



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche


Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.





E. BIBL. RADCL

Per. 193^{C.} e. 228





Jahresbericht
über die Fortschritte
der
reinen, pharmaceutischen und technischen
Chemie,
Physik, Mineralogie und Geologie.

Unter Mitwirkung von
H. Buff, E. Dieffenbach, C. Ettling, F. Knapp,
H. Will, F. Zamminer

herausgegeben von
Justus Liebig und Hermann Kopp.

Für 1847 u. 1848.

Giessen.
J. Ricker'sche Buchhandlung.
1849.

Vorrede.

Die reine und die angewandte Chemie, die Physik, die Mineralogie und die chemische Geologie bilden ein Gebiet, dessen einzelne Theile so viel Gemeinschaftliches und Zusammenhängendes haben, daß sich zwischen ihnen kaum bestimmte Grenzen ziehen lassen; jene Wissenschaften bilden ein Gebiet von durchweg in einandergreifendem Inhalt, aber von solchem Umfang und so vielfältiger Bearbeitung, daß es dem Einzelnen sehr schwer wird, allen Fortschritten auf demselben durch das Studium der einzelnen Originalabhandlungen zu folgen. Ueber diese Fortschritte einen vollständigen Ueberblick zu geben, zu zeigen, inwiefern die einzelnen Untersuchungen Neues bringen und früher Bekanntes bestätigen oder berichtigen, dazu eignet sich vorzugsweise ein umfassend angelegter und gründlich durchgeführter Jahresbericht.

Die Herausgabe eines Jahresberichts über die eben genannten Wissenschaften zu versuchen, wurde für die Unterzeichneten durch das freundschaftliche Zusammenwirken möglich, welches eine Anzahl Lehrer der Naturwissenschaften an der hiesigen Universität vereinigt. Herr Prof. Buff übernahm die Berichterstattung bezüglich der Molecularwirkungen, der Electricität und theilweise des Magnetismus; Herr Prof. Zamminer bezüglich des Diamagnetismus, der Bewegungslehre, der Akustik, der Optik,

erstatters unbedingt ausschliesse. Wer mit dem gegenwärtigen Zustand der Chemie einigermaassen vertraut ist, kann nicht verkennen, dass diese Wissenschaft in Beziehung auf gewisse Grundansichten, insbesondere über die Constitution der Salze und der organischen Verbindungen, sich in einer Uebergangsperiode befindet, welche noch nicht so weit durchlebt ist, dass sich mit Sicherheit erkennen liesse, welche oder wieviel von den aufgestellten Ansichten sich eine dauerndere Anerkennung verschaffen werden. Es legt dies, in Beziehung auf die Chemie insbesondere, die Pflicht auf, über die Ausbildung der verschiedenen Ansichten zu berichten. Ueberhaupt aber soll der Jahresbericht für keins der darin abgehandelten Fächer die Ansichten einer bestimmten Schule durchweg vertreten; er soll keineswegs Alle Arbeiten, welche innerhalb eines bestimmten Fachs erscheinen, von dem Standpunkt einer bestimmten theoretischen Ansicht discutiren und die Uebereinstimmung oder den Widerspruch mit derselben zu erörtern und erklären suchen. — Die objective Darstellung lässt sich leider bei einzelnen Fächern nicht bis in's kleinste Detail ausführen, ohne dass grössere Uebelstände daraus erwachsen; es konnten z. B. die so abweichenden Ansichten der einzelnen Chemiker über Atomgewichte und Schreibart der Formeln unmöglich hier immer unverändert aufgenommen werden, wenn nicht vieler Raum durch die immer wiederkehrende Erklärung der Werthe der einzelnen Zeichen in Anspruch genommen oder grosse Verwirrung hinsichtlich der Bedeutung der Formeln entstehen sollte. Es musste hier vorgezogen werden, Einer Schreibart der Formeln getreu zu bleiben, welche aus der beigegebenen Uebersicht der gebrauchten Atomgewichte verständlich ist. Wo die dafür angenommenen Zeichen mit verschiedenem Werth gebraucht sind — z. B. in dem Bericht über Mineralogie bei Vergleichung von Formeln für dasselbe Mineral, wo in den einen die Kieselerde als SiO_2 , in den andern als SiO , betrachtet wird — ist dies

Inhaltsverzeichnis.

Physik und physikalische Chemie.

Molecularwirkungen	1
Abhängigkeit der Cohäsion der Flüssigkeiten und der Capillari- tätshöhe von der Temperatur	1
Veränderung der Form der Oberfläche von Flüssigkeiten durch andere	11
Capillarsenkung des Quecksilbers	12
Endosmose	15
Atomenlehre	23
Krystallisation	23
Krystallographie	25
Beziehungen zwischen Zusammensetzung und Krystallform; Iso- morphismus, Dimorphismus	29
Specifisches Gewicht; Bestimmung desselben bei festen Körpern, Flüssigkeiten und Gasen	37
Beziehungen zwischen Zusammensetzung und specifischem Ge- wicht. — Specifisches Volum	40
Wärmelehre	47
Wärmequellen; Wärmeentwicklung bei chemischen Verbindungen	47
Mechanisches Aequivalent der Wärme	56
Ausdehnung durch die Wärme	57
Specifische Wärme; Schmelzen, latente Schmelzwärme	70
Sieden; latente Dampfwärme	87
Beziehungen zwischen chemischer Zusammensetzung und Siedepunkt	98
Spannkraft der Dämpfe; Thaubildung; hygrometrische Apparate	95
Wärmeleitung	100
Wärmestrahlung	104
Bewegungslehre	123
Ueber Kräfte im Allgemeinen	123
Gleichgewicht starrer Körper, Elasticität und Festigkeit	125
Gleichgewicht tropfbarer Flüssigkeiten; Zusammendrückbarkeit ders.	133

Inhaltsverzeichnis.

IX

Electricität	264
Leitungsvermögen der Flamme	264
Isolirmittel	266
Electrometrie	267
Entladung par cascade	273
Electrische Ströme durch Entladung von Flaschenbatterien	276
Volta'sche Combinationen	276
Gasbatterie	278
Passivität	284
Leitungswiderstand	285
Polarisation	293
Electromotorische Kraft	299
Wärmeentwicklung in Stromleitern	307
Electrothermische Zersetzung	314
Neue Theorie der Electricität	315
Electrodynamik	315
Allgemeines Inductionsgesetz	319
Torsionswage zum Messen inducirter Ströme	321
Magnet-electrische Maschine	323

Unorganische Chemie.

Allgemeines	325
Katalyse	325
Einwirkung starker Hitze auf zusammengesetzte Gase und Wasser	326
Verhalten wasserfreier Säuren gegen Pflanzenfarben	327
Ansichten über die Salze	328
Sauerstoff	328
Ozon	329
Wasserstoff; Wasser	331
Kohlenstoff; Kohlensäure	333
Boron; Borsäure	335
Phosphor	336
Gewöhnliche Phosphorsäure	337
Pyrophosphorsäure; Submodificationen derselben	345
Metaphosphorsäure; Submodificationen derselben	355
Andere Modificationen der Phosphorsäure	359
Schwefelphosphorsäure	362
Phosphorwasserstoff; Phosphorchlorid; Chlorschwefelphosphor; Phosphoroxychlorid	363
Schwefel	365
Unterschweflige Säure	366
Schweflige Säure	368
Schwefelsäure	370
Di-, Tri-, Tetra-, Pentathionsäure etc.	374
Selen; Selenverbindungen	378

Gold; Goldverbindungen	451
Platin; Platinverbindungen	453
Palladium	457
Rathenium	457
Iridium und Verbindungen desselben	458
Osmium; Osman-Osmiumsäure	461

Organische Chemie.

Allgemeines	465
Einfluß der Zeit auf die Bildung chemischer Verbindungen	465
Gährung und Fäulnis	465
Cyan und Cyanverbindungen	473
Cyan und Paracyan	473
Blausäure; Chlorcyanwasserstoff; flüssiges Chlorcyan	474
Cyankalium; cyansaures Kali	476
Cyanblei; Cyanquecksilber-Doppelsalze	477
Doppelcyanüre; Ferridcyankalium; Kobaltcyanverbindungen; Platincyanverbindungen	477
Constitution der Cyanverbindungen; Verhalten derselben in höherer Temperatur	484
Zersetzung des Cyanquecksilbers durch Chlor	486
Constitution u. Nomenclatur der Knallsäuren; Knallsäure; Cyanursäure	487
Schwefelcyanammonium	491
Mellonverbindungen	491
Pseudoschwefelcyan und Schwefelmellonwasserstoff	491
Mellonkalium	493
Kakodyl der Buttersäure	494
Säuren und dahin Gehöriges	494
Mellithsäure (Aethermellithsäure; Euchronsäure; Paramid; Par- amidsäure; Euchron)	494
Oxalsäure	498
Bernsteinsäure (Chlorsuccinsäure)	499
Äpfelsäure	500
Citronsäure; Einwirkung von Brom auf citrons., itacons. u. citra- cons. Salze (Bromoxaform; Bromotriconsäure; Bromitonsäure)	501
Weinsäure; Veränderung derselben durch Erwärmung (Metawein- säure; Isoweinsäure; Isotartriidsäure; Pyroweinsäure)	505
Traubensäure	512
Milchsäure (Unterschied der aus Zucker und der aus Muskel- fleisch dargestellten)	512
Igasursäure	519
Schleimsäure	520
Camphersäure	522
Chinasäure (Chinon)	522

Adstringirende Extracte; Gerbsäure; Kaffeegerbsäure; Virldin- säure; Boheasäure	522
Angelikasäure	528
Benzoësäure (Chloroniceinsäure; Chloroniceinamid; einfach-ge- chlortes Nicen; Chloronicin; Paranicen; Paranicin; Nitro- benzoësäure; Binitrobenzoësäure)	528
Cuminsäure (Chlorcumyl; Nitrocuminsäure)	534
Zimmtsäure (Chlorcinnamyl; Cyancinnamyl)	535
Benzilsäure (Chlorbenzil)	536
Anissäure (Binitranisol; Trinitranisol; Pikranissäure; Chlor- anisyl; Nitranssäure)	536
Anilsäure; Pikrinsäure; Chlorpikrin; Nitrobichlorphensäure	538
Chrysamminsäure (Chrysamid; Chrysamminamid; Amidochry- samminsäure; Hydrochrysamid)	541
Ueber die Constitution der Säuren $C_n H_n O_4$	544
Ueber die Constitution der Acetone der Säuren $C_n H_n O_4$	544
Ueber das Vorkommen der Säuren $C_n H_n O_4$ im Allgemeinen	545
Ameisensäure	546
Essigsäure; Aldehyd	547
Metacetonsäure (Nitrometacetonsäure)	551
Buttersäure	554
Valeriansäure; Zersetzung derselben durch den electricischen Strom	556
Capronsäure	559
Fette Säuren des Cocosnufsöls (Capronsäure; Caprylsäure; Caprin- säure; Pichurimalgsäure; Myristinsäure; Palmitinsäure)	560
Fette Säuren des Ricinusöls; Oenanthol und Zersetzungspro- ducte desselben	562
Fette Säure im Döglingthran	567
Fette Säure im Behenöl	569
Untersuchung von altem Lampen-Brennmaterial; Fettmasse aus verwestem Thierkörper	569
Zersetzung fatter Oele mit Schwefel in der Hitze (Odmyl)	570
Säuren im Fichtenharz (Sylvinsäure; Pimarsäure; Pininsäure; Azomarsäure)	572
Anacardsäure (Untersuchung der Anacardiumfrüchte; Cardol)	574
Harnsäure; Zersetzung durch Ferridcyankalium und Kali (Lan- tanursäure; Hidantoinensäure)	578
Hippursäure	584
Amide, Nitrile, Anilide und Aehnliches	585
Amide: Phosphamid; Sulfocarbamid; Metacetamid; Acetamid; Valeramid; Chlorcarbethamid oder Chloracetamid; Anisamid; Cuminamid; Nitrobenzamid; Chlorbenzamid; Phtalamsäure; Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Hydramide	585

Nitrile : Acetonitril ; Chloracetonitril ; Butyronitril und Valeronitril ; Cumonitril ; Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Benzonitril	591
Anilidverbindungen : Chlorcyanilid ; Fluosilicanilid ; Oxanilid ; Oxanilsäure ; Oxaluranilid ; Succinanil ; Succinanilsäure ; Succinanilid ; Suberanilid ; Suberanilsäure ; Phtalanil ; Phtalanilsäure ; Camphoranil ; Camphoranilsäure ; Carbanilsäure (Anthranilsäure) ; Sulfocarbonilid ; Cinnanilid ; Cumanilid ; Anisanilid	596
Amidartige Verbindungen des Naphthalidams : Naphthalidam-carbamid ; Schwefel-Naphthalidam-Carbamid	610
Organische Basen	612
Nicotin	612
Chinin (Chininverfälschung und Chininsurrogate	615
Cinchonin (Chlor- und Bromcinchonin)	617
Chinoidin	620
Chinidin	620
Pseudochinin	621
Morphin	622
Sulfomorphid und Sulfonarcotid	623
Cotarnin	624
Codein	625
Papaverin	625
Piperin	625
Strychnin (Chlor- und Bromstrychnin)	625
Brucin ; Brombrucin ; Zersetzung des Brucins durch Salpetersäure	628
Theobromin	633
Caffein	634
Berberin	635
Harmalin ; Harmin ; Hydrocyanharmalin ; Nitroharmalidin	636
Corydalin	643
Digitalin	644
Gratiolin	645
Agrostemmin	645
Phosphorhaltige organische Basen	645
Thialdin ; Selenaldin	646
Carbothialdin	649
Kyanäthin	650
Organische Basen im Oleum animale Dippelii (Petinin ; Picolin)	651
Anilin ; Jodanilin ; Cyananilin ; Melanilin ; Dichloromelanilin ; Dibromomelanilin ; Dijodomelanilin ; Dinitromelanilin ; Dicyanomelanilin	654
Cumidin ; Nitrocumidin ; Cyancumidin ; Cyantoluidin	663
Chinolin ; Pikryl ; Lophin ; Flavin	666
Unterscheidung der organischen Basen mittelst des Mikroskops	667

Constitution der organischen Basen	668
Alkohole und dahin Gehöriges	669
Methylverbindungen und dahin Gehöriges	669
Rohrer Holzgeist, neue Körper darin; Einwirkung von Chlor auf Holzgeist	669
Jodmethyl; Brommethyl; Cyanmethyl	672
Schwefelcyanmethyl; Einwirkung der Salpetersäure darauf (Methylunterschwefelsäure)	673
Zweifach - Schwefelmethyl; Einwirkung der Salpetersäure darauf (Sulfmethylschwefelsäure)	673
Methyloxyd-Schwefelkohlenstoff	674
Oxalsaures Methyloxyd; ameisensaures Methyloxyd; Einwir- kung von Chlor auf dieselben	674
Salicylsaures Methyloxyd; Einwirkung von Salpeter-Schwefel- säure (Binitrogaultheriasäure; Binitrosalicylsäure)	676
Cyanursaures und cyansaures Methyloxyd	679
Chloroform; Jodoform, Zersetzungsproducte desselben	680
Aethylverbindungen und dahin Gehöriges	682
Alkohol; Mischungen mit Wasser; Bestimmung des Alkohol- gehaltes; Alkoholate	682
Selenmercaptan	684
Aether; Substitutionsproducte desselben	685
Chloräthyl; damit isomere Flüssigkeit; Substitutionsproducte desselben	685
Jodäthyl; Schwefeläthyl	686
Cyanäthyl, Zersetzung durch Kalium	687
Schwefelcyanäthyl, Zersetzungsproducte desselben	687
Zersetzung der Substitutionsproducte zusammengesetzt. Aetherarten	689
Salpetrigsaures und salpetersaures Aethyloxyd, Einwirkung von Schwefelwasserstoff	689
Aethyloxyd-Schwefelkohlenstoff	690
Cyanursaures und cyansaures Aethyloxyd	691
Schwefelsaures Aethyloxyd; Aetherschwefelsäure	692
Aetherphosphorsäure; Biätherphosphorsäure; phosphorsaures Aethyloxyd; Aetherschwefelphosphorsäure	694
Acetal	696
Amylverbindungen und dahin Gehöriges	698
Amyloxydhydrat; Amyläther?, Chloramyl	698
Einwirkung von Cyansäure auf Amyloxydhydrat	699
Salpetrigsaures und salpetersaures Amyloxyd	699
Zweifach-Schwefelamyl; Schwefelcyanamyl; Cyanamyl	699
Amyloxyd-Schwefelkohlenstoff	700
Neue Alkohole in Wachs	701
Untersuchung des Bienenwachses	701
Untersuchung von chinesischem Wachs	706

Eigenthümliche Pflanzenstoffe	808
Gentianin	809
Santonin	812
Asparagin	816
Amygdalin	820
Pflanzenchemie	822
Absorption unorganischer Substanzen durch Pflanzen	822
Reaction von Pflanzensäften; Untersuchung von Milchsäft	823
Untersuchung verschiedener Wurzeln	825
Untersuchung von Hölzern, Rinden und Blättern	828
Untersuchung von Pollen, Früchten und Samen	828
Untersuchung ganzer Pflanzen	831
Schwefel- und Phosphorgehalt der Pflanzen	832
Einfachere Bestandtheile des Thierkörpers u. Aehnliches	834
S. g. Proteinverbindungen im Allgemeinen	834
Schwefelgehalt thierischer Substanzen	836
Spec. Gew. thierischer Substanzen	837
Muskelgewebe der Fische	837
Schleimhautepithelium	838
Casein; Fäulnisproducte desselben; Umwandlung desselben in Fett	839
Albumin aus Fisch- u. Hühnerfleisch; lösliches Albumin der Fische	840
Vitellin	841
Legumin	842
Leim; Glycocoll; Leucin	845
Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fibrin und Leim durch Manganhyperoxyd und Chromsäure bei Mitwirkung von Schwefelsäure	847
Harnstoff	854
Thierchemie	857
Zusammensetzung des Hühnereis	857
Chemische Vorgänge bei der Entwicklung der Thiere im Ei	859
Athmen	860
Verdauung (Magensteine); Ernährung; Fettbildung	863
Blut im normalen Zustande	865
Blut unter abnormen Umständen	869
Blut niederer Thiere	871
Gehalt des Bluts an Kohlensäure od. kohlens. Alkali; Blutasche	872
Metalle im Thierkörper und namentlich im Blute	874
Fleisch; Untersuchung der Fleischflüssigkeit (Kreatin; Kreatinin; Sarkosin; Inosinsäure; Milchsäure; unorgan. Bestandtheile)	876
Thierische Säfte im Allgemeinen; Amniosflüssigkeit; Untersuchung von Flüssigkeiten aus kranken Körpern; Castoreum	894
Zucker in der Leber	895
Galle	896

Untersuchung der Ochsen-galle (Cholsäure; Cholalsäure; Cholsäure; Choloidinsäure; Dyslysin; Choleinsäure) . . .	896
Untersuchung der Schweinegalle (Hyo-cholinsäure) . . .	913
Untersuchung der Galle verschiedener Thiere . . .	918
Taurin	918
Gallensteine; Cholesterin	919
Milch	922
Speichel	923
Harn; über den Gehalt desselben an Kohlensäure, Schwefel und Phosphor, Harnstoff; Abwesenheit der Milchsäure im Harn; Kreatin und Kreatinin im Harn; über den Uebergang verschiedener Stoffe in den Harn; Harn bei Krankheiten; Kalb- u. Hammelharn	923
Harnsteine; Gichtknoten; Nierensteine	932
Excremente	934
Untersuchung eines Osteosarkoms	935
Federn	935
Schildpatt	936
Seidensaft	936
Spongia marina	937

Analytische Chemie.

Anwendung des Salmiaks in der analytischen Chemie . . .	939
Gasanalysen; Sauerstoff (Eudiometrie)	941
Wasserstoff	942
Kohlenstoff; Kohlensäure	943
Phosphor; Phosphorsäure	945
Schwefel; Sauerstoffsäuren des Schwefels	949
Brom; Jod	952
Stickstoff; Salpetersäure; Ammoniak	954
Kali; Natron	960
Magnesia; Strontian; Kalk	961
Molybdän; Chrom; Mangan	964
Arsen	965
Antimon und Zinn	969
Wismuth und Blei	970
Eisen	970
Nickel und Kobalt	971
Kupfer; Silber; Gold	975
Analyse von Aschen	976
Analyse von Ackererden	983
Unterscheidung von Rohr- und Traubenzucker	983
Essigsäure (Bestimmung des Säuregehalts); Milchsäure; Blausäure	986

Schwefels, Cinchonin in schwefels. Chinin; Strychnin	988
Harnstoff; Harnsäure; Galle; Chloroform im Blut; Erkennung von Blutflecken; Fibrin	989
Anhang zur analytischen Chemie	993
Regenwasser	993
Brunnen- und Fluswasser	994
Meerwasser	999
Salzsoolen und Mineralwasser	1001
Quellenabsätze (Ocker)	1012
Ueber den Gehalt der Mineralwasser an Arsen, Kupfer u. s. w.	1013

Technische Chemie.

Metalle und Legirungen	1019
Kohlenstoff, Phosphor und Arsen im Eisen	1019
Darstellung des Kupfers; fremde Metalle in demselben	1020
Fremde Metalle im Zinn; Ausbringen des Silbers ohne Quecksilber	1023
Nasse Versilberung; Vergoldung; Verzinnung; Verkupferung; Ver- bleiung	1024
Ätzflüssigkeit für Kupfer und Stahl	1027
Goldscheiderei mit Schwefelsäure	1027
Hydrostatische Silberprobe	1032
Goldzinklegirung; Bronze; Glockenmetall u. a. Kupferlegirungen	1034
Kupferamalgam	1036
Nickelhaltiges Kupfer; Nickelspeise; Neusilber	1038
Schmelzpunkt verschiedener Legirungen	1040
Schwefelsäure- und Sodafabrikation	1041
Schwefelsäurefabrikation	1041
Sodafabrikation	1043
Salze	1054
Salinenwesen	1054
Chromsaure Salze	1055
Blutlaugensalz	1056
Härten des Gypses	1057
Schlacken zu hydraulischem Cement	1057
Bleiweißfabrikation	1057
Zinnsaures Natron	1058
Titangrün und bors. Kupferoxyd als Ersatz für grüne Arsenfarbe	1058
Glasbereitung und Töpferei	1060
Alte Glasmalerei; künstlicher Aventurin; Email zum Löthen von Porcellan; Hämatinon; böhmisches Glas; Krystallbildung in Tafelglas	1060
Rohstoffe und Producte der Töpferei	1063
Heizung der Porcellanöfen mit Steinkohle	1066

Telluride : Blättertellur; Tetradymit	1154
Arsenide : Speiskobalt; Kobaltglanz; Nickelglanz	1155
Sulfuride : Wismuthglanz; Magnetkies; Hauerit; Zinnober; Nadel- erz; Jamesonit; Federerz; Berthierit; Fahlerz	1156
Wasserfreie Oxyde : Rothzinkerz; Mennige; Arkansit; Pyro- lusit; Titaneisen; Smirgel; Quarz; Chalcodon	1160
Wasserhaltige Oxyde : Hyalith; Opal; Kieselguhr; Diaspor; Hydrargillit; Bohnerz	1162
Manganate : Crednerit	1164
(Spinelle) Ferrate : Magneteisen. Aluminate : Chromeisen; Kreitonit; Coracit; Uranpacherz; Chrysoberyll	1165
Wasserhaltige Aluminate : Völknerit	1168
Silicate im Allgemeinen : Formeln und Klassification der Sili- cate; Uebersicht der Silicate nach ihren Sauerstoffverhältnissen; künstliche Silicate (Schlacken); künstliche Feldspathkrystalle	1168
Wasserfreie Silicate mit Basen R_2O_3 : Zirkon und Malakon	1171
Wasserfreie Silicate mit Basen RO : Agalmatolith; Augit; Hornblende; Chrysolith; Willemit; Bagrationit	1171
Wasserfreie Silicate mit Basen RO u. R_2O_3 : Epidot (Buck- landit); Orthit (Allanit; Cerin); Bodenit u. Muromontit; Idokras; Pyrop; Thjorsanit; Gehlenit; Jacksonit; Feldspathe (Baulit; Orthoklas; Periklin; Oligoklas; Andesin; Labrador); Glimmer	1174
Wasserhaltige Silicate mit Basen R_2O_3 : amorphe Thonerde- silicate; amorphe Eisenoxysilicate	1185
Wasserhaltige Silicate mit Basen RO : Zinkglas; Apophyllit	1187
Wasserhaltige Silicate mit Basen RO u. R_2O_3 : Chlorastrolith; Skolezit; Chabasit; Faujasit; Phillipsit (Christianit); Gismondin; Diaphanit; Neolith; Gigantolith; Chlorophyllit; Pinit; Liebe- nerit; Palagonit; Hisingerit	1188
Silicate mit Hydraten : Schillerspathähnliches Mineral; Wil- liamsit; Serpentin (Pikrolith und Chrysotil); steatitartige Mineralien; Disterrit (Brandisit); Chlorit (Leuchtenbergit; Eisenchlorit); Grünerde	1195
Silicate mit Fluoriden : Humit; Chondroit	1200
Silicate mit Chloriden, Sulfaten, Carbonaten u. Boraten : Sodalith; Nosean; Hauyn; Ittnerit; Cancrinit; Turmalin	1201
Titanate, Tantalate, Niobate und Pelopate : Wöhlerit; Eukolit; Enceladit; Greenovit; Pyrochlor; Yttrotantalit; Euxenit und Polykras; Columbit (Tantalit); Samarskit (Urano- tantal; Yttrilmenit)	1203
Wolframate : Wolfram; Wolframbleierz	1210

Ungeschichtete Gesteine (Granit; Gneufs und Gneufgneiss; Syenit; Porphyry [Melaphyr]; Protogyn; Trachyt; Diomit; Arkose; Gabbro; Laven)	1264
Geschichtete Gesteine (Serpentinschiefer; Dolomit und Dolo- mitbildung; Muschelkalk; Steinsalz, Gyps und Anhydrit; Pseudomorphosen nach Steinsalz; Bildung von Steinkohlen, Faserkohlen, Pechkohlen)	1288
Imatrasteine; Koprolithen	1298
Meteorsteine und Meteorstaub	1298

Abhängigkeit
der Cohäsion
der Flüssig-
keiten und der
Capillaritäts-
höhe von der
Temperatur.

Dichtigkeit in Betracht gezogen und glaubten die vermehrte abstossende Kraft als unbedeutend vernachlässigen zu dürfen.

Die neuesten experimentalen Studien haben nun übereinstimmend dargethan, daß die Cohäsion von den Veränderungen, die mit der Entfernung der kleinsten Theilchen von einander eintreten, wenigstens innerhalb der Gränzen der bisherigen Beobachtungen nicht merklich abhängig ist, während ihre Abnahme mit der Zunahme der Temperatur so ziemlich gleichen Schritt hält.

Direkte Mafsbestimmungen über die durch **Erwärmung** bewirkten Veränderungen der Cohäsion einiger Flüssigkeiten sind von Buys-Ballot (1) mitgetheilt worden. Er bediente sich bei diesen Versuchen der Adhäsionsplatten von Glas oder Metall.

Eine ebene Platte, von dem einen Arme einer feinen Wage herabhängend und genau wagerecht eingestellt, wurde mit der Oberfläche der Flüssigkeit, welche sie benetzte in Berührung gesetzt. Das Gewicht, welches um sie wieder loszureißen auf der andern Seite aufgelegt werden mußte, war dann das Mafs der Cohäsion für einen Querschnitt, entsprechend dem Flächeninhalte der Platte. Unreinlichkeiten, so wie auch Luftbläschen zwischen beiden in Berührung tretenden Flächen wurden aufs sorgfältigste vermieden, und überhaupt scheint jede bei dergleichen feinen Versuchen unumgängliche Vorsicht beachtet worden zu sein. Das wagerechte Einstellen der Platten gelang am sichersten bei viereckigen Platten, mit Hülfe von drei feinen Schrauben, mittelst deren man die drei Aufhängefäden verlängern oder verkürzen konnte.

Die zu einer Versuchsreihe bestimmte Flüssigkeit wurde zuerst erwärmt, und dann, während sie langsam erkaltete,

(1) Pogg. Ann. LXXI, 177. Auszug aus Dissertatio inauguralis de Synaphia et Prosaphia. Trajecti ad Rhenum. 1844. Eine Berichtigung seiner Rechnungen von R. Merian findet sich Pogg. Ann. LXXIII, 486, auch Arch. ph. nat. V, 355.

Abhängigkeit
der Cohäsion
der Flüssig-
keiten und der
Capillaritäts-
höhe von der
Temperatur.

Einwürfe zu beseitigen, welche Donny (1) dagegen erhoben hat; gleichwohl können die in obiger Tabelle enthaltenen Werthe, wie B. B. selbst zugiebt, nur als Annäherungen betrachtet werden, weil das Verfahren mit Adhäsionsplatten, bei aller Umsicht des Experimentators, wohl kaum die Erreichung eines sehr hohen Grades der Genauigkeit gestattet. Andere Physiker haben daher vorgezogen, die Cohäsion des Flüssigen aus der Capillarerhebung abzuleiten, wozu bekanntlich La Place zuerst den Weg angebahnt hat, indem es ihm gelang, die Erscheinungen der Capillarität auf die Kraft, womit feste Platten an der Oberfläche flüssiger Körper anhaften, zurückzuführen.

Ueber das Verhalten flüssiger Körper in Haarröhrchen sind in den letzten Jahren sehr umfangreiche Abhandlungen von C. Brunner (2) und von Frankenheim (3) erschienen. Die des letzteren beziehen sich auf experimentale Untersuchungen, die er größtentheils schon früher, zum Theil gemeinschaftlich mit Sondhaus (4) und mit Hildebrand, angestellt hatte.

Frankenheim brachte die zu prüfenden Flüssigkeiten in heberförmig gebogene Röhren, deren einer Schenkel capillar oder doch sehr enge war, während der andere 3–7 Millimeter Radius zeigte. Diese doppeltschenkligen Röhren wurden, um die nöthigen Temperaturveränderungen hervorbringen zu können, in ein durchsichtiges Bad, das sich erwärmen liefs, eingetaucht.

Brunner befolgte im Wesentlichen die von Gay-Lussac angegebene und in Biot's *traité de physique* 1, 441 beschriebene Methode, und suchte den erforderlichen Temperaturwechsel dadurch hervorzubringen, dafs er das

(1) Pogg. Ann. LXVII, 564. — (2) Pogg. Ann. LXX, 481; Arch. ph. nat. IV, 121; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LIV, 140. — (3) Pogg. Ann. LXXII, 178; im Ausz. Arch. ph. nat. VII, 122; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 143. — (4) J. pr. Chem. XXIII, 401.

Abhängigkeit
der Cohäsion
der Flüssig-
keiten und der
Capillaritäts-
höhe von der
Temperatur.

$$H = r \left(h + \frac{r}{3} \right)$$

wenn h die Höhe der Capillarsäule in einem Rohr von r^{mm} Radius vorstellt, gemessen vom unteren Spiegel der Flüssigkeit bis zum niedrigsten Punkte des Meniskus (1).

	Spec. Gew. bei 0°	Frankenheim H^{mm}	Brunner H^{mm}
Wasser . . .	1,0000	15,336—0,02875t oder 15,336— 0,02751t—0,000014t ³ zwischen — 2°,5 bis 98°,4 C.	15,332—0,0286t zw. 0° bis 82°C.
Aether . . .	0,7370	5,400—0,0254t zwisch. — 6° bis 35°.	5,354 — 0,0280t zw. 0° bis 35°
Olivöl . . .	0,9150		7,461 — 0,0105t zw. 15° bis 150°
Terpentinöl.	0,8902	6,760—0,0167t zw. 17° bis 137°	
Citronenöl .	0,8380	7,23 — 0,0174t zw. 17° bis 125°	
Steinöl . . .	0,8467	6,896 — 0,0161t zw. 17° bis 128°	
Alkohol . . .	0,8208	6,05—0,0116t—0,000051t ³ zw. 0° bis 75°	
Weingeist . .	0,9274	6,41 — 0,0120t zw. — 2° bis 70°	
Schwefelkoh- lenstoff . .	1,290	5,10 — 0,0101t zw. — 5° bis 36°	
Essigsäure .	1,0522	8,51 — 0,0097t zw. 13° bis 100°	
Chlorzinklö- sung . . .	1,3638	10,06—0,0220t zw. 40° bis 85°	
Schwefelsäure	1,840	8,40 — 0,0153t—0,000094t ³ zw. 12°—90°	

Frankenheim und Brunner haben, wie man sieht, für das Wasser und den Aether fast gleiche Werthe erhalten. Für ersteres fand Gay-Lussac bei 8°,5 C. $H = 15^{\text{mm}},135$. Aus Frankenheim's Formel ergibt sich für dieselbe Temperatur $15^{\text{mm}},101$; aus der von Brunner mitgetheilten: $15^{\text{mm}},089$.

Die beigelegten specifischen Gewichte zeigen, wie wenig aus der Dichtigkeit einer Flüssigkeit auf den Zusammenhang ihrer Theile ein Schluss gezogen werden kann. Mit der Dichtigkeitsabnahme eines und desselben flüssigen Körpers vermindert sich zwar im Allgemeinen auch seine Capillarhöhe, aber nach ganz andern Verhältnissen. Beispielsweise vergleiche man die mittleren Dichtigkeitsab-

(1) Blot, traité de physique, I, 449.

Abhängigkeit
der Cohäsion
der Flüssig-
keiten und der
Capillaritäts-
höhe von der
Temperatur.

Erhebung der Flüssigkeit in einem cylindrischen Rohr von 1 mm Radius, ausgedrückt in Millimetern, dividirt durch 100; μ bedeutet das Gewicht von 1 Cubikcentimeter der betreffenden Flüssigkeit, πr^2 den Flächeninhalt der Adhäsionsplatte in Quadratcentimetern, p das zum Abreißen erforderliche Gewicht (in Grammen).

Berechnet man nun p für verschiedene Temperaturen, indem man für μ und a^2 jedesmal die entsprechenden Werthe setzt, so gelangt man, mit Zugrundelegung der Brunner'schen Formel für das Wasser, auf eine Zahlenreihe, welche allgemein durch die Gleichung

$$p = 0,4632 - 0,000358t - 0,000002t^2$$

dargestellt werden kann. p bedeutet hier die Cohäsion des Wassers für 1 Quadratcentimeter Querschnitt. Dieselbe ist also bei der Temperatur des Eispunktes 0,4632 Gramme, bei 100° beträgt sie 0,4086 Grm.

Nach der Rechnungsweise von Frankenheim ergibt sich für dieselben Temperaturen 0,5544 und 0,4784.

Man weiß, daß das Wasser unter genügendem äußeren Druck bei Temperaturen weit über 100° den tropfbarflüssigen Zustand, also Zusammenhang der Theile, zu behaupten vermag. Darf man der so eben aufgestellten Formel für solche höhere Wärmegrade wenigstens annähernde Geltung beimessen, so läßt sich die mit der Temperatur abnehmende Cohäsion bis zu dem Punkte verfolgen, wo sie durch eine ihr an Gröfse gleiche Wärmeabstofsung völlig erschöpft ist, und man findet, daß dies bei 400° eintreten müßte, d. h. Wasser zu dieser Temperatur erhitzt, müßte durch das geringste Uebergewicht der Spannung, z. B. durch eine einzige eintretende Luftblase, sich plötzlich durch seine ganze Masse in Dampf verwandeln. Da das Wasser, um sich in Dampf zu verwandeln, von 0° an gerechnet 610 Wärmeeinheiten bedarf, so läßt sich hieraus ferner auf eine sehr rasche Zunahme der specifischen Wärme des Wassers bei Temperaturen über 100° schließen.

Abhängigkeit
der Cohäsion
der Flüssig-
keiten und der
Capillaritäts-
höhe von der
Temperatur.

der verwendeten Anzahl Wärmeeinheiten und dem aus andern Betrachtungen abgeleiteten mechanischen Effecte einer Wärmeeinheit zu erwarten stand. Der gefundene Unterschied (beziehungsweise Wärmeverlust) wurde dann auf Rechnung der Cohäsion gebracht. So gelangte er zu der Formel: $607 - 1,1394 t$, welche die Cohäsion der Gewichtseinheit Wasser bei verschiedenen Temperaturen in Wärmeeinheiten ausdrückt.

Dividirt man diesen Ausdruck durch 607 und multiplicirt mit 15,332, so erhält man

$$15,332 - 0,02878t,$$

fast genau denselben Werth, welchen Brunner für die Erhebung des Wassers in einem Capillarrohr von 1^{mm} Radius gefunden hatte. Holtzmann betrachtet diese Uebereinstimmung als eine sichere Stütze für die Richtigkeit seiner theoretischen Untersuchungen. Er hat indeß bei der Berechnung seiner Formel die spec. Wärme des Wassers als beständig angenommen, was für die höheren Temperaturen gewiß nicht zulässig ist; ferner hat er die Dampfwärme gleich 640 gesetzt, was wahrscheinlich zu hoch ist. Den Ausdehnungscoefficienten des Wasserdampfes nahm er zu $\frac{1}{33}$ an; seitdem aber hat Regnault experimentell nachgewiesen, daß derselbe selbst beim Dichtigkeits-Maximum von dem der Luft $\frac{1}{33}$ nicht bedeutend abweichen kann. Jene Uebereinstimmung mit der Brunner'schen Formel ergibt sich hiernach als eine zufällige. Dies kann aber auch nicht anders sein, indem die Brunner'sche Formel, wohl geeignet, die Cohäsion des Wassers daraus abzuleiten, doch unmittelbar kein vergleichbarer Ausdruck derselben ist.

A. Moritz in Dorpat (1) benutzte das von Coulomb angegebene Verfahren, nämlich: durch Beobachtung der Schwingungsabnahme einer in horizontaler Lage an einem feinen Draht aufgehängten und unter dem Einflusse der Torsion innerhalb der Flüssigkeit um ihren Mittelpunkt

(1) Pogg. Ann. LXX, 74; im Ausz. Arch. ph. nat. IV, 891.

Veränderung
der Form der
Oberfläche
von Flüssig-
keiten durch
andere.

deutlichsten. Swan (1) hat diesen Gegenstand hauptsächlich theoretisch zu verfolgen gesucht. Wir heben aus seiner Arbeit hervor, daß er die Oberfläche von Chloroform in Glasgefäßen unter alkalischem Wasser eben fand, ausgenommen an der Glaswandung, wo sie convex war; — Olivenöl und Spermacetiöl zeigt auf reinem oder mit Salzsäure versetztem Wasser schwimmend nach unten eine convexe Fläche, die durch Zusatz von Alkali geebnet wird; ebenso Lavendelöl auf Zusatz von Alkohol; — die convexe Oberfläche von Cassiaöl unter Wasser wird durch Zusatz von Alkali oder Alkohol, die von Nelkenöl durch Alkohol geebnet.

Swan giebt noch folgende Bestimmungen über Capillaritätshöhe (A bezeichnet das spec. Gew., B den Durchmesser der Glasröhre, C die Capillaritätshöhe in englischen Zollen) :

	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Chloroform	1,493	0,014	0,8	1,493	0,026	0,46	1,493	0,010	1,07
Salzsäure	1,165	"	2,7	1,167	"	1,51	1,167	"	3,73
Kalilösung	1,343	"	2,9	1,105	"	1,77	1,105	"	4,61

Capillar-Senkung
des
Quecksilbers.

Frankenheim (2) hat nach dem oben beschriebenen Verfahren mit doppeltschenklichen Röhren von ungleicher Weite auch die Capillarsenkung des Quecksilbers mit Rücksicht auf Temperaturveränderungen geprüft. Er findet daß der Höhenunterschied beider Quecksilberspiegel bei steigender Temperatur zunimmt und zwar, wie es den Anschein hat, proportional mit der Temperatur. Setzt man demnach die Senkung bei der Temperatur t :

$$H = h (1 + \alpha t)$$

wo h die Capillarsenkung bei der Anfangstemperatur vorstellt, so fällt nach Frankenheim der den Einfluß der Erwärmung bezeichnende beständige Coefficient α zwischen 0,0013 und 0,0014. Der Ausdehnungscoefficient des Queck-

Capillar-Senkung des Quecksilbers.

Lage dieser Ebene kennen zu lernen, hat Danger (1) folgendes Mittel angewendet. Cylindrische Röhren von verschiedener Weite mit eben abgeschliffenem oberem Rande und unten zugeschmolzen wurden mit Quecksilber bis über den Rand angefüllt, dann der Ueberschuß mittelst einer luftdicht aufgeschliffenen Spiegelglasplatte abgestrichen. Entfernte man diese Platte wieder, mit der Vorsicht, daß dabei kein Quecksilber abfloß, so bildete sich sogleich der Meniskus, indem die Flüssigkeit sich vom Rande ablöste und in der Mitte hob. Der abgeschliffene Glasrand bildete hier die gesuchte Ebene. Die jedesmalige Senkung des Quecksilberandes unter dieselbe, so wie die Erhebung der Quecksilberkuppe darüber wurde mittelst eines geeigneten Fernrohrs und einer dasselbe bewegendes Mikrometerschraube gemessen. Die so erhaltenen Resultate sind auszugsweise in der folgenden Tabelle zusammengestellt, wo A den inneren Durchmesser der Röhre, B die Erhebung des Gipfels des Meniskus über, C die Senkung der Basis des Meniskus unter den Glasrand, D die ganze Höhe des Meniskus in Millimetern angiebt. Sie gelten für die Temperatur von 15° C. Es ist zu bedauern, daß der Verfasser unbemerkt gelassen, ob seine Versuche bei gewöhnlicher Luftbeschaffenheit oder bei trockner oder feuchter Luft angestellt sind, da bekanntlich die Höhe des Meniskus von diesen Einflüssen nicht unabhängig ist.

A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1	0,178	0,143	0,321	10	0,648	0,900	1,548	28	0,380	1,302	1,682
2	0,310	0,261	0,571	12	0,637	0,988	1,625	30	0,355	1,325	1,670
3	0,410	0,369	0,779	14	0,610	1,056	1,666	35	0,297	1,375	1,676
4	0,486	0,467	0,953	16	0,570	1,110	1,680	40	0,248	1,415	1,668
5	0,544	0,558	1,102	18	0,530	1,157	1,687	45	0,208	1,450	1,658
6	0,584	0,643	1,218	20	0,495	1,190	1,685	50	0,187	1,480	1,667
7	0,610	0,710	1,320	22	0,455	1,224	1,679	55	0,160	1,511	1,691
8	0,630	0,782	1,412	24	0,436	1,252	1,688	60	0,178	1,540	1,718
9	0,689	0,844	1,488	26	0,408	1,278	1,686				

(1) Compt. rend. XXVII, 381; Ann. ch. phys. [3] XXIV, 501; Pogg. LXXVI, 297.

Endosmose. alsbald angezeigt wird. Das Nähere läßt sich ohne Beihülfe von Zeichnungen nicht deutlich machen.

Vierordt hat mit diesem Apparate die Endosmose des Wassers gegen Zucker- und Kochsalzlösungen bei verschiedenen Stufen der Concentration untersucht. Aus seinen Versuchen geht hervor, daß der Unterschied in der Geschwindigkeit der nach entgegengesetzten Richtungen erfolgenden Strömungen, bei gleicher Dauer der Versuche, mit der Menge des in einem bestimmten Volume Wasser anfangs aufgelösten Körpers zwar zunimmt, aber dieser Menge keineswegs so genau proportional ist, als Dutrochet behauptete. Vielmehr zeigte sich das Verhältniß der Volumzunahmen bei allen Versuchen geringer, als das Verhältniß der Anfangsdichtigkeiten.

Um die Endosmose verschiedener Salzlösungen zu Wasser kennen zu lernen, hat Jolly (1) einen von dem bisherigen endosmotrischen Verfahren abweichenden Weg eingeschlagen. In eine offene, am einen Ende mit Blase geschlossene Glasröhre brachte er die Lösung und bestimmte die allmählig eintretenden Aenderungen ihrer Menge durch Abwiegen. Die äußere Flüssigkeit, das Wasser, wurde durch häufige Erneuerung in möglichst gleichförmigem Zustande erhalten, so lange bis keine andern Gewichtsveränderungen der Röhre, als solche, die von der Verdunstung herrührten, mehr eintraten. Die Röhre enthielt dann nur destillirtes Wasser, der gelöste Stoff war fortgegangen. Der Einfluß der Verdunstung wurde durch Abwiegen einer zum Theil mit Wasser gefüllten Controllröhre bestimmt.

Auf diesem Wege fand Jolly, daß beliebige Gewichtsmengen auflöslicher Stoffe, gleichgültig ob trocken oder bereits in Auflösung befindlich, während ihres Austrittes zum Wasser, bei unveränderter Temperatur, durch proportionale Gewichtsmengen dieser Flüssigkeit, welche er *endosmotische Aequivalente* nennt, ersetzt werden. Z. B. bei einer

(1) Henle und Pfeufer's Zeitschr. für rationelle Medicin, VII, 83; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 1.

Endosmose.

Die beiden von Jolly aufgestellten Gesetze — daß bei der Vermischung einer Salzlösung mit Wasser durch eine thierische Haut die Menge des in der Zeiteinheit übergehenden Salzes der Dichtigkeit der Lösung proportional sei, und daß zweitens die Menge des in beliebiger Zeit und ganz unabhängig von der Dichtigkeit ausgetretenen Salzes durch eine endosmotisch proportionale Menge eintretenden Wassers ersetzt werde — würden, wenn sie durch ausgedehntere Versuchsreihen eine allgemeine Bestätigung finden sollten, eine sehr gewichtige Stütze bilden für die Ansicht: daß bei jenem Vorgange von Seite der Lösung nur Salztheile durch die Haut zu dem Wasser und von Seite dieses letzteren nur reine Wassertheile zu der Salzlösung übergehen.

Jolly giebt eine ihm eigenthümliche Erklärung des ungleichen Durchgangsvermögens zweier durch eine poröse Substanz getrennter Flüssigkeiten, welcher er die Hypothese zu Grunde legt, daß der poröse Stoff die Fähigkeit besitze von beiden Flüssigkeiten gleichzeitig aufzusaugen, aber ungleiche Mengen, je nach dem relativen Absorptionsvermögen für beide. Der Allgemeinheit dieser Annahme widersprechen jedoch mehrere bekannte Erfahrungen. So z. B. wird Filtrirpapier sowohl vom Wasser wie vom Oel benetzt. Hat man es aber zuerst mit Wasser getränkt, so ist es nachher für das Oel, selbst bei nicht ganz unbedeutendem Drucke, wie hermetisch verschlossen, während dagegen das letztere durch das erstere aus den Poren des Papiers verdrängt wird. Man sieht, ein poröser Stoff vermag nur dann von zweien Flüssigkeiten gleichzeitig aufzunehmen, wenn diese die Eigenschaft besitzen sich zu vermischen, also selbst eine kräftige Anziehung zu einander besitzen; in diesem Falle bedarf es aber gar nicht jener hypothetischen, durch Versuche nicht erweisbaren Annahme, um das Eindringen beider Flüssigkeiten selbst dann zu begreifen, wenn die eine gar keine Anziehungskraft gegen den Stoff der porösen Wand äußern sollte. Beide müssen

Endonmose.

100 Gewichtstheile Ochsenblase in 48 Stunden :

reines Wasser	310 Vol.
von einer Mischung von $\frac{1}{2}$ Wasser und $\frac{1}{2}$ Salzwasser	219 "
" " " " $\frac{1}{2}$ " " $\frac{1}{2}$ "	235 "
" " " " $\frac{2}{3}$ " " $\frac{1}{3}$ "	288 "
" " " " $\frac{1}{2}$ Alkohol " $\frac{1}{2}$ Wasser	60 "
" " " " $\frac{1}{2}$ " " $\frac{1}{2}$ "	181 "
" " " " $\frac{1}{4}$ " " $\frac{3}{4}$ "	290 "

100 Gewichtstheile trockner Schweineblase nehmen auf in 24 Stunden :

reines Wasser	356 Vol.
mit Kochsalz gesättigtes Wasser	159 "
Knochenöl	14 "

Berücksichtigt man nun, daß die thierische Haut eine nicht geringe elastische Kraft besitzt mit der sie dem Anschwellen, während sie sich mit einer Flüssigkeit vollsaugt, zu widerstehen strebt, so wird man zu dem Schlusse berechtigt, daß die Ursache des Absorptionsvermögens, die Adhäsion der Haut zu einer Flüssigkeit, um so größer ist, je mehr sie davon aufzusaugen vermag. In der That findet man, daß mit Wasser gesättigte thierische Haut, wenn ihr Wassergehalt durch Aufnahme von Salz oder Alkohol ein Gemische von geringerer Absorptionsfähigkeit bildet, nunmehr durch das Uebergewicht der elastischen Kraft zusammenschrumpft, so daß ein Theil des früheren flüssigen Inhaltes ausgepreßt wird.

Bedeckt man ein Stück mit Oel getränkter Blase mit reinem Wasser, so tritt das Oel vollkommen aus und wird durch dieselbe Menge Wasser ersetzt, wie wenn vorher kein Oel vorhanden gewesen wäre.

Wird ein zuvor mit Salzwasser gesättigtes Stück Blase mit reinem Wasser bedeckt, so tritt Salzwasser auf der andern Seite in Tropfenform aus, und wahrscheinlich würde bald alles Salz, wie vorher das Oel ausgetrieben werden, und die Poren der Haut würden sich mit reinem Wasser ausfüllen, wenn nicht in diesem Falle eine neue Kraft hinzukäme, nämlich die Fähigkeit beider Flüssigkeiten sich zu mischen, wodurch ein Theil des Salzes nach der Seite

Endosmose. weil sie im trocknen Zustande fast undurchdringlich ist gegen den Luftdruck, auch im benetzten Zustande unfähig sei den hydrostatischen Druck durch ihre capillaren Räume fortzupflanzen. Liebig hat die Kraft, welche erforderlich ist um verschiedene Flüssigkeiten durch die Poren thierischer Gewebe zu pressen, durch directe Messungen zu bestimmen gesucht, und findet dieselbe im Allgemeinen um so geringer, je mehr der poröse Stoff die Fähigkeit besitzt durch Aufnahme einer Flüssigkeit anzuschwellen. Die Durchlässigkeit steht damit in keinem Verhältnisse.

So fließt Wasser durch eine Ochsenblase von $\frac{1}{8}$ Linie Dicke unter einem Drucke von 12 Zoll Quecksilber, gesättigte Kochsalzlösung bei 18–20 Zoll, Oel (Knochenöl) bei 34 Zoll. Unter 36 Zoll Druck wurde Alkohol noch nicht durchgelassen.

Durch die Oberhaut einer Ochsenleber von $\frac{1}{8}$ Linie Dicke fließt Wasser bei einem Drucke von 8–10 Zoll, Salzwasser bei 12–16 Zoll, Oel bei 22–24 Zoll, Weingeist bei 36–40 Zoll Quecksilber.

Dieser Druck bleibt jedoch bei längere Zeit fortgesetzten Versuchen nicht gleich; er vermindert sich, offenbar weil durch die lange Berührung mit Wasser die Haut eine Veränderung erfährt, in Folge welcher die Poren erweitert werden.

Wenn ein mit Wasser gefüllter Raum mit Blase geschlossen ist, die auf der einen Seite durch Berührung mit der Flüssigkeit benetzt erhalten, auf der andern Seite von der Luft bespült wird, so verdunstet die Feuchtigkeit an der äußeren Fläche, wird aber durch Zutritt von Wasser aus dem Inneren stets wieder ersetzt. Die Flüssigkeit gewinnt auf diese Weise eine Bewegung gegen die verdunstende Oberfläche, ihre Menge vermindert sich allmählig und in demselben Verhältnisse entsteht ein Uebergewicht des äußeren Drucks gegen die Behälterwände. Flüssigkeiten, welche einzelne Theile der Blase von Außen berühren: Wasser, wässrige Lösungen, Oele, Weingeist u. s. w.

Neue Methode
zur Darstel-
lung von Kry-
stallen auf
trocknem
Wege.

stellende Verbindung ausgeschieden wird. Solche Substanzen sind Borsäure und Borax. Durch Mischen von Thonerde und Magnesia mit geschmolzener Borsäure und anhaltendes Erhitzen in den Porzellanöfen zu Sevres, erhielt er nach dem Erkalten eine mit kleinen Krystallen durchwachsene Masse, welche Krystalle dem Spinell in Beziehung auf naturhistorische Eigenschaften und chemische Zusammensetzung (MgO , Al_2O_3) ganz gleich waren, und nach Belieben durch Zusatz von Chromoxyd röthlich, oder durch Kobaltoxyd blau, oder durch Eisenoxyd schwarz gefärbt erhalten werden konnten. In derselben Weise und in derselben Krystallform (Reguläroctaëder) bereitete er die Verbindungen von Thonerde mit Manganoxydul, mit Eisenoxydul, mit Kobaltoxydul und mit Kalk, von Chromoxyd und Thonerde mit Eisenoxydul und Magnesia, von Chromoxyd und Eisenoxydul mit Eisenoxydul, von Chromoxyd mit Magnesia und mit Manganoxydul. Ebenso stellte er künstlich mikroskopische Krystalle von Cymophan (Thonerde-Beryllerde, BeO , Al_2O_3) dar; auch eine krystallinische Verbindung von Thonerde mit Baryt. Chromoxyd erhielt er krystallisirt, indem er diese Substanz mit kohlen-saurem Kalk und geschmolzener Borsäure gemischt anhaltend starker Hitze aussetzte. Smaragd liefs sich gleichfalls auf diese Art in Borsäure lösen und krystallinisch abscheiden, Peridot mit allen Eigenschaften des natürlichen künstlich darstellen. An der Stelle der Borsäure wandte er Borax mit Erfolg an, um die Thonerde mit den Eigenschaften des Korunds krystallisirt zu erhalten.

Krystallbil-
dung.

Knop (1) hat Beobachtungen über Krystallbildung mitgetheilt, namentlich was die Verzerrungen, die Aggregation von Krystallen, die Streifung u. a. bei dem Alaun betrifft. Ohne Beihülfe von Abbildungen läfst sich hiervon kein Auszug geben, weshalb wir auf die Abhandlung verweisen müssen.

(1) J. pr. Chem. XL, 90; XLI, 81.

Krystallographie. Theilchen Richtungen (Axen) bei, nach welchen sie sich vorzugsweise anziehen, und den beiden Enden jeder Richtung polare Verschiedenheit. Er sucht, diese Ansichten weiter ausführend, die krystallographischen und krystallophysikalischen Eigenschaften der Körper zu deduciren. Hinsichtlich der Ausführung müssen wir auf das Original verweisen, da speculative Arbeiten der Art einen Auszug nicht wohl zulassen. An der Betrachtung der Krystallisation des Schnees hat Dana (1) seine Vorstellungsweise specieller entwickelt.

Hemiëdrie. Das krystallographische Gesetz, daß gleiche Stellen einer Form durch Combination in gleicher Weise verändert werden, leidet eine Ausnahme, wenn die mit der Grundform sich combinirende Krystallform eine hemiëdrische ist. Rivière (2) bestreitet diese Ausnahme, welche nach ihm nur scheinbar ist; nach ihm treten (nach Beobachtungen an dem Bittersalz und dem Boracit) an gleichen Stellen der Grundform immer auch gleiche Abänderungsflächen auf, nur sind diese zum Theil so klein, daß man sie nur mit der Loupe, oder auch selbst nicht mit dieser, wahrnehmen kann. Es ist schwer einzusehen, wie diese Beobachtungen der Lehre von der Hemiëdrie entgegengesetzt werden sollen, und wie sie zum Beweis dienen können, daß das Hauy'sche Symmetriegesetz in *allen* Fällen gültig ist. Wenn an einem Boracitwürfel auch alle Ecken abgestumpft sind, sind sie es bekanntlich doch nicht in gleicher Weise, sofern die Flächen des einen Tetraëders physikalisch sich anders verhalten, als die des andern.

Toxatologie der Krystalle. Holger kündigte 1837 an, daß er die Mineralogie mit der Pathologie der Mineralien bereichern werde, mit der Untersuchung, wie die Mineralien in Beziehung auf Zusammensetzung, Form oder Ursprung krank sein können. Baudrimont (3) hat sich einen Theil dieses wissenschaft-

(1) Sill. Am. J. [2] V, 100. — (2) Compt. rend. XXV, 636. — (3) Compt. rend. XXV, 668.

Mikrokrystal-
lometrie.

Coincidenz gebracht werden sollen; und auch nicht von Pacini (1), welcher das Object zu drehen und zu dem Ende den Tisch des Mikroskops mit einem drehbaren, kreisförmigen und am Rande eingetheilten Aufsatz zu versehen anrieth.

C. Schmidt hat (2) nach derselben Methode, welche von Frankenheim vorgeschlagen war, die aber durch ihn in Beziehung auf mögliche Fehlerquellen u. s. w. zuerst genauer studirt wurde, eine gröfsere Anzahl krystallisirter Körper unter dem Mikroskop sorgfältig untersucht, und die Tauglichkeit jener Methode aufser Zweifel gesetzt. Interessant ist in dieser Beziehung eine von Schmidt (3) gegebene Vergleichung der Resultate seiner mikroskopischen Messungen an dem phosphorsauren Magnesia-Ammoniak mit den von Teschemacher ganz unabhängig mittelst des Reflexionsgoniometers an derselben im Guano in gröfsere Krystallen gefundenen Substanz (Teschemacher's Guanit, identisch mit dem Struvit von Ulex) erhaltenen. Dieselbe krystallisirt im rhombischen System; es ergibt sich das Verhältnifs der Brachydiagonale zur Mikrodiagonale zur Hauptaxe

$$0,5441 : 1 : 0,6241 \text{ nach Schmidt,}$$

$$0,5429 : 1 : 0,6233 \text{ nach Teschemacher.}$$

Für die gewöhnlichen Messungen ohne Nutzen complicirter ist die Einrichtung, welche Leeson (4) vorgeschlagen hat; nämlich statt des Fadenkreuzes ein Rochon'sches Prisma anzuwenden, von solchen Dimensionen, dafs die beiden durch es gegebenen Bilder des Objects nicht ganz von einander getrennt sind. Ein ebener Winkel an einem Krystall wird unter dem Mikroskop gemessen, indem man durch Drehung des Oculars mit dem Prisma die beiden Bilder

(1) Nuovi Annali delle Scienze Naturali di Bologna, 1845, Novembre. — (2) Krystallonomische Untersuchungen, oder Entwurf einer allgemeinen Untersuchungsmethode der Säfte und Excrets im thierischen Organismus. Mitau u. Leipz. 1846. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXI, 323. — (4) Chem. Soc. Mem. III, 550.

Beziehungen
zwischen
Zusammen-
setzung und
Krystallform.

untersucht; auch von seiner Abhandlung ist bisher nur ein Auszug bekannt geworden. Die Bestandtheile einer chemischen Verbindung bilden nach ihm zum Theil den Kern, zum Theil die Hülle eines Krystallmoleküls, und die Form desselben hängt zusammen mit der Anzahl der Kernatome und der Hüllenatome. Im regulären Systeme kommen einfache (holoëdrische) Formen vor mit 6, 8, 12, 24 und 48 Flächen; der Alaun krystallisirt regulär und enthält 24 Atome Wasser, welche Hüllenatome sind, so dafs jedes Atom einer Fläche des Krystallmoleküls entspricht. Bei den Substanzen, welche auch tetraëdrische Flächen zeigen, wird plötzlich die Flächenzahl, nicht einer einfachen Form, sondern einer Combination, mit der Zahl der supponirten Hüllenatome verglichen; den vorgenannten Zahlen sei für sie immer 4 zuzuaddiren. In ähnlicher Weise fafst Delafosse die Krystallform quadratischer und hexagonaler Krystalle auf, und verspricht, in einer Fortsetzung das so erlangte Wissen zur Erkenntnifs der kieselhaltigen Mineralien anzuwenden; doch sei diese Anwendung nur dann möglich, wenn man der Kieselerde die Formel Si O gebe, und wenn man die Formeln der Silicate nicht, wie bisher oft geschehen, Doppelverbindungen ausdrücken lasse, d. h. die Kieselerde nicht unter die Alaunerde und die andern Basen (von der Formel Me O natürlich) theile. Diese Schlufsfolgerung, und die Erinnerung an den oktaëdrischen Borax, welcher mit 5 Atomen Wasser krystallisirt, geben Anhaltspunkte genug ab, Delafosse's Ansichten würdigen zu lassen. Das Grundprincip derselben hat übrigens Baudrimont (1) für sich in Anspruch genommen, ohne jedoch sich Delafosse's Ausführung desselben ganz anzuschließen; Delafosse (2) hat die Prioritätsreclamation beantwortet.

Die Differenzen in den Analysen für Körper, welche nach den naturhistorischen Eigenschaften und namentlich

(1) *Compt. rend.* XXVI, 209. — (2) *Compt. rend.* XXVI, 335.

Beziehungen
zwischen
Zusammen-
setzung und
Krystallform.

Basen oder Krystallwasser sich an den Enden des Krystallmoleküls zu befinden und diese verschieden ausgebildet sein zu lassen. Pasteur weist weiter an den weinsauren Salzen hemiëdrische Ausbildung nach; es könne diese bald an den einen, bald an den andern gleichnamigen Begrenzungselementen der Krystalle sich zeigen, so daß hemiëdrisch ausgebildete Krystalle der einen Art das Spiegelbild von hemiëdrisch ausgebildeten Krystallen der andern Art sind; er unterscheidet die eine von der andern Art als links und rechts hemiëdrisch. Bei den weinsauren Salzen finde nur Hemiëdrie in dem Einen Sinne statt, und alle drehen in Auflösung die Polarisationssebene in derselben Richtung. Unter den verschiedenen Krystallen, die aus einer Lösung von gewöhnlichem traubensaurem Natron-Ammoniak (welche die Polarisationssebene nach Mitscherlich nicht dreht) anschießen, seien einige links, andere rechts hemiëdrisch; beide durch Auslesen getrennt, geben Auflösungen, welche die Polarisationssebene drehen, die links hemiëdrischen in der einen, die rechts hemiëdrischen in der entgegengesetzten Richtung. Diese zwei verschiedenen Arten von Krystallen geben durch Behandlung mit Natron ein einfaches Natronsalz, welches die Polarisationssebene links oder rechts dreht, je nachdem das Doppelsalz, welches zur Darstellung diente, das eine oder das andere bewirkte; die Säure, welche aus dem einen oder dem andern Doppelsalz dargestellt werden kann, zeigt ebenfalls Drehungsvermögen in dem einen oder dem andern Sinn. In der gewöhnlichen Traubensäure der Chemiker, welche die Polarisationssebene nicht dreht, seien also zwei Säuren von entgegengesetztem Drehungsvermögen vorhanden, deren eine wahrscheinlich Weinsäure sei. — Uebrigens seien wohl alle circular polarisierenden Substanzen hemiëdrisch; für den Zucker ist dies in der That der Fall.

Pasteur's Arbeiten gaben Laurent (1) Gelegenheit, an einige von ihm früher geäußerte Ansichten zu erinnern,

(1) Compt. rend. XXVI, 632; J. pharm. [3] XIV, 209.

Beziehungen
zwischen Zu-
sammense-
tzung und
Krystallform.

in mehreren Salzen enthalten ist) in der Zusammensetzung; letztere Auffassung ist sehr vag. Als neuen Beweis für die Richtigkeit der Behauptung 3) führt Laurent übrigens noch an, daß essigsaures Kupferoxyd und buttersaures Kupferoxyd übereinstimmende Krystallgestalt zeigen (an dem letztern wurde nur die Combination $\infty P \cdot o P$ des monoklinometrischen Systems beobachtet), ungeachtet ersteres Salz 1, letzteres 2 Atome Krystallwasser enthalte. Aber nach Lies (1) enthält auch letzteres nur 1 Atom Krystallwasser.

Endlich bespricht Laurent noch, wie für die übereinstimmende Krystallform des salpetersauren Natrons und des Kalkspaths sich auch eine Analogie in der Zusammensetzung construiren lasse (was übrigens schon Schaffgotsch (2) gezeigt hat), und daß für die Formeln $N Na O_6$ und $C_2 Ca_2 O_6$ sich die specifischen Volume beider Salze nahe übereinstimmend ergeben (was übrigens schon H. Kopp (3) gezeigt hat).

Nicklès (4) hat gleichfalls einige Beispiele hervorgehoben, wo das gleichartige in der Zusammensetzung sich in gleichartiger Ausbildung der Form in Einer Richtung, das ungleichartige in der Zusammensetzung sich in der ungleichartigen Ausbildung an den Enden dieser Richtung zeige. Als hemimorph im Laurent'schen Sinn des Worts betrachtet er den ameisensauren Baryt (wasserfrei), den essigsauren (enthält 3) und den metacetonsauren (enthält 1 Atom Wasser) Baryt; ersteres Salz krystallisirt zwar rhombisch und die beiden andern monoklinometrisch, aber an allen dreien finden sich prismatische Flächen, welche nahe unter demselben Winkel zu einander geneigt sind (für den essigsauren Baryt mit 3 Atomen Wasser weichen übrigens Nicklès' Angaben von denen Brooke's ab). Das gleichartige in der Zusammensetzung ist hier, daß die

(1) Compt. rend. XXVII, 321. — (2) Pogg. Ann. XLVIII, 335. —
(3) Pogg. Ann. LIII, 458. — (4) Compt. rend. XXVII, 611; Inst. 1848, 390.

Dimorphis-
mus.

stimmter Flächen zu einander auch nahe dieselben, möge nun der Schwefel nach dem Symmetriegesetz des rhombischen oder des monoklinometrischen Systems ausgebildet sein. — In ähnlicher Weise betrachtet Pasteur die andern dimorphen Substanzen. Mehrere von ihm angegebene Beziehungen sind recht interessant, aber ein allgemeines Gesetz oder auch nur eine Bestätigung seiner Ansicht geht aus seiner Arbeit nicht hervor. Da es ihm auf Winkeldifferenzen von 3 bis 4° in den Grundformen der verschiedenen Modificationen nicht ankommt, so läßt sich auf Grund des Gesetzes der Axenveränderungen nach einfachen Verhältnissen jede Form jedes Systems mit jeder andern innerhalb dieser Grenzen vergleichbar machen, namentlich wenn man auch noch gar so ungleichartige Formen wie ein schiefes rhombisches Prisma und das gerade rechteckige Prisma (welches letztere für alle Substanzen aus dem rhombischen System gleichartig, also für gar keine einzelne charakteristisch ist) für vergleichbar hält. Pasteur's Ansicht, der Dimorphismus beruhe mehr im Symmetriegesetz als in den Dimensionen der Grundform, steht außerdem im Widerspruch mit der Thatsache, daß die verschiedenen Modificationen einer dimorphen Substanz demselben Krystallsystem angehören können. Diesen Widerspruch sucht er durch die Behauptung zu beseitigen, solche Modificationen seien nicht dimorph, sondern isomer. Aber dadurch kommt er mit sich selbst in Widerspruch, da er von vornherein die dimorphen Körper allgemein als eine Klasse isomerer Körper betrachtet, und diese Confusion wird dadurch nicht aufgehoben, daß er später die dimorphen Substanzen als solche bezeichnet, bei welchen das Molecular-Arrangement nur wenig verschieden sei. — Wie willkürlich die Vergleichenungen übrigens sind, wie sie Pasteur angestellt hat, ergibt sich noch daraus, daß Kupffer (dessen Arbeit Pasteur nicht gekannt zu haben scheint) die zwei Formen des Schwefels ganz anders gestellt mit einander vergleicht, und eine viel größere Uebereinstim-

Bestimmung
des spec. Gew.
bei
festen Kör-
pern.

Zustände der feinsten Vertheilung wägt. Sie erstrecken sich auf Gold, Silber, Platin und schwefelsauren Baryt. Das spec. Gewicht fand er für Gold nach dem Schmelzen für sich 19,30 bis 19,34, nach dem Schmelzen unter kohlensaurem Natron 19,32 bis 19,33, unter Borax 19,33 bis 19,34, unter Chlornatrium 19,30 (die Bestimmungen gelten für 17°,5), Unter einem Prägestock zusammengedrückt, zeigt das Gold das spec. Gewicht 19,31 bis 19,34. Mit Eisenvitriol gefälltes fein vertheiltes Gold zeigte 19,55 bis 20,72, mit Oxalsäure gefälltes 19,49. Geschmolzenes Silber zeigte 10,53, zusammengedrücktes 10,57, aus der salpetersauren Auflösung durch Eisenvitriol gefälltes 10,56 bis 10,62. Durch Erhitzen des Oxyds erhaltenes fein vertheiltes Platin zeigte sogar 26,14, während das des compacten zwischen 21 und 22 liegt. Spätere Versuche mit Platinmohr, welcher auf verschiedene Weise bereitet war, ergaben indeß das spec. Gewicht zwischen 16,63 und 22,89, einmal sogar nur 14,89. Das spec. Gewicht des schwefelsauren Baryts in natürlichen durchsichtigen Krystallen fand Rose 4,48 bis 4,49, das des Niederschlags aus salzsaurem Baryt mit Schwefelsäure 4,53. Rose folgert, daß das spec. Gewicht bei der Bestimmung an einem Körper in fein vertheiltem Zustand höher ausfällt, als an demselben im compacteren Zustand größerer Krystalle oder derber Massen; daß es sich um so höher ergebe, je feiner die Vertheilung sei; daß dieses beruhe auf der Verdichtung von Wasser an der Oberfläche des Körpers, welche letztere um so größer ist, je feiner der Körper vertheilt ist.

Osann (1) hat in Beziehung hierauf an frühere Versuche von ihm (2) erinnert, wobei er für Platin ein um so kleineres, für Glas ein um so größeres spec. Gewicht fand, eine je größere Quantität er zu der Bestimmung anwandte, und will dieses davon ableiten, daß das Glas zum Wasser

(1) Pogg. Ann. LXXIII, 605; Pharm. Centr. 1848, 330. — (2) Pogg. Ann. XI; Kastner's Arch. II, 58.

Bestimmung
des spec. Gew.
bei Gasen.

und unter demselben Druck) mit einem Gas, und verdrängt dasselbe dann mittelst eines andern Gases, wobei das erstere durch geeignete Absorptionsmittel aufgenommen wird, welche das letztere (verdrängende) Gas nicht aufnehmen; aus der Gewichtszunahme der Absorptionsmittel läßt sich das Gewicht des im Ballon befindlich gewesenen ersteren Gases ermitteln. Werden solche Versuche für mehrere Gase mit Benutzung desselben Ballons angestellt, so erhält man die Gewichte gleicher Volume von ihnen und also das Verhältniß ihrer spec. Gewichte. Sauerstoff liefs er z. B. durch Kohlensäure verdrängen und von Kupfer oder Phosphor absorbiren, Kohlensäure durch atmosphärische Luft verdrängen und durch Kali absorbiren u. s. w. Das spec. Gewicht des Sauerstoffs = 1 gesetzt, fand er als Mittelresultat mehrerer gut stimmender Versuche das der Kohlensäure = 1,3825 und 1,3819, das des Kohlenoxyds = 0,87563, das der schwefligen Säure = 2,04116.

Beziehungen zwisch.
Zusammensetzung u.
spec. Gew.
Bei Gasen.

Hunt (1) hat seine Ansichten über die Ursachen mitgetheilt, weshalb Schwefel ein dreifach, Stickstoff ein halb so großes specifisches Gewicht im gasförmigen Zustand hat, als diese Körper haben sollten, wenn aequivalente Gewichtsmengen Schwefel, Stickstoff und Sauerstoff im Gaszustand gleiche Volume einnehmen. Nach ihm ist der uns bekannte Schwefel S_3 , und gehört in denselben Typus wie Ozon (O_3) und schweflige Säure (SO_2). Elementarer Stickstoff sei uns unbekannt; was man aus der Luft durch Wegnahme des Sauerstoffs erhalte, sei NN, ein Amid (soll wohl Nitryl heißen). — —

Spec. Volum
fester Körper.

Filhol (2) hat den ersten Theil eigner Studien über den Zusammenhang zwischen dem Atomgewicht, der Krystallform und dem spec. Gewicht veröffentlicht. Dieser enthält Bemerkungen über die früheren hierher gehörigen Arbeiten Anderer (welche Filhol unvollständig studirt zu haben scheint) und eigne Bestimmungen und Ansichten.

(1) *Sitzb. Am. J.* [2] VI, 170. — (2) *Ann. ch. phys.* [3] XXI, 415; im *Ausz. Ann. Ch. Pharm.* LXIV, 155.

Spec. Volum
fester Körper. eines Gemenges aus denselben Bestandtheilen in denselben Verhältnissen (Δ) zu vergleichen. Condensationscoefficient (was sonst $\frac{D}{\Delta}$ bedeutete) nennt er die Gröfse $\frac{D-\Delta}{D}$ (für verschiedene Verbindungen ergibt sich natürlich der Condensationscoefficient in Einem Sinne genommen gleich, wenn er es im andern ist). Wie schon Andere vor ihm, findet auch Filhol den Condensationscoefficienten bei analogen Verbindungen manchmal gleich und manchmal sehr verschiedenen, und er bemerkt, dafs, wenn man ihn erst bei zwei Verbindungen gleich gefunden hat, das specifische Gewicht der einen Verbindung mittelst des für die andere Verbindung ermittelten Condensationscoefficienten (*na priori* nennt er dies) berechnet werden könne. Doch findet er auch, und mit Recht, die Condensationscoefficienten zu selten gleich, als dafs sich darauf ein allgemeines Gesetz gründen liefse.

Spec. Volum
der wasser-
haltigen Salze. Ueber das specifische Volum wasserhaltiger Salze, und den Zusammenhang desselben mit den specifischen Volumen der Bestandtheile, haben Joule und Playfair (1) eine Abhandlung publicirt. Schon früher hatten sie die Behauptung aufgestellt, und an Beobachtungen zu rechtfertigen gesucht, dafs bei der Auflösung von Salzen, welche vieles Krystallwasser enthalten, der neben dem Wasser darin enthaltene Bestandtheil in der Auflösung gar keinen Raum einnehme, und dafs die wasserhaltigen Salze im festen Zustand den Raum einnehmen, welchen das in ihnen enthaltene Wasser einnimmt, als dessen spec. Gewicht aber in einigen Salzen das des Eises 0,9184 (oder das spec. Volum 9,8, immer bezogen auf Atomgewichte für $H = 1$), in andern Salzen 0,8163 (oder das spec. Vol. 11,025) anzunehmen sei. Die specifischen Volume seien Multipla der Zahl 1,225, auf welche, als Volumeinheit, in dem Folgenden sich bezogen werden wird.

Ihre Behauptungen sind mit Zweifel aufgenommen

(1) Chem. Soc. Qu. J. I, 139.

Spec. Volum
der wasser-
haltigen Salze.

Dasselbe gilt für die Alaune, wo die 24 Atome Krystallwasser, als Eis betrachtet, und die Basen (deren spec. Vol. zum Theil anders angenommen ist, als es directe Beobachtungen ausweisen, weil in den Alaunen ungeglühte Thonerde, Eisenoxyd u. s. w. enthalten sei, und nicht geglühte) allen Raum einnehmen, die 4 Atome Schwefelsäure aber gar keinen.

Ganz anders ist es mit den Doppelsalzen, welche aus 1 Atom schwefelsauren Zinkoxyds oder eines isomorphen Oxyds, 1 Atom schwefelsauren Alkalis und 6 Atomen Wasser zusammengesetzt sind. Die Raumerfüllung soll in ihnen bewirkt werden durch 6 Atome Wasser als Eis, 1 Atom schwefelsaures Alkali, und die Basis des andern schwefelsauren Salzes; die Säure des letztern hat aufgehört, Raum zu erfüllen. Vorläufig mag hierzu nur bemerkt werden, dafs nach den von Playfair und Joule angenommenen Zahlen es auch umgekehrt sein kann, nämlich dafs die Schwefelsäure des schwefelsauren Alkalis der Raumerfüllung verlustig geht, und die des anderen Salzes nicht; beide Hypothesen führen ganz zu demselben Resultat.

Die Verfasser dieser Abhandlung sind anerkannte Forscher, aber das hebt die Unbegreiflichkeit nicht auf, dafs in dem phosphorsauren Natron, welches wir vor uns sehen, es nur das Wasser sein soll, welches den Raum erfüllt, *neither acid nor base occupy space*. Wie durch Zauberei kommen die letztern erst bei dem Erhitzen räumlich zum Vorschein. — Säure und Basis nehmen hier keinen Raum ein, weil die Annahme, das Wasser sei hier mit dem spec. Volum des Eises vorhanden, gemacht worden ist, und nach ihr für Säure und Basis Nichts übrig bleibt. Jene Katze wurde von ihrem Herrn vermisst, obgleich er sie unter Händen hielt, weil er die Annahme gemacht hatte, sie habe das Fleisch gefressen. An diese merkwürdige Begebenheit wird man sehr oft in den Naturwissenschaften erinnert. Ein Mann supponirte, seine Katze habe Fleisch gefressen; er wog sie, und da sie grade so viel wog als

Volum
ge-
r Kör-
r. Gerhard (1) hat eine Zusammenstellung von Mineralien gegeben, welche nach ihm in Regulärktaëdern krystallisiren, und welchen nach gewöhnlichen Ansichten verschiedenartigsten Formeln angehören (Mineralien der Gruppe des Spinells, Martit, Titaneisen, Periklas, Rowskit, Braunit). Wenn man die Formeln aller dieser Mineralien so schreibe, daß auf 1 Aequiv. Sauerstoff 1 Aequiv. Metall irgend einer Art komme (die Äquivalente der verschiedenen Metalle müssen natürlich dann zum Theil anders genommen werden, als gewöhnlich geschieht), so ergebe sich für alle nahe gleiches spec. Volum. Das Resultat muß um so mehr auffallen, da mit regulär krystallisirenden Substanzen auch eine quadratische (Braunit, weil die Form desselben von einem Regulärktaëder nur wenig abweiche) und rhomboëdrisch krystallisirende (Titaneisen zum Theil) zusammengestellt, und ganz irrig Zusammensetzungen (für den Chromeisenstein von St. Domingo und den Periklas z. B.) zu Grunde gelegt sind.

Ueber die
Condensation
des Wassers
in Mischung
mit Säuren.

Naumann (2) hat eine Abhandlung über die Condensation der Wasseratome in den wasserhaltigen Säuren veröffentlicht. Folgendes Resultat hält er für wahrscheinlich. Wenn sich eine (hypothetisch wasserfreie) Säure, welche Atome Sauerstoff enthält, mit Wasser verbindet, so sei d Condensationsgröße c (um welche das spec. Volum d Wassers in der Mischung kleiner ist, als das des Wassers im isolirten Zustand) jedes neu hinzutretenden Wassermoles, mit Ausnahme des n ten, durch die Proportion $v : = \varphi : c$ bestimmt, in welcher v das spec. Volum der Säure vor der Aufnahme des neuen Wasseratoms, φ das ursprüngliche spec. Volum des Wassers bedeutet; für das n Wasseratom selbst aber gelte die Proportion $v : \psi = \psi$ in welcher v und c die bisherige Bedeutung haben, ψ das spec. Volum bedeute, welches nach dem Vorherge-

(1) J. pharm. [3] XI, 381; Sill. Am. J. [2] IV, 405. — (2) Chem. XLIII, 1; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 218.

Wärmeent-
wicklung bei
chemischen
Verbindun-
gen.

kali den nämlichen Niederschlag hervorbringt, oder in welchen sich die Metalle auf der nämlichen Oxydationsstufe befinden. Ferner soll, wenn das Metall A die Metalle I und C, wenn ferner B das Metall C in Verbindungen ersetzt, die Wärme bei Ersetzung von C durch A gleich der Summe der Wärme bei der Substitution von A für B und von B für C sein.

Andrews (1) hat auch die Wärmemengen, welche bei der Verbindung von Körpern mit Sauerstoff und mit Chlor frei werden, aufs Neue gemessen. — Die Verbindung von Gasen mit Sauerstoff erfolgte in einem Gefäße von Kupferblech, welches etwa 380 Kubikcent. faßte; sie wurde eingeleitet durch den electrischen Strom, welcher einen feinen Platindraht zum Glühen brachte. Das Kupfergefäß tauchte in ein Wassercalorimeter, welches fest verschlossen in einen weiteren Cylinder gebracht wurde, der sich um die kürzere horizontale Axe in schnelle Drehung versetzen ließ. Diese Drehung, vor und nach der Verbindung der Gase vorgenommen, hatte zum Zweck, eine gleichmäßige Temperatur des Calorimeterwassers zu sichern. Bildete sich bei der Vereinigung zweier Gase Wasser, so mußte die aus der Verdichtung des Dampfes entspringende Wärme abgeführt werden. Die Resultate sind (als Wärmeinheit die Menge Wärme genommen, durch welche die Temperatur von 1 Grm. Wasser um 1° erhöht wird):

Luftart.	Verbrennungswärme					
	v. 1 Liter mit Sauerst.	Abwei- chung vom Mittel.	v. 1 Liter Sauerst. mit der Luftart.	v. 1 Grm. Sauerst. mit der Luftart.	Berich- tigt weg. d. Wasser- dampfes.	v. 1 Grm der Luft art mit Sauerst.
Wasserstoff . .	8086	16	6072	4226	3539	3380
Kohlenoxyd. . .	8057	6	6114	4255	—	243
Sumpfgas . . .	9421	10	4716	3277	2931	1310
Ölbildendes Gas	15016	40	5005	3483	3252	1194

Die Verbindung von starren und flüssigen Körpern mit Sauerstoff geschah in einer Platin- oder Porzellanschale.

(1) Phil. Mag. [8] XXXII, 321 u. 426; Pogg. Ann. LXXV, 27 u. 24

Wärmeentwicklung bei chemischen Verbindungen.	Spec. Wärme n. Regnault	Verbindungswärme
für Diamant	0,147	7824
" Graphit	0,201	7778
" Holzkohle	0,242	8080

Andrews endlich fand durch neuere Bestimmung bei welchen die Kohle in einem Korbe von Platin verbrannt wurde, so daß sich nur etwa $\frac{3}{8}$ in Kohlenoxyd verwandelte, 7860 Einheiten, oder verbessert wegen Kohlenoxyds 7881 Einheiten.

Die Folgerung, welche einige Physiker aus Dulong's Resultaten ziehen wollten, daß die durch Verbrennung eines zusammengesetzten Gases entwickelte Wärme gleich sei der, welche durch Verbrennung seiner Bestandtheile entwickelt wird, ist durch die oben mitgetheilten Zahlen widerlegt. Wenn man, dieser Hypothese gemäß, aus den für Sumpf- und ölbildendes Gas erhaltenen Resultaten die Verbrennungswärme für 1 Liter Kohlendampf berechnet, so erhält man zwei sehr verschiedene Zahlen:

	Dulong	Andrews		Dulong	Andrews
1 Liter Sumpfgas .	9588	9420	1 Liter ölbildendes Gas	15338	15
2 Liter Wasserstoff.	6212	6072	2 Liter Wasserstoff .	6212	6
1 Liter Kohlendampf	3376	3348	1 Liter Kohlendampf .	4563	4

Um die Verbindungen mit Chlor einzuleiten, wurden die Substanzen in sehr zerbrechliche Glaskügelchen eingeschlossen, und diese dann in ein Glasgefäß gebracht, in welchem die Luft durch trocknes Chlorgas verdrängt wurde. Das Glasgefäß wurde in ein kupfernes Kalorimeter eingesenkt, und durch eine rasche Erschütterung das die Substanz einschließende Glaskügelchen zerbrochen. Uebrigens war der Apparat und die Methode des Versuchs, wie bei den Verbindungen mit Sauerstoff. Die Verbindung von Kalium mit Chlor wurde in einem Messinggefäß vorgenommen, welches von trockenem Chlorgase nicht merklich angegriffen wurde. — Zink konnte nur bei Gegenwart von etwas Wasser mit Chlor verbunden werden, und es mußte die durch Lösung der Verbindung in Wasser entbundene

Wärmeentwicklung bei chemischen Verbindungen. —
 nahme, daß die Metallchloride als solche in den Lösungen existiren. —

Favre und Silbermann(1) machen als Fortsetzung ihrer Arbeit über die bei chemischen Verbindungen entwickelte Wärme folgende Resultate bekannt :

1) Bei der Zerlegung des Kalkspathes durch Wärme wurden absorbiert 308,1 Wärmeeinheiten, bei der Verwandlung des Arragonits in Kalkspath 38,3 Einheiten entwickelt, bei der Zerlegung des Arragonits 299,2 Einheiten absorbiert.

2) Bei der Zerlegung von Stickstoffoxydul in seine Bestandtheile wurden entwickelt 1090,5 Einheiten auf 1 Grm. abgeschiedenen Sauerstoffs.

3) Bei der Zerlegung von Wasserstoffsuperoxyd 1303 Einheiten; hierzu etwas mehr als 600 Einheiten, welche für die Vergasung des Sauerstoffs verwendet werden, giebt etwa 1950 Einheiten.

4) Wärmentwicklung bei der Mischung von 1 Grm. $\text{SO}_4 \text{ H}$ (Schwefelsäurehydrat) mit Wasser :

mit dem ersten $\frac{1}{2}$ Aeq. W.	9,4	mit 1 Aeq. W.	64,7	mit 7 Aeq. W.	141,8
" " zweiten $\frac{1}{2}$ " "	8,8	" 2 " "	94,6	" 8 " "	145,1
" " ersten $\frac{1}{2}$ " "	18,8	" 3 " "	111,9	" 9 " "	148,5
" " zweiten $\frac{1}{2}$ " "	17,2	" 4 " "	122,2	" 10 " "	148,4
" " ersten $\frac{1}{2}$ " "	36,7	" 5 " "	130,7	" 20 " "	148,7
" " zweiten $\frac{1}{2}$ " "	28,3	" 6 " "	136,2		

Wärmeentwicklung bei der Mischung von 1 Grm. $\text{SO}_4 \text{ H} + \text{HO}$ mit dem ersten $\frac{1}{2}$ Aeq. 9,2, zweiten $\frac{1}{2}$ Aeq. 7,8; ersten $\frac{1}{2}$ Aeq. 17,3, zweiten $\frac{1}{2}$ Aeq. 12,3. Wärmeentwicklung bei der Mischung von 1 Grm. $\text{SO}_4 \text{ H} + 2 \text{HO}$ mit dem ersten $\frac{1}{2}$ Aeq. Wasser 9,5, mit dem zweiten $\frac{1}{2}$ Aeq. 7,6.

5) Verbindung von Basen mit Säuren nach Aequivalenten, die Säuren in großer Verdünnung und großem Ueberschuß angewendet :

1 Grm. Kalkhydrat, gesättigt mit		1 Grm. Kali, mit Wasser verdünnt, gesättigt mit	
Schwefels.	660,2	Schwefels.	311,8
Salzs.	603,2	Salpeters.	312,5
Salpeters.	607,0	Salzs.	314,4
Essigs.	518,2	Metaphosphors.	325,4
		Phosphors.	323,9
		Essigs.	283,5
		Citronens.	268,3

(1) Compt. rend. XXIV, 1081.

Wärme- entwicklung bei chemischen Verbindun- gen.	Schwefels.	Kiesensulfidkali	20,6	Oxalsäure (krystall.)	58,7
	"	Baryt	52,2	Oxalsäures Kali	36,9
	"	Servotian	58,4	" saures S.)	59,5
	"	Kalk	23,1	Kohlensäures Kali	+ 2,5
	"	in schwefels. Am. gelöst	0,0	" saures S.)	49,1
	Ka-S-Alum.		22,4	" Natron	49,8
	Ammoniak-Alum.		18,2	Weinsteinsäure (krystall.)	18,8
	Essigs. Natron		20,9	Weinsteinsäures Kali	16,5
	" Kalk		- 11,6	" Natron	24,2
	" (saures S.)		15,5	" Kalinauron	39,3
	" Kalk		- 21,9	Phosphorsäures Natron	49,4
	" Baryt		3,3	Pyrophosphorsäures Natron	21,1

Die Zeichen — zeigen eine Wärmeentwicklung an. —
Ohne allen Wärmeeffect erfolgten die Mischungen von
schwefelsaurem Eisen mit schwefelsaurem Kali, schwefel-
saurem Eisen mit schwefelsaurem Ammoniak, schwefels.
Thonerde mit schwefels. Natron, schwefels. Thonerde mit
schwefels. Kali, schwefels. Thonerde mit schwefels. Am-
moniak, weinsteins. Natron mit weinsteins. Kali.

Unter den Schlüssen, welche die genannten Forscher
aus den angeführten Resultaten ziehen, heben wir als cha-
rakteristisch heraus: 1) daß ein neutrales Salz T. in Auf-
lösung und krystallisirt, zwei isomere Körper bildet, z. B.
 $\text{SO}_4 \text{ K}$ und $\text{S}_2 \text{O}_4 \text{ K}_2$; 2) daß die sauren und Doppel-
salze sich erst im Krystallisiren bilden: sie seien die kry-
stallisirten Neutralen „*M de type complexe par des M quel-
conques*“; 3) daß die Ansicht aufs Neue begründet sei, wo-
nach die latente Schmelzwärme des Wassers auf einem
chemischen Vorgange beruht, indem HO im Eise in
 $n \text{ HO}$ übergeht, wo n irgend eine einfache ganze Zahl. —
Es ist nicht das Erstmal, daß man neben den werthvollen
Beobachtungsergebnissen (1) der Hrn. Favre und Silber-
mann Schlüsse antrifft, deren nothwendiger Zusammen-
hang mit jenen nicht einleuchtet. Die Verbrennungswärme
des Schwefelkohlenstoffs, sowie der Kohle im Stickstoff-
oxydulgase hat bei ihnen die Theorie der Spaltung
(*dédoublément*) der Elemente hervorgerufen, welcher sie
zunehmend eine immer größere Ausdehnung einzuräumen
scheinen.

	1 Grm.	1 Aeq.		1 Grm.	1 Aeq.
Wasserstoff	84462	34462	Kupfer	655	21280
Eisen	1332	35964	Blei	255	26520
Zink	1277	41503	Silber	49	5292

Mechanisches
Aequivalent
der Wärme.

Joule (1) hat das mechanische Aequivalent der Wärme gemessen, indem er die Wärme, welche durch die Reibung eines horizontalen Schaufelrades in verschiedenen Flüssigkeiten entwickelt wurde, verglich mit der zur Drehung des Rades aufgewendeten Kraft. Ein messingenes Rad wurde durch ein herabsinkendes Gewicht gedreht, das erstemal in Wasser, das anderemal in Wallrathöl; die Mittel aus neun Versuchen gaben das mechanische Aequivalent der Wärmeeinheit gleich 428 und 429 Metergramme. Eine dritte Versuchsreihe (2), bei welcher ein eisernes Rad in Quecksilber umgedreht wurde, ergab 432,1 Metergramme im Mittel aus sechs Versuchen. Eine Reklamation Mayer's (3) veranlafte Joule eine Uebersicht seiner Arbeiten (4) über diesen Gegenstand verbunden mit einer Wahrung der Priorität zu geben. — Man findet, wenn man den mechanischen Effect der Ausdehnung der Gase ganz auf Rechnung der von Dulong bestimmten Ausdehnungswärme ($0^{\circ},421$ für eine Zusammendrückung um $\frac{1}{11}$) setzt, das mechanische Aequivalent nur 368,5 Metergramme; und man kann um so mehr versucht sein zu glauben, dafs bei den Messungen von Joule Wärme verloren und darum das mechanische Aequivalent zu groß gefunden worden ist, weil eine Probe, welche Joule für seine Messungen zu sprechen scheint (5), bei näherer Betrachtung ein gegentheiliges Resultat liefert. Das Verhältnifs zwischen der spec. Wärme der Luft bei constantem Volum und bei constantem Druck ergibt sich aus Joule's Resultat, wenn man das mechanische Aequivalent der Wärme zu 430 Metergrammen annimmt, = 1,077, und die Qua-

(1) Phil. Mag. [3] XXXI, 173; Pogg. Ann. LXXXIII, 479. —

(2) Compt. rend. XXV, 309; Pogg. Ann. LXXXIII, 483. — (3) Compt. rend. XXVII, 385. — (4) Compt. rend. XXVIII, 132. — (5) Phil. Mag. [3] XXXI, 114.

dratwurzel dieser Zahl mit der Newton'schen Schallgeschwindigkeit von 280^m multiplicirt giebt $290^m,4$, ein Resultat, welches bedeutend hinter der Wahrheit zurückbleibt.

Mechanisches
Aequivalent
der Wärme.

Seguin (1) theilt einen Beitrag zur Bestimmung des mechanischen Aequivalentes der Wärme mit. Er berechnet den mechanischen Effect, welchen Wasserdampf von 180° ausübt, indem er sich ausdehnt und, indem seine freie Wärme theilweise als Ausdehnungswärme latent wird, sich bis 80° abkühlt. Es kommt auf eine Wärmeeinheit :

zwischen 180° und 160° ein Effect von 395 Metergramme

"	160	"	140	"	"	"	412	"
"	140	"	120	"	"	"	440	"
"	120	"	100	"	"	"	472	"
"	100	"	80	"	"	"	529	"

im Mittel also eine mechanische Wirkung von 449 Grm., welche 1 Meter hoch gehoben werden. Seguin zeigt an, daß er eine ausgedehnte Arbeit unternommen, um zu zeigen, daß die Erscheinungen der Wärme nur Bewegungserscheinungen sind und unter das Gesetz der allgemeinen Gravitation fallen.

Joule und Playfair (2) haben die Ausdehnung verschiedener fester Körper zu bestimmen gesucht. Sie wandten dazu Glasfläschchen an, wie sie zur Ermittlung des spec. Gewichts gebraucht werden. Die Ausdehnung des Glases ermittelten sie so, daß sie ein solches Fläschchen mit Wasser füllten und darauf eine graduirte Thermometerröhre als Stöpsel aufsetzten; das Wasser stand in der Röhre an derselben Stelle bei $3^\circ,84$ und bei $7^\circ,67$, und die Ausdehnung des Glases innerhalb dieses Temperaturintervalls ist also gleich der des Wassers innerhalb desselben; letztere wurde aus Despretz's Angaben entnommen, und danach die kubische Ausdehnung des Glases für 0 bis

Ausdehnung durch
die Wärme
fester Körper
per.

(1) Compt. rend. XXV, 420. — (2) Chem. Soc. Qu. J. I, 121.

Ausdehnung fester Körper. $100^\circ = 0,002788$ gefunden. Ein ebenso ausgeführter zweiter Versuch führte zu dem Resultate $0,002798$.

Es wurde nun ermittelt, wieviel Terpenthinöl bei verschiedenen Temperaturen ein Glasfläschchen faßte. Die Ausdehnung der festen Körper wurde folgendermaßen bestimmt: ein Glasfläschchen wurde mit Terpenthinöl theilweise gefüllt und gewogen, von dem zu untersuchenden Körper etwas hineingethan und abermals gewogen, die diesem Körper anhängende Luft unter der Luftpumpe weggeschafft, das Fläschchen mit Terpenthinöl vollends gefüllt, ein Thermometerrohr als Stöpsel aufgesetzt, und das Gewicht des bei verschiedenen Temperaturen (zwischen $3^\circ,5$ und $31^\circ,5$) gefüllten Fläschchens ermittelt. Hieraus konnte berechnet werden, wieviel Raum der untersuchte feste Körper bei verschiedenen Temperaturen einnehme, und welche Ausdehnung ihm danach für das Temperaturintervall 0 bis 100° zukomme. Es wird angeführt, die Ausdehnung der Salze sei in vielen Versuchen als gleichförmig befunden worden. Da das spec. Gewicht des Terpenthinöls ermittelt war, so wurde durch diese Versuche auch das spec. Gewicht der untersuchten festen Körper gegeben. Die Resultate ihrer Beobachtungen sind:

Substanz.	Formel.	Kubische Ausdehnung 0 — 100°	Spec. Gew. bei $3^\circ, 9$.
Kupfer	Cu	0,0055	8,867
desgl.	"	0,00767	8,416
Quecksilberoxyd . .	Hg O	0,00580	11,136
Bleioxyd	Pb O	0,00795	9,363
Manganoxydoxydul .	Mn ₂ O ₃	0,00522	4,325
Zinnoxyd	Sn O ₂	0,00172	6,712
Schwefelblei	Pb S	0,01045	6,924
Chlorkalium	K Cl	0,01094	1,978
Chlorbaryum	Ba Cl + 2 HO	0,00987	3,054
Chlorammonium . .	NH ₄ Cl	0,0191	1,583
Salpetersaures Natron .	NaO, NO ₃	0,0128	2,261
" Kali	KO, NO ₃	0,01967	2,108
" desgl.	"	0,01724	2,096
" desgl.	"	0,01949	2,107
" Bleioxyd	PbO, NO ₃	0,00839	4,472
" Baryt	BaO, NO ₃	0,00452	3,161
Chlorsaures Kali . .	KO, ClO ₃	0,01711	2,326

Substanz.	Formel.	Ausdehnung fester Körper.	
		Kubische Ausdehnung bei 0—100°	Spec. Gew. bei 3°, 9.
Einfach chroms. Kali desgl.	KO, CrO_3	0,01134	2,711
Zweifach chroms. Kali	$\text{K}_2\text{O}, \text{CrO}_3$	0,01101	2,723
Chroms. Chlorkalium	$\text{KCl} + 2 \text{CrO}_3$	0,0122	2,692
		0,01590	2,497
Oxalsäure	$\text{HO}, \text{C}_2\text{O}_3 + 2 \text{HO}$	0,02748	1,641
Einfach oxals. Kali .	$\text{KO}, \text{C}_2\text{O}_3 + \text{HO}$	0,01162	2,127
Zweifach oxals. Kali .	$\text{KO}, 2 \text{C}_2\text{O}_3 + 3 \text{HO}$	0,01134	2,044
Vierfach oxals. Kali .	$\text{KO}, 4 \text{C}_2\text{O}_3 + 7 \text{HO}$	0,01592	1,849
Einfach oxals. Ammon.	$\text{NH}_4\text{O}, \text{C}_2\text{O}_3 + \text{HO}$	0,00876	1,500
Zweifach oxals. Ammon.	$\text{NH}_4\text{O}, 2 \text{C}_2\text{O}_3 + 3 \text{HO}$	0,01372	1,613
Vierfach oxals. Ammon.	$\text{NH}_4\text{O}, 4 \text{C}_2\text{O}_3 + 7 \text{HO}$	0,01435	1,652
Einfach schwefels. Kali	KO, SO_3	0,01070	2,656
Zweifach schwefels. Kali	$\text{KO}, \text{SO}_3 + \text{HO}, \text{SO}_3$	0,01229	2,478
Schwefels. Ammon. .	$\text{NH}_4\text{O}, \text{SO}_3$	0,01093	1,761
Schwefels. Kupferoxyd desgl.	$\text{CuO}, \text{SO}_3 + 5 \text{HO}$	0,00953	2,290
desgl.	"	0,00532	2,242
desgl.	"	0,00812	2,278
Schwefels. Eisenoxydul	$\text{FeO}, \text{SO}_3 + 7 \text{HO}$	0,01153	1,889
„ Magnesia .	$\text{MgO}, \text{SO}_3 + 7 \text{HO}$	0,01019	1,683
„ Kupferox.-Am.	$\text{CuO}, \text{SO}_3 + \text{NH}_4\text{O}, \text{SO}_3 + 6 \text{HO}$	0,00661	1,894
„ Kupferox.-Kali	$\text{CuO}, \text{SO}_3 + \text{KO}, \text{SO}_3 + 6 \text{HO}$	0,00904	2,164
„ Magnesia-Kali	$\text{MgO}, \text{SO}_3 + \text{KO}, \text{SO}_3 + 6 \text{HO}$	0,00937	2,053
„ Chromox.-Kali	$\text{Cr}_2\text{O}_3, 3 \text{SO}_3 + \text{KO}, \text{SO}_3 + 24 \text{HO}$	0,00524	1,856
„ Thonerde-Kali	$\text{Al}_2\text{O}_3, 3 \text{SO}_3 + \text{KO}, \text{SO}_3 + 24 \text{HO}$	0,00368	1,751
„ Zinkoxyd-Kali	$\text{ZnO}, \text{SO}_3 + \text{KO}, \text{SO}_3 + 6 \text{HO}$	0,00824	2,240
„ Magnesia-Am.	$\text{MgO}, \text{SO}_3 + \text{NH}_4\text{O}, \text{SO}_3 + 6 \text{HO}$	0,00716	1,717
Bohrzucker	$\text{C}_{12}\text{H}_{11}\text{O}_{11}$	0,01116	1,593
Milchzucker	$\text{C}_{12}\text{H}_{12}\text{O}_{12}$	0,00911	1,534

Wo die Versuche mit derselben Substanz wiederholt angestellt wurden, zeigt sich meistens ziemliche Abweichung der Resultate für die Ausdehnung.

Joule und Playfair sind der Ansicht, dies rühre von wirklicher Differenz der physikalischen Eigenschaften der untersuchten Substanzen her; das Kupfer (aus Oxyd durch Wasserstoff reducirt) sei einmal stärkerer Hitze ausgesetzt gewesen, als das anderemal; das salpetersaure Kali sei bald in größeren Krystallen, welche Wasser eingeschlossen gehalten hätten, bald in kleineren angewandt worden u. s. w. Indefs geben die wasserhaltigen Salpeterkrystalle eine kleinere Zahl für die Ausdehnung, als die wasserfreien, was man eigentlich nicht vermuthen sollte, und es ist sehr

Ausdehnung
fester Körper.

wahrscheinlich, daß die Differenzen der Resultate für dieselbe Substanz der Methode zuzuschreiben sind, und daß die Resultate, so weit sie die Ausdehnung betreffen, einer Bestätigung oder Berichtigung bedürftig sind.

In drei von einander unabhängigen Versuchsreihen fanden Schumacher, Pohrt und Moritz (1) die lineare Ausdehnung des Eises für ein Temperaturintervall von 100° zu 0,00524, 0,00513 und 0,00518 (Brunner hatte diese GröÙe zu 0,00375, Marchand zu 0,0035 bestimmt).

Ausdehnung
von Flüssig-
keiten.

Pierre hat mehrere Abhandlungen über die Ausdehnung von Flüssigkeiten publicirt, welchen Gegenstand er in größerem Umfang als irgend ein anderer untersucht hat. Seine erste Abhandlung darüber wurde zwar schon vor dem Zeitraum veröffentlicht, über welchen zunächst hier Bericht zu erstatten ist; doch wollen wir auch aus ihr die Resultate mittheilen, um diese für die Ausdehnungsversuche von Pierre überhaupt vollständig zusammenstellen zu können.

Es mag vorweg bemerkt werden, daß für die untersuchten Substanzen die Bereitungsart und in den meisten Fällen auch die Analyse angegeben ist, daß das spec. Gewicht für 0° bestimmt ist, der Siedepunkt in der Flüssigkeit bei dem immer angegebenen Barometerstand ermittelt wurde. Die Untersuchung der Ausdehnung geschah nach der thermometrischen Methode; über die Einzelheiten hinsichtlich ihrer Ausführung, der Rechnung u. s. w. berichtet er genau im Eingang zu seiner ersten Abhandlung (2). Wir geben hier immer das Endresultat für jeden Körper, die Formel, welche das wahre Volum V für eine Temperatur t° giebt, das Volum bei $0^\circ = 1$ gesetzt, und fügen eingeklammert bei die Temperaturgrenzen, innerhalb welcher die Ausdehnungsversuche angestellt wurden.

In der ersten Abhandlung theilt er die Untersuchung folgender Flüssigkeiten mit :

(1) Aus dem Arch. f. wissenschaftl. Kunde v. Rußland, VII, 553, in Arch. ph. nat. X, 47. — (2) Ann. ch. phys. [3] XV, 325.

Wasser (HO). Es sind hier nur die einzelnen Versuche mitgeteilt, welche wir ihrer großen Anzahl halber nicht aufnehmen können. Pierre fand keine Formel, welche die Ausdehnung des Wassers von -13° bis 100° genau dargestellt hätte; er hat keine Tabelle aus seinen Versuchen abgeleitet, aus welcher für gleichmäßig zunehmende Temperaturen die Ausdehnung zu ersehen wäre.

Ausdehnung
von Flüssig-
keiten.

Alkohol (Weingeist, Aethyloxydhydrat; $C_4 H_8 O_2$). Sp. Gew. 0,8151. Siedep. $78^{\circ},3$ bei 758^{mm} .

$$V=1+0,0010486t+0,00000171510t^2+0,000000001345t^3 \quad (-32,2 \text{ bis } +76^{\circ},6)$$

Holzgeist (Methyloxydhydrat; $C_2 H_4 O_2$). Spec. Gew. 0,8207.

Siedep. $66^{\circ},3$ bei 759^{mm} .

$$V=1+0,0011856t+0,0000015649t^2+0,000000009111t^3 \quad (-38^{\circ},0 \text{ bis } +69^{\circ},4)$$

Schneefekohlenstoff ($C S_2$). Sp. Gew. 1,2931. Siedep. $47^{\circ},9$ bei $755^{mm},8$.

$$V=1+0,0011398t+0,0000013707t^2+0,000000019123t^3 \quad (-34^{\circ},9 \text{ bis } +59^{\circ},6)$$

Aether (Aethyloxyd; $C_4 H_8 O$). Spec. Gew. 0,7358. Siedep. $35^{\circ},5$ bei $755^{mm},8$.

$$V=1+0,0015132t+0,0000023592t^2+0,000000040051t^3 \quad (-15^{\circ},4 \text{ bis } +38^{\circ},1)$$

Chloräther (Chloräthyl; $C_4 H_8 Cl$). Spec. Gewicht 0,9214. Siedep. 11° bei 758^{mm} .

$$V=1+0,0015746t+0,0000028137t^2+0,000000015698t^3 \quad (-31^{\circ},8 \text{ bis } +26^{\circ},4)$$

Bromäther (Bromäthyl; $C_4 H_8 Br$). Spec. Gew. 1,4733. Siedep. $40^{\circ},7$ bei 757^{mm} .

$$V=1+0,0013376t+0,0000015013t^2+0,000000016900t^3 \quad (-31^{\circ},9 \text{ bis } +53^{\circ},7)$$

Jodäther (Jodäthyl; $C_4 H_8 J$). Spec. Gew. 1,9755. Siedep. 70° bei $751^{mm},7$.

$$V=1+0,0011423t+0,0000019638t^2+0,000000006206t^3 \quad (-34^{\circ},8 \text{ bis } +71^{\circ},9)$$

Bromholzäther (Brommethyl; $C_2 H_5 Br$). Spec. Gew. 1,6644. Siedep. etwa 13° bei 759^{mm} .

$$V=1+0,0014152t+0,0000033153t^2+0,00000011381t^3 \quad (-34^{\circ},6 \text{ bis } +27^{\circ},8)$$

Jodholzäther (Jodmethyl; $C_2 H_5 J$). Spec. Gew. 2,1992. Siedep. $43^{\circ},8$ bei $750^{mm},2$.

$$V=1+0,0011996t+0,0000021633t^2+0,000000010051t^3 \quad (-35^{\circ},4 \text{ bis } +61^{\circ},5)$$

Ameisenäther (Ameisens. Aethyloxyd; $C_6 H_8 O_4$). Spec. Gew. 0,9357. Siedep. $52^{\circ},9$ bei 752^{mm} .

$$V=1+0,0013252t+0,0000028625t^2+0,0000000066180t^3 \quad (-32^{\circ},4 \text{ bis } +61^{\circ},6)$$

Ausdehnung von Flüssigkeiten. *Essigholzäther* (Essigs. Methyloxyd; $C_6 H_8 O_4$). Spec. Gew. 0,8668 (?). Siedep. $59^{\circ},5$ bei $761^{mm},2$.

$$V = 1 + 0,0012960t + 0,0000029098t^2 + 0,000000004257t^3 \quad (-34^{\circ},3 \text{ bis } 66^{\circ},3)$$

In einer zweiten Abhandlung (1) hat Pierre die Untersuchung folgender Flüssigkeiten mitgeteilt :

Fuselalkohol (Kartoffelfuselöl, Amyloxydhydrat; $C_{10} H_{12} O_2$).

Spec. Gew. 0,8271. Siedep. $131^{\circ},8$ bei $751^{mm},3$.

$$V = 1 + 0,00089001t + 0,00000065729t^2 + 0,000000011846t^3 \quad (0^{\circ} \text{ bis } 80^{\circ})$$

$$V = 1 + 0,00089885t + 0,00000068745t^2 + 0,000000010096t^3 \quad (80^{\circ} \text{ bis } 130^{\circ})$$

Pierre berechnet die Ausdehnung bis zu 80° mittelst der ersteren, die für Temperaturen über 80° mittelst der zweiten Formel, weil Eine Formel für das ganze Temperaturintervall 0 bis 130° seine Beobachtungen nicht genau genug ausdrücke.

Essigäther (Essigs. Aethyloxyd; $C_4 H_8 O_4$). Spec. Gew. 0,9069. Siedep. $74^{\circ},1$ bei $766^{mm},5$.

$$V = 1 + 0,0012585t + 0,0000029569t^2 + 0,000000001492t^3 \quad (-36^{\circ},2 \text{ bis } 72^{\circ},4)$$

Butterholzäther (Butters. Methyloxyd; $C_{10} H_{10} O_4$). Spec.

Gew. 1,0293. Siedep. $102^{\circ},1$ bei $743^{mm},9$. (Beide Eigenschaften differiren sehr stark von den durch H. Kopp bestimmten, vergl. Seite 67.)

$$V = 1 + 0,0012399t + 0,000000626025t^2 + 0,000000013066t^3 \quad (0^{\circ} \text{ bis } 99^{\circ},8)$$

Butteräther (Butters. Aethyloxyd; $C_{12} H_{12} O_4$). Spec.

Gew. 0,9019. Siedep. 119° bei $746^{mm},5$.

$$V = 1 + 0,0012028t + 0,00000007223t^2 + 0,00000002263t^3 \quad (0^{\circ} \text{ bis } 100^{\circ})$$

$$V = 1 + 0,0006327t + 0,000012763t^2 + 0,00000005028t^3 \quad (100^{\circ} \text{ bis } 118^{\circ})$$

In einer dritten Abhandlung (2) hat Pierre die Untersuchung folgender Flüssigkeiten mitgeteilt :

Chlorphosphor (Phosphorchlorür; $P Cl_3$). Spec. Gew. 1,6162.

Siedep. $78^{\circ},3$ bei $751^{mm},5$.

$$V = 1 + 0,0011286t + 0,00000087288t^2 + 0,000017924t^3 \quad (-35^{\circ},7 \text{ bis } +74^{\circ},9)$$

Bromphosphor (Phosphorbromür; $P Br_3$). Spec. Gew. 2,9249.

Siedep. $175^{\circ},3$ bei $760^{mm},2$.

$$V = 1 + 0,00084720t + 0,00000043672t^2 + 0,000000002528t^3 \quad (0^{\circ} \text{ bis } 100^{\circ})$$

$$V = 1 + 0,00082427t + 0,00000091431t^2 + 0,000000000055t^3 \quad (100^{\circ} \text{ bis } 175^{\circ})$$

(1) Ann. ch. phys. [3] XIX, 193; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 160. — (2) Ann. ch. phys. [3] XX, 5; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 168.

Arsen (Arsenchlorür; As Cl_3). Spec. Gew. 2,2050. Andehnung von Flüssigkeiten.

Siedep. $133^\circ,8$ bei $756^{\text{mm}},9$.

$$V = 1 + 0,00097907t + 0,00000096695t^2 + 0,0000000017772t^3 \\ (-14^\circ,9 \text{ bis } 130^\circ,2)$$

Zinnchlorid (Sn Cl_2). Spec. Gew. 2,2671. Siedep. $115^\circ,4$ bei $763^{\text{mm}},1$.

$$V = 1 + 0,0011328t + 0,00000091171t^2 + 0,0000000075798t^3 \\ (-19^\circ,1 \text{ bis } 112^\circ,6)$$

Titanchlorid (Ti Cl_3). Spec. Gew. 1,7609. Siedep. 136° bei $762^{\text{mm}},3$.

$$V = 1 + 0,000942569t + 0,0000019458t^2 + 0,000000000888t^3 \\ (-22^\circ,1 \text{ bis } 134^\circ,2)$$

Chlorsilicium (Si Cl_4). Spec. Gew. 1,5237. Siedep. 59° bei $760^{\text{mm}},1$.

$$V = 1 + 0,0012941t + 0,0000021841t^2 + 0,000000040864t^3 (-32^\circ,4 \text{ bis } 58^\circ,6)$$

Bromsilicium (Si Br_4). Spec. Gew. 2,8128. Siedep. $153^\circ,4$ bei $762^{\text{mm}},5$.

$$V = 1 + 0,00095257t + 0,00000075674t^2 + 0,0000000002921t^3 (0^\circ \text{ bis } 149^\circ,5)$$

Chlorethyl (Öl des ölbildenden Gases, Flüssigkeit der holländischen Chemiker; $\text{C}_4 \text{H}_4 \text{Cl}_2$). Spec. Gew. 1,2803.

Siedep. $84^\circ,9$ bei $761^{\text{mm}},9$.

$$V = 1 + 0,0011189t + 0,0000010469t^2 + 0,000000010341t^3 (-22^\circ,7 \text{ bis } 83^\circ,8)$$

Bromethyl ($\text{C}_4 \text{H}_4 \text{Br}_2$). Spec. Gew. 2,1629 bei $20^\circ,8$ (es erstarrt bei 13°). Siedep. $132^\circ,6$ bei $756^{\text{mm}},9$. Die Formeln

$$\mathfrak{B} = 1 + 0,00095270d + 0,0000013165d^2 + 0,0000000010627d^3 (20^\circ \text{ bis } 100^\circ)$$

$$\mathfrak{B} = 1 + 0,0010168d + 0,00000010223d^2 + 0,000000008788d^3 (100^\circ \text{ bis } 132^\circ,6)$$

geben das Volum für eine Temperatur (die erste zwischen 20° und 100° , die zweite zwischen 100° und $132^\circ,6$), welche um d° höher ist als $20^\circ,09$, das Volum bei letzterer Temperatur = 1 gesetzt.

Brom (Br). Spec. Gew. 3,1872. Siedep. 63° bei 760^{mm} .

$$V = 1 + 0,0010382t + 0,0000017114t^2 + 0,000000005447t^3 (-7^\circ,4 \text{ bis } 60^\circ,2)$$

In einer vierten Abhandlung (1) endlich hat Pierre die Untersuchung folgender Flüssigkeiten mitgetheilt:

Schweflige Säure (S O_2). Spec. Gew. 1,4911 bei $-20^\circ,5$.

Siedep. — 8° bei $759^{\text{mm}},2$.

$$\mathfrak{B} = 1 + 0,0014964d + 0,0000223875d^2 - 0,000000495759d^3 (-25,9 \text{ bis } -9^\circ,5)$$

(1) Ann. ch. phys. [3] XXI, 386; im Ausg. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 177.

Ausdehnung
von Flüssig-
keiten.

welche Formel das Volum für eine um d° höhere Temperatur als $-25^{\circ},85$ giebt, das Volum bei letzterer Temperatur $= 1$ gesetzt.

Schwefelsäureäther (Schwefligs. Aethyloxyd; $C_4 H_8 SO_2$).

Spec. Gew. 1,1063. Siedep. $160^{\circ},3$ bei $763^{mm},8$.

$$V = 1 + 0,00099348t + 0,0000010904t^2 + 0,0000000015394t^3 \quad (0^{\circ} \text{ bis } 160^{\circ},1)$$

Pierre hat für die meisten dieser Flüssigkeiten Tafeln berechnet, welches Volum sie bei verschiedenen Temperaturen haben, das bei 0° oder einer andern Temperatur oder dem Siedepunkt $= 1$ gesetzt. Wir nehmen hier die letztern auf; die beiliegende Tabelle giebt also das Volum für 5, 10, 15 . . . , allgemein D , Grade unter dem Siedepunkt, das Volum bei diesem $= 10000$ gesetzt. Für Schwefelkohlenstoff, Aether und Ameisenäther, wofür Pierre solche Tafeln nicht gab, sind sie mit Zugrundelegung der von ihm angegebenen Siedepunkte und Ausdehnungsformeln berechnet; bezüglich des Wassers gilt das oben (Seite 61) gesagte.

Pierre hat die Mittheilung seiner Beobachtungen und der daraus resultirenden Ausdehnungsformeln begleitet mit Betrachtungen über die Ungleichmäßigkeit der Ausdehnung der untersuchten Flüssigkeiten und in wiefern letztere zur Construction richtig zeigender Thermometer untauglich sind; mit der Vergleichung der durchschnittlichen Ausdehnung für 1° (des mittleren Ausdehnungscoefficienten) bei Temperaturerhöhung von 0° zu t° , und der Ausdehnung bei Temperaturerhöhung von t° zu $(t + 1)^{\circ}$ (des wahren Ausdehnungscoefficienten bei t°) (1). Er vergleicht ferner die Volumveränderungen, welche gleiche Volume verschiedener Flüssigkeiten bei ihrem Siedepunkt durch Erkältung um gleichviel Grade unter ihren Siedepunkt erleiden; die beigefügte Tabelle giebt diese Vergleichung. Zu bemerken ist nur, daß Pierre (2), durch einen Rechnungs-

(1) Diese für Thermometrie im Allgemeinen wichtigen Resultate hat Pierre zusammengestellt Compt. rend. XXVII, 213 — (2) Ann. ch. phys. [3] XV, 403.

Tabelle b) :

D	Fuselalkohol $C_{10}H_{12}O_2$ (131°,8)	Aether C_4H_8O (35°,5)	Chloräther C_2H_5Cl (11°)	Bromäther C_2H_5Br (40°,7)	Jodäther C_2H_5J (70°)
0	10000	10000	10000	10000	10000
5	9982	9914	9924	9925	9938
10	9865	9832	9845	9853	9875
15	9800	9753	9770	9782	9812
20	9737	9676	9698	9713	9752
25	9676	9601	9626	9643	9691
30	9617	9527	9556	9580	9632
35	9559	9455	9485	9516	9572
40	9503	9384	9419	9452	9514
45	9448	9314	—	9389	9456
50	9394	9244	—	9327	9401
55	9342	—	—	9265	9346
60	9292	—	—	9204	9293
65	9241	—	—	9148	9239
70	9192	—	—	9091	9187
75	9145	—	—	—	9135
80	9098	—	—	—	9084
85	9053	—	—	—	9034
90	9009	—	—	—	8984
95	8966	—	—	—	8935
100	8924	—	—	—	8887
105	8882	—	—	—	—
110	8841	—	—	—	—
115	8801	—	—	—	—
120	8761	—	—	—	—
125	8722	—	—	—	—
130	8683	—	—	—	—
135	8644	—	—	—	—
140	8606	—	—	—	—
145	8568	—	—	—	—
150	—	—	—	—	—
155	—	—	—	—	—
160	—	—	—	—	—
165	—	—	—	—	—
170	—	—	—	—	—
175	—	—	—	—	—
180	—	—	—	—	—

Bromholzäther C_2H_5Br (18°)	Jodholzäther C_2H_5J (43° 8)	Ammoniakäther C_2H_5O (52° 9)	Essigholzäther $C_2H_5O_2$ (59° 5)	Essigäther $C_2H_5O_2$ (74° 1)	Butterholzäther $C_4H_9O_2$ (102° 1)	Butteräther $C_4H_9O_2$ (119°)	Schwefelsäure-Aether $C_2H_5SO_2$ (160° 3)
10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
9926	9934	9922	9923	9922	9924	9933	9943
9854	9863	9847	9848	9846	9849	9865	9876
9784	9796	9774	9775	9772	9777	9795	9819
9715	9733	9702	9703	9700	9706	9724	9763
9648	9672	9632	9633	9629	9636	9652	9706
9579	9612	9563	9564	9559	9569	9583	9648
9509	9552	9496	9497	9491	9503	9515	9592
9438	9494	9430	9431	9424	9438	9446	9536
9368	9437	9366	9367	9359	9375	9378	9481
—	9881	9303	9304	9295	9812	9813	9426
—	9826	9241	9243	9233	9251	9248	9873
—	9272	9181	9183	9172	9192	9185	9320
—	9218	9122	9124	9112	9133	9124	9267
—	9163	9064	9065	9053	9075	9065	9215
—	9108	9007	9010	8996	9017	9007	9164
—	—	8952	8955	8940	8961	8950	9114
—	—	8898	8899	8886	8905	8895	9064
—	—	8845	8843	8833	8850	8840	9015
—	—	—	8788	8781	8795	8787	8966
—	—	—	—	8730	8741	8734	8918
—	—	—	—	8681	8687	8682	8870
—	—	—	—	8633	8633	8630	8823
—	—	—	—	—	8580	8579	8777
—	—	—	—	—	8526	8527	8731
—	—	—	—	—	8472	8476	8685
—	—	—	—	—	8418	8424	8641
—	—	—	—	—	—	8373	8596
—	—	—	—	—	—	—	8553
—	—	—	—	—	—	—	8509
—	—	—	—	—	—	—	8466
—	—	—	—	—	—	—	8424
—	—	—	—	—	—	—	8382
—	—	—	—	—	—	—	8341
—	—	—	—	—	—	—	8300
—	—	—	—	—	—	—	8259
—	—	—	—	—	—	—	8219

fehler verleitet, die Volumverminderung für Ameisenäther und Essigöläther als verschieden (und diese Verschiedenheit für alle isomeren Flüssigkeiten als wahrscheinlich) betrachtet, während doch seine Angaben (vergl. die Tabelle), ebenso wie die sogleich anzuführenden Versuche von H. Kopp, die Gleichheit der Volumverminderung gerade für die genannten Substanzen außer Zweifel setzten. Endlich hebt er noch hervor, daß das spezifische Volum des Schwefligsäureäthers $\text{C}_4\text{H}_8\text{SO}_3 = \text{C}_4\text{H}_8\text{O} + \text{SO}_2$ bei seinem Siedepunkte sehr genau gleich den Summen der spec. Volume des Aethers $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ und der schwefligen Säure (SO_2) bei ihren Siedepunkten ist.

Ausdehnung
von Flüssig-
keiten.

Ueber das spezifische Gewicht, die Ausdehnung durch die Wärme und den Siedepunkt einiger Flüssigkeiten hat H. Kopp (1) Untersuchungen publicirt. Er berichtet zuerst über die Construction der angewandten Thermometer und Dilatometer (thermometerartigen Apparate zur Ermittlung der Ausdehnung von Flüssigkeiten), die Anstellung und Berechnung der Ausdehnungsversuche, die Bestimmung des spezifischen Gewichts und des Siedepunkts; dann folgt die Untersuchung von 18 Flüssigkeiten, deren Bereitung und Analyse angegeben ist, mit den unten folgenden Resultaten. Die spezifischen Gewichte sind die für 0° gefundenen, bezogen auf Wasser von derselben Temperatur als Einheit. Die Siedepunkte sind für 760^{mm} Barometerstand nach der Voraussetzung corrigirt, daß für kleine Abstände vom Siedepunkt das Dalton'sche Gesetz sich als gültig betrachten lasse, und nach Regnault's Bestimmungen über die Schwankungen des Siedepunkts nach dem Barometerstand bei dem Wasser; für die meisten Substanzen wurde der Siedepunkt sowohl beobachtet, wenn die Thermometerkugel in die Flüssigkeit tauchte, als auch wenn sie sich im Dampf befand; wir geben hier die letzteren Beobachtungen. Die folgenden Formeln für die Ausdehnung

(1) Pogg. Ann. LXXII, 1 u. 223.

Ansehnung
von Flüssig-
keiten.

sind (ausgenommen bei dem Wasser) die Mittel aus Formeln mit wohl übereinstimmenden Resultaten, welche aus verschiedenen Beobachtungsreihen, unter Anwendung verschiedener Apparate, abgeleitet wurden; sie geben das wahre Volum V bei einer Temperatur t° , das bei $0^\circ = 1$ gesetzt; wir fügen jeder Formel auch hier in Klammern die Temperaturgrenzen bei, innerhalb welcher die Ausdehnungsversuche angestellt wurden.

Wasser (H_2O); die Ausdehnung des Wassers von 0 bis 100° läßt sich nicht genau durch Eine Formel ausdrücken; Kopp hat aus seinen Versuchen abgeleitet für die Temperaturen :

$$\begin{aligned} 0 \text{ bis } 25^\circ : V &= 1 - 0,000061045t + 0,0000077183t^2 - 0,000000037t^3 \\ 25 \text{ „ } 50^\circ : V &= 1 - 0,000065415t + 0,0000077587t^2 - 0,0000000354t^3 \\ 50 \text{ „ } 75^\circ : V &= 1 + 0,00005916t + 0,0000031849t^2 + 0,00000000728t^3 \\ 75 \text{ „ } 100^\circ : V &= 1 + 0,00008645t + 0,0000031892t^2 + 0,00000000244t^3 \end{aligned}$$

Aus der ersten Formel leitet sich die Temperatur des Maximum der Dichtigkeit des Wassers zu $4^\circ,08$ ab.

Holzgeist (Methyloxydhydrat; $C_2 H_4 O_2$); spec. Gew. $0,81796$, Siedep. $65^\circ,5$.

$V = 1 + 0,00115435t - 0,00000028046t^2 + 0,000000027766t^3$ (0° bis 69°)
Alkohol (Weingeist, Aethyloxydhydrat; $C_4 H_8 O_2$); spec. Gew. $0,80950$, Siedep. $78^\circ,4$.

$V = 1 + 0,00104139t + 0,0000007836t^2 + 0,000000017618t^3$ (0° bis 79°)
Fuselalkohol (Kartoffelfuselöl, Amyloxydhydrat; $C_{10} H_{12} O$); spec. Gew. $0,8253$, Siedep. $131^\circ,1$.

$V = 1 + 0,00090692t + 0,00000035970t^2 + 0,000000013786t^3$ ($11^\circ,6$ bis 130°)
Aether (Aethyloxyd; $C_4 H_8 O$ oder $C_6 H_{10} O_2$); spec. Gew. $0,73658$, Siedep. $34^\circ,9$.

$V = 1 + 0,00148026t + 0,00000350316t^2 + 0,000000027007t^3$ (0° bis 33°)
Aldehyd (Acetyloxydhydrat; $C_4 H_4 O_2$); spec. Gew. $0,80092$, Siedep. $20^\circ,8$.

$V = 1 + 0,0015464t + 0,0000069745t^2$ (0° bis $21^\circ,2$)
Aceton ($C_3 H_6 O$ oder $C_6 H_8 O_2$); spec. Gew. $0,8144$, Siedep. $56^\circ,3$.

$V = 1 + 0,00134810t + 0,0000026090t^2 + 0,0000000115592t^3$ (0° bis 62°)
Benzol (Benzin; $C_{12} H_6$); spec. Gew. $0,89911$, Siedep. 80°
 $V = 1 + 0,00117626t + 0,00000127755t^2 + 0,0000000080648t^3$ ($11^\circ,4$ bis 81°)

[illegible]

Ameisensäure (Ameisensäurehydrat; $C_1 H_2 O_4$); spec. Ausdehnung
von Flüssig-
keiten.

Gew. 1,2227, Siedep. $105^{\circ},3$.

$$V=1+0,00099269t+0,00000062514t^2+0,0000000059650t^3 \quad (5^{\circ},4 \text{ bis } 103^{\circ},5)$$

Essigsäure (Essigsäurehydrat; $C_2 H_4 O_4$); spec. Gewicht
1,08005, Siedep. $117^{\circ},3$.

$$V=1+0,00105703t+0,00000018323t^2+0,0000000096435t^3 \quad (17^{\circ},7 \text{ bis } 109^{\circ},6)$$

Buttersäure (Buttersäurehydrat; $C_3 H_6 O_4$); spec. Gew.
0,96862, Siedep. $157^{\circ},0$.

$$V=1+0,0010461t+0,00000056244t^2+0,0000000054201t^3 \quad (12^{\circ},1 \text{ bis } 141^{\circ},9)$$

Ameisenholzäther (ameisens. Methyloxyd; $C_4 H_4 O_4$); spec.
Gew. 0,99840, Siedep. $33^{\circ},4$.

$$V=1+0,0014055t+0,0000017131t^2+0,000000045947t^3 \quad (0^{\circ} \text{ bis } 30^{\circ},9)$$

Ameisenäther (ameisens. Aethyloxyd; $C_6 H_6 O_4$); spec.
Gew. 0,94474, Siedep. $54^{\circ},9$.

$$V=1+0,00136446t+0,00000013538t^2+0,000000039248t^3 \quad (0^{\circ} \text{ bis } 63^{\circ},1)$$

Essigholzäther (essigs. Methyloxyd; $C_6 H_6 O_4$); spec. Gew.
0,95620, Siedep. $56^{\circ},3$.

$$V=1+0,0012779t+0,00000089471t^2-0,000000003639t^3 \quad (0^{\circ} \text{ bis } 62^{\circ},3)$$

Essigäther (essigs. Aethyloxyd; $C_8 H_8 O_4$); spec. Gew.
0,91046, Siedep. $74^{\circ},3$.

$$V=1+0,0012738t+0,0000021914t^2+0,000000011797t^3 \quad (0^{\circ} \text{ bis } 74^{\circ},8)$$

Butterholzäther (butters. Methyloxyd; $C_{10} H_{10} O_4$); spec.
Gew. 0,92098, Siedep. $95^{\circ},9$.

$$V=1+0,00119565t+0,0000018103t^2+0,0000000098292t^3 \quad (6^{\circ},9 \text{ bis } 94^{\circ},6)$$

Butteräther (butters. Aethyloxyd; $C_{12} H_{12} O_4$); spec. Gew.
0,90412, Siedep. $114^{\circ},8$.

$$V=1+0,00117817t+0,0000018093t^2+0,000000009560t^3 \quad (12^{\circ},0 \text{ bis } 111^{\circ},1)$$

Valerianholzäther (valerians. Methyloxyd; $C_{12} H_{12} O_4$);
spec. Gew. 0,901525, Siedep. $116^{\circ},2$.

$$V=1+0,00112115t+0,0000017044t^2+0,0000000058627t^3 \quad (5^{\circ},5 \text{ bis } 104^{\circ},1)$$

Die Resultate dieser Formeln sind in der beiliegenden Tabelle A enthalten, welche das Volum einer Flüssigkeit bei 5, 10 allgemein bei T° Graden über 0° angiebt, das Volum bei $0^{\circ} = 1$ gesetzt. Tabelle B giebt die Zusammenziehung für gleiche Temperaturabstände von den Siedepunkten; das Volum jeder Flüssigkeit bei dem für sie beobachteten (in den Ueberschriften nochmals angegebenen)

Ausdehnung
von Flüssig-
keiten. Siedepunkt ist = 10000 gesetzt, und angegeben, wie groß d
Volum bei 5, 10 allgemein bei D^0 unter dem Sied
punkt ist.

Die Ausdehnung einiger Flüssigkeiten ist auch dur
Frankenheim (1) untersucht worden, nach derselb
Methode (Messung der Volumsveränderung in thermon
terartigen Apparaten) aber verschieden in den Einzelne
der Anwendung derselben. Die untersuchten Substan
sind in Beziehung auf ihre chemische Zusammensetzun
nicht scharf bestimmt. Die im Folgenden angegebenen
specifischen Gewichte gelten für 0^0 ; V ist das wahre V
lum für t^0 (nach Versuchen innerhalb der Temperatur
welche hinter jeder Formel eingeklammert stehen).

Terpenthinöl, welches wiederholt über Chlorcalcium destil
war, doch wahrscheinlich etwas Wasser aufgenommen
hatte, und bei dem Kochen ein permanentes Gas e
wickelte. Spec. Gewicht 0,8902.

$$V = 1 + 0,0008474t + 0,000001248t^2 \quad (11^0 \text{ bis } 145^0)$$

Citronenöl erster Art (dieselben Bemerkungen wie für
vorhergehende Oel gelten). Spec. Gew. 0,8380.

$$V = 1 + 0,0008660t + 0,000001161t^2 \quad (35^0 \text{ bis } 133^0)$$

Citronenöl zweiter Art (das vorhergehende, welches si
mit der Zeit etwas verändert hatte). Spec. Gew. 0,86

$$V = 1 + 0,0007902t + 0,000002053t^2 \quad (15^0 \text{ bis } 122^0)$$

Petroleum (Bereitung und Zusammensetzung war derjenig
des Terpenthinöls ähnlich). Spec. Gew. 0,8467.

$$V = 1 + 0,0008994t + 0,000001396t^2 \quad (24^0 \text{ bis } 120^0)$$

Essigäther vom spec. Gew. 0,9051.

$$V = 1 + 0,001040t + 0,00000363t^2 \quad (13^0 \text{ bis } 68^0)$$

Essigsäure (wohl wässerige) vom spec. Gew. 1,0522.

$$V = 1 + 0,0004924t + 0,00000513t^2 \quad (13^0 \text{ bis } 101^0)$$

Ameisensäure, wässerige, vom spec. Gew. 1,1051.

$$V = 1 + 0,0005126t + 0,000002721t^2 \quad (15^0 \text{ bis } 99^0)$$

Chlorzinklösung vom spec. Gew. 1,3632.

$$V = 1 + 0,0005435t + 0,000001320t^2 \quad (15^0 \text{ bis } 103^0)$$

(1) Pogg. Ann. LXXII, 422, mit Beziehung auf eine Abhandl
dasselbst, 177.

zung
Kasig-
m.

nn der
gkeit
miera.

T	Terpenhöl
0	1,00
5	1,00
10	1,00
15	1,01
20	1,01
25	1,02
30	1,02
35	1,03
40	1,03
45	1,04
50	1,04
55	1,05
60	1,05
65	1,06
70	1,06
75	1,07
80	1,07
85	1,08
90	1,08
95	1,09
100	1,09
105	1,10
110	1,10
115	1,11
120	1,11
125	1,12
130	1,13
135	1,13
140	1,14
145	1,14

Ausd
von
ke

Maximum der
Dichtigkeit
des Wassers.

Maximumstemperatur gleich gesetzt werden kann, ging al
der Strom oben von dem Wasser, dessen Temperatur v
dieser Maximumstemperatur mehr differirte, zu dem Wasse
dessen Temperatur dieser Maximumstemperatur näher wa
kein Strom wäre sichtbar gewesen, wenn die Wasse
massen in beiden Gefäßen gleichweit vom Maximumspun
abstehende Temperaturen gehabt hätten, oder wenn dur
das arithmetische Mittel ihrer Temperaturen die gesuch
Maximumstemperatur gegeben wäre. Letztere wurde a
den Beobachtungen durch Interpolation abgeleitet, w
im Mittel aus den wohl übereinstimmenden Resultat
verschiedener Versuchsreihen zu 3°,945 gefunden.

Ausdehnung
des
Quecksilbers.

Regnault (1) hat zahlreiche Versuche über die a
solute Ausdehnung des Quecksilbers angestellt. Er b
stimmte dieselbe durch Messung der Verschiedenheit d
Drucks, welchen gleich hohe Quecksilbersäulen von ve
schiedener Temperatur ausüben; eine genauere Darlegu
seiner Verfahrungsweisen ist ohne Zeichnungen nicht :
geben. Das Volum des Quecksilbers bei 0° = 1 geset:
ist es nach seiner Bestimmung bei t° des Luftthermomet
gegeben durch :

$$1 + 0,000179007t + 0,0000000252816t^2,$$

also bei 50°=1,009013	bei 150°=0,027419	bei 250°=0,0462
" 100°=1,018153	" 200°=0,036811	" 300°=0,0552
		" 350°=0,0652

Izarn (2) hat, mit Zugrundlegung von Regnault
Bestimmung der Ausdehnung des Quecksilbers, Tafel
zur Reduction des Barometerstandes auf 0° berechnet.

Specifische
Wärme;
Schmelzen,
latente
Schmelz-
wärme.

Ueber die Wärmemengen in Metallgemischen ist ein
Notiz von Rudberg (3) veröffentlicht worden, welc
derselbe 1839 an Poggendorff mittheilte. Rudbe

(1) Relation des experiences entreprises — — pour déterminer les pr
ciples lois physiques et les données numériques qui entrent dans le calcul
des machines à vapeur, Paris 1847, 271. — (2) Millon et Reiset's Annuaire
chimie, 1848, 498. (3) Pogg. Ann. LXXI, 460; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 2.

Wärmemenge
in Metall-
gemischen.

gewesen zu sein, das Cadmium stimme, bei dem allgemein angenommenen Atomgewicht für dasselbe, nicht mit dem Dulong'schen Gesetz, und eine Correction hierfür bringe Uebereinstimmung hervor; aber dem ist nicht so.

Für ternäre Legirungen vermuthete Rudberg, daß die Summe der Wärmemengen der elektropositiveren Metalle gleich sei der Wärmemenge des elektronegativeren Metalls. Für eine von Svanberg untersuchte Legirung $\text{Zn Pb}_2\text{Sn}$, sind die Schmelzpunkte :

$$\begin{array}{rcl} \text{Zn} & = & 400^{\circ},0 \\ \text{Zn Pb}_2 \text{ Sn}_2 & = & 168,0 \\ \hline & & 232,0 \end{array} \quad \begin{array}{rcl} \text{Pb} & = & 326^{\circ},0 \\ & & 168,0 \\ \hline & & 158,0 \end{array} \quad \begin{array}{rcl} \text{Sn} & = & 228^{\circ},5 \\ & & 168,0 \\ \hline & & 60,5 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Es ist } 232,0 + 2 \cdot 158,0 = 548,0 \\ \quad \quad \quad 9 \cdot 60,5 = 544,5 \end{array}$$

Ueber speci-
fische Wärme,
Schmelzpunkt
und latente
Schmelz-
Wärme.

Person hat über die specifische Wärme mehrerer Körper in dem festen und flüssigen Zustand, über die latente Wärme derselben bei dem Schmelzen und über den Zusammenhang dieser Eigenschaften Mehreres publicirt, kürzere Notizen und ausführlichere Mittheilungen, welche beide hier zu besprechen sind, weil die in ihnen enthaltenen Angaben nicht immer übereinstimmen.

In den früheren Publikationen (1) theilt er folgende Resultate seiner Untersuchungen mit. T bedeutet den Schmelzpunkt, L die latente Wärme bei dem Schmelzen für die Gewichtseinheit; die folgende Columnne giebt die Temperaturen, zwischen welchen die specifische Wärme W bestimmt wurde.

S u b s t a n z.	T	L		W
Zinn	235°C	14,3	340° u. 240°	0,061
Wismuth	270	12,4	370 „ 280	0,035
Blei	332	5,15	440 „ 340	0,039
Legirung $\text{Pb}_2 \text{ Sn}_2 \text{ Bi}_2$	96	5,96	300 „ 136	0,036
desgl.	—	—	136 „ 107	0,047
desgl.	—	—	80 „ 14	0,060
desgl.	—	—	50 „ 12	0,049

(1) Compt. rend. XXIII, 162; Instit. 1846, 247; Pogg. Ann. LXX, 300.— Compt. rend. XXIII, 336; Instit. 1846, 277; Pogg. Ann. LXX, 302; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 179.

S u b s t a n z .	T	L		W	Ueber specifische Wärme, Schmelzpunkt und latente Schmelzwärme.
Legirung Pb Sn, Bi	145	7,63	330 "	143	0,046
Phosphor	44,2	4,71	100 "	50	0,212
Schwefel	115	9,175	147 "	120	0,235
Salpetersaures Natron	310,5	62,98	430 "	330	0,413
" Kali	339	46,18	435 "	350	0,344
Phosphor. Natron (PO ₃ , 2 NaO, 25 HO)	36,4	54,65	79 "	44	0,758
deagl.	—	—	2 "	20	0,454
Chlorcalcium (Cl Ca + 6 HO) . .	28,5	45,79	127 "	100	0,519
deagl.	—	—	100 "	60	0,628
deagl.	—	—	60 "	31	0,358
deagl.	—	—	28 "	4	0,647
deagl.	—	—	2 "	20	0,406
Bienenwachs (gelbes)	62,0	43,51	102 "	66	0,54
deagl.	—	—	58 "	42	0,72
deagl.	—	—	42 "	26	0,79
deagl.	—	—	26 "	6	0,52
deagl.	—	—	2 "	20	0,39
Eis	—	—	0 "	30	0,505
Zink	423	27,46	—	—	—

Person stellt für den Zusammenhang zwischen dem Schmelzpunkt, den specifischen Wärmen im festen und flüssigen Zustand und der latenten Wärme die Formel auf:

$$(160 + T) d = L$$

wo T und L die obigen Bedeutungen haben, d den Unterschied der specifischen Wärmen im festen und im flüssigen Zustand bedeutet; er behauptet, daß, um die latente Wärme zu erhalten, der Unterschied der beiden specifischen Wärmen so oft genommen werden muß, als Grade zwischen -160° und dem Schmelzpunkt liegen. Aus den Angaben der vorhergehenden Tabelle und aus den von Regnault bestimmten specifischen Wärmen berechnet er folgende Werthe für die latente Wärme bei verschiedenen Substanzen, und vergleicht damit die beobachteten Resultate :

Substanz.	berechn.	beobacht.	Substanz.	berechn.	beobacht.
Wasser . . .	79,20	79,25	Schwefel . .	9,08	9,18
Chlorcalcium .	43,60	45,79	Salpeters. Natron	63,52	62,98
Phosphor. Natr.	59,70	54,65	Salpeters. Kali .	52,39	46,18
Phosphor . .	4,76	4,71			

Ueber specifische Wärme, Schmelzpunkt und latente Schmelzwärme.

Bei mehreren andern Körpern ergibt sich nicht ein solche Uebereinstimmung zwischen Rechnung und Beobachtung zu Gunsten der Formel; Person sucht die Abweichungen zu erklären. — Bei dem Wachs fand er die spezifische Wärme im festen Zustand in der Nähe des Schmelzpunkts dieser Substanz größer als im flüssigen, so daß mit Zugrundelegung der so gefundenen Größen die Formel eine Absurdität, L negativ, ergeben würde. Aber in größerem Abstand unter dem Schmelzpunkt fand er die spezifische Wärme des Wachses viel kleiner (0,39) und er glaubt, man müsse von der zwischen 2 und 60 gefundenen specifischen Wärme alles, was 0,39 übersteigt als latente Wärme abziehen (Wärme werde vor der Schmelzen latent, unter Hervorbringung der Erweichung) dann zeige sich die Formel anwendbar. — Bei den Metallen scheint die Formel gleichfalls nicht zu passen, weil hier die spezifische Wärme im festen und flüssigen Zustand nahe gleich ist, d also $= 0$ wird. Person betrachtet eher er dies zu erklären versucht, die Formel von einer andern Seite. Wenn c und C die specifischen Wärmen im festen und im flüssigen Zustand bedeuten, so bezeichne $(160 + T) c$ die Wärmemenge, welche zwischen -160° und T° in der Gewichtseinheit des festen Körpers enthalten ist und durch Zufügung der latenten Wärme L erhält man die in derselben Menge des flüssigen Körpers zwischen denselben Grenzen enthaltene Wärme $= (160 + T) c + L$. Die oben gegebene Formel $(160 + T) d = L$, läßt sich aber auch, wenn man $C - c$ statt d einführt, schreiben :

$$(160 + T) c + L = (160 + T) C,$$

d. h. die Wärme, welche man einer flüssigen Masse entziehen müßte um sie bis -160° zu erkalten, kann, ohne Berücksichtigung der Aenderung des Aggregatzustandes berechnet werden, wie wenn diese Masse flüssig blieb. Er erinnert daran, daß mehrere Körper noch unter ihrem Schmelzpunkt in dem flüssigen Zustand verbleiben können und meint, der flüssige Zustand sei mit den niedrigsten

Ueber specifische Wärme, Schmelzpunkt und latente Schmelzwärme.

(willkürlichen) Nullpunkts von dem absoluten $= x^0$ gesetzt, so ist die erstere Wärme $= (x + T) c$, die letztere $= (x + T) C$, die latente Wärme $= (x + T) (C - c)$. Die Erfahrung gebe nun hier $x = 160$. Die latente Schmelzwärme sei wahrscheinlich eine veränderliche Gröfse; sie ändere sich mit der Temperatur, bei welcher der Uebergang aus dem einen in den andern Aggregatzustand stattfindet, und werde kleiner, wie diese Temperatur niedriger werde.

Nach dieser letzteren Ansicht suchte Person ein Problem bei dem Schmelzen von Legirungen zu lösen (1). Er fand für eine Legirung aus 8 Theilen Wismuth, 5 Blei und 3 Zinn (entsprechend $\text{Bi}_8\text{Pb}_5\text{Sn}_3$), welche bei 96° erstarrt, die latente Schmelzwärme $= 6$; aus den latenten Wärmen der Bestandtheile, wie sie in der mitgetheilten Tabelle angegeben sind, berechnet sie sich für diese Mischung aber zu 10,4. Nach Person rührt die Differenz davon her, daß man in dieser Rechnung die latenten Wärmen für die Bestandtheile so genommen hat, wie sie für höhere Temperaturen, die Schmelzpunkte dieser Metalle für sich, gefunden wurden, während man sie für 96° nehmen mußte, bei welcher Temperatur die Metalle in der Legirung flüssig werden, aber auch eine kleinere latente Wärme haben. Letztere berechnet er, da directe Beobachtung nicht möglich ist, in folgender Weise. Er setzt in der Formel $(160 + t) d = L$, — welche zuerst (Seite 73) nur für den Fall aufgestellt wurde, daß t den Schmelzpunkt im gewöhnlichen Sinn dieses Wortes bedeutet —, t allgemein = einer Temperatur, bei welcher die Substanz fest oder flüssig sein kann (oder das letztere gedacht wird). Für $t =$ den Schmelzpunkt ist t und L bekannt; er kann nun für jedes Metall d berechnen, den Unterschied zwischen der spec. Wärme im festen und im flüssigen Zustande

(1) Compt. rend. XXIII, 626; Instit. 1846, 325; Pogg. Ann. LXX, 388; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 181.

Ueber speci-
sche Wärme,
Schmelzpunkt
und latente
Schmelz-
Wärme.

die Ergebnisse mit, welche er für fünf verschiedene Substanzen fand.

Für das Eis bestimmte er die spezifische Wärme durch Messung der Temperaturerniedrigung, welche bis zu -20° etwa erkaltetes Eis in einer Flüssigkeit, ohne zu schmelzen, hervorbringt, zu 0,5017, im Mittel mehrerer gut stimmender Versuche, bei deren einigen als Flüssigkeit Terpenthinöl (dessen spec. Wärme in der Nähe von 0° zu 0,416 gefunden wurde), bei andern Salzwasser (auf 100 Wasser 6,75 Chlornatrium enthaltend; spec. Wärme 0,950) angewandt wurde. Durch Messung der Temperaturerniedrigung, welche Eis in Wasser hervorbringt indem es dabei selbst schmilzt (die latente Schmelzwärme des Eises mußte bei der Berechnung dieser Versuche natürlich berücksichtigt und als bekannt vorausgesetzt werden), fand er im Mittel mehrerer Experimente für die spec. Wärme des Eises 0,5057; im Mittel aus beiden verschiedenen Methoden (1) also 0,504. Aus diesem Werth für c berechnet Person den Werth von x in der Formel $(x + T) \cdot (C - c) = L$ (vergl. Seite 76), wo die anderen Größen bei dem Wasser bekannt sind: $T = 0$, $C = 1$, $L = 79,25$. — Die latente Schmelzwärme sei veränderlich. Eine Gewichtseinheit Wasser bei 0° lasse bei dem Gefrieren 79,15 Wärmeeinheiten frei werden. Denke man sich eine Gewichtseinheit Eis bei -10° , so mache die Erwärmung derselben auf 0° das Zutreten von 5 Wärmeeinheiten nothwendig (die spec. Wärme des Eises $= 0,5$ gesetzt), und das Schmelzen das Zutreten von 79,2 Wärmeeinheiten. Im Ganzen treten also 84,2 Wärmeeinheiten zu der Gewichtseinheit Eis von -10° , wenn daraus Wasser von 0° wird, und ebenso viel müssen

(1) Eine dritte von Clément und Désormes versuchte Methode, die spezifische Wärme des Eises aus dem Gewicht des Eises zu ermitteln, welches sich in Wasser von 0° an einer bestimmten Menge von vorher unter 0° erkaltetem Eis bildet, fand Person unbrauchbar, weil sich nicht eine bestimmte Menge sondern fort und fort um so mehr Eis bilde, je länger man das vorher erkaltete Eis eingetaucht lasse.

Ueber specifische Wärme, Schmelzpunkt und latente Schmelzwärme.

festen salpeters. Natrons nach Regnault = 0,27821 gesetzt 63,4.

Für das salpetersaure Kali fand er den Schmelzpunkt = 339°, die spec. Wärme im flüssigen Zustand zwischen 350 und 435° = 0,33186, die latente Schmelzwärme 47,3°. Seine Formel giebt für die letztere (die spec. Wärme des festen salpeters. Kali's nach Regnault = 0,23875 gesetzt) 46,462.

Person erörtert nun weiter Folgerungen aus seiner Formel, die wir schon im Vorhergehenden hervorgehoben haben, und verspricht in einer andern Abhandlung weiter zu entwickeln, daß bei einer Temperatur von 160° und Null gar keine Wärme mehr in den Körpern enthalten ist.

In dieser Abhandlung (1) erinnert er zuerst daran, daß das Verhältniß der in verschiedenen Körpern bei derselben Temperatur enthaltenen Wärmemengen annähernd durch das Verhältniß ihrer spec. Wärmen gegeben sei; genaugen würde dies der Fall sein, wenn das Verhältniß der spec. Wärmen unter einander ein constantes wäre. Ist außerdem das Verhältniß der gesammten Wärmemengen in zwei Körpern auch noch ihre Differenz bekannt, so lassen sich diese bestimmen. Nennt man die bei 0° in der Gewichtseinheit Eis und Wasser enthaltenen absoluten Wärmemengen x und x^1 , so ist ihr Verhältniß $\frac{x}{x^1} = \frac{0,504}{1}$ (0,504 die spec. Wärme des Eises) und ihre Differenz $x^1 - x = 79,2$ (cal latente Schmelzwärme des Wassers); daraus findet man $x = 80$ und $x^1 = 160$. Das heißt, die gesammte Wärmemenge ist also in jedem dieser Körper = 160 mal der spec. Wärme, oder : die ganze in ihnen enthaltene Wärme wird durch Erkaltung auf - 160° ausgetrieben. Also müsse - 160° der absolute Nullpunkt sein.

Person geht sodann über zur detaillirten Mittheilung seiner Versuche mit Metallen. Die Resultate weichen

(1) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 129.

Ueber specifische Wärme, Schmelzpunkt und latente Schmelzwärme.

sehr nahe = C. Die Berechnung von k gilt für eine Temperatur, die eben so weit unter 220° ist, als diejenige über 220° ist, für welche die Berechnung von K gilt; es gestattet dies den Schluss, die spec. Wärme der flüssigen Legirungen und die der darin enthaltenen Metalle für sich (diese als ein Gemenge im Gegensatz zur eigentlichen Legirung gedacht seien bei derselben Temperatur gleich groß.

Legirung.	k	K	$\frac{1}{2}(k+K)$	C
Bi, Pb, Sn, . . .	0,0356	0,04256	0,03908	0,03895
Bi, Pb Sn, . . .	0,03785	0,04447	0,04116	0,04219
Bi, Pb,	0,03106	0,03784	0,03444	0,03503
Bi, Sn,	0,0415	0,04792	0,04447	0,04540

Bei der Mischung geschmolzener Metalle findet nach Person eine Temperaturerhöhung statt; wenn er in geschmolzenes Blei eine Glasröhre mit geschmolzenem Wismuth tauchte, dann durch Zerschneiden des Glases rasch eine Mischung bewerkstelligte, zeigte sich eine Temperaturerhöhung bis zu 30°. Person glaubt nicht, daß diese Wärmeausscheidung chemischer Effect sei, sondern in geschmolzener Legirung sei weniger Wärme enthalten, als in den geschmolzenen Bestandtheilen für sich bei gleicher Temperatur. Um eine Gewichtseinheit Pb, Bi, von 20° auf 330° zu erwärmen, müssen nach seinen Bestimmungen 15,748 Wärmeinheiten hinzutreten; um eben so viel der in der Legirung enthaltenen Metalle, diese abgesondert gedacht, eben so stark zu erwärmen, 19,570 Wärmeinheiten. Die Differenz werde bei dem Uebergang der Metalle in die Legirung frei. Für andere Legirungen (Wismuth mit Blei und Zinn, und namentlich Wismuth und Zinn) giebt die Rechnung geringere Differenzen, und die Beobachtung zeigt hier entsprechend geringere Temperaturerhöhung. Person schließt weiter, die latente Schmelzwärme der legirten Metalle sei kleiner als die der Metalle für sich.

Er zeigt ferner, daß diejenigen Legirungen, welche nicht (wie Rudberg zuerst beobachtete) einen Ausscheidungspunkt haben, d. h. nicht erst Einem, dann erst einem an-

dem Theil nach fest werden, sondern Einen festen Erstarrungspunkt haben, — dafs diese nach dem Erstarren eine Zersetzung erleiden (1). Die Legirung $\text{Bi}_3 \text{Pb}_2 \text{Sn}_2$ kühlt sich, fest geworden, bis 57° ruhig ab, dann wird das Thermometer stationär oder steigt selbst, und die Legirung dehnt sich aus und sprengt das Gefäfs, in dem sie enthalten ist, falls es von Glas oder dünnem Metall ist. In Wasser gegossene Legirung zeigt die Erwärmung erst bei niedrigerer Temperatur, sie kann aber dann 30 und mehr Grade betragen. Die Legirung enthält, nach dem Schmelzen erstarrt, einige Grade unter dem Erstarrungspunkt (vor der Wärmeausscheidung) eine gröfsere Wärmemenge und er giebt bei dem Versuche eine gröfsere spec. Wärme, als wenn sie nach völligem Erkalten (und der Wärmeausscheidung) wieder bis zu demselben Grade erhitzt wird. Unter den ersteren Umständen wurde der erste, unter den letzteren die andern Versuche in der folgenden Tabelle mit $\text{Bi}_3 \text{Pb}_2 \text{Sn}_2$ (Schmelzpunkt 96°) angestellt. Diese Versuche zeigen übrigens, dafs bei dem Erhitzen schon unter dem Schmelzpunkt Wärme gebunden wird, wahrscheinlich unter Vereinigung der Ausscheidungsproducte, die sich bei dem Abkühlen in niedrigerer Temperatur bilden. (T bedeutet den Schmelzpunkt, c die specifische Wärme, Δ das Temperaturintervall, für welches sie bestimmt wurde, k die spec. Wärme, wie sie sich aus der der Bestandtheile berechnet; für weitere Abstände vom Schmelzpunkt stimmen c und k überein.)

Ueber specifische Wärme, Schmelzpunkt und latente Schmelzwärme.

Legirung	Δ	c	Legirung	T	Δ	c	k
$\text{Bi}_3 \text{Pb}_2 \text{Sn}_2$	$95^\circ \text{ u. } 25^\circ$	0,1054	$\text{Bi}_3 \text{Pb}_2$	$122^\circ, 4$	$99^\circ \text{ u. } 17^\circ$	0,0317	0,0311
"	95 " 28	0,0710	"	"	99 " 16	0,0316	"
"	94 " 22	0,0690	$\text{Bi}_3 \text{Sn}_2$	135,3	99 " 17	0,0450	0,0415
"	82 " 14	0,0598	Bi Pb Sn_2	145 ?	53 " 17	0,0429	0,0401
"	51 " 19	0,0374	"	"	51 " 19	0,0417	"
"	51 " 12	0,0377					

Person hat sich weiter bemüht, für einige Legirungen sowohl die latente Schmelzwärme als auch die Wärme zu

(1) Vorläufige Nachricht hierüber : *Compt. rend.* XXV, 444; *Pogg. Ann.* LXXIII, 472.

Ueber specifische Wärme, Schmelzpunkt und latente Schmelzwärme.

bestimmen, welche nach dem Erstarren bei der Zersetzung frei wird. Er findet

für Bi, Pb, Sn, erstere = 4,50, letztere = 3,15
Bi, Pb, Sn, „ „ 4,69, „ „ 2,8

Er bespricht endlich noch in dieser Abhandlung von Rudberg aufgestellte Ansicht (vergl. Seite 70), den Zusammenhang zwischen den Schmelzpunkten von Legierungen und ihren Bestandtheilen. Er berücksichtigt nicht, daß man zur Zeit Rudberg's fast allgemein Wismuth ein anderes Atomgewicht beilegte, als und daß sonach die von Rudberg durch Formeln ausgedrückten Wismuthlegierungen eine andere Zusammensetzung haben, als er ihnen beilegt; seine Bemerkungen, daß Rudberg an einigen Legierungen gewisse Eigenschaften übersehen habe, sind deshalb ungegründet. Ueberbringt Person mehrere Bestätigungen für Rudberg's Ansicht. Nach des ersteren Bestimmungen sind die Schmelzpunkte

Für Bi=266°,8	Sn=232°,7	Sn=232°,7	Pb=326°,2	Bi=266°,8	Pb=326°,2
B, Sn, =135,3	135,3	Sn, Pb=182,8	182,8	Bi, Pb, =122,4	122,4
131,5	97,4	49,9	143,4	144,4	
Es ist 3 . 131,5 =	394,5	Es ist 3 . 49,9 =	149,7	Es ist 3 . 144,4 =	
4 . 97,4 =	389,6			2 . 203,8 =	

Die Person'schen Resultate in der zweiten Zusammenstellungen stimmen in allen Einzelheiten gut mit den von Rudberg für dieselben Substanzen gemachten Angaben.

Schmelzpunkt, spec. Wärme u. latente Wärme d. Phosphors.

Desains (1) bestimmte den Schmelzpunkt des Phosphors zu 44°,2; nach Beobachtungen der Erhaltung von festem und von geschmolzenem (unter dem Schmelzpunkt noch flüssigem) Phosphor hält er die spec. Wärme dieses Körpers in beiderlei Zuständen für gleich (im Widerspruch mit Person, vergl. Seite 79), und bestimmt nach der Erhaltungsmethode zu 0,2. Die latente Schmelzwärme bestimmte er aus der Temperaturerhöhung, v

(1) Compt. rend. XXIII, 149; Instit. 1846, 247; Arch. ph. 409; Ann. ch. phys. [3] XXII, 432; Pogg. Ann. LXX, 315.

unter den Schmelzpunkt erkalteter flüssiger Phosphor bei dem Erstarren zeigte, zu 5,4, nach der Mengungsmethode zu 5,06.

Woestyn (1) hat [unbekannt mit den früheren Untersuchungen Schröder's (2)] den Zusammenhang zwischen der spec. Wärme von Verbindungen und derjenigen ihrer Bestandtheile untersucht. Er stellt als Gesetz auf: Wenn A das Atomgewicht und C die spec. Wärme einer Verbindung bedeuten, a_1, a_2, a_3, \dots die Atomgewichte (3) und c_1, c_2, c_3, \dots die spec. Wärmen der darin enthaltenen Elemente, n_1, n_2, n_3 die Zahlen, welche angeben, wie viel Atome jedes Elements in einem Atome der Verbindung enthalten sind, so sei

$$AC = n_1 a_1 c_1 + n_2 a_2 c_2 + n_3 a_3 c_3 + \dots$$

Zur Beweisführung vergleicht er (mit Zugrundelegung der von Regnault gefundenen Resultate) die für mehrere Verbindungen und Legirungen berechneten Werthe von AC mit den empirisch gefundenen. Aus dem Gesetz folgt weiter, daß, wenn man die Formeln und die Werthe für AC von Verbindungen von einander abzieht, für dieselben Differenzen der Formeln auch gleiche Differenzen der Werthe AC sich ergeben müssen. Endlich läßt sich auf Grund dieses Gesetzes das Produkt aus der spec. Wärme und dem Atomgewicht für einen Bestandtheil einer Verbindung finden, wenn dies Produkt für die Verbindung und für die andern Bestandtheile bekannt ist. Die von Woestyn zur Begründung des Gesetzes und dieser Folgerungen mitgetheilten Rechnungen ergaben Resultate, welche mit den Beobachtungen, respective unter sich, recht genügend übereinstimmen.

(1) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 295; Pogg. Ann. LXXVI, 129; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 175. — (2) Pogg. Ann. LII, 269. — (3) Die Atomgewichte mehrerer Elemente (Sb, Bi, Ag, K, Na, Cl, Br, J, N) nimmt Woestyn halb so groß, als ihr Aequivalentgewicht, wie dieß auch Regnault in seinen Arbeiten über specifische Wärme vorgezogen hat.

Spec. Wärme
des Wassers
bei verschie-
denen Tempe-
raturen.

Regnault (1) hat die spec. Wärme des Wassers bei verschiedenen Temperaturen genauer bestimmt. Aus seinen Versuchen geht hervor, daß die Quantität Wärme Q , welche 1 Gewichtseinheit Wasser von T° bei dem Erkalten auf 0° verliert, in Wärmeeinheiten ausgedrückt ist durch

$$Q = T + 0,00002 T^2 + 0,0000003 T^3$$

und die spezifische Wärme C des Wassers bei T° durch

$$C = 1 + 0,00004 T + 0,0000009 T^2$$

nach welchen Formeln sich folgende zusammengehörige Werthe ergeben.

T	Q	C	T	Q	C	T	Q	C
0°	0,000	1,0000	100°	100,500	1,0130	200°	203,200	1,0130
50	50,087	1,0042	150	151,462	1,0262	230	234,708	1,0410

Spec. Wärme
verschiedener
Flüssigkeiten.

H. Kopp (2) hat die spec. Wärme folgender Flüssigkeiten bestimmt (die dritte Columnne giebt an, innerhalb welcher Temperaturen) :

Quecksilber . .	0,0332	44° u. 24°	Ameisenäther .	0,513	39° u. 2
Holzgeist . .	0,645	43 " 23	Essigholzäther .	0,507	41 " 2
Alkohol . .	0,615	43 " 23	Essigäther . .	0,496	45 " 2
Fuselalkohol .	0,564	44 " 26	Butterholzäther.	0,487	45 " 2
Ameisensäure .	0,536	45 " 24	Valerianholzäther	0,491	45 " 2
Essigsäure . .	0,509	45 " 24	Aceton . . .	0,530	41 " 2
Buttersäure . .	0,503	45 " 21	Benzol . . .	0,450	46 " 1
Schwefelsäure .	0,343	46 " 21	Senföl . . .	0,432	48 " 2

Andrews (3) bestimmte die spec. Wärme des Broms zwischen 45 und 11° zu 0,107.

Spec. Wärme
von Gasen.

Favre und Silbermann (4) haben einen Apparat beschrieben, die spec. Wärme von Gasen unter verschiedenem Druck zu bestimmen. Die damit erhaltenen Resultate werden sie später mittheilen.

(1) Relation etc. (vgl. S. 70), 729. — (2) Pogg. Ann. LXXV, im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 177. — (3) Chem. Soc. Qu. J. 18; Pogg. Ann. LXXV, 335; Pharm. Centr. 1848, 702. — (4) Compt. rend. XXVII, 56.

Regnault (1) hat ausgedehnte Versuche über die latente Wärme des Wasserdampfes angestellt, namentlich über die Gröfse derselben bei gesättigtem Dampf unter verschiedenem Druck. Zwei Ansichten waren in dieser Beziehung früher aufgestellt worden. Watt behauptete, die Quantität Wärme, welche man der Gewichtseinheit Wasser von 0° zuführen müsse, um sie in Dampfzustand unter irgend einem Druck zu versetzen, sei stets dieselbe; d. h. die Summe der latenten und der durch das Thermometer angezeigten Wärme im gesättigten Wasserdampf sei, unabhängig von der Temperatur desselben, eine constante. Southern behauptete im Gegentheil, diese Summe sei nach der Temperatur veränderlich, insofern sie ausgedrückt sei durch die am Thermometer angezeigte Wärme des Wasserdampfes (seine Temperatur) und seine latente Wärme, welche letztere constant sei. Also nach Watt ist für gesättigten Wasserdampf bei jeder Temperatur die Gesamtmenge der darin enthaltenen Wärme gleich grofs, nach Southern die latente Wärme.

Sieden:
latente
Dampfwärme
des Wassers.

Regnault fand, dafs die Erfahrung keine dieser beiden Ansichten bestätigt. Seine Versuche ergeben, dafs 1 Gewichtseinheit gesättigter Dampf von T° eine Wärmemenge $\lambda = 606,5 + 0,305 T$ (in Wärmeeinheiten) mehr besitzt, als 1 Gewichtseinheit Wasser von 0° . Zieht man von λ ab die Wärmemenge, welche 1 Gewichtseinheit Wasser von T° mehr enthält, als 1 Gewichtseinheit Wasser von 0° (und welche jetzt aus Regnault's Arbeiten über die spec. Wärme des Wassers bei verschiedenen Temperaturen genauer bekannt ist), so erhält man L , die latente Verdampfungswärme des Wassers für T° . Es sind für gesättigten Wasserdampf von der Temperatur T° und der entsprechenden Spannkraft E in Millimetern oder Atmosphären die Werthe für λ und L nach Regnault's Bestimmungen :

(1) Relation etc. (vgl. S. 70), 635 ss., 748.

Latente
Dampfwärme
des Wassers.

T	E		λ	L	T	E		λ	L
	mm	atm.				mm	atm.		
0°	4,60	0,006	606,5	606,5	150°	3581,23	4,712	652,2	500,7
50	91,98	0,121	621,7	571,6	200	11688,96	15,380	667,5	464,3
100	760,00	1,000	637,0	536,5	230	20926,40	27,535	676,6	441,9

Pouillet (1) hat die latente Verdampfungswärme hauptsächlich von dem theoretischen und mathematischen Gesichtspunkt aus betrachtet, und diese Betrachtungen mit früheren Versuchen anderer in Verbindung gebracht. Ein Auszug aus dieser Abhandlung ist nicht wohl zu geben, ebensowenig aus einer Notiz von Lubbock (2) über die Wärme der Dämpfe. Wir heben hier nur hervor, daß auch Pouillet zu dem Resultate kommt, gesättigter Wasserdampf enthalte eine um so größere Gesamtwärmemenge und habe eine um so kleinere latente Wärmemenge, je höher die Temperatur ist; bei Kohlensäuredampf nehme im Gegentheil die Gesamtwärmemenge ab mit dem Steigen der Temperatur, und ebenso verhalte sich der Dampf des condensirten Stickoxyduls. Die latente Wärme des Wasserdampfs bei 0° fand er = 560 (von Regnault's genauerer Bestimmung stark abweichend).

Latente
Dampfwärme
verschiedener
Körper.

Andrews (3) hat die latente Dampfwärme und mehrere andere Eigenschaften einiger Flüssigkeiten untersucht. Die zu untersuchende Flüssigkeit wurde in einem kleinen Kolben zum Sieden gebracht, dessen Hals in eine Vorlage mit aufwärtsgehendem Schlangenrohr (beides von Glas) mündete, welche beide in einem Gefäß mit Wasser sich befanden. Die Temperaturzunahme des letztern wurde ermittelt, die Quantität des Dampfs, welcher die Temperaturzunahme hervorgerufen hatte, durch Wägung der Vorlage vor und nach dem Versuch bestimmt. Ein Schirm schützte das Gefäß mit Wasser vor Erwärmung von dem Kolben her. Die nöthigen Correctionen für Wärmeverlust des Wassers wäh-

(1) Compt. rend. XXIV, 915; Pogg. Ann. Ergänzungs-Bd. II, 579. —

(2) Phil. Mag. [3] XXXI, 90. — (3) Chem. Soc. Qu. J. I, 27; Pogg. Ann. LXXV, 501; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 696.

Latente Dampfwärme. wärme $L = (160 + T) d$. Er berechnet d für mehrere Substanzen, deren Siedepunkt T , deren spezifische Wärme im flüssigen Zustand und deren latente Dampfwärme bekannt ist, bezieht aber L und d hier nicht auf Gewichtseinheiten, sondern auf Atomgewichte (für welche er die Formeln so annimmt, daß sie zwei Volumen im Dampfzustand entsprechen, und wo er $O = 1$, $H = 0,125$, $C = 0,75$ u. s. w. setzt); die Columnne G. W. giebt die Gesamtwärme, welche bei dem Siedepunkt in Einem Atomgewicht Dampf enthalten ist [d. i. $(160 + T) \cdot A \cdot c + L$, wenn A das Atomgewicht, c die spec. Wärme im flüssigen Zustand bedeutet].

Substanz.	T	L	G.W.	d	Substanz.	T	L	G.W.	d
Aether . . .	35°,7	426	898	2,17	Terpenthinöl	156°,8	653	1764	2,06
Schwefelkohlenst.	46°,6	502	719	2,42	Schwefel . .	316°,0	724	1392	1,52
Holzgeist . . .	66°,5	582	866	2,56	Schwefelsäure	326°,0	748	1791	1,53
Alkohol . . .	78°,8	597	1024	2,50	Quecksilber.	350°,0	775	988	1,52
Wasser . . .	100°,0	602	892	2,31					

Er findet, daß sich d wenig und regelmäsig ändere, und daß die Gesamtwärme für mehrere Dämpfe, welche in Beziehung auf Zusammensetzung und Temperatur sehr verschieden sind, nahe dieselbe sei.

Person hatte schon 1843 behauptet, daß die latente Dampfwärme gleich sei für Substanzen von gleichem Siedepunkt, und bei den übrigen Körpern mit den Siedepunkten sich ändere. Er führte zur Unterstützung dieser Behauptung später (1) eine Reihe von Substanzen an, für welche ihm Favre und Silbermann Siedepunktsbeobachtungen mitgeteilt haben. Die Formeln und Atomgewichte beziehen sich auf die im zunächst vorherstehenden angegebenen Annahmen.

(1) Compt. rend. XXIII, 524; Instit. 1846, 302; Pogg. Ann. LXX, 386; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 185.

Substanz.	Zusammen- setzung.	Siedepunkt.	Latente Wärme	
			Für das Atomgewicht.	Für die Gewichtseinh.
Aether	$C_4 H_{10} O$	35°,6	421,3	91,1
Holzgeist	$C_2 H_5 O$	66°,5	527,7	263,8
Essigäther	$C_4 H_8 O_2$	74°,0	582,0	105,8
Alkohol	$C_2 H_5 O$	78°,4	598,8	208,3
Butterholzäther	$C_8 H_{16} O_2$	93°,0?	556,5	87,3
Wasser	HO	100	603,0	536,0
Ameisensäure	$C_2 H_4 O_2$	100°,0	694,0	120,7
Amyloxyd	$C_{10} H_{22} O$	113°,0	685,0	69,4
Essigsäure	$C_2 H_4 O_2$	120°,0	382,0	101,9
Fuselalkohol	$C_4 H_{10} O$	132°,0	606,8	121,4
Terpenthinöl	$C_{10} H_{18}$	156°,0	584,0	68,7
Tereben	$C_{10} H_{14}$	156°,0	571,0	67,2
Citronenöl	$C_{10} H_{18}$	165°,0	595,0	70,0
Buttersäure	$C_4 H_8 O_2$	164°,0	632,0	114,9
Valeriansäure	$C_5 H_{10} O_2$	175°,0	660,0	103,5
Kohlenwasserstoff	$C_{12} H_{22}$	198°,0	629,0	59,9
Kohlenwasserstoff	$C_{12} H_{22}$	255°,0	783,0	59,7
Aethylalkohol	$C_2 H_5 O$	360°,0?	884,0	58,4

Im Allgemeinen nehme die latente Wärme (für das Atomgewicht) zu wie der Siedepunkt; die Ausnahmen erklärt Person in folgender Weise. Bei der Essigsäure wirke der Umstand ein, daß die angenommene Formel bei dem Siedepunkt nicht genau 2 Volumen Dampf entspreche (er erinnert an die von Cahours und Bineau ermittelte Veränderlichkeit der Dampfdichte dieser Säure). Dasselbe gelte für die Buttersäure, und wohl auch für den Butterholzäther (letzteres schwerlich; die Veränderlichkeit der relativen Dampfdichte mit der Temperatur ist bei Aetherarten keineswegs gefunden worden). Die Ameisensäure habe Wasser enthalten. Für das Terpenthinöl erhalte man ein passendes Resultat, wenn man die latente Wärme für die Gewichtseinheit nach Despretz = 76,8 setze. — Im Allgemeinen befolge die latente Dampfwärme die Reihenfolge der Siedepunkte.

L. Smith (1) hat darauf aufmerksam gemacht, daß Wasser im luftleeren Raum auch ohne Gegenwart von Sub-

(1) Sill. Am. J. [2] I, 265; Pogg. Ann. LXX, 174; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 185.

stanzen, welche den Wasserdampf absorbiren, zum Gefrieren gebracht werden kann, wenn es sich in einem Gefäße befindet, dessen Inneres mit einer Rufsschicht überzogen ist.

Sphäroidaler
Zustand.

Boutigny (1) giebt für die Erscheinung, welche früher meistens als Leidenfrost'scher Versuch bezeichnet wurde, folgende Definition : Ein auf eine heiße Fläche gebrachter Körper ist im sphäroidalen Zustand, wenn er abgerundete Form annimmt, und sich auf jener Fläche außerhalb der Sphäre physikalischer und chemischer Thätigkeit hält; dann reflectirt er die strahlende Wärme, und seine Moleküle sind in Beziehung auf die Wärme in stabilem Gleichgewicht, d. h. seine Temperatur ist unveränderlich oder nur innerhalb enger Grenzen wechselnd.

Mittelst einer Mischung von Aether und condensirter Kohlensäure, welche in einem glühenden Platintiegel sich im sphäroidalen Zustande befand, brachte Faraday (2) Quecksilber in wenigen Secunden zum Gefrieren. Ein seltsamer Versuch, wo Quecksilber aus einem rothglühenden Tiegel gefroren heraus kommt.

Moritz (3) hat angegeben, daß der sphäroidale Zustand des Wassers auch auf Glas leicht hervorgebracht werden kann, wenn man siedendes Wasser auf das erhitzte Glas bringt.

Stossen bei
dem Sieden.

Die Beobachtung, daß von Luft befreite Flüssigkeiten bis über ihren Siedpunkt sich erhitzen lassen, ohne zu sieden, hatte Donny (4) zu der Ansicht geführt : die Flüssigkeiten besäßen eine ungleich stärkere Cohäsion, als man ihnen zuschreibe; Dampfbildung gehe nur an der Oberfläche von Flüssigkeiten, oder wo sich eine Luftblase in ihnen vorfinde, vor sich; der Siedepunkt sei abhängig von der Menge absorbirter Luft; wenn wenig Luft mehr in der Flüssigkeit enthalten sei, und nur in längeren Zwischen-

(1) Compt. rend. XXVI, 320; J. chim. méd. [3] V, 3. — (2) Ann. ch. phys. [3] XIX, 383; Pogg. Ann. LXX, 580; J. pr. Chem. XL, 374. — (3) Pogg. Ann. LXXII, 112. — (4) Ann. ch. phys. [3] XVI, 167; Pogg. Ann. LXVII, 562.

räumen eine solche Blase und damit Dampf sich bilde, trete Stoßen bei dem Sieden. das sogenannte Stoßen bei dem Sieden ein. Louyet (1) bestreitet diese Ansichten und sucht die Erklärung dafür, daß sich manchmal Flüssigkeiten bis über ihren Siedepunkt erhitzen lassen und dann mit Stoßen sieden, in größerer Attraction der Gefäßwände zu der Flüssigkeit.

Redwood (2) empfiehlt den Gebrauch inwendig mit Silber oder Platin überzogener Glasgefäße zur Destillation solcher Substanzen, welche leicht mit Stoßen sieden.

Es ist bekannt, daß einige Körper, z. B. Borsäure, Verflüchtigung fester Substanzen mit Wasserdampf. welche an sich sehr feuerbeständig sind, in einer Flüssigkeit aufgelöst bei dem Erhitzen sich mit den Dämpfen des Lösungsmittels verflüchtigen. Larocque (3) hat gefunden, daß dies für eine große Anzahl von Körpern der Fall ist.

H. Kopp (4) hat darauf aufmerksam gemacht, daß die Beziehungen zwischen Zusammensetzung und Siedepunkt. Siedepunkte analoger Chlor- und Bromverbindungen um 32° , $2 \cdot 32 = 64^\circ$ oder $3 \cdot 32 = 96^\circ$ verschieden sind, je nachdem 1, 2 oder 3 Atome Chlor in der einen durch Brom in der andern vertreten sind.

Babo (5) hat die Spannkraft der Dämpfe von Salzlösungen mit der von Wasserdampf verglichen. Bei der Temperatur, wo eine Salzlösung siedet, und der aus ihr sich entwickelnde Dampf also dem Druck einer Atmosphäre das Gleichgewicht hält, hat Wasserdampf eine höhere Spannkraft; Babo hat untersucht, welcher Zusammenhang zwischen der Differenz dieser beiden Größen und der Menge des Salzgehalts stattfindet. Er fand, daß für eine Zunahme dieser Differenz nach einer geometrischen Reihe auch die Salzmengen, welche zu 100 Gewichtstheilen Wasser gesetzt die betreffenden Lösungen bilden, eine geometrische Reihe befolgen (die Siedepunkte der Salzlösungen von verschiedener Concentration entnahm er aus Legrand's Angaben,

(1) *Justit.* 1848, 294. — (2) *Pharm. J. Trans.* VIII, 78. — (3) *J. pharm.* [3] XIV, 345. — (4) *Ann. Ch. Pharm.* LXVII, 356; *Pharm. Centr.* 1849, 128. — (5) Ueber die Spannkraft des Wasserdampfs in Salzlösungen, Freiburg i. B. 1847.

Beziehungen
zwischen
Zusammen-
setzung und
Siedepunkt.

welche er bei verschiedenen Controllversuchen richtig fand). Zur Verdeutlichung geben wir folgende Tabelle, wo A den Siedepunkt einer Salzlösung bei 760^{mm}, die auf 100 Wasser C Chlorcalcium enthält, B die dieser Temperatur zugehörige Spannkraft des Wasserdampfs (in Atmosphären zu 760^{mm}) bedeutet.

A	B	C	
		beobachtet	berechnet
102°,5	1,1	19,05	19,05
105 ,1	1,2	29,72	29,09 = 19,05 × 1,526
110 ,0	1,4	44,0	44,42 = 19,05 × 1,526 ³
117 ,7	1,8	66,7	67,84 = 19,05 × 1,526 ³
129 ,7	2,6	103,67	103,59 = 19,05 × 1,526 ⁴
146 ,5	4,2	157,95	158,19 = 19,05 × 1,526 ⁵

Die Menge Salz ist also durch $S \times F^n$ ausdrückbar, die mit 100 Wasser eine bei derjenigen Temperatur siedende Lösung giebt, bei welcher die Elasticität des Wasserdampfs $= 1 + (0,1 \times 2^n)$ Atmosphären ist. Babo hat die Gröfsen S und F für folgende Salze (alle wasserfrei gedacht) ermittelt :

	S	F		S	F
Chlorcalcium	19,05	1,526	Salpeters. Kali	34,30	2,31
Chlorstrontium	28,65	1,55	„ Natron	23,45	1,999
Kohlens. Kali	28	1,55	„ Kalk	33	1,58
Essigs. Kali	24,30	1,73	„ Ammoniumoxyd	25,9	2,083

Nach ihm findet ein Zusammenhang zwischen den Gröfsen F und den spec. Volumen der Salze statt, insofern die Werthe $F^{1,7}$ den spec. Volumen nahezu proportionirt seien.

Für niedrigere Temperaturen als die Siedepunkte fand Babo, dafs bei Chlorcalciumlösungen von verschiedener Concentration die Verminderung der Dampfelasticität immer in demselben Verhältnifs stattfindet; eine Chlorcalciumlösung z. B., welche bei der Temperatur 118° siedet, wo die Spannkraft des Dampfes von reinem Wasser = 1,8 Atmosphären ist, scheint bei jeder Temperatur Dampf von der 1,8 mal kleineren Spannkraft als reines Wasser zu geben. Für die Lösungen anderer Salze findet eine solche einfache Beziehung nicht statt. Wir geben hier noch Babo's Bestim-

mungen für die Spannkraft des Dampfs aus Chlorcalciumlösung A (Siedepunkt 118°), B (110°), C (105°), in Millimetern ausgedrückt, für verschiedene Temperaturen :

	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°
A . .	28	38	49	62	79	100	123
B . .	38	50	65	81	103	127	159
C . .	—	58	76	97	125	150	188

Farey (1) theilt folgende Resultate von Messungen von Dampfelasticitäten mit, welche Southern, ein in der Maschinenfabrik Watt's beschäftigter Mathematiker, im Jahr 1814 erhalten hatte :

Spannkraft
der
Dämpfe.

Atmosphäre.	Druck in engl. Zollen		Temperatur° C.
	Quecksilber.		
1	29,8	100	
2	59,6	121,25	
4	119,2	145,2	
8	238,4	173,1	

Alexander (2) giebt eine Interpolationsformel für die Spannkraft des Wasserdampfs :

$$p = \left(\frac{t}{180} + \frac{990}{1695} \right)^6$$

worin p die Spannkraft in engl. Zollen, t die Temperatur nach Fahrenheit, 180 den bekannten Fundamentalabstand dieser Thermometerscale, 990 die latente Dampfwärme, 1695 die Volumvergrößerung beim Uebergang von Wasser in Dampf bedeutet. — Die Formel paßt ziemlich gut, für niedere Temperaturen sowohl als für höhere; die theoretische Ableitung derselben jedoch ist unverständlich und ohne Werth. Die Form des Ausdrucks ist keineswegs neu, da sie im Wesentlichen mit den Formeln von Young (3), Coriolis (4), Tredgold (5), Mellet (6), Spasky (7) und Dulong (8)

- (1) Phil. Mag. [3] XXX, 113. — (2) Sill. Am. J. [2] VI, 210; Phil. Mag. [3] XXXIV, 1 und 98. — (3) Pogg. Ann. XXVII, 21. — (4) Gehler's phys. Wörterb. X, 1065. — (5) Pogg. Ann. XXVII, 22. — (6) Pogg. Ann. XXVII, 22. — (7) Pogg. Ann. XXX, 333. — (8) Pogg. Ann. XVIII, 437; XXVII, 23.

Spannkraft
der
Dämpfe.

übereinstimmt. — Alexander hat zum Behufe der Vergleichung mit seiner Formel die Messungen von Watt (1774), Robison (1778), Betancourt (1790), Southern (1797 — 1803), Dalton (1801 und 1820), Ure (1818), Arzberger (1819), Taylor (1822), der französischen Akademiker (1829), des Franklin Instit. (1836) und von Regnault (1844) in einer Tafel zusammengestellt.

Shortrede (1) hat eine kritische Arbeit bezüglich der verschiedenen Formeln für die Spannkraft der Wasserdämpfe geliefert. Er selbst giebt eine Formel, ganz ähnlich der von Magnus; für die Temperaturen des Quecksilberthermometers und den Atmosphärendruck von 0,76^m als Einheit nämlich $\log A = 5 - \frac{1625}{225 + t}$ für die hunderttheilige Scale, oder $\log A = 6,47712125 - \frac{2925}{373 + t}$ für die Fahrenheit'sche Scale und die Elasticität in englischen Zollen Quecksilber.

Faraday hatte an Blattgold, welches sich unter 0° über Quecksilber befand, keine Veränderung bemerkt, und daraus geschlossen, dafs sich bei dieser Temperatur keine Quecksilberdämpfe mehr bilden. G. Karsten nahm wahr (2), dafs Quecksilber noch unter 0° auf einer darüber befindlichen Daguerreotypplatte das Lichtbild zum Vorschein bringt, und also bei dieser Temperatur noch verdunstet.

Thaubildung.

Melloni (3) hat — veranlaßt durch ein Ankämpfen gegen die Theorie der Thaubildung von Wells, welches, andern Orts längst aufgegeben, in Italien noch hier und da fortzudauern scheint — jene Theorie einer Revision unterworfen und sie nicht nur in allem Wesentlichen bestätigt, sondern auch mit einigen genaueren Bestimmungen und eignen Ansichten bereichert. — Sein Apparat bestand aus drei übereinstimmenden Thermometern, deren Behälter mit fingerhutartigen glattpolirten Gefäfsen von Silber umgeben waren, während Cylinder von Weifsblech die Stiele

(1) Instit. 1848, 220. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 245. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXI, 145; XXII, 129, 467; Compt. rend. XXIV, 530, 641; XXV, 499; Pogg. Ann. LXXI, 416; LXXIII, 467.

der Thermometer, welche die Theilung trugen, umschlossen. Die Metallhülle des einen Thermometers war beruſt, die der beiden andern waren blank; die Instrumente wurden in drei nach oben konisch sich erweiternde Büchsen von Weißblech, welche auf dünnen Metallfüßen ruhten, durch eine seitliche Oeffnung in horizontaler Lage eingeschoben. So lange die drei Büchsen oben mit Deckeln verschlossen waren, zeigten die Thermometer eine gleiche Temperatur; wurden dagegen die Deckel über dem beruſten und dem einen metallischen Thermometer weggenommen, so sank die Temperatur des letzteren um $0^{\circ},108$, die des beruſten dagegen um $3^{\circ},581$, ein offener Beweis, daß die Strahlung, nicht die Berührung mit der äußeren Luft, die Ursache der Temperaturdifferenz ist.

Melloni fand, daß die Strahlung gegen einen kreisförmigen Raum von 30° bis 35° scheinbarem Halbmesser, vom Zenith aus gerechnet, am Stärksten ist, indem die Unterschiede der Thermometer sehr klein werden und verschwinden, wenn man die Axen der Blechbehälter der Horizontalen nähert, oder wenn Wolken jenem Theile des Himmels sich nähern und ihn überziehen.

Stets ging die Abkühlung der Bethauung voran, und die geringe Strahlung der Metalle erklärt vollkommen, warum sich dieselben nicht bethauen. Folgender Versuch beweist dies unwiderleglich. Eine Weißblechscheibe wurde einerseits auf ihrem centralen Theile gefirnist, und in einigem Abstände darüber an derselben Axe ein blankes Metallplättchen befestigt, welches von dem gefirnistem Theile noch einen Ring frei ließ, das Ganze dann in einer heitern windstillen Nacht senkrecht aufgestellt. — Der Thau, welcher sich auf dem freien befirnistem Theile alsbald absetzte, verbreitete sich nach dem blanken metallischen Rande hin, mehr als nach dem geschützten centralen Theile welcher sich nur durch Leitung abkühlen konnte. Genau dieselben Erscheinungen wiederholten sich auf der

Thaubildung. untern, dem Boden zugekehrten blanken Seite der Metallscheibe; auch hier blieb der centrale Theil trocken. Die obere Metallplatte, welche blank polirt war, beschlug sich gar nicht mit Thau. Dieser einfache Versuch umfaßt alle Verhandlungen der Physiker über den Ursprung des Thaues, insofern er zeigt, daß der Thau weder von Oben herabfällt, noch von unten aufsteigt, und daß die Metalle keineswegs eine eigenthümliche abstoßende Kraft auf den Wasserdampf äußern (1).

Melloni bemerkt, daß er zwischen der Temperatur der ausstrahlenden Körper und derjenigen der umgebenden Luft nie größere Unterschiede als 1° bis 2° gefunden, und daß Wilson und Wells solche von 7° bis 8° nur darum beobachtet hätten, weil sie die Thermometer in sehr ungleichem Abstände vom Boden anbrachten. Bei einer so geringen Differenz von 2° bedarf es freilich eines besondern Nachweises, wie hierdurch eine Verdichtung des Wasserdampfs und reichliche Bethauung herbeigeführt werden könne, und es ist nöthig die Theorie unter einem etwas veränderten Gesichtspunkt aufzufassen. Melloni bemerkt zuvörderst, daß jene Temperaturdifferenz zwischen den ausstrahlenden Körpern und der umgebenden Luft von der Temperatur dieser letztern unabhängig sei, und führt zum Beleg Beobachtungen von Parry und Scoresby sowie von Pouillet an. Eigne Beobachtungen mit Thermometern, deren Gefäße mit Baumwolle und Wolle in verschieden dichtem Zustande umwickelt waren, ergaben die stärkste Temperatursenkung, wenn die Hülle am Lockersten war. Es ist hier die zwischen den Fasern beharrende und abgekühlte Luftschichte,

(1) Zantedeschi bestreitet übrigens das Resultat des angeführten Versuches und behauptet, er habe die obere Scheibe, auch den gefirniften Theil, jedesmal bethaut gefunden, wenn der Thau sich überhaupt in der betreffenden Nacht bis zur Höhe der Scheibe erhoben habe; Z. vertheidigt die Entstehung des Thau's aus den vom Boden ausgehauchten Wasserdämpfen (Arch. ph. nat. VII, 59. Delle alterazioni fatte dal Sign. Melloni alle dottrine sulla rugiada e sulla brina dei Sign. Fusiniere et Zantedeschi; L'ipotesi di Wells; in Raccolta fisico-chimica italiana, III.).

welche eine weitere Abkühlung des Thermometers beginnt. Dasselbe aber gilt für die Luft, welche in der Nähe der Erdoberfläche zwischen der dichten Vegetation sich aufhält, und es ist darum, um den Zustand der Sättigung mit Wasserdampf herbeizuführen, keineswegs eine so große Temperaturdifferenz zwischen den ausstrahlenden Gewächsen und der umgebenden Luft nöthig, wie man sie seither in allen Lehrbüchern der Naturlehre angenommen hat. Es erklärt sich, warum die Bethauung so reichlich und allgemein verbreitet ist, wenn sie überhaupt einmal eintritt. Melloni unterscheidet drei horizontale Schichten in der Luft, welche die Gewächse umgiebt. Die oberste Schichte ist in Berührung mit denjenigen Theilen der Gewächse, welche am Stärksten ausstrahlen. Diese Luft sinkt herab und kühlt sich in der mittleren Region, wo die Vegetation dichter und der Ausstrahlung ebenfalls unterworfen ist, noch mehr ab; es tritt hier der Thaupunkt ein. Indem die Luft ganz auf den Boden und zwischen die Pflanzentheile, welche gänzlich im Schutz der oberen stehen, herabsinkt, erwärmt sie sich hier wieder und geht mit Bodenfeuchtigkeit versehen wieder in die Höhe, um dann denselben Weg von Neuem zu machen. Dieser Kreislauf ist es, welcher die Thaubildung hauptsächlich bedingt. Es ist hiernach begreiflich, warum Luftzug die Bethauung hindert, warum bei sehr trockner Luft Thau nur in der Nähe von feuchtem Boden und stehendem Wasser anzutreffen ist, warum die höheren Bäume, welche dem Luftzug ausgesetzt und von weniger feuchter Luft umgeben sind, sich so wenig bethauen. Melloni leitet weiter aus seinen Principien ab, warum der Thau auf den kleinen Inseln Polyneziens und auf Schiffen mitten im Meere fehlt, warum er sich dagegen alsbald reichlich einfindet, wenn die Schiffe sich den Küsten der Continente nähern; er erklärt die empfindliche Nachtkälte in den Sandwüsten Afrikas, sowie das Gefrieren seichter Gewässer bei 5° bis 6° Lufttemperatur, während das Wasser sich erwiesenermaßen durch

einfache Strahlung nicht ganz 2° unter jene Temperatur abkühlen kann.

Einfluss der
Farbe auf die
Bethauung.

Brocklesby (1) hat Versuche über die Abhängigkeit der Bethauung, also eigentlich des Ausstrahlungsvermögens, von der Farbe angestellt, indem er verschiedenefarbte, sonst ganz gleichartige, Stücke Flanell und mit Farbe überzogene Stücke Glas und Pappe der nächtlichen Strahlung aussetzte. Der Versuche von Melloni, welche diesen Gegenstand erledigt haben, sowie der von Knoblauch erwähnt Brocklesby nicht. Uebrigens ergeben seine Versuche ebenfalls, dass die Farbe an sich ohne Einfluss ist.

Atmidoscop.

Babinet (2) hat ein *Atmidoscop* construirt, welches die Stärke der Verdampfung anzeigt, die je nach dem Grad der Trockenheit der Luft, ihrer Temperatur und Bewegtheit in einem bestimmten Locale stattfindet. Ein Reservoir von porösem, plastischem Thone ist mit Wasser gefüllt, und der Verbrauch wird an einer Röhre gemessen, welche mit dem Reservoir in Verbindung steht. Babinet hält es für einen Vorzug seines Instrumentes vor dem gewöhnlichen Hygrometer, dass es durch die Bewegungen der Luft afficirt wird, und dass es die Totalwirkung angiebt von dem Augenblick seiner Aufstellung bis zu dem der Beobachtung.

Ein Hygrometer wurde beschrieben von Majocchi (3), und eine verbesserte Construction desselben von Regnault (4).

Wärme-
leitung im
Boden.

Dove (5) hat mit Benutzung von Beobachtungen der Bodenwärme zu Brüssel, zu Heidelberg und Schwetzingen (erstere in schwerem Thonboden, letztere in leichtem Sandboden angestellt), ferner der Beobachtungen, welche seit 1837 zu Edinburg im Dolerit, Kohlensandstein und Sandboden in 3, 6, 12 und 24 par. Fufs Tiefe angestellt wurden, gefunden, dass die Grösse der periodischen sowohl, als der

(1) Sill. Am. J. [2] VI, 178. — (2) Compt. rend. XXVII, 529; Instit. 1848, 158. — (3) Ann. ch. phys. [3] XIX, 77. — (4) Ann. ch. phys. [3] XIX, 82; Pogg. Ann. LXX, 530. — (5) Berl. Acad. Ber. 1847, 82.

Wärmelei-
tung
in Krystallen.

doch Flächen sind, welche den Ellipsoiden sehr nahe kommen. Bei allen optisch einaxigen Krystallen gehen sie in Umdrehungsellipsoide über, deren Axe mit der optischen Axe zusammenfällt, in homogenen unkrystallisierten Körpern sowie in Krystallen des regelmäßigen Systems sind die isothermen Flächen Kugeln. — Im Allgemeinen fallen die thermischen Hauptaxen mit den optischen Elasticitätsaxen zusammen, und Ausnahmen finden nur da statt, wo, wie in dem zwei- und eingliedrigen Systeme für diejenigen Axen, welche senkrecht zur Symmetrieaxe stehen, und in dem ein- und eingliedrigen Systeme für sämtliche der Axen, schon die Farbe des Lichtes eine Verschiedenheit der Lage bedingt, so daß sich jedesmal eine Wellenlänge der Axen läßt, deren zugehörige Elasticitätsaxen in der That mit den thermischen coincidiren.

Die von Senarmont untersuchten Körper waren :

I. Homogene Platten von Spiegelglas und Zink; die Platten von Flußspath, parallel einer Würfelfläche, einer Oktaëderfläche und einer Rhombendodekaëderfläche; Platten von Schwefelkies, Magneteisen, Rothkupfererz, Bleiglanz und Blende.

II. Aus dem zwei- und einaxigen (pyramidalen oder quadratischen) System: Zinkstein, Rutil, Idokras und Quecksilberchlorür sowohl in senkrecht als auch in parallel zur Axe geschnittenen Platten. Die ersteren gaben Kreise, die letzteren Ellipsen, deren Axenverhältniß beim Rutil = 1, beim Idokras = 1,13, beim Quecksilberchlorür = 1,23 war.

III. Aus dem drei- und einaxigen (rhomboëdrischen) System: Kalkspath, Quarz, Beryll, Eisenglanz und Korund. Das Resultat war wie bei dem vorhergehenden System; die Axenverhältniß der Ellipse beim Kalkspath = 1,12, beim Quarz = 1,312, beim Beryll = 1,11. Die thermischen Eigenschaften fallen insofern nicht ganz mit den optischen zusammen, als sowohl beim Quarz, beim Quecksilberchlorür und Rutil (also in der Optik sogenannten attractiven Krystallen), als auch beim Kalkspath und Beryll (also

Wärme-
leitung.

durch Pressen, Ziehen oder Härten verändert war. Crystallische Platten von 25^{mm} Seite und 6–8^{mm} Dicke zwischen beiden parallelen Backen eines Schraubstocks eingepreßt zeigten deutlich thermische Ellipsen, deren kleine Axe desmal in die Richtung der Druckkraft, also der größten Dichte, fiel. Versuche mit Porzellan, Spiegelglas und Flintglas gaben Axenverhältnisse = 1,031 bis 1,098. Bei Körpern, wo ein solcher Molecularzustand künstlich hervorgebracht entspricht ein verlängertes oder abgeplattetes thermisches Ellipsoid immer der gleichen Form der optischen Elasticitätsfläche, aber diese Körper sind auch optisch attractiv oder repulsiv für alle Farbenstrahlen ohne Unterschied, während es Krystalle giebt, wie z. B. der Apophyllit, welche activ für den einen, repulsiv für den andern und einfach achsend für einen mittleren Theil des Spectrums sind.

Bonnet (1) und Duhamel (2) haben die Probleme über Wärmeleitung in Körpern, deren Leitungsfähigkeit Ort und Richtung veränderlich ist, mathematisch behandelt. Letzterer gelangt unter Andern zu dem Satze: In welchem Gesetze man allen Punkten einer Linie, welche zu einer dünnen Krystallplatte senkrecht steht, Wärme zuführen mag, die isothermen Curven sind Ellipsen, deren Axen mit zwei Hauptaxen der Wärmeleitung parallel gehen und den Quadratwurzeln aus den entsprechenden Verhältnissen der Leitungsfähigkeit proportional sind.

Bertrand (3) theilt die Resultate einer Abhandlung mit über die Vereinfachung der Rechnungen bezüglich der Bewegung der Wärme durch Veränderung der Coordinaten.

Wärme-
strahlung.

Durch eine größere Reihe von Arbeiten hat Kirchhoff (4) mehrere der wesentlichsten Resultate aus

(1) Compt. rend. XXVII, 49. — (2) Compt. rend. XXV, 870; XXVI, 129; Institut. 1848, 246. — (3) Compt. rend. XXVII, 557. — (4) Acad. Ber. 1846, 355; Institut. 1846, 21; 1847, 227; de calore radiantis. Berol. 1846; Pogg. Ann. LXX, 205 u. 337; LXXI, 1; LXXII, 161. 170. 177; Jahresber. üb. d. Fortsch. d. Phys. i. J. 1846, Berl., 280 u.

Wärmestrahlung.

Platin ohne Flamme, Alkoholflamme mit nicht verkohlendem Dochte, Argand'sche Lampe mit constantem Niveau, cylindrischem Dochte und ohne Glasschornstein, endlich Wasserstofflamme, aus einem Gasometer mit constantem Drucke gespeist, als Wärmequellen anwandte, ergab sich, dafs die Wärme der Wasserstofflamme und des glühenden Platins ungeachtet der grofsen Temperaturverschiedenheit gleich fähig waren eine Glasplatte zu durchdringen, während die Wärme der Alkoholflamme diese Fähigkeit in geringerem, die der Argand'schen Lampe in höherem Mafse besitzt. Durch Alaun geht die Wärme der Wasserstoff- und Alkoholflamme gleich gut, reichlicher noch die des glühenden Platins, durch Kali- und Magnesiaglimmer geht die Wärme der Wasserstofflamme schlechter, als die der drei übrigen Quellen.— Die Strahlen eines allmähig erkaltenden Leslie'schen Würfels zeigten eine unveränderliche Durchgangsfähigkeit durch die verschiedensten Substanzen, welche Temperatur zwischen 30° und 100° die Quelle haben mochte. — Die Strahlen, welche von einem Cylinder aus schwarzem Eisenblech ausgingen, der über einer Argand'schen Lampe erhitzt wurde, strahlten bei höherer Temperatur durch einige Substanzen relativ besser, als bei geringerer Erhitzung, durch andere gleich gut. — Von den Strahlen, welche von einer dunkel erhitzten, ferner einer roth-, gelb- und weifsglühenden Platinspirale ausströmten, gingen die des roth- und gelbglühenden Platins durch Glas in gleichem Verhältnifs. Durch Alaun gingen die des gelbglühenden Platins weniger gut, als die des rothglühenden und dunkel-erhitzten, dagegen die Durchgangsfähigkeit durch Glimmer mit der Temperatur stieg. Diese Versuche zusammengekommen begründen den Satz, *dafs der Durchgang der strahlenden Wärme durch diathermane Körper nicht in directem Zusammenhange mit der Temperatur der Quelle steht.*

In Beziehung der Erwärmung der Körper durch Strahlung war schon länger bekannt : 1) dafs sich verschiedene Substanzen unter gleichem Einflufs einer und derselben

Wärmequelle in ungleichem Grade erhitzen, 2) daß der Grad der Erwärmung bei jeder Substanz von der Beschaffenheit der Oberfläche abhängig ist, 3) daß ein und derselbe Körper von Strahlen verschiedener Quellen, welche auf ein berufenes Thermoscop direct gleiche Wirkung äußern, gleich stark erwärmt wird. Knoblauch bewies durch Versuche mit einer Metallscheibe, welche nach der Thermosäule zu mit Ruß, auf der andern Seite einmal mit Carmin, das anderemal mit schwarzem Papier überzogen war, daß die Erwärmung, bei gleicher Intensität der eingestrahnten Wärme, unabhängig von der Temperatur der Quelle ist, und allein durch die Natur der absorbirenden Substanzen bedingt wird, welche für gewisse Strahlen mehr als für andere empfänglich sind.

Wärmestrahlung.

Um zu erfahren, in welcher Beziehung die Erwärmung der Körper zu ihrer Dicke stehe, trug Knoblauch auf dünne, in jeder Beziehung gleiche Metallscheiben Schichten von verschiedener Dicke auf: 1) von durchsichtigem Firnis, 2) von schwarzem undurchsichtigem, aber diathermanem Lack, 3) von Bleiweiß, und setzte sie den Strahlen der nämlichen Wärmequellen aus. Die Körper *erwärmten sich* innerhalb der Grenzen der Versuche (100° und Argand'sche Lampe) *um so mehr, je dicker sie waren*. Daß Leslie und Melloni die umgekehrte Erfahrung gemacht, rührte daher, daß sie ihre Schirme so dick anwendeten, daß nur ein geringer Theil der absorbirten Wärme die dem Thermoscope zugekehrte Seite erreichte. Es giebt also eine Grenze, über welche hinaus die Erwärmung eines Körpers bei zunehmender Dicke nicht mehr steigt, und diese Grenze hängt bei derselben Substanz von der Natur der Wärmequelle ab. — Diathermane Körper werden übrigens durch die Strahlen, welche sie am Wenigsten durchdringen, am Meisten erwärmt.

Verschiedene Substanzen strahlen die Wärme bei gleicher Temperatur in ungleichem Grade aus. Bei einer bestimmten Substanz ist dieses Vermögen abhängig sowohl


Wärme-
strah-
lung.

von der Beschaffenheit der Oberfläche, als von der Dicke. Knoblauch wandte gegossene und gewalzte Bleiplatten als Seitenflächen des Leslie'schen Würfels an, zuerst glatt, dann einfach, zuletzt doppelt geritzt, und fand, wie früher Melloni, daß eine Veränderung der Oberfläche durch Ritzen etc. auf das Ausstrahlungsvermögen nur in so fern von Einfluß ist, als Dichte und Härte geändert werden. Jenes Vermögen nimmt zu oder ab, je nachdem die Substanz durch das Ritzen aufgelockert oder verdichtet wird. — Weiter bestätigte sich, bei Anwendung verschiedenen dicker Firnißschichten, das von Rumford und Melloni gefundene Resultat, daß das Ausstrahlungsvermögen mit wachsender Dicke der ausstrahlenden Schichte zunimmt. Durch Vergleichung dieses Resultates mit einem oben angeführten ergibt sich ein neuer Beweis für die Uebereinstimmung der Wärmeausstrahlung und Absorption. — Es besteht übrigens diese Gleichheit wohl unbedingt für denselben Körper, so daß alle Einflüsse, welche seine Ausstrahlung erhöhen oder vermindern, eine gleiche Wirkung auf die Absorption äußern; bei Vergleichung verschiedener Körper läßt sich aber keineswegs behaupten, daß der Körper, welcher bei einer bestimmten Erwärmung ein höheres Ausstrahlungsvermögen zeigt, auch darum *überhaupt* die Wärme in höherem Grade absorbire, da das Verhältniß, in welchem die Wärme von zwei Körpern aufgenommen wird, mit der Natur der Strahlen veränderlich ist. Wurden eine Kohlenplatte und eine auf ein Metallnetz aufgetragene Carminscheibe einmal den Strahlen einer Argand'schen Lampe, dann denjenigen einer dunkeln Wärmequelle von 100° ausgesetzt, so gab die erste Platte für beide Wärmequellen eine gleiche, die Carminscheibe unter dem Einfluß der dunkeln Strahlen eine größere Ablenkung. Dieser Unterschied bestand *in gleichem Grade* fort, wenn die zweite Seite der Carminscheibe beruht wurde, und rührt also offenbar von einem für die verschiedenen Quellen ungleichen Absorptionsvermögen her. Schwarzes Papier verhält sich ähnlich,

Wärmestrah-
lung.

Die Wärme, welche zwischen den Temperaturgrer und 112° von verschiedenen Körpern unter den verschiedensten Umständen ausgeht, ist demnach als voll gleichartig erkannt. — Die angeführte Methode giebt gleich ein Mittel an die Hand, zu untersuchen, ob Körper die Wärme durchlasse oder nicht. Man kann ihn mittelst der Argand'schen Lampe und unter die Durchgangsfähigkeit seiner Wärmestrahlen durch eine Reihe diathermaner Platten. Erhält man dieselbe, wie mittelst eines als adiatherman anerkannt wird, so gehört auch der erste Körper in diese Reihe. Unterschiede können nur von durchgegangener (d. h. durch) Wärme herrühren. Schwarzes Glas, schwarzer Asphaltpapier, eine dünne Carminschicht, Postpapier und Elfenbein wiesen sich auf diese Weise als diatherman.

Die Diffusion der Wärme oder Zerstreuung der Wärmestreuung ist zuerst von Melloni mit Sicherheit nachgewiesen und näher untersucht worden. Er fand, dass die Diffusion an einer weissen Fläche für verschiedene Wärmestrecken eine ungleiche Intensität hat. Nur Metalle streuen die Wärme aller Quellen gleich stark, Ruß zeigt kaum eine bemerkbare Zerstreuung. — Die Intensität der zerstreuten Wärme ist, wie die der regelmässigen, von der Natur der Substanz und der Beschaffenheit ihrer Oberfläche abhängig; ein wesentlicher Unterschied der Zerstreuung von der spiegelnden Reflexion besteht darin, dass bei der ersteren die Wärmestrahlen von denselben Quellen von der nämlichen Substanz in ungleicher Masse zurückgeworfen werden, und dass die Wärme der zerstreuten Strahlen im Allgemeinen von der directen oder einfallenden Wärme verschieden ist. — Zur Bestätigung dieses Satzes dienten wieder diathermanen Prüfungsplatten, d. h. es wurde untersucht, ob die strahlende Wärme dieselben diathermanen Körper in ungleichem Verhältniss durchdringt, je nachdem sie



Eingeschal- tete Substanzen.	D nach dem Einschalten von			
	grünem Zinnober	Chromgelb	Diesbacher Blau	Ultramarin
Roths Glas	7,75	7,79	7,63	7,58
Blaues Glas	5,67	5,63	5,50	5,50
Alaun . .	3,42	4,17	3,25	3,67
Steinsalz .	23,25	23,06	23,06	23,13
Kalkspath .	19,88	19,94	20,00	19,25
Gyps . .	15,69	15,81	15,75	15,31

	weißem Papier	weißer Baum- wolle	weiße Wolle	Perl- mutter	Elfen- bein	Silber
Roths Glas	9,29	9,21	9,00	8,33	7,37	7,58
Blaues Glas	6,46	6,50	6,46	6,13	5,96	5,83
Alaun . .	5,75	5,83	6,58	6,13	5,83	4,38
Steinsalz .	22,56	23,13	23,13	22,56	21,94	22,25
Kalkspath .	20,25	20,44	20,81	19,06	17,44	14,86
Gyps . .	16,88	16,94	18,31	17,56	15,89	11,59

	fen worden von		Ablenkung durch die unreflectirten Strahlen nach dem Einschalten	Ablenkung nach dem Einschalten, die Wärme reflectirt von	
	schwarz. Glase	Schwarz- blech		Holz- kohle	Braun- kohle
Roths Glas	8,25	9,29	9,06	8,25	10,25
Blaues Glas	6,79	7,11	7,88	7,50	7,56
Alaun . .	5,94	5,57	5,75	5,31	6,06
Steinsalz .	20,88	22,12	22,12	21,31	22,12
Kalkspath .	15,12	16,89	16,50	14,69	19,50
Gyps . .	12,62	13,69	14,44	13,12	16,56

oder von verschiedenen Körpern diffus reflectirt angewendet wird. — Die Erwärmung der zerstreuen Substanzen wurde bei diesen Versuchen dadurch vermieden, daß sie auf die Seitenflächen eines Metallwürfels aufgetragen wurden, welcher Wasser von der Temperatur der Umgebung enthielt. Um eine unter allen Umständen gleiche Wirkung der directen Strahlung und damit vergleichbare Resultate zu erhalten, mußten Entfernung, Neigung und Größe der zerstreuen Fläche auf die verschiedenste Weise geändert werden. Controllversuche bewiesen, daß der Durchgang der zerstreuten Wärme durch diathermane Platten durch diese Aenderungen nicht afficirt wurde. Die von verschiedenen Farbstoffen, von gleichartigen, aber verschiedenen gefärbten Körpern, endlich an ungleichartigen Körpern von gleicher Farbe zerstreute Wärme zeigte deutlich ausgesprochene Unterschiede bezüglich ihres Durchgangs durch die Prüfungsplatten. Die beiliegende Tabelle z. B. zeigt das Verhalten der Strahlen einer Argand'schen Lampe, nachdem dieselben an einer Reihe farbiger, weißer oder schwarzer Flächen zerstreut wurden.

Wärmestrahlung.

Manche gleichartige Körper verändern die Wärme auch in ganz gleicher Weise, wie z. B. Birkenholz, Kork und Mahagoniholz, desgl. die Metalle und Metalllegirungen, welche überdies noch die zerstreute Wärme gerade so wiedergeben, wie sie einfiel, was mit dem Satze Melloni's stimmt, daß sich rauhe Metallflächen gegen die Wärme wie weiße Flächen gegen das Licht verhalten. — Als Hauptresultat ergibt sich, daß die Diffusion an manchen Körpern die Wärmefarbe in hohem Grade, an andern dagegen gar nicht ändert, und daß diese Veränderung von der Rauheit der Flächen unabhängig ist; die Metalle behaupten ihre weiße Wärmefarbe, mag man sie rauh oder spiegelnd gebrauchen. — Eine Menge von Beispielen beweisen, daß die Aenderung des Durchgangs der Wärme nach der Diffusion durch Eine diathermane Substanz in gar keiner Bezie-

Wärmestrah-
lung. lung zu ihrer Durchgangsfähigkeit durch irgend eine andere stehe. —

Bei Untersuchung des Einflusses der Wärmequellen auf die Diffusion ergab sich, daß die Veränderungen der Wärmefarbe, welche für die Argand'sche Lampe sehr bedeutend sind, sich für die Wärme des rothglühenden Platins vermindern, für die Strahlen einer Alkoholflamme noch geringer werden, und für die Wärme eines erhitzten Eisencylinders, welche Temperatur derselbe zwischen 24° und 112° haben mag, absolut verschwinden. Ueberhaupt also sind die Veränderungen der Wärme bei diffuser Reflexion ebensowohl von der Natur der Wärmequellen, als von der Beschaffenheit der reflectirenden Substanzen abhängig. — Durch Wiederholung der Versuche mit den vier genannten Wärmequellen fand Knoblauch, daß die Flächen, welche einen *gleichen Einfluß* auf die Strahlen Einer Quelle, z. B. der Argand'schen Lampe, äufsern, auch die Strahlen der übrigen Quellen in gleicher Weise modificiren.

Für die Veränderungen, welche die Wärmestrahlen bei der diffusen Reflexion erleiden, sind zwei Erklärungen denkbar. Jene beruhen entweder auf einer wirklichen Veränderung der Wärmestrahlen, oder nur auf auswählender Absorption der zerstreuen Flächen. Ist das Letztere der Fall, so muß mit der verschiedenen Durchgangsfähigkeit auch eine ungleiche Intensität der Wärmestrahlen verbunden sein. So ist z. B. die von weißem Papier zerstreute Wärme in höherem Grade fähig durch rothes Glas und Kalkspath zu gehen, als die von schwarzem Papier reflectirte. Weiter enthält die Wärme der Argand'schen Lampe mehr Strahlen von der Wärmefarbe des rothen Glases und Kalkspathes, als die eines dunkelerhitzten Cylinders. Weißes Papier müßte demnach, wenn eine theilweise Absorption Ursache der Wärmefarbe der zerstreuten Strahlen ist, die Wärme der letzteren Quelle verhältnißmäßig schlechter reflectiren, als die der Argand'schen Lampe, wenn man die Diffusion beider Strahlenarten an schwarzem Papier als

Vergleichungspunkt wählt. Der Versuch bestätigt dieses, und aus einer grossen Reihe ähnlicher Versuche folgt : 1) dafs eine Fläche, welche die Wärme dergestalt reflectirt, dafs sie in höherem Grade als die von einer andern zurückgeworfene durch rothes Glas, blaues Glas, Alaun, Steinsalz, Kalkspath und Gyps hindurchgeht, im Vergleich mit dieser zweiten Fläche am Besten die Wärme der Argand'schen Lampe, sodann die des glühenden Platins, in geringerem Grade die der Alkoholflamme und am Schlechtesten die des erhitzten Cylinders reflectirt; worin zugleich das Gegentheil ausgesprochen ist, dafs eine reflectirende Fläche, welche, im Vergleich mit einer andern, den Durchgang der Wärme durch die genannten Körper vermindert, die Strahlen der Argand'schen Lampe verhältnismäfsig im geringsten Grade, besser die des glühenden Platins, mit noch gröfserer Intensität die der Alkoholflamme und relativ am Besten die des dunkeln Cylinders zurücksendet; — 2) dafs, wenn die Wärmefarben gewisser Prüfungsplatten mehr der einen, andere mehr einer zweiten zerstreuen Fläche sich homogen erweisen, die eine Fläche auch die Strahlen verschiedener Wärmequellen bald besser, bald schlechter reflectirt, als die andere; — 3) dafs dagegen, wenn die reflectirten Strahlen sich gegen diathermane Platten gleich verhalten, beide Flächen auch die Strahlen verschiedener Wärmequellen mit gleicher Intensität zurückwerfen. — Das Gesammtresultat ist demnach, dafs die Veränderungen der Wärme bei diffuser Reflexion nur Folgen einer auswählenden Absorption der reflectirenden Flächen für gewisse ihnen zugesandte Wärmestrahlen sind. — Die Erscheinungen sind denjenigen analog, welche bei der Diffusion der Lichtstrahlen beobachtet werden, ohne dafs, wie schon Herschel und Melloni bemerkten, die Reflexion beider Strahlenarten sich analog verhält.

Die Untersuchungen Knoblauch's lehren bezüglich der angewendeten Wärmequellen, dafs die Mannigfaltigkeit der ausgesendeten Strahlen bei der Argand'schen Lampe am Gröfsten, geringer beim glühenden Platin und noch ge-

Wärmestrahlung.

ringer bei der Alkoholflamme ist, während sie bei 100° erhitzten Cylinder gänzlich aufhört; überhaupt zwischen 30° und 112° von den verschiedensten festen ausgestrahlte Wärme vollkommen *gleichartig* (farbig). — Indem sich Knoblauch einer Platinspindel, welche über dem Schornstein einer Berzeli Lampe zunächst unter 112°, dann zum Roth-, Gelb- und glühen erhitzt wurde, fand er durch Prüfung mit diathermen Platten, daß die Mannigfaltigkeit der von dem Körper ausgesendeten Wärmestraahlen mit der Temperatur zunimmt.

De la Provostaye und Desains haben eine Untersuchung über Wärmestrahlung angestellt (1), welche Fortsetzung einer früheren Arbeit (2) über den nämlichen Gegenstand anzusehen ist.

Dulong und Petit hatten in ihrer Arbeit über die Abkühlung im luftgefüllten Raume die Wirkung der Luft unter einem Drucke p durch $n \cdot p^{0.45}$ ausgedrückt, worin n als constant angenommen geglaubt. Pr. u. D. zeigen, daß die Art, wie der Ausdruck begründet sei, eine Formel $n \cdot p^{0.45} + f(p)$ ausschliesse, wenn $f(p)$ mit p Null werde und innerhalb der Grenzen der Versuche von D. u. P. nahezu constant bleibe. Die Versuche über Abkühlung in atmosphärischer Luft ergaben für niederen Druck einen Wendungspunkt der Abkühlungskurve, welche die Abhängigkeit der Abkühlungsgeschwindigkeit von dem Drucke versinnlicht. In Wasser erhielten Pr. und D. folgende Resultate:

Druck	0 ^m ,760	0 ^m ,477	0 ^m ,057	0 ^m ,020	0 ^m
Erkaltungszeit	12'46"	13'20"	13'40"	14'49"	2

Die Abkühlung geht also um so langsamer vor, je dünner das Gas wird. In Kohlensäure nahm die Erkaltungszeit mit abnehmendem Drucke zu bis zu 35^{mm}, blieb dann gleich und nahm dann wieder ab. Ganz ähnlich verhielt sich Stickstoffoxydul. — Die Abkühlung in einem Gase

(1) Ann. ch. phys. [3] XXII, 858; Compt. rend. XXIV, 60, XXV, 106; Arch. ph. nat. IV, 174. — (2) Ann. ch. phys. [3]

von gleichen Volumen Wasserstoff und atmosphär. Luft unter einem Totaldruck von 60^{mm} geht langsamer vor sich, als in Wasserstoff bei 30^{mm} Druck, so daß also hier die zugefügte Luft verzögernd wirkt, während sie für sich allein beschleunigend wirken würde. Die Moleküle der Gase scheinen aufeinander zu wirken, so daß ihre Beweglichkeit abnimmt. — Was die Intensität der Strahlung betrifft, so haben Pr. und D. für die bekannte Formel von Dulong und Petit eine etwas erweiterte substituirt und die Uebereinstimmung derselben mit der Beobachtung nachgewiesen. Es ist, wenn in zwei Versuchen t und t^1 die Temperaturen der Thermosäule, T und T^1 die der Wärmequelle sind, das Verhältniß der Ablenkungen

$$R = \frac{a + \alpha \vartheta + \beta \vartheta^2}{a + \alpha \vartheta_1 + \beta \vartheta_1^2} \cdot \frac{1}{1}$$

worin $a = 1,009$, $\vartheta = T - t$, $\vartheta_1 = T^1 - t^1$, $\alpha = \frac{1}{7028}$; $\beta = \frac{a}{100}$

Das Ausstrahlungsvermögen der Metalle verglichen die genannten Physiker nach zwei verschiedenen Methoden mit dem des Rufses als Einheit, und erhielten folgende Resultate:

	Ausstrahlungsvermögen.	
	1. Meth.	2. Meth.
Gediegenes Silber, gewalzt	0,03	0,029
Silber auf Kupfer chemisch niedergeschl., matt	0,0536	0,053
Gewaltes Platin	0,108	0,104
Vernilbertes Silber	—	0,0205
Gediegenes Silber, polirt	0,025	0,022
Dasselbe lange erhitzt	0,0275	0,0297
Silber, chemisch niedergeschlagen, dann polirt	0,0225	0,022
Plattirtes Silber	—	0,0218
Gewaltes Platin	0,108	0,104
Polirtes Platin	0,095	0,09
Goldblatt	0,0428	0,043
Kupferblech	0,049	0,0514

Diese Werthe sind bedeutend geringer, als das Ausstrahlungsvermögen, welches man den Metallen nach Leslie's und Dulong's und Petit's Versuchen beilegte. — Knoblauch (1) sucht den Grund dieser Abweichungen in

(1) Jahresber. der Berliner phys. Gesellschaft für 1846, 279.

Wärmestrahlung.

der von Melloni bewiesenen Veränderlichkeit des Strahlungsvermögens des Rufses, und bezeichnet es als *unstatthaft*, diese Gröfse ferner zum Mafsstab zu wählen. *Doch* scheint aus Melloni's Arbeit nur so viel zu folgen, *dafs* man die Rufsschichte hinlänglich dick machen mufs, *um* ein constantes Maximum der Ausstrahlung zu erhalten *und* es geht aus der Abhandlung der franz. Physiker nicht *her-* vor, *dafs* sie diese Vorsicht nicht angewendet hätten.

Die erste der beiden oben erwähnten Methoden, *das* Ausstrahlungsvermögen zu bestimmen, besteht darin, *die* Thermosiüle der Wirkung der heißen Flächen *auszusetzen*, während durch einen durchbrochenen Schirm bei den *Me-* tallen eine gröfsere, bei dem Rufe eine kleinere Fläche zur Wirksamkeit gebracht wird. — Nach der zweiten *Me-* thode werden gleich grofse Flächen, die metallischen *aber* bei höherer Temperatur, angewandt, und aus der *Ablenkung*, welche die Rufsfäche bei T giebt, diejenige, welche sie *bei* der höheren Temperatur T' des Metalles geben würde, mittelst der Formel

$$\delta' = \delta \cdot \frac{a \frac{T' - \vartheta}{T - \vartheta} - 1}{a - 1}$$

berechnet, so *dafs* die Gröfsen vergleichbar werden.

Wir schalten hier die verwandten Resultate einiger *an-* deren Physiker ein. Gelegentlich einer Arbeit über die *Thau-* bildung hat Melloni (1) das Ausstrahlungsvermögen einiger Körper gemessen, indem er die metallischen Hüllen von Thermometern damit überzog. Er fand, das Ausstrahlungs- vermögen des Rufses zu 100 angenommen, für

Silber	3,026	Kraut mit glatten Blättern . . .	103
Bleiweifs	99	Blätter von Ulme und Pappel . .	101
Firnifs	97	Sägespäne von Pappelholz . . .	99
Hausenblase	96	„ „ Acajou	96
Glas	93	Kieselsand	93
Graphit	86	Humose Erde	92

(1) Ann. ch. phys. [3] XXII, 141—148.

iner Präcipitate angestellt, woraus sie schliessen, die Metalle im Zustande feiner Zertheilung ein weit anderes Ausstrahlungsvermögen haben, als wenn sie in oder gehämmert sind; 2) dafs das Ausstrahlungsvermögen der Körper von ihrem Cohäsionszustande, nicht in ihrer sonstigen Natur abhängig ist; 3) dafs wenn Körper in den nämlichen Zustand feiner Vertheilung gebracht würden, sie bei 100° alle das nämliche Ausstrahlungsvermögen haben würden. In einer folgenden Mittheilung fügen sie noch zu, dafs die Körper im Zustande feiner Zertheilung auch bei 400° noch gleiches Absorptions- und Streuungsvermögen zu haben scheinen, dafs alle Körper, welche das Licht vollkommen absorbiren, auch dieselbe Wirkung auf die Wärmestrahlen äufsern; dafs auch die schwarzen Substanzen das nämliche Absorptions- und Streuungsvermögen zeigen und dies auch für leuchtende Körper, durch welche Substanzen dieselben hindurchgehen können, sein mögen. Nur der phosphors. Kalk soll ein sehr geringes Diffusionsvermögen im Verhältnifs zu seiner abstrahirenden Kraft haben.

Bisher hat der königl. Ges. zu London (3) Resultate nächtliche Ausstrahlung der Wärme mitgetheilt, welche an nahe 100 verschiedenen Substanzen erhalten sind. Nach dem Diffusionsvermögen der Metalle haben Prä-

Wärmestrahlung.	Plattirtes Silber, gut polirt	0,97	Neu polirtes Spiegelmetall	0,855
	Vergoldeter Stahl, vollkommen polirt	0,97	Etwas getrübbtes „	0,825
	Plattirtes Gold	0,95	Platin	0,81
	Kupfer	0,93	Stahl	0,825
	Messing	0,93	Zink	0,81
	Gefirnifstes Kupfer	0,86	Eisen	0,77

Die Art der Darstellung der Metallflächen hat einen äußerst geringen Einfluss auf das Reflexionsvermögen, vorausgesetzt, daß die Politur immer gut ist. — Die Summe des Reflexionsvermögens und Ausstrahlungsvermögens des Silbers $0,97 + 0,025$ ist sehr nahe $= 1$, und da die Diffusion am Silber nur äußerst gering ist, so bietet dieses Resultat eine Bestätigung der Gleichheit des Absorptions- und Emissionsvermögens. — Die Intensität der an einer Glasfläche zurückgeworfenen Wärmestrahlen wächst bedeutend bei zunehmendem Einfallswinkel, und die Absorption und folglich auch die Ausstrahlung muß demnach eine entsprechende Verminderung erleiden.

Zurückwerfung der Wärmestrahlen.

Knoblauch (1) hat durch vergleichende Versuche mit einem Spiegel von schwarzem Glase und einem Stahlspiegel den von Forbes und de la Provostaye und Desains bereits aufgestellten Satz bestätigt, daß die Intensität der reflectirten Wärme bei wachsender Incidenz beim Glase vermehrt, beim Metalle vermindert wird. Seine Versuche gaben folgende Ablenkungen der Multiplicatornadel:

	Winkel der Wärmestrahlen mit dem Spiegel					
	60°	50°	40°	30°	20°	10°
Schwarzes Glas	10,0	10,0	11,0	15,1	28,1	43,0
Stahlspiegel	56,0	55,0	54,5	50,0	48,0	43,0

Versuche von Provostaye und Desains über die Intensität der Ausstrahlung unter verschiedenen Ausfallswinkeln ergaben die folgenden Resultate:

(1) Pogg. Ann. LXXIV, 168.

Doppelbre-
chung, Polari-
sation, Inter-
ferenz und
Beugung der
strahlenden
Wärme.

schen dem Verhalten der Licht und Wärmestrahlen bezüglich der Doppelbrechung, Polarisation, Interferenz und Beugung erst durch die ausgedehnten Untersuchungen Knoblauch's so wie durch einige Versuche von Provostaye und Desains dargethan worden.

Knoblauch (1) liefs Sonnenstrahlen, welche von einem Heliostaten reflectirt wurden, auf die natürlichen Rhombenflächen eines Kalkspaths fallen, und fing die durchgegangenen Strahlen mit einer Thermokette auf, deren Fläche einen vertikalen Streif von nur $\frac{1}{4}$ mm Breite bildete. Ablenkung auf $20^{\circ},5$, Rückgang auf 5° und abermalige Ablenkung auf $20^{\circ},75$ bewiesen die Doppelbrechung der Wärme unzweideutig. Der Abstand der äußersten Grenzen beider Wärmebilder änderte sich, wenn der Kalkspath in einer Ebene senkrecht zu den Wärmestrahlen gedreht wurde. Man mußte um 90° drehen, wenn der Abstand vom Minimum bis zum Maximum anwachsen sollte. Bei der Drehung des Kalkspathes bewegt sich das eine (außerordentlich gebrochene) Strahlenbüschel um das andre (ordentlich gebrochene), welches feststeht. Die Intensität beider Büschel war gleich. Alle Erscheinungen der Doppelbrechung verschwanden, wenn man eine senkrecht zur optischen Axe geschnittene Platte anwandte. —

Die Polarisation der Wärme durch Reflexion erhielt Knoblauch (2), indem er Sonnenstrahlen an einem Spiegel von schwarzem Glas oder einem Stahlspiegel zurückwerfen und dann durch ein Nikol'sches Prisma gehen liefs. — Bei Anwendung verschiedener Einfallwinkel ergab sich, daß die Güte der Polarisation anfangs zunimmt, wenn der Winkel der Wärmestrahlen mit dem Spiegel kleiner wird, und später sich wieder vermindert. Die beste Polarisation trat bei dem Glasspiegel ein, wenn jene Neigung 35° , bei dem Stahlspiegel, wenn sie etwa 15° war; das Maximum betrug bei dem ersteren 74 polarisirte Strahlen auf 100 zurückgeworfene, bei dem letztern nur 34.

(1) Pogg. Ann. LXXIV, 1. — (2) Pogg. Ann. LXXIV, 161.

Die Polarisation der Wärme durch einfache Brechung prüfte Knoblauch (1) auf drei verschiedene Arten. Die folgende Tabelle enthält unter I die Resultate, welche erhalten wurden, wenn ein Satz paralleler Glasplatten als polarisirender und ein gleicher Satz als analysirender Apparat diente, unter II, wenn ein Nikol zum Analysiren, unter III, wenn ein Nikol zum Polarisiren, ein Glasplattensatz zum Analysiren gebraucht wurde.

Doppelbre-
chung, Polari-
sation, Inter-
ferenz und
Beugung der
strahlenden
Wärme.

Einfall- Winkel der Wärme- Strahlen	Von 100 Strahlen waren polarisirt, bei Anwendung von											
	3 Platten			6 Platten			9 Platten			12 Platten		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
0°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20°	0	10	9	0	17	13	0	30	20	13	44	50
40°	0	22	25	13	53	38	25	63	51	50	70	69
60°	21	36	47	53	81	71	76	96	92	100	100	100

Die Polarisation durch einfache Brechung ist also um so vollkommener, 1) je größer bei einer constanten Anzahl von Glasplatten der Einfallswinkel, 2) je größer bei constantem Einfallswinkel die Anzahl der Glasplatten. Die Polarisationsebenen der reflectirten und der gebrochenen Wärme bilden einen rechten Winkel.

Auch die Polarisation durch Doppelbrechung ist von Knoblauch (2) untersucht worden. Gekreuzte Turmaline polarisirten 58 Strahlen von 100 durch die parallel gestellten Platten gehenden Strahlen. Eine sehr vollständige Polarisation gaben Nikol'sche Prismen, und es ist dieses Phänomen zugleich ein neuer Beleg für die totale Reflexion der Wärmestrahlen. — Die beiden durch Kalkspath erzeugten Wärmebilder erwiesen sich in zu einander senkrechten Ebenen polarisirt. Eine Kalkspathplatte zwischen gekreuzten oder parallelen Nikols bot bezüglich der Wärmestrahlen ganz die dem Lichte analogen Erscheinungen dar. — Eine nähere Untersuchung bewies ferner, daß die Wärme in ihrer Intensität und Qualität keine verschiedenartigen Ein-

(1) Pogg. Ann. LXXIV, 170. — (2) Pogg. Ann. LXXIV, 177.

Doppelbre-
chung, Polari-
sation, Inter-
ferenz und
Beugung der
strahlenden
Wärme.

wirkungen erfährt, in welcher Richtung man sie auch durch einen Kalkspath mag gehen lassen.

Die *Beugung* der Wärmestrahlen wies Knoblauch (1) nach, indem er mittelst eines Heliostaten und einer cylindrischen Linse eine lineare Wärmequelle darstellte, die Strahlen alsdann durch eine feine Spalte gehen liefs, und hinter derselben mittelst einer linearen Thermosäule das Feld bestimmte, auf welches sich die Wärmestrahlen verbreiteten. Dieses Feld war stets gröfser als das aus der geradlinigen Fortpflanzung abzuleitende. Der Unterschied war um so bedeutender, 1) in je gröfserem Abstände von dem Schnitte die Messung angestellt wurde, 2) je enger der Spalt war, durch welchen die Strahlen gingen, 3) je gröfser seine Entfernung von der Wärmequelle war.

Interferenz
der Wärme-
strahlen.

Fizeau und Foucault (2) haben Interferenzen der Wärmestrahlen in den Spiegelfransen, in den mit dunkeln Räumen versehenen Spectris, welche man durch prismatische Zerlegung der Farben von Krystallplättchen im polarisirten Lichte erhält, sowie endlich in den durch einen geradlinigen Rand erzeugten Diffractionsfransen nachgewiesen. Die Interferenzstreifen der Wärme fallen mit denen des Lichtes zusammen, und zeigen sich in der ganzen Ausdehnung des Wärmespectrums. Die genannten Physiker bedienten sich zu ihren Versuchen eines äufserst feinen Weingeistthermometers, dessen kugelförmiger Behälter nicht über 1^{mm},1 Durchmesser hatte, und an welchem dennoch 1° C eine Länge von 8^{mm} einnahm, so dafs man noch $\frac{1}{100}$ Grad ablesen konnte. — Bei dem Durchgang durch die mittlere Spiegelfranse gab das Thermometer 20,9; 35,9; 20,0 Abtheilungen an.

(1) Pogg. Ann. LXXIV, 9; Instit. 1848, 139. — (2) Compt. rend. XXV, 447 u. 485; Pogg. Ann. LXXIII, 462.

Bewegungslehre.

Grove hat im königlichen Institut zu London Vor-
trüge über die Beziehungen zwischen den verschiedenen
physikalischen Kräften gehalten, welche ihrem Hauptinhalte
nach niedergeschrieben, von Louyet übersetzt, in der bel-
gischen revue scientifique und aus dieser entnommen im
Institut (1) mitgetheilt werden. Der Hauptgedanke, daß
jede der folgenden Kräfte: Bewegung, Wärme, Electricität,
Licht, Magnetismus, chemische Verwandtschaft, in jede der
übrigen umgesetzt werden könne, ist nicht neu, und wird
auch nicht mit Benutzung alles vorhandenen Materiales
durchgeführt, sowie die bekannte Schwierigkeit, die Vor-
stellung der latenten Wärme zu beseitigen und die hierauf
bezüglichen Erscheinungen als Bewegungsphänomene dar-
zustellen, keineswegs gehoben ist. Einen ihm eigenthüm-
lichen Versuch, die Umsetzung des Lichtes in die übrigen
Agentien darzuthun, beschreibt Grove mit den folgenden
Worten: Eine zubereitete Daguerrotypplatte wird in eine
mit Wasser gefüllte und oben mit einem Glasdeckel ver-
sehene Büchse eingeschlossen; der Glasdeckel ist mit einem
Schirme bedeckt, zwischen ihm und der Platte befindet
sich ein Gitter (*grille*) von Silberdraht, welches mit dem
Ende einer Berguet'schen Spirale in Verbindung steht.
An das andere Ende schließt sich ein feiner Metalldraht,
an diesen das Ende eines Galvanometerdrahtes, dessen
anderes Ende mit der Daguerrotypplatte communicirt. Die
Nadeln stehen auf Null. Sowie ein Strahl von Sonnen- oder
Knallgaslicht auf die Platte fällt, werden die Nadeln ab-
gelenkt, zum Beweise, daß chemische Action, Electricität,
Magnetismus, Wärme und Bewegung, Alles durch das
Licht hervorgerufen wurden. — Neben philosophischen Er-
örterungen über das eigentliche Wesen physikalischer Ur-

Ueber
Kräfte im
Allgemei-
nen.

(1) *Inst.* 1848, 154., 162., 169., 176; *Phil. Mag.* [3] XXXI, 67.

Ueber Kräfte
im Allgemei-
nen.

sachen und die Mangelhaftigkeit der technischen Terminologie enthält die vorliegende Arbeit einige abnorme Ideen wie die über die Ursache des Lichtes, welche Grove in Umgehung eines Aethers in der Vibration der materiellen Molecüle finden will, eine Ansicht, welche durch das angeführte Beispiel der Abhängigkeit optischer Eigenschaften von der Structur wenig gestützt und durch die Consequenz, daß der Himmelsraum mit materiellen Theilen erfüllt zu sein wenig empfohlen wird. — Uebrigens bemerkt Grove ganz richtig, daß die nächste Aufgabe bezüglich des Zusammenhanges der physikalischen Kräfte die numerische Bestimmung der Aequivalente sei. Die Bestimmung des mechanischen Aequivalentes der Wärme durch Joule, die Maßbestimmung magnetischer Kräfte durch Gauss und Weber, die Messung des electrochemischen Aequivalentes des Wassers durch Weber sind Beispiele solcher Arbeiten.

Untersuchungen in ähnlicher Richtung wurden von Haughton (1) und von Goodman (2) (von letzterem in dem 8. Bande der Abhandlungen der literarischen und philosophischen Gesellschaft zu Manchester) mitgetheilt. Matteucci (3) hat eine Reihe von Versuchen angestellt, welche ihm zu dem Schlusse zu berechtigen scheinen, daß die Imponderabilien — Wärme, Licht und Electricität — sich bei dem chemischen Proceß in von einander unabhängige Mengen entwickeln, so daß durch das gleichzeitige Auftreten eines zweiten oder dritten derselben die Menge der ersten keine Aenderung erleide.

Tiefere
Quellen der
Mechanik.

In der *Cambridge philos. soc.* hat Herr Ellis (4) in Anerkennung dessen, daß die chemischen Processe noch keine wegs durch die Mechanik erklärt sind, ein neues Causa princip aufzustellen sich veranlaßt gesehen, welches er (Kraft)² nennt, und welches zur Kraft, im gewöhnlichen

(1) Phil. Mag. [3] XXX, 437 u. 502. — (2) Phil. Mag. [3] XXX, 172. — (3) Arch. ph. nat. IV, 381. — (4) Phil. Mag. [3] XXXIII, 35

Sinne, ganz in derselben Beziehung stehen soll, wie letztere zur Geschwindigkeit. Herr Ellis bildet diese absurde Hypothese noch weiter aus, indem er zu : $(\text{Kraft})^3$, $(\text{Kraft})^4$, $(\text{Kraft})^n$ zurückgeht.

De Saint-Venant (1) bemerkt in einer Abhandlung Gleichgewicht starrer Körper. über das Gleichgewicht fester Körper, daß die Formeln der Molekularmechanik seither stets auf die Voraussetzung gegründet worden, daß der Abstand zweier Moleküle der Größe, wie der Richtung nach, nur ganz kleine Veränderungen erleiden. Wenn Metall-Streifen oder Stäbe bis zur Berührung der Enden zusammengebogen oder gar mehrmals gewunden würden, sei jene Voraussetzung nicht mehr zulässig. St. Venant entwickelt neue Formeln unter der Annahme, daß das Verhältniß des Abstandes zweier Moleküle vor und nach der Verschiebung wenig von 1 verschieden sei. Nennt man 1) d_x , d_y , d_z die Verlängerungen dreier materieller Linien, welche in einem Punkte M des materiellen Körpers senkrecht aufeinander stehen, parallel den Coordinaten x , y , z , und 2) g_{yz} , g_{zx} , g_{xy} die kleinen Veränderungen der rechten Winkel, so ist für eine Verschiebung ξ , η , ζ :

$$dx = \frac{d\xi}{dx} + \frac{d\xi^2 + d\eta^2 + d\zeta^2}{2 dx^3}; \quad g_{yz} = \frac{d\eta}{dz} + \frac{d\zeta}{dy} + \left(\frac{d\xi}{dy} \frac{d\xi}{dz} + \frac{d\eta}{dy} \frac{d\eta}{dz} + \frac{d\zeta}{dy} \frac{d\zeta}{dz} \right)$$

und in diesen Ausdrücken verschwinden die zweiten Glieder unter der früher statuirten Voraussetzung, daß ξ , η , ζ klein seien. Die Verlängerung einer andern Graden, welche mit den Coordinatenachsen die Winkel α , β , γ macht, ist

$$D = d_x \cos^2 \alpha + d_y \cos^2 \beta + d_z \cos^2 \gamma + g_{yz} \cos \beta \cos \gamma + g_{zx} \cos \alpha \cos \gamma + g_{xy} \cos \alpha \cos \beta$$

St. Venant hat für einige einfachere Fälle Resultate aus diesen Formeln abgeleitet. — Rücksichtlich des Torsionswiderstandes, welchen ein Prisma mit rechteckigem Querschnitte darbietet, bemerkt St. Venant, daß dieser früher fälschlich dem Trägheitsmomente des Querschnittes proportional gesetzt worden sei. Cauchy habe bereits gefunden, daß bei gleichem Trägheitsmoment der Wider-

(1) Compt. rend. XXIV, 260.

Gleichgewicht
starrer Kör-
per.

stand gegen die Drehung um so geringer sei, je un-
die beiden Seiten des Querschnittes, so wie auch,
vorher ebene Querschnitt bei der Torsion w-
werde, ähnlich wie die Flügel einer Windmühle, a-
mit geradlinigen Umfangslinien. St. Venant fand
dafs der ebene Querschnitt noch eine weitere
erleidet, so dafs die krumme Fläche auf den vier
benförmig gewundenen Kanten senkrecht steht
Umfangsseiten sich krümmen. Ein Versuch mit
von Kautschuk bestätigt das theoretische Resultat
gleichen stimmen damit die Versuche von Duleau
Unterschied des Widerstandes cylindrischer und
scher Stäbe bei gleichem Trägheitsmoment des Quers-
Sind $2h$ und $2i$ die Seiten des Querschnittes eines
lelopipedischen Stabes, $G = \frac{1}{3} E$, worin E der Elasticitäts-
coëfficient (*G coeffic. d'élasticité de glissement*), ist θ
der Torsionswinkel für die Längeneinheit, so findet
Venant (1) das Drehungsmoment :

$$M = \frac{16}{3} G \cdot d h^3 - G d i^4 \frac{1024}{\pi^3} \left\{ \frac{1 - e^{-\frac{\pi h}{i}}}{1 + e^{-\frac{\pi h}{i}}} + \frac{1}{3} \frac{1 - e^{-\frac{3\pi}{i}}}{1 - e^{-\frac{3\pi}{i}}} \right\}$$

Wenn $h = i$, also das Prisma eine quadratische Basis hat,

$$M = 0,841 \cdot \frac{8 G d h^4}{3}$$

Wenn i sehr klein ist gegen h :

$$M = \frac{16}{3} G d h^3$$

wie auch schon Cauchy gefunden hatte.— Ein Cylinders-
kreisförmiger Stab, dessen Querschnitt das Trägheitsmoment hat,
wie das Prisma im erst erwähnten Falle, bietet ein Torsionsmoment $M =$
dar. Während die Rechnung das Verhältnifs 0,841
folgt aus den Versuchen von Duleau an Eisenstäben
aus denen von Savart an Kupferstäben 0,82.

(1) Compt. rend. XXIV, 485.

Für einen Cylinder mit elliptischer Basis berechnet St. Gleichgewicht starrer Körper.
Ve nant (1) das Drehungsmoment $M = G d \cdot \frac{4 \mu \mu'}{\mu + \mu'}$ worin
 $\mu = \frac{\pi}{2} h i^2$ und $\mu' = \frac{\pi}{2} h^2 i$, h und i aber die Axen der
 Ellipse sind. Er findet, daß die elliptischen Querschnitte
 bei der Torsion die Form eines hyperbolischen Paraboloids
 annehmen.

Die Theorie der Elasticität führt zu einigen Resultaten, Ueber Elasticität und Zusammendrückbarkeit fester Körper.
 welche sich vorzugsweise für die experimentelle Bestätigung
 eignen. So z. B. der Satz, daß, wenn man einen Stab
 oder eine Saite durch eine Zugkraft um Weniges verlän-
 gert, auch das Volum zunimmt, und zwar so, daß die
 Vermehrung der Volumeinheit halb so viel beträgt als die
 Zunahme der Längeneinheit. — Wertheim (2) findet
 die experimentelle Bestätigung dieses Satzes durch Cag-
 niard-Latour unzureichend; Versuche mit Stäben von
 Kautschuk sowohl als mit cylindrischen Röhren von Mes-
 sing und Glas, bei welchen die Volumänderung an oben
 eingekitteten Capillarröhren gemessen wurde, haben viel-
 mehr die Vergrößerung der Volumeinheit nahe gleich $\frac{1}{2}$
 der Zunahme der Längeneinheit ergeben. — Nennt man π
 die wirkende Druck- oder Zugkraft, ε die lineare Ver-
 längerung im Sinne dieser Kraft, v die Volumänderung,
 k und K die Coëfficienten der lineären und kubischen Zu-
 sammendrückbarkeit oder Ausdehnbarkeit, so ist die Grund-
 hypothese Cauchy's über die elastische Wirkung ausge-
 drückt durch die Gleichung $\pi = k \cdot \varepsilon + K \cdot v$. — Hieraus
 leitet Cauchy für einen Cylinder, auf dessen convexe
 Fläche keine Kraft wirkt, während ein Druck oder Zug
 an den Grundflächen angebracht ist, die Gleichung $v =$
 $\frac{k}{k+2K} \varepsilon$ ab, und diese giebt, wenn man nach dem Resultat
 der Versuche $v = \frac{1}{2} \varepsilon$ nimmt, $k = K$, also $\pi = k (\varepsilon + v)$. —
 Führt man diese Bedingung in die allgemeinen Gleichungen

(1) Compt. rend. XXIV, 847. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 52;
 Compt. rend. XXVI, 206; Pogg. Ann. LXXIV, 150.

Ueber Elastizität und Zusammendrückbarkeit fester Körper.

des Gleichgewichts und der Bewegung ein, so gelangt man für gewisse specielle Fälle nun zu andern Formeln, als unter der früheren Voraussetzung: $v = \frac{1}{2} \varepsilon$, oder $k=2K$. — Diese Formeln, angewandt auf Regnault's Versuche über kubische Zusammendrückbarkeit starrer Hüllen, geben folgende Bestätigung:

H ü l l e.	Kubische Zusammendrückbarkeit f. 1 Atm. auf 1 Qu. Cent.	Elasticitätscoëff. für 1 Quadratmillim. in Kilogr. nach		
		der alten Formel.	der neuen Formel.	d. Verlängerung.
Kupferne Kugel . . .	0,0000013377	11550	10266	10519
Messingene Kugel . . .	0,0000014788	10447	9287	9277
Gläserner Cylinder mit halbkugelf. Grundfl. . .	0,0000022897	6748	5998	6040

Die Verbindung der Beziehung $v = \frac{1}{2} \varepsilon$ mit Cauchy's mathematischen Deductionen führt zu einer Gleichung, welcher genügt wird durch die Annahme, daß die Molecularanziehung sich umgekehrt, wie die 14. Potenz des Abstandes zweier Molecüle verhalte. Endlich folgt noch, daß die Schallgeschwindigkeit in einer unbegrenzten Masse sich zu der in einem Faden von derselben Substanz verhält, wie $\sqrt{\frac{1}{2}}$: 1.

Elasticität u. Festigkeit verschiedener Glassorten.

Chevandier und Wertheim (1) haben die Elasticität und Festigkeit verschiedener Glassorten gemessen. Stücke von 1–2 Meter Länge aus Stäben gewonnen, welche auf 10–12 Meter ausgezogen waren, gaben für die Schallgeschwindigkeit äußerst schwankende Resultate. Diese wurden nicht eher übereinstimmend, als bis die Stäbe angelassen und sehr genau prismatisch mit quadratischem Querschnitte ausgearbeitet waren. Fensterglas gab eine Schallgeschwindigkeit zwischen 16,58 und 16,76; Spiegelglas zwischen 15,70 und 16,02. Aufser diesen beiden Sorten wurden noch Glas, wie es zu Gefäßen dient, und Kristallglas geprüft. Die folgende Tabelle enthält einige Resultate.

(1) Ann. ch. phys. [3] XIX, 129 u. 252.

	Elasticitätscoefficient aus der Schallgeschwindigkeit.	Cohäsion in Kilogrm. für 1 Qu.-Millim. Querschnitt.	Elasticität u. Festigkeit verschiedener Körper.
Fensterglas	7917	1,763	
Spiegelglas	7015	1,400	
Farbloses Gefäßglas	6890	1,002	
Weißes od. farbiges Krystallglas	5477	0,665	

Die Dichte der Gläser nahm beim Anlassen etwas zu, dergleichen der Elasticitätscoefficient. Die Messung der Verlängerung gab für den letztern kleinere Werthe, als die Messung der Schwingungszahlen. Die gröfsere Elasticität der Gläser geht mit ihrer gröfseren Festigkeit Hand in Hand; diese Eigenschaften finden sich im geringsten Mafse bei den bleihaltigen Gläsern; bei solchen, welche kein Blei enthalten, finden sie sich in geringerem Mafse, wenn der Gehalt an Kalk klein und der an Kieselsäure verhältnißmäfsig grofs ist.

Chevandier und Wertheim (1) haben auch die mechanischen Eigenschaften der am Meisten vorkommenden Holzarten, welche seit Muschenbroek so oft untersucht worden sind, einer neuen Prüfung unterworfen, und dieselben nicht nur bezüglich der verschiedenen Arten, sondern auch bei der nämlichen Holzart in verschiedenem Alter, am obern und untern Theile des Stammes, am Umfang und im Innern desselben, in Form dünner Latten und Bretter wie in Form dicker Balken, ganz grün und in verschiedenen Stadien der Austrocknung verglichen. — In Richtung der Fasern liefsen sie quadratische Latten von 10^{mm} Dicke und 2^{te} Länge ausarbeiten, und bestimmten sie die Schallgeschwindigkeit aus den Längenschwingungen, die Elasticität aus der Verlängerung, die Cohäsion durch Belastung bis zum Zerreißen. Senkrecht zur Faserrichtung wurden Stäbchen in radialer und tangentialer Richtung ausgearbeitet, und die Elasticität und Schallgeschwindigkeit durch die Querschwingungen gemessen. Es bestätigte sich hierbei auf's Neue, dafs die aus den Schwingungen abgeleiteten Elasticitäts-

Mechanische
Eigenschaften
des Holzes

(1) *Compt. rend.* XXIII, 663; *Pogg. Ann. Ergänz.-Bd.* II, 481; ein Bericht darüber von Brogniart, Regnault u. Poncelet *Compt. rend.* XXIV, 537.

Mechanische
Eigen-
schaften der
Hölzer.

coëfficienten höher ausfallen, als die aus den Verlängen. In Beziehung der speciellen Resultate und Erfahrungen müssen wir auf die Abhandlung selbst verweisen aus der wir nur noch das Folgende entnehmen :

Namen der Holzart.	Dich- te.	Schallgeschwin- digkeit			Elasticitäts-Coëff.			Cohäsion	
		L	R	T	L	R	T	L	R
Acacie . .	0,717	14,19	—	—	1261,9	—	—	7,93	—
Tanne . .	0,493	13,96	8,05	4,72	1113,2	94,5	34,1	4,18	0,220
Hainbuche .	0,756	11,80	10,28	7,20	1085,7	208,4	103,4	2,99	1,007
Birke . .	0,812	13,32	6,46	9,14	997,2	81,1	153,2	4,30	0,823
Buche . .	0,823	10,06	11,06	8,53	980,4	269,7	159,3	3,57	0,885
Stieleiche .	0,808	—	—	—	977,8	—	—	6,49	—
Steineiche .	0,872	11,58	9,24	7,76	921,3	188,7	129,8	5,66	0,582
Kiefer (P. sylv.)	0,559	10,00	8,53	4,78	564,1	97,7	28,6	2,48	0,256
Sycamore . .	0,692	13,43	9,02	6,85	1163,8	134,9	80,5	6,16	0,522
Esche . .	0,697	14,05	8,39	7,60	1121,4	111,3	102,0	6,78	0,218
Erle . .	0,601	13,95	8,25	6,28	1108,1	98,3	59,4	4,54	0,329
Espe . .	0,602	15,30	9,72	5,48	1075,9	107,6	43,4	7,20	0,171
Ahorn . .	0,674	12,36	9,26	6,23	1021,4	157,1	72,7	3,58	0,716
Pappel . .	0,477	12,89	8,44	6,32	517,2	73,3	35,9	1,97	0,146
Ulme . .	—	—	8,56	6,11	—	122,6	63,4	—	0,345

L bezieht sich auf die der Faserrichtung nach geschnittenen Stäbe, welche bis auf 20 pC. Feuchtigkeit getrocknet waren, R auf die in Richtung des Radius, T auf die Richtung der Tangente der Jahresringe geschnittenen S

Elasticität u.
Cohäsion der
hauptsäch-
lichsten Ge-
bilde des
menschlichen
Körpers.

Wertheim (1) hat ferner die Elasticität und Cohäsion von Knochen, Sehnen, Muskeln, Nerven, Arterien und V des menschlichen Körpers untersucht. Er fand (die Cohäsion in Kilogramm. für 1 Qu.-Millim. Querschnitt) :

S u b s t a n z e n.		Geschl.	Alter. Jahre.	Spec. Gew.	Elastic- Coëff.
Knochen.	Wadenbein	W.	21	1,968	2181
"	Schenkelbein	W.	21	1,940	2710
"	Wadenbein	M.	30	1,984	1819
"	Schenkelbein	M.	30	1,997	2059
"	Wadenbein	W.	60	1,849	2421
"	Schenkelbein	W.	60	1,799	—
"	Wadenbein	M.	74	1,987	2638
"	Schenkelbein	M.	74	1,947	—
Sehnen des langen Fußsohlenmuskels .		W.	21	1,115	164,71
"	"	M.	35	1,125	199,42
" des Beugemuskels d. großen Zehe		M.	35	1,132	128,39

(1) Ann. ch. phys. [3] XXI, 885.

Substanz.	Geschl.	Alter. Jahre.	Spec. Gew.	Elastic. Coëff.	Cohäsion.
Sehnen des Beugemuskels der großen Zehe, leicht getrocknet . . .	M.	35	1,132	183,44	—
— desselben, vollkommen trocken . . .	M.	35	1,132	186,85	4,11
— des langen Fußsohlenmuskels . . .	M.	40	1,124	134,78	7,10
— desselben	W.	70	1,114	169,21	5,61
—	M.	74	1,105	200,50	5,89
Muskeln. Schneidermuskel	M.	1	1,071	1,271	0,070
— derselbe	W.	21	1,049	0,857	0,040
—	M.	30	1,058	0,352	0,026
—	W.	60	1,040	—	—
—	M.	74	1,045	0,261	0,017
Nerven. Innerer Kniekehlnerv	W.	21	1,038	—	0,769
— Lendennerv	W.	21	1,030	10,053	0,900
—	M.	35	1,071	23,943	0,963
— hinterer Schienbeinnerv	M.	35	1,040	—	1,959
—	M.	40	1,041	26,427	1,300
— Lendennerv	W.	60	1,028	13,517	0,800
— Wadenhautnerv	W.	70	1,052	23,878	3,530
— Lendennerv	M.	74	1,014	14,004	0,590
— hinterer Schienbeinnerv	M.	74	1,041	32,417	—
— äußerer Rosenadernerv	M.	74	1,050	—	—
— derselbe getrocknet	M.	74	1,129	164,20	9,46
Arterien des Schenkels	W.	21	1,056	—	0,1403
—	M.	30	1,014	0,052	0,1660
— desselben, knorpelig	W.	70	1,085	—	0,1070
Venen. Schenkelvene	W.	21	1,055	0,844	0,0969
— Innere Rosenader	W.	21	1,048	—	0,3108
— Schenkelvene	W.	70	1,019	0,883	0,1490

Elasticität u.
Cohäsion der
hauptsäch-
lichsten Ge-
bilde des
menschlichen
Körpers.

Aus Wertheim's Versuchen ergibt sich: 1) Das spezifische Gewicht der Sehnen, Muskeln und Venen nimmt mit zunehmendem Alter ab, das der Arterien dagegen zu, in Folge einer Verknöcherung der Wände. 2) Die Knochengebilde verlängern sich fast ganz proportional der Belastung, ähnlich wie die unorganischen Körper und Hölzer, die weichen Theile des Körpers dagegen verlängern sich anfangs in wachsendem Verhältniß und erst bei größerer Belastung tritt auch für sie nahezu das Verhältniß der einfachen Proportionalität ein. 3) Die Elasticitätscoefficienten der Knochen, Sehnen und Nerven scheinen mit dem Alter zuzunehmen, die der Muskeln dagegen sich beträchtlich zu vermindern. 4) Die Cohäsion aller Gebilde nimmt mit zunehmendem Alter ab. 5) Die Nervenstämme haben bei gleichem Querschnitte eine geringere Festigkeit als ihre

Elasticität u.
Cohäsion der
hauptsäch-
lichsten Ge-
bilde des
menschlichen
Körpers.

Zweige, und die letzteren eine geringere als ihre Faser so dafs die Festigkeit der Nerven in dem Mafs zu wachsen scheint, wie ihre Dicke abnimmt. 6) Wenn man die verschiedenen Gebilde nach der Gröfse ihres Elasticitätscoëfficienten oder nach ihrer Cohäsion ordnet, so erhält man in beiden Fällen die folgende Reihe: Knochen, Sehnen, Nerven, Muskeln, Venen, Arterien. 7) Durch Atrocknen wird die Elasticität und Cohäsion aller Theile vermehrt. — Die Versuche wurden 3 bis 4 Tage nach dem Tode angestellt. Für frische Muskeln scheint der Elasticitätscoëfficient etwa 1,15, die Cohäsion etwa 1,44 mal gröfs zu sein, als in der Tabelle angegeben.

Beziehungen
zwischen
dem Elasticitätscoëfficienten und der Schmelzwärme.

Person (1) bemerkt, dafs, wenn schon zwischen dem Elasticitätscoëfficienten mancher festen Körper und ihrer latenten Schmelzwärme sehr nahe eine Proportionalität bestünde, wie die Vergleichung von Zink mit Zinn, mit Bismuth lehre, dieses um so mehr der Fall sein müßte, wenn zwischen der latenten Schmelzwärme und einer Function des Elasticitätscoëfficienten, welche die Arbeit ausdrückt, die erfordert wird, um die Cohäsion der Molecüle in einer Einheit des Gewichts so weit zu ändern, als dieses in dem Uebergang vom starren in den tropfbaren Zustand nothwendig verbunden ist. Nimmt man einen Würfel von einer Einheit des Gewichts (1 Grm.), und σ als die Verlängerung, welche die Seite erleiden mufs, wenn die Cohäsion aufgegeben werden soll; nimmt man weiter bis zu dieser Grenze die Zugkraft der Verlängerung s proportional, so ist die zuzuwendende Kraft $3 \int_0^\sigma ds \cdot ks = \frac{3}{2} k \sigma^2$. Es sei p das specifische Gewicht, q der Elasticitätscoëfficient, $1000 q$ die Anzahl Gramme, welche einen Stab von 1^{mm} Querschnitt auf die doppelte Länge ausziehen vermögen, so ist $\frac{1}{p}$ alsdann das Volum des Würfels, $\frac{100}{p^{\frac{2}{3}}}$ der Querschnitt in Quadr-

(1) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 265; Compt. rend. XXVII, 258; ibid. 1848, 269.

millim., und $\frac{100000 q}{p^{\frac{1}{2}}}$ Grm. erzeugen eine Verlängerung von 1^m (der angenommenen Längeneinheit). — Ist S der Werth von σ , welcher der Längeneinheit entspricht, so ist $\sigma = \frac{S}{p^{\frac{1}{2}}}$ und die aufzuwendende Arbeit $= \frac{4,5q S^2}{p}$ in Kilogrammmetern.

Beziehungen zwischen dem Elasticitätscoefficienten und der Schmelzwärme.

Für zwei Metalle hat man daher $\frac{q S^2}{p} : \frac{q_1 S_1^2}{p_1} = 1 : 1$, wo 1 die latente Schmelzwärme bezeichnet. Person fand, daß den Beobachtungen Genüge geleistet wird, wenn man die Gleichung $\frac{S^2}{p+2\sqrt{p}} = \frac{S_1^2}{p_1+2\sqrt{p_1}}$ annimmt, woraus sich dann die Formel ableitet $q \left(1 + \frac{2}{\sqrt{p}}\right) : q_1 \left(1 + \frac{2}{\sqrt{p_1}}\right) = 1 : 1$.

Diese Formel bestätigt sich für Zink und Blei (5,28 ; 5,23), für Zinn und Blei (2,42 ; 2,65), Zink und d'Arcet'sche Legirung (3,92 ; 3,68), desgleichen für Cadmium und Silber. Die Elasticitätscoefficienten dieser beiden Metalle wurden von Wertheim mit großer Genauigkeit bestimmt. Die Rechnung giebt dem Cadmium die latente Schmelzwärme 13,52; Person's Messungen 13,66. Für das Silber giebt die Formel 20,38, der Versuch 21,07.

Die älteren Versuche über Zusammendrückbarkeit tropfbarer Flüssigkeiten leiden sämmtlich an einer Ungenauigkeit, welche daraus entstand, daß die Correction wegen der Zusammendrückbarkeit der Gefäßwände auf willkürlichen Voraussetzungen beruhte. Regnault (1) hat darum seine Versuche über Zusammendrückbarkeit des Wassers in Glas- und Messinggefäßen sowie über die des Quecksilbers in einem Glaspiezometer so eingerichtet, daß gleichzeitig die Volumänderung der Substanz der Gefäßwände daraus entnommen werden konnte. Die Compression geschah nicht durch eine Schraube, sondern durch gespannte Luft, was den großen Vortheil bietet, daß man die Kraft ganz allmählig kann einwirken lassen, so daß eine dauernde Formänderung des Piezometers nicht so leicht zu fürchten

Gleichgewicht tropfbarer Flüssigkeiten. Zusammendrückbarkeit derselben.

(1) Relation etc. (vgl. S. 70), 429.

Zusammen-
drückbarkeit
tropfbarer
Flüssigkeiten.

ist. In fünf aufeinander folgenden Versuchen war das Piezometer 1) aufsen und innen dem atmosph. Druck 2) aufsen einem stärkeren, innen dem atmosph. Druck 3) aufsen und innen dem stärkeren Drucke, 4) aufsen dem atmosph., innen dem stärkeren Drucke und 5) wieder dem atmosph. Druck wie unter Nr. 1) ausgesetzt. — Es ergaben sich hieraus jedesmal drei Gleichungen, deren zwei zur Bestimmung der Compression der Flüssigkeit und der Gefäßwand, dritte zur Controle diente. Die Formeln sind von Lamé entwickelt für 1) eine sphärische Hülle, 2) eine cylindrische Hülle mit ebenen und 3) eine cylindrische Hülle mit sphärischen Grundflächen. Bedeuten μ und k die kubische Zusammendrückbarkeit der Flüssigkeit und der festen Substanz, V und U die Volume der im Piezometer 1) u. 2) enthaltenen Flüssigkeit, N und M die Verhältnisse dieser Volume zu demjenigen der starren Masse des Piezometers, die scheinbare Verminderung von V und U bei einem äußern Drucküberschuß P ; \mathfrak{V}' und \mathfrak{V}'' die scheinbare Vermehrung bei bloß äußerem und bei innerem und äußerem Druck, so ist nach Lamé

für eine sphär. Hülle. $kP = \frac{1}{V} \left\{ \frac{4 \mathfrak{V}'}{9(N+1)} \right\}$ $\mathfrak{V}'' = \mathfrak{V} - \frac{4 \mathfrak{V}'}{9(N+1)}$ $\mu P = \frac{1}{V} \left\{ \mathfrak{V}'' + \frac{4 \mathfrak{V}'}{9(N+1)} \right\}$	für eine cylindr. Hülle mit ebener Grundfl. $kP = \frac{1}{U} \cdot \frac{3 \mathfrak{V}'}{8(M+1)}$ $\mathfrak{V}'' = \mathfrak{V} - \frac{3 \mathfrak{V}'}{8(M+1)}$ $\mu P = \frac{1}{U} \left\{ \mathfrak{V}'' + \frac{3 \mathfrak{V}'}{8(M+1)} \right\}$	für eine cylindr. Hülle mit sph. Grundfl. $kP = \frac{1}{U} \cdot \frac{3 \mathfrak{V}'}{(M+1)U + \frac{1}{2}(N+1)U}$ $\mathfrak{V}'' = \mathfrak{V} - \frac{3 \mathfrak{V}'}{(M+1)U + \frac{1}{2}(N+1)U}$ $\mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \mathfrak{V}'}{(M+1)U + \frac{1}{2}(N+1)U}$
--	---	---

Für das Wasser erhielt Regnault folgende Resultate

für den Druck von 1 Atmosph.	in einer Kupferkugel:	in einer Messingkugel:	in einem Glasgefäß sphär. Grundfl.
μ	0,000047709	0,000048288	0,000046677
k	0,000001317	0,000001440	0,000002368

Die Zusammendrückbarkeit des Quecksilbers ergab sich für den Druck von 1 Atmosph. = 0,000003517, also eine Belastung durch eine Quecksilbersäule von 1^m H = 0,000004628. — Bei Gelegenheit dieser Versuche fand Regnault, daß ein plötzlich einwirkender Druck von 1 Atmosphären aus dem Wasser nicht so viel Wärme bindet, um seine Temperatur um $\frac{1}{50}^{\circ}$ zu erhöhen.

Zusammen-
drückbarkeit
gasförmiger
Flüssigkeiten.

stoffgas und Kohlensäure sind stärker, Wasserstoffgas i
ger zusammendrückbar, als der Funktion $\frac{v \cdot P_0}{v_1 \cdot P_1}$ -
entspricht, welche das Mariotte'sche Gesetz ausdrückt.
man die Eigenschaft der ersteren Gase aus einem
kommenen Gaszustand erklären, so käme für das W
stoffgas die Ungereimtheit eines mehr als vollkor
Gaszustandes heraus. Regnault glaubt, daß $\frac{v \cdot P_0}{v_1}$
einer ziemlich verwickelten Funktion des Druck
der Temperatur gleich zu setzen sei, deren Form
perimentellem Wege allein wohl schwerlich werde
funden werden. Er berechnet Interpolationsformel
der Form $\frac{r}{m} = 1 + A(m-1) + B(m-1)^2$, w
das Verdichtungsverhältniß, r das Verhältniß der
kräfte bedeutet, und die Coëfficienten A und B die fo
Werthe erhalten :

	Atmosph. Luft.		Stickstoffgas.		Kohlensäure.		Wass
	Zeichen	log.	Zeichen	log.	Zeichen	log.	Zeichen
A	—	3,0435120	—	4,8389375	—	3,9310399	+ 4
B	+	5,2873751	+	6,8476020	—	6,8624721	+ 6

Aus diesen Formeln ergeben sich für das Verdic
verhältniß m die beistehenden Druckkräfte :

m	Atmosph. Luft.	Stickstoffgas.	Kohlensäure.	Wass
1	1,000000	1,000000	1,00000	1,
2	1,997828	1,998634	1,98292	2,
3	2,993601	2,995944	2,94873	3,
4	3,987432	3,991972	3,89736	4,
5	4,979440	4,968760	4,82880	5,
6	5,969748	5,980350	5,74296	6,
7	6,958455	6,972791	6,63985	7,
8	7,945696	7,964112	7,51936	8,
9	8,931573	8,954361	8,38152	9,
10	9,916220	9,943590	9,22620	10,
11	10,899724	10,931833	10,05345	11,
12	11,882232	11,919120	10,86324	12,
13	12,863888	12,905516	11,65541	13,
14	13,844670	13,891052	12,43018	14,
15	14,824845	14,875770	13,18695	15,
16	15,804480	15,859712	13,92608	16,
17	16,783675	16,942920	14,64771	17,
18	17,762562	17,825486	15,35148	18,
19	18,741258	18,807321	16,03733	19,
20	19,719880	19,788580	16,70540	20,

Von den Arbeiten über verschiedene Gegenstände der Allgemeine
Bewe-
gungslehre führen wir die folgenden an :
 Integration der Differenzialgleichungen der Bewegung eines materiellen Punktes sowie der allgemeinen Bewegungsgleichungen von Serret (1) und Sturm (2); über den Grundsatz der kleinsten Wirkung und seine Anwendbarkeit von Bonnet (3); Bemerkungen über Aehnlichkeit in der Mechanik von Bertrand (4); über Veränderung der willkürlichen Constanten in den Problemen der Dynamik von Ostrogradsky (5); eine Mittheilung über die symbolische Gleichung der Vibrationsbewegung in einem elastischen krystallisirten oder unkrystallisirten Mittel von O'Brien (6); eine Berechnung der Kraft, womit die Molecüle zusammenhängen und womit dieselben beim Entstehen von Niederschlägen aus der Auflösung zusammengeführt werden, nach dem Newton'schen Gravitationsgesetze von Seguin (7); über die Bewegung eines Systems von Molecülen, deren jedes aus mehreren Atomen besteht, von Cauchy (8). Ettingshausen (9) giebt eine unmittelbare Herleitung der Differenzialgleichungen der unendlich kleinen Bewegungen eines homogenen Systems von Molecülen aus den allgemeinen Gleichungen der unendlich kleinen Verschiebungen der Schwerpunkte der Molecüle irgend eines Systems.

Timmermanns (10) theilt folgenden Satz zur Theorie der Trägheitsmomente mit : Wenn man um jeden Punkt einer Axe, welche durch einen Körper gelegt ist, das Ellipsoid der Trägheitsmomente construirt, so wird die Axe ein Durchmesser dieser sämmtlichen Ellipsoide sein, und die damit conjugirten Diametralebene gehen alle durch eine nämliche Gerade, welche die Richtung des Stosses angiebt, durch welchen kein Druck auf die Axe ausgeübt

(1) Instit. 1848, 173 u. 183. — (2) Instit. 1848, 190. — (3) Instit. 1848, 184. — (4) Compt. rend. XXV, 163. — (5) Petersb. Acad. Bull. VII, 113. — (6) Phil. Mag. [3] XXXI, 376. — (7) Compt. rend. XXVII, 314. — (8) Compt. rend. XXIV, 414. — (9) Compt. rend. XXIV, 801. — (10) Instit. 1848, 42.

Trägheits-
momente.

wird. — Diese Grade steht im Allgemeinen schief auf Ebene, welche durch die Axe und den Schwerpunkt geht. Sie steht nur dann senkrecht, wenn die Axe bezüglich einer ihrer Punkte Hauptaxe der Trägheitsmomente ist. Im Falle der schiefen Stellung übt ein Stoß längs der gemeinschaftlichen Durchschnittslinie gar keinen Druck auf die Axe aus, sondern erzeugt eine Wirkung in der Richtung der Axe selbst.

Bewegung
starrer
Körper.
Bewegung
von Wurfge-
schossen.

Didion (1) theilt einen Auszug aus einer Arbeit über die wahre Bahn der Wurfgeschosse mit. Die analytische Lösung des Problems gab Resultate, welche mit allen früheren Beobachtungen, von welchen Didion eine Uebersicht giebt, nicht hinreichend übereinstimmen. Didion hat deswegen die Berechnung der Ballistik auf's Neue genommen, indem er den Widerstand der Luft zwei Größen, welche die zweite und dritte Potenz der Geschwindigkeit enthalten, proportional annahm. Seine Resultate stimmen mit den Mittelwerthen aus den 1844 und 1846 zu Montpellier angestellten Messungen sehr genau. Die Abweichung der Tragweiten und der Bahnen einzelner Schüsse schreibt Didion auf Rechnung besonderer ablenkender Ursachen, welche neben der Schwere und dem Luftwiderstande wirken sollen, jedoch vorerst nicht näher bezeichnet werden.

Elasticitäts-
Coefficient u.
Drehschwin-
gungen.

Die Elasticitätscoefficienten, welche aus den Drehschwingungen hergeleitet wurden, fielen immer kleiner aus, als die durch directe Beobachtungen bestimmten. Das gilt für die Versuche Coulombs, welche Biot berechnet, sowie für diejenigen von Duleau, Savart, Bevan und Giulio. — Wertheim (2) hat die allgemeinen Gleichungen des Gleichgewichts und der Bewegung elastischer Körper in einer Weise umgeändert, daß die Beziehungen zwischen dem Elasticitätscoefficienten und den Längen- und Querschnitten zwar die nämlichen bleiben, die jenes Coefficienten zu den Drehschwingungen aber sich modificiren.

(1) Compt. rend. XXVII, 495; Instit. 1848, 143. — (2) Instit. 1848, 397; Ann. ch. phys. [3] XXV, 209.

Sind n und n' die Anzahl der Längen- und Drehschwingungen des tiefsten Tones, welchen ein am einen Ende eingespannter Stab giebt, so hat man für einen cylindrischen Stab

Elasticitäts-
Coefficient u.
Drehschwin-
gungen.

$$\text{nach Poisson's Formeln } \frac{n}{n'} = \sqrt{\frac{5}{2}} = 1,5811$$

$$\text{nach Wertheim's Formeln } \frac{n}{n'} = \sqrt{\frac{8}{3}} = 1,6330$$

Savart hat dieses Verhältniß durch den Versuch = 1,6668, Wertheim = 1,6309 gefunden.

Kirchhoff (1) theilte eine Bemerkung über die Theorie des Gleichgewichtes und der Bewegung einer elastischen Platte mit.

Poiseuille (2) hat in einer früheren Arbeit über die Ausflusgeschwindigkeit des Wassers und des Weingeistes aus engen Röhren gefunden, daß diese Geschwindigkeit sich direct wie der Druck und umgekehrt wie die Länge der Röhre verhält, vorausgesetzt, daß diese Länge nicht unter eine gewisse Grenze herabgeht, welche mit ihrem Durchmesser ab- und zunimmt; während bei kürzeren Röhren die Geschwindigkeit in stärkerem Verhältnisse wächst, als der Druck. Er fand ferner, daß, wenn alle übrigen Umstände die nämlichen sind, die Ausflusmengen sich wie die vierten Potenzen der Röhrendurchmesser verhalten. Bezeichnet man die Ausflusmenge mit Q , den Druck durch die Höhe einer Wassersäule H , den Durchmesser der Röhre durch D , ihre Länge durch L , so ist $Q = k \frac{H \cdot D^4}{L}$, worin k ein von der Natur der Flüssigkeit abhängiger Coëfficient ist, welcher rasch mit der Temperatur wächst. Für Wasser von der Temperatur t fand Poiseuille :

Bewegung
tropfbar-
flüssiger
Körper.
Ausflus-
geschwindig-
keit von
Flüssigkeiten
aus engen
Röhren.

$$Q = 183,6724 (1 + 0,0336793t + 0,0002209936t^2) \frac{H \cdot D^4}{L}$$

Die Versuche mit Alkohol und Mischungen aus Alkohol und Wasser gaben das merkwürdige Resultat, daß Alkohol

(1) Compt. rend. XXVII. 394. — (2) Mém. des Savans étrang. IX; Ann. ch. phys. [3] VII, 50.

Ausfluss-
geschwindig-
keit von
Flüssigkeiten
aus engen
Röhren.

langsamer ausfließt als Wasser, ferner, daß absoluter Alkohol von dem spec. Gewicht 0,8000 und eine Mischung von 1 Theil Alkohol mit $17\frac{1}{2}$ Gewichtstheilen Wasser von dem spec. Gewicht 0,9893 beinahe gleich schnell ausfließen, während eine Mischung von fast gleichen Gewichtsmengen beider Flüssigkeiten von der Dichte 0,93 mehr als die doppelte Zeit zum Ausfließen braucht. Es ist dies nach Rudberg die Mischung von stärkster Verdichtung.

Nachdem Poiseuille sich überzeugt hatte, daß die Ausflusgeschwindigkeit von Flüssigkeiten durch Beimischung von Körpern, welche sich darin lösen, auf gleiche Weise verändert wird, mag der Ausfluß durch starre Röhren von Glas oder Metall oder durch Röhren aus organischen Substanzen, wie sie z. B. die Capillargefäße der Thiere darstellen, stattfinden, unternahm er im Interesse der Physiologie eine ausführliche Untersuchung (1) über die Beschleunigung oder Verzögerung, welche der Ausfluß des Wassers durch enge Glasröhren erleidet, wenn demselben Salze, Säuren, Basen in so geringen Quantitäten beigemischt werden, wie sie etwa in den Flüssigkeiten des thierischen Körpers enthalten sind. Durch diese geringe Beimischung von fremden Substanzen zu dem Wasser unterscheidet sich die Untersuchung Poiseuille's von einer ähnlichen, welche Girard im Jahr 1817 anstellte und bei welcher jene Substanzen im Verhältniß von $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ oder gar $\frac{1}{4}$ zugesetzt wurden. Die folgende Tabelle enthält die Resultate Poiseuille's. Die Salze sind nach den Säuren zusammengestellt, weil diese die Wirkung vorzugsweise zu bedingen scheinen.

(1) Ann. ch. phys. [3] XXI, 76.

Ausfluss-
geschwindig-
keit von
Flüssigkeiten
aus engen
Röhren.

Substanz.	M	Z	Substanz.	M	Z
T = 12° 7.			D. L=105; D=0,17; H=1998,6; T = 12°, 8.		
Alaun	1,0	575,8	Essigsaur. Ammoniak	2,0	123° 38''
" " " " " " " "	4,0	632,4	" " " " " " " "		122° 25''
Phosphors. Kali.	1,0	583,4	B. H = 1000; T = 11°, 9.		
" " " " " " " "	4,0	602,7	Festes Kali	2,0	564,7
" Natron	1,0	588,6	" Natron	2,0	579,4
" " " " " " " "	4,0	622,8	Concentr. Ammoniak	10,0	611,4
" Ammoniak	1,0	590,2	" " " " " " " "		628,7
" " " " " " " "	4,0	626,2	" " " " " " " "	rein	725,4
T = 11°, 2.			T = 11°, 2.		
Arseniks. Kali	1,0	575,6	Jodwasserstoffsäure	1,0	574,9
" " " " " " " "	2,0	583,3	" " " " " " " "	4,0	575,0
" Natron	1,0	590,8	Salpetersäure	1,0	574,5
" " " " " " " "	4,0	617,3	" " " " " " " "	3,2	573,9
Saur. kohlenst. Ammon.	1,0	580,6	" " " " " " " "	8,2	574,6
" " " " " " " "	1,0	580,4	" " " " " " " "		573,3
" " Natron	1,0	589,8	T = 11°, 8.		
Kohlens. Ammoniak	1,0	583,8	Feste Jodsäure	1,0	566,2
" " " " " " " "	4,0	602,9	" " " " " " " "	3,4	570,1
" Kali	1,0	588,3	" " " " " " " "		578,5
" " " " " " " "	4,0	617,0	E. L=27; D=0,1316; H=2012,2; T = 10°.		
" Natron	1,0	592,5	Blausäure	33,3	499
" " " " " " " "	4,0	622,7	" " " " " " " "		489
T = 11°, 8.			F. L=70; D=0,207; H=2039,4; T = 10°.		
Oxals. Kali	1,0	566,2	Reines Serum		1448
" " " " " " " "	10,0	571,1	100 Wasser zu 500 Serum		1277
" Ammoniak	1,0	620,1	100 Blausäure desgl.		1278
" " " " " " " "	4,0	574,2	100 Schwefelwasserst. desgl.		1266
" Natron	1,0	596,6	B. H = 1000; T = 11°, 6.		
Saur. oxals. Kali	1,0	578,4	Bromwasserstoffsäure	1,0	568,3
" " " " " " " "	1,0	573,4	" " " " " " " "	7,2	569,7
B. H = 858; T = 14°, 1.			Bromsäure	1,0	571,4
Essigs. Bleioxyd	1,0	620,0	" " " " " " " "	3,2	569,3
" " " " " " " "	4,0	633,1	" " " " " " " "		570,5
" " " " " " " "	4,0	653,5	T = 11°, 2.		
B. H = 1000; T = 11°, 4.			Salzsäure	1,0	575,8
Citronens. Eisen	2,0	571,1	" " " " " " " "	2,0	577,3
" " " " " " " "		595,3	" " " " " " " "	10,0	579,5
T = 11°, 2.			" " " " " " " "	20,0	591,8
Brechweinstein	1,0	575,8	Kohlensäure	gesätt.	604,3
" " " " " " " "	4,0	581,2	Künstl. Selswasser.	gesätt.	580,5
" " " " " " " "	4,0	594,7	" " " " " " " "		584,2

Ausfluss-
geschwindig-
keit von
Flüssigkeiten
aus engen
Röhren.

felwasserstoff zum größten Theil oder ganz aufgehoben, durch einen Gehalt an Kohlensäure dagegen verstärkt.

In der folgenden Tabelle sind die Ausflusgeschwindigkeiten solcher Flüssigkeiten, welche als Nahrungsmittel dienen, verglichen, und der Einfluss verschiedener Körper auf die Ausflusgeschwindigkeit des Blutserums angegeben.

Substanz.	M	Z	Substanz.	M	Z
B. H = 800; T = 18°.			B. H = 1000; T = 11°, 2.		
Schwarzer Thee (*)	0	602,0	Serum von Ochsenblut	rein	575,2
"	rein	611,5	zu 100 Thln. Serum:		1048,5
Schwarz. u. grüner Thee			Schwefelsäure (**)	0,5	1057,4
in gleichen Theilen.	rein	614,0	"	1,0	1033,2
Grüner Thee	rein	618,2	"	1,0	1035,5
"	10	604,3	Citronensäure	10,0	1140,2
"	20	606,5	Essigsäure	1,0	1041,3
"	33,3	608,3	"	10,0	1070,7
"	100	610,6	Weinsteinsäure	1,0	1041,1
"	300	615,8	"	10,0	1233,5
B. H = 1000; T = 11, 2.			B. H = 1000; T = 14°, 5.		
Madera	rein	575,8	Aether	rein	535,2
Moussirender Wein	"	1134,1	"	10	160,0
" (Sillery)	"	1152,9	Alkohol v. 80° (Alkoholom.)	rein	773,3
Rum von Jamaica	"	1462,8	Concentr. Ammoniak	"	1184,5
	"	1831,9	Ammoniak mit 10 Thln.		688,1
B. H = 1000; T = 9°, 2.			Alkohol	"	1320,6
Guaiacodecoct	rein	611,2	Serum von Ochsenblut.	"	1029,0
Chinacodecoct	"	612,4	Aether in Serum	1	1038,8
"	"	625,1	"	2	1055,5
"	100	617,4	Alkohol in Serum	40	1223,4
Eibischdecoct	rein	646,5	Ammoniak	10	1000,1
"	100	634,5	"	20	981,6
			Aether im alkoholisirt.		
			Serum (s. o.)	40	1434,1
			Ammoniak in demselb.	40	1179,6
			"	70	1141,5

Das Ammoniak fließt langsamer als Wasser und verzögert dessen Bewegung, es beschleunigt dagegen den Ausflus sowohl des reinen, als des mit Alkohol versetzten Serums. Poiseuille meint, daß die Bekämpfung des Zustandes der Trunkenheit durch Ammoniak auf dieser Wir-

(*) Auf den Thee ward sein fünffaches Gewicht siedenden Wassers gegossen.

(**) Die concentrirte Schwefelsäure ward mit dem achtfachen, die Citronen-, Essig- und Weinsteinsäure vorher mit ihrem vierfachen Gewicht Wasser gemischt.

ng beruhe. Poiseuille hat noch die Ausflusgeschwindigkeit der Blutflüssigkeit untersucht; es flossen eiche Mengen der folgenden Flüssigkeiten aus :

Serum in	20 Min. 23 Sec.
„ das eine geringe Menge Blutkügelchen enthielt	21 „ 17 „
Blut, welches von Fibrin befreit war, in	68 „ 47 „

Von Saint Venant (1) ist eine Arbeit über die Theorie des Widerstandes in Flüssigkeiten erschienen, wozu das Paradoxon von d'Alembert, daß ein in eine bewegte Flüssigkeit getauchter fester Körper von jener keinen Stofs erleiden, oder derselben keinen Widerstand entgegenzusetzen soll, durch gehörige Berücksichtigung der Reibung zwischen der Flüssigkeit und dem festen Körper aufgehoben ist. An die Stelle des Paradoxons tritt der Satz : Eine in Bewegung befindliche Flüssigkeit übt auf einen in dieselbe getauchten Körper einen Stofs aus, gleich der Reibungsarbeit der Reibung zwischen der Flüssigkeit und dem starren Körper sowohl als zwischen den flüssigen Theilen selbst.

Stofs bewegter Flüssigkeiten auf eingetauchte Körper.

De Caligny (2) beschreibt das Resultat einiger Versuche über das Intermittiren eines Wasserstrahls, welcher entweder aus theilweise verstopften Oeffnungen heraustritt, oder als Centralstrahl von mehreren andern Strahlen umgeben ist.

Außerdem sind über die Bewegung von Flüssigkeiten noch folgende Arbeiten mitgetheilt worden : über die Continuitätsgleichung für die Bewegung von Flüssigkeiten, von Poisson (3); über die Bewegung einer Flüssigkeit in einem gleichartigen Mittel, von Magnus (4); über die Zunehmziehung des Wasserstrahls, von Hagen (5).

Person (6) macht darauf aufmerksam, daß das Problem des Hebers, der sich selbst ansaugt wenn nur sein

Heber, welcher sich selbst ansaugt.

(1) Compt. rend. XXIV, 248; Bericht Cauchy's über zwei Abhandl. Verf., angez. Compt. rend. XXIV, 675. — (2) Instit. 1848, 127. — Phil. Mag. [3] XXX, 104. — (4) Berl. Acad. Ber. 1847, 305. — Berl. Acad. Ber. 1847, 108. — (6) Compt. rend. XXVII, 321; Instit. 1847, 294; Dingl. pol. J. CX, 155.

Heber,
welcher sich
selbst
ausaugt.

längerer Schenkel zuvor gefüllt war, in Péclet's Physik falsch gelöst sei. Ist a der kürzere, c der längere der beiden verticalen Schenkel und ist b der horizontale Schenkel, so giebt Péclet die Bedingung $c > 2a + b$, während die richtige Formel $c > a + \frac{H(a+b)}{H-a}$ ist, worin H die Höhe einer Flüssigkeitssäule von ein Atmosphäre Druck bedeutet.

Bewegung
gasförmiger
Körper.
Ausfluss
von Gasen.

Blake (1) hat eine theoretische Betrachtung über den Ausfluss von Gasen angestellt, welche wir darum nicht näher mittheilen, weil dieselbe zu völlig ungereimten Resultaten geführt hat, wie unter Anderm, dass die Geschwindigkeit und Ausflussmenge aus einem Gefäße in dem leeren Raum oder in ein anderes gaserfülltes Gefäße ganz gleich seien, vorausgesetzt, dass die Luft im letzteren noch nicht halb so dicht sei, als die im erstern Gefäße.

Dynamik
der Erde.
Dichte des
Erdkerns.

Wenn p den Druck an irgend einem Punkte des flüssigen Erdinnern, r die an demselben Punkte herrschende Dichte bedeutet, so folgert Roche (2) aus der Gleichung $\frac{dp}{dr} = Ar + Br^3$ das Gesetz der Dichte $r = r_0 (1 - \beta a^2)$ wo a den Halbmesser der Schichte bedeutet. $\beta = 0,8$ genügt der Praecession, sowie der Abplattung von $\frac{1}{11}$. Die Formel giebt für eine mittlere Dichte 5,5, an der Oberfläche die Dichte 2,1, in der Mitte des Halbmessers 8 und im Mittelpunkt 10,5, die Abplattung der Schichten nimmt zu von $\frac{1}{11}$ im Mittelpunkt bis $\frac{1}{11}$ an der Oberfläche. Die Schwere wächst unter Voraussetzung des obigen Gesetzes von der Oberfläche aus bis zu 0,82 des Halbmessers, bei 0,65 hat sie denselben Werth wie an der Oberfläche, und nimmt dann bis zum Mittelpunkt rasch ab.

Anziehung
des
Erdsphäroids.

Guiot (3) hat eine Abhandlung mitgetheilt über die Anziehung der Erde auf Punkte ihrer Oberfläche und die Ableitung der elliptischen Gestalt des Erdsphäroids. Er geht dabei von einem ihm eigenthümlichen Satze aus, wel-

(1) Sill. Am. J. [2] V, 78. — (2) Instit. 1848, 185. — (3) Compt. rend. XXV, 195.

Theorie der
Maschinen.
Theorie der
Dampf-
maschinen.

Crelle (1) kündigt eine ausführliche mathematische Theorie der Dampfmaschinen an. Er unterscheidet an Dampfmaschine die Theile, welche zur Erzeugung Kraft dienen, wie Esse, Kessel, Schornstein, Heiß- und Kaltwasserpumpe, welchen man im Allgemeinen mit mathematischer Behandlung darum noch nicht beikommen kann, weil es noch an der physikal. Grundlage allzusehr fehle, von den Theilen für Benutzung der Kraft, wie Dampftrieb, Wagebalken, Steuerung der Klappen, Wassersturz (bei einfach wirkenden Maschinen, welche Wasser aus verschiedenen Tiefen heben sollen), Regulator, Condensator. Die wahre Theorie der letztern Theile sei zwar von Pambour in ihren Hauptgrundzügen gegeben; noch aber bleibe Einzelnen Vieles zu thun. Crelle verspricht Untersuchungen über die Theorie des Schwungrades, der Absperrung des Wassersturzes, des Watt'schen Vierseitgelenkes, wie über das vortheilhafteste Maschinensystem überhaupt. Einstweilen theilt Crelle Resultate bezüglich des Schwungrades mit.

Im weiteren Verlaufe seiner Untersuchungen (2) beschäftigt sich Crelle specieller mit der Absperrung und mit der Frage, ob der Wassersturz, — welcher da angewendet wird, wo die Maschine Wasser aus veränderlicher Tiefe zu holen, oder überhaupt sehr veränderliche Widerstände überwinden hat, — nicht durch eine Einrichtung von zuverlässigerer Wirkung zu ersetzen sei. Er bejaht diese Frage und schlägt eine ziemlich einfache, bessere Einrichtung vor. Crelle findet auf theoretischem Wege, daß Woolf's Expansionsmaschine mit zwei Cylindern den größten Nutzeffect giebt, viermal so viel, als eine Maschine mit Niederdruck und Condensation ohne Absperrung. — Weiter findet er, daß durch die Dampfstrahlventilation in den Locomotiven viel Kraft verloren gehe und daß man weit vortheilhafter eine andere Ventilationsart anwende.

(1) Berl. Acad. Ber. 1847, März. — (2) Berl. Acad. Ber. 1848, April. Institut. 1848, 369.

Aerometer-
Pipette.

senen Raume gleich ist. In der Nähe des unteren Ende ist die Röhre in ein erweitertes Gefäß ausgeblasen, welche über dieselbe von Oben her ein gläsernes Schwimmgefäß gezogen, so daß das Ganze als Aerometer schwimmt. Die Dimensionen sind so abgemessen, daß das Instrument 1000 Gran Wasser im Inneren faßt, in der nämlichen Stellung, in welcher der Glaskörper 1000 Gran Wasser verdrängt, und vermöge der oben erwähnten Eigenschaft des Halses erhält man das nämliche Gewicht auch in Flüssigkeiten von größerer Dichte, indem hier das Instrument weniger tief einsinkt. Man kann es von dem Niveau der ersten Einsenkung bis zur Schwimmkugel herab benutzen. Schafhäutl's Instrument diente von 1,000 bis 1,026 spec. Gew. — Das Nähere über die complicirte Anfertigung und Adjustirung des Instrumentes siehe a. a. O.

Aneroid-
Barometer.

Das Aneroidbarometer, von Vidi (1) erfunden, besteht aus einer $\frac{1}{4}$ Zoll tiefen Metallbüchse, welche luftleer gemacht und dann hermetisch verschlossen ist. Der obere Boden ist dünn, und seine Beweglichkeit durch concentrisch eingeritzte Kreise noch gesteigert, so daß er bei jeder Aenderung des Luftdruckes eine andere Lage einnimmt. Die Dose ist in eine runde Büchse eingelegt, und mit dem Mittelpunkt des beweglichen Bodens ein Hebelwerk verbunden, welches jede Bewegung, 600—700 mal vergrößert auf einen Zeiger überträgt, der sich auf der Außenseite der Büchse an einer Theilung herbewegt. Einmal mit dem Quecksilberbarometer verglichen, können die Beobachtungen an demselben durch die am Aneroidbarometer ersetzt werden, vorausgesetzt, daß man keine größere Genauigkeit als bis auf $\frac{1}{4}$ Linie verlangt (2). Veränderungen der Temperatur haben keinen merklichen Einfluß auf den Gang dieses Barometers. Er ist leicht transportabel, da die Büchse nur etwa 4 Zoll im Durchmesser und $1\frac{1}{2}$ Zoll in der Dicke mißt.

(1) Compt. rend. XXIV, 975; Pharm. J. Trans. VII, 479.

(2) Pogg. Ann. LXXIII, 620.

Außerdem führen wir noch an : ein Sphärometer von ^{Apparate} Perreaux (1), Verbesserung des Wheatstone'schen Chronoscops von Hipp (2); Messung periodischer Bewegungen von grosser Schnelligkeit von Doppler, mitgetheilt von Bolzane (3); eine Uhr mit conischem Pendel von L. Foucault (4), Bemerkungen hierzu von Arago (5), Winckler (6), St. Preuve (7) und Garnier (8); über ein Centrifugalpendel mit wirklichem Isochronismus von Pecqueur (9); ein Mittel, die astron. Pendel dem Einflusse der Aenderungen der Temperatur und des Druckes zu entziehen, von Faye (10); Compensation der astron. Uhren von Perro (11) und von Lauguier (12); Verbesserung des parabol. Pendels von Huyghens, von St. Preuve (13); über ein neues System hydraulischer Motore von de Caligny (14) und Bourdon (15); Schraubenpumpe von Guillemot (16); Barometer von Lefranc (17); Verbesserungen an Ärostaten von Gaudin (18); Anemometer von Henry (19) und Cockburn (20), Reflexionsanemometer von Aimé (21), Schraube als Luftmotor von Planzanet (22); Locomotive durch Kohlensäure getrieben von Jagu (23); Hydraulischer Telegraph von Pighi (24).

- (1) *Compt. rend.* XXVII, 585. — (2) *Pogg. Ann.* LXXIV, 589. — (3) *Pogg. Ann.* LXXII, 530. — (4) *Compt. rend.* XXV, 154. — (5) *Compt. rend.* XXV, 160. — (6) *Compt. rend.* XXV, 214. — (7) u. (8) *Compt. rend.* XXV, 215. — (9) *Compt. rend.* XXV, 251. — (10) *Compt. rend.* XIV, 875. — (11) *Compt. rend.* XXV, 940. — (12) *Compt. rend.* XXV, 415 u. 941. — (13) *Compt. rend.* XXV, 392. — (14) *Compt. rend.* XXVII, 430; *Instit.* 1848, 21. — (15) *Instit.* 1848, 87. — (16) *Compt. rend.* XXVII, 447. — (17) *Pogg. Ann.* LXXIV, 462. — (18) *Compt. rend.* XXIV, 306. — (19) *Compt. rend.* XXIV, 877. — (20) *Instit.* 1848, 52. — (21) *Ann. ch. phys.* [3] XVII, 498; *Pogg. Ann.* LXX, 578. — (22) *Compt. rend.* XXIV, 446. — (23) *Compt. rend.* XXVI, 339. 390. — (24) *Compt. rend.* XXIV, 387.

A k u s t i k.

Schall-
geschwin-
digkeit
in tropfbar-
flüssigen Kör-
pern.

Um die Schallgeschwindigkeit in Flüssigkeiten aus
Tone abzuleiten, welche diese Flüssigkeiten in einer
Orgelpfeife geben, hat Wertheim (1) einen Apparat
struirt, welcher aus einem Flüssigkeitsreservoir, einer
Orgelpfeife, einer Pumpe, einem Luftbehälter und ei-
nem Manometer besteht. Die Pfeife kann mit Hilfe der Pu-
mpe beliebig mit Luft oder mit der betreffenden Flüssig-
keit angeblasen werden. In dem letzteren Fall gehört be-
sondere Sorgfalt dazu, die falschen zischenden Töne zu
vermeiden; der Mund der Pfeife muß etwas weniger breit
lang sein als für den Fall des Anblasens mit Luft,
die Spalte muß größer, und die Lippe mehr nach Innen
gebogen sein. Luftblasen oder leichtes in der Flüssig-
keit suspendirtes Pulver verhindern das Zustandekommen
des Tones gänzlich. Bei Vermeidung aller dieser Einflüsse
erhält man den Grundton und die harmonischen Töne,
je nach dem angewendeten Drucke. Wenn
Orgelpfeifen mit Luft angeblasen werden, geben sie
einen tieferen Ton, als man nach der Länge der Pfeife
und der bekannten Schallgeschwindigkeit in der Luft
warten sollte. — Liskovius (2) hat bewiesen, daß die
Senkung des Tones bei sonst gleichen Umständen mit
der Größe des Querschnittes wächst. Jene hat ihren Grund
in einer Verlängerung der schwingenden Luftsäule über
die Grenzen der Pfeife hinaus, und ist also bei offenen
Pfeifen beträchtlicher als bei gedeckten, da bei letzteren
eine solche Störung nur am Mundstück eintreten kann.
Nimmt man zu einem Mundstück zwei offene Röhren
von L_1 und L_2 , und geben diese Grundtöne von n_1 und n_2 , so
ergeben sich daraus, woraus dann ohne weitere Correction die Schall-

(1) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 434; Compt. rend. XXIV, 656; X
150; Pogg. Ann. Ergänz.-Bd. II, 497. — (2) Pogg. Ann. LVIII
LX, 482.

geschwindigkeiten v_1 und v_2 sich berechnen, und sind endlich x und y die Correctionen am Mundstück und am oberen Ende ausgedrückt in der nämlichen Einheit, wie die Röhrenlänge, so hat man $x + y = \frac{v_2 - v_1}{n_1 - n_2}$, und wenn n_1' und n_2' , v_1' und v_2' die nämliche Bedeutung für die gedeckten Röhren haben $x = \frac{v_1' - v_2'}{2(n_1' - n_2')}$. Die Correctionen können sonach gesondert berechnet werden; allein eine Hauptschwierigkeit bleibt zurück, indem der Grundton nicht ganz fix ist, sondern mit der Stärke des Windes sich etwas ändert. Will man die harmonischen Obertöne benutzen, so fällt der abgeleitete Grundton um so höher aus, je höher der benutzte harmonische Ton liegt. — Wertheim berechnete die Correctionen nur aus solchen Tönen, welche mit gleichen Druckkräften hervorgebracht wurden. Er fand bei dieser Gelegenheit, indem er die den verschiedenen Obertönen am Meisten zusagenden Druckkräfte verglich, daß sich dieselben, wenn Luft, oder wenn tropfbare Flüssigkeiten tönen, wie die Quadrate der Ordnungszahlen in der harmonischen Reihe verhalten. — Die auf diese Weise gemachten zahlreichen Bestimmungen der Schallgeschwindigkeit weichen nie um mehr als 1 pC. von der auf anderem Wege gefundenen ($332^m,3$) ab. Die Geschwindigkeit des Schalles ist also in einer unbegrenzten Luftmasse die nämliche, wie in einer cylindrischen Säule.

Die Messungen der Töne des in der Pfeife schwingenden Wassers ergeben die Schallgeschwindigkeit von $1173^m,4$ bei 15° C . Nimmt man an, daß das oben (S.128) für die starren Körper abgeleitete Gesetz auch für die tropfbarflüssigen Körper gelte, so erhält man für 15° die Schallgeschwindigkeit $1173,4 \cdot \sqrt{\frac{1}{4}} = 1437^m,1$, während die Beobachtung bei 9° 1435^m ergeben hat. Man muß also annehmen, daß auch in Flüssigkeiten sich die Schallgeschwindigkeit in unbegrenzter Masse zu der in einem flüssigen Faden verhält wie $\sqrt{\frac{1}{4}} : 1$, was nur möglich ist, wenn das Gesetz der Gleichheit des Druckes nach allen

Schall-
geschwindig-
keit in tropf-
bar - flüssigen
Körpern.

Schall-
geschwindig-
keit in tropf-
bar-flüssigen
Körpern.

Seiten, in der schwingenden Flüssigkeitsmasse nicht mehr herrscht. — Durch experimentelle Bestimmung der an der Röhrenlänge anzubringenden Correctionen, Messung der Schwingungszahlen und Berücksichtigung des eben ausgesprochenen Satzes, sind die folgenden Werthe erhalten worden :

Flüssigkeit.	Temp.	Dichte.	Schallgeschwindigkeit		Zusammen- drückbarkeit
			in einer Säule.	in unbegrenzt.M.	
Seinewasser . . .	15°	0,9996	1173 ^m ,4	1437 ^m ,1	0,0000465
Künstl. Meerwasser	20°	1,0264	1187 ^m ,0	1453 ^m ,8	0,0000467
Lösung v. Cl Na . .	18°	1,1920	1275 ^m ,0	1561 ^m ,6	0,0000479
" SO ₃ NaO	20	1,1089	1245 ^m ,2	1525 ^m ,1	0,0000392
" CO ₂ NaO	22,2	1,1828	1301 ^m ,8	1594 ^m ,4	0,0000337
" NO ₂ NaO	20,9	1,2066	1363 ^m ,5	1669 ^m ,9	0,0000301
" Cl Ca .	22,5	1,4322	1616 ^m ,3	1979 ^m ,6	0,0000181
Absol. Alkohol . .	23,0	0,7960	947 ^m ,0	1159 ^m ,8	0,0000347
Terpenthinöl . .	24,0	0,8622	989 ^m ,8	1212 ^m ,3	0,0000300
Schwefeläther . .	0,0	0,7529	946 ^m ,3	1159 ^m ,0	0,0001002

Fortpflan-
zungsge-
schwindigkeit
des Schalles
in der Luft.

Challis (1) hat die mathematische Theorie der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalles und der Luftvibrationen einer neuen Behandlung unterworfen und dadurch Veranlassung zu einer Discussion gegeben, an welcher sich Airy (2) und Stokes (3) theilnahmen, welche indefinit bis jetzt ohne erhebliche Resultate geblieben ist.

Wie Challis, so hat auch Blake (4) die Laplace'sche Correction der Newton'schen Formel für die Schallgeschwindigkeit angefochten. Ist H die Höhe einer Luftsäule, von überall der nämlichen Dichte wie am Orte der Schallverbreitung, welche einen dem atmosphärischen gleichen Druck ausübt, ist h die Höhe einer gleich dichten Luftsäule, deren Druck der Vermehrung der Dichte entspricht wie sie in der Schallwelle wirklich eintritt, so findet Blake die Geschwindigkeit des Schalles derjenigen gleich, welchen ein durch den Raum $\frac{H+h}{2}$ fallender Kör-

(1) Phil. Mag. [3] XXXII, 276. 494; XXXIII, 98. 360. 462. —

(2) Phil. Mag. [3] XXXII, 339. — (3) Phil. Mag. [3] XXXIII, 349. —

(4) Sill. Am. J. [2] V, 372.

per erlangt, während Newton diesen Fallraum $\frac{H}{2}$, also von der Intensität des Schalles unabhängig, gefunden hatte. — Blake berechnet nach seiner Formel die der Geschwindigkeit von 1142 Fufs entsprechende Intensität der Welle und die größere Dichte der Luft in derselben nach den Formeln $h = \frac{V^2}{32} - H$; $d = \frac{V^2}{32 H}$, wo die Dichte der umgebenden Luft zur Einheit angenommen ist, und findet $h = 12937$ Fufs, $d = 1,465$, während $H = 27818$, ein Resultat, dessen Ungereimtheit sogleich einleuchtet, wenn man in Anschlag bringt, wie gering die Schwingungsweite tönender Körper meist im Verhältnifs zur Wellenlänge ist. — Blake ist der Meinung, dafs aus der von ihm nachgewiesenen Abhängigkeit der Schallgeschwindigkeit von der Intensität sich die grofsen Abweichungen erklären, welche sich bei den Messungen ergeben haben. Doch zeigt eine genauere Betrachtung der Methoden, dafs die seither anerkannten Fehlerquellen, namentlich der Einflufs des Windes, zur Erklärung jener Abweichungen ausreichen.

A. Seebeck (1) hat gezeigt, wie man die Lage der Schwingungsknoten, der Wendepunkte und der Punkte stärkster Schwingung und Biegung nicht gespannter schwingender Stäbe, welche seither nur für einen an beiden Enden freien Stab berechnet worden sind, für alle übrigen Fälle nach einem gemeinsamen Verfahren berechnen kann. In einer Tabelle wird die Uebersicht der Rechnungsergebnisse gegeben. — Der zweite Theil der Abhandlung bezieht sich auf die Schwingungen gespannter Stäbe, unter welchen Fall, streng genommen, die gespannten Saiten gehören. N. Savart hatte experimentell, Duhamel theoretisch den Satz zu begründen gesucht, dafs wenn n die Schwingungsmenge der gespannten Saite, n_0 die der nicht gespannten Saite, n , die der nicht steifen gespannten Saite, alsdann $n^2 = n_0^2 + n^2$ sei. Seebeck leitet aus der allgemeinen Bewegungsgleichung

Fort-
pflanzungsge-
schwindigkeit
des Schalles
in der Luft.

Ton-
schwin-
gungen von
Stäben und
Saiten.

(1) Pogg. Ann. LXXIII, 442.

Ton-
schwin-
gungen von
Stäben und
Saiten.

für Saiten die hinlänglich genaue Näherungsformel für den i^{ten} Ton her :

$$n = i n, (1 + i^2 \delta)$$

$$n, = \frac{\pi}{l} \sqrt{\left\{ \frac{Pg}{p} \left(1 + 4 \sqrt{\frac{a}{Pl^3}} + 12 \frac{a}{Pl^3} \right) \right\}} \text{ und } \delta = \frac{1}{4} \pi^2 \frac{a}{Pl^3}$$

worin P die Spannung, l die Länge, p das Gewicht der Längeneinheit der Saite und a die elastische Constante bedeutet. Die Abweichung des i^{ten} Tones von der harmonischen Reinheit ist hiernach gleich $\frac{1+i^2\delta}{1+\delta}$.

Bellani (1) führt Beobachtungen von Gattoni an, wonach in freier Luft straff ausgespannte Eisendrähte nur dann tönen sollen, wenn ein Witterungswechsel eintritt, außerdem weder bei heiterem, noch bei regnetem oder sehr windigem Wetter.

Theorie der
musikalischen
Töne.

Robert Lefebvre (2) hat der französischen Academie eine mathematische Theorie der musikalischen Töne, verbunden mit einer Erörterung des allgemeinen Princip der Musik, mitgetheilt.

Töne
durch den
electrisch.
Strom.

Wertheim hatte in einer früheren Arbeit (3) zu beweisen gesucht, 1) dafs der electriche Strom eine vorübergehende Verminderung des Elasticitätscoefficienten der Leiter bewirkt, 2) dafs die Magnetisirung des Eisens gleichfalls von einer geringen Abnahme des Elasticitätscoefficienten begleitet ist, welche mit Unterbrechung des Stromes nur theilweise verschwindet. — In einer zweiten Untersuchung (4) sucht er den mechanischen Effect näher auszumitteln, welcher durch einen äufseren (durch eine umgewundene Spirale gehenden) oder inneren Strom auf Eisen- und Stahlstäbe ausgeübt wird, und ferner die Gesetze, welchen die durch die longitudinale und transversale Erschütterung hervorgerufenen Töne folgen. Die Resultate seiner Arbeit spricht Wertheim in folgenden Sätzen aus :

(1) Aus Giornale dell' Instit. Lombardo, XV, in Arch. ph. nat. IV, 180. — (2) Instit. 1848, 898. — (3) Ann. ch. phys. [3] XII, 610. — (4) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 303; Compt. rend. XXVII, 506; Instit. 1848, 142.

- 1) Ein Strom, welcher durch eine um eine Eisenmasse gewundene Spirale geht, übt auf diese Masse eine anziehende Wirkung aus, ähnlich der von Arago entdeckten Anziehung von Eisenfeile durch den electricen Leitungsdraht. Töne durch den electricen Strom.
- 2) Diese Zugkraft, welche der Stromstärke und der Gröfse der Eisenmasse proportional ist, kann man sich aus einer longitudinalen und einer transversalen Composante bestehend denken. 3) Die erstere strebt, je nach der Stellung der Spirale, den Eisenstab zu verlängern oder zu verkürzen. 4) Die transversalen Composanten, deren mechanisches Aequivalent man leicht in Gewichten ausdrücken kann, treten nur bei excentrischer Lage des Eisenstabes auf; sie halten sich im Gleichgewicht, wenn die Axen des Stabes und der Spirale zusammenfallen. 5) Der durchgehende oder innere Strom übt einen plötzlichen Stofs auf den eisernen Leiter aus, und zwischen dieser Wirkung und einer in gleichem Sinne wirkenden mechanischen Kraft ist kein Unterschied. 6) Alle deutlichen Töne, welche durch den äufseren oder inneren Strom, oder durch die Verbindung beider in einem Stabe, einem Faden, einer Platte von Stahl und Eisen hervorgebracht werden, finden in den vorhererwähnten mechanischen Wirkungen ihre vollständige Erklärung. Die durch die longitudinalen Composanten erzeugten Töne sind die nämlichen, wie die durch einen Schlag auf das Ende des Stabes in Richtung seiner Axe hervorgebrachten Longitudinaltöne. — Wartmann (1) glaubt aus einer Reihe von Versuchen mit Glasplatten, deren Harz- oder Zinnfoliebelegung electricisch geladen wurden, mit Saiten, Platten und Stäben von Eisen, Kupfer und Messing, welche der inducirenden Wirkung des Stromes oder eines Magneten ausgesetzt wurden und unter diesen Umständen ihre natürliche Tonhöhe beibehielten, schliessen zu dürfen, dafs die Induction die Elasticität nicht merklich ändert.

(1) Arch. ph. nat. VIII, 177.

Physiologi-
sche Akustik.

und der reflectirten Töne eine Ursache des **peinlichen Ein-**
drucks, welchen das **Ohr** erhält, wenn man mit einem **Train**
unter einer Brücke durchfährt.

Segond (1) hat Untersuchungen über den Ursprung des
verschiedenartigen Klanges der menschlichen Stimme ange-
stellt. Je kleiner die Räume der Luftröhre, des **Rachens**,
des Mundes und der Nase, desto heller und schreiender
wird nach ihm die Stimme; was die Erklärung der **Nasen-**
stimme betrifft, so macht Segond auf den Unterschied auf-
merksam, der darin liege, ob der Ton durch die **Nasen-**
höhle gehe, oder ob er nur in der geschlossenen **Nasenhöhle**
Resonanz finde. In dem letzteren Falle tritt der **Charac-**
ter der Nasenstimme am Entschiedensten hervor.

Segond hat ferner Untersuchungen angestellt über die
menschliche Stimme beim Einathmen (2), und über den
Zusammenhang der Totalbewegung des Kehlkopfs mit der
Tonhöhe und Tonstärke (3).

Apparate.

Eine Handorgel wurde beschrieben von Stein (4), ein
Akumeter oder Mefsinstrument für die Güte des Gehörs
von Marloye (5) nach Blanchet's Angabe.

O p t i k.

Licht-
quellen.
Lichtent-
wicklung beim
Glühen und
beim chemi-
schen Pro-
cessen.

Draper hat Untersuchungen über die Lichtentwicklung
beim Glühen (6) und bei dem Verbrennungsproceß (7)
angestellt. — Um die Temperatur des anfangenden Glühens
zu messen, bediente sich Dr. eines Platindrahtes von 1
Zoll Dicke, welcher durch eine galvanische Batterie und

(1) Compt. rend. XXV, 204; Arch. gén. de Médec. Mars 1848; Jahrbücher der gesammten Medicin LXI, 9—12. — (2) Compt. rend. XXVI, 252; Instit. 1848, 63; Jahrb. d. ges. Medic. LXI, 11. — (3) Compt. rend. XXVII, 85; Jahrb. d. ges. Medic. LXI, 12. — (4) Compt. rend. XXIV, 333. — (5) Compt. rend. XXV, 676; XXVI, 580. — (6) Phil. Mag. [3] XXX, 345. — (7) Phil. Mag. [3] XXXII, 100; Instit. 1848, 153; Frorieps Notizen VII, 18.

der Anwendung des Rheostaten zu verschiedenen Temperaturen erhitzt wurde, welche durch die Ausdehnung Platindrahtes gemessen wurden. Bei 525° begann der Draht in einem dunkeln Raume zu leuchten, während die steigende Glühtemperatur nach Newton 335° , nach Wavy 433° , nach Wedgewood 508° , nach Daniell 528° anwuchs. Kupfer, Antimon, Steinkohlen, Blei und Eisen begannen bei derselben Temperatur zu erglühen, wie das Platin, und es scheint demnach die Temperatur des anfänglichen Glühens für die verschiedensten Körper die nämliche zu sein. Doch machen viele, namentlich kalkhaltige Gesteine, eine Ausnahme. Draper fand, daß Kalkstein, Quarz und mehr noch Flussspath früher erglühen, als Eisen. — Eine prismatische Zerlegung des vom glühenden Platindraht ausgehenden Lichtes bewies, daß im Allgemeinen die am wenigsten brechbaren Strahlen zuerst, und mit steigender Temperatur immer mehr der brechbareren Strahlen ausgesendet werden. Daß auch nach der rothen Seite das Farbenbild sich um Etwas erweitert, erklärt Draper aus der zunehmenden Lichtintensität überhaupt. Bei 10° sah man vorzugsweise Orange und an der Stelle des Blau ein schwaches Grau. Erst bei 2130° war das Spectrum glänzend und wenig kürzer als das des Tageslichts. Mit Hilfe der photometrischen Methode von Bouguer und Draper, daß mit steigender Temperatur die Lichtintensität anfangs langsam, dann aber immer rascher wächst, ist bei 525° gleich 0, bei 1038° gleich 34, bei 1420° gleich 14, also 36 mal größer als bei 1038° . — Auch die ausgestrahlte Wärme nimmt, wie Versuche mit dem Thermomultiplicator gelehrt haben, rascher zu, als die Temperatur. Nimmt man die Wärme bei 545° Grad zur Einheit, so beträgt sich dieselbe bei 800° auf 2,5, bei 1038° auf 7,8, bei 1420° auf 17,8.

Die prismatische Zerlegung des Lichtes von Steinkohle, in atmosphärischer Luft, und von Holzkohle, welche in Sauerstoffströme brannte und dann allmählig erlosch,

Licht-
entwicklung
beim Glühen
und beim
chemischen
Prozesse.

Licht-
entwicklung
beim Glühen
und beim
chemischen
Process.

bewies, daß zwischen dem Grade der chemischen Wirkung und der Brechbarkeit der Strahlen ein Zusammenhang besteht, der Art, daß bei minder lebhafter Verbrennung nur der weniger brechbare Theil des Farbenbildes vorhanden ist und mit gesteigerter Intensität des chemischen Processes immer mehr der brechbareren Strahlen hinzutreten. Die Folgerung Draper's, daß bei jedem Grade der Verbrennung Strahlen einer bestimmten Farbe entwickelt werden, und demnach eine Lichtflamme, in welcher die Heftigkeit der Verbrennung von Außen nach Innen abnimmt, aus concentrischen Hüllen von allen Regenbogenfarben bestehen müsse, so daß sich im horizontalen Querschnitte in der That ein Regenbogenkreis beobachten lasse, ist hierdurch keineswegs begründet. Von dem hellsten Theile, in welchem die weißglühenden Kohlentheilchen schwimmen, werden, wie aus den vorhin angegebenen Versuchen und denjenigen über das beim Glühen entwickelte Licht hervorgeht, alle Farbenstrahlen ausgesendet; wenn auch die äußerste, heißeste Hülle vorzugsweise blaues, die innerste vorzugsweise rothes Licht geben mag. — Daß das Spectrum farbiger Flammen zwar viele Farbenstrahlen, jedoch gewisse Farben vorherrschend zeigt, ist nichts Neues (Radicke, Optik II, 201). — Draper analysirte einen horizontalen Streifen der Spiritusflamme und fand alle Farbenstrahlen vor, die rothen gaben bei horizontal gerichteter Kante des Prismas das schmalste, die violetten Strahlen, welche sich am Weitesten nach Außen erstrecken, das breiteste Farbenbild. Im Gelben zeigte sich eine glänzende Linie, Brewsters monochromat. Strahl. Die Kohlenoxydflamme, in atmosph. Luft blau, ändert im Sauerstoffgase ihre Farbe nicht; die rothe Flamme des Cyangases dagegen nimmt im Sauerstoff einen blendenden Glanz an, ihr Farbenbild erweitert sich namentlich nach der violetten Seite hin. — Durch Einführung von Luft ins Innere einer Oelflamme mittelst des Löthrohrs wurde das prismatische Farbenbild wesentlich verändert. Draper giebt an, daß die blaue

Flammenspitze keine rothen und orangefarbigten Strahlen mehr gab, und das Spectrum aus 5 von einander getrennten Räumen, einem gelben, zwei grünen, einem blauen und einem violetten, bestand. — Die Ansicht Draper's, dafs bei dem chemischen Processe alle materiellen Theilchen in Schwingungen gerathen, welche bei der Verbrennung z. B. von 400 Billionen in der Secunde auf 800 Bill. sich vermehren, mag man gelten lassen. Die Regelmässigkeit der Differenzen aber, welche er bei den Wellenlängen, die den Fraunhofer'schen Linien entsprechen, im Verhältnifs der Zahlen 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10 stehend fand, kann keine Bedeutung haben, da Fraunhofer aus den 2000 Linien des Sonnenspectrums nicht einmal überall die stärksten ausgewählt hat, gerade darum, weil es ihm mehr um einen ebenmässigen Abstand zu thun war.

Licht-
entwicklung
beim Glühen
und beim
chemischen
Processe.

Volger (1) hat die Natur der Lichtflamme einer neuen Betrachtung unterworfen. Nachdem er die bekannte Zusammensetzung und Zersetzung der Fettarten bei der Verbrennung übersichtlich zusammengestellt, geht er auf die allmähige Entwicklung der Flamme beim Anzünden ein. An der Spitze des Doctes entsteht zuerst die sogenannte »Flammenknospe«, ein kugelförmiges, blaues Flämmchen, in welchem Kohlenoxyd, Wasserstoffgas und Kohle verbrennen; dieselbe ist umgeben von einem röthlichvioletten Flammenschein, dem »Schleier«. Die gesteigerte Hitze bildet nun die eigentliche Lichtflamme, welche aus der aufbrechenden Knospe, die fortan als Hülle den untern Theil der Flamme umgiebt, hervorblüht. Ihr Inneres besteht aus einem dunkeln Gaskegel, welcher die unmittelbaren Zersetzungsproducte der Fettsäuren enthält und von einem ebenfalls dunkeln Hohlkegel, der »inneren Mütze«, umhüllt ist, welcher die bereits in Kohlenstoff und Wasserstoff geschiedenen Zersetzungsproducte enthält, und sich vom innern Kegel dadurch unterscheidet, dafs er Ruß giebt.

Natur der
Lichtflamme.

(1) Pogg. Ann. LXXII, 82.

Natur der
Lichtflamme.

Die „äußere Mütze“ bildet den stark leuchtenden Theil der Flamme, in welchem der Wasserstoff verbrennt und der Kohlenstoff weißglüht; die Umgebung dieses Theiles endlich leuchtet schwach und ruft gar nicht, in ihr verbrennt Kohlenstoff und Wasserstoff.

E. Becquerel (1) hat die Wirkung der verschiedenen Theile des Spectrums auf den Canton'schen und den Bologneserphosphor (Schwefelcalcium und Schwefelbarium) untersucht, und gefunden, daß die brechbarsten Strahlen jenseits vom Violett die Phosphorescenz hervorrufen, und daß in diesem Theile des Spectrums Stellen größerer und kleinerer Wirkung zu unterscheiden sind; daß die Strahlen vom Violett nach dem Roth hin dagegen die Phosphorescenz zerstören, nachdem sie dieselbe auf kurze Zeit erhöht, oder die Aussendung aller verwendbaren Strahlen beschleunigt haben. Draper (2) theilt mit, daß in einem Werke von Wilson (1776) bereits die obigen Resultate zu finden sind.

Matteucci (3) hat eine Notiz über die phosphorescirende Substanz der Fische und die Phosphorescenz des Meeres mitgetheilt.

Theorie des
Lichtes.

Bezüglich der drei Lichtstrahlen, welche den drei einfachen Schwingungen des Aethers entsprechen, theilt Cauchy (4) die folgenden Resultate mit :

1. Bei Voraussetzung ebener Wellen pflanzen sich die drei Lichtstrahlen mit Geschwindigkeiten fort, deren Quadrate die Wurzeln einer Gleichung vom dritten Grade sind. Zwei Wurzeln entsprechen den seither von den Physikern beobachteten Strahlen; sie sind gleich für die einfach brechenden, ungleich, wiewohl wenig verschieden bei den doppelbrechenden und denjenigen homogenen Mitteln, welche die Polarisationsebene drehen, imaginär bei den Metallen und undurchsichtigen Körpern.

(1) Ann. ch. phys. [3] XXII, 244; Compt. rend. XXV, 682. —

(2) Phil. Mag. [3] XXX, 87. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 358. —

(4) Instit. 1848, 229 u. 398.

2. Aus den beiden Grundsätzen der correspondirenden Bewegungen und der Continuität der Aetherbewegung folgen die Bedingungsgleichungen, welche hinreichen, um die Art der Polarisation, sowie die Intensität der an der Oberfläche durchsichtiger oder undurchsichtiger Mittel zurückgeworfenen und gebrochenen Strahlen zu finden.

3. In Beziehung auf den dritten Strahl zeigt die Rechnung, daß er verschwindet, wenn das einfallende Licht entweder senkrecht zur Einfallsebene schwingt, oder wenn es parallel oder senkrecht zur reflectirenden Fläche fortgeht; d. h., daß er für jedes Mittel in einer merklichen Entfernung von der Trennungsfläche erlischt. Der Quotient der Intensität durch den Verschwindungscoefficienten des dritten Strahles ändert seinen Werth beim Uebergang des Strahles vom ersten Mittel zum zweiten, ausgenommen, wenn die Oberfläche das Licht unter gewisser Incidenz vollständig polarisirt. Der Unterschied beider Werthe, mit dem Brechungsverhältniß multiplicirt, giebt zum Product den kleinen Coefficienten, welchen die auf durchsichtige Körper bezüglichen Formeln enthalten, wie sie durch Jamin's Versuche bewährt gefunden wurden.

4. Die Existenz des dritten Strahles scheint noch durch andere Erscheinungen angezeigt zu werden, wie durch den Lichtverlust im zurückgeworfenen Strahl bei schiefen Incidenzen und die von Arago beobachtete Polarisation des verstreuten Lichtes.

Challis (1) hat eine Theorie der Fortpflanzung der Lichtstrahlen und der Polarisation auf neue Voraussetzungen über die Constitution des Aethers, den er als compressibel annimmt, gegründet.

Mac-Cullagh (2) hat einen Versuch einer dynamischen Theorie der Reflexion und Brechung an Krystallen mitgetheilt.

(1) Phil. Mag. [3] XXX, 365; Instit. 1848, 59. — (2) Trans. of the royal Irish Acad. XXI.

Gradlinige
Fortpflan-
zung des
Lichtes.
Aberration
des Lichtes.

Die Erklärung der Aberration des Lichtes, welche nach der Emissionstheorie ohne Schwierigkeit ist, wird von dem Standpunkt der Wellentheorie aus bekanntlich durch den Umstand verwickelt, daß die durch den Himmelsraum gehenden Strahlen bei ihrer Annäherung an die Erde in den mit derselben durch die Rotation und Translation bewegten Aether eintreten, und ihre Bahn unter diesen Umständen nachgewiesen werden muß. Fresnel hatte den Knoten durchhauen durch die Annahme, die Erde bewege sich mit allem Festen und Flüssigen durch den ruhenden Aether, wie ein Netz mit weiten Maschen durch die Luft. Doch hat diese unwahrscheinliche Voraussetzung die Physiker nicht befriedigt. Zu der Discussion über diese Materie, welche hauptsächlich im Jahre 1846 meist auf mathematischem Wege geführt wurde (1), sind 1847 und 1848 noch einige Zusatzbemerkungen von Powell (2), Challis (3) und Stokes (4) gemacht worden.

Interferenz
bei grossem
Gang-
unterschied.

Fizeau und Foucault (5) haben zur Beobachtung von Interferenzerscheinungen der mannigfaltigsten Art einen Apparat construirt, welcher von den Berichterstatlern der franz. Academie, Babinet, Arago und Regnault, als eine experimentelle Erfindung ersten Ranges, geeignet für das Studium der einfachsten wie der verwickelsten optischen Erscheinungen bezeichnet wird. Strahlen, welche von einer engen Oeffnung ausgehen, werden durch eine Linse parallel gemacht, und durchdringen dann ein, zwei, oder drei, ja selbst fünf starkbrechende Prismen. Die Farbenstrahlen werden somit auf eine höchst vollkommene Weise getrennt, und die gleichartigen durch eine zweite Linse in einem Punkt vereinigt. Das Farbenbild bietet die dunkeln Linien in grosser Schärfe dar; es kann auf einem

(1) Doppler, Abh. der böhm. Ges. 5. F. III, 747. Stokes, Phil. Mag. [3] XXVII, 9; XXVIII, 15. 76. 335; XXIX, 6. 62. Challis, Phil. Mag. [3] XXVII, 321; XXVIII, 90. 176. 393. Powell, Phil. Mag. [3] XXIX, 425. — (2) Phil. Mag. [3] XXX, 93. — (3) Phil. Mag. [3] XXXII, 168. — (4) Phil. Mag. [3] XXXII, 343. — (5) Instit. 1848, 189.

weißen Schirm, einem matten Glase, oder unmittelbar mittelst einer Mikrometerloupe beobachtet werden. Die Erfinder des Apparates haben mittelst desselben Fransen mit sehr großem Gangunterschiede, sowohl mittelst der Spiegel, als durch Verzögerung des einen Strahls durch zweimalige Reflexion in einer Glasplatte, oder durch doppelte Brechung in Kalkspathplatten von 5^{mm}, Bergkrystallplatten von 50^{mm} Dicke, hervorgebracht; sie haben die Erscheinungen der chromatischen Polarisirung beobachtet, die dabei wirkenden Gangunterschiede, sowie die Constanten der geradelinigen, kreisförmigen und elliptischen Polarisirung gemessen, und mannigfaltige theoretische Folgerungen von Wichtigkeit gezogen. Die Abhandlungen sind in den *Recueil des savans étrangers* aufgenommen.

Interferenz
bei grossem
Gang-
unterschied.

Baden-Powell (1) hat einen neuen Fall der Interferenz untersucht. In ein Hohlprisma mit Sassafras-, Anis- oder Kassiaöl gefüllt taucht man einen Glasstreifen, so daß nur die durch den breiteren Theil des Prismas gehenden Strahlen denselben durchdringen. Das Farbenbild einer Lichtlinie ist dann mit schwarzen Bändern durchzogen parallel der Lichtquelle und der brechenden Kante des Prismas. Wendet man Flüssigkeiten an, welche schwächer brechen wie Glas, z. B. Terpenthinöl oder Wasser, so muß man den Glasstreifen in den engeren Theil des Prismas hinabsenken und den breiteren Theil frei lassen. Es seien m und n die Brechungscoefficienten des Glasstreifens und der Flüssigkeit, λ die Wellenlänge eines Strahles, m' , n' , λ' dieselben Größen für einen zweiten Strahl, d die Dicke der Platte, so ist die Anzahl a der Streifen zwischen beiden Farbenstrahlen $a = d \left\{ \frac{m-n}{\lambda} - \frac{m'-n'}{\lambda'} \right\}$. Wenn man doppelbrechende Platten anwendet, erhält man zwei Reihen von Streifen übereinander gelagert.

Ein neuer
Fall von Interferenz.

Mossotti (2) hat bereits 1845 eine besonders gedruckte Abhandlung über die Eigenschaften der Frauenhofer'schen

Analyse des
Frauenhofer'schen
Glitterspectrums.

(1) *Institt.* 1848, 314; *Phil. Mag.* [3] XXXIII, 155. — (2) *Pogg. Ann.* LXXII, 509.

Analyse des
Fraunhofer-
schen Gitter-
spectrums.

Gitterspectra zu Pisa herausgegeben, worin er Formeln mittheilt, welche die Abhängigkeit der Wellenlänge und Intensität von der Lage eines Farbenstrahles im Spectrum ausdrücken. Das Gitterspectrum ist als das normale, das prismatische nur als ein verzerrtes Spectrum zu betrachten. Denkt man sich die Länge des Gitterspectrums in 360 Theile getheilt und bezeichnet sie mit 2π , so ergibt sich aus den Beobachtungen die Wellenlänge λ , welche einem Bogen φ , von der Mitte des Spectrums aus gemessen, entspricht $\lambda = 553,5 + 184,5 \frac{\varphi}{\pi}$, was für die äußersten Enden 369 und 738 giebt, wobei die Einheit der millionte Theil des Millimeters. Die Formel $n = \frac{1}{v} = i + h \left(\frac{\lambda_0}{\lambda} \right)^2 + k \left(\frac{\lambda_0}{\lambda} \right)^4$ drückt den Brechungsindex n eines Strahles durch dessen Wellenlänge λ aus, worin λ_0 die Wellenlänge eines bestimmten Strahles ist, dessen Ablenkung jedesmal gemessen werden muß. Macht man mehr Messungen, als Unbekannte vorhanden sind, so können die Coëfficienten i , h und k nach der Methode der kleinsten Quadrate berechnet werden. — Wenn x den Winkelabstand zwischen dem Strahle λ und λ_0 bedeutet, so ist

$$\frac{\sin \frac{1}{2} (\varphi + \psi + x)}{\sin \frac{1}{2} \varphi} = i + h \left(\frac{\lambda_0}{\lambda} \right)^2 + k \left(\frac{\lambda_0}{\lambda} \right)^4$$

und wenn G die Intensität eines Punktes im Brechungsspectrum, so ist die Intensität des nämlichen Farbenstrahls im Gitterspectrum $\Gamma = n \frac{dx}{d\lambda} \cdot G$, worin n ein constanter Coëfficient ist. Für die bekannten 7 Linien sind die Werthe von $\frac{1}{n} \Gamma$

B	C	D	E	F	G	H
9054	30851	294375	315787	145931	39316	9471

Legt man eine Coordinatenaxe durch die Mitte des Gitterspectrums, also den Farbenstrahl, dessen Wellenlänge $\lambda = 553,5$, so giebt Mossotti folgende Gleichung, welche die beiderseits symmetrische Abnahme der Intensität in diesem Spectrum ausdrücken soll:

$$z^4 = \frac{1}{2} \chi \left\{ 1 - \frac{3 \chi (1 - \chi)}{1 + 4 \chi^2 \epsilon - \frac{3}{\chi}} \right\}$$

Analyse des
Fraunhofer'schen
Gitterspectrums.

$$= 3 \pi \frac{\lambda - 553,5}{553,5}, \text{ und } \chi = \frac{1 - r}{r}. \text{ Die aus dieser}$$

für das Brechungsspectrum abgeleiteten Werthe
eine genügende Uebereinstimmung.

nus (1) beschreibt einen Apparat, mit Hülfe des-
fractionerscheinungen in der Toricelli'schen Leere
agt. Lichtquelle und Diaphragmen befinden sich
im leeren Raume, so dafs allen Einwendungen
welche eine Fortpflanzung des Lichtes durch die
n Theile der Körper annehmen wollen, begeg-

Gesetze der Zurückwerfung des Lichtes haben Zurückwer-
fung des
Lichtes.
allgemeinerung und zugleich eine Vereinfachung
durch die mathematische Analyse Cauchy's und
imentellen Arbeiten von Jamin und Senarmont.
sind um so werthvoller, als sie eine Reihe der
Beobachtungsmethoden enthalten, und zeigen, wie
die Anwendung der Doppelbrechung und chro-
Polarisation, verbunden mit einfachen mathema-
etrachtungen, für die genaue Bestätigung optischer
und die Messung der, erforderlichen Constanten
werden kann.

geben zunächst diejenigen Formeln Cauchy's (2),
ie Intensität des an opaken, insbesondere metalli-
örpern reflectirten Lichtes ausdrücken, da in den
experimentellen Arbeiten mehrfach hierauf Bezug
n wird. Zur Characterisirung einer homogenen
tigen Substanz genügt die Kenntnifs ihres Bre-
hältnisses; bei den opaken Körpern wird der ge-
Strahl in sehr geringer Tiefe ausgelöscht, und
nimmt daher für diese Körper eine zweite Con-

Zurückwer-
fung des
Lichtes.

stante, den Auslöschungscoefficienten, in Anspruch. — E seien ϑ und ε so gewählt, daß $\vartheta \cos \varepsilon$ und $\vartheta \sin \varepsilon$ die Brechungs- und Auslöschungscoefficienten für senkrecht Incidenz vorstellen, J^2 und J'^2 seien die Intensitäten des unter einem Winkel i reflectirten Lichtes, wenn der einfallende Strahl senkrecht oder parallel zur Einfallsebene polarisirt ist, so hat man $J^2 = \operatorname{tg} \left(\varphi - \frac{\pi}{4} \right)$; $J'^2 = \operatorname{tg} \left(\chi - \frac{\pi}{4} \right)$ (1) worin

$\cot \varphi = \cos (2\varepsilon - u) \sin \left(2 \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{U}{\vartheta^2 \cos i} \right)$; $\cot \chi = \cos u \sin \left(2 \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{\cos i}{U} \right)$ (2) und es sind u und U durch die folgenden Gleichungen gegeben

$$\cot (2u - \varepsilon) = \cot \varepsilon \cos \left(2 \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{\sin i}{\vartheta} \right); U^2 = \frac{\sin 2\varepsilon}{\sin 2u} \cdot \vartheta^2 \quad (3)$$

Die beiden Componenten, in welche jeder geradelini polarisirte Strahl bei der Reflexion zerlegt gedacht werden kann, eine senkrecht und eine parallel zur Einfallsebene, erhalten bei der Zurückwerfung einen Gangunterschied δ , welcher durch die Gleichung $\operatorname{tg} \delta = \operatorname{tg} 2\omega \sin u$ gegeben ist, während ω durch die Beziehung $\operatorname{tg} \omega = \frac{U \cdot \cos i}{\sin^2 i}$ bestimmt wird. Für die Hauptincidenz (den Winkel der stärksten Polarisation) wird $\delta = \frac{\pi}{4}$, also $\omega = \frac{\pi}{4}$ und $U = \sin i \cdot \operatorname{tg}$ endlich $u = 2A$, worin A das Azimut bezeichnet, welches der reflectirte Strahl annimmt, wenn das Azimut des einfallenden $= \frac{\pi}{4}$ ist. Hat man i und A gemessen, so kann u und U berechnet, so führt man sie in die aus (3) folgenden Gleichungen $\operatorname{tg} (2\varepsilon - u) = \operatorname{tg} u \cos (\pi - 2\varepsilon)$ $\vartheta^2 = \frac{\sin 2u}{\sin 2\varepsilon} U$ ein und berechnet ε und ϑ , sodann φ und endlich die Intensitäten J^2 und J'^2 .

Es ist bekannt, wie man seither in Beziehung auf die Zurückwerfung des Lichtes die durchsichtigen und die metallischen Substanzen als zwei gesonderte Gruppen betrachtete, die ersteren sollten einen geradelinig polarisirten Strahl von beliebigem Azimut stets wieder geradelinig polarisirt reflectiren indem angenommen wurde, daß der Phasenunterschied δ

componirten Systeme, senkrecht und parallel zur Einfallebene, von 0° Incidenz bis zum Polarisationswinkel $= 0$ oder $= 2\pi$, von da bis zu 90° Incidenz $= \pi$ sei. Die Metalle boten dagegen statt vollständiger Polarisation nur ein Polarisationsmaximum, und verwandelten die geradlinige Schwingung, wenn diese nicht gerade senkrecht oder parallel der Einfallebene erfolge, in eine elliptische, indem der Phasenunterschied von 0° Incidenz bis zur Hauptincidenz allmählig von 0 bis $\frac{3\pi}{4}$, und von der Hauptincidenz bis zu 90° von $\frac{3\pi}{4}$ bis π wächst. — Einige durchsichtige Substanzen von hohem Brechungsvermögen, wie der Diamant, schienen Mittelglieder zwischen jenen beiden Gruppen abzugeben, indem man innerhalb gewisser Grenzen elliptische Polarisation bei denselben wahrnahm. Dale (1) hat eine Reihe nicht metallischer Substanzen von hohem Brechungscoefficienten namhaft gemacht, welche das Licht elliptisch polarisiren, wie Indigo, künstl. Realgar, Diamant, Schwefelzink, Antimonglas, geschmolzener Schwefel, Tungstein, kohlens. Blei, Hyazinth, arsenige Säure, Granat, Idokras, Helvin, Labrador, Hornblende, Chromblei, Silberglätte, Bleiglätte, Tusche; und die Ansicht ausgesprochen, es möge die elliptische Polarisation der ganz allgemeine Fall sein, keine Substanz polarisire wahrscheinlich vollständig, der Rest des unpolarisirten Lichtes möge aber bei den Substanzen mit niedrigem Brechungsverhältniß zu gering sein, um wahrgenommen zu werden; die mathematische Theorie der Reflexion müsse die Zurückwerfung an Metallen, an durchsichtigen Substanzen mit hohem und niederm Brechungscoefficienten in Eine Gleichung zusammenfassen.

Jamin (2) scheint die obige Ansicht Dale's nicht gekannt zu haben, giebt aber deren Inhalt als ausgemachte Wahrheit, von ihm, wie er sagt, durch eine sehr genaue Beobachtungsmethode, welche er indessen noch nicht mit-

(1) Sill. Am. J. [2] III, 262, aus Athen. Nr. 986; Instit. 1846, 368.

— (2) Compt. rend. XXVII, 147.

Zurückwer-
fung des
Lichtes.

theilt, begründet. Er ist zu dem Resultate gelangt, daß die seitherige Eintheilung der homogenen Mittel in durchsichtige, welche den zurückgeworfenen Strahl geradlinig polarisiren, und metallisch-undurchsichtige, welche ihm elliptische Polarisation ertheilen, nicht ferner beizubehalten sind, indem der Fall der elliptischen Polarisation der ganz allgemeine sei. Wenn man die reflectirenden Substanzen nach ihren Brechungscoefficienten ordnet, so nimmt, indem man nach und nach zu den schwächer brechenden Mitteln übergeht, die elliptische Polarisation des reflectirten Strahls immer mehr ab, bis man zu dem Fall der geradlinig polarisirenden Substanzen gelangt, für welchen die Theorie Fresnel's gilt. Der Winkel eines Polarisationsmaximums, welcher dem Silber kaum merklich ist, tritt also hierbei immer deutlicher hervor, der Phasenunterschied der beiden einander rechtwinklichen Vibrationen ändert sich von π zu 2π zwischen Grenzen, deren erste unter, die zweite oberhalb des Polarisationswinkels liegt; diese Grenzen, welche bei den metallischen Substanzen mit der streifenden und senkrechten Incidenz zusammenfallen, nähern sich einander umfassen bei dem Glase nur einen Winkel von 4 bis 5 Graden, und treffen endlich im Polarisationswinkel zusammen. Die doppelte Eigenschaft, das Licht vollständig geradlinig zu polarisiren, findet sich nur bei wenigen Körpern, deren Brechungsverhältniß nahe gleich 1,4 ist, und nur für diese sind die Fresnel'schen Formeln in aller Strenge anwendbar. — Geht man zu Substanzen von noch schwächerer Brechkraft fort, so beginnt die elliptische Polarisation aufs Neue aufzutreten, mit dem Unterschiede, daß nun die Schwingungen senkrecht zur Einfallsebene eine Verzögerung gegen diejenigen in der Einfallsebene erleiden, während bei den stärker brechenden Substanzen das Umgekehrte stattfindet. Die letzteren nennt Jamin *positive*, erstere *negative* Substanzen. — Auch wenn die vollständige Polarisation nicht in aller Strenge stattfindet, so kann man doch, wegen der geringen Empfindlichkeit des Auges, c

Polarisationswinkel mit der Hauptincidenz verwechseln, für welche der Phasenunterschied gleich $\frac{3\pi}{2}$ und deren Messung mit großer Schärfe erfolgen kann. Das Brewster'sche Gesetz, wonach die Tangente des Polarisationswinkels dem Brechungsverhältniß gleich ist, kann numerisch für die Hauptincidenz beibehalten werden. — Die beiden Reflexionsconstanten der Metalle, nämlich Hauptincidenz und Verhältniß der Amplituden der beiden Componenten des unter dem Polarisationswinkel reflectirten Strahles, oder auch das Azimut des reflectirten Strahles, müssen nunmehr auch für die durchsichtigen Substanzen beibehalten werden, wie klein auch der Werth sein mag, welchen die letztere Constante in diesem Falle meistens annimmt. Jamin bemerkt, daß die Formeln von Cauchy, welche außer dem Brechungsverhältniß noch den Ellipticitätscoefficienten einschlossen, in ihrer Allgemeinheit von dem Autor nur für die Substanzen beibehalten worden sind, deren Typus der Diamant ist, und im Uebrigen den Beobachtungen gemäß, welche die elliptische Reflexion nur als einen besondern Fall erscheinen ließen, beschränkt wurden. Nunmehr treten diese Formeln wieder in das Recht allgemeiner Gültigkeit ein.

Zurückwer-
fung des
Lichtes.

Eine Andeutung seiner Beobachtungsmethode giebt Jamin (1), indem er sagt, daß er polarisirtes Sonnenlicht an durchsichtigen Substanzen reflectiren und dann durch zwei gekreuzte Quarzprismen von gleichem Winkel gehen ließ und es mit einem Nicol analysirte. Die Verschiebung der parallelen Fransen deutete jederzeit auf einen zwischen den rechtwinkligen Componenten vorhandenen Phasenunterschied.

Die Gesetze der Metallreflexion sind von Jamin (2) einer neuen Prüfung mit Hülfe genauerer Methoden unterworfen worden. Die Zahlenresultate stimmen mit den Formeln von Neumann, dessen übrigens Jamin mit keinem Worte erwähnt, und denjenigen Cauchy's (S.170) mit einer

Reflexion an
Metallen.

(1) *Compt. rend.* XXVI, 888; *Instit.* 1848, 93; *Pogg. Ann.* LXXIV, 248. — (2) *Ann. ch. phys.* [3] XIX, 296; *Pogg. Ann. Ergänz.-Bd.* II, 437.

Reflexion an
Metallen. seither in diesen Untersuchungen nicht gekannten Genauigkeit.

Um die *Intensitäten* der nach den Azimuten 0° und 90° polarisirten Strahlen bei verschiedenen Einfallswinkeln messen, bediente sich Jamin eines ebenen Spiegels, welcher zur Hälfte aus Metall, zur andern Hälfte aus Glas bestand, so daß beide Platten nach einer geraden Linie dicht an einander stießen. An dieser Grenze wurden die polarisirten Strahlen reflectirt, und dann mit einem doppelbrechenden Prisma aufgefangen. Sind β und β' die Azimute des Hauptschnittes des Prismas, für welche das ordentliche Bild des Metalls dem außerordentlichen des Glases, und das außerordentliche des Metalls dem ordentlichen des Glases Intensität gleich wird, so hat man mit Zugrundelegung der bekannten Fresnel'schen Formeln: $J^2 = \operatorname{tg}^2 \beta \cdot \frac{\sin^2 (i-r)}{\sin^2 (i+r)}$

$$= \cot^2 \beta' \cdot \frac{\sin^2 (i-r)}{\sin^2 (i+r)} \text{ für das Polarisationsazimut } 0, \text{ und}$$

$$I^2 = \operatorname{tg}^2 \beta \cdot \frac{\operatorname{tg}^2 (i-r)}{\operatorname{tg}^2 (i+r)} = \cot^2 \beta' \cdot \frac{\operatorname{tg}^2 (i-r)}{\operatorname{tg}^2 (i+r)} \text{ für das Azimut } 90^\circ$$

da das Licht an der Glasplatte in der Nähe des Polarisationswinkels so gut wie ganz ausgelöscht wird, so entsteht hier eine Lücke von einigen Graden. Da man zur Berechnung von J^2 und I^2 den Brechungscoefficienten des Glases kennen muß, so bestimmte Jamin diesen durch Messung des Azimutes A' eines zurückgeworfenen Strahles, welcher unter dem Azimut $\frac{\pi}{4}$ einfällt. Es ist $\operatorname{tg} A' = \frac{\cos (i+r)}{\cos (i-r)}$ und

$$\text{hiernach } \operatorname{tg} r = \frac{\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - A' \right)}{\operatorname{tg} i}; \text{ man kann also verschiedene}$$

Incidenzen anwenden und den Mittelwerth nehmen. — Als Lichtquelle diente eine Carcel'sche Lampe, deren Flamme im Brennpunkt einer Linse stand; ein rothes Glas macht das Licht homogen. Versuche mit Platten von Stahl und Spiegelmetall gaben eine vortreffliche Uebereinstimmung der Beobachtungen mit den oben mitgetheilten Formeln Cauchy's.

Phasenunterschied, welcher von der Incidenz 0° bis zu 90° wächst, beim Polarisationsmaximum $= \frac{\lambda}{4}$ Reflexion an Metallen.
 en zwei Reflexionen an dem nämlichen Metalle Hauptincidenz einen Gangunterschied $\frac{\lambda}{2}$, also wie-
 linig polarisirtes Licht; denn die Bedingung für
 rherstellung der geradelinigen Schwingung ist
 , dafs der Gangunterschied der zwei rechtwink-
 osanten $= n \frac{\lambda}{2}$ ist. — Bei drei Reflexionen an
 Spiegeln wird man einen kleineren und einen
 infallwinkel, als die Hauptincidenz, wählen müssen,
 , welche bei Einer Reflexion $\frac{\lambda}{6}$ und $\frac{\lambda}{3}$ Phasenun-
 eben, damit man nach der letzten Reflexion $3 \cdot \frac{\lambda}{6}$
 $= \frac{\lambda}{2}$ Phasenunterschied, also geradelinige Po-
 habe. Ueberhaupt giebt es bei m Reflexionen
 idenzen der wiederhergestellten Polarisation, und
 dafs man durch Beobachtung derselben, bei all-
 ehmender Zahl der Reflexionen, experimentell
 kann, wie sich die Phasendifferenz mit der Inci-
 t. Zwei parallele Metallplatten, deren Abstand
 er Schraube verändert werden konnte, dienten
 ren, und man beobachtete, bei welchen Inciden-
 kol das Minimum der Helligkeit zeigte, welches
 urch eine Uebergangsfarbe zwischen dunkelblau
 lpurpur ausgezeichnet war; das Azimut des ein-
 rahles war beliebig. — Cauchy giebt zur Berech-
 hasendifferenz den Ausdruck $\text{tg } \delta = \text{tg } 2 \omega \cdot \sin u$,
 $\delta = \frac{U \cos i}{\sin^2 i}$, während u und U hier die näm-
 atung haben, wie in den oben mitgetheilten
 Versuche an Silber, Stahl und Zink gaben eine
 idigende Uebereinstimmung mit dem Resultate
 ng.

Reflexion an
Metallen.

Es lassen sich mittelst einer leichten Reflexion folgenden Eigenschaften der elliptischen Schwingung, die ein polarisirter Strahl annimmt, wenn er im einfallt, nachweisen, Eigenschaften, welche sich beziehen auf das Verhalten des elliptisch polarisirten gegen ein doppelbrechendes Prisma. 1) Der Hauptschnitt des doppelbrechenden Prismas parallel einer Axe der Ellipse, so hat das eine Bild die größere und das andere die kleinste Intensität. 2) Die Intensität der Schwingungen in Richtung der Axe ist dem Quadrat der Länge derselben proportional. 3) Jede elliptisch polarisirte Schwingung kann in zwei, nach Richtung der beiden Axen polarisirte Strahlen zerfällt werden, deren Intensitäten das Quadrat der Axenlängen proportional und deren Unterschied $= \frac{\lambda}{4}$ ist. 4) Die beiden Bilder sind gleich hell, wenn der Hauptschnitt den Winkel beider Axen halbt. Nach diesem letzten Satze hat Jamin die Lage der Ellipse ausgemittelt, indem, wenn die Stellung des Hauptachsens gefunden war, welche gleichen Bildern entspricht, das Azimut nur um 45° zu vergrößern und zu verkleinern hatte. Die Messungen, welche für die Incidenzen von 36° bis 86° an Spiegelmetall mit rothem homogenem Licht vorgenommen wurden, stimmten gut mit dem Resultat der Berechnung nach den Formeln $\tan 2\omega = \tan 2\alpha \cot \delta$ und $\frac{J}{I} \tan \alpha = \frac{J}{I} \tan \omega$, worin α das Azimut des einfallenden Lichtes, ω das Azimut der Axen der Ellipse bedeutet. — Auf dieser Gelegenheit bestimmte Jamin auch das Verhältniß der Intensitäten der in den Hauptazimuten der Ellipse verlaufenden Strahlen. Wenn die beiden Bilder gleich hell sind, so hat man für das Azimut ω' die Bedingung $\cos \delta \tan 2\omega' = -\cot 2\alpha$, und indem man für δ seinen Werth und $\frac{J}{I} = m$ setzt, $2 \cot \delta \tan 2\omega' = \frac{1}{m \cot \alpha}$. Bringt man den Hauptschnitt in die Reflexionsebene, so ist $\omega' = 0$, und $\frac{J}{I} = \tan^2 \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right)$. Man hat also bei

denen Incidenzen, indem der Hauptschnitt des Zerlegers in der Reflexionsebene steht, an dem betreffenden Nikol nur dasjenige Azimut des einfallenden Lichtes zu messen, bei welchem die Bilder gleich werden. Die Versuche an Spiegelmetall bei den Incidenzen 30° bis 86° gaben eine sehr gute Uebereinstimmung mit dem Resultate der Rechnung.

Reflexion an
Metallen.

Die Bemerkungen Jamin's über die mehrfachen Reflexionen, insbesondere über die Lage und absolute Gröfse des Azimuts des reflectirten Strahles, wenn das Azimut α des einfallenden gegeben ist, enthalten nur Bekanntes; seine Messungen an einer Kupferplatte stimmen hinlänglich gut mit dem Resultat der Rechnung. — Desgleichen sind die Bemerkungen über die Reflexion an Spiegeln, welche gegeneinander geneigt sind, nur eine Recapitulation der Neumann'schen Formeln und Brewster'schen Versuche.

Jamin (1) hat die Messung der beiden Constanten der metallischen Reflexion für Silber, Glockengut, Stahl, Zink, Spiegelmetall, Kupfer und Messing ausgeführt, indem er jedesmal zwei Platten parallel auf einem horizontalen getheilten Kreise aufstellte und auf dieselben nacheinander die verschiedenen prismatischen Farbenstrahlen fallen liefs, durch einen Nikol, welcher das Azimut der Polarisation bestimmte; das Azimut nach der Reflexion ward mittelst eines am Kreise verschiebbaren, doppeltbrechenden Prismas beobachtet. — Die Incidenzen der wiederhergestellten Polarisation nehmen bei allen Metallen vom Roth zum Violett hin ab, umgekehrt wie die Polarisationswinkel für durchsichtige Substanzen, welche mit der Brechbarkeit des Strahles zunehmen. Für Silber, Kupfer, Messing und Glockengut nehmen die Azimute vom Roth zum Violett hin ab, und zwar beim Silber um $0^\circ,5$, beim Glockengut um $7^\circ 12'$. Eine zweite Klasse von Metallen, wozu Zink und Stahl gehören, zeigt gerade das umgekehrte Verhalten. Beim Spiegelmetall nehmen die Azi-

Farbe
der Metalle.

(1) Ann. ch. phys. [3] XXII, 811; Pogg. Ann. LXXIV, 528; Instit. 1848, 38; Compt. rend. XXV, 714; XXVI, 83.

Farbe
der Metalle.

mute vom Roth zum Grün ab, und dann wieder zu bis zum Violett. — Mit Hülfe der gemessenen Constanten kann die Intensität der reflectirten Strahlen nach den oben mitgetheilten Formeln Cauchy's, deren Richtigkeit durch zahlreiche Versuche bestätigt ist, leicht berechnet werden.

Die Hauptresultate dieser Formeln sind : 1) bei der streifenden Incidenz sind alle gutpolirten Metalle vollkommen weifs, 2) beleuchtet durch ein in der Einfallsebene polarisirtes Licht zeigen sie eine eigenthümliche, sehr blasse Farbe, mit vorherrschendem Weifs, 3) beleuchtet durch rechtwinklich gegen die Einfallsebene polarisirtes Licht zeigen sie eine lebhaftere Farbe, mit weniger Weifs, 4) bei lothrechter Incidenz bleibt die eigenthümliche Farbe unverändert, das Azimut hat begreiflicher Weise keinen Einflufs. Für diesen letzten Fall sind die Cauchy'schen Formeln, wenn J die Intensität, i die Incidenz der wiederhergestellten Polarisation bedeutet :

$$J^2 = \tan^2(\varphi - 45); \cos \varphi = \cos 2A \cdot \sin 2(\arctan \frac{\cos i}{\sin^2 i})$$

Ist a das anfängliche Azimut, und sind x' , x'' , x''' die Azimute des wieder geradlinig polarisirten Strahles nach 2, 4, 6 . . Reflexionen, so ist :

$$\tan x' = \tan^2 A \cdot \tan a; \tan x'' = \tan^4 A \cdot \tan a; \tan x''' = \tan^6 A \cdot \tan a$$

woraus sich die Bedeutung des Winkels A ergibt.

Jamin berechnete hiernach die Intensitäten der Hauptstrahlen nach 1 und nach 10 Reflexionen, und dann nach Newton's Farbenregel (Biot's Physik T. III, S. 445) die Farbe des Metalls. U sei nach gewöhnlicher Bezeichnung der Winkel, welchen die berechnete Farbe eines jeden Metalls mit dem Anfang des Roth bildet; Δ und $1-\Delta$ bezeichnen in dem reflectirten Strahl die Verhältnisse dieser Farbe und des weissen Lichtes.

Metalle der ersten Reihe.

Farbe
der Metalle.

	Nach einer Reflexion.			Nach 10 Reflexionen.		
	U	Δ	$1-\Delta$	U	Δ	$1-\Delta$
Kupfer . .	69° 56'	0,113	0,887	43° 29'	0,812	0,188
	Orange, sehr roth			Roth		
Glockengut .	83° 10'	0,065	0,935	40° 40'	0,767	0,233
	Orange, gelb			Roth		
Messing . .	103° 13'	0,112	0,888	62° 50'	0,349	0,650
	Gelb			Orange, sehr roth		
Silber . .	89° 0'	0,018	0,987	84° 32'	0,124	0,876
	Orange, sehr gelb			Orange, gelb		

Metalle der zweiten Reihe.

Zink . . .	180° 67'	0,021	0,979	264° 58'	0,188	0,812
	Blau			Indigblau		
Stahl . . .	74° 33'	0,017	0,983	— 22° 50'	0,089	0,911
	Orangeroth			Violett		

Spiegelmetall.

	67° 25'	0,028	0,972	53° 59'	0,292	0,708
	Orange, sehr roth			Roth, orange		

Man findet diese Resultate durch den Versuch vollkommen bestätigt, wenn man nicht vergißt, daß manche der angegebenen Farben durch die starken Beimengungen von Weiß fast ganz verdeckt werden. Das Kupfer erleidet unter allen Metallen bei Vervielfältigung der Reflexionen die merkwürdigsten Farbenveränderungen. Blafs und wenig merklich bei einer Reflexion, nimmt die Farbe nach 10 Reflexionen einen ausgezeichneten Glanz und ein reines Purpurroth an. Dasselbe ist fast homogen oder unzersetzbar durch das Prisma. Der Stahl ist das einzige unter den untersuchten Metallen, welches auch bei vervielfältigter Reflexion überwiegend weiß bleibt.

Die Zurückwerfung an durchsichtigen krystallisirten Mitteln ist von Brewster und Seebeck untersucht und von Mac-Cullagh und Neumann theoretisch begründet worden. Diese Zurückwerfung hat das Characteristische, daß sich nicht alle Umstände rings um einen Punct gleich sind. Die zur Einfallsebene parallelen und rechtwinkligen Schwingungen behalten ihre Richtung bei der Reflexion nur in wenigen bestimmten Fällen bei, im Allgemeinen liefert jede

Zurück-
werfung des
Lichtes durch
metallisch-
undurchsich-
tige Krystalle.

Zurück-
werfung des
Lichtes durch
metallisch-
undurchsich-
tige Krystalle.

dieser Schwingungen eine parallele und eine rechtwinklige Composante. Stets aber erhalten diese Componenten n Phasenunterschiede von Vielfachen des halben Kreisumfangs und die Polarisation bleibt sonach geradelinig. Das Azimut hängt ab von dem Verhältniss der Amplituden der parallel und der rechtwinkligen Composante im zurückgeworfenen Strahle. — Dieses unbekannte Element ist aber nicht allein abhängig vom Einfallswinkel, sondern auch von der Lage der Einfallsebene gegen die Krystallaxe. Es ändert sich also, wenn man die reflectirende Fläche in ihrer eigenen Ebene dreht. — Hat man zwei Lagen ausgefunden, in welchen die Schwingungen der reflectirten Componenten denjenigen des einfallenden Strahles parallel bleiben, so findet man, dass in denselben dem nämlichen Einfallswinkel verschiedener Amplitudenverhältniss entspricht und umgekehrt; dieses Verhältniss geht durch Null bei gewissen Einfallswinkeln, die Winkeln der vollständigen Polarisation. Bei senkrechter Incidenz bleibt das Polarisationsazimut im Allgemeinen nicht ungeändert, wie bei den homogenen Mitteln. Dagegen vermindern sich beide Amplituden in gleichem Verhältniss und das Polarisationsazimut bleibt ungeändert für gewisse schiefe Incidenzen und nur bei gewissen besondern Richtungen der Einfallsebene. — Zur vollständigen Erörterung aller möglichen Reflexionserscheinungen fehlte noch die Untersuchung der Zurückwerfung an *undurchsichtigen krystallisirten Mitteln*, welche von Senarmont (1) mittelst sinnreich construirter Apparate ausgeführt worden ist. Dieser Forscher ging weiter, als später durch die Resultate bestätigten Voraussetzungen aus, dass bei jenen Körpern sich die Eigenthümlichkeiten der Krystallreflexion wieder finden würden, jedoch complicirt durch den Character der Metallreflexion, d. h. durch den veränderlichen Phasenunterschied zwischen beiden Componenten. — Der Apparat besteht aus einem senkrecht stehenden, getheilten Kreise, an welchem sich zwei Röhren

(1) Ann. ch. phys. [3] XX, 897; Pogg. Ann. Ergänz.-Bd. II, 513.

von 20^{cm} Länge bewegen und so einstellen lassen, daß die Nulllinie der Theilung den Winkel ihrer Axen halbirt. Ein um eine verticale Axe drehbarer Träger wird so aufgestellt, daß die über der Axe angebrachte reflectirende Fläche in den Mittelpunkt des Kreises und senkrecht gegen denselben gestellt ist und bei der Drehung des Trägers sich in ihrer eignen Ebene bewegt. Ein Behälter kann so angebracht werden, daß die Reflexion im Innern einer Flüssigkeit zu Stande kommt. Die beiden Röhren unten mit senkrecht gegen ihre Axe gestellten Spiegelplatten verschlossen, tauchen dann in die Flüssigkeit. — Das Licht einer Uhrlampe fällt in der einen Röhre auf einen Nikol, welcher das Azimut des einfallenden Strahles bestimmt, und geht dann durch eine Platte, deren beide Hälften aus gleich dicken, senkrecht gegen die Axe geschnittenen Quarzen bestehen. Nach der Reflexion fällt der Strahl auf ein doppelbrechendes Prisma, dessen Azimut, sowie das des ersten Nikols, an graduirten Kreisen abgelesen wird. — Die Veränderungen, welche das Licht erfährt, werden ausgedrückt, wenn man den polarisirten Strahl $2 \sin \frac{2\pi}{T} t$ in zwei circulare Schwingungen von entgegengesetzter Drehung zerlegt, dem einen System gegen das andere einen Gangunterschied δ ertheilt, dann beide parallel und rechtwinklig zur Einfallsebene zerlegt, die Verminderung der Amplituden gleich h und k , den Phasenunterschied gleich φ annimmt, und endlich die Schwingungen des zurückgeworfenen Strahles senkrecht und parallel zum Hauptschnitte des Zerlegers, also in das ordentliche und außerordentliche Bild zerlegt. Die beiden Bildern angehörenden Schwingungen sind alsdann, wenn man das Azimut des einfallenden Strahles mit ω , den Winkel des Hauptschnittes des Zerlegers mit der Einfallsebene mit a bezeichnet :

$$O = h \sin a \cos\left(\frac{\delta}{2} + \omega\right) \sin\left(\frac{d}{2} + \varphi + \frac{2\pi}{T} t\right) - k \cos a \sin\left(\frac{\delta}{2} + \omega\right) \sin\left(\frac{\delta}{2} + \frac{2\pi}{T} t\right)$$

$$E = h \cos a \cos\left(\frac{\delta}{2} + \omega\right) \sin\left(\frac{\delta}{2} + \varphi + \frac{2\pi}{T} t\right) + k \sin a \sin\left(\frac{\delta}{2} + \omega\right) \sin\left(\frac{\delta}{2} + \frac{2\pi}{T} t\right)$$

Zurück-
werfung des
Lichtes durch
metallisch-
undurchsich-
tige Krystalle.

Zurück-
werfung des
Lichtes durch
metallisch-
undurchsich-
tige Krystalle.

und wenn man $\operatorname{tg} \alpha = \frac{h}{k} \operatorname{tg} a$; $\operatorname{tg} \alpha' = -\frac{h}{k} \cot a$ 84
und reducirt, so findet man die Intensitäten des ordentlichen und des außerordentlichen Bildes proportional :

$$O_1 = (h^2 \sin^2 a + k^2 \cos^2 a) \left\{ \begin{array}{l} 1 - \cos \delta (\cos 2 \alpha \cos 2 \omega + \sin 2 \alpha \sin 2 \omega \cos \varphi) \\ + \sin \delta \cos 2 \alpha \cos 2 \omega (\operatorname{tg} 2 \omega - \cos \varphi \operatorname{tg} 2 \alpha) \end{array} \right\}$$

$$E_1 = (h^2 \cos^2 \alpha + k^2 \sin^2 \alpha) \left\{ \begin{array}{l} 1 - \cos \delta (\cos 2 \alpha' \cos 2 \omega + \sin 2 \alpha' \sin 2 \omega \cos \varphi) \\ + \sin \delta \cos 2 \alpha' \cos 2 \omega (\operatorname{tg} 2 \omega - \cos \varphi \operatorname{tg} 2 \alpha') \end{array} \right\}$$

Dieselben Formeln stellen die Intensitäten von O und E im Quarz von umgekehrter Drehung vor, wenn man Zeichen von δ ändert.

Diese Formeln werden zeigen, wie man durch leerkennbare Zustände des Lichtfeldes, z. B. aus der Gleichfarbigkeit der beiden Segmente in einem Bilde oder in beiden zugleich, dabei complementärer Färbung beider Bilder, oder gleicher Färbung mit complementärer Intensität, oder endlich gleicher Färbung und Intensität im ordentlichen und außerordentlichen Bilde, alle diejenigen Momente qualitativ und selbst quantitativ erfassen kann, welche bei der Zurückwerfung des Lichtes interessiren und für welche die seitherigen Hilfsmittel nicht immer genügten. Diese Momente sind Größendifferenzen beider Componenten von bestimmter Größe z. B. $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{2}$ Wellenlänge, Einfallswinkel, für welche beide Amplituden gleichmäßig verringert werden, Vorhandensein eines Winkels vollständiger Polarisierung, endlich Größe des Phasenunterschiedes und des Verhältnisses $\frac{k}{h}$ für irgendwelche Incidenz. Uebrigens ist bei allem diesem festzuhalten, daß k und h unter der Voraussetzung eingeführt wurden, daß die zur Einfallsebene parallelen und rechtwinkligen Schwingungen auch in diesen Richtungen verbleiben, was dann eintritt, wenn die Einfallsebene mit einem der Hauptschnitte der Fresnel'schen Elasticitätsfläche coincidirt. In beiden Quarzsegmenten werden dann die nämlichen Farben gezeigt, wenn die obigen Intensitätsausdrücke unabhängig vom Zeichen von δ sind. Die Bedingungen dafür sind :

$$\operatorname{tg} 2 \omega - \cos \varphi \operatorname{tg} 2 \alpha = 0; \quad \operatorname{tg} 2 \omega - \cos \varphi \cdot \operatorname{tg} 2 \alpha' = 0 \quad (3)$$

Wenn das nämliche Azimut ω beide Bilder gleichförmig geben soll, muß $\cos \varphi (\operatorname{tg} 2\alpha - \operatorname{tg} 2\alpha') = 0$ seyn, und diese Bedingung ist für $\varphi = \frac{\pi}{2}$ erfüllt, wo dann $\omega = 0$ oder $= 90^\circ$ wird.

Zurückwer-
fung des
Lichtes durch
metallisch-
undurchsich-
tige Krystalle.

Macht man unter diesen Bedingungen für den Zerleger $\operatorname{tga} = 0$ oder $= \infty$, so sind die Intensitäten $h^2 (1 - \cos \delta)$ und $k^2 (1 + \cos \delta)$, also bis auf die Intensität die Farben complementär. Macht man dagegen $\operatorname{tga} = 1$, so wird $\cos 2\alpha = \cos 2\alpha'$ und es werden beide Bilder von gleicher Intensität und Farbe. — Soll bei $\cos \varphi = 0$ das Azimut ω noch irgend einen beliebigen Werth behalten, so müßte $\alpha = \alpha' = 45$ oder 135° sein, was unmöglich ist. Man kann in diesem Falle nur einer der Gleichungen (2) genügen oder es kann bei einem beliebigen Azimut des einfallenden Strahles im Allgemeinen nur eines der beiden Bilder von gleichförmiger Farbe werden. Nimmt man z. B.

$\alpha = 45$ oder 135° , so ist $\operatorname{tg} \alpha = \pm \frac{k}{h}$ und die Intensitäten $O_1 = \frac{2h^2k^2}{h^2+k^2}$ und $E_1 = \frac{h^4+k^4}{h^2+k^2} (1 - \cos \delta \cos \alpha')$, das ordentliche Bild wird farblos, das andre bleibt farbig; das

Umgekehrte findet statt, wenn $\cot \alpha = \pm \frac{k}{h}$ wird. — Die Bedingung $\cos \varphi (\operatorname{tg} 2\alpha - \operatorname{tg} 2\alpha') = 0$ ist auch erfüllt,

wenn $\operatorname{tg} 2\alpha = \operatorname{tg} 2\alpha'$, d. h. wenn $\alpha = \frac{\pi}{2} + \alpha'$ oder

$\alpha = \pi + \alpha'$, was zu den Gleichungen $\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \alpha' + 1 = 0$ und $\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \alpha' = 0$ führt; da nun im Allgemeinen

$\operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \alpha' + \frac{h^2}{k^2} = 0$ und $\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \alpha' = \frac{h}{k} \cdot \frac{2}{\sin 2\alpha}$, so sind

jene Bedingungen nur erfüllt, wenn $h = k$, und in diesem Falle sind die beiden Bilder immer complementär, — oder wenn $h = 0$, was das Vorhandensein eines Winkels vollständiger Polarisation voraussetzt und wobei die Intensitäten $\sin^2 \alpha (1 - \cos \delta)$ und $\cos^2 \alpha (1 - \cos \delta)$, also die Bilder von identischer Farbe und complementärer Intensität werden.

— Ist der Zerleger so gestellt, daß das ordentliche Bild

Zurück-
werfung des
Lichtes durch
metallisch-
undurchsich-
tige Krystalle.

eine gleichförmige Farbe hat, so ist $\operatorname{tg} 2\alpha \cos \varphi = \operatorname{tg} 2\omega$ und die beiden Werthe α und $\frac{\pi}{2} + \alpha$, welche dieser Gleichung

genügen, geben zwei Stellungen des Zerlegers $\frac{h}{k} \operatorname{tg} \alpha$

$= \operatorname{tg} \alpha$; $\frac{h}{k} \operatorname{tg} \alpha' = \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right)$ und hieraus $\frac{h}{k} = -\cot \alpha \cot \alpha'$;

$\cos \varphi = \operatorname{tg} 2\omega \cdot \frac{\sin (\alpha + \alpha')}{\sqrt{-\sin 2\alpha \cdot \sin 2\alpha'}}$. Giebt man also dem

einfallenden Strahl irgend ein festes Azimut und mißt die beiden conjugirten Azimute α und α' des Zerlegers, welche z. B. das ordentliche Bild von gleichförmiger Farbe machen, so kann man bei irgend einer Incidenz den Phasenunterschied φ und das Verhältniß der Amplitudenverringern berechnen. Die Formeln (1), welche sich schon so fruchtbar in der Auslegung der Erscheinungen des oben beschriebenen Apparates erwiesen haben, geben auch noch den Weg an, wie man erkennen kann, ob in $\cos \varphi$ ein Zeichenwechsel stattgefunden, φ also durch 90° oder 270° gegangen ist, was entweder in allmählichem Fortschritt geschehen kann, wie bei den Metallen und starkbrechenden oder metallisch undurchsichtigen Krystallen, oder plötzlich (S. 172), wie bei den homogenen Mitteln. Die erste der Formeln (1) in Beziehung auf α differenzirt, dann ω mittelst der Gleichung $\operatorname{tg} 2\omega = \cos \varphi \operatorname{tg} 2\alpha$ eliminirt und $\alpha = \alpha = 0^\circ$ oder $= 90^\circ$ gesetzt, was so viel sagen will, als daß man das ordentliche Bild auf die Gleichförmigkeit zurückführt und den Hauptschnitt des Zerlegers parallel oder senkrecht zur Einfallsebene stellt, giebt $\frac{d\varphi}{d\alpha} = -2hk \sin \delta \cdot \cos \varphi$.

Je nachdem h und k von gleichem oder entgegengesetztem Zeichen sind, oder, wenn man diese Größen nur als absolute Werthe betrachten will, je nach dem Zeichen von $\cos \varphi$ muß der Zerleger von der gedachten Stellung aus etwas vorwärts oder rückwärts gedreht werden, wenn man den nämlichen Farbenwechsel herbeiführen will. — Dieses Mittel ist z. B. ganz vorzüglich geeignet, um durch den bloßen Anblick zu bestätigen, daß der Phasenunterschied zwischen

den componirenden rechtwinkligen Schwingungen bei der Zurückwerfung an durchsichtigen homogenen Mitteln von der senkrechten Incidenz bis zum Winkel der vollständigen Polarisation 180° und von diesem Winkel bis zur streifenden Incidenz 360° ist, während $\frac{h}{k}$ an den drei Grenzpunkten die Werthe 1, 0, 1 annimmt, wie dies die Fresnel'schen Formeln fordern. Der Winkel der vollständigen Polarisation kann mittelst des Apparates, wie oben bemerkt, aus der Bedingung gefunden werden, daß O und E für alle Azimute des Zerlegers gleichzeitig von gleichförmiger Farbe seien. Senarmont fand den Polarisationswinkel für Wasser = $53^\circ 5'$, für Flussspath = $55^\circ 1'$, für entfärbtes Bucheckernöl = $55^\circ 43'$. — Bei den Metallen ist der Phasenunterschied der beiden rechtwinkligen Componenten bei senkrechter Incidenz 180° , er geht beim Polarisationsmaximum durch 270° und wächst bei der streifenden Incidenz auf 360° . Die entsprechenden Werthe von $\frac{h}{k}$ sind 1, Minimum, 1. Senarmont fand den Winkel des Polarisationsmaximums für verschiedene Exemplare von Bleiglanz $75^\circ 13'$ bis $75^\circ 22'$, für Stahl $75^\circ 27'$, für Münzlegirung $73^\circ 33'$. — Die durchsichtigen starkbrechenden Körper bilden gewissermaßen (S. 171 u. 172) den Uebergang zwischen den homogenen durchsichtigen und den metallischen Mitteln, die Amplitude der in der Einfallsebene liegenden Schwingung geht durch einen sehr kleinen Minimumwerth und in der Nähe desselben geht der Phasenunterschied sehr rasch, wenn auch immer stetig von 180 durch 270 auf 360° . Wenn das Azimut des einfallenden Strahles und das des Zerlegers Null sind, so giebt z. B. Blende oder Arsensulfid das ordentliche Bild schwach aber deutlich grün, das außerordentliche lebhaft rosenroth; bei geringer Drehung des Zerlegers geht das erstere plötzlich in einen bleichen, fast farblosen Ton über, dem unmittelbar Rosenroth folgt.

Was die durchsichtigen doppelbrechenden Körper betrifft, welche bereits sehr vollständig behandelt sind, so

Zurück-
werfung des
Lichtes durch
metallisch-
undurchsich-
tige Krystalle.

Zurück-
werfung des
Lichtes durch
metallisch-
undurchsich-
tige Krystalle.

begnügte sich Senarmont, zwei Fälle zu betrachten, welche von Seebeck vernachlässigt zu sein schienen; er bestimmte die schiefen Incidenzen, bei welchen die beiden Componenten in gleichem Verhältniß verringert werden, so daß das Azimut des einfallenden Lichtes ungeändert bleibt, ferner die Aenderung des Azimutes bei senkrechter Incidenz. Beide Erscheinungen finden sich auch an den metallisch undurchsichtigen Krystallen; die zweite sogar befreit von aller Complication, welche aus der elliptischen Polarisirung entspringt. — Gleiche Amplituden der componirenden Schwingungen im reflectirten Strahle erhält man für keine Incidenz, wenn die Einfallsebene parallel dem Hauptschnitte; sie wurde daher rechtwinklig dagegen gestellt, ω und α zu 45° angenommen und der Krystall nacheinander in Luft, Wasser und entfärbtes Bucheckernöl ($n = 1,470$) getaucht. Die Werthe der Amplituden sind nach den Formeln von Neumann (1) berechnet.

Neigung d. refl. Fläche gegen die Axe.	Beobachtete Incidenzen.	Berechnete Werthe		
		I	J	
$45^\circ 23'$	$16^\circ 00'$	— 0,252	+ 0,246	in Luft.
0 7	$23^\circ 47'$	— 0,2188	+ 0,2190	
$45^\circ 23'$	26 15	— 0,1718	+ 0,1704	in Wasser.
0 7'	33 0	— 0,071	+ 0,1072	
	75 59	— 0,551	— 0,543	in Oel.
$45^\circ 23'$	36 16	— 0,0653	+ 0,0656	
0 7	> 45 0	— 0,0087	+ 0,011	
	51 7	— 0,0109	— 0,011	

Zur Untersuchung der zweiten Erscheinung ließ Senarmont außerhalb der Einfallsebene polarisirtes Licht unter einem andern als dem Polarisationswinkel auf ein dünnes Glas mit parallelen Flächen fallen. Der reflectirte Theil traf hierauf senkrecht einen horizontalen Spiegel, kehrte in sich zurück, um abermals auf die Glasplatte zu fallen, welche er durchdrang, um endlich zum Zerleger, einem doppelbrechenden Prisma zu gelangen, eine Vorrichtung,

(1) In den Schriften der Berliner Academie für 1835; Journ. de Math. de Mr. Liouville.

sehr ähnlich dem Nörrenberg'schen Polarisationsapparat. Zurück-
werfung des
Lichtes durch
metallisch-
undurchsich-
tige Krystalle.
 n und m seien die Verringerungen der Amplituden für die zur Einfallsebene der Glasplatte parallelen und rechtwinkligen Schwingungen, insoweit sie durch Reflexion an der Glasplatte und viermalige Brechung an dieser und der Oberfläche der Flüssigkeit hervorgerufen werden, h und k seien die Coefficienten der Schwächung, welche die zum Hauptschnitte des Krystalls parallelen und rechtwinkligen Schwingungen erleiden, so gelangen, wenn der Hauptschnitt mit der Einfallsebene der Glasplatte zusammenfällt, die Schwingungen zum Zerleger mit den Amplituden $nh \cos \omega$ und $mk \sin \omega$, und wenn der Hauptschnitt rechtwinklig zur Einfallsebene steht, sind die Amplituden $nk \cos \omega$ und $mh \sin \omega$. Nennt man a und a' die Azimute des ausfahrenden Strahles, so ist $\operatorname{tg} a = \frac{mh}{nh} \operatorname{tg} \omega$, $\operatorname{tg} a' = \frac{mh}{nk} \operatorname{tg} \omega$ und $\frac{h}{k} = \frac{\operatorname{tg} a'}{\operatorname{tg} a}$. Es erleidet nach der Fresnel'schen Theorie bei senkrechter Incidenz eine Schwingung durch Reflexion die Schwächung $\frac{1-l}{1+l}$, wo l das Verhältniß der Fortpflanzungsgeschwindigkeit in beiden Mitteln ist. Diefes ist beim Kalkspath für die zum Hauptschnitte senkrechte Schwingung $\frac{n-1}{n+1}$, für die parallele $\frac{\mu-1}{\mu+1}$, worin $\mu = \frac{nm'}{\sqrt{m^2 \cos^2 \lambda + m'^2 \sin^2 \lambda}}$, so daß $\frac{h}{k} = \frac{\mu-1}{\mu+1} \cdot \frac{m+1}{m-1}$. Für $a = 45^\circ$ ergab die Beobachtung:

Neigung der refl. Fläche gegen die Axe.	Werthe von a'	Werthe von $\frac{h}{k}$		
		beobachtet.	berechnet.	
$0^\circ 7'$	$31^\circ 42'$	0,7859	0,7894	in Luft.
$45^\circ 28'$	88 82	0,8924	0,8902	
0 7	13 42	0,4937	0,4902	
$45^\circ 23'$	28 18	0,7329	0,7355	in Oel.
0 7	$0^\circ 26'$	0,08697	0,0752	
45 23	0 3	0,02954	0,05184	

Nur die letzten Beobachtungen entfernen sich merklich vom theoretischen Resultate, weil die gemessenen Winkel klein sind und die Beobachtungsfehler darum einen allzu großen Einfluß üben.

Zurück-
werfung des
Lichtes durch
metallisch-
undurchsich-
tige Krystalle.

Unter den mit metallischer Undurchsichtigkeit begabten Krystallen fand Senarmont das Schwefelantimon für seine Untersuchung geeignet. Dasselbe krystallisirt in geraden rhombischen Prismen, die Spaltungsebene halbirt den Winkel der optischen Axen und enthält die dazu senkrechte Axe. — Stellt man die Spaltungsfläche so auf, daß man sie in ihrer Ebene drehen kann, so nehmen bei einer Incidenz von $78^{\circ} 30'$ beide Bilder gleichzeitig eine gleichförmige Färbung an, wenn die Einfallebene zur Axe des Krystalls parallel ist, und bei $76^{\circ} 40'$, wenn sie zu ihr senkrecht steht, was jedesmal dem Phasenunterschiede $\varphi = \frac{\pi}{2}$ entspricht. — Wenn man in einer der beiden Lagen und bei irgend einer Incidenz das eine der beiden Bilder gleichförmig gemacht hat, so sieht man die Farbentöne seiner Hälften auseinandergehen, sowie man den Spiegel dreht; der Gegensatz erreicht sein Maximum, wenn die Einfallebene die entgegengesetzte Lage zur Krystallaxe angenommen hat. — Wenn man immer das ordentliche Bild zur Gleichförmigkeit zurückführt, erscheinen die beiden Segmente von E in Farben, deren Contrast anfangs mit abnehmender Incidenz zunimmt, zuletzt aber wieder schwächer wird. Bei $18^{\circ} 30'$ werden beide Bilder gleichförmig und complementär, wenn die Einfallebene parallel der Axe. Dann ist also $\frac{h^2}{k^2} = 1$. Nimmt die Incidenz noch mehr ab, so hören die Bilder auf gleichzeitig gleichförmig zu seyn, wie auch die Krystallaxe liege. Man gewinnt somit auf die anschaulichste Weise alle Kennzeichen der Krystallreflexion, und Senarmont hat nicht unterlassen, noch zahlreiche numerische Bestimmungen hinzuzufügen (1). — Die senkrechte Reflexion am Schwefelantimon zeigt durchaus die nänlichen Eigenthümlichkeiten wie am Kalkspath, doch scheint die Doppelbrechung weniger kräftig zu sein und es tritt dagegen eine schwache aber deutliche Farbenzerstreuung auf. — Die beiden bis

(1) Ann. ch. phys. [3] XX, 436; Pogg. Ann. Ergänz.-Bd. II, 552.

jetzt genannten Lagen der Einfallebene fielen mit zwei Hauptschnitten der Fresnel'schen Elasticitätsfläche zusammen. Wenn man die Krystallaxe schief gegen die Einfallebene neigt, so erlöscht, wenn man den Doppelquarz weglässt und die Hauptschnitte des Nikols und des Zerlegers parallel oder rechtwinklig zur Einfallebene stellt, keins der beiden Bilder, was auf eine Ablenkung der Polarisations-ebene schliessen lässt. Um zu erkennen, ob das Licht elliptisch polarisirt sei, zerlegt man den reflectirten Strahl mit einer gegen die Axe senkrechten Kalkspathplatte und einem Turmalin; man beobachtet eine, wenn auch schwache, Verschiebung des schwarzen Kreuzes und der Ringe, jedoch nur dann, wenn die einfallende Schwingung parallel der Einfallebene und die Incidenz nicht kleiner als 75 bis 80° ist. — Man findet also bei den krystallisirten undurchsichtigen Körpern die Eigenschaften der Krystall- und Metall-reflexion gepaart; die Doppelbrechung in den opaken Körpern ist in dem Vorstehenden hinlänglich bewiesen und hiermit eine Lücke in der experimentellen Grundlage der Wellentheorie glücklich ausgefüllt.

Zurück-
werfung des
Lichtes durch
metallisch-
undurchsich-
tige Krystalle.

Dove (1) bemerkt, dass, wenn man Licht senkrecht auf eine rauhe Fläche, z. B. eine weisse Wand fallen lässt, dieses gleichmässig zerstreut und reflectirt werde, während an einer spiegelnden Fläche das ausserhalb der Einfallebene zurückgeworfene, also zerstreute Licht in den Ebenen polarisirt sei, in welchen es wahrgenommen werde. Betrachtet man ein gefirnifstes Oelgemälde mit einem Nikol, so verschwindet der Glanz. Um zu der Ansicht, dass natürliches Licht nicht aus zwei senkrecht zu einander polarisirten Componenten, sondern aus Schwingungen in allen möglichen Richtungen senkrecht zum Strahle bestehe, einen Beitrag zu liefern, schliiff Dove in eine dicke Glasplatte eine konische Oeffnung ein, und liess die Sonnenstrahlen durch eine ringförmige Oeffnung senkrecht auf die grössere

Depolarisa-
tion
des Lichtes.

(1) Berl. Acad. Ber. 1847, 75; Pogg. Ann. LXXI. 115; Phil. Mag.

[3] XXX, 469.

Depolarisation des Lichtes. Grundfläche des abgestumpften Kegels fallen, die an der geschliffenen Seitenfläche, da der Winkel an der Spitze des Kegels $70^{\circ} 50'$ betrug, in allen möglichen Azimuten polarisirt, nach der Zurückwerfung sich in einem Punkte schneiden. Dieses Licht verhielt sich gegen ein Glimmerblatt und einen Analysator wie natürliches.

Newton'sche Farbenringe. Brücke (1) hat die Farbenfolge in den Newton'schen Ringen genauer studirt, indem er die Farben der Gypsplättchen im Polarisationsapparat bei ganz allmählig anwachsender Dicke einer genauen Betrachtung unterwarf. In der ausführlichen Beschreibung der Farben der sechs ersten Ordnungen finden sich einige Berichtigungen der Newton'schen Scala.

Electrische Farbenringe. Die von Nobili entdeckten Farbenringe, welche durch metallische Niederschläge auf einer Metallplatte entstehen wenn dieser, als der einen Electrode, ein Metalldraht als zweite Electrode in einigem Abstand senkrecht gegenübergestellt wird, werden nach Becquerel gut dargestellt wenn man eine Neusilberplatte mit einer dünnen Schicht einer Auflösung von Bleioxyd in Kalihydrat übergießt und das freie Ende eines nach Wollaston in einem Glasrohr äußerst fein ausgezogenen Platindrahtes gegenüberstellt indem man ihn mit dem negativen, die Platte mit dem positiven Pole einer Säule von 8 — 10 Elementen verbindet — Beetz (2) fand übrigens galvanisch vergoldete Silberplatten und Platinplatten zur Erzielung regelmäßiger Ringensysteme geeigneter. Da die Dicke des metallischen Niederschlags von dem Mittelpunkt nach dem Rande hin abnimmt so bieten die Ringe die umgekehrte Anordnung der Newton'schen dar, mit welchen sie übrigens einerlei Erklärung grund haben.

E. Becquerel hat, um eine genauere Theorie der Erscheinung zu geben, die Abnahme der Dicke der Metallschicht vom Mittelpunkte nach dem Rande hin durch die

(1) Pogg. Ann. LXXIV, 582. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 71; Ph. Mag. [3] XXXIII, 7.

Gleichung $y = \frac{A}{\sqrt{m^2 + x^2}}$ ausgedrückt, worin A eine Con- Electrische
Farberringe.

stante, m der Abstand der Polspitze von der Platte, x die Entfernung des betrachteten Punktes vom Mittelpunkt des Ring-systems, y die Dicke der Metallschicht bedeutet, und das Ohm'sche Gesetz zu Grunde gelegt ist. — Kann man m gegen x vernachlässigen, so vereinfacht sich die obige Gleichung, indem $y = \frac{A}{x}$, und hiermit sollen nach Becquerel

zwei Beobachtungsreihen gut gestimmt haben. Du Bois-Reymond (1) findet diese Uebereinstimmung unerklärlich, da jene Gleichung auf einer mangelhaften Theorie beruhe. Die Ströme breiten sich von jedem Punkte der angewendeten Polspitze kegelförmig nach der Platte hin aus; bringt man diesen Umstand mit Hülfe der höheren Rechnung in Anschlag, immer mit Zugrundelegung des Ohm'schen Ge-

setzes, so kommt die Gleichung $y = \frac{A}{(x^2 + m^2)(\sqrt{x^2 + m^2} - \rho)}$,

worin ρ der Halbmesser des Poldrahtes ist. Kann man ρ und m gegen x vernachlässigen, so hat man endlich $y = \frac{A}{x^3}$;

so daß also die Dicken der niedergeschlagenen Schichte sich umgekehrt, wie die Würfel, nicht wie die ersten Potenzen des Abstandes von der Mitte verhalten. Beetz hat es unternommen, die Richtigkeit dieser Gleichung experimentell zu bestätigen, indem er die Halbmesser der dunkeln und hellen Ringe (im zweiten Ringsystem), bei monochromatischer Beleuchtung durch die den Linien B, D, E und F entsprechenden Stellen des Spectrums, maß. Die Uebereinstimmung war höchst befriedigend, während die Becquerel'sche Gleichung bedeutende Differenzen giebt. — Da nach Messungen von Beetz der Brechungsindex des Bleisuperoxyds = 1,964, also kleiner ist, als der des Goldes, so müssen die geraden Producte der dritten Potenzen der Halbmesser für die dunkeln Ringe und die Pro-

(1) Pogg. Ann. LXXI, 71; Phil. Mag. [3] XXXIII, 7.

Electrische
Farbenringe.

ducte mit den ungeraden Zahlen für die hellen Ringe stante Werthe geben. Auch dies bestätigte sich g mit Ausnahme der beiden äußersten Ringe, welche die Begrenzung der Platte, durch die in der Mitte auftretende Ladung im Verhältniß zu klein ausfallen, sowie dieser Fehler auch durch Vernachlässigung der Gröfse noch vermehrt werden mußte.

Erscheinungen an dünnen
Platten im polarisirten
Lichte.

Auf eine Arbeit von Brewster (1) über die Erscheinungen, welche dünne Platten im polarisirten Lichte und welche das *Phil. Mag.* für 1848 mittheilt, gehen wir hier nicht näher eingehen zu sollen, da diese Arbeit in den *Philos. Trans.* für 1841 publicirt, bereits veröffentlicht worden ist. Nur das Hauptresultat setzen wir. Wenn zwei polarisirte Lichtbündel, reflectirt von einer dünnen Platte, die auf einer reflectirenden Unterlage liegt, mit einander interfereiren, so geht keine halbe Undulation verloren, oder es entstehen Ringe mit weifsem Mittelpunkte gebildet, wenn die seitige Neigung der Polarisationssebene gröfser ist als die Neigung kleiner als 90° , so geht eine halbe Undulation verloren, und es entstehen Ringe mit schwarzen Mittelpunkten; ist endlich die Neigung genau 90° , interfereiren die Lichtbündel nicht, und es werden keine Ringe gebildet.

Theorie
des schwarzen
Flecks in der
Mitte der
Newton'schen
Ringe.

G. Stokes (2) hat sich mit der Theorie des schwarzen Flecks in der Mitte der Newton'schen Ringe beschäftigt. Seine Intensitätsformeln für das reflectirte Licht geben außer den bereits bekannten Resultaten noch, die Intensität des schwarzen Flecks, wenn der Einfallswinkel zwischen dem einfallenden und einem andern durch einen einfachen Sinus gegebenen Werthe liegt, gröfser ausfällt in senkrechter Einfallsebene polarisirtem Lichte, als im Lichte, welches

(1) *Phil. Mag.* [3] XXXII, 181. — (2) *Pogg. Ann.* LVIII
— (3) *Instit.* 1848, 290.

dieser Ebene polarisirt ist. Die Beobachtung bestätigt dieses Resultat.

Brewster hat im Jahre 1829 die Entdeckung gemacht, Irisirendes Silber. daß das Farbenspiel der Perlmutter durch Abdruck der Oberfläche auf Blei, Zinn, leichtflüssiges Metallgemisch etc. übertragen werden kann. Da die Erscheinung an diesen Körpern, ihrer Oxydirbarkeit wegen, vergänglich ist, so empfiehlt Brockelsby (1), dieselbe durch Galvanismus auf Silber zu übertragen, indem man das leichtflüssige Metallgemisch nach dem Erkalten in Cyansilberlösung als negativen Pol einer kleinen Batterie anwendet. Dove (2) Irisirendes Kupfer. theilt mit Bezug hierauf mit, daß er bereits 1839 galvanoplastische Abdrücke von irisirenden Knöpfen in Kupfer gefertigt habe.

Hausmann (3) hat eine Zusammenstellung aller Fälle, Irisirende Oberflächen von Mineralien. in welchen Mineralien irisirende Oberflächen zeigen, gegeben, und diese Erscheinung auf ihre verschiedenen Ursachen zurückgeführt. Die Farbenerscheinung beruht immer, wie bei dem angelaufenen Stahle, auf einer oberflächigen Schicht, welche mit der übrigen Mineralmasse heterogen ist und vom Lichte durchdrungen wird. Die Entstehung einer solchen heterogenen Schicht aber beruht entweder auf einem Ueberzug aus einem andern Mineral, wie er namentlich durch Eisenoxydhydrat (z. B. auf Eisenglanz) oder Manganoxdhydrat gebildet wird, oder auf einer chemischen Veränderung der Mineraloberflächen, nämlich einer Oxydation, meist von Wasseraufnahme begleitet und entweder ohne oder mit Ausscheidung eines andern Elementes.

Unter den Mineralien der ersten Art zeichnet sich der Arsenik durch raschen Uebergang der frischen Flächen ins Irisiren aus, im luftleeren Raum oder trockner Luft erhält sich derselbe jedoch jahrelang unverändert. Es gehören dahin ferner Wismuth, Speiskobalt, Hartkobalterz, Arsenikkies,

(1) Sill. Am. J. [2] I, 112; Pogg. Ann. LXX, 204. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 246. — (3) Instit. 1848, 150; Sill. Am. J. [2] VI, 254.

Irisirende
Oberflächen
von
Mineralien.

Kobaltglanz, Nickelglanz, Bleiglanz, Magneteisen. — den Mineralien, bei welchen das Irisiren durch Oxydation, verbunden mit Ausscheidung eines Elementes, entsteht gehören Schwefelmetalle, welche sich in Oxyde und Hydrate verwandeln, wie Wasserkies, Schwefelkies, Magneteisenkies, Kupferglanz, Kupferkies, Buntkupfererz. Bei den letzteren Mineral bedingt die Feuchtigkeit der Luft die Zersetzung der Oberfläche. Ueber Schwefelsäure unter einer Glocke erhalten sich die Flächen jahrelang frisch ohne eine Spur von Irisfarben; sie färben sich dagegen in 2 Stunden, wenn Wasser unter die Glocke gegeben wird. — Weiter sind Antimonglanz, Zinkenit, Federspath, Kupferantimonglanz, Rothgiltigerz, Fahlerz hierhin zu rechnen. — Oxydation mit Ausscheidung von Wasser ist Ursache des Irisirens bei dem Graubraunstein, Oxydation unter Ausscheidung von Kohlensäure bei dem Sphärosiderit, Eisenspath, Braunspar, Bitterkalk und Magnesit. — Irisiren durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff beobachtet man am Silberglanz. — In allen Fällen, in welchen das Irisiren auf einer Oxydation beruht, befördert man dasselbe durch Erhöhung der Temperatur. Die Veränderungen der Oberfläche sind in der Hitze nicht immer die nämlichen, wie bei gewöhnlicher Temperatur; bei manchen Mineralien erzeugt die Hitze eine Verglasung der oberflächigen Schichten wie bei dem Lepidomelan, Ilvaït, Arfvedsonit und Gahnit. — Andere Mineralien endlich tragen an der Oberfläche nur irisirende Schuppen, wie der Ilvaït, Thallit, die braunen Varietäten von Glimmer und andere Silicate.

Farben-
schiller der
Krystalle.

Haidinger (1) hat einen weiteren Beitrag zum Studium der Farben der krystallisirten Körper geliefert durch Untersuchung des metallglänzenden Schillers, welcher manchen Krystallen (2) ein so prachtvolles Ansehen giebt und beweist, daß nicht nur die Farben des durchgehenden, sondern auch die des reflectirten Lichtes von der Lage der Flächen gegen die Axen des Krystalls abhängig sind. E

(1) Pogg. Ann. LXXI, 321. — (2) Pogg. Ann. LXX, 574.

zeichnen wir das ordentliche Bild der dichroskopischen Loupe mit O, das außerordentliche mit E, so haben die Beobachtungen Folgendes ergeben. 1) Kaliumplatincyauür. Im durchfallenden Licht senkrecht gegen die Axe blaß schwefelgelb, längs der Axe himmelblau. Im reflectirten Licht, die Einfallebene senkrecht zur Axe : O mit Glasglanz, E glanzlos; die Einfallebene parallel der Axe : O farblos glänzend, E mit blauem Lichtschein; von der Endfläche zurückgeworfen : O und E gleich blau. 2) Bariumplatincyauür. Im durchfallenden Lichte: O rein gelb, E gelb mit Beimischung von Roth und Grün. Im reflectirten Lichte, die Einfallebene senkrecht zur Axe : O weiß, E farb- und glanzlos; die Einfallebene parallel der Axe : O weiß, E laurbau. — Wenn man den Krystall so gegen das Licht hält, daß er durch eine Endfläche erleuchtet wird, so erscheint die Kante zwischen dieser und einer Seitenfläche mit einem reichen zeisiggrünen Lichtschein, welcher in der dichroskopischen Loupe ganz in das Bild O eingeht, während E die rein gelbe Durchgangsfarbe zeigt. Diese Beispiele mögen genügen, um die Beobachtungsart Haidinger's zu characterisiren. Er untersuchte außer den genannten Salzen noch Magnesiumplatincyauür, welches im durchfallenden Lichte carminroth, im zurückgeworfenen grün und blau ist; Murexid, welches dunkelroth im durchfallenden, grün goldglänzend im zurückgeworfenen Lichte ist; Hydrochinon, schwarzgrün mit grüngelber Metallfarbe; oxalsaures Platin-oxydul, welches sich aus der olivengrünen Auflösung mit kupferrothem Metallglanze absetzt und woran sich außerdem blau, tombackbraun und violblau zeigen; Indig, kupferroth, gold- und messinggelb. Haidinger nimmt zur Erklärung dieser Erscheinungen an der Grenzfläche zweier optischer Mittel noch eine Aetherschicht von besonderer Beschaffenheit an; die erste Fläche derselben liefert die Reflexion des weißen Lichtes, sowie von ihr aus die doppelte Brechung und Farbenzerstreuung beginnt. An der zweiten Fläche erfolgt dann die Reflexion eines Theils des einen Farbenbildes, wie z. B. bei

dem Magnesiumplatincyanür das Grün des außerordentlichen Strahles reflectirt wird. Diese Erklärung ist eine durchaus willkürliche, da kein anderes optisches Phänomen auf das Vorhandensein einer eigenthümlichen Aetherschicht an der Oberfläche hinweist.

Einfache
Brechung
des
Lichtes.
Neuer Aus-
druck des
Brechungs-
gesetzes.

Minding (1) hat einen Ausdruck des Snell'schen Brechungsgesetzes mitgetheilt, welcher für manche Anwendungen bequemer zu sein scheint, als der gewöhnliche. Zwei dioptrische Sätze, der eine von Dupin und Malus der andere von Gergonne, werden von Minding mit Hilfe seines neuen Satzes kürzer bewiesen, als von den Entdeckern. Der Ausdruck des Brechungsgesetzes ist folgender: der Cosinus der Neigung des verlängerten einfallenden Strahles, gegen irgend ein beliebig auf der Grenzfläche des brechenden Mittels vom Einfallpunkte aus gezogenes Linearelement, steht zu dem Cosinus der Neigung des gebrochenen Strahles gegen dasselbe Linearelement in einem constanten Verhältnisse, nämlich dem des Brechungsverhältnisses. — Es seien η und η' die Winkel des verlängerten einfallenden und des gebrochenen Strahles mit der in der Einfallsebene liegenden Linearelement, ϑ und ϑ' die Winkel dieser Strahlen mit einem andern in der brechenden Fläche liegenden Elemente, so ist $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \eta\right) = n \sin\left(\frac{\pi}{2} - \eta'\right)$ oder $\cos \eta = n \cos \eta'$, weiter wenn δ der Winkel beider Elemente ist, $\cos \vartheta = \cos \eta \cos \delta$; $\cos \vartheta' = \cos \eta' \cos \delta$, also auch $\cos \vartheta = n \cos \vartheta'$, was der obigen Satz enthält.

Brechungs-
verhältniss
des Eisens.

Bravais (2) hat das Brechungsverhältniss des Eisens mittelst des Wollaston'schen Goniometers gemessen, und folgende Werthe erhalten:

Mitte des Roth	1,3070	Mitte des Grün	1,3115
" " Orange	1,3085	" " Blau	1,3150
" " Gelb	1,3095	" " Violett	1,3170

(1) Petersb. Acad. Bull. V, 113; Pogg. Ann. LXX, 268. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXI, 361; Pogg. Ann. Ergänz.-Bd. II, 576.

Airy (1) giebt einen Zusatz zu seiner Arbeit über die Brennlinien. Lichtintensität in der Nachbarschaft der Brennlinien. De Morgan hat hiernach das Integral $\int_0^\infty d\omega \cos(\omega^2 - m\omega)$ in einer Reihe integrirt, während Airy, um das ihm dunkel scheinende Integral $\int_0^\infty d\vartheta \cos \vartheta$ zu umgehen, die Quadraturen angewendet hat.

Brewster (2) hat bekanntlich vor einer Reihe von Farbener-
streuung.
Zusammen-
setzung des
Spectrums. Jahren schon die Ansicht aufgestellt, daß das Spectrum nur aus drei Grundfarben, *roth*, *gelb* und *blau* bestehe, welche sich über die ganze Länge des Farbenbildes mit ungleicher Intensität erstrecken und so nicht allein orange, grün und violett als Mischfarben gäben, sondern auch noch eine gewisse Menge weißen Lichtes über das Spectrum verbreiteten, welches darum unzerlegbar sei, weil es aus *verschiedenfarbigen Strahlen von gleicher Brechbarkeit* bestehe. Das Motiv zu dieser Ansicht hat die Beschaffenheit des Spectrums geliefert, wenn man dasselbe durch farbige absorbirende Mittel, wie z. B. durch Smalteglas, betrachtet. Roth tritt unmittelbar neben glänzendem, reinem Gelb auf, das Orange ist verschwunden etc. Airy (3) hat einen Versuch gemacht, Brewster's Resultate als aus unvollkommenen Beobachtungen hervorgegangen darzustellen; er sagt, das modificirte Spectrum müsse unmittelbar mit einem unveränderten verglichen, alles fremde Licht abgehalten werden; er, Airy, erinnere sich vor längerer Zeit sorgfältige Versuche mit absorbirenden Mitteln angestellt zu haben, welche Brewster's Meinung durchaus widersprüchen. Brewster (4) hat diesen Angriff indessen mit Glück zurückgewiesen, indem er bemerkt, daß bei seinen Beobachtungen alle jene Rücksichten genommen worden, daß John Herschel ähnliche Resultate erhalten habe, und daß ein aus der Erinnerung unvollständig mitgetheilte Versuch weder geeignet sei, seine mit hunderten von absorbirenden Mitteln gewon-

(1) Phil. Mag. [3] XXXIII, 311. — (2) Edinb. Trans. XII, 123. —
(3) Phil. Mag. [3] XXX, 73; Pogg. Ann. LXXI, 393. — (4) Phil. Mag.
[3] XXX, 158; Pogg. Ann. LXXI, 397.

nenen Resultate umzustossen, noch von einem Geschreiber der inductiven Wissenschaften (Whewell) unzweifelhafte Thatsache auf die späteste Nachwelt gebracht zu werden.

Zerlegung
des Sonnen-
lichtes.

Melloni (1) giebt einen Bericht über Draper's beiten über Lichtentwicklung beim Glühen, und nimmt Gelegenheit zu einer Kritik von Brewster's eben erwäh Untersuchungen über die Constitution des prismatis Farbenbildes. M. wirft diesem Naturforscher vor, er sich durch den Effect eines complexen Farbenbildes täus lassen, indem bei homogenen oder Elementarspec welche Melloni bei seinen Versuchen angewendet zu h versichert, niemals Gelb dicht neben Roth zu sehen s dem Fall, dafs man das Orange durch ein absorbirendes M weggenommen. — Brewster (2) weist diese Zumuth sowie die ganze Kritik Draper's und Melloni's, mit vo Rechte, als ungeschickt, auf das Entschiedenste zurück

Längstreifen
im Sonnen-
spectrum.

Wenn man mittelst eines Heliostaten Sonnenlicht d eine Spalte in ein dunkles Zimmer treten läfst, so beob man im prismatischen Farbenbilde, namentlich dann, v die Spalte enger wird, mehr oder weniger Längsstre welche von Zantedeschi (3), Ragona-Scina (4) und W mann (5) merkwürdiger Weise aus Reflexion, Brech Dispersion, Interferenz und Beugung hergeleitet wu während Knoblauch und Karsten (6), Kuhn (7) Crahay (8) mit leichter Mühe nachwiesen, dafs jene S fen einzig von Unvollkommenheiten des Apparates, Unebenheiten, Staubtheilchen an dem Spiegel und Spalte herrühren. Die Arbeiten der drei erstgenan

(1) Phil. Mag. [3] XXXII, 262; Pogg. Ann. LXXV, 62; Arch nat. V, 238. — (2) Phil. Mag. [3] XXX, 461; XXXII, 489; Pogg. LXXV, 81. — (3) Raccolta fisico-chimica italiana 1846, I, 87. (4) Raccolta fis.-chim. ital. 1847, II, 483; 1848, III, 17. — (5) ph. nat. VII, 33; Phil. Mag. [3] XXXII, 499; Instit. 1848, 96. (6) Pogg. Ann. LXXIV, 389. — (7) Pogg. Ann. LXXV, 455. — (8) stit. 1848, 268.

Physiker über diesen Gegenstand gehören zu denjenigen, welche gemacht zu sein scheinen, um längst gesicherte Resultate der Beobachtung wieder prekär zu machen. Der Eine sieht die Längsstreifen besser bei breiter, der Andere bei schmaler Spalte; die drei Beobachter geben die Abhängigkeit der Streifen vom Apparate zu, und Zantedeschimuthet in Folge davon Frauenhofer'n zu, die Abhängigkeit seiner Linien (der Transversallinien) von der Beschaffenheit des Apparates übersehen zu haben. Die theoretischen Erörterungen sind dunkel und unverständlich.

Längsstreifen
im Sonnen-
spectrum.

J. Müller in Freiburg beschäftigt sich mit der Erklärung der natürlichen Farben, indem er dabei von der durch Wrede (1) aufgestellten Ansicht ausgeht, wonach die Farben durch Interferenz der an der Oberfläche der Körper und in verschiedenen Tiefen zurückgeworfenen Strahlen entstehen sollen. Müller (2) wirft Sonnenlicht mit Hilfe eines Heliostaten durch eine senkrechte Spalte in ein dunkles Zimmer, und läßt es durch eine zweite Spalte auf ein Flintglasprisma fallen. Er fängt das Farbenbild auf einem Schirm von durchscheinendem Papier auf, welcher mit horizontaler Theilung in Zolle und Linien versehen ist. Man kann mittelst dieser Vorrichtung mehrere der Frauenhofer'schen Linien beobachten und ihre Abstände vergleichen; zugleich bietet dieser Apparat vor der Beobachtung durch das Fernrohr den Vortheil einer totalen Uebersicht des Farbenbildes. Läßt man das Licht vor der Zerlegung durch farbige Mittel gehen, so treten im Farbenbilde mehr oder weniger breite Schatten, oder sehr zahlreiche, schmale, schwarze Linien, oder auch beide Erscheinungen vereinigt auf. Erstere entsprechen den kräftigen Farben niederer Ordnung, die zweite Erscheinung den blässeren Farben oder dem Weiß höherer Ordnung, der dritte Fall aber Combinationen aus niederen und höheren Farbenordnungen. Ganz ähnliche Erscheinungen erhält

Theorie der
natürlichen
Farben.

(1) Pogg. Ann. XXXIII, 353. — (2) Pogg. Ann. LXIX, 93; LXX, 115.

Theorie der
natürlichen
Farben.

man, wenn man Interferenzfarben prismatisch zerlegt, was Müller (1) sehr bequem dadurch ausführte, daß er das Licht vor der Zerlegung durch Gypsblättchen von verschiedener Dicke gehen liefs. Diese, zwischen zwei Nikols eingeschaltet, deren Polarisationssebene parallel oder gekreuzt mit den Schwingungsebenen des Gypsblättchens einen Winkel von 45° bildeten, gaben die Polarisationsfarben, deren Entstehung durch Interferenz längst keinem Zweifel mehr unterworfen ist, und für welche die Farbenstrahlen, welche ausgelöscht werden, im Voraus berechnet werden können. Das Violett der zweiten Ordnung giebt einen dunkeln Streifen im Gelb, beim Gelb der zweiten Ordnung ist das violette Ende des Spectrums ausgelöscht, die Farben der vierten Ordnung zeigen schon zwei dunkle Streifen, und man erhält 3, 4, 5 . . und endlich sehr viele feine dunkle Streifen, wenn man nach einander immer dickere Gypsblättchen wählt. Wendet man 3 Nikols an, und bringt zwischen je zwei ein Gypsblättchen in der gehörigen Lage, so erhält man Combinationen zweier Farben. Ein Gypsblättchen, welches das Violett zweiter Ordnung zeigt, mit einem andern, welches dick genug ist, um weiß zu erscheinen, verbunden, giebt bei der prismatischen Zerlegung eine Erscheinung, welche Analogie mit der Farbe der Joddämpfe zeigt.

Um Material für die weitere Durchführung der Theorie zu gewinnen, hat Müller (2) das Licht von 12 gefärbten Flüssigkeiten prismatisch zerlegt. Er stellt eine Schicht der möglichst concentrirten Flüssigkeit zwischen Plangläsern vor der zweiten Spalte seines Apparates auf (s. oben) und liest auf dem getheilten Schirme die Länge der ausgelöschten Farbenräume ab, verdünnt dann die Flüssigkeit mit der gleichen Menge Wasser, liest wieder ab u. s. f. Eine Lösung von Pariser Blau in Oxalsäure (blaue Tinte) gab fol-

(1) Pogg. Ann. LXIX, 98; LXXI, 91. — (2) Pogg. Ann. LXXII, —

gende Resultate : Während das ganze Farbenbild von Theilstrich 44 bis 70 ging, gab

Theorie der natürlichen Farben.

die concentrirte Lösung hell zwischen 52 und 58	
auf $\frac{1}{2}$ verdünnt	50 „ 60
„ $\frac{1}{4}$ „	49 „ 62
„ $\frac{1}{8}$ „	47 „ 63
„ $\frac{1}{16}$ „	46 „ 64,5
„ $\frac{1}{32}$ „	45,5 „ 65,5

Hiernach hat Müller Curven construirt, welche das Verhalten des Farbenbildes unter diesen Umständen übersichtlich darstellen, und zwar außer für die genannte Flüssigkeit noch für schwefelsaures Kupferoxydammoniak, Indigolösung Chromalaun, Lackmustinktur, eine Mischung von zweifach-chroms. Kali mit schwefels. Kupferoxydammoniak, eine Mischung von Saflor mit blauer Tinte, grüne Tinte, zweifach-chroms. Kali, Schwefelcyaneisen in Wasser, Schwefelcyan-eisen in Aether gelöst, Karmin. — Sehr auffallend waren die Erscheinungen, welche das zweifach-chroms. Kali darbot. Eine möglichst concentrirte Lösung, welche noch so hell war, daß man keine bedeutende Absorption erwarten konnte, löschte alles Licht vom Grün bis zum Violett völlig aus, während gelb, orange und roth ungeschwächt durchgingen. Bei der concentrirten Lösung ging das Licht von Theilstrich 63 bis 69, bei Verdünnung auf $\frac{1}{8}$ nur von 61 bis 70, erst bei Verdünnung auf $\frac{1}{16}$ erschien weiterhin ein schwacher Schimmer, und bei Verdünnung auf $\frac{1}{32}$ war das violette Ende des Farbenbildes noch ausgelöscht. — Eine Theorie dieser Erscheinungen steht noch zu erwarten.

* Brücke (1) hat wahrgenommen, daß ein keilförmiges Gypsblättchen zwischen parallelen Nikols an seiner dünnsten Stelle von Weiß allmählig in Braun übergeht, und daß diesem Braun bei Kreuzung der Nikols Lavendelgrau als Complementärfarbe entspricht; er hat diese Bemerkung unter dem Titel »über das Wesen der braunen Farbe« bekannt gemacht.

(1) Pogg. Ann. LXXIV, 461; Phil. Mag. [3] XXXIII, 281.

Durocher (1), Martins (2) und Collomb (3) haben Bemerkungen über die Farbe der Gletscher und der an ihnen kommenden Wasser mitgeteilt.

Licht-
zerstreuung
im Innern
fester u. flüs-
siger Körper.

J. Herschel hatte die Farbe, welche einige Varietäten des Flußspaths, sowie Lösungen von schwefelsaurem Chinin im reflectirten Lichte zeigen, und welche von der Durchgangsfarbe verschieden ist, einer oberflächigen Dispersion zugeschrieben und Epipolismus genannt. Brewster (4) zeigt nun, daß man bei Anwendung intensiver Lichtbündel sich überzeugen könne, daß die Erscheinung auf einer Dispersion im Innern der Masse bis zu bedeutender Tiefe beruhe; und daß man sie bei einer großen Anzahl von Körpern, wie bei verschiedenen grünen Glassorten, sowie bei vielen Lösungen vegetabilischer Stoffe wie z. B. des Farbstoffes der Lorbeerblätter, des Orcinharzes, des schwarzen Thees, der Samen von *Colchicum autumnale*, des schwefels. Strychnins beobachten könne. Die Dispersion des eindringenden Strahles erreicht dann ihr Ende, wenn alle zerstreubaren Strahlen bereits abgesondert sind und dies ist bei dem schwefels. Chinin schon in sehr geringer Tiefe der Fall; daher dessen auffällender Epipolismus. Der zerstreute Lichtbündel ist größtentheils in der Reflexionsebene polarisirt. Bei einer Lösung von Berlinerblau kann man sehr deutlich beobachten, wie die Farbe mit dem Azimut wechselt, unter welchem man den Strahl betrachtet. Sie ist bläulich bei 90°, nelkenfarbig bei 100°, grünlich bei 120°, bläulich bei 150°, nelkenfarbig bei 170°.

Pleochroismus
des
Amethystes.

Haidinger (5) hat seine Beobachtungen über den Pleochroismus der Krystalle (Pogg. Ann. LXV, 1) durch eine Analyse der Farben des Amethystes vermehrt. Eine Platte, von Soleil senkrecht zur Axe geschliffen, zeigt, wenn man sie mit der dichroskopischen Loupe senkrecht

(1) Ann. ch. phys. [3] XXI, 488; Compt. rend. XXIV, 677. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXII, 496; Compt. rend. XXIV, 545. — (3) Compt. rend. XXIV, 1093. — (4) Phil. Mag. [3] XXXII, 401; Pogg. Ann. LXXII, 531. — (5) Pogg. Ann. LXX, 531.

gegen die geschliffenen Flächen betrachtete, gleiche Farben im ordentlichen und außerordentlichen Bilde nur in der Mitte der Platte, während dieses sonst bei einaxigen Krystallen durchaus der Fall ist. Das Feld bestand im Uebrigen aus drei Keilen von 90° mit gegen die Mitte des Winkels steigendem Blau, abwechselnd mit drei Keilen von 30° mit gegen die Mitte zunehmendem Roth. — Um die größten Farbenunterschiede in den beiden Bildern der Loupe zu erhalten, muß man durch den Krystall sehen senkrecht gegen eine Fläche P, welche den Rhomboëderflächen des Amethysts parallel läuft, oder gegen eine Fläche M, welche senkrecht auf der vorigen und parallel zur Axe ist, oder endlich gegen eine Fläche T rechtwinklig zu den beiden vorhergehenden. Die Fläche P giebt im ordentlichen Strahl ein schönes Violblau, im außerordentlichen ein reines Rosenroth; die Fläche T giebt dasselbe Violblau und ein reines Blau; hellere und dunklere Streifen, der P Fläche parallel, wechseln mit einander ab; die Fläche M zeigt ohne Loupe Violblau, was sich unter der Loupe in röthliches und bläuliches Violblau zerlegt. Die genannten Farbenerscheinungen, sowie andere, welche Haidinger durch mannigfaltige Abänderung der Versuche erhielt, sind in Uebereinstimmung mit der Beschreibung, welche Brewster schon vor längerer Zeit (*Philos. Trans.* 1819, S. 11) von den Farbentönen des Amethysts entworfen; sie weichen von den Erscheinungen des Dichroismus optisch einaxiger Krystalle sowohl, als des Trichroismus zweiaxiger Krystalle ab. Wenn Haidinger sagt: „Die Fläche senkrecht auf der Axe, welche bei allen einaxigen Krystallen sonst durchgängig zwei gleichfarbige Bilder giebt, ist also hier dichromatisch, übereinstimmend mit den zwei Paaren in entgegengesetzter Richtung mit ungleicher Geschwindigkeit stattfindenden circularen Schwingungen“, so wäre zu wünschen, daß näher entwickelt wäre, wie hiermit die Gleichfarbigkeit der beiden Bilder in der Mitte der Platte, sowie die aus der Streifung der Fläche T geschlossene Schichtung des Amethysts aus

Pleochroismus des Amethysts.

rechts und links drehenden Lamellen »parallel den Flächen P und parallel drei in der Axe zusammenschließenden Flächen eines dreiseitigen Prismas« in Uebereinstimmung zu bringen ist.

Doppelte
Brechung.

Brewster (1) hat gefunden, daß das optische Verhalten derjenigen Schichten im Topase, welche gewissen kleinen Höhlungen zunächst liegen, darauf hinweist, daß durch die Spannung von Gasen in diesen Höhlungen die noch flüssige Topasmasse verdichtet worden ist.

Optische Eigenschaften
des Ammoniak-Alauns.

Nach einer Mittheilung Jamin's (2) hat Biot gefunden, daß das Oktaëder des Ammoniakalauns aus 8 Pyramiden besteht, deren Spitzen im Mittelpunkte des Oktaëders liegen und welche parallel mit den oktaëdrischen Flächen, den Grundflächen der Pyramiden, spalten. Jede Pyramide bildet einen optisch einaxigen und zwar positiven Krystall, dessen Axe senkrecht zu den Spaltungsplättchen steht, und dessen doppelbrechende Kraft in verschiedenen Stücken sich ändert, im Mittel etwa 200 mal schwächer ist, als im Gyps. — Sind die Pyramiden zu einem natürlichen Alaunkrystall vereinigt, so verdecken sich die optischen Wirkungen. Giebt man einer Platte zwei parallele Flächen senkrecht zur einen Kante des Alauns, so hat man die nämliche optische Wirkung, wie im Compensator Babinet's.

Drehung der
Polarisationsebene in Beziehung zur
Krystallform.

Es ist namentlich durch Biot's (3) Arbeiten aufser Zweifel gestellt, daß die Kraft, welche die Drehung der Polarisationsebene eines Lichtstrahls beim Durchgang durch irgend eine Substanz bedingt, den Moleculen selbst innewohnt und nicht Folge einer bestimmten Anordnung derselben ist. Nur der Quarz schien Biot hiervon eine Ausnahme zu machen, da Opal, Hyalith, Tabascheer (4), amorphe Kieselsäure (5) überhaupt ebensowenig als kieselsaure Salze nach Herschel (6) Circularpolarisation zeigen. Es

(1) Phil. Mag. [3] XXXI, 101. — (2) Instit. 1848, 400. — (3) Ann. ch. phys. [2] IX, 372; X, 63; [3] X, 5. 175. 307. 385; XI, 82. — (4) Pogg. Ann. XIII, 522. — (5) Pogg. Ann. XXI, 289. — (6) Herschel's Lehre vom Lichte, §. 1046.

ist indessen durch Biot's Versuche wahrscheinlich geworden, daß eine mit dem Uebergang in den amorphen Zustand verbundene Umsetzung der Molecüle die Ursache des Verschwindens der Circularpolarisation ist; indem das spezifische Rotationsvermögen einer Platte geschmolzenen und dann erkalteten Zuckers wächst, während ein immer größerer Theil aus dem amorphen in den krystallinischen Zustand übergeht. An den Zucker-, Kampher- und Weinsteinsäurekrystallen nimmt man keine Circularpolarisation wahr, weil die Doppelbrechung diese Erscheinung verdeckt, und es berechtigt dieses nicht zu dem Schlusse (1), daß diese Substanzen in festem Zustande keine circularpolarisirende Kraft besitzen. In der Richtung der optischen Axen müßte man bei dazu geeigneten Zucker- und Weinsteinsäurekrystallen die Circularpolarisation ebensowohl wahrnehmen, als dies in Richtung der optischen Axe des Bergkrystalls der Fall ist. — Es scheint, als ob die Substanzen, welche die Polarisationsebene drehen, in krystallisirtem Zustande hemiëdrische oder hemimorphe Bildung zeigen. So der Zucker, die Weinsteinsäure; auch der Quarz ist als eine Combination zweier Hemiëdrien anzusehen, und die tetartoëdrischen Plagiëdrflächen deuten den Sinn der Drehung der Polarisationssebene an. — Nach Pasteur's (2) Untersuchungen drehen die beiden symmetrischen Hemiëdrien, welche aus einer Lösung von traubensaurem Natron-Ammoniak hervorgehen (3), die Polarisationssebene in verschiedenem Sinne, und dieser entgegengesetzte Character behauptet sich sogar im Natronsalze und der aus dem Barytsalz durch Schwefelsäure abgetriebenen Säure, während die Mutterlauge des erwähnten Doppelsalzes sich in allen Stadien der Krystallisation indifferent gegen das Licht verhält.

Drehung der
Polarisations-
ebene in Be-
ziehung zur
Krystallform.

Die Haidinger'schen Farbenbüschel haben durch Silbermann (4) eine befriedigende Erklärung gefunden, indem

Haidinger's-
che Farben-
büschel.

(1) Herschel's Lehre vom Lichte, §. 1046. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 442; Instit. 1848, 157; Compt. rend. XXVI, 535; XXVII, 367 u. 401. — (3) Siehe diesen Jahresbericht S. 32. — (4) Compt. rend. XXIII, 629; XXIV, 114; Pogg. Ann. LXX, 393. 401.

Haidinger'sche Farben-
büschel.

derselbe nachwies, daß die durchsichtige Hornhaut und Krystalllinse eine doppelbrechende Structur besitzen, die gewöhnlichen Farben der chromatischen Polarisat geben fähig sind, daß die strahligfaserige Structu Krystalllinse einen Analysirer darbietet, ähnlich der rigen Achat und nur mit dem Unterschied, daß b Linse die Fasern von der Axe aus nach allen Richt radial auseinander laufen. In der Mitte läßt die Linse neutralen Raum, wo das Licht nicht polarisirt wir daher farblos bleibt; die Axe der gelben Büschel ste rallel der Polarisationsebene, welche durch einen vor da gehaltenen Nikol oder durch einen Turmalin etc. g ist, senkrecht dagegen stehen die complementären vi Büschel. — Nach Pappenheim soll auch die f Structur der Glasfeuchtigkeit ähnlich wie die der Kr linse wirken. — Man sieht nach dieser Erklärung ein, warum nicht alle Augen gleich fähig sind, die dinger'schen Büschel zu sehen, sowie, warum di schel nach einigen Sekunden aufmerksamen Betre verschwinden können, um nach einer plötzlichen D des Prisma's um 90° wieder deutlich hervorzutreten.

Botzenhart (1) hat bemerkt, daß durch ein geschaltete, senkrecht zur Axe geschnittene Quar die Haidinger'schen Büschel links oder rechts g werden, je nach der Natur des Quarzes, und daß dann außer den gelben und violetten Büscheln noch rot grüne wahrnimmt, eine Folge der ungleichen Drehu Polarisations Ebenen der verschiedenen Farbenstrahlen

Jamin (2) dagegen erklärt die Haidinger'schen büschel nach der von Moigno angegebenen Grundid folgende Weise : Wenn man ein polarisirtes Licht auf eine Säule geneigter Glasplatten fallen läßt, so : Intensität des gebrochenen Strahles nach dem Polaris azimut verschieden; sie erreicht ein Maximum, wenn

(1) Pogg. Ann. LXX, 399; Compt. rend. XXIV, 43. — (2) rend. XXVI, 197; Instit. 1848, 53; Pogg. Ann. LXXIV, 145.

fall- und Polarisationsebene senkrecht aufeinander stehen. Haidinger'sche Farbensbüschel.
 Ein System convexer und concaver Linsen, nach der nämlichen Axe centrirt, bietet einem längs dieser Axe gehenden polarisirten Lichtbüschel alle möglichen Azimute der Brechungsebene dar. Man wird zwei dunkle, nach dem Umfange hin breiter werdende Büschel in der Polarisations-ebene, zwei helle senkrecht darauf haben, und die Haidinger'schen Büschel werden auf diese Weise durch das Linsensystem des Auges erzeugt. Da wegen der verschiedenen Brechverhältnisse die Intensitäten der verschiedenen gebrochenen Farbenstrahlen ungleich sind, so müssen die Büschel gefärbt erscheinen. Die Rechnung soll denselben die nämlichen Farbennuanzen geben, welche sie bei der Beobachtung darbieten.

Dove hat dadurch, daß er an seinem Polarisations- Versuche mit rotirenden Polarisations-Apparate.
 apparatus (1) Rollen anbrachte, durch welche eines oder beide Nikol'sche Prismen, sowie auch dazwischen geschobene Platten, in einerlei oder entgegengesetztem Sinne, mit gleicher oder ungleicher Geschwindigkeit um die Axe des Apparates gedreht werden können, Gelegenheit zu einer großen Menge interessanter optischer Versuche (2) gefunden. Wenn der polarisirende Nikol rotirt, verhält sich das geradelinig polarisirte Licht wie natürliches, die in den zwei Hauptstellungen auftretenden complementären Ringsysteme und Farben dünner Krystallplättchen ergänzen sich fortwährend zu Weiß. Doch kann man das Vorhandensein der Polarisation wahrnehmen, wenn man den elektrischen Funken als Lichtquelle anwendet. — Wenn die Umdrehungsgeschwindigkeit innerhalb eines Umlaufs stetig zu- und abnimmt, so treten die Erscheinungen des theilweise polarisirten Lichtes ein, und die Polarisationsebene fällt in die Richtung des Minimums der Geschwindigkeit. — Dreht man beide Nikols mit gleicher Geschwindigkeit in entgegengesetztem Sinne, so sieht man das Ringsystem, welches

(1) Pogg. Ann. XXXV, 569. — (2) Berl. Acad. Ber. 1847, 70; Pogg. Ann. LXXI, 97; Phil. Mag. [3] XXX, 465.

Versuche mit
rotirendem
Polarisations-
Apparate.

auftritt, wenn beide im Zustande der Ruhe im Azimut 45° gegeneinander aufgestellt sind. Das Ringsystem dem weissen Kreuz tritt nämlich bei jedem Uml viermal auf und fällt auf die Punkte 0° , 90° , 180° , 2 das mit schwarzem Kreuz erscheint an den Punkten 135° , 225° , 315° , man erhält daher den Eindruck be sich deckenden Erscheinungen. Ist die Umdrehung schwindigkeit beider Nikols verschieden, so rotirt die scheinung selbst. Bei gleichmäfsiger Drehung beider N in gleichem Sinne erhält man die nämlichen Erscheinun wie mit circularpolarisirtem und circularanalysirtem Li Diese Beispiele mögen genügen, die Art dieser Vers zu characterisiren, welche durch die mannigfaltigsten C binationen der Bewegung von Dove vervielfältigt wo sind. — Unter andern Versuchen, durch Uebereinarr legen von Complementarfarben Weiss zu erhalten, besch Dove den folgenden. Vor zwei hellen Längenspalten ein doppelbrechender Krystall so aufgestellt, dafs die be mittleren Bilder sich gerade decken. Man betrachtet Erscheinung durch einen Nikol, indem man sie mit e Gypsblättchen färbt. Die beiden äufsersten Bilder g Complementarfarben, das mittlere das aus ihrer Decl entspringende Weiss. — Das Kaleidophon, gleichzeitig Lampen- und Tageslicht erleuchtet, giebt objectiv or und subjectiv blau gefärbte Curven, deren Durchsch punkte nach Dove nicht ganz weiss erscheinen. — D drei Gläser, ein bläulichgrünes, ein gelbes und ein vioke erhielt Dove eine farblose Verbindung; das helle T licht erschien grau, Lampenlicht dagegen, welches ein deres Spectrum hat, schmutzig grün.

Cauchy (1) hat eine Mittheilung gemacht über Differenzialgleichungen für die chromatische Polarisati

Optik
der Atmo-
sphäre.
Lichtmeteore.

Mehrere Arbeiten über Lichtmeteore findet man in von Grunert herausgegebenen Zeitschrift: Beiträge

(1) Compt. rend. XXV, 331.

meteorologischen Optik, I. Theil, erstes und zweites Heft: Lichtnetze.
 Ueber den Regenbogen von Grunert, die drei wichtigsten älteren Hof- und Nebensonnenphänomene von Kuhse, über die Dämmerung und Berechnung der Lambert'schen Dämmerungsbeobachtungen von Grunert.

Von Bravais (1) ist eine Abhandlung erschienen über die optischen Phänomene, welche durch die eishaltigen Wolken hervorgebracht werden.

Clausius (2) hat einen Versuch gemacht, die Menge Licht-
zerstreuung
in der
Atmosphäre. Licht, welche die Atmosphäre der Erde zusendet, und die Helle, in welcher die verschiedenen Punkte des Himmels erscheinen, durch Formeln wieder zu geben, eine Aufgabe, womit sich Lambert (*Photometria*) und Bouguer (*Optice*) früher beschäftigt haben, zu deren vollständiger Lösung es indessen immer noch an den nöthigen physikalischen Daten gebricht. Die Atmosphäre wird überall gleich dicht und von horizontalen Ebenen begrenzt gedacht: Ein Lichtstrahl, der mit der Intensität 1 auffällt, kommt mit der Intensität $e^{-\delta x}$ in einer Tiefe x der Atmosphäre, also mit $e^{-\delta \gamma}$ an der Erdoberfläche an, wenn γ die Zenithdistanz der Sonne, h die reducirte Höhe der Atmosphäre ist. Ist $\gamma = 0$, so ist die Intensität des Sonnenlichtes e^{-a} , von Bouguer = 0,8123, von Lambert = 0,59 angegeben, von Clausius endlich zu 0,75, also $a = 0,2876819$ angenommen. — Die Absorption in der Atmosphäre bleibt unberücksichtigt, und die Reflexion und Zerstreuung wird so berechnet, als geschähe sie nicht an den Lufttheilchen, sondern an den in der Luft schwebenden Dampfbläschen. — Wenn L die Lichtmenge bedeutet, welche von der Sonne, entweder direct oder nach beliebig vielen Reflexionen, zur Erde gelangt, so wird ein Theil $A \cdot L$ wieder zurückgeschickt und ist wieder der Reflexion in der Luft unterworfen. A wird nach Lambert = $\frac{1}{12}$ angenommen, und aus

(1) Compt. rend. XXIV, 962. — (2) Pogg. Ann. LXXII, 294, aus Crelle's Journal der reinen und angewandten Mathem., XXXIV u. XXXVI; Berl. Acad. Ber. 1847, 200.

Licht-
streuung
in der
Atmosphäre.

den Formeln, welche sich nach den hier aufgezählten Voraussetzungen ergeben, berechnen sich die folgenden Werthe:

Zenith- Abst. der Sonne.	Menge des directen Sonnenlichtes.	Menge des durch die Atmosphäre geschwächten Sonnen - Lichtes.	Ganze Licht- menge, welche die Erde von der Luft empfängt.	Ganze Licht- menge, welche zur Erde gelangt.
5°	1	0,75	0,18599	0,98599
50°	0,64279	0,41087	0,15599	0,56686
80°	0,17365	0,03313	0,06736	0,10049

Die Formeln gelten nur für Zenithabstände der Sonne bis zu 80°. Für die Helligkeit des Himmels, die der Sonne außerhalb der Atmosphäre = 1000000 angenommen, mögen beispielsweise folgende Resultate angeführt werden :

Zenith- Abstand der Sonne.	Helle der Sonne.	Helle des Himmels								
		im Zenith.	in unmittel- barer Nähe der Sonne.	in einem Horizontal- kreis 60° v. Zenith.			im Horizont.			
				Horizontalabstand						
				0°	90°	180°	0°	90°	180°	
0°	750000	6,825	6,825	3,475	3,475	3,475	5,051	5,051	5,051	
60°	562500	1,719	10,227	10,227	2,278	1,778	10,367	4,039	3,555	
80°	190800	0,880	10,413	4,347	1,389	1,216	5,925	2,306	2,220	

In einer Abhandlung über den Polarisationszustand des Himmels giebt Brewster (1) zunächst die Lage der neutralen Punkte an : 1) Arago's neutraler Punkt liegt 18°,5 über dem Gegenpole der Sonne, wenn diese im Horizont steht, nähert sich aber diesem Gegenpole bis auf 11–12°, wenn die Sonne steigt; 2) Babinet's neutraler Punkt liegt 18°,5 über der Sonne, wenn diese im Horizont steht, er fällt mit der Sonne zusammen, wenn sie im Zenith steht. — Die Polarisation zwischen jedem dieser beiden Neutralpunkte und der Sonne oder resp. ihrem Gegenpole ist negativ (senkrecht zur Einfallsebene), zwischen den Neutralpunkten selbst positiv (in der Einfallsebene). Brewster schloß, daß die Ursachen, welche diese Neutralpunkte hervorrufen, auch noch einen dritten unterhalb der Sonne erzeugen müßten, und er fand denselben endlich auch unter besonders günstigen Umständen in einem Abstand von 16 bis 16° von

(1) Phil. Mag. [3] XXXI, 444.

der Sonne, welcher jedoch nicht unverändert bleibt. Wenn die Sonne im Zenith steht, fallen der obere und der untere Neutralpunkt in ihr zusammen; sie gehen wieder auseinander, wenn die Sonne sinkt. — Brewster hat die beiden ersten Neutralpunkte unter besonderen Umständen noch von sekundären Neutralpunkten in geringem Abstand begleitet gesehen. — Mit einem eigens construirten Polarimeter (die Polarisation wurde jedesmal bei einer bestimmten Anzahl von dünnen Glasplatten, durch Herstellung der gehörigen Incidenz, oder bei constanter Incidenz durch Wahl der hinreichenden Plattenzahl neutralisirt) untersuchte Brewster den Polarisationszustand des Himmels. Der Punkt der stärksten Polarisation liegt in einem Abstände von 88 bis 92° von der Sonne in der Ebene, welche durch die Sonne und das Zenith geht, die Componenten in der Polarisationsebene und senkrecht darauf verhalten sich wie 1:2. — Für die Linien gleicher Polarisation giebt Brewster die Gleichung $R = 33^{\circ},5 (\sin D \cdot \sin D') - 6^{\circ} 34' (\sin Z \sin A)$, worin R den Grad der Polarisation, D und D' die Abstände von den beiden ersten Neutralpunkten, Z die Zenithdistanz, A das Azimut gegen die Hauptebene bedeuten. — Schließlich führt Brewster an, daß von Zantedeschi eine Abhandlung über atmosphärische Polarisation in der *Raccolta Fisico-chimica Italiana*, 1846 erschienen sei.

Licht-
streuung
in der
Atmosphäre.

Grüel (1) hat die rotirende Scheibe, welche man anwendet, um die unmeßbar kurze Dauer des elektrischen Funkens zu zeigen, vertikal gestellt und mit einem Uhrwerk versehen, welches die beliebige Regulirung der Rotationsgeschwindigkeit gestattet, und diesen Apparat zur Darstellung subjectiver Farbenerscheinungen angewendet, welche von Dove (2) näher beschrieben werden, sowie auch die Newton'sche Farbenscheibe, die stroboscopischen Scheiben, die Opelt'sche Sirene darauf angebracht werden können. Dove hat bei dieser Gelegenheit auch durch dioptrische Farben mit Hülfe farbiger Gläser *Weiss* dargestellt.

Optische
Apparate.
Rotirende
Farben-
scheibe.

(1) Pogg. Ann. LXXV, 524. — (2) Pogg. Ann. LXXV, 528.

Anwendung
des polarisir-
ten Lichtes
im
Mikroskope.

Brewster (1) hat gefunden, daß die Anwendung des polarisirten Lichtes ein vorzügliches Mittel ist, um solche Gegenstände unter dem Mikroskop deutlich zu sehen, welche doppelbrechende Kraft haben, in welchem Falle sich die meisten Krystalle, sowie beinahe alle Thier- und Pflanzenfasern befinden. Die Diffraction, welche die Ursache der Undeutlichkeit der mikroskopischen Bilder ist, verschwindet im polarisirten Lichte, weil keine Strahlen an den Rändern der Fasern vorübergehen. Da, wo man genöthigt ist, Gegenstände in Flüssigkeit ohne Deckplatte oder in andern festen Körpern von unregelmäßiger Oberfläche eingeschlossen zu betrachten, entfernt das polarisirte Licht den schädlichen Einfluß der unregelmäßigen Brechung durch die Oberfläche größtentheils. — Brewster klärt bei dieser Gelegenheit einen Irrthum Chevallier's auf, indem er nachweist, daß er, nicht Wollaston, den schädlichen Einfluß der Diffraction durch ein eigenthümliches Beleuchtungssystem (für nicht polarisirende Körper) gehoben habe.

Wir führen noch die folgenden optischen Apparate und Methoden an: Beleuchtungssystem für die Zifferblätter größerer Uhren von Dorey (2); Argand'sche Lampe für optische Versuche eingerichtet von Soleil (3); Photometer und Beiträge zur Kunst des Schleifens von Gläsern und Metallsiegeln von Doppler [mitgetheilt von Bolzano] (4) und Heineken (5); Vereinfachung des Heliostaten von Grüel (6); Legirungen für Spiegel und Verbesserungen der katoptrischen Werkzeuge, ferner Apparat, um die geringste Ablenkung eines Lichtstrahls zu messen, von Doppler (7); über die Verfertigung der magischen Spiegel der Chinesen, von Stan. Julien (8); Versuch mit einem solchen Spiegel, von Person (9); Apparat, um mikroskopische Objecte mit

(1) Phil. Mag. [3] XXXII, 161; Froriep's Notizen [3] VII, 50. —

(2) Compt. rend. XXV, 557. — (3) Compt. rend. XXIV, 300. — (4) Pogg. Ann. LXXII, 530. — (5) Phil. Mag. [3] XXXIII, 480. — (6) Pogg. Ann. LXXII, 422. — (7) Pogg. Ann. LXXII, 530. — (8) Compt. rend. XXIV, 999. — (9) Compt. rend. XXIV, 1110.

schiefem Lichte zu beleuchten, von Nabet (1); Bemerkungen hierzu, von Oberhäuser (2) und Chevallier (3); Erleuchtung von Mikrometerfäden durch galvanisch glühende Platindrähte, von Arago (4), ausgeführt von Forment; optischer Fernmesser und Vorschlag zur Erbauung eines Riesenmikroskops, von Doppler (5); Stephanoscop, durch Rotiren feiner Glasgitter erzeugt, von Dove (6); Verbesserung des optischen Saccharimeters, von Soleil (7); Apparate zur Saccharimetrie und Beschreibung der Methode, von Clerget (8); Apparat, um die Drehung der Polarisationssebene durch Flüssigkeiten bei verschiedenen Temperaturen zu messen, von Barthelemy Bianchi (9); doppelbrechendes Okularmikrometer, von Arago (10).

Optische
Apparate.

Bowmann (11) hat in einer seiner Vorlesungen am königl. Augenhospital zu London eine Beschreibung des Bau und der physikalischen Eigenschaften der Krystalllinse gegeben.

Physiologi-
sche Optik.
Bau und
optische Ei-
genschaften
des Auges.

Valée (12) giebt an, durch eine Vergleichung von Krause's Messungen der Dimensionen des Auges gefunden zu haben, daß die nach vorn convexen Flächen genau diejenige geometrische Gestalt [krümme Fläche vierter Ordnung (13)] haben, welche Brennpunkte frei von Abweichungen giebt; er nennt sie *optoidale* Flächen und findet weiter, daß die nach hinten convexen Flächen wenigstens in so weit optoidal sind, als sie von den ins Auge dringenden Lichtbüscheln getroffen werden. — In einer folgenden Abhand-

(1) Compt. rend. XXIV, 976. — (2) Compt. rend. XXIV, 1052. — (3) Compt. rend. XXIV, 1097. — (4) Compt. rend. XXIV, 321; Pogg. Ann. LXXI, 96. — (5) Pogg. Ann. LXXII, 530. — (6) Berl. Acad. Ber. 1847, 76; Pogg. Ann. LXXI, 115. — (7) Compt. rend. XXIV, 973; XXVI, 162; Instit. 1848, 45 u. 55. — (8) Instit. 1848, 61. — (9) Compt. rend. XXV, 324. — (10) Compt. rend. XXIV, 400; Pogg. Ann. LXXI, 405. — (11) London Med. Gaz. 1848, Aug., 320. — (12) Compt. rend. XXIV, 676. — (13) Herschel, vom Licht, übers. von Schmidt, 98.

Bau und
optische Ei-
genschaften
des Auges.

lung wendet Valée (1) den Satz : daß wenn Strahlen von einem Punkte ausgehend durch eine Reihe von brechenden Flächen von beliebiger Form dringen, immer eine dieser Flächen so gewählt werden kann daß alle Strahlen wieder in einem Brennpunkte zusammenlaufen — auf das Auge an. Er ist der Ansicht, daß der Cornea durch die Muskeln des Auges jedesmal diejenige Form gegeben werde, welche zur Erzeugung scharfer Bilder auf der Netzhaut erforderlich sei. Diese Formänderungen dürften um so kleiner sein, je weniger die Gestalt der übrigen brechenden Flächen sich von der optoidalen unterscheidet. — Faye hat der französischen Akademie über die beiden Arbeiten Valée's Bericht erstattet (2).

Dispersion
des
Menschen-
auges.

Matthiessen (3) hat über die Dispersion des Menschenauges folgende Bestimmungen gemacht : 1) Der Abstand des deutlichen Sehens mit rothem Licht von der Linie B ist für Fernsichtige mehr als doppelt so groß, als mit blauem Lichte von der Linie G. Für normale Augen ist der Unterschied geringer, noch kleiner für Kurzsichtige. 2) Ein weißer Lichtpunkt vor einem gesunden Auge in der Entfernung des deutlichen Sehens hat seinen Brennpunkt B $16^{\text{mm}},3$, seinen Brennpunkt E $16^{\text{mm}},0$, seinen Brennpunkt G $15^{\text{mm}},7$ hinter dem Centrum des Auges. 3) Die Dispersion des Menschenauges ist stärker als die des Kronglases und Wassers, sie nähert sich derjenigen des Flintglases. 4) Die Brechverhältnisse der Krystalllinse sind für die Linien B, E, G resp. gleich 1,3634, 1,370, 1,3765.

Matthiessen ist der Meinung, daß die Mittel, den Achromatismus der optischen Eindrücke herzustellen, von der Natur außerhalb des eigentlichen optischen Augenapparates angewendet seien; eine Meinung, welcher Valée (4) widerspricht. Er substituirt die Hypothese, daß die aus der Krystalllinse tretenden stark convergirenden

(1) Compt. rend. XXV, 501. — (2) Compt. rend. XXV, 843. — (3) Compt. rend. XXIV, 875; Pogg. Ann. LXXI, 578; Arch. ph. nat. V, 221. — (4) Compt. rend. XXIV, 1096.

lichtbüschel von der Glasfeuchtigkeit, welche er sich aus
 erschieden dichten Schichten zusammengesetzt denkt, zu-
 respitzt (*appareil acuteur*) und somit die verschiedenfarbigen
 Büschel in eine Linie zusammengezogen werden.

Dispersion
 des
 Menschen-
 auges.

Pappenheim (1) hat die Brechungsverhältnisse der
 Glasfeuchtigkeit in der vordern und hintern Schicht gemes-
 sen, und für die erstere 1,3339 und 1,3343, für die hintere
 1,3371 gefunden, also Unterschiede, welche in jedem Falle
 zu gering sind, um Valée's *appareil acuteur* zu recht-
 fertigen.

Brown-Sequard (2) theilt vergleichende Beobachtun-
 gen mit über die Wirkungen des Lichtes auf die Iris bei
 den fünf Klassen der Wirbelthiere.

Hamilton (3) giebt Nachricht von einem eigenthüm-
 lichen Gesichtsfehler. Ein 25jähriger Mann war unvoll-
 ständig nachblind und kurzsichtig, er vermochte horizon-
 zontrale Linien ziemlich gut, vertikale fast gar nicht zu
 erkennen, noch weniger selbst zu zeichnen. Der senkrechte
 Durchmesser und Krümmungshalbmesser waren größer, als
 die horizontalen. Ein Versuch mit zwei Löchern in einem
 Kartenblatte, durch welche ein Stecknadelknopf betrachtet
 wird, ergab, daß derselbe von dem linken Auge in 6 Zoll
 oder in 9 Zoll Abstand einfach gesehen wurde, je nachdem
 die Löcher horizontal oder vertikal genommen wurden,
 bei dem rechten Auge stellte sich ein Verhältniß von $5\frac{1}{2}$
 zu $6\frac{1}{2}$ heraus. Mit einer cylindrischen Linse wurde dem
 Fehler abgeholfen.

Gesichts-
 fehler.

Brewster (4) giebt eine Ansicht über die *Muscae vo-
 litanes*, gestützt auf Versuche am eigenen Auge, welche
 abweicht von den Erklärungen, welche de la Hire, Por-
 terfield und Mackenzie gegeben haben. Er findet die
 Ursache in Resten der Gefäße, in welchen die Glasfeuchtig-
 keit eingeschlossen ist, die abgerissen innerhalb der Zellen
 schwimmen und Schatten und gebeugtes Licht auf die Netz-

Muscae
 volitantes.

(1) Compt. rend. XXV, 901. — (2) Compt. rend. XXV, 482. 508.
 510. — (3) *Erwin's Notizen* [3] VII, 219. — (4) Phil. Mag. [3] XXXII, 1.

*Muscae
volitantes.*

hant werfen. Durch zwei vor das Auge gesetzte glänzend Lichtquellen erhält man von der nämlichen Faser zwei Schattenbilder, mit Hülfe deren Brewster den scheinbare Durchmesser der *Muscae volitantes*, sowie den Abstand der sie bedingenden Körper von der Netzhaut gemessen hat. Mittelst Schirmen mit geeigneten Oeffnungen oder Linsen von verschiedener Brennweite kann man den Divergenzpunkt der angewendeten Lichtbüschel beliebig aufserhalb oder innerhalb des Auges verlegen, und durch theilweise Blendung der Linsen auch die feineren *Muscae* sichtbar machen während bei vollem Licht nur die grössten wahrgenommen werden. — Nach Brewster kommen die *Muscae* in jedem gesunden Auge vor und sind nur durch allzustarke Anhäufung gefährlich, keineswegs aber ein Symptom herannahender Blindheit durch Cataract oder Amaurosis.

Ueber zufällige Färbung der Glasfeuchtigkeit theilt Caron du Villars (1) Bemerkungen mit.

*Theorie
des Sehens.*

Die Grösse des Winkels, welchen die nach einem Punkte gerichteten Sehaxen mit einander bilden, steht in einem bestimmten Verhältniss zur Entfernung des Objectes und es ist denkbar, dass man aus der Grösse jenes Winkels direct auf die Entfernung schliesst, ohne dass der Gesichtssinn weiterer Hülfe bedarf. Für diese Ansicht spricht die scheinbare Verkürzung oder Vergrößerung des Abstandes betrachteter Objecte, wenn man den Durchkreuzungspunkt der Sehaxen absichtlich vor oder hinter dieselben verlegt wie dies Brewster (2) in einer Reihe neuer Versuche bestätigt gefunden hat. Wenn man sich vor einer grösseren Fläche, z. B. einer verticalen Wand, aufstellt, auf welcher die nämliche Figur in vielen Wiederholungen in immer gleichen Abständen zu sehen ist, wie z. B. Blumen an einer Tapete, und man richtet die Sehaxen so, dass zwei nächstgelegene Figuren zur Coincidenz kommen, so decken sich auch alle übrigen Paare, und das Bild der Wand rück-

(1) Compt. rend. XXIV, 1097. — (2) Phil. Mag. [8] XXX, 805.

scheinbar in den Durchkreuzungspunkt der Sehaxen, mag Theorie
des Sehens. dieser nun vor der Wand dicht bei den Augen oder hinter der Wand liegen. Der letztere Fall läßt sich übrigens nur dann herstellen, wenn die Figuren auf einer durchsichtigen Wand, z. B. einer Glastafel, angebracht sind; auch der vertical gestellte Sitz eines durchbrochen gearbeiteten Rohrstahles soll zu letzterem Zwecke sehr brauchbar sein. Je weiter man das Gitter zurückversetzt glaubt, desto größer erscheinen durch einen Trugschluß des Geistes die Stäbe und Zwischenräume. — Hat man auf einem horizontalen Blatte die zwei Schenkel eines Winkels verzeichnet und bringt durch gehörige Richtung der Sehaxen die Endpunkte der beiden gleichlangen Schenkel zur Deckung, so decken sich beide zu einer Linie, die verkürzt oder auch weithin verlängert erscheint, je nach der Lage des Durchkreuzungspunktes der Sehaxen und der Stellung der Augen zur Horizontalebene. Der bekannte Versuch mit dem vor die Augen gehaltenen Zirkel, dessen Füße in weite Entfernungen hinaus zu reichen scheinen (in Smith's Optik II, 388 beschrieben), ist nur ein besonderer Fall des obigen.

Nach Allem diesem ist Brewster (1) der Meinung, daß in dem Processe des Sehens selbst die Wahrnehmung der Entfernungen inbegriffen sei und keinerlei Erfahrungen dem Gesichtssinne zu Hülfe zu kommen brauchen, wie denn Kinder sowohl, als junge Thiere gleich nach der Geburt schon Entfernungen in ihren richtigem Verhältnisse schätzten. Whewell widerspricht dem, und führt entgegenstehende Erfahrungen von Augenärzten an, wonach operirte Blinde längerer Uebung bedurften, bis sie den Abstand der gesehenen Objecte richtig zu beurtheilen vermochten.

An einem andern Orte (2) äußert Brewster die Ansicht, daß die Verschiedenheit der Farbe Einfluß auf die Beurtheilung der Entfernung habe. Er führt an, daß, wenn rothe und blaue Objecte, auf dem nämlichen Blatte ver-

(1) Instit. 1848, 371. — (2) Instit. 1848, 290.

Theorie
des Sehens.

zeichnet, betrachtet werden, die rothen näher zu liegen scheinen als die blauen. Hiernach wäre also die Verschiedenheit der Farbe eine Quelle optischer Täuschungen.

Heineken (1) theilt mit Bezug auf Erfahrungen von Prevost und Babbage über Doppeltsehen mit *einem* Auge mit, daß sein linkes Auge, nachdem er es längere Zeit geschlossen gehalten, während er das rechte, mit einer Loupe bewaffnet, zur Theilung eines Yards in 400 Theile anwandte, etwa zwei Stunden lang *dreifach* gesehen habe.

Foramen cen-
trale.

Brewster (2) beschreibt einen Versuch, welchen er durch das von Sömmering entdeckte *Foramen centrale* der Netzhaut erklärt. Wenn man das Auge nach einer kurzen Ruhe auf ein gleichförmig erleuchtetes Blatt Papier richtet, so gewahrt man einen runden schwarzen Fleck umgeben von gleichförmigem Weiß. Der scheinbare Durchmesser ist 35', was für das *Foramen centrale* einen wirklichen Durchmesser von $\frac{1}{3}$ Zoll giebt.

Subjective
Farben.
Farbenringe
beim Durch-
sehen durch
farbige Flüssigkeiten.

Haidinger (3) theilt eine Beobachtung Löwe's mit, wonach man beim Durchsehen durch eine Schicht *einer* farbigen Flüssigkeit, namentlich aber der sogenannten *dichromatischen* Mittel, wie Chromchlorid, Kobaltglas, einen Ring von der Größe der Iris, anders gefärbt als die betrachtete Flüssigkeit, beobachtet, während der umschlossene Raum von der Größe der Pupille die natürliche Farbe hat. Es scheint, als ob, durch die vorzugweise Affizirung *dieses* Theils der Netzhaut, der ringförmig umgebende für *den* complementären Eindruck empfänglich gemacht werde, so daß diese Farbe auftritt, wenn sie im *dichromatischen* Mittel ebenfalls enthalten ist. So gewahrt man beim *Ansehen* des Chromchlorids einen grünen Fleck, umgeben von *einem* violetten Ring. Bei dem einfarbigen Kupferoxyd-Ammoniak ist der umgebende Ring nur etwas dunkler blau.

Subjective
Farben auf
d. rotirenden
Scheibe.

Wenn man auf eine rotirende Scheibe einen *gelben* und blauen Sector im Verhältniß von 1 : 4 *aufträgt*, so

(1) Phil. Mag. [3] XXXIII, 318. — (2) Instit. 1848, 289. — (3) Pogg-Ann. LXX, 403.

ein in der Mitte stehendes Grün zu erhalten, und man bewegt ein dunkles Stäbchen von der Dicke eines dünnen Bleistiftes über die Scheibe parallel mit sich selbst fort, so sieht man, nach Dove (1), den Stab als ein Stabgitter mit abwechselnd blauen und gelben Speichen. Die gelben Speichen sind die breiteren, sie erscheinen also, wenn der Stab auf blau steht. Die Anzahl dieser Speichen entspricht derjenigen der Umdrehungen, wenn nur ein Sector von jeder Farbe vorhanden ist. Da man die Speichen leicht zählen kann, so hat man damit zugleich die Anzahl der Umdrehungen in einer gegebenen Zeit. — Ruht der Stab, wird dagegen das Auge zur Seite bewegt, so gewahrt man die nämliche Erscheinung. — Wenn man vor der sectorenweise bemalten Scheibe das Auge rasch hin- und herschüttelt, so sieht man die Mischungsfarbe auf der Seite, nach welcher das Auge sich bewegt, momentan in ihre Componenten sich auflösen, weil zwischen der bewegten Scheibe und dem Auge Annäherung an einen relativen Ruhezustand eintritt.

Subjective
Farben auf
der rotirenden
Scheibe.

Es ist schon längere Zeit bekannt, daß, wenn man bei künstlicher Beleuchtung ein blaues Feld, worauf rothe Punkte, oder ein rothes Feld, worauf blaue Punkte sich befinden, hin- und herbewegt, die farbigen Punkte noch stärker zu schwanken scheinen, so, als ob sie lose auf ihrer Unterlage sich befänden. Taylor (2) macht zur Erklärung dieses Phänomens zuerst darauf aufmerksam, daß, wenn an einer Kugel, welche vor uns hängt, plötzlich Licht und Schatten ihre Stelle wechseln, die Kugel hin- und herzuschwanken scheint. Man kann sich hiervon überzeugen, wenn man im Rücken etwas rechts und links zwei Lichter aufstellt und diese abwechselnd auf- und zudecken läßt. — Wenn die rothen Punkte auf blauem Felde von der Rechten zur Linken fahren, so vermischt sich am rechten Rande jedes Punkts der noch fortdauernde Eindruck des Roth mit dem

Optische Täuschungen.
Scheinbare
Bewegung
blauer und rother Punkte
auf blauem u.
rothem
Grunde.

(1) Pogg. Ann. LXXI, 112; Berl. Acad. Ber. 1847, 77. — (2) Phil. Mag. [3] XXXIII, 845.

Scheinbare
Bewegung ro-
ther u. blauer
Punkte auf
blauem
und rothem
Grunde.

Blau des Untergrundes zu einem dunkleren Roth, gleichsam einem Schattensaum; dieser geht augenblicklich auf den linken Rand über, wenn man von der Linken zur Rechten fährt. Blaue Punkte auf rothem Grunde erhalten im Gegentheil einen hellen oder Lichtsaum. Der Ortswechsel dieser Schatten und Lichter ist hier der Grund des scheinbaren Schwankens, gerade so, wie bei dem oben beschriebenen Versuche der abwechselnd von Links oder Rechts beleuchteten Kugel.

Brewster (1) verbreitet sich über die Täuschung, welcher man beim Betrachten schwach vertiefter oder weniger erhabener Arbeit unterworfen ist, namentlich bei Anwendung eines Mikrosopes oder eines Fernrohrkulars, und welche in einer Verwechslung des Convexen mit dem Concaven und umgekehrt besteht. Bei Anwendung eines Apparates, welcher die Bilder umkehrt, erscheint eine Höhlung, auch bei ganz gleichmäßiger schattenloser Beleuchtung, erhaben, wenn dieselbe sich in einer breiteren horizontalen Platte befindet, so daß die Umkehrung dieser nicht zugleich wahrgenommen werden kann; in einer kleineren Fläche angebracht, sieht man die Höhlung auch nach der Umkehrung noch concav. Daß im ersteren Falle die Täuschung bei seitlicher Ansicht, wo man bei der Concavität immer noch den ganzen Umfangsrand, bei der Convexität nur den diesseits gelegenen Theil wahrnimmt, verschwinden muß, ist begreiflich. — Schatten müssen bei der Umkehrung dazu beitragen, die Täuschung zu erhöhen.

Dove (2) macht auf eine optische Täuschung bei Fahren auf der Eisenbahn aufmerksam, wonach die Gegenstände Außen verkleinert und im Gegensatz das Innere der Wagen auffallend vergrößert erscheinen.

(1) Phil. Mag. [3] XXX, 432. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 118.

Favre und Silbermann (1) haben in der 12. Abtheilung ihrer Untersuchungen die Einwirkung des Sonnenlichtes auf ein Gemenge von Chlor und Wasserstoff betrachtet. Sie ließen gleiche Mengen von Chlorgas, das eine Mal, nachdem dasselbe von der Sonne bestrahlt war, das andere Mal ganz im Dunkeln von Kalilauge absorbiren, und fanden, daß 1 Grm. Chlor, wenn es bestrahlt war, 478,85 Wärmeeinheiten, unbestrahlt 439,70 Wärmeeinh. entwickelte. Den Unterschied von 39,15 Wärmeeinh. leiten F. u. S. aus einer Modification der Molecule ab, welche der Verbindung mit Kali vorhergehen und von Wärmebindung begleitet sein soll. Das bestrahlte Chlor soll sich auf Kosten der Sonnenwärme bereits modificirt haben. Die Zahl des bestrahlten Chlors 478,85 mit dem Aequivalent desselben multiplicirt, giebt die Hälfte der Verbrennungswärme des Wasserstoffs. — Um den Einfluß der verschiedenen Farbenstrahlen des Spectrums auf das Gemenge von Chlor und Wasserstoff zu studiren, füllten F. und S. 50 Glasröhrchen, stellten dieselben längs der Wand eines engen Troges auf, so daß die Gase über Salzwasser abgesperrt waren, und ließen das Farbenbild darauf fallen. Das Niveau, zu welchem sich die Salzlösung unter Einwirkung des Lichtes in den verschiedenen Röhrchen erhob, machte dem Auge die chemische Wirkung der Farbenstrahlen anschaulich. F. und S. wollen gefunden haben, daß die größte Wirkung in der Frühe bei der Linie H, Mittags bei G, Abends bei F liege. — Sie wollen demnächst den Einfluß untersuchen, welchen die Substanz des Prisma's auf diese Resultate übt.

Chemische
Wirkungen
des
Lichtes.

Einwirkung
des Lichtes auf
ein Gemenge
von Chlor und
Wasserstoff.

Die mißliche Streitfrage über den Character der photo-
genischen Wirkung der verschiedenen Farbenstrahlen ist
in Folge der Mittheilungen Draper's nur noch verwickelter
geworden, ja sie kann, wenn man den Erfahrungen dieses
Beobachters Zutrauen schenken will, in Europa ihre Lö-
sung gar nicht erhalten. — Man ist bekanntlich darin einver-

Photo-
genische Wir-
kung der
verschiedenen
Farbenstrah-
len.

(1) Instit. 1848, 309; Compt. rend. XXVII, 362.

Photo-
genische Wir-
kung der
verschiedenen
Farbenstrah-
len.

standen, daß die brechbarsten Strahlen des Spectrums vorzugsweise eine kräftige chemische Wirkung im Allgemeinen und photographische Wirkung im Besonderen ausüben, da gegen widerstreiten sich die Erfahrungen rücksichtlich der weniger brechbaren Strahlen; es ist nicht ausgemacht, ob diese ebenfalls eine selbstständige photogenische Wirkung äußern, nur in schwächerem Maße, als die blaue und violette Farbe, — oder ob sie nur die Fähigkeit haben, eine von diesen begonnene Wirkung fortzusetzen (Becquerel), oder endlich, ob ihre Wirkung derjenigen des brechbareren Theils des Spectrums geradezu entgegengesetzt ist, so daß sie die photographischen Effekte dieser nivelliren und die Empfindlichkeit der betreffenden Substanzen gegen das Licht wieder herstellen. — Die Versuchsergebnisse, welche Fizeau und Foucault erhielten, hatten diese Physiker veranlaßt sich für die letztere Ansicht zu erklären, allein E. Becquerel (1) glaubt, daß diese Resultate bei den von jenen Physikern angewandten complexen Verbindungen von Jod-Brom- und Chlorsilber durch sekundäre chemische Action zu erklären seien, und er führt einige Beispiele solcher chemischen Wirkungen aus Herschel's und seiner eignen Erfahrung an.

Draper (2) theilt seine Erfahrungen mit, welche er in Virginien in verschiedenen Jahreszeiten über die photographische Wirkung der verschiedenen Theile des Spectrums gemacht, und welche der Ansicht Becquerel's nicht günstig sind. Draper fand nicht nur, daß der weniger brechbare Theil des Virginischen Sonnenspectrums die Wirkung des Tageslichtes hindert und rückgängig macht, selbst wenn man ihn stundenlang wirken läßt, sondern auch, daß eine gleiche Wirkung gewissen Strahlen jenseits des Violett zu kommt. Letzteres soll sich indessen nur im Juli zeigen, und selbst die schützende Kraft der rothen und orangefarbenen

(1) Phil. Mag. [3] XXX, 214. — (2) Phil. Mag. [3] XXX, 87; Arch. ph. nat. V, 5.

Strahlen war nach Draper im September verschwunden; sie fand sich nur noch bei einem Theil der gelben und grünen Strahlen, stellte sich aber im März im Roth und Orange wieder ein. — Wenn das Tageslicht weder vorher noch gleichzeitig einwirkt, macht sich auch die schützende Kraft der weniger brechbaren Strahlen nicht geltend; das Daguerrotypspectrum ist weiß längs des Raumes, auf welchen sie gefallen sind.

Photo-
genische Wir-
kung der
verschiedenen
Farbenstrah-
len.

Noch entschiedener wurde die dritte der oben angeführten Ansichten über die photogenische Wirkung der verschiedenen Farbenstrahlen von Claudet (1) verfochten, welcher sogar als allgemeines Resultat ausspricht, daß jede Strahlenart eine ganz eigenthümliche photogenische Wirkung äußere, welche zugleich die jeder andern Strahlenart anhebe. Die Wirkung der blauen Strahlen soll hiernach von den rothen und gelben und umgekehrt, die Wirkung der rothen durch die gelben und umgekehrt, zerstört werden. Unter photogenischer Wirkung will Claudet indessen ausschließlich eine solche verstanden haben, welche mit Jodid, Bromid oder Chlorid überzogenen Silberplatten Verwandtschaft zu Quecksilberdämpfen ertheilt. Die Resultate Claudet's im Einzelnen sind die folgenden: Er fand, daß Sonnenstrahlen, welche durch dichten atmosphärischen Nebel roth gefärbt waren, ebenso wie solche, welche durch rothes, orangefarbenes und gelbes Glas gegangen waren, die Wirkung des weißen Lichtes auf jodirte Silberplatten wieder zerstören, so daß die hervorgerufene Verwandtschaft zu Quecksilberdämpfen wieder vollständig aufgehoben ist. Die Platten sind dann wieder so empfindlich gegen das weiße Licht, wie vor jeder Bestrahlung, und man erhält ganz regelmäßige Bilder, wenn auch ein Theil der Platte zu oft wiederholten Malen durch weißes Licht verändert und durch rothes, orangefarbenes oder gelbes wiederhergestellt war.

(1) Athen. Nr. 1027; Sill. Am. J. [2] IV, 409; Phil. Mag. [3] XXXII, 86, aus Phil. Trans. 1847, II.; Compt. rend. XXV, 554; Ann. ch. phys. [3] XXII, 332.

Photo-
genische Wir-
kung der
verschiedenen
Farbenstrah-
len.

Claudet verspricht sich zwei nützliche Anwendungen diesen Resultaten, einmal, daß man die Platten an Dunkeln bei offenem Tageslicht zubereiten könne, wenn nur nachher durch rothes Licht vor dem Gebrauche empfindlich mache; sodann, daß man ein Bild nachzeichnen könne, wenn man bei der Behandlung mit silberdämpfen bemerke, daß es dem Licht zu lang ausgesetzt gewesen. — Nimmt man die Zeit der Belichtung durch weißes Licht zur Einheit, so braucht roth die Zeit 50, orangefarbenes 15, gelbes 10, um die Wirkung wieder aufzuheben. — Uebrigens sollen diese Farben ausser der zerstörenden auch noch eine eigentliche photogenische Wirkung haben, Roth 5000mal, Gelb schwächer als Weiss; aber diese Wirkung muß von anderer Art sein, als die der blauen und violetten Farben, da diese sonst unter der gleichzeitigen zerstörenden Wirkung von Roth und Gelb gar nicht aufkommen. Nach allem diesem schließt Claudet, daß die photogenische Wirkung nicht in einer Reduction des Silber durch die Entbindung von Jod, Brom oder Chlor bestehen könne, da die Platte bei so vielfach wiederholten Wirkungen und Gegenwirkungen ihre Empfindlichkeit gegen das Licht nicht verliere. — Auch Hunt (1) theilt einen Versuch mit, welcher dafür spricht, daß gewisse Lichtstrahlen die Empfindlichkeit der Substanzen vor chemischer Veränderung erhöhen. Er liefs auf höchst empfindliches photographisches Papier Licht fallen, welches zuvor durch ein gelbes Mittel gefiltert war, und reflectirte gleichzeitig das volle Sonnenlicht darauf. Das ganze Papier wurde geschwärzt, nur die Annahme des von gelbem Licht getroffenen Streifs, welcher weiss blieb.

Gaudin (2) bestätigt dagegen die Resultate Brel's. Er hat durch die fortsetzende Kraft der durch orangegelbes Glas gegangenen Strahlen allein, ohne Anwendung von Quecksilber, vollkommene Bilder erhalten.

(1) Instit. 1848, 292. — (2) Compt. rend. XXV, 689.

welche Claudet (1), als gar nicht in die Klasse der Daguerrotypbilder gehörig, aus einer Krystallisation des Chlorsilbers erklären will. Gaudin giebt ferner an, daß bei Anwendung von Chlorjod das orangegelbe Licht nicht nur fortsetzend, sondern selbstständig wirke, während die durch ein rothes Glas gegangenen Strahlen nur fortsetzten.

Photo-
genische Wir-
kung der
verschiedenen
Farbenstrah-
len.

Auf die Bemerkungen von Becquerel und Gaudin erwiedert Claudet (2), daß auch ihm Fälle vorgekommen seien, wo die Wirkungen der rothen und gelben Strahlen auf jodirte Silberplatten fortsetzend anstatt zerstörend gewirkt hätten. Da ihm jedoch eben so gewiß auch das Umgekehrte vorgekommen, so scheine dies zu Gunsten der Draper'schen Resultate zu sprechen, denen zu Folge die Wirkung aller Farbenstrahlen wesentlich durch die Jahreszeit bedingt sei. Die wechselnden Resultate haben sich indessen nur für, auf gewöhnliche Weise jodirte, Silberplatten ergeben. Hat man das Jodiren so lange fortgesetzt, bis die Platte durch die Reihe der gelben, rothen, blauen und blaugrünen Tinte durchgegangen und diese Farbenreihe sich wiederholt, oder wendet man die noch empfindlicheren (3) Brom- und Chlorverbindungen an, so sollen, Claudet zu Folge, die gelben und rothen Strahlen immer aufhebend, die fortsetzend wirken. — Das Ausbleiben der Bilder, welches man oft der mangelhaften Zubereitung der Platten oder dem Zustand der beschleunigenden Flüssigkeiten zuschreibt, kommt nach Claudet meist auf Rechnung der Beschaffenheit des Lichtes, indem die zerstörenden Strahlen gegen die wirksamen an Intensität zunehmen.

E. Becquerel (4) giebt an, daß, wenn man ein Silberblättchen im Abstand einiger Centimeter über Chlorwasser hält, dasselbe nach einigen Minuten eine weißliche Färbung

(1) *Compt. rend.* XXV, 763; *Instit.* 1848, 291. — (2) *Phil. Mag.* [3] XXXII, 199; *Ann. ch. phys.* [3] XXII, 348; *Compt. rend.* XXV, 763. 928. — (3) *Phil. Mag.* [3] XXXII, 215. — (4) *Ann. ch. phys.* [3] XXII, 451; *J. pr. Chem.* XLIV, 358; *Dingl. pol. J.* CX, 25; *Compt. rend.* XXVI, 181; *Instit.* 1848, 45. 54. 341.

Farbige
Lichtbilder.

annimmt, und, wenn man dann ein auf wenige Centimeter verdichtetes Sonnenspectrum darauf fallen läßt, dasselbe sich mit seinen eigenthümlichen Farben abbildet. Am wenigsten deutlich ist das Gelb wiedergegeben. Noch besser präparirt man die Platte durch Eintauchen in Chlorwasser, bis sie eine weißliche, schwach rosenrothe Färbung angenommen hat; oder durch Eintauchen in eine verdünnte Lösung von Salzsäure, indem man sie als positiven Pol einer Säule gebraucht; oder endlich in einer Auflösung von Kupferchlorid. — Um die gelbe Farbe schön zu erhalten, setzt man eine gut präparirte Platte unter ein vereinigt rothes und blaues Kobaltglas, worunter sie sich in dem diffusen Licht purpurroth färbt. Sie nimmt alsdann von einem Spectrum das Orange, Gelb, Grün und Blau sehr deutlich auf. Becquerel hält die Verbindung, welche sich bei der angewandten Methode bildet, für ein violettes Subchlorür oder ein Gemenge von weißem Chlorür mit Subchlorür, weil sie, mit Ammoniak behandelt, weiß wird und sich wie das weiße Chlorür verhält. — Der gefärbte prismatische Abdruck erhält sich übrigens unter Einfluß des Lichtes nicht, die Auflösungsmittel des Chlorürs, wie Ammoniak, unterschwefligsaures Natron, zerstören ihn.

Daguerreotyp-
Bilder.

Zur Darstellung der Daguerreotypbilder sind nur wenige neue Bemerkungen gemacht worden.

Belfield-Lefèvre und Foucault (1) machen bekannt, daß, wenn man eine Silberplatte wie gewöhnlich polirt und jodirt und alsdann 3mal so viel Bromdampf zutreten läßt, als hinreicht um die Platte am Empfindlichsten gegen das Licht zu machen, so daß dieselbe einen dunkelblau-violetten Ton annimmt, die Platte alsdann zwar eine weit geringere Empfindlichkeit besitzt, dagegen viel geeigneter ist, die Lichtabstufungen der hellsten wie der dunkelsten Parthieen gleichzeitig im vollständigsten Detail wiederzugeben, eine Eigenschaft, welche man bei den nach gewöhnlicher Art zubereiteten Platten sehr vermißt.

(1) Ann. ch. phys. [3] XIX, 125; Phil. Mag. [3] XXX, 213.

Kilburn (1) bemerkt, daß galvanisch versilberte Platten eine bessere Politur annehmen und gegen die Einwirkung des Lichts empfindlicher sind, als die auf gewöhnlichem Wege verfertigten Daguerrotypplatten. — Boué (2) empfiehlt dasselbe Verfahren.

Daguerrotyp-
Bilder.

Kilburn (3) hat Daguerrotypbilder bei der Beleuchtung durch die Flamme des Talglichts oder der Oellampe innerhalb zehn Minuten erhalten.

Die Methoden der Anfertigung photographischer Bilder auf Papier haben sich vervollkommenet.

Blanquart-Evrard (4) wendet zur Darstellung größerer Lichtbilder auf Papier das Papier feucht an, indem er es zwischen zwei Glasplatten preßt und durch mehrere dahinter gelegte und benetzte Blätter feucht erhält. Die Flüssigkeiten, womit das Papier das eine Mal auf der einen, das andere Mal auf der andern Seite getränkt wird, sind 1 Thl. salpetersaures Silber auf 30 Thle. destillirtes Wasser, und 25 Thle. Jodkalium mit 1 Thl. Bromkalium auf 560 Thle. destillirtes Wasser. Nach dem letzten Bad wird das Papier getrocknet und im Dunkeln aufbewahrt; wenn es gebraucht werden soll, wird es nochmals auf der ersten Seite mit einer Lösung von 6 Thln. salpetersaurem Silber in 11 Thln. krystallisirbarer Essigsäure und 64 Thln. Wasser befeuchtet, und dann in der Kammer dem Licht ausgesetzt. Durch eine gesättigte Lösung von Gallussäure in großem Ueberschusse (5) bringt man das Bild zum Vorschein, wäscht alsdann mit Wasser, gießt eine Lösung von 1 Thl. Bromkalium in 40 Thln. Wasser auf, und wäscht endlich wieder und trocknet, worauf das negative Bild vollendet ist. — Die Bereitung des Papiers für die positiven Bilder, deren man eine beträchtliche Anzahl mittelst des negativen anfer-

Lichtbilder
auf Papier.

(1) Phil. Mag. [3] XXXII, 541; Dingl. pol. J. CIX, 314. — (2) Compt. rend. XXIV, 466. — (3) Phil. Mag. [3] XXX, 378. — (4) Ann. ch. phys. [3] XX, 100; Compt. rend. XXIV, 117. 653; XXV, 812. — (5) Ann. ch. phys. [3] XXI, 447.

Lichtbilder
auf Papier.

tigen kann, geschieht mittelst Lösungen von Kochsalz und salpetersaurem Silber auf die bekannte Art.

Saguez (1) giebt folgende Methode, photographisches Papier darzustellen : 1) Für das negative Bild. Auswahl eines recht feinen Papiers von ganz gleichmäßiger Durchsichtigkeit. 3—4 Minuten langes Eintauchen in eine Lösung von 5 Grm. Jodkalium in 120 Grm. Wasser. 12stündiges Trocknen in der Luft. Das Papier nimmt einen schwach rosenfarbnen Schein an. Es kann an einem trocknen Orte monatelang in diesem Zustande aufbewahrt werden. Soll es zur Anfertigung eines Bildes gebraucht werden, so gießt man auf eine Spiegelplatte eine geringe Menge einer Lösung von 5 Grm. salpetersaurem Silber in 10 Grm. Essigsäure und 60 Grm. Wasser, und legt das Papier auf die Oberfläche. Es überzieht sich mit einer dichten und sehr empfindlichen Schicht von weißem Jodsilber (nach Saguez sous-jodure). 2) Für das positive Bild. Das Papier wird auf eine Lösung von 1,25 Grm. Chlornatrium in 30 Grm. Wasser gelegt, bis es sich gleichmäßig damit getränkt, es wird alsdann zwischen Löschpapier gepresst und sodann auf eine Lösung von 5 Grm. salpetersaurem Silber in 30 Grm. Wasser gelegt, und nach einiger Zeit abgenommen, um in einem völlig dunkeln Raume getrocknet zu werden. Bei aller Vorsicht kann man indessen nicht vermeiden, daß es einen schwach rosenfarbnen Schein annimmt. Das positive Bild wird mit einer Lösung von 30 Grm. unterschwefligsaurem Natron in 300 Grm. Wasser fixirt.

Jodirtes Papier
für
Lichtbilder.

Um jodirtes Papier für Lichtbilder mittelst einer einzigen Auflösung zu bereiten, empfiehlt Jordan (2), salpetersaures Silber mit Jodkalium zu fällen, das Jodsilber auszuwaschen und in einer starken Jodkaliumlösung wieder aufzulösen. Diese Lösung soll man mittelst eines Glasstabes auf das Papier tragen, dasselbe trocknen und sodann in

(1) Compt. rend. XXV, 633. — (2) Dingl. pol. J. CX, 78, aus Mechanic's Mag. 1848, Nr. 1304.

Wasser tauchen, welches das Jodsilber auf das Papier niederschlägt. Man legt dieses alsdann mit der überzogenen Seite auf eine Wasseroberfläche, um das Jodkalium vollständig zu entfernen.

Jodirtes Papier für Lichtbilder.

Brooke (1) giebt an, durch Zusatz von wenig Jodkalium zu Bromkalium ein ungewöhnlich empfindliches photographisches Papier erhalten zu haben.

Schönbein (2) theilt mit, daß Stärkekleister mit frisch dargestelltem Jodblei so gemischt, daß er stark gelb gefärbt erscheint, dem Sonnenlicht ausgesetzt schnell schwarzblau werde, und überhaupt von allen bekannten Substanzen am Empfindlichsten gegen das Licht sei.

Poitevin (3) hat ein Verfahren angegeben, um Daguerre'sche Bilder, Zeichnungen und Kupferstiche auf photographisches Papier zu übertragen. Das Daguerre'sche Bild soll, ehe das Jodsilber durch unterschwefligsaures Natron abgewaschen ist, als negativer Pol in eine Auflösung von Kupfervitriol getaucht werden. Das Kupfer setzt sich nur an den Quecksilbertheilchen, nicht an dem schlechtleitenden Jodsilber ab. Man nimmt dann das letztere weg und trocknet. Gießt man alsdann auf die Platte eine Auflösung von Gallerte und läßt diese eintrocknen, so nimmt man mit dem Gallerteblatt das Kupfer und somit ein negatives Bild ab, welches dann sorgfältig über photographisches Papier gelegt und eine Viertelstunde dem diffusen Licht ausgesetzt werden soll. Das Bild wird dann in Wasser und in unterschwefligsaurem Natron gewaschen und getrocknet. Um eine Zeichnung oder einen Kupferstich wiederzugeben, legt man dieselben auf eine jodirte Platte und setzt dem Lichte, das hierdurch entstehende negative Bild alsdann Quecksilberdämpfen aus, und verfährt nachher, wie im vorigen Falle.

Übertragen von Lichtbildern und Zeichnungen auf photograph. Papier.

(1) *Instit.* 1848, 66. — (2) *Pogg. Ann.* LXXIII, 136. — (3) *Compt. rend.* XXVII, 13; *Instit.* 1848, 221.

Darstellung
gravirter Metallplatten von
Zeichnungen
und Kupfer-
stichen.

Poitevin (1) hat ferner ein Verfahren erfunden, von Zeichnungen und Kupferstichen erhaben oder vertieft gravirte Platten darzustellen, von welchen dann wieder beliebig Abdrücke genommen werden können. Man setzt den Kupferstich Joddämpfen aus, welche sich nur an die dunkeln Stellen anlegen, durch einen leisen Druck befestigt man das Blatt alsdann auf einer nach Daguerre'scher Art polirten Silberplatte, worauf das Jod zum Silber übertritt, so daß den Schatten des Kupferstichs Stellen von Silberjodür entsprechen. Man taucht alsdann die Platte als negativen Pol einer schwachen Batterie in eine gesättigte Lösung von Kupfervitriol, und nimmt sie wieder heraus ehe noch die jodirten Stellen Kupfer annehmen. Die Platte wird sofort abgewaschen, das Jodür mit unterschwefligsaurem Natrium weggenommen, die Kupferflächen werden durch Erhitzen bis zum Dunkelbraunwerden oxydirt, die bloßgelegten Silberflächen nach dem Erkalten amalgamirt, worauf man die Platte mit 2 oder 3 geschlagenen Goldblättchen bedeckt und unter Erhitzen das Quecksilber verdampfen läßt. Von den mit Kupferoxyd überzogenen Stellen, an welchen das Gold nicht festhaftet, wird dasselbe mit einer Bürste weggenommen. Darauf löst man das Kupferoxyd in einer Auflösung von salpetersaurem Silber, und setzt das Silber, wie das darunter befindliche Kupfer, der Einwirkung von verdünnter Salpetersäure aus. Die mit Gold bedeckten Stellen werden nicht angegriffen, man kann auf diese Weise beliebig tief ätzen und erhält eine Platte, von welcher nach Art der Holzschnitte Abdrücke machen kann.

Um tief gestochene Platten nach Art der Platten für gewöhnliche Kupferstiche zu erhalten, benutzt man eine Platte von vergoldetem Kupfer. Wenn man wie vorher verfährt, nehmen die Lichtstellen Kupfer auf, die Schattenstellen werden von Jod befreit und mit Säure wird dann das Goldamalgam an den Schattenstellen, das Kupferoxyd an den Lichtstellen weggenommen; die letzteren sind nunmehr

(1) Compt. rend. XXVI, 153; Instit. 1848, 46; J. pr. Chem. XLV, 333.

lurch das Gold gegen das weitere Einätzen der Säure geschützt und man erhält eine tiefgravirte Zeichnung.

Niépce de St. Victor (1) hat zwei neue Eigenthümlichkeiten der Joddämpfe entdeckt und sich bestrebt, dieselben auf die Vervielfältigung von Kunstwerken anzuwenden. — Die erste Eigenthümlichkeit besteht darin, daß die Joddämpfe sich auf den Strichen von Kupferstichen, Zeichnungen und dgl. absetzen, sei es, daß dieselben aus Druckerschwärze, gummifreier Tinte, Tusche oder Mennige bestehen. Legt man das jodirte Blatt alsdann auf ein Papier, eine Platte von Glas, Porcellan, Elfenbein etc., welche mit einem Stärkeüberzug versehen sind, so drückt sich die Zeichnung in blauer, violetter oder rother Färbung von Jodstärke ab. Am besten taucht man die Zeichnung zuerst in schwach ammoniakalisches Wasser und zieht sie hierauf durch, mit Schwefelsäure, Salzsäure und Salpetersäure angesäuertes, Wasser. Nachdem sie getrocknet, setzt man sie den Joddämpfen aus und wiederholt die angegebenen Operationen, legt das Blatt dann auf die mit Stärkekleister überzogene Platte und überzieht das Bild, nachdem es vollkommen trocken geworden, mit einem durchsichtigen Firnis und bedeckt es mit Glas. Man kann mehrere Abdrücke machen, ohne aufs Neue zu jodiren. — Auch auf Silber und Kupfer läßt sich das Bild übertragen und fixiren. — Eisen, Blei, Zinn, Messing nehmen das Bild gleichfalls auf, doch ist es nicht gelungen, dasselbe zu fixiren. — Die zweite Eigenthümlichkeit der Joddämpfe besteht darin, daß sie sich vorzugsweise auf die erhabenen Stellen von Reliefplatten ansetzen, so daß man auch hiervon Abdrücke machen kann. — Chlor besitzt die nämlichen Eigenschaften wie das Jod, doch ist das Bild so schwach, daß man es auf Silberplatten erst durch Quecksilber, auf Kupfer durch Ammoniakdämpfe sichtbar machen muß. Brom giebt gar keine Wirkung. — Das aus der langsamen Verbrennung

Eigenthümlichkeiten gewisser Dämpfe, zur Erzeugung von Bildern angewandt.

(1) Ann. ch. phys. [3] XXII, 85; Phil. Mag. [3] XXXII, 206; Sill. Am. J. [2] VI, 258.

Eigenthümlichkeiten gewisser Dämpfe, zur Erzeugung von Bildern angewandt.

des Phosphors entstehende Product verhält sich wie die aus Salpetersäure aufsteigenden Dämpfe setzen vorzugsweise an die hellen Stellen ab, und geben als negatives Bild auf Silber- oder Kupferplatten. G Relieffplatten verhalten sich diese Dämpfe dem Jod ähnlich — Von einem Kupferstich kann man ein negatives auch dadurch erhalten, daß man ihn den Dämpfen erwärmtem Chlorkalk aussetzt. — Chevreul (1) hat die hier angeführte Arbeit einen geistreichen Bericht geben.

Lichtbilder auf Glas.

Um Lichtbilder auf Glas zu übertragen, sch Niepce (2) vor, zu dem Weissen von 3 Eiern 12–15 pfen Jodkalium zu setzen, dann zu Schaum zu schäumen aus welchem man das flüssige Albumin ablaufen. Man bringt dieses dann in ein quadratisches Porzellan stellt darin die Glasplatte an der einen Wand aufrecht läßt sie an einem Haken sanft nieder, bis sie in der horizontalen Lage sich ganz mit Albumin bekleidet, wo man dann bei einer Temperatur, nicht höher als 15 bis trocknen läßt. Man bringt die Platte alsdann in eine Mischung von essigsaurem und salpetersaurem Silber an nämliche Art, wie man sie in Albumin tauchte, wasch mit destillirtem Wasser und bringt sie in die dunkle Kammer. Man bedient sich der Gallussäure, um das zum Vorschein zu bringen; des Bromkaliums, um fixiren.

Porro (3) theilt eine Notiz mit über ein von Z. deschi erhaltenes, den Moser'schen analoges Bild, wo mit Kobaltoxyd gefärbte Porzellanplatten auf gegenüberstehenden weissen Porzellanflächen hervorbrachten. Porro macht darauf aufmerksam, daß er schon früher ähnliche Bilder erhalten und die Resultate publicirt habe.

(1) Compt. rend. XXV, 785. — (2) Compt. rend. XXVI, 637; 1848, 183; J. pr. Chem. XLV, 280. — (3) Compt. rend. XXV, 7 (4) Compt. rend. XXV, 784.

Von Seguiet (1) ist der Gesellschaft für Beförderung der Künste zu Paris, behufs einer Preisvertheilung, vollständiger Bericht über die neueren Fortschritte der Photographie erstattet worden.

Ein Instrument, um die Intensität der chemischen Wirkung des Sonnenlichtes zu messen, wurde 1839 von Jordan ^{Photo-graphometer.} construiert und von Hunt verbessert. Ein hohler Cylinder, auf dessen Seitenfläche ein Dreieck, die eine Spitze aufwärts gerichtet, ausgeschnitten ist, dreht sich, dem Gang der Sonne folgend, um seine Axe, welche senkrecht zur Ebene der Ekliptik gestellt ist. Innerhalb desselben dreht sich ein mit photographischem Papier bedeckter Cylinder in entgegengesetztem Sinne. Die Punkte, welche hinter dem dreieckigen Ausschnitte vorübergehen, werden vom Sonnenlichte getroffen, um so kürzere Zeit, je näher sie der Spitze des Dreiecks liegen. Je weiter sich die sichtbare photographische Wirkung gegen die Spitze des Dreiecks erhebt, um so stärker hat das Licht gewirkt. Dieser Apparat ebensowohl, wie der 1840 von J. Herschel construirte, erfordert ein Uhrwerk zu seiner Bewegung, und beide dienen nur, um die mit den Tagesstunden sich ändernde Intensität zu messen. — Claudet (2) hat nun ein von ihm sogenanntes Photographometer construiert, mit Hülfe dessen man nicht nur die Intensität der chemischen Strahlen, sondern auch die relative Empfindlichkeit der nach verschiedenen Methoden zubereiteten Platten und chemischen Papiere messen kann. Die Platte oder das Papier wird am untern Ende einer schiefen Ebene angebracht und mit einem Metallbleche bedeckt, welches mit einer horizontal gerichteten Reihe gleichweiter runder Löcher versehen ist. Diesen entsprechen in einer längs der schiefen Ebene herabgleitenden zweiten Platte Oeffnungen von 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 Millimeter Länge; diese letztere Platte ist in ein schwarzes

(1) Aus Bull. de la soc. d'encour., Avril 1848, 195, in Dingl. pol. J. CVIII, 451. — (2) Phil. Mag. [3] XXXIII, 329; Instit. 1848, 318; Compt. rend. XXVII, 370.

Photo-
graphometer.

Tuch eingefügt, welches sich mit bewegt, so daß die Lichtstrahlen auf die zubereitete Platte nur in der Zeit treffen können, während welcher die Oeffnungen der bewegten Platte über die der ruhenden weggehen. Die Wirkungszeiten für die nebeneinander liegenden Oeffnungen verhalten sich begreiflicher Weise ebenfalls wie $1 : 2 : 4 : 8$ u. s. v. Bei Anwendung sehr schwacher Lichtquellen, wie z. B. bei Vergleichung der chemischen Wirkung des Mondlichts mit der des Sonnenlichtes, muß man die bewegliche Platte mehrmals fallen lassen und das Verhältniß der Intensitäten danach berechnen. — Um Platten verschiedener Zubereitung vergleichen zu können, muß man sie nebeneinander legen und zwei bewegliche Platten gleichzeitig herabgleiten lassen, da die Intensität des Lichtes sich mit jeder Minute ändert.

Claudet hat mit Hülfe seines Apparates gefunden, daß das reine Sonnenlicht das Bromjodsilber schon in $\frac{1}{10}$ Sekunde für die Quecksilberdämpfe empfänglich macht. Er hält den Apparat geeignet für die Beantwortung folgender Fragen: Welches ist die Wirkung des zusammengesetzten Lichtes, welches die der einzelnen Farbenstrahlen? Welcher Verlust an chemischen Strahlen tritt bei der gewöhnlichen und totalen Reflexion, oder bei der Brechung durch Linse ein? Welches ist die Intensität der chemischen Strahlen in den verschiedenen Lichtquellen? Welchen Einfluß äußern die Veränderungen in der Atmosphäre auf die chemischen Strahlen?

Ronalds (1) hat eine Methode photographischer Selbstregistrierung meteorologischer und magnetischer Phänomene erfunden.

(1) Sill. Am. J. [2] III, 428.

Magnetismus.

Schon vor mehreren Jahren hat P. W. Häcker, Eisen-
händler in Nürnberg, für das Tragungsvermögen hufeisen-
förmiger Stahlmagnete, wenn sie bis zu dem Grade gesät-
tigt sind, daß ihre magnetische Kraft durch noch so oft-
maliges Abreißen des Ankers nicht weiter geschwächt werden
kann, die aus zahlreichen Versuchen abgeleitete (rein em-
pirische) Formel aufgestellt (1):

$$(1) \quad z = a \sqrt[3]{P},$$

wo **P** das Gewicht, **z** das Tragungsvermögen des Magnets, beides in baierischen Lothen (1 Kilogr. = 1,786 baier. Pfd. = 57,152 baier. Loth), **a** bei gleichartiger Stahlmasse eine beständige GröÙe vorstellt. Bei guten Magneten kann sich **a** nach Häcker bis zu $\log a = 1,6$ erheben und erhält sich, wenn störende äußere Einflüsse vermieden werden, dauernd bei diesem Werthe. Dieser Werth **a** hängt jedoch sehr von der Beschaffenheit des Stahls, so wie von der Bearbeitung desselben im Feuer und dem Härtegrad, dagegen innerhalb gewisser Gränzen nicht merklich von der GröÙe und Gestalt der Magnete ab. Die Gewichte einer großen Anzahl untersuchter Magnete fallen zwischen 1½ Loth bis zu 40 Pfund, bei sehr ungleichen Abmessungen der Schenkel, deren Länge bei dem schwersten Magnete 31 Zoll betrug. Innerhalb dieser Grenzen nun scheint es gleichgültig, ob der Querschnitt der Schenkel rund oder viereckig, quadratisch oder länglich ist, ob sie etwas länger oder kürzer sind, ob sie etwas mehr oder weniger von einander abstehen; ja selbst, ob sie aus einem Stücke bestehen oder aus mehreren Lamellen zusammengesetzt sind.

Auch das Tragungsvermögen gerader Magnetstäbe, zwischen ¼ Loth bis 81 Loth Gewicht und 2 bis 18 Par. Zoll Länge, soll sich nach derselben Formel berechnen lassen,

(1) Pogg. Ann. LVII, 321.

Magnetische
Tragkraft.

wenn sie ihre dauernde Sättigungsstufe möglichst vollständig erreicht haben und wenn man dasjenige, was ein Pol zu tragen vermag, doppelt nimmt (1).

Für die Schwingungszeiten gerader Magnetstücke, die in einer wagerechten Ebene schwingen, giebt Häcker (2) das Erfahrungsgesetz :

$$T : t = \sqrt{L} \sqrt[3]{F} : \sqrt{l} \sqrt[3]{f}$$

wo L und l die Längen, F und f die Querschnittsflächen der Stäbe bedeuten. Indem dann anstatt des Querschnittes das Gewicht dividirt durch die Länge und die Schwingungszeit t eines Stabs von der Länge l und dem Gewicht 1 gleich c gesetzt wurde, wurde erhalten :

$$(2) \quad T = c \sqrt[3]{P \sqrt{L}}$$

Die Versuche, aus welchen diese Formel abgeleitet ist, beziehen sich auf Magnetstäbe zwischen 3 bis 22 Zoll Länge bei 1 bis 103 Loth Gewicht. Häcker setzt $\log c = 0,432$; wobei jedoch P wieder in baierischen Lothen und L in Par. Zollen ausgedrückt werden muß (3).

Die nach dieser Formel innerhalb der erwähnten Grenzen berechneten Schwingungszeiten stimmen so ziemlich mit der Beobachtung, sowohl bei cylindrischen als bei viereckigen Stäben; bei letzteren selbst dann, wenn sie aus mehreren übereinandergelegten, nicht sehr breiten Lamellen bestanden.

Im Verlauf dieser Untersuchungen kam Häcker zu der bemerkenswerthen Beobachtung, daß bei geraden Magnetstäben, bei beliebiger Stufe der Sättigung, das Product ac^2 stets unverändert blieb. Wird nun die erste mit dem Quadrate der zweiten Gleichung multiplicirt, so ergibt sich :

$$(3) \quad z \quad T^2 = ac^2 \sqrt[3]{P \cdot L}$$

eine Gleichung, mittelst deren, sowie ac^2 ein für allemal genau bekannt ist, aus der Schwingungszeit eines geraden

(1) Pogg. Ann. LXII, 366. — (2) Pogg. Ann. LVII, 337. — (3) Pogg. Ann. LXXII, 68.

t, deren Abmessungen nicht innerhalb der oben
n Grenzen fallen. Da jedoch die von ihm in dieser
g aufgefundenen Resultate weder hinsichtlich ihrer
en noch wissenschaftlichen Bedeutung ein gleiches
zu bieten scheinen, so dürfte es genügen, hier
die betreffenden Abhandlungen hinzuweisen (1).
wichtig ist die Erfahrung, daß ungehärteter Stahl
etwas mehr als die Hälfte derjenigen magnetischen
nimmt, die dem gehärteten bleibend ertheilt wer-

ker sagt nichts über die Beschaffenheit der von
ühlten Anker, die gleichwohl, wie man aus neueren
n von Dub über das Tragungsvermögen der Elec-
te (2) schliessen muß, auch bei den Stahlmagneten
ie sehr bedeutenden, übrigens auch schon von frü-
ysikern hervorgehobenen, Einfluß bleiben konnte.
ichtlich des Tragungsvermögens der Electromagnete
akobi und Lenz (3) den auf Beobachtungen ge-
n Satz aufgestellt: daß unter übrigens gleichen
en die GröÙe der Anziehung (d. h. des wechsel-
Festhaltens) zweier gerader, cylindrischer Electro-
oder eines Electromagnets und eines Ankers von

Magnetische
Tragkraft.

hältnisse hervortreten. Ueberhaupt zeigt Dub durch seine zahlreichen Versuche mit Ankern von sehr verschiedenen Abmessungen angestellt, daß dieselben auf die Größe der Tragungsvermögens einen weit größeren Einfluß haben als man bisher vermuthete. Nicht nur die Gewichtsmasse des Ankers, sondern auch seine Längenausdehnung, sowie die Größe der Fläche, womit er den Magnet berührt, kommen dabei als wesentlich in Betracht. Ueber die Gesetze dieser Abhängigkeit erhält man aus Dub's Arbeit keine Aufschlüsse, so daß es also bis jetzt nicht möglich ist, über die zweckmäßigste Gestalt und Größe der Anker irgend allgemeine Bestimmungen zu geben.

Von Barral (1) wurden einige Versuche über denselben Gegenstand mitgetheilt, wonach die Anziehung mit dem Gewichte des Ankers zunimmt, und ein Maximum erreicht wenn Electromagnet und Anker gleiches Gewicht besitzen. Die weit umfangreicheren und ausführlicher beschriebenen Versuchsreihen Dub's stimmen mit dieser Angabe nur soweit überein, daß für einen gegebenen Electromagnet und gegebenen Durchmesser des Ankers eine gewisse Größe der Tragkraft nicht überschritten werden kann. Diese Grenze scheint jedoch mehr von der Länge als von dem Gewichte abhängig zu sein, und um so schneller erreicht zu werden, je größer die Stromstärke ist.

Barral hat auch das Gesetz der Abnahme der Tragkraft bei zunehmender Entfernung der einander anziehenden Flächen untersucht, und gibt dafür den Ausdruck $y = \frac{A}{B + Cx}$, worin y die Stärke der Anziehung in Kilogrammen, x die Entfernung in Millimetern bedeutet. A, B und C sind Constanten, abhängig von der Stromstärke, sowie von dem Gewicht und der Form der Electromagnete und ihrer Anker. A soll größer als 1, B ein Bruchtheil und C zwischen 1 und 2 liegen. Daß die Wahrheit des ausgesprochenen Gesetzes bei so unbestimmten Angaben

(1) Compt. rend. XXV, 757.

noch sehr der Bestätigung bedarf, braucht kaum erwähnt zu werden.

Ueber die Vertheilung des Magnetismus in regelmäsig magnetisirten Stahl- und Eisenstäben hat van Roes in Utrecht eine werthvolle theoretische Untersuchung bekannt gemacht (1). Die Grundlage, von welcher er ausging, bildet die gegenwärtig wohl von allen Physikern angenommene Hypothese, daß jeder regelmäsig Magnet aus Reihen magnetisch polarer Theilchen bestehe, welche einander ihre ungleichnamigen Pole zukehren. Diese Annahme, verbunden mit der Vorstellung, daß die Wirkung eines jeden magnetischen Theilchens auf die Ferne oder nach Außen der Größe seines magnetischen Momentes proportional sei, oder, was dasselbe sagt, im zusammengesetzten Verhältniß der Menge getrennter magnetischer Flüssigkeiten und ihrer Scheidungsweite (dem Abstände ihrer Pole von einander) stehe, — leitete ihn in strenger Schlussfolge zu dem Satze, daß die Menge (y) freier magnetischer Flüssigkeit, vertheilt um eine Scheibe deren Dicke der Längeneinheit gleich ist und die man sich durch zwei auf die magnetische Axe senkrechte Ebenen in beliebigem Abstände (x) von der Mitte des Stabs abgegrenzt denkt, gleich sei dem *Differenzialquotienten* $\left(\frac{dz}{dx}\right)$ des magnetischen Momentes (z) an dieser Stelle, betrachtet als Function des Abstandes x .

Vertheilungs-
Gesetz des
Magnetismus
in Magnet-
stäben.

Indem er dann für y den von Biot (2) nach den bekannten Beobachtungen Coulombs über die Vertheilung des freien Magnetismus auf Stahldrähten berechneten algebraischen Ausdruck setzte (der jedoch, um zu diesem besonderen Zwecke zu passen, anstatt auf das Ende, auf die Mitte des Magnetstabs bezogen werden mußte), gelangte er durch Integriren zu der Gleichung $z = a - b(\mu^x + \mu^{-x})$, die, wenn der Abstand x und das Moment z als Coordinaten einer Curve betrachtet werden, der Kettenlinie an-

(1) Pogg. Ann. LXX, 1. — (2) Traité de physique III, 70.

Vertheilungs-
Gesetz des
Magnetismus
in Magnet-
stäben.

gehört. Die drei Constanten a , b und μ müssen für jeden Magneten besonders bestimmt werden.

Man darf erwarten, daß dieses zunächst von dem Verhalten der Stahlmagnete abgeleitete Gesetz auch für Electromagnete, die von Drahtwindungen ihrer ganzen Länge nach und gleichmäßig umgeben sind, Geltung habe, indem der den Eisenstab umkreisende Strom an allen Punkten des ersteren ein und dieselbe magnetisirende Kraft ausübt, und, so lange er anhält, die dem weichen Eisen abgehende Coercitivkraft ersetzt.

Nun ist die Vertheilung des Magnetismus in Electromagneten schon vor mehreren Jahren auf experimentellem Wege von Lenz und Jakobi (1) bestimmt worden. Es schoben eine ganz schmale Inductionsrolle, deren Drähte einem feinen Galvanometer führten, nach und nach auf verschiedene Stellen des Electromagnets, und indem einen galvanischen Strom von stets gleicher Stärke durch die electromagnetische Spirale sendeten, wurde an jeder Stelle die Wirkung gemessen, welche dieser Theil des Magnets auf die Drahtwindungen der darüber befindlichen Inductionsrolle ausübte. Die Stärke des erregten Inductionstroms wurde dem Sinus des halben Ablenkungswinkels der Galvanometernadel gleichgesetzt, und als proportionaler Ausdruck für die Menge des an der betreffenden Stelle des Magnets zerlegten Fluidums betrachtet. Aus den erhaltenen Werthen zogen die genannten Physiker die Folgerung: daß der Magnetismus unter dem Einflusse des Stroms sich am stärksten in der Mitte eines Eisencylinders entwickle, also gerade da, wo der freie Magnetismus Null ist, und daß von hier aus nach beiden Seiten hin die Abnahme der magnetischen Ausscheidung nach einem Gesetze vor sich gehe, welches dem der Biegung der Parabel entspreche.

Van Rees bemerkt, daß Lenz und Jakobi bei ihrer Versuchsmethode nicht eigentlich die Menge, sondern

(1) Pogg. Ann. LXI, 271. 448.

Vertheilungs-
Gesetz des
Magnetismus
in Magnet-
stäben.

das Moment des an verschiedenen Stellen zerlegten magnetischen Fluidums gemessen haben; indem ja die Stärke der Induction im zusammengesetzten Verhältnisse steht zu der Menge getrennter, ungleichartiger magnetischer Flüssigkeiten und dem Weg, den sie zurücklegen müssen, um sich im Augenblicke des Oeffnens der galvanischen Kette wieder zu vereinigen. Diese Versuche lassen sich daher als Prüfstein des von van Rees aufgefundenen Gesetzes benutzen. Letzterer hat sie zu diesem Zwecke von Neuem und nach seiner Formel berechnet und findet, daß sie sich derselben wirklich noch besser anschmiegen, als der von jenen Physikern gegebenen parabolischen (1).

Um die Richtigkeit des Gesetzes aber auch an Stahlmagneten prüfen zu können, hat van Rees selbst Versuche angestellt (2). Er benutzte dazu, wie Lenz und Jakobi, eine schmale Inductionsrolle, welche auf die magnetisirten Stahlstäbe aufgeschoben sich dem Umfange derselben thunlichst nahe anschloß. Sie wurde zuerst von der Mitte aus, dann aus verschiedenen Abständen von der Mitte abgeschoben, und der jedesmal dadurch erzeugte momentane Strom mit dem Galvanometer gemessen. Seine Stärke, dem Sinus des halben Ablenkungswinkels gleichgesetzt, mußte der Menge des freien Magnetismus proportional sein, welche zwischen dem Ende des Stabs und der Stelle (x), von welcher die Bewegung begann, eingeschlossen ist, und wird als proportionaler Ausdruck des magnetischen Momentes an der Stelle x genommen.

Versuche dieser Art wurden mit viereckigen und cylindrischen Magnetstäben ausgeführt. Die Resultate zeigten im Allgemeinen eine befriedigende Uebereinstimmung mit dem theoretischen Gesetze. Nur die letzten Beobachtungen einer jeden Reihe, nämlich die durch Abziehen der Inductionsrolle vom Ende eines jeden Stabs erhaltenen Stromstärken, fallen stets etwas geringer aus als die Resultate der Rechnung. Aus diesem Grunde wagt van Rees noch

(1) Pogg. Ann. LXX, 20. — (2) Pogg. Ann. LXXIV, 213.

Vertheilungs-
Gesetz des
Magnetismus
in Magnet-
stäben.

nicht, das von ihm aufgestellte Gesetz als ganz erwiesen zu betrachten. Die bemerkten Abweichungen können allerdings nicht zufällig sein, da sie die Grenzen Beobachtungsfehler zum Theile weit überschreiten überdies auch bei den Versuchsreihen der Petersburger Physiker wahrnehmbar sind. Sie scheinen jedoch nur Folge inducirender Seitenwirkungen zu sein, die bei gewählten Versuchsmethode nicht ganz zu vermeiden war und offenbar am Ende des Stabs, wo sich ihr Einfluss von einer Seite äußern konnte, eine verhältnismäßige Verringerung der Wirkung herbeiführen mußten. Gewisse Folgen ähnlicher Einflüsse, wurden immer etwas zu geringen Stromstärken erhalten, wenn die Rolle von den in Nähe der Magnetpole liegenden Stellen abgeschoben war.

Van Rees setzte, wie oben bemerkt, die Stärke momentanen Stroms nach dem Vorgange von Lenz und Jakobi dem Sinus des halben Ablenkungswinkels proportional. Man könnte aber gegen die Gültigkeit dieses Verfahrens den Einwurf erheben, daß der von der Vanometersnadel beschriebene erste Ablenkungsbogen nicht die Gegenwart desjenigen Inductionsstroms, welchen eine eigne Bewegung in den Drahtwindungen erregt, nicht seiner ganzen, theoretisch vorausgesetzten Größe gleich könne; ein Einwurf, der *a priori* sich nicht leicht entkräften läßt. Van Rees hat ihn aber durch eine Reihe von Versuchen beseitigt, indem er für eine gegebene Größe der durch Induction bewirkten electromotorischen Kraft, ebenfalls bekanntem aber wechselndem Leitungswiderstande die beobachteten Ablenkungen mit den berechneten verglich, und beide stets einander gleich fand.

Die experimentelle Bewährung des von van Rees aufgestellten Gesetzes giebt zugleich eine umfassende Bestätigung des Biot'schen Gesetzes über die Vertheilung des Magnetismus, welches ja von dem ersteren die Grundlage bildet. Die Formel $y = A (\mu^x - \mu^{21-x})$, oder wenn man von der Mitte des Magnets ausgeht: $y = -A \mu^x (\mu^x -$

wenn auch ursprünglich nur für magnetisirte Stahldrähte geltend, kann mit gleichem Rechte gebraucht werden, um die Vertheilung des freien Magnetismus auf geraden Magnetstäben jeder Art zu berechnen.

Ueber den Einfluss, welchen die Magnetisirung auf die Gestalt der Eisenstäbe üfsert, liegen Versuche des thätigen englischen Physikers Joule (1) vor. Er hat gefunden, dass Stäbe, insbesondere von sehr weichem Eisen, im Augenblicke der Magnetisirung sich verlängern, ohne jedoch ihr Volum zu ändern, so dass demnach eine gleichzeitige verhältnissmäßige Verminderung des Querschnittes eintreten muss. Während des Erlöschens des Magnetismus (z. B. durch Aufhören des erzeugenden Stroms) gehen die Stäbe nicht ganz oder doch nur sehr langsam zur früheren Länge zurück. Aus dieser Gestaltsveränderung würde sich das bekannte Ertönen der Eisenstäbe im Augenblicke des Eintritts des Stroms in die Windungen erklären. — Joule setzt die Verlängerung sehr weicher Stäbe dem Quadrate der magnetischen Intensität proportional. Bei hartem und gespanntem Eisen, sowie bei Stahlstäben ist die Verlängerung unregelmässig, und geht sogar bei sehr starker, z. B. durch angehängte Gewichte bewirkter, Spannung in eine Verkürzung über.

Ueber die mittlere Horizontalintensität des Erdmagnetismus hat Lamont (2) mehrere, theils von Langberg, theils von Ångström, theils von ihm selbst ausgeführte Bestimmungen zusammengestellt. Sie sind der besseren Vergleichung willen sämmtlich auf den ersten Januar 1845 reducirt. Es ist hiernach die mittlere Horizontalintensität in :

(1) Phil. Mag. [3] XXX, 76. 225: in Ann. Mag. Nat. Hist. Nat. V, 51. — (2) Pogg. Ann. LXX. 154.

Erd-
Magnetismus.

Name des Ortes.	Bestimmungen von		
	Langberg.	Ångström.	Lamont.
Kopenhagen . . .	1,6545	1,6548	—
Altona	—	1,7262	—
Utrecht	—	—	1,7278
Leiden	—	—	1,7234
Cork	1,6486	—	—
London, Greenwich	} 1,7191 {	—	1,7250
Woolwich		—	1,7197
Göttingen	—	1,7849	—
Dresden	1,8377	—	—
Brüssel	1,7710	1,7664	1,7662
Aachen	—	—	1,7810
Bonn	1,8001	1,7926	1,7941
Prag	1,8740	—	—
Mannheim	—	—	1,8568
Paris	1,8372	1,8355	—
Stuttgart	—	1,8969	1,8870
Tübingen	1,9048	1,9011	1,9034
Straßburg	—	1,8909	—
Augsburg	—	1,9299	—
Ulm	—	1,9186	—
Wien	1,9731	—	—
München	1,9386	—	—
Bern	1,9625	—	—
Genf	1,9837	—	—
Roveredo	2,0317	—	—
Mailand	2,0345	—	—
Venedig	2,0674	—	—

Die magnetische Deklination findet Lamont, eben auf den ersten Januar 1845 reducirt, in :

Tübingen	17° 50,0	Brüssel	21° 15,1	Leiden	20°
Mannheim	18° 12,8	Utrecht	20° 19,0	London, Greenwich	23°

Aus vergleichenden Versuchen über die Schwingzeit eines Magnetstabs im leeren Raume und in Luft verschiedener Dichtigkeit, welche Lamont gemeinschaft mit Kuhn angestellt hat, scheint hervorzugehen, daß durch die Luft veranlafte Verzögerung so groß ist, wenn die träge Masse des Magnets um die Luft vermehrt sei, welche die Oberfläche des schwinger Körpers bis zu 4 Millimeter Abstand rings umgiebt (1).

(1) Pogg. Ann. LXXI, 124.

Matthiessen (1) hat unter einer großen Menge von Glassorten 23 gefunden, welche zwischen den Polen des Electromagneten die Polarisationsebene stärker drehen, als das Faraday'sche schwere Glas. Namentlich die Bleisilikate zeichnen sich aus. M. hat den Einfluss der Stärke des Electromagneten, des Abstands der Pole, der Neigung der Magnetaxen, der Dicke der Gläser, ihrer Härtung, der Vervielfältigung der Oberflächen einer Untersuchung unterworfen, und ein Verzeichniss seiner wirksamsten Gläser mitgetheilt (2).

Diamagnetismus.
Drehung der
Polarisations-
ebene durch
den Electro-
magneten.

Bertin (3) hat in einer Arbeit über die Drehung der Polarisationsebene durch den Electromagneten oder die Drahtrolle zuerst das Gesetz, »dass die Drehung immer gleiche Richtung hat, wie der die Magnetisirung erzeugende Strom, oder auch wie die Ströme, welche nach Ampère in einem Stücke weichen Eisens, das an die Stelle der angewandten Substanz versetzt worden, unter der Wirkung des Electromagneten würden erregt werden«, unter verschiedenen Umständen bestätigt. — Er giebt bei dieser Gelegenheit an, dass man starke Drehungen erhalten könne, wenn man mehrere Gläser in die Zwischenräume einer Reihe von Rollen einschalte, welche nach einer Axe centrirte, den Strom in gleicher Richtung leiten. Eine sehr bequeme Art, die Versuche über Drehung der Polarisationsebene durch einen Pol des Electromagneten anzustellen, besteht darin, dass man den Nörrenberg'schen Polarisationsapparat auf die horizontale Polfläche eines kräftigen Electromagneten aufstellt, die polarisirende Substanz auf den untern belegten Spiegel und eine Soleil'sche Platte von zwei Drehungen auf das Tischchen, welches für die Krystalle bestimmt ist, auflegt. Die Drehung wird hier verdoppelt,

(1) Compt. rend. XXIV, 969; XXV, 200; Pogg. Ann. LXXIII, 65. 71; Arch. ph. nat. V, 126. — (2) Compt. rend. XXV, 173; Pogg. Ann. LXXIII, 77. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 5; Pogg. Ann. LXXV, 420; im Ausz. Compt. rend. XXVI, 216; Instit. 1848, 53; Pogg. Ann. LXXIV, 143.

Drehung der
Polarisations-
ebene durch
den Electro-
magneten.

weil das Licht die polarisirende Substanz zweimal durchläuft. Ein Glas von 48^{mm} Dicke gab eine Drehung von 21°. — Diese Vorrichtung ist nebenbei geeignet, die Wirkung des Magneten auf Quarzplatten zu zeigen, weil die eigenthümliche Drehung dieser Substanz durch zwei entgegengesetzte Effecte compensirt ist.

Die Stärke der Drehung hängt, eine bestimmte Stromstärke vorausgesetzt, ab von der Natur der Substanz, von der Dicke der angewandten Schicht und von dem Abstand der Pole. Bertin fand, daß, wenn man nur einen Pol auf ein Flintglas von 39^{mm} Dicke wirken und dessen Abstand in arithmetischer Reihe wachsen läßt, die Drehungen der Polarisationsebene in geometrischer Reihe abnehmen. Ist demnach A die Drehung, welche das Flintglas im Contact mit dem Pole erzeugt, A r die Drehung in 1^{mm} Abstand, so ist die Drehung y in x^{mm} Abstand $y = Ar^x$; bezeichnet sodann c die Drehung, welche eine Schicht von 1^{mm} Dicke im Contact mit dem Pole hervorbringt, so hat man für einen Körper von c^{mm} Dicke

$$A = c \frac{1-r^c}{1-r} \text{ also } y = c \left(\frac{1-r^x}{1-r} \right) r^x$$

Die Wirkung zweier Pole, welche einen Abstand d haben, und zwischen welchen sich ein wirksamer Körper von der Dicke e befindet, ist hiernach ausgedrückt durch

$$z = c \left(\frac{1-r^e}{1-r} \right) (r^x + r^{d-e-x})$$

Sind z, z', z'' die Drehungen, wenn der Abstand desselben Glases x, x + α, x + 2α, so ist $\frac{z+z''}{z'} = r^\alpha + r^{-\alpha}$ eine constante GröÙe. Diese Consequenz, sowie einige andere, welche Bertin aus den Formeln gezogen, werden durch die Beobachtung auf das Befriedigendste bestätigt. Die GröÙe c variiert mit der Intensität des Magnetismus bei allen Körpern nach dem nämlichen Gesetze, so daß die Verhältnisse der Werthe von c nur von der Natur der Substanzen abhängen. Bertin schlägt vor, c den *Coefficienten der magnetischen Polarisation* zu nennen, und hat ihn für

die folgenden Substanzen bestimmt, indem er ihn für das Drehung der Polarisations-ebene durch den Electro-Magneten.
Faraday'sche Flintglas = 1 annahm :

Guinand's Flintglas	0,87	Phosphorchlorür	0,51
Matthiessen's Flintglas	0,83	Gelöstes Chlorzink	0,55
Sehr dichtes Flintglas	0,55	Gelöstes Chlorcalcium	0,45
Gemeines Flintglas	0,53	Wasser	0,25
Zinnchlorid	0,77	Gewönl. Alkohol (36° B.)	0,18
Schwefelkohlenstoff	0,74	Aether	0,15

Matteucci (1) hat gefunden, dafs, wenn man polarisirtes Licht durch Kronglas, Flintglas und Faraday's schweres Glas gehen läfst und den Soleil'schen Quarzapparat, Drehung der Polarisations-ebene in comprimierten Körpern durch den Magnetismus. welcher die Lage der Polarisations-ebene angiebt, auf Null stellt, jene Körper alsdann zusammenpreßt, die Polarisations-ebene gedreht wird. Läfst man dann einen Electromagneten einwirken, so ist die Drehung der Polarisations-ebene bedeutender im Sinne der durch Compression erzeugten Drehung, als im entgegengesetzten, während vor der Compression die Drehung beim Stromwechsel rechts und links gleich war. — Matteucci fand ferner, dafs die Drehung der Polarisations-ebene durch den Magneten bei höherer Temperatur bedeutend zunimmt, bei der Siedetemperatur des Oeles z. B. doppelt so grofs ist, als bei gewöhnlicher Temperatur.

Wartmann (2) hat auf folgende Weise die Einwirkung Wirkung des Magnetismus auf die strahlende Wärme. des Magnetismus auf die Polarisations-ebene der strahlenden Wärme dargethan. Ein Bündel Wärmestrahlen von einer Locatelli'schen Lampe wird durch eine Glimmersäule polarisirt, geht dann durch einen Steinsalzcyylinder und sodann durch eine zweite Glimmersäule, deren Polarisations-ebene senkrecht auf derjenigen der ersten Säule steht. Da die Polarisation immer unvollständig ist, so bringt das Wärmebüschel auf einer Thermosäule immer noch Wirkung hervor; diese steigert sich aber, sobald ein Electromagnet in Thätigkeit tritt, dessen Pole das Steinsalz berühren, oder der Strom in einer Drahtrolle, welche das Steinsalz um-

(1) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 354. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 573.

Wirkung des
Magnetismus
auf die strah-
lende Wärme.

schließt, zum Beweise, daß die Polarisationsebene worden. Die Wirkungen sind zwar gering, W hält sie jedoch für unzweideutig.

Von Airy (1) ist eine Abhandlung erschienen Gleichungen für das unter der Wirkung des Ma stehende Licht.

Magnetismus
als allgemeine
Eigenschaft
der Materie.

Es ist bekannt, wie die vereinzelt Beob einer Abstossung des Wismuths durch die Magne Brugmans (2) und le Baillif (3), sowie die vo beck, daß das Wismuth zwischen den Polen eine z axe senkrechte oder *äquatoriale* Richtung annimm eine umfassende Arbeit Faraday's (4) als Aeu einer allgemein verbreiteten Naturkraft, wonach al von dem Magneten entweder angezogen oder ab werden, erkannt wurden. Zu den erstern oder de tischen Körpern, deren Hauptrepräsentant das l gehören nach Faraday Nickel, Kobalt, Mangan Cer, Titan, Palladium, Platin, Osmium, Aluminium alle natürlichen und künstlichen Verbindungen di talle. Schwach magnetisch zeigten sich noch Pa gellack, Tusche, Porcellan, Asbest, Flußspath, Zinnober, Bleisuperoxyd, Zinkvitriol, Turmalin, Schellack und Holzkohle. Zu den Körpern der Gruppe, welche Faraday *diamagnetische* genannt hören: Wismuth, Antimon, Zink, Zinn, Kadmium, Quecksilber, Blei, Silber, Kupfer, Gold, Arsen, U dium, Iridium, Wolfram und viele Verbindung Körper; ferner Alaun, Salmiak, Soda, Kalkspat steinsäure, Citronensäure, Wasser, Alkohol, Aet petersäure, Schwefelsäure, Salzsäure, Jod, Phospho fel, Harz, Wachs, Olivenöl, Terpenthinöl, Kautschu cker, Stärke, Gummi, Holz, Elfenbein.

(1) Phil. Mag. [3] XXVIII, 469; Pogg. Ann. LXX, 272. — Ann. X, 293. — (3) Pogg. Ann. X, 507. — (4) Phil. Trans Phil. Mag. [3] XXVIII, 455; Pogg. Ann. LXX, 24.

Plücker (1) hat auf einige Phänomene aufmerksam gemacht, welche auf der magnetischen oder diamagnetischen Eigenschaft tropfbarer Flüssigkeiten beruhen. War der Abstand der beiden Halbanker des Electromagneten 2,5^{mm} und wurde ein Uhrglas, aus einer Kugel von 36^{mm} Halbmesser geschnitten, so weit mit Eisenchloridlösung gefüllt, daß der Umfang derselben einen Kreis von 35^{mm} bildete, und alsdann auf die Halbanker aufgesetzt, so daß es dieselben in ihren äußersten Punkten berührte, so erschien die Flüssigkeit nach Schließung der Kette, von oben gesehen, von einer Ellipse begrenzt. Die große Axe, 40^{mm} lang, fiel in die Aequatorialebene, die kleine, 25^{mm} lang, in die Magnetaxe. In der Mitte wurde die Flüssigkeit um mehr als 1^{mm} gehoben, so daß sie in der Aequatorialebene einen Bergrücken bildete. Wurde der Abstand der Pole bis auf 8^{mm} vergrößert, so verwandelte sich die elliptische Form in eine ovale, deren längste Axe bei 15^{mm} und noch deutlicher bei 23^{mm} Abstand in die Axenrichtung fiel. Lösungen von Eisenchlorür, Eisenvitriol und salpetersaurem Nickeloxyd zeigten ähnliche, jedoch schwächere Wirkungen. Enthielt das Uhrglas diamagnetische Flüssigkeit, so sah man dieselbe in der axialen Richtung sich ausdehnen, in der äquatorialen sich zusammenziehen und in dieser letzteren Ebene ein Thal bilden. Plücker ist der Ansicht, daß man auf die hier beschriebenen Beobachtungen eine Methode gründen könne, nicht nur um die kleinste Spur von Magnetismus oder Diamagnetismus zu entdecken, sondern auch um die Stärke beider zu messen. Er schlägt hierzu den folgenden Apparat vor. Ein oben offener parallelepipedischer Kasten von dünnem Messingblech wird zwischen die senkrechten Polflächen der Halbanker eingeschoben. An dem unteren Theile einer derjenigen Seitenflächen, welche zur Aequatorialebene senkrecht stehen, ist eine Glasröhre eingekittet, welche nach außen allmählig ansteigt. Füllt man den Kasten zum Theil mit einer diamagnetischen

Magnetismus
als allgemeine
Eigenschaft
der Materie.

(1) Pogg. Ann. LXX, 567.

Magnetismus
als allgemeine
Eigenschaft
der Materie.

oder magnetischen Flüssigkeit, so sieht man beim Steigen der Kette das Niveau in der Glasröhre im ersten ansteigen, im zweiten aber sinken.

Werden die Versuche über die Richtung, welche ein Körper zwischen den Magnetpolen annehmen, nicht in einem leeren Raume angestellt, so erhält man nur Resultate, d. h. auch ein magnetischer Körper kann äquatorial, ein diamagnetischer axial stellen, wenn die genannten Eigenschaften in geringerem Maße vorhanden sind, als dem umgebenden Mittel. Man mag sich die Beobachtungen Faraday's erinnern, wonach eine vitriollösung, in eine Glasröhre eingeschlossen und in verdünnter Lösung getaucht, sich axial, in einer concentrirteren aber äquatorial stellt. Das magnetische Verhalten der Gase muß durchaus unter diesem Gesichtspunkte betrachtet werden, wenn man die Versuche nicht im Vacuum stellen kann. — Eine unvortheilhafte Beobachtung hatte Faraday (1) zwar anfangs verhindert, den Diamagnetismus und Diamagnetismus der Gase zu erkennen, glaubte dieselben auf den Nullpunkt der magnetischen Skale setzen zu müssen. Die auffällenden Erscheinungen, welche die Flamme zwischen den Magnetpolen darbietet, und welche von Bancalari entdeckt, von Zantedeschi (2) und Faraday bestätigt, von Einzelnen weiter verfolgt wurden, veranlaßten deutschen Naturforscher zu einer neuen Untersuchung, in welcher sich das diamagnetische oder auch magnetische Verhalten der Gase unzweideutig herausstellte (3), überdies im Wesentlichen von Plücker (4) bestätigt. Faraday ließ die Gase aus einem gebogenen Rohr in der Mitte zwischen den Polflächen ausströmen, aufwärts, wenn sie leichter, abwärts, wenn sie schwerer als die Luft waren.

(1) Pogg. Ann. LXX, 39. — (2) Pogg. Ann. LXX, 286; I [3] XXXI, 421; Instit. 1848, 8. — (3) Phil. Mag. [3] XXXI, 40 Ann. LXXXIII, 276; Instit. 1848, 13. 24. — (4) Pogg. Ann. 571. 579.

che Luft waren. In dem Ausflusrohrre befand sich etwas
 elspapier mit Salzsäure befeuchtet; drei beiderseits offene
 ffröhrren in der Aequatorialebene, die eine senkrecht
 m Gasstrom gerade gegenüber, die beiden andern links
 d rechts von der Axenlinie und etwas geneigt aufgestellt,
 e drei mit Stückchen Fließpapier versehen, welches in
 moniakflüssigkeit getaucht war, dienten dazu, die Rich-
 ig zu erkennen, welche der Gasstrom nahm. Schirmende
 ände von Glas umgaben das Feld der Beobachtung, um
 che Bewegungen zu verhüten. Ein aufwärts gesen-
 er Strom von Stickstoffgas z. B. ging direkt durch die
 ale Linie in die darüber gesetzte Fangröhre. Wurde
 : Magnet in Thätigkeit gesetzt, so erschienen Theile des
 stroms auch in den Seitenröhren. Ging der Strom an-
 gs etwas seitwärts der axialen Linie, so wurde er durch
 magnetische Action ganz in die zunächst liegende seit-
 ie Röhre gedrängt, indem er in äquatorialer Richtung
 gestossen wurde und sich also in atmosphärischer Luft
 magnetisch verhielt. Das nämliche Verhalten zeigten
 usserstoffgas, Kohlensäure, Kohlenoxyd, Stickstoffoxydul,
 kststoffoxyd, salpetrigsaures Gas, ölbildendes Gas, Stein-
 kohlengas, schwefligsaures, salzsaures, jodwasserstoffsäures
 s, Fluorkieselgas, Quecksilberdampf, Wasserdampf, Am-
 niak, Chlor, Jod und Brom. — Ein Sauerstoffstrom, der
 der Luft zwischen den Polen abwärts ging, wurde unter
 n Einfluss des Magneten der Axenlinie genähert; Sauer-
 ff verhält sich also in atmosphärischer Luft magnetisch.
 seinen Verbindungen mit Stickstoff scheint diese Eigen-
 aft noch wirksam zu sein, indem dieselben schwächer
 magnetisch zu sein scheinen als reines Stickstoffgas.
 dem Faraday die den Gasstrom umgebende Luft durch
 dere Gase ersetzte, fand er, dafs in Kohlensäure sich
 nosphärische Luft, Sauerstoff und Stickstoffoxyd magne-
 ch, dagegen Stickstoff, Wasserstoff, Steinkohlengas, ölbil-
 ndes Gas, Salzsäure, Ammoniak, Kohlenoxyd und Stickstoff-
 ydul diamagnetisch verhalten. Im Steinkohlengas war

Magnetismus
 als allgemeine
 Eigenschaft
 der Materie.

Magnetismus
als allgemeine
Eigenchaft
der Materie.

Luft, Sauerstoff und selbst Stickstoff magnetisch, im Wasserstoff sind Luft und Sauerstoff magnetisch, die übrigen Gase diamagnetisch.

Faraday erkannte, indem er an der Mündung der Ausflusssröhre einen schraubenförmigen Platindraht anbrachte, welcher durch den electrischen Strom beliebig erhitzt werden konnte, daß durch Erhöhung der Temperatur der Diamagnetismus der Gase gesteigert werden kann. Immer verhielt sich der heiße Strom in dem kälteren gleichartigen Mittel entschieden diamagnetisch. Aus dieser einzigen Thatsache erklären sich alle die von Zantedeschi, Faraday und Plücker an Flammen beobachteten und mannigfach variirten Erscheinungen. Steht die Flamme neben der axialen Linie, so wird sie durch den Magnetismus äquatorial fortgetrieben, in der Mitte zwischen beiden Polflächen wird die Flamme um so mehr zusammengedrückt, je mehr man jene Flächen einander nähert. Sie breitet sich in Form eines Fischeschwanzes aus und theilt sich zuletzt gabelförmig. Die Flamme dient nur dazu, das diamagnetische Verhalten des heißen Stromes sichtbar zu machen. An dem Rauchstrom eines glimmenden Wachstocks, eines Räucherkerzchens oder einer Terpenthinölflamme beobachtet man dieselben Erscheinungen in noch größerer Regelmäßigkeit. — Gelegentlich seiner Untersuchung über den Diamagnetismus der Gase beschreibt Plücker (1) einen Versuch, welcher ihm zu beweisen scheint, daß die Luft in der Nähe der Magnetpole durch die abstossende Kraft derselben verdünnt werde. Er brachte zwischen die Pole ein Gefäß von Messingblech, welches sich an die Polflächen dicht anschloß, so daß der Raum zwischen denselben vollkommen ausgefüllt wurde. Das Gefäß war überall luftdicht verschlossen, nur in der Mitte einer der beiden Seitenflächen war eine Glasröhre von 1^{mm} Durchmesser in horizontaler Richtung eingelassen. Durch einen in dieselbe gebrachten Alkoholtropfen aber war die innere

(1) Pogg. Ann. LXXIII, 579.

Luft gegen die äußere abgeschlossen. Wurde der Magnetismus durch 12 Grove'sche Elemente hervorgerufen, so bewegte sich in demselben Augenblick der Alkoholtropfen 3[—] weit nach der Oeffnung der Glasröhre hin, und er kehrte eben so rasch in die frühere Lage zurück, wenn die Kette geöffnet wurde.

Magnetismus
als allgemeine
Eigenschaft
der Materie.

Plücker (1) hat eine ihm eigenthümliche Methode angewendet, welche sowohl die Vergleichung der, gleichen Gewichtsmengen verschiedener Körper inwohnenden, magnetischen oder diamagnetischen Kräfte, als auch die Beobachtung der Veränderung dieser Kräfte mit wechselnder Temperatur gestattet. Ein Uhrglas wird mit der zu prüfenden Substanz gefüllt, mit einer aufgeschliffenen Glasplatte abgestrichen und verschlossen. Es wird in einen dünnen Ring von Messing eingesetzt, welcher an der einen Seite einer Wage hängt, an welcher sich aufer der Axe des Wagbalkens kein Eisen befindet. Das Uhrglas berührt die beiden abgerundeten Enden der Halbanker eines Electromagneten, jeden in einem einzigen Punkte. Ist es mit einer magnetischen Substanz gefüllt, so wird es nach Erregung des Magnetismus angezogen, legt man alsdann in die an dem andern Ende des Wagbalkens aufgehängte Schale feinen Sand oder Papier in kleinen Stückchen auf, bis das Uhrglas von den Halbankern abgerissen wird, so ist das Gewicht der zugelegten Masse das Maß für die jedesmalige magnetische Kraft. Das Uhrglas sammt dem Messingringe bildet für sich ein magnetisches System, welches auch dann noch, wiewohl in schwächerem Maße, angezogen wird, wenn es mit einer diamagnetischen Substanz gefüllt ist. Die Abnahme der Anziehung giebt in einem solchen Falle das Maß des Diamagnetismus der eingefüllten Substanz. — Die magnetischen und diamagnetischen Körper wurden in das Uhrglas entweder in Lösung, oder in Pulverform mit Schweineschmalz zu einer homogenen Masse gemischt, eingefüllt. Man konnte auf

(1) Pogg. Ann. LXXIV, 321; LXXV, 177; Arch. ph. nat. IX, 308.

Magnetismus
als allgemeine
Eigenschaft
der Materie.

diese Weise das Verhältniß der magnetischen gleiche Gewichte oder für die Aequivalentgewicht vorausgesetzt, daß man die magnetische Substanz so dicht anwandte, daß die magnetische Erde Theilchens auf die eines benachbarten einen Einfluß äußern konnte; denn nur in diesem Fall Totalanziehung im Verhältniß der Anzahl der Moleküle stehen. Die Totalanziehungen des Magneten vier Lösungen von Eisenchlorür, in welchen sie gegen der gleichmäßig vertheilten magnetischen wie 8 : 4 : 2 : 1 verhielten, standen ganz in gleichen Zahlenverhältniß, so daß hier offenbar eine Inductionswirkung stattgefunden hatte. Wenn Eisenstaub, welcher zuerst rein, dann in einer Mischung in's Uhrglas eingefüllt wurde, bewies Inductionswirkungen, wo sie stattfinden, die Totalanziehung vermindern, vorausgesetzt, daß die Schale je die Pöflächen beider Halbkugeln berührt. Aus den Resultaten (1) wählen wir nur einige aus :

Magnetische Anziehung bei gleichem Gewicht

Eisen	100000	Eisenoxyd in salpeters.
Magneteisenstein	40227	„ „ salzs.
Eisenoxyd I.	500	„ „ schwefel
Eisenoxyd II.	286	Eisen in schwefels. Eisen
Eisenoxydhydrat	156	Nickeloxydul
Eisenvitriol	78	Nickeloxydulhydrat .
Salpeters. Eisenoxyd (gesätt.)	34	Manganoxydhydrat .
Salzsäure	98	Manganoxydoxydul .
Schwefelsäure	58	Mangan im Oxydoxydul

Die Ungleichheit der Werthe für das auf dem Weg dargestellte Eisenoxyd beweist hinlänglich die Schwankende dieser Versuchsergebnisse. Plückte man jene Ungleichheit einem Gehalt an Oxydul zu, ist noch ungewiß, welche Zahl er, als dem reinen entsprechend, ansehen soll. — Da man die Menge einer chemischen Verbindung entweder der V

oder auch nur dem einen im reinen Zustande magnetischen Bestandtheile zurechnen kann, so sind hiernach die in obiger Tafel enthaltenen, z. B. für das Eisenoxyd und das Eisen in Salzlösungen berechneten, Magnetkräfte zu verstehen. Als besonders beachtungswerth hebt Plücker hervor, dafs in den Salzlösungen durch Hinzutreten der Säuren zu dem Oxyd der ursprüngliche Magnetismus des letzteren nicht geschwächt ist, dafs der Magnetismus des Nickeloxyduls durch das hinzutretende Hydratwasser ungefähr auf das Vierfache verstärkt wird, dafs bei dem Mangan das Oxydoxydul, welches durch Glühen des Oxydhydrats entsteht, ähnlich, wie bei den entsprechenden Verbindungen des Eisens, bedeutend stärker magnetisch ist, als das Hydrat.

Magnetismus
als allgemeine
Eigenschaft
der Materie.

Diamagnetische Abstofsung

	bei gleich. Volum	bei gleich. Gewicht		bei gleich. Volum	bei gleich. Gewicht
Wasser	100	100	Gesätt. Lös. v. gelbem		
Alkohol I. (0,813) . .	93	114	Blutlaugensalz . .	86	70
Alkohol II. (0,861) . .	122,5	143	Gereinigtes Kochsalz,		
Schwefeläther	93	127	gepulvert	—	79
Schwefelkohlenstoff . .	129	102	Wismuthoxyd, gepulv.	—	35
Schwefelsäure	64	34	Schwefelblüthe	—	71
Salzsäure	114	102	Terpenthinöl	107	123
Salpetersäure	71	48	Quecksilber	314	23
Geschlagenes Ochsenblut	122,5	—	Phosphor	172	100

Es ist schwer einzusehen, wie Plücker bei dieser Art von Versuchen und diesen Resultaten dem Gedanken Worte leihen mochte, dafs unter den Zahlen der letzten Columnne obiger Tafel einfache Verhältnisse herrschen.

Es galt bis auf die neuere Zeit als eine ausgemachte Thatsache, dafs der Magnetismus der Stahlmagnete durch die Weissglühhitze vollständig zerstört werde, und dafs auch das Eisen bei dieser Temperatur der Anziehung des Magneten nicht mehr folge. Nach Pouillet sollte zwar Kobalt bei der höchsten Temperatur magnetisch bleiben, dagegen Chrom etwas unter der Rothglühhitze, Nickel bei 350°, Mangan bei 25—20° unter Null aufhören, magnetisch zu sein. Neuerdings hat indessen Faraday durch Versuche

Magnetismus
als allgemeine
Eigenschaft
der Materie.

mit kräftigen Electromagneten gefunden, daß auch das weißglühende Eisen und das weit über 350° erhitze Nickel noch der magnetischen Anziehung folgen, und Plücker (1) hat das Verhalten der magnetischen und diamagnetischen Kräfte bei wachsender Temperatur einer näheren Untersuchung unterworfen. Eine Porzellanschale, welche ganz nach der oben beschriebenen Weise an der Wage über den beiden Halbankern aufgehängt war, wurde mit der Substanz gefüllt, erhitzt und während des Erkaltes wiederholt die Gewichte bestimmt, welche zum Abreißen erforderlich waren, während die Temperaturen an einem in die Substanz eintauchenden Thermometer abgelesen wurden. Die Versuche mit Nickel erstreckten sich über die Temperaturen von 340° bis 32° ; die mit Wismuth von 311° bis 148° . Diese Metalle können als Typen des Verhaltens der magnetischen Körper gelten. Die Curve, in welcher die Temperaturen zu Abscissen, die Intensitäten zu Ordinaten genommen sind, ist für das Nickel in höheren Temperaturen convex gegen die Abscissenaxe und hat dieselbe zur Asymptote, womit also weder ein absolutes Verschwinden des Magnetismus, noch ein Uebergehen in Diamagnetismus vereinbar ist. Bei 350° ist die magnetische Kraft des Nickels wenigstens 35mal geringer als bei 50° . Am raschesten nimmt der Magnetismus zwischen 225° und 300° ab; bei 275° hat die Curve einen Wendepunkt und ist also in niederen Temperaturen concav gegen die Abscissenaxe. Die diamagnetische Curve des Wismuths ist der vorigen sehr ähnlich, nur fällt die rasche Abnahme der Kraft hier noch zwischen engere Grenzen, zwischen 245° und 255° .

Faraday glaubte aus seinen Versuchen schließen zu dürfen, daß durch gehörige Mischung magnetischer und diamagnetischer Substanzen vollkommen neutrale Körper hergestellt werden können; Plücker (2) ist dagegen durch seine Beobachtungen zu entgegengesetzten Schlüssen ge-

(1) Pogg. Ann. LXXV, 177. — (2) Pogg. Ann. LXXII, 243; LXXIII, 617; LXXIV, 362; LXXV, 413.

führt worden. Ein Stück Kohle stellte sich zwischen den beiden möglichst genäherten Polspitzen äquatorial, dagegen Magnetismus als allgemeine Eigenschaft der Materie. axial, wenn die Pole weiter von einander entfernt wurden. Bei einer gewissen Stellung der Pole richtete sich die Kohle axial, wenn der Strom durch ein Grove'sches Element erregt wurde; es nahm eine bestimmte Mittellage an, unter einem Winkel von 40° gegen die Axe, bei Anwendung von drei Elementen; es richtete sich bei sieben Elementen entschieden äquatorial. Ein Stück Wismuth an der Wage in einem Abstand von $3,5^{\text{mm}}$ in's Gleichgewicht gebracht, wurde, wenn der Magnetismus durch 8 Tröge erregt war, diamagnetisch abgestoßen, bei Erregung durch 4 Tröge magnetisch angezogen; bei Anwendung eines einzigen Troges war die magnetische Kraft bedeutend stärker. Plücker folgert hieraus, daß der Diamagnetismus bei wachsender Kraft des Electromagneten rascher zunimmt, als der Magnetismus, und er hält es hierbei für völlig gleichgültig, ob die Zunahme der Intensität aus der Anwendung von mehr Elementen oder aus größerer Annäherung an die Pole hervorgehe. Sind diese Resultate vollkommen begründet, so kann es einen absolut neutralen Körper allerdings nicht geben; ein Körper, welcher sich in einem bestimmten Abstände neutral verhält, ist dann in größerer Entfernung magnetisch, in kleinerer diamagnetisch.

Die folgenden Versuche von Poggendorff und Weber (1) haben bewiesen, daß diamagnetische Abstofsung auch durch den galvanischen Strom ohne Dazwischenkunft von Eisen bewirkt werden kann; sie bieten zugleich ein Mittel, die diamagnetische Kraft auf ein absolutes Maß zu reduciren. Es wurde zu diesen Versuchen eine Drahtrolle benutzt, welche, eigentlich zu andern Zwecken bestimmt, nicht gerade die vortheilhaftesten Bedingungen für die diamagnetischen Beobachtungen vereinigte. Ein Kupferdraht, Eine par. Linie dick und drei Centner schwer, war um eine Holzrolle von 600^{mm} innerem Durchmesser und 200^{mm}

(1) Berl. Acad. Ber. 1848, August; Instit. 1849, 60.

Magnetismus
als allgemeine
Eigenschaft
der Materie.

Länge gewickelt, so daß die innerste Windung 19^{mm} äußerste 2350^{mm} Umfang hatte. An einem Bünd dreher Seidenfäden war im Innern der Rolle Wismuthstab von 308,6 Grm. Gewicht, 14^{mm} Durchmesser und 210^{mm} Länge so aufgehängt, daß er mit der Elektrodrahtwindungen, welche dem magnetischen Meridian parallel liefen, einen Winkel von 45° bildete. Das Ende des Stabes trug einen ebenen Spiegel, in welchem mittelst eines Fernrohrs das Bild einer 2340^{mm} entfernten Scale beobachtete. Nachdem man die Schwingungen der Nadel einige Zeit beobachtet und hatte, daß die Gleichgewichtslage, auch abgesehen von magnetischen Einflüssen, veränderlich war, wurde sie mit 24 Grove'schen Elementen, worin das Platin mit tinirtem Blei vertauscht und die Salpetersäure mit starkem Zusatz concentrirter Schwefelsäure versetzt in Verbindung gesetzt und so lange darin erhalten, bis der Wismuthstab zwei Schwingungen vollendet hatte. In der zweiten und dritten Schwingung war die Kette der beiden nächsten Schwingungen war die Kette und so abwechselnd weiter fort. Das Mittel aus diesen Versuchen ergab eine Annäherung der Gleichgewichtslage des Wismuthstabes an die Ebene der Drahtwindung 44,545 Scalentheilen oder 0°32', womit die diamagnetische Wirkung des galvanischen Stroms unzweideutig war. — Die Schwingungsdauer des Stabes betrug sein Trägheitsmoment, wenn man den Millimeter Milligramm zur Einheit nimmt, $k = 1.176.000.00$ nach die Richtkraft der Nadel $D = \frac{\pi^2}{4} k = 411$ die ablenkende Kraft des Stromes $F = \frac{44,545}{4694} D$: (2347 Scalentheile betrug der Abstand des Spiegels der Scala). — Diese ablenkende Kraft ist gleich dem Product aus dem diamagnetischen Moment M des Stabes, mal dem Sinus des Winkels φ , den er mit der Rolle bildet, multiplicirt mit dem Wirkungsmoment des galvanischen Stromes auf einen Körper im Mi-

der Rolle, mal dem Cosinus des Winkels φ . — Es ist aber Magnetismus als allgemeine Eigenschaft der Materie.

$\Gamma = \frac{2G}{R^2}$, wenn G das galvanische Moment des Stromes, R den Halbmesser der Rolle bedeutet, und da $R = 340^{\text{mm}}$, und G nach der bekannten Methode mittelst Ablenkung einer Magnetnadel $= 1.170.000.000.000$ gefunden wurde, so ist $\Gamma = 596$ und aus der Gleichung $\Gamma A \sin \varphi \cos \varphi = 3903$ berechnet sich $A = 13,1$. Der Einheit des galvanischen Momentes entspricht daher das diamagnetische Moment $\delta = \frac{13,1}{596} = 0,022$ und auf die Gewichtseinheit Wismuth kommt

daher ein Moment $= \frac{1}{14.000.000}$, während 1^{er} stark magneti-

sirten Stahles ungefähr 400 magnetische Einheiten enthält. Ist die horizontale Composante des Erdmagnetismus $= 1,84$, so erzeugt diese in der Gewichtseinheit Wismuth eine diamagnetische Kraft ungefähr 3000 Mill. mal schwächer, als die magnetische Kraft der Gewichtseinheit stark magnetisirten Stahles.

Faraday hatte zwar die Ansicht ausgesprochen, daß die Erregung des Diamagnetismus auf der Induction electrischer Ströme beruhen müge; das dem Anscheine nach gänzliche Fehlen der Polarität der diamagnetischen Körper veranlaßte ihn jedoch, jene Idee zur Seite zu legen. Erst nachdem Reich (1) nachgewiesen hatte, daß diamagnetische Substanzen zwar von beiden Polen eines Magneten, einzeln genommen, abgestoßen werden, daß bei vereinter Anwendung beider Pole aber nur der Unterschied ihrer Kraft wirksam bleibt, kam Weber (2) auf die oben erwähnte Ansicht Faraday's über den Ursprung des Diamagnetismus zurück, und es gelang ihm, die erste Consequenz jener Ansicht, nämlich die Polarität der diamagnetischen Körper, auf folgende Weise darzuthun. Er stellte ein Stück Wismuth in der Ebene auf, welche eine symmetrisch magnetisirte, an einem Coconfaden aufgehängene

(1) Pogg. Ann. LXXIII, 60; Phil. Mag. [3] XXXIV, 127; Instit. 1849, 119. — (2) Pogg. Ann. LXXIII, 241.

Magnetismus
als allgemeine
Eigenchaft
der Materie.

kleine Magnetnadel rechtwinklig halbirte, so daß die Pole der Nadel auf den diamagnetischen Zustand des entfernten Wismuthstücks keinen merklichen Einfluß hatten, stellte alsdann einen starken Hufeisenmagneten so auf, daß der Ort, welchen vorher das Wismuth einnahm, in den freien Raum zwischen seinen beiden Polen zu liegen kam und die magnetische Axe die Nadel halbirte. Das durch den Hufeisenmagneten hervorgerufene Drehungsmoment wurde durch einen andererseits angebrachten Magnetstab gerade compensirt, so daß die Nadel der Einwirkung des Erdmagnetismus frei folgen konnte. Wurde nun das Wismuthstück zwischen die Pole eingesenkt, so wurde augenblicklich die Nadel abgelenkt, kehrte man die Pole der Magnete deren Wirkungen auf die Nadel sich compensirten, um, brachte das Wismuth an derselben Stelle und in der nämlichen Lage nun die entgegengesetzte Ablenkung hervor. Vertauschte man das Wismuth mit Eisen, so waren die Ablenkungen unter denselben Umständen gerade die entgegengesetzten. Auch Poggendorff (1) und Plücker (2) haben Versuche beschrieben, welche dazu dienen, die Polarität der diamagnetisirten Körper nachzuweisen. Poggendorff empfiehlt unter anderem, ein Wismuthstäbchen zwischen den Polen eines Electromagneten innerhalb eines cylindrischen Drahtgewindes aufzuhängen, dessen Axe äquatorial gerichtet ist. So lange der Electromagnet außer Thätigkeit ist, wirkt ein durch das Drahtgewinde gehender Strom nicht auf das Wismuth; dagegen beobachtet man eine Ablenkung zur Linken oder Rechten, je nach der Richtung des Stromes, sobald der Electromagnet wirksam ist. Der Wismuthstab ist also unter diesen Umständen in der äquatorialen Lage transversal magnetisch, so daß den Polen des Electromagneten die gleichartigen im Wismuth zunächst liegen.

Eine eigenthümliche Wirkung der Magnetpole auf die Körper von organischem Gefüge, sowie auf die optisch

(1) Pogg. Ann. LXXIII, 475. — (2) Pogg. Ann. LXXIII, 618.

1- und zweiaxigen Krystalle ist von Plücker (1) entdeckt worden. Die Körper mit organischer Textur stellen die Axe ihrer organischen Ausbildung, wie z. B. die Richtung der Holzfaser etc., äquatorial. Versuche mit Turmalin, mit Doppelspath, Bergkrystall, Zirkon, Beryll, Smagad, Idokras und Korund bewiesen das Vorhandensein einer abstofsenden Wirkung, welche gegen die optische Axe dieser einaxigen Mittel gerichtet ist und sich allemal äußert, wenn sie nicht durch eine überwiegende magnetische Anziehung verdeckt wird. Versuche mit Glimmer, welcher sich magnetisch, und mit Topas und Zucker, welche sich diamagnetisch verhalten, gaben eine gleiche Abstofung auf die Axen der optisch zweiaxigen Mittel zu erkennen. Bei brasilianischem Topas, Arragonit, Salpeter, Glaubersalz etc., welche diamagnetisch sind und in Säulen krystallisiren, deren Axe mit der optischen Mittellinie zusammenfällt, trägt der Diamagnetismus sowohl, als die Axenabstofung zur äquatorialen Stellung bei; doch erkannte Plücker das Vorhandensein der letzteren an der Verschiedenheit der Drehungsmomente, welche sich kundgab, je nachdem der Faden der Aufhängung senkrecht auf der Ebene der optischen Axen stand, oder in dieser Ebene in die Richtung der Mittellinie oder der Supplementarlinie fiel. Plücker hat an einem Staurolithkrystall gezeigt, wie man an einem völlig undurchsichtigen Krystalle, dessen äußere Form gänzlich verwischt ist, die Lage der optischen Axen mit Hilfe des Magneten auffinden kann. — Derselbe fand ferner (2), daß rasch gekühlte Glaszylinder sich zwischen den Magnetpolen wie ein einaxiger Krystall verhalten, wobei die Axe des Cylinders die Stelle der optischen Axe einnimmt. Oersted (3) hat in einer Untersuchung über den Diamagnetismus mehrere der früher bekannten Resultate bestätigt, insbesondere die Beobachtung Plücker's, daß

Magnetismus
als allgemeine
Eigenschaft
der Materie.

(1) Pogg. Ann. LXXII, 815. — (2) Pogg. Ann. LXXV, 108. —
(3) Ann. ch.-phys. [3] XXIV, 424; Pogg. Ann. LXXV, 445; Instit. 1848,
326, weidläufiger 1849, 92; Arch. ph. nat. X, 49; Phil. Mag. [3] XXXIV, 81.

Magnetismus
als allgemeine
Eigenschaft
der Materie.

die nämlichen Körper, welche zwischen den hinlänglich genäherten Polen sich äquatorial richten, die axiale Stellung annehmen, wenn sie über die Axenlinie gehoben oder unter dieselbe herabgesenkt werden, oder wenn auch nur die Pole weit genug von einander entfernt werden. Oersted gibt an, daß diamagnetische Wirkungen auch an solchen Körpern wahrgenommen werden, welche ihrer ganzen Masse nach von den Polen angezogen werden, also an solchen, welche seither als magnetische bezeichnet wurden. Oersted will demnach die diamagnetischen Körper in angezogene und abgestoßene eintheilen; von den ersteren giebt er an, daß sie in der Nähe einer Polkante sich derselben parallel richten, daß die Vertheilung der magnetischen Kräfte in ihnen transversal sei, wie bei den diamagnetischen Körpern überhaupt, jedoch mit dem Unterschied, daß die Pole der Nadel den entgegengesetzten des Electromagneten zunächst liegen.

Die Theorie des Diamagnetismus ist begreiflicherweise noch nicht ausgebildet. Weber (1) hat die Ansicht, daß die Erregung des Diamagnetismus auf Molecularströme beruhe, einer experimentellen Probe unterworfen. Sind nämlich in den diamagnetischen Körpern die Ampère'schen Ströme vorhanden, welche unter dem Einfluß eines starken Magneten bewegt oder gedreht werden, so muß von ihnen im Augenblick dieses Vorgangs in benachbarten Leitern ein Strom inducirt werden, der freilich äußerst schwach ausfallen muß und nur beobachtet werden kann, wenn die Kraft des starken Magneten constant ist, damit von ihm keine störende Inductionswirkung ausgeht. — Auf die kreisförmige Endfläche eines geraden Eisenkernes ward eine Inductionsrolle aus einem 300 Meter langen Kupferdraht gesetzt, welche einen Raum von 140^{mm} Länge und 15^{mm} Weite umschloß. Ein Stab von reinem Wismuth paßte in diesen Raum und wurde, nachdem der Eisenkern in eine möglichst constante Thätigkeit gesetzt war, abwechselnd

(1) Pogg. Ann. LXXIII, 247.

eingesenkt und herausgezogen, während der Commutator, ^{Magnetismus als allgemeine Eigenschaft der Materie.} nach welchem die Enden der Inductionsrolle hingen, jedesmal gewechselt wurde; in demselben Commutator endigten die Drähte eines empfindlichen Galvanometers. Bei einer zweiten Versuchsreihe erhielt der Commutator beim Einsenken und Herausziehen des Wismuthstabes gerade die umgekehrte Stellung wie vorher; in einer dritten wieder die nämliche Stellung, wie in der ersten Reihe u. s. f. Die Vergleichung des Mittelwerthes der zweiten bis sechsten Reihe mit dem Mittel aus der unmittelbar vorhergehenden und nachfolgenden ergibt folgende Resultate :

$$2. \quad 514,02 = 516,82 - 2,80$$

$$3. \quad 518,72 = 515,53 + 3,19$$

$$4. \quad 517,04 = 520,36 - 3,32$$

$$5. \quad 522,00 = 518,47 + 3,53$$

$$6. \quad 519,90 = 525,43 - 5,53$$

wonach die Induction eines Stromes durch das Wismuth außer Zweifel gestellt ist, da die Mittelwerthe für die eine Stellung des Commutators durchgängig gröfser ausfallen, als für die andere. Gegenversuche mit einem Eisenstäbchen zeigen, dafs Wismuth und Eisen unter gleichen Umständen entgegengesetzte Ströme induciren, woraus folgt, dafs auch die Molecularströme im Wismuth denen im Eisen entgegengesetzt sind. Der Grund, warum diese Ströme in den diamagnetischen Körpern in anderer Richtung gedreht werden, als in den magnetischen, bleibt freilich noch dunkel. Weber glaubt, dafs, wenn man seither nur an bereits vorhandene Molecularströme gedacht habe, welche bei der Induction gleiche Richtung erhalten, man zur Erklärung der diamagnetischen Erscheinung die Erregung von Molecularströmen annehmen könne, welche, einmal erregt, fort-dauern, bis sie in Folge neuer entgegengesetzter Induction aufgehoben werden.

Zantedeschi (1) theilt mit, 1) dafs der Magnetismus in der unorganischen Natur viel verbreiteter sei, als Fara-

(1) Instit. 1848, 102.

Magnetismus
als allgemeine
Eigenschaft
der Materie.

day angenommen; 2) dafs alle organischen Körper magnetisch sind; 3) dafs die Repulsion zwischen den Cülen auf dem Diamagnetismus, 4) die Attraction zwischen denselben auf dem Magnetismus beruhe, dafs also chemische Verbindungen zwischen magnetischen Elementen viel seltener sein müssen, als zwischen diamagnetischen.

Eine Abhandlung von de Haldat (1) verbreitet über die Universalität des Magnetismus.

Electricität.

Leitungsver-
mögen der
Flamme.

Es ist eine alt bekannte Erfahrung, dafs die Flamme eine die Electricität zerstörende Eigenschaft besitzt. Man beschäftigt sich mit electrischen Versuchen, benutzt diese Eigenschaft, um Harzplatten, Glas und Schellackstücke von anhaftender Electricität zu befreien. Ueber die Ursache dieses Verhaltens haben jedoch die Bemühungen ausgezeichneter Physiker seit mehr als 100 Jahren her nur wenig festgestellt: dafs die Flamme eine sehr grofse Leitfähigkeit für die Electricität besitzt, die sich nicht blofs aus der Temperaturerhöhung der Luft, noch aus einem Leitungsvermögen der heifsen Luft der Flamme beigemessen, noch aus der Luftströmung oder einer Leitung der Electricität durch die aus der Flamme erhebenden flüchtigen Theile erklären läfst. Denn die erwähnten Einflüsse allein üben nur eine ableitende, so hohem Grade als die Flamme. Uebrigens bediente sich schon Volta der Flamme einer Blechlampe, um die Electricität aus der Luft zu ziehen und in seinem Condensator zu sammeln.

Vor einigen Jahren machte Rieffs (2) darauf aufmerksam, dafs die Wirkung der Flamme sich auf viel gröfser ausdehnen kann.

(1) Compt. rend. XXII, 739; Instit. 1846, 143; Ann. ch. [1] XIX, 113; Phil. Mag. [3] XXX, 319. — (2) Berl. Acad. Ber., Febr. 1847, auch Pogg. Ann. LXI, 543.

Entfernungen erstreckt, als der heisse Luftstrom sich erhebt, oder die Luft leitend machen kann, und nach Richtungen hin (z. B. seitwärts von der Flamme), nach welchen sich derselbe gar nicht bewegt. Er folgerte daraus, daß die Flamme nicht bloß durch directe Mittheilung, sondern auch durch Vertheilung (Influenz) wirksam ist, und versuchte hierauf die Wirksamkeit der Flamme auf diejenige der Spitzen zurückzuführen, wobei er von der Betrachtung ausging, daß der von der Flamme aufsteigende Strom heißer, die Electricität leitender Gase durch die zuströmende und eindringende kalte, also die Electricität nicht leitende Luft vielfach eingeschnitten und zerrissen werde, so daß sich Spitzen und gleichsam Fäden des leitenden Gases bilden, die sich unter dem Einflusse der kälteren Umgebung mehr und mehr verdünnen und allmählig in der Luft zerstreuen. Diese Zacken und Spitzen äußern nun ihren kräftigen, electricisch vertheilenden Einfluß nach allen Richtungen und auf beträchtliche Entfernungen hin, und bringen dadurch ganz die Wirkungen guter Leiter hervor.

Leitungsver-
mögen der
Flamme.

Bei Körpern, die nicht mit Flamme brennen, sondern bloß glimmen, wie Feuerschwamm, Lunte, glimmender Docht, Räucherkerzen, zeigt sich ebenfalls die Wirkung der Spitzen; aber Riefs beweist, daß dieselben in diesem Falle, wo sie nicht durch das Aufsteigen glühender Gase bedingt sein können, bei der Verbrennung an der Oberfläche des Körpers selbst entstehen. (1)

Mehrere Einwürfe, welche von van Rees (2) gegen die von Riefs gegebene Erklärungsweise erhoben worden waren, führten in den zwei letzten Jahren zu einem wissenschaftlichen Streite zwischen beiden Physikern, der von dem letzteren siegreich durchgeführt wurde und nicht wenig beigetragen hat, die Wahrscheinlichkeit seiner Erklärung zu erhöhen (3).

(1) Pogg. Ann. LXI, 558. — (2) Het institut of verslagen etc. 1846, 62. — (3) Pogg. Ann. LXXI, 568; LXXIII, 41. 307; LXXIV, 379. 580.

Isolirmittel.

Nach Mittheilungen Matteucci's (1) vermindern trockne Gase schon bei dem Unterschiede von -10 zu $+2$ um ein Merkliches ihre isolirende Eigenschaft.

Auch Schellack und Schwefel sollen schon bei $25-30^\circ$ anfangen, die Electricität zu leiten.

Riefs (2) hat bemerkt, daß Schellackstiele, frisch fertig, schon nach einigen Tagen die Electricität wenig gut zurückhalten, als gleich anfangs. Es ist die Folge des Einflusses der Atmosphäre und anderer nicht auszuschließender Agentien auf die Oberfläche des Schellacks. An die Benutzung der Stiele, das wiederholte Ziehen derselben durch die Spitze der Spiritusflamme, um sie unelectrisch zu machen, wirkt dahin, ihre Verschlechterung zu beschleunigen. Solche untauglich gewordene Stiele lassen sich durch Waschen mit Alkohol wieder in vollkommen brauchbaren Zustand versetzen. Sie werden zu dem Ende in starkem Alkohol (spec. Gewicht 0,81) leicht genäßt, in einem leinenen Tuche abgerieben, durch eine Flamme geführt und in einer Glasglocke dem Trocknen überlassen.

Um eine gute Isolirung zu erhalten, war man bisher ausschließlich auf das Schellack beschränkt, da Glas selbst Seide vermöge ihrer Eigenschaft, die Luftfeuchtigkeit anzuziehen, sehr leicht leitend werden. Nun hat Faraday im verflossenen Jahre (1848) die Aufmerksamkeit der Physiker auf das hohe Isolirungsvermögen der Gutta Percha gelenkt, welches dieselbe nicht nur unter gewöhnlichen Umständen besitzt, sondern auch bei atmosphärischen Zuständen behält, welche die Oberfläche des Glases zu einem guten Leiter machen. Ein gutes Stück Gutta Percha isolirt ebenso vollkommen wie Schellack, mag es die Form einer Tafel eines Stabes oder Fadens besitzen. Dabei ist es zäh biegsam in der Kälte, weich in der Wärme und deshalb dem spröden Schellack in vielen Fällen vorzuziehen. In der Form von Streifen und Schnüren bildet die G

(1) Compt. rend. XXV, 324. 985. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 87
(3) Phil. Mag. [3] XXXII, 165; Pogg. Ann. LXXIV, 154.

Percha ein vortrefflich isolirendes Aufhängemittel, und in Platten liefert sie die zweckmäfsigsten isolirenden Unterlagen. Für die Stiele der Goldblattelektrometer bildet sie vortrefflich isolirende Stöpsel, wenn sie in Röhren eingeschlossen werden; gröfsere Stöpsel geben gut isolirende Fütterungen für temporäre electrische Vorrichtungen. Cylinder von einem halben Zoll und mehr im Durchmesser besitzen grofse Steifheit und bilden vortrefflich isolirende Stützen. Wegen dieser guten Isolation ist sie ferner un-^{Isolirmittel.} gemein geeignet zur Erregung negativer Electricität.

Die käufliche Gutta Percha ist nicht alle gleich gut isolirend. Wenn man indefs ein leitendes Stück in einem Strome heifser Luft oder in einem Glase über der Spiritusflamme erwärmt, ausstreckt, faltet und einige Zeit zwischen den Fingern knetet, wie wenn man darin befindliche Feuchtigkeit ausdrücken wollte, so wird es ein eben so guter Isolator als das beste.

Einen nicht geringeren Grad der Isolation als Gutta Percha besitzt das Collodion, nämlich der aus der ätherischen Auflösung von Schiefsbaumwolle durch Abdunstung zurückbleibende Stoff. Wird die klare Auflösung über eine beliebige Glasfläche ausgebreitet, so bleibt nach gänzlicher Verflüchtigung des Lösungsmittels eine durchsichtige Haut zurück, welche schon durch einmaliges Darüberfahren mit der Hand, aber noch wirksamer durch Reiben mit Wolle, negativ electrisch wird, und diese electrische Beschaffenheit hartnäckig behauptet. Sie ist hinsichtlich ihrer chemischen Beschaffenheit mit dem zuerst von Schönbein (1) dargestellten electrischen Papier identisch. Ballons aus Collodion (vergl. bei diesem) eignen sich vorzüglich zur Anstellung der electrischen Grundversuche über Anziehung und Abstofsung.

Vor einigen Jahren hat Rieffs electrische Messungen^{Electrometrie.} bekannt gemacht (2), die er an der Coulomb'schen Drehwaage erhalten hatte. Schon damals machte er darauf auf-

(1) Pogg. Ann. LXVIII, 159. — (2) Berl. Acad. Ber., Febr. 1844.

Electrometrie. merksam, dafs die Handhabung dieses wichtigen Instrumentes (welches seit Coulomb nur wenig aber von Vielen wegen mancherlei Unvollkommenheiten getadelt worden ist) keineswegs so schwierig, und Erzielung brauchbarer und übereinstimmender Resultate demselben durchaus nicht so ungewifs sei, als Vieler und häufig wohl auch schlechte Ausführung des Apparates dieselbe in den Augen vieler Physiker haben erlauben lassen. In einem belehrenden Aufsatz: »Ueber Bestimmung electrischer Dichtigkeiten in der Torsionswaage« kommt er neuerdings und ausführlicher auf diesen Stand zurück. Er verbreitet sich über die verschiedenen anzuwendenden Bestimmungsmethoden und die dabei erforderlichen Rechnungen, und zeigt den Grad der Zuverlässigkeit jeder einzelnen derselben; er erörtert die verschiedenen Fehlerquellen und Vorsichtsmafsregeln, welche das Gelingen der Versuche sichern und wodurch die mancherlei Fehler von welchen die mehr oder weniger rasche Zerstreuung der Prüfungskörpern mitgetheilten Electricität abhängt nicht ganz beseitigt, doch ihren Ursachen nach erkannt in Rechnung gezogen werden können. Eine sehr vollständige mit Abbildungen begleitete Beschreibung der vorgetragenen Torsionswaage gewährt die Möglichkeit nach ähnliche Instrumente überall ausführen zu lassen.

R. Kohlrausch (2) in Rinteln giebt eine ausführliche Beschreibung eines von ihm nach Oersted's (1) und Dellmann's (4) Construction ausgeführten, je nach mehreren Punkten verbesserten Electrometers, welches dasselbe, ohne die Eigenschaft zu verlieren, ein sehr empfindlicher Anzeiger der Electricität zu seyn, zugleich ein wirkliches Meßwerkzeug geworden ist. Dieser Apparat ist im Grunde nichts anders als eine Drehwaage; er

(1) Berl. Acad. Ber. 1847, 148; Pogg. Ann. LXXI, 359. — Ann. LXXII, 358; LXXIV, 499. — (2) Pogg. Ann. LIII, 612. — Ann. LV, 301.

cheidet sich aber von der gewöhnlichen Coulomb'schen Electrometrie.
 Drehwaage dadurch, daß er mehr geeignet ist, Electricitäten
 von geringer Spannung, die aber in großer Menge zur
 Verfügung stehen, z. B. die Spannung an den Polen gal-
 vanischer Säulen, zu messen, während jene vorzuziehen ist,
 die Wirkungen sehr kleiner Electricitätsmengen bei großer
 Dichtigkeit derselben zu messen. Die nähere Einrichtung
 dieses Apparats läßt sich ohne Zeichnung nicht verständlich
 machen.

Kohlrausch (1) verbindet mit demselben einen Condensator.
 eigenthümlich construirten, in der Ausführung allerdings
 zwar ziemlich zusammengesetzten, übrigens, wie es scheint,
 zur Erzielung vergleichbarer Resultate gut geeigneten und
 daher brauchbaren Condensator, mit dessen Hülfe es ihm
 gelungen ist, die electricischen Spannungen einfacher Volta'-
 scher Ketten fast mit derselben Genauigkeit zu messen,
 mit der sich ihre electromotorischen Kräfte bestimmen lassen.
 Die electricische Spannung der offenen Volta'schen Säule
 bei allmählig veränderter Anzahl der Glieder fand Kohl-
 rausch sehr genau proportional der Zahl verwendeter
 Glieder (2). Auch hat er die electricische Spannung ver-
 schiedener geschlossener constanter Ketten im Augenblicke
 des Oeffnens gemessen und mit der gleichzeitigen ebenfalls
 gemessenen electromotorischen Kraft verglichen. Er fand,
 wie vorauszusehen, zwischen beiden Versuchsreihen die
 vollkommenste Proportionalität (3).

Kohlrausch empfiehlt, um die Platten des Conden-
 sators außer leitender Verbindung zu erhalten, das alte,
 schon von Volta angegebene Verfahren einer Trennung
 nur durch drei isolirende Punkte. Zu dem Ende erhalten
 beide Platten je an drei correspondirenden Stellen von ge-
 ringem Umfange, in der Nähe des Randes, einen Anstrich
 von Schellackfirniß. An den drei Stellen der unteren
 Platte werden dann dünne Stückchen Schellack durch Er-

(1) Pogg. Ann. LXXV, 88. — (2) Pogg. Ann. LXXV, 94. —
 (3) Pogg. Ann. LXXV, 220.

Condensator. hitzen der Platte von Unten angeschmolzen und nach dem Erkalten mittelst eines sehr scharfen Messers so weit erforderlich geebnet. Die Einrichtung muß so getroffen sein, daß beide Platten immer genau an denselben Stellen übereinander zu liegen kommen, und daß die obere genau parallel von der unteren abgehoben werden kann. Bei dieser Anordnung liefs sich nach Kohlrausch die condensirende Kraft bis ungefähr auf das 260fache derjenigen Electricitätsmenge steigern, welche die Collectorplatte entfernt von der Condensatorplatte aus derselben Quelle aufzunehmen vermochte.

Um die Theorie des Condensators zu vervollständigen, hat Rieffs (1) eine sehr gründliche experimentelle Arbeit ausgeführt. Die Geräthschaft, deren er sich bediente, besteht aus zwei ebenen Messingscheiben 81,6 Par. Lin. im Durchmesser, $\frac{1}{4}$ ''' dick, mit abgerundeten Rändern. Sie sind auf dem Mittelpunkte einer Fläche mit cylinderförmigen halbkugelig geschlossenen Fortsätzen von $14\frac{1}{4}$ ''' Länge und $11\frac{1}{4}$ ''' Dicke versehen. Diese Fortsätze sind in der Axe durchbohrt, so daß darin ein Zuleitungscanal mittelst Klemmschraube befestigt werden kann, und haben winkelrecht zu ihrer Axe eine Höhlung, in welche ein $8''$ $\frac{1}{2}$ ''' langer, mit Schellack überzogener Glasstab gekittet ist. Mit Hülfe dieser Glasstäbe und geeigneter Fufsstücke sind die Scheiben auf einem Brette winkelrecht aufgestellt. Die eine, die Condensatorplatte, steht auf einem Charniere, durch das sie aus der vertikalen Lage bis unter das Fußbrett gedreht werden kann; die andere Scheibe, die Collectorplatte, steht auf einem Schlitten, der sich auf einem horizontalen, mit einer Eintheilung versehenen Prisma bewegt und daselbst beliebig festgestellt werden kann. Die freien Flächen der Scheiben konnten so in Berührung gebracht und in ihrer Centrallinie von einander entfernt werden; sie bilden also, entfernt von einander, einen condensirenden

(1) Pogg. Ann. LXXIII, 367; Berl. Acad. Ber. 1847, 465; Inst. 1848, 217.

Apparat, in welchem die isolirende Zwischenschicht aus Condensator. Luft besteht. Bei dem Gebrauche erhielt der Fortsatz der Condensatorplatte einen horizontalen Messingdraht, der in einer kleinen Kugel endigte, die in gut leitende Verbindung mit der Erde gebracht werden konnte. Nachdem die Collectorplatte Electricität erhalten hatte, wurde die Condensatorplatte heruntergeschlagen und dadurch die Condensirung, das heisst, die veränderte Anordnung der Electricität auf der ersten Platte, aufgehoben.

Ein Kupferdraht von $\frac{1}{4}$ '' Dicke und 8'' 5''' Länge, der in dem Fortsatze der Collectorplatte befestigt ist, führt zu einer Messingkugel von 7''' Dicke, die auf einem besonderen mit Schellack überzogenen Glasfusse ruht. Sie bildet das Ende des Zuleitungsdrahts der Collectorplatte. Wurde letztere alleinstehend oder gegenüber der Condensatorplatte mit Electricität beladen, so begann dieses Fluidum, je nach der Luftbeschaffenheit bei verschiedener Dichtigkeit der Ladung, aber zuerst immer von der Kugel aus in die Luft überzuströmen, so daß diejenige electricische Dichtigkeit auf der Kugel, wobei das Ausströmen eintrat, allemal das Maximum der Ladungsfähigkeit bezeichnete.

Auf die Collectorplatte wurde durch Berührung des äußersten Punktes der Kugel mit dem Knopfe einer geladenen Leidener Flasche Electricität übertragen (1), dann die electricische Dichtigkeit desselben Punktes der Kugel mit der Drehwage gemessen, zuerst wenn die Collectorplatte einzeln stand, dann bei verschiedenem Abstände der Condensatorplatte. Der allmähliche Electricitätsverlust während der Dauer dieser Versuche wurde auf die von Riefs in seiner Abhandlung über die Drehwage beschriebene Weise (2) in Rechnung gebracht.

So wurde z. B. gefunden, die Dichtigkeit bei entfernter Condensatorplatte der Einheit gleich gesetzt:

Entfernung der Platten	∞	50'''	20'''	15'''	10'''	5'''	4'''	3'''	2'''
Dichtigkeiten in d. Mitte d. Collectorplatte	1	0,897	0,683	0,595	0,492	0,335	0,286	0,235	0,173
am Rande	1	0,941	0,828	0,731	0,617	0,460	0,412	0,341	0,260

(1) Pogg. Ann. LXXIII, 388. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 366.

Condensator. Die jedesmalige Dichtigkeit in 1 dividirt giebt condensirende Kraft bei der betreffenden Entfernung. Dichtigkeit 0,173, welche in 1 ungefähr 6mal enthsagt aus, dafs die Collectorplatte bei 2''' Entfernung Condensatorplatte ungefähr 6mal so viel Electricitt nehmen kann, als wenn letztere zurckgeschlagen

Man sieht, dafs die Dichtigkeit, welche der Dichtigkeit umgekehrt proportional ist, in einem geringen Verhltnisse zunimmt, als die Entfernung, und zwar um so mehr der Fall, je grofter die Entfernung. Bei sehr geringer Entfernung wird sich daher die condensirende Kraft mehr umgekehrt verhalten, wie die Dichtigkeit der condensirenden Schicht.

Am Rande der Platte (wenn von diesem die Dichtigkeit der Electricitt entnommen wurde) zeigt sich fr verschiedene Abstnde berall eine groftere Dichtigkeit, als an der Mitte verbundenen Kugel. Die Verstrkungszahl des Condensators fllt daher geringer aus, wenn der condensirende electrische Krper am Rande, anstatt an der Mitte ausgehenden Zuleiter, angelegt wird. Die Lnge des Leitungsdrahtes, welcher Kugel und Fort verbindet, ist nicht ohne Einflufs. Riefs fand, dafs ein Draht von nur 3,5''' Lnge, anstatt des von 8'' 5' eingeschaltet, eine merklich bessere Condensation giebt. Bei noch lngeren Drhten kommt dieser vermehrte Einflufs der Lnge nicht mehr in Betracht.

Riefs hat auch die ansammelnde Kraft grofterer Condensatorscheiben verglichen, und besttigt die Beobachtung Munck's af Rosenschld (1), dafs die Fhigkeit der grofteren Scheiben, aus derselben Quantitt groftere Menge Electricitt anzusammeln, nicht nur nicht rhrt, weil sie allein stehend mehr aufnehmen, sondern weil sie eine mit der Grofo zunehmende Kraft be

Wollte man z. B. zwei kleine Collectorscheiben verbinden, die allein stehend dieselbe Menge Electricitt

(1) Pogg. Ann. LXIX, 44. 223.

men, wie eine grössere, so würde nach Hinzufügung ^{Condensator.} r Condensatorscheiben, bei allen in gleichem Abstände, r große Condensator beträchtlich mehr aufnehmen können, als die beiden kleineren zusammen genommen. — Es liegt dies den Vorzug der aus wenigen großen Flaschen bestehenden Batterien vor den aus mehr Flaschen zusammengesetzten von gleicher Oberfläche. Das Uebergewicht der großen Condensatoren über die kleinen wird um so größer, je kleiner die Entfernung ihrer Scheiben ist, und verschwindet bei einer großen Entfernung gänzlich.

Franklin hat zuerst vorgeschlagen, die bei dem Laden <sup>Entladung
par cascade.</sup> der Innenfläche einer Batterie aus der äußeren Belegung abfließende Electricität zum Laden einer zweiten Batterie zu benutzen, und empfiehlt diese stufenweise (*par cascade*) bewirkte Ladung als ein Mittel, eine große Anzahl Flaschen mittelst einer geringen Anzahl Umdrehungen zu laden. Man habe zu dem Ende die Flaschen erst stufenweise zu verbinden, dann, nachdem die Ladung bewerkstelligt, vor erfolgter Entladung die gleichartige Verbindung, nämlich aller Innenflächen untereinander und ebenso aller Außenflächen untereinander, herzustellen.

Dove (1) zeigt nun durch Versuche, daß es einer Umänderung jener ersten Anordnung gar nicht bedarf, und daß, wenn man die erste innere mit der letzten äußeren Belegung einer Reihe *par cascade* verbundener Flaschen verbindet, durch die Entladung eine nicht weniger kräftige Wirkung entsteht, wie wenn, nachdem alle inneren und alle äußeren Belegungen vereinigt sind, die Entladung erfolgt; ungeachtet in dem letzteren Falle fast viermal größere Electricitätsmengen zu einander übertreten müssen.

Die stufenweise Entladung ist eigentlich aus einer Reihe von Entladungsströmen zusammengesetzt. Es seien z. B. 4 gleich große Flaschen; i_1, i_2, i_3, i_4 ihre inneren, a_1, a_2, a_3, a_4 ihre äußeren Belegungen. Während der Ladung sei a_1 mit i_2 , a_2 mit i_3 , a_3 mit i_4 je durch einen Kupfer-

(1) Berl. Acad. Ber. 1847, 148. 287; auch Pogg. Ann. LXXII, 406.

Entladung
par cascade.

draht verbunden. Geschieht nun die Entladung mittel des Ausladers zwischen a_4 und i_1 , so entstehen gleichzeitig in den getrennten Drähten 4 Entladungsströme, nämlich einer im Schließungsbogen $i_1 a_4$ durch einen Funken vermittelt, und drei ohne Funkenbildung in den Verbindungsdrähten $a_1 i_2$, $a_2 i_3$, $a_3 i_4$.

Wenn man die Electricitätsmenge der ersten inneren Belegung mit E , die der ersten äußeren mit mE bezeichnet, so ist nach bekannten Gesetzen (1) die zweite äußere Belegung mit m^2E , die dritte mit m^3E u. s. w. beladen. Kurz die Ladungen der auf einander folgenden stufenweise geladenen Flaschen verhalten sich wie $1 : m : m^2 : m^3$ u. s. w., wo jedoch wegen des stets geringen Abstandes beider Belegungen m einen Bruch vorstellt, der von der Einheit nur wenig verschieden sein kann. Die Ladung der letzten Flasche kann folglich auch nur wenig von der der ersten verschieden sein.

Als Maß der Entladungswirkungen gebrauchte Dove zuerst das von Riefs (2) verbesserte electrische Luftthermometer. Dasselbe wurde bei stets gleicher Ladung nach einander in den Schließungsbogen der inneren Belegung i_1 mit den äußeren Belegungen a_1 , a_2 , a_3 und a_4 gebracht. Die bei den Entladungen erfolgenden Wärmeerhöhungen verhielten sich wie die einfachen Zahlen 1, 2, 3, 4.

Wurde das Thermometer in den Verbindungsdraht $a_1 i_2$ eingeschaltet, so stieg die Wärme, wenn die Entladung nach einander durch die Schließungsbögen $i_1 a_1$, $i_1 a_2$, $i_1 a_3$ erfolgte. Sie zeigte sich in allen Verbindungsdrähten gleich, wenn die 4 Flaschen durch Verbindung von i_1 mit a_4 entladen wurden, und nahe gleich der im Schließungsbogen selbst erhaltenen. Bei gleichen Verbindungsdrähten von je einer Flasche zur andern erfolgen also in allen gleiche Wärmeerscheinungen, und die in jedem einzelnen Drahte erregte Wärme nimmt stets im Verhältniß der Anzahl der stufenweise verbundenen Flaschen zu.

(1) Biot, traité de phys. II, 407. — (2) Pogg. Ann. XL, 339.

Werden nach bewirkter Ladung par cascade sämt- Entladung
par cascade. liche inneren und ebenso sämtliche äußeren Belegungen untereinander verbunden, so beträgt nunmehr die ganze Ladung der vereinigten inneren Flächen $E(1+m+m^2+m^3)$, d. h. nahe 4 E, die Ladung der Außenflächen $m E(1+m+m^2+m^3)$ oder nahe 4 m E. Das Verhältniß beider Electricitätsmengen 1 : m bleibt also dasselbe, wie vorher auf jeder einzelnen Flasche für sich betrachtet.

Gesetzt die Wärmeerhöhung im Luftthermometer bei Entladung einer einzelnen Flasche sei t , so muß durch Entladung der ganzen Batterie aus 4 Flaschen beinahe 4 t erhalten werden; denn bei gleicher Dichtigkeit der electrischen Anhäufung verhalten sich die Wärmeerhöhungen wie die Mengen der sich entladenden Electricitäten (1). Dieselbe Wärmeerhöhung 4 t wurde aber auch bei der Entladung par cascade zwischen i_1 a_4 erhalten. Dove glaubt, daß diese Gleichheit der Wirkung bei so großer Verschiedenheit der durch das Luftthermometer gegangenen Electricitätsmengen nur von einer Ungleichheit der Entladungsdauer herrühren könne. In der vorher angezogenen klassischen Arbeit über die Erwärmung im Schließungsbogen der electrischen Batterie hatte nämlich Rieffs den Beweis geführt, daß die Wärmeerhöhung für gleiche Electricitätsmengen der Dauer der Entladung umgekehrt proportional sei (2). War also in dem einen Falle (der Entladung par cascade) die Electricitätsmenge 1 in der Zeiteinheit durch das Thermometer geströmt, während in dem andern Falle die vierfache Menge eine vierfache Zeit bedurfte, so mußte die Erwärmung in beiden Fällen allerdings gleich sein. Es würde demnach nur noch des bis jetzt fehlenden Beweises bedürfen, daß wenn die Entladung stufenweise erfolgt, die Entladungsdauer wirklich in dem angegebenen Verhältnisse abnehmen muß.

Dove hat auch die Schlagweite bei der Entladung par cascade untersucht. Die Hauptergebnisse dieser Versuche

(1) Rieffs in Pogg. Ann. XL, 342. — (2) Pogg. Ann. XLIII, 47.

Entladung
par cascade. sind in der folgenden Tabelle mit den Wärmewirkungen
zusammengestellt.

Schließungs- bogen	Verhältniß der Electricität in beiden Flächen	Erwär- mung	Schlag- weite
$i_1 a_1$	1 : m	t	x
$i_1 a_2$	1 : m ²	2t	4x
$i_1 a_3$	1 : m ³	3t	9x
$i_1 a_4$	1 : m ⁴	4t	16x

Die Schlagweite wächst also im Quadrate der Anzahl stufenweise verbundener Flaschen. Dies gilt, mochte nun das Funkenmikrometer im äußeren Schließungsbogen, oder in die Verbindungsdrähte eingeschaltet sein.

Electrische
Ströme durch
Entladung
der Flaschen-
batterie.

Ueber Wirkungen electrischer Ströme, hervorgebracht durch Entladung der Flaschenbatterie, sind in den zwei letzten Jahren noch folgende Arbeiten erschienen:

Von K. W. Knochenhauer. Ueber die Spannungsverhältnisse beim electrischen Nebenstrom. Pogg. Ann. LXX, 106. 255.

Von demselben. Ueber Erscheinungen, die mit dem electrischen Ladungsstrom zusammenhängen. Pogg. Ann. LXXI, 343.

Diese Abhandlungen reihen sich anderen desselben Verfassers an, die in Pogg. Ann. LXVI, LXVII, LXVIII und LXIX abgedruckt sind. Sie eignen sich nicht zum Auszuge.

Electricitäts-
entwicklung
durch
Wasserdampf

Eine lesenswerthe historische Arbeit von Moisson: *Coup d'oeil historique sur le développement de l'électricité par la vapeur d'eau*, findet sich in den Arch. ph. nat. IV, 5.

Volta'sche
Combinatio-
nen.

N. J. Callan, Professor der Physik am k. Collegium zu Maynooth in Irland, hat den Versuch gemacht, das Platin in der Grove'schen constanten Kette durch platinirtes Blei zu ersetzen (1). Es kann nicht verwundern, daß eine solche Kette, in welche das Blei nur als leitende Masse eintritt, um einer äußerst dünnen Platinplatte Festig-

(1) Phil. Mag. [3] XXXI, 81; Ausz. in Pogg. Ann. LXXII, 48; Arch. ph. nat. 1847, 47.

keit zu verleihen, so lange die Platinirung hält, dieselbe electromotorische Kraft wie die Grove'sche besitzt, und hätte dies kaum bestätigender Versuche bedurft. In Beziehung auf Haltbarkeit bei häufig wiederholtem Gebrauche scheint jedoch das platinirte Blei den Anforderungen von Callan selbst nicht entsprochen zu haben, da er nach einer späteren Anzeige (1) gusseiserne Kasten zur Aufnahme der Salpetersäure oder eigentlich eines Gemisches von Salpetersäure und concentrirter Schwefelsäure anwendet. Er setzte 577 Elemente mit Kasten von Gufseisen zusammen und erhielt dadurch begreiflicher Weise außerordentlich kräftige Wirkungen. Poggendorff bemerkt hinsichtlich dieses Apparates, daß, wenn auch das Gufseisen, so weit es mit Flüssigkeit bedeckt ist, nicht oder nur wenig leidet, doch die außerhalb liegenden Theile durch die salpetrigen Dämpfe sehr bald völlig zerfressen werden müssen.

Es scheint demnach, daß weder das platinirte Blei, noch das Gufseisen geeignet ist, in Beziehung auf Wohlfeilheit und wirkliche Brauchbarkeit die Bunsen'schen Kohlenzylinder zu ersetzen.

Eine wirkliche Verbesserung der constanten Kette, die man Callan verdankt, ist aber der von ihm zuerst empfohlene Zusatz von concentrirter Schwefelsäure zu der Salpetersäure, wodurch nicht nur das Leistungsvermögen erhöht, sondern auch die Beständigkeit der Kette auf viel längere Zeit und in der That fast bis zur völligen Abnutzung der Salpetersäure erhalten wird.

Eine sehr kräftig wirkende galvanische Kette aus Platin oder Kupfer mit Kalium-Amalgam ist von J. Goodman (2) beschrieben worden. Ein Glasgefäß wurde theilweise mit Kupfervitriol gefüllt, dem etwas verdünnte Schwefelsäure zugesetzt war, und in diese Flüssigkeit ein Glasrohr, am unteren Ende mit Blase geschlossen und Steinöl enthaltend, eingesenkt. Im Glase stand ein Platinstreifen,

(1) Phil. Mag. [3] XXXIII, 49; Pogg. Ann. LXXV, 128. — (2) Phil. Mag. [3] XXXIII, 207; Arch. ph. nat. IX, 805.

Volta'sche
Combinationen.

in das Steinöl wurde das Kalium-Amalgam, an einem Kupferdrahte befestigt, eingetaucht. Verband man nun das Platin mit dem einen, den Kupferdraht mit dem andern Platindrahte einer kleinen mit Schwefelsäure gefüllten Zersetzungszelle, und wurde das Kalium mit der von der Säure befeuchteten Haut in Berührung gebracht, so entstand eine kräftige und dauernde Wasserzersetzung.

Gasbatterie.

Im Jahre 1842 hat Grove (1) eine Art Volta'sche Combinationen beschrieben, welche er Gasbatterie nannte und die im Wesentlichen folgende Zusammensetzung hatten: Glasröhren unten offen, oben geschlossen, mit eingeschmolzenen Platinstreifen, die zuvor platinirt worden waren, d. h. einen Ueberzug von Platinmohr (2) erhalten hatten, in Paare (H und O) mit Wasserstoff und Sauerstoff gefüllt und in Glasgefäße, die angesäuertes Wasser enthalten, eingetaucht, so jedoch, daß das Platin eines jeden Rohrs noch mit der verdünnten Säure in Berührung steht. Das Platin des ersten Wasserstoffrohrs (H_1) wird mit dem Platin des zweiten Sauerstoffrohrs (O_2), das Platin des zweiten Wasserstoffrohrs (H_2) mit dem Platin des dritten Sauerstoffrohrs (O_3) u. s. w. und endlich das Platin des letzten Wasserstoffrohrs mit dem Platin des ersten Sauerstoffrohrs (O_1) metallisch verbunden. In der so geschlossenen Kette entsteht dann ein Strom in der Richtung vom Wasserstoff durch die Säure zum Sauerstoff, der die Nadel bewegt, Wasser zersetzt und alle andern bekannten Stromwirkungen erzeugt. — Dabei verschwinden allmählig die Gase. Ist die Kette so eingerichtet, daß die Menge der eingefüllten und verbrauchten Gase gemessen werden kann (3), so zeigt sich zwischen der Menge des verbrauchten Wasserstoffs und Sauerstoffs so ziemlich das Verhältniß wie 2 : 1.

(1) Phil. Mag. [3] XXI, 417; Pogg. Ann. LVIII, 202. — (2) Das Platinmohr oder das schwarze, äußerst fein vertheilte Platinpulver wird aus einer verdünnten Lösung von Platinchlorid electrolytisch auf den Platin niedergeschlagen; zu vergleichen: Pogg. Ann. LXI, 598. — (3) Pogg. Ann. Ergänz.-Bd. II, 369, aus Phil. Trans. 1843, II, 91.

Wird ein Voltameter in die Gasbatterie eingeschaltet, so findet man, daß das Volum der durch Wasserzersetzung gebildeten Gase der in jedem Röhrenpaar gleichzeitig verschwindenden Gasmenge gleich ist. — Gewiß mit Recht hat Grove aus diesen verschiedenen Thatsachen den Schluß gezogen, daß die Wirksamkeit der Kette von dem Gegensatz dieser beiden gasförmigen Körper abhängig sei. Es ist nämlich einleuchtend, daß die Platinstreifen aller Wasserstoffröhren, so weit sie befeuchtet sind, und daß eben so die Platinstreifen aller Sauerstoffröhren eine veränderte Oberflächenbeschaffenheit erfahren müssen, ähnlich derjenigen der mit Wasserstoff und Sauerstoff polarisirten und dadurch ungleichartig gemachten Platten. In der That geht der gebildete Strom, gleich wie zwischen zweien in saurem Wasser einander gegenüberstehenden und ungleichartig polarisirten Platinplatten vom Wasserstoff, welcher das Zink der gewöhnlichen Combination vertritt, durch die Flüssigkeit zum Sauerstoff. Er hat Fortdauer, weil der oxydirte Wasserstoff durch neu aufgelösten stets wieder ersetzt wird. Zugleich ist dieß, nämlich die Fortdauer, der einzige wesentliche Unterschied der Grove'schen Gasbatterie und einer aus polarisirten Platten zusammengesetzten, sogenannten Ritter'schen Ladungssäule (1).

Um eine wirksame Gasbatterie zu erhalten ist die Platinirung der Platinstreifen, d. h. das Bekleiden derselben mit pulverförmigem Platin, wesentlich; offenbar weil der schwammige Ueberzug durch Capillaraction die Flüssigkeit in den Gasraum heraufzieht und dadurch die Berührungspunkte der Gase mit Flüssigkeit und Metall vervielfältigt.

Kommen die Platinstreifen außer directer Berührung mit den Gasen, d. h. tauchen sie ganz in die Flüssigkeit ein, so daß nur die in der letzteren aufgelösten Gastheile damit in Berührung kommen können, so hört zwar der Strom nicht ganz auf, aber er wird sehr geschwächt.

(1) Zu vergleichen : Pogg. Ann. LXI, 599.

Gasbatterie.

Als Grove die Sauerstoffröhren seiner Batterie anfangs mit Flüssigkeit bis oben anfüllte, zeigte es wohl ein Strom, nur schwächer als vorher. Der Sauerstoff wurde in diesem Falle allmählig aufgenommen. Denn bei gänzlichem Abschlusse sphärischen Sauerstoffs hörte der Strom nach auf. Grove füllte nun die Sauerstoffröhren mit an. Jetzt hatte der Strom Fortdauer, selbst bei Abschlusse der äußeren Luft. Der Stickstoff spielte bei keine andere Rolle, als daß er den Raum in welchem sich nach und nach durch Diffusion Wasserstoff absonderte. An dem einen (dem mit V umhüllten) Platinstreifen oxydirte sich also Wasser während an dem andern dasselbe Gas ausgeschieden. Dieser beim ersten Blick etwas auffallende Versuch scheidet sich übrigens dem Wesen nach nicht verschieden von der schon länger bekannten Thatsache: Zinkplatte gegenüber einer Platinplatte in reinem Wasser zur Kette geschlossen, sich oxydirt, während an metallisches Zink abgeschieden wird.

Grove hat auch die galvanischen Wirkungen von Gasen untersucht (1), wenn sie an die Stelle von Wasserstoff oder Sauerstoff in die Gasröhren gebracht werden. Die Wirkungen mit denen der Wasserstoff- und Sauerstoffbatterie vergleichbar, zeigten sich jedoch nur bei der Stelle des Sauerstoffs und Kohlenoxyd an. Bei vollständigem Abschlusse der Luft gab auch Stickstoffoxyd gegenüber Sauerstoff deutliche Wirkung, indem es sich höher oxydirt. Selbst die Dämpfe von einigen Körpern wirkten auf die Bildung electricischer Ströme. So die Dämpfe von Phosphor schon bei gewöhnlicher Temperatur. Bei einem Stück Phosphor wurde zu diesem Zwecke in das Rohr gebracht, umgeben von irgend einem in

(1) Pogg. Ann. Ergänz.-Bd. II, 385. — (2) Pogg. Ann. II, 408, aus Phil. Trans. 1845, II.

Gase, z. B. Stickstoff oder Kohlensäure. Das andere Gas- Gasbatterie.rohr war mit Sauerstoff gefüllt. Der Strom hatte Fortdauer, und Theile des Phosphors oxydirten sich allmählig. — Ein Stück Schwefel unter gleichen Umständen erzeugte keinen Strom. Wurde es aber bis zum Schmelzen erhitzt, so zeigte sich alsbald eine Ablenkung der Nadel.

Grove fand, daß atmosphärischer Luft, die in das eine Rohr an die Stelle des Sauerstoffs gebracht worden war, während sich im andern Rohr Wasserstoff befand, nach und nach (d. h. nach mehreren Tagen) aller Sauerstoff bis auf den letzten Rest entzogen wurde, während der Stickstoff unverändert und vollständig zurückblieb. Eben so verlor ein Gasgemenge, das Wasserstoff enthielt, wenn es dem Sauerstoff gegenüber gebracht wurde, allen Wasserstoff, bis auf die letzte Spur (1). Grove empfiehlt daher den Gebrauch eines Paares der Gassäule als ein, wenn auch langsam, doch dafür um so sicherer wirkendes Hilfsmittel zu eudiometrischen Zwecken; insbesondere, wenn es darauf ankommt, recht reinen Stickstoff darzustellen oder ganz geringe Mengen von Wasserstoff oder Sauerstoff aus einem Gasgemenge zu entfernen. Poggendorff schlägt zu demselben Zwecke ein einfacheres, wiewohl auf denselben Grundsätzen beruhendes Verfahren vor (2).

Die electromotorische Kraft der Gasbatterie hat Grove, wie schon oben bemerkt wurde, und zwar aus sehr überzeugenden Gründen, von dem chemisch electricen Gegensatze des Wasserstoffs und Sauerstoffs abzuleiten gesucht. Schönbein in Basel erachtet jedoch diese Gründe nicht für stichhaltig (3), und sucht zunächst den Einfluß des Sauerstoffs nur in einer depolarisirenden Thätigkeit, d. h. in einer Wirksamkeit derjenigen ähnlich, welche die Salpetersäure in der constanten Grove'schen Kette ausübt. Man wird erwarten, Schönbein habe diese seine Behauptung aus directen electromotorischen Maßbestimmungen

(1) Pogg. Ann. Ergänz.-Bd. II, 398. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 288.
— (3) Pogg. Ann. LVIII, 361; LXXIV, 241.

darin bestanden haben muß, die negative Metallplatte im Ursprungszustand zu erhalten. Beetz geht jedoch zu weit in seinen Folgerungen, indem er eine gleichzeitige Vermehrung der electromotorischen Kraft, bewirkt durch die Gegenwart des Sauerstoffs, unbedingt ausschließt. Die Entscheidung dieser Frage kann nur aus electromotorischen Messungen hervorgehen.

Passivität. Ueber die Passivität des Eisens sind in den letzten Jahren mehrere Untersuchungen mitgetheilt worden: von W. Beetz (1), von W. Rollmann in Halle (2) und von Gust. Wetzlar (3), der bekanntlich zuerst und schon im Jahre 1827 dieses eigenthümliche Verhalten ausführlich beschrieben hat. Alle diese Arbeiten bestätigen im Wesentlichen die schon öfter aufgestellte und eben so oft wieder verlassene Ansicht: daß die Passivität von einer dünnen Oxydhaut herrühre, womit sich das Eisen unter gewissen Bedingungen überziehe und wodurch es einerseits einen Theil seiner Leitfähigkeit verliere, andererseits aber auch dem direkten Angriffe der Salpetersäure und anderer oxydirender Flüssigkeiten mehr entzogen werde.

Es ist einzusehen, daß Eisen mit einer Oxydschicht überzogen ein dem passiven Eisen ähnliches Verhalten zeigen muß. Aber wie läßt sich die Entstehung dieser schützenden Oxydhaut erklären bei blankem Eisen, das mit Platin verbunden und in Salpetersäure getaucht sogleich passiv erscheint, welches, so lange es mit dem Platin an einer galvanischen Kette geschlossen bleibt, einen nie unterbrochenen, wenn auch schwachen Strom entwickelt, und sich dabei zwar sehr langsam aber nach und nach vollständig in der Säure auflöst? Wie läßt sich überdies die Oxydschicht mit der Thatsache vereinigen, daß der in Salpetersäure erlangte passive Zustand gewöhnlich schon durch Abspülen mit reinem Wasser wieder entfernt werden kann?

(1) Pogg. Ann. LXVII, 186. — (2) Pogg. Ann. LXXIII, 404. — (3) Pogg. Ann. LXXIII, 417.

Jacobi (1) hat gefunden, daß in dem Voltameter eine **allmähliche Wiedervereinigung** der darin erzeugten Gase selbst dann statt hat, wenn die Elektroden von Platin immer mit Flüssigkeit bedeckt sind und also mit dem Gasgemenge nicht in unmittelbarer Berührung stehen. Auch wenn atmosphärische Luft in dem Voltameter enthalten ist, **verringere** sich ihr Volum unter dem Einfluß der Elektroden von Platin, doch weniger rasch, als dies bei Knallgas der Fall ist.

Wiederver-
einigung der
Gase im
Voltameter.

Unsere Kenntnisse in der galvanischen Electricitäts-**lehre** sind in den letzten Jahren durch zahlreiche, zum **Theil** sehr genaue Mafsbestimmungen erweitert worden. Die Entdeckung constant wirkender Ketten, die Vervoll-**kommenung** der galvanischen Meßinstrumente, die Erfindung **des** Stromregulators, die man Wheatstone und Jacobi **verdankt**, führten zu vereinfachten Methoden der Messun-**gen** und trugen wesentlich bei, der Ausführung selbst in **weniger** geübten Händen Sicherheit und Zutrauen zu **ver-
leihen**.

Leitungs-
widerstand.

Der Stromregulator, dessen äußere Einrichtung je nach **Bedürfnis** mancherlei Abänderungen zuläßt, besteht, wie **bekannt**, in der Hauptsache aus einer Drahtmasse, die in **den** Kreislauf der galvanischen Kette eingeschaltet und, so oft es nöthig erscheint, ohne die geringste Unterbrechung **des** Stroms, rasch verlängert, verkürzt oder auch ganz aus-**geschlossen** werden kann. Ist dieser Regulatordraht durch **seine** ganze Masse gleichartig, läßt sich die eingeschaltete **Länge** jeden Augenblick leicht und genau abmessen, so ist dadurch ein höchst einfaches Mittel gegeben, alle leitende Bestandtheile der Kette, feste wie flüssige, als Drahtlängen derselben Art zu berechnen, also den ganzen Leitungs-**widerstand** der Kette auf eine Länge Regulatordraht zu-**rückzuführen**.

(1) Petersb. Acad. Bull. VII, 161; Ann. ch. phys. [3] XXV, 215; Pogg. Ann. LXX, 105; Compt. rend. XXVII, 628; Instit. 1848, 398; Arch. ph. nat. X, 56.

Leitungs-
widerstand.

Denkt man sich einen Leiter von unbekanntem Widerstande in eine Kette von constanter Kraft eingeschaltet, dann, nachdem man die Ablenkung der Galvanometernadel beobachtet hat, wieder entfernt und durch Einführen von Regulatordraht in der Weise ersetzt, daß die vorher beobachtete Ablenkung der Nadel genau wieder erscheint, so giebt die hierzu erforderliche Drahtlänge einen Ausdruck für den Widerstand jenes Leiters. Auf diese Art läßt sich der Regulatordraht als gemeinschaftliches Maß zur Vergleichung des Widerstandes der verschiedenartigsten Leiter gebrauchen.

Dieses Hilfsmittel zur Bestimmung von Leitungswiderständen wird gegenwärtig häufig benutzt.

Nach diesem Verfahren hat Buff den Leitungswiderstand der folgenden Körper gemessen :

Silber, chemisch rein . . .	1,000
Kupfer, chemisch rein . . .	1,048
Kupfer des Handels	
Erste Sorte	1,227
Zweite Sorte	1,579
Neusilber	12,401

Das reine Silber war eigens zu diesem Zwecke, im chemischen Laboratorium zu Gießen, dargestellt. Das reine Kupfer war mit großer Sorgfalt auf galvanischem Wege bereitet, aber gleichwohl nicht absolut frei von Eisen. Die chemische Analyse zeigte darin 0,02 pC. Die erste Sorte des Handelskupfers enthielt 0,22 pC. Eisen; die zweite Sorte neben einer Spur von Eisen 0,20 pC. Blei und 0,26 pC. Nickel.

Die Querschnitte der verwendeten Drähte wurden sämtlich aus dem Gewichte abgemessener Drahtlängen und deren spec. Gewichte abgeleitet.

Einen dem vorher beschriebenen ähnlichen Weg hat Horsford aus Albany (1) eingeschlagen, um den Leitungswiderstand einiger flüssiger Körper bei einer Temperatur

(1) Pogg. Ann. LXX, 238; Sill. Am. J. [2] V, 36.

von 18–20° C. zu messen. Zur Aufnahme der zu prüfenden Flüssigkeiten diente ihm ein viereckiger Trog von festem und dichtem Holze, 0,3 Meter lang, 0,075 Meter breit und eben so tief; er war im Innern mit Schellackfirnis dick überzogen, um das Eindringen der Flüssigkeit zu verhindern oder doch möglichst zu verzögern. Auf diesem Troge lagen zwei Brettstücke, von welchen das eine fest saß, das andere verschiebbar war. Sie dienten die in die Flüssigkeit eintauchenden Platten zu halten und nach Befinden deren Abstand zu verändern. Die Platten, von gleicher Größe wie der Querschnitt des Kastens, wurden an Kupferstreifen festgeklemmt, welche ihrerseits wieder an den Brettstücken angeschraubt waren und mit den Endpunkten einer constanten galvanischen Kette in Verbindung standen. Die Stromstärken wurden mittelst einer in die Kette eingeschalteten Tangentenbussole gemessen. Leitungs-
widerstand.

Der Gang des Versuchs fand in der Weise statt, daß man zwei Platten in dem mit Flüssigkeit ganz oder theilweise angefüllten Troge einander genau parallel, zuerst gewöhnlich auf 2,5 Centimeter Entfernung, gegenüberstellte, dann die Kette schloß, und mit Hülfe des Stromregulators die Nadel der Tangentenbussole auf einen bestimmten Grad richtete. Hierauf vergrößerte man den Abstand beider Platten durch Verrücken der einen, und sah zu, wie viel Regulatordraht aus der Kette herausgenommen werden mußte, um den anfänglichen Ausschlag der Nadel wieder zu erhalten. Es ist einleuchtend, daß alsdann die Vergrößerung der Flüssigkeitsschicht einen genau eben so großen Widerstand bewirkte, wie der abgewickelte Draht, und zwar ganz unabhängig von dem Einflusse der Polarisation.

Horsford rechtfertigte durch seine Versuche die frühere, durch directe Versuche jedoch vordem noch nicht bestimmt erwiesene, Annahme, daß der Leitungswiderstand des Flüssigen von der Stromstärke unabhängig, der Länge der flüssigen Schicht direct und dem Querschnitte derselben umgekehrt proportional sei.

Leitungs-
widerstand.

Hier folgen die von ihm für den Leitungswiderstand einiger chemisch reinen Auflösungen gefundenen Zahlen.

Namen und Beschaffenheit der Flüssigkeit.		Leitungswiderstand, der des reinen Silbers = 1.
Schwefelsäure von 1,10 spec. Gew.		938500
" " 1,15 " "		840500
" " 1,20 " "		696700
" " 1,24 " "		696700
" " 1,30 " "		696700
" " 1,40 " "		1023400
Chlornatriumlös. 27,6 Grm. in 500 C.C. Wasser		7157000
" 21,8 " " " " "		9543000
" 10,65 " " " " "		18460000
" 5,325 " " " " "		84110000
Chlorkaliumlös. 27,7 " " " " "		7168000
Kupfervitriollösung, 100 C.C. enthalten		
15,093 Grm. CuO SO_4		12058000
Dieselbe Salzmenge im doppelten Volume Flüssigkeit		17490000
Zinkvitriollösung, 100 C.C. enthalten		
7,287 Grm. $\text{ZnO SO}_4 \text{ HO}$		23515000

Edm. Becquerel hat das Leitungsvermögen starrer und flüssiger Körper untersucht und sich dazu eines Differenzialgalvanometers bedient (1). D. h. der Strom einer galvanischen Kette, in zwei Arme gespalten, wurde in diesen so geleitet, daß sie in entgegengesetzter Richtung um die Galvanometernadel herum liefen, folglich nur mit dem Unterschiede ihrer Stärke auf dieselbe einwirken konnten. Mit Hülfe eines Wheatstone'schen Rheostats oder Stromregulators, der in die eine Verzweigung eingeschaltet war, konnte das Gleichgewicht beider Stromtheile hergestellt, folglich die Nadel in ihrer Ruhelage erhalten oder doch immer in dieselbe zurückgeführt werden. Dies geschah, erst allein, dann nachdem in den andern Arm der auf sein Leitungsvermögen zu prüfende Körper eingeschaltet war. Der Widerstand des letztern wurde also unmittelbar mit dem einer Länge Regulatordraht verglichen.

(1) Ann. ch. phys. [3] XVII, 242; im Auss. Pogg. Ann. LXX, 266.

Auf diese Weise sind die folgenden Bestimmungen bei 12°–13° C. erhalten worden. Leitungs-
widerstand.

	Leitungsvermögen bei gleichem Durchmesser im gehärteten ausgeglühten Zustande.	
Silber, rein, aus Chlorsilber reducirt	93,448	100,000
Kupfer, electrochemisch gefällt, dann geschmolzen	89,084	91,439
Gold, rein	64,385	65,458
Kadmium	24,574	—
Zink	24,164	—
Zinn	13,656	—
Palladium	13,977	—
Eisen	12,124	—
Blei	8,245	—
Platin	8,042	—
Quecksilber	1,8017	—

Die mittleren Durchmesser der gewählten Drähte sind mittelst eines Mikrometers unter dem Mikroscope gemessen.

Um die Abnahme des Leitvermögens bei höheren Temperaturen zu prüfen, wurden die Drähte, spiralförmig gewunden, doch ohne daß die einzelnen Windungen in leitende Berührung kommen konnten, in ein Oelbad getaucht. E. Becquerel gelangte zu dem Schlusse, daß die Abnahme des Leitungsvermögens mit der Zunahme der Temperatur proportional gehe. Dieser Folgerung widersprechen jedoch die Ergebnisse seiner eignen Versuche. Auch stimmen ältere, jedoch sehr genaue Messungen, welche Lenz (1) mittelst magnet-electrischer Ströme ausgeführt hat, nicht damit überein.

Ueber die Abhängigkeit des Leitungswiderstandes der Metalle von der Temperatur hat auch J. Müller (2) in Halle nach einer der von E. Becquerel angewendeten sehr ähnlichen Methode einige Versuche angestellt, wobei er ein sehr sicher gehendes, von Hankel (3) construirtes, Differenzialgalvanometer gebrauchte. Seine Messungen erstrecken sich jedoch nur auf Eisen, Zink und Quecksilber zwischen den Temperaturgrenzen von 18 bis 158° C. Für

(1) Pogg. Ann. XLV, 119. — (2) Pogg. Ann. LXXIII, 434. —

(3) Pogg. Ann. LXIX, 256.

Leitungs-
widerstand.

Eisendraht erhält er fast genau dieselben Resultate, wie früher Lenz. Auch bei den beiden andern Metallen findet er den Widerstand nicht mit der Temperatur proportional zunehmend. Doch ist die Abweichung sehr gering.

Um das Leitungsvermögen flüssiger Körper unabhängig von der Polarisation kennen zu lernen, hat E. Becquerel (1) in jeden der beiden Arme des gespaltenen Strom (siehe S. 288) eine Säule von ein und derselben Flüssigkeit eingeschaltet, und das Gleichgewicht hergestellt, erst für sich, und dann, nachdem in den einen Arm ein Draht von bekanntem Widerstand eingefügt worden war. Das Stück, um welches hierzu die in demselben Arme befindliche Säule verkürzt werden mußte, lehrte nun den Widerstand der Flüssigkeit kennen.

Er erhielt folgende Resultate :

	Dichtigkeit.	Temperatur.	Leitvermögen.	Widerstand
Silber, rein, ausgeglüht	—	0°,00	100000000	1
Wasser, gesättigt mit schwefelsaurem Kupfer	1,1707	9°,25	5,42	1845000
Wasser, gesättigt mit Chlornatrium bei 9°,5 C.	—	18°,40	31,52	317000
Wasser, gesättigt mit salpeters. Kupfer	1,6008	13°,00	8,995	1113000
Wasser, gesättigt mit schwefels. Zink	1,4410	14°,40	5,77	1730000
250 Grm. Wasser m. 30 Grm. Jodkalium	—	12°,50	11,20	890000
220 C.C. Wasser und 20 C.C. Schwefelsäure mit 1 At. Wasser	—	19°,00	83,68	113000
Künstliche Salpetersäure von 36° B.	—	13°,10	93,77	1000000
20 Grm. Antimonchlorür, 120 C.C. Wasser und 100 CC. Salzsäure	—	15°,00	112,01	82000

Einfluß des Sättigungsgrades.

	Salzgehalt in gleich. Volum	Leitungsvermögen.	Widerstand.
Schwefelsaures Kupferoxyd.			
Gesättigte Lösung	1	5,42	1845000
" " verdünnt zum 2fachen Volum	1/2	3,47	2680000
" " " " 4fachen "	1/4	2,08	4000000
Chlornatrium.			
Gesättigte Lösung	1	31,52	317000
" " verdünnt zum 2fachen Volum	1/2	23,08	433000
" " " " 3fachen "	1/3	17,48	577000
" " " " 4fachen "	1/4	13,58	780000
Salpetersaures Kupferoxyd (Dichte = 1,6008)	1	8,995	—
" " verdünnt zum 1/2fachen Volum	2/3	16,308	—
" " " " 2fachen "	1/2	17,073	—
" " " " 4fachen "	1/4	13,442	—
" " (Dichte = 1,085)	—	8,979	—

(1) Ann. ch. phys. [8] XVII, 267; Pogg. Ann. LXX, 350.

Das Leitungsvermögen flüssiger Körper ändert sich auch mit der Temperatur, und zwar im umgekehrten Sinne wie bei den Metalldrähten; d. h. es vermehrt sich bei zunehmender Erwärmung. Die Thatsache ist längst bekannt, aber Messungen fehlten bisher. E. Becquerel (1) schließt aus seinen nicht zahlreichen Versuchen über diesen Gegenstand, daß die Zunahme des Leitungsvermögens mit derjenigen der Temperatur proportional fortschreite. Diese Annahme kann jedoch nur als eine grobe Annäherung gelten. Aus einer weit ausführlicheren, jedoch ebenfalls noch unvollendeten Arbeit Hankels (2) ergibt sich, daß der Leitungswiderstand der Flüssigkeiten durch Erwärmen sehr bedeutend vermindert wird, daß diese Verminderung aber der Temperaturveränderung nicht proportional geht, sondern für einen bestimmten Temperaturunterschied um so größer ist, je mehr man sich dem Nullpunkte nähert. Uebrigens scheinen die verschiedenen Flüssigkeiten in diesen Veränderungen einen ziemlich übereinstimmenden Gang darzubieten und nur darin von einander abzuweichen, daß diejenigen Lösungen, welche eine größere Menge der Salze aufgelöst enthalten, auch eine größere Aenderung in ihrer Leitungsfähigkeit für dieselben Temperaturunterschiede erleiden. Bemerkenswerth ist es, daß bei concentrirter Zinkvitriollösung, gleich wie bei concentrirter Schwefelsäure, mäßiger Wasserzusatz das Leitungsvermögen vergrößert, stärkere Verdünnung aber es mehr und mehr vermindert.

Ueber den Leitungswiderstand flüssiger Körper ist auch eine Arbeit von Marié-Davy, Professor der Physik zu Montpellier, bekannt geworden (3). Er leitet den electrischen Strom durch einen mit Flüssigkeit gefüllten Glas-Cylinder, dessen Boden mit einer geeigneten Metallplatte geschlossen war. Eine zweite Platte, von gleichem Querschnitte mit dem Cylinder, konnte auf und nieder geschoben

Leitungs-
widerstand.

(1) A. a. O. — (2) Pogg. Ann. LXIX, 258; im Ausz. Arch. ph. nat. IV, 66. — (3) Ann. ch. phys. [3] XIX, 401.

gesetzt worden. Nachrichten hierüber findet man an den unten angezeigten Orten (1).

Eine der wesentlichsten Schwierigkeiten, womit die Physiker vor der Entdeckung der constanten Kette bei galvanisch-electrischen Messungen zu kämpfen hatten, war die große Veränderlichkeit in der Stärke der Ströme, welche man einer eigenthümlichen, durch den Strom selbst herbeigeführten Oberflächenbeschaffenheit der eingetauchten Platten, der *Polarisation*, zuschrieb. Später glaubten mehrere Physiker nach Fechner's Vorgang noch einen besonderen *Widerstand des Uebergangs* annehmen zu müssen, den der Strom beim Eintritte aus festen in flüssige Leiter und umgekehrt erfahre; während Andere, Ohm an der Spitze, der Ansicht Geltung zu verschaffen suchten, daß die Thatsache der galvanischen Polarisation allein vollkommen genüge, um alle mit dem Uebergangswiderstande zusammenhängende Erscheinungen zu erklären. Diese letztere Ansicht der Sache gewann an Wahrscheinlichkeit, je mehr es gelang, das eigentliche Wesen der Polarisation zu erforschen. Man fand, daß dieselbe in allen Fällen in einer Ablagerung fremdartiger Bestandtheile auf der Oberfläche der Platten ihren Grund hat; man sah ein, daß eine solche Ablagerung die jedesmalige unmittelbare und nothwendige Folge des Stroms und der Zersetzung der Flüssigkeit sein muß; man überzeugte sich, daß durch die Entfernung der fremdartigen Theile die ursprüngliche Stromstärke stets wieder hergestellt werden konnte.

Eine Platinplatte z. B., die als negatives Glied einer galvanischen Kette von Kupfervitriol umgeben ist, beginnt mit dem Eintritte des Stroms sich mit metallischem Kupfer zu bedecken; in Zinkvitriol getaucht, erhält sie allmählig einen Zinküberzug. Hinsichtlich ihres electricischen Verhaltens muß sie also mehr und mehr die Beschaffenheit, im

(1) Compt. rend. XXIII, 546; XXIV, 980; Phil. Mag. [3] XXX, 186; Arch. ph. nat. IV, 298; Pogg. Ann. LXXI, 358; LXXIII, 609; LXXVI, 185.

Polarisation. ersten Falle einer Kupferplatte, im zweiten einer Zinkplatte annehmen, d. h. die Triebkraft des Stroms muß sich vermindern.

Wird in einer galvanischen Kette verdünnte Schwefelsäure oder eine alkalische Lösung zersetzt, so umhüllt sich die negative Polplatte mit Wasserstoff, ähnlich wie vorher mit Kupfer oder Zink; die electropositive Polplatte, wenn sie nicht in der Flüssigkeit aufgelöst wird, scheidet Sauerstoffgas aus und bedeckt sich damit. Nun bildet Sauerstoff das electronegative Ende der Spannungsreihe. Wasserstoff steht nach der positiven Seite hin jedenfalls über dem Zink (1). Liefse sich annehmen, daß die erwähnten Gasablagerungen sich in solcher Dichtigkeit ansammeln könnten, daß dadurch die unmittelbare Berührung der metallischen Oberfläche mit der Flüssigkeit aufhörte, so würden in letzterer nicht mehr zwei Metallplatten, sondern gleichsam eine Wasserstoffplatte und eine Sauerstoffplatte einander gegenüberstehen. Es ist einleuchtend, daß dadurch eine electromotorische Kraft entstehen müßte, in der Richtung entgegengesetzt der ursprünglich vorhandenen, und hinsichtlich der Größe ihrer Wirksamkeit diejenige der Kupfer-Zinkkette und selbst diejenige der Kohlen-Zinkkette bedeutend übertreffend. Die electriche Erregungskraft des Wasserstoffs zu Sauerstoff bezeichnet also die Grenze der Stärke, welche der Widerstand der Polarisation möglicherweise erreichen kann, die er jedoch selbst unter den günstigsten Verhältnissen wohl niemals wirklich erreicht.

In der gewöhnlichen (unbeständigen) Zink-Kupfer- oder Zink-Platinkette mit verdünnter Schwefelsäure geschlossen wird nur das electronegative Metall und zwar durch Wasserstoff polarisirt. Der Wasserstoff ist positiv gegen den Zink. Eine Wasserstoffhülle von hinlänglicher Dichtigkeit müßte daher die Umkehrung des Stroms zur Folge haben. Eine Polarisation von dieser Stärke kann jedoch unter gewöhnlichen Umständen nicht vorkommen, weil die secundäre

(1) Ann. Ch. Pharm. XLI, 136.

des Stroms und der Zersetzung die Polarisation so nehmen muß, bis endlich, bei immer abnehmender Menge, die noch bleibende Quantität der Zersetzung derjenigen Gasmenge ins Gleichgewicht gesetzt ist. In jedem Augenblick, sei es durch ihr Expansivvermögen, sei es durch die auflösende Kraft der Flüssigkeit, der Metallplatte wieder entfernt wird.

Es ist hiernach vor auszusehen, daß die durch Wasserstoff und Sauerstoff im Kreisläufe einer wirkten Polarisation mit der Größe der electromotorischen Kraft der Kette selbst zunehmen muß, jedoch nicht, bis die oben erwähnte Grenze erreicht oder überschritten ist.

Volta war der Erste, welcher den Widerstand in der Bedeutung einer electromotorischen Kraft nicht erkannt, doch in die Ohm'sche Formel eingeführt und dieser dadurch die Gestalt :

$$Q = \frac{nK - p}{nR + r}$$

hat (1). Die Größe und der Einfluß dieser GröÙen unter verschiedenen Verhältnissen ist von mehreren Forschern näher bestimmt worden (2). Alle bekannt

Polarisation. der Platinplatten, so oft eine lebhafte Wasserzersetzung eingetreten ist, einen fast unveränderlichen, oder ausgedrückt mit der Stromstärke kaum bemerkbaren Werth annimmt. Abstand der Platten, Grösse der Einsenkungstiefe sind ohne Einfluß, insofern nur an den Punkten die Gasentwicklung lebhaft ist. Bei sehr schwachen Strömen dagegen, die von keiner direct wahrnehmbaren oder doch nur von sehr geringer Wasserzersetzung sind, vermehrt sich die Polarisation mit der Stromstärke.

Der Zahlenwerth der Polarisation, wenn sie ihre Maximalstärke erreicht hat (Platinplatten in verdünnter Schwefelsäure vorausgesetzt) übersteigt das $1\frac{1}{4}$ fache der constanten Kohlen-Zink- oder Platin-Zinkelemente erreicht also nahe die dreifache Kraft eines Kupfer-Zinkelementes. Hiernach wird es vollkommener, greiflich, daß um eine wirksame Wasserzersetzung in einer Zersetzungs-Zelle mit Platinplatten zu erhalten, nicht weniger als zwei Kohlen-Zinkelemente und nicht weniger als drei Kupfer-Zinkelemente angewendet werden müssen. Wenn indessen die Zersetzungs-Zelle aus zwei durch eine poröse Wand getrennten Abtheilungen besteht, die eine mit Aetzkali, die andere mit verdünnter Schwefelsäure gefüllt ist, und wenn dieser voltametrische Apparat in eine galvanische Kette so verbunden wird, daß der Zinkpol sich an der ins Aetzkali tauchenden Platinplatte, der Kupferpol sich an der in die Säure tauchenden Platinplatte entwickeln muß, so wird nach Poggendorff eine vollständige Wasserzersetzung durch ein einziges Grove'sches Element selbst schon durch ein Daniell'sches Paar vermög.

Poggendorff hat die sonderbare Beobachtung gemacht, daß platinirte Platinplatten in einer mit verdünnter Schwefelsäure gefüllten Zersetzungs-Zelle eine sehr geringere Polarisation erleiden, als Platten im gewöhnlichen Zustand.

(1) Berl. Acad. Ber. 1847, 440, auch Pogg. Ann. LXX Ausz. Arch. ph. nat. V, 278.

blanken Zustände. Bei genauerer Messung ergaben sich Polarisation.
folgende Resultate: (1)

1) Das Polarisations-Maximum bei den platinirten Platten ist etwa um ein Viertel seines Werthes geringer als bei den blanken Platten, und übertrifft daher nur wenig die Kraft einer einfachen Grove'schen Kette.

2) Die Polarisation bei den platinirten Platten wechselt mit den Aenderungen der Stromstärke weniger, als bei den blanken.

3) Sie gelangt bei den ersteren schneller zu ihrem Maximum, als es bei den letzteren gewöhnlich der Fall ist, wenigstens wenn sie nicht einen hohen Grad der Reinheit besitzen.

Poggendorff wurde auf dieses Verhalten der platinirten Platten dadurch aufmerksam gemacht, daß sie als Electroden mit einem einfachen Grove'schen Paare verbunden, eine sehr auffallend größere Ausbeute an Gas gaben, als blanke Platten. De la Rive hatte übrigens dieselbe Erscheinung schon im Jahre 1843 wahrgenommen (2).

Auch in verschiedenartigen Flüssigkeiten, durch deren Electrolyse Wasserstoff und Sauerstoff ausgeschieden werden, ist die Polarisation, gleiche Stromstärken vorausgesetzt, nicht gleich groß. So bewirkt eine Lösung von reinem Aetkali, und ebenso Glaubersalzlösung, einen im Verhältniß von 120 : 100 größeren Widerstand, als verdünnte Schwefelsäure. Der Grad der Concentration ist ohne Bedeutung.

Bei steigender Temperatur der Zersetzungsflüssigkeit nimmt die Polarisation ab, wie Poggendorff zuerst wahrgenommen und Dr. E. Becker in Gießen in einer noch nicht veröffentlichten Arbeit durch genaue Messungen bewiesen hat.

Man hat gefunden, daß die Polarisation mit der Natur des eingetauchten Metalls bald mehr bald weniger merklichen

(1) Pogg. Ann. LXX, 186; im Ausz. Arch. ph. nat. V, 163. —

(2) Archives d'Electricité, III, 159.

Polarisation. Aenderungen unterworfen ist. Angenommen, die positive Zersetzungsplatte bleibe fortwährend Platin, die negative abwechselnd Silber, Kupfer oder ein anderes dem negativen Ende der Spannungsreihe näher liegendes Metall, so zeigt sich, so lange der Zersetzungsprocess mit Lebhaftigkeit vor sich geht, kein sehr auffallender Unterschied in der Größe der Gegenkraft [Svanberg (1)], obschon eine deutliche wahrnehmbare Zunahme, vom Platin zum Silber, zum Kupfer etc. Der Unterschied wird aber sehr bemerkbar bei der Anwendung electropositiver Metalle. Entwickelte sich z. B. der Wasserstoff an einem amalgamirten Zinkstreifen anstatt an einem Platinstreifen, so erreichte die Gegenkraft (welche in diesem Falle aus der electromotorischen Thätigkeit des Wasserstoffs zu Zink und des Zinks zu Platin zusammengesetzt ist) einen fast um die Hälfte größeren Werth (2).

Dieser Unterschied würde nicht stattfinden, die chemische Natur des eingetauchten Metalls müßte ganz gleichgültig sein, wenn der eingetauchte Streifen durch den Wasserstoff, womit er sich umgibt, von der Flüssigkeit vollständig isolirt werden könnte. Da dies nun nicht der Fall ist, so ergibt sich als nothwendige Folge, was denn auch die Erfahrung bestätigt, daß die Polarisation in Flüssigkeiten die mehr oder weniger mit Metallauflösungen gemischt sind, gewöhnlich einen größeren Werth erreicht, als in chemisch reiner, verdünnter Schwefelsäure.

A. Saweljew (3) hat die Beobachtung gemacht, daß Platinplatten, die als Pole einer electrischen Säule gedient hatten und dadurch polarisirt worden waren, selbst wenn sie anscheinend wieder ganz homogen geworden sind, sich gleichwohl gegen magnet-electrische Ströme noch ungleichartig verhalten, d. h. je nach der Richtung dieser Ströme die Entwicklung derselben entweder schwächen oder unterstützen.

(1) Pogg. Ann. LXXIII, 305; Arch. ph. nat. IV, 296. — (2) Pogg. Ann. LXXIII, 504. — (3) Pogg. Ann. LXXIII, 516.

Die neueren Arbeiten deutscher und englischer Physiker über das Wesen, den Einfluss und die Gröfse der Polarisation scheinen bis jetzt in Frankreich wenig bekannt oder beachtet worden zu sein. Marié-Davy in zwei sehr weitläufigen Abhandlungen: *Recherches expérimentales sur l'électricité Voltaïque* (1), betrachtet Uebergangswiderstand und Polarisation noch als wesentlich verschiedene Dinge, und giebt für beide bestimmte Zahlenwerthe. Er kommt im Verlaufe seiner Untersuchungen zu dem Resultate, dafs das Ohm'sche Gesetz unrichtig sei, und bemüht sich das Fehlerhafte desselben zu berichtigen. Dafs der Irrthum möglicher Weise auch in seiner Betrachtungsweise und in der Ungenauigkeit seiner Versuche (für deren Zuverlässigkeit dem Leser keine Controlle gestattet ist) liegen könne, daran scheint Marié-Davy nicht gedacht zu haben.

Derselbe Gegenstand ist auch von dem jüngeren Becquerel (2) und zwar, wie es scheint, mit mehr Gründlichkeit bearbeitet worden. Für deutsche Leser ist jedoch in diesem Theile seiner Abhandlung nichts Neues enthalten.

A. F. Svanberg (3) hat den Einfluss untersucht, welchen die Beschaffenheit, insbesondere die Sättigungsstufe der Lösungen, worin die Platten eingetaucht sind, auf die Gröfse der electromotorischen Kraft der Daniell'schen Kette äufsert. Der Einfluss der Sättigungsstufe der Kupfervitriollösung zeigte sich als unerheblich. Doch wahrscheinlich nur bei Entwicklung schwacher Ströme, da durch starke Ströme in verdünnter Kupferlösung die Kupferplatte theilweise durch Wasserstoff polarisirt wird. Wenn die Zinkplatte unamalgamirt zuerst in eine concentrirte und dann in mehr und mehr verdünnte Lösungen von Zinkvitriol gestellt wurde, stieg die Kraft allmählig im Verhältnisse von 15,6 zu 16,15. Verdünnte Schwefelsäure statt des Zink-

(1) Ann. ch. phys. [3] XIX, 401. 422; XXII, 257; im Ausz. Ann. Arch. phys. nat. VII, 303. — (2) Ann. ch. phys. [3] XX, 62; im Ausz. Compt. rend. XXIV, 376; Arch. phys. nat. IV, 300. — (3) Pogg. Ann. LXXIII, 291.

Electromoto-
rische Kraft.

vitriols angewendet, bewirkte ein Sinken der Kraft bis zu 14,14. Bei Anwendung von concentrirter Glaubersalz-lösung erhob sich die Kraft bis zu 16,57, und verminderte sich nur wenig, wenn diese Flüssigkeit verdünnt wurde. Die Stromstärken, aus welchen die electromotorischen Kräfte abgeleitet wurden, blieben bei allen Versuchen dieselben.

Es ist auffallend, daß die erwähnten Ungleichheiten ganz oder doch beinahe ganz verschwinden, wenn das Zink im amalgamirten Zustande benutzt wird. Svanberg schiebt dies auf Rechnung einer unter dem Einflusse des Quecksilbers bewirkten Polarisirung der amalgamirten Zinkplatte durch Wasserstoff. Wenn indessen der Wasserstoff einen Antheil daran hätte, so müßte sich derselbe in noch höherem Grade bei den nicht amalgamirten Platten zeigen; letztere verhalten sich indessen gerade umgekehrt, electronegativ gegen die ersteren. Diese electronegative Beschaffenheit ist bekanntlich bei stark angefressenen und unreinen Zinkplatten am größten, und in diesem Umstande mag der Grund, warum nicht amalgamirte Platten in verdünnter Schwefelsäure, worin sie sogleich heftig angegriffen wurden, eine geringere electromotorische Kraft bewirkten, als in Zinkvitriol-Lösung, wohl mit größerer Wahrscheinlichkeit zu suchen sein, als in einer Ungleichheit der Contactwirkung verschiedenartiger Flüssigkeiten zum Zink. Denn aus mehreren Beobachtungsreihen, welche Buff (1) mitgetheilt hat, geht hervor, daß, so oft wenigstens starke Ströme in Bewegung sind, die flüssigen Leiter im Innern der Kette, während sie durch den Strom zersetzt werden, durch Contactwirkung auf die Oberfläche der eingetauchten festen Leiter zu dem Werthe der electromotorischen Kraft keinen in Betracht kommenden Beitrag, weder im positiven, noch im negativen Sinne, zu liefern vermögen.

Wenn man ein Gefäß durch eine poröse Wand in zwei Zellen theilt, die eine mit Schwefelsäure, die andere mit

(1) Pogg. Ann. LXXIII, 507.

Kupfervitriol füllt und zwei verbundene Kupferstreifen in ^{Electromotorische Kraft.} dieselben eintaucht, wird bekanntlich ein schwacher, jedoch andauernder Strom erhalten. Leitet man aber durch diese Kette, und selbst durch mehrere ähnlich hinter einander aufgestellte, den weit kräftigeren Strom eines einfachen Bunsen'schen Paares, dessen electromotorische Kraft vorher bestimmt worden war, so zeigt sich in der so zusammengesetzten Kette nicht die geringste Vermehrung der vorher gemessenen Triebkraft. In Folge der verstärkten Oxydation und dadurch bewirkten Verunreinigung des in die Schwefelsäure eingetauchten Kupfers bemerkt man im Gegentheil eine kleine Verminderung, die übrigens bei drei solcher Kupferstreifen hintereinander noch nicht 1 Procent der electromotorischen Kraft des Kohlen-Zinkpaares ausmachte.

Ein ähnliches Verhalten zeigten amalgamirte Zinkplatten, die in Zinkvitriollösung und Schwefelsäure eingetaucht waren. Nur war in Folge der Oxydation der einen Zinkplatte, während die andere sich mit reinem Zink bedeckte, die electromotorische Gegenkraft etwas größer geworden. Schwefelsäure, Kupfervitriol- und Zinkvitriollösung sind die Flüssigkeiten, welche als Bestandtheile in die Daniell'sche Kette eintreten. In den vorerwähnten Thatsachen liegt demnach der Beweis, daß die Kraft dieser Kette wesentlich nur auf der electricchen Verschiedenheit des metallischen Kupfers und Zinks beruht und durch eine electromotorische Wirkung der Flüssigkeiten auf die Metallfläche nicht verstärkt wird.

Bezeichnet man die Kraft der constanten Kohlen-Zinkkette bei Anwendung von gewöhnlicher Salpetersäure mit 7,16, so ist die der Daniell'schen Kette 4,207. Wurde die Kupfervitriollösung mit rauchender Salpetersäure vertauscht, die bekanntlich das Kupfer nicht angreift, so fand man 4,324. Die Gegenwart der Salpetersäure, so stark electropositiv sie sonst das Kupfer erregt, hat folglich, wenn starke Ströme in Bewegung sind, einen nur ganz geringen Einfluß auf Vermehrung der electromotorischen Kraft.

Electromotorische Kraft. Und selbst dieser geringe Einfluss scheint nicht mit der electromotorischen Thätigkeit der Salpetersäure zusammenzuhängen; denn auch andere Abwechslungen des Grünversuches (1) führten zu der Kraft 4,3 und bestätigten, dass Schwefelsäure und Zinkvitriollösung, in welche ein Kupfer-Zinkpaar eingetaucht wird, zur electromotorischen Kraft desselben keinen merklichen Beitrag liefern.

Die Kraft des Kupfers (in verdünnter Schwefelsäure) zu Platin (in rauchender Salpetersäure) wurde = 2,9 gefunden. Hierzu 4,3, nämlich die Kraft Kupfer zu Zink addirt, giebt 7,395. Die Kraft des Zinks zu Platin in rauchender Salpetersäure unmittelbar gemessen, wurde = 7,3 gefunden. Die Kraft des Zinks zu Kohle in rauchender Salpetersäure ist 7,856.

Die Polarisation des Zinks durch Wasserstoff wurde nahe = 0,9 gefunden. Die electromotorische Kraft eines mit Wasserstoff dicht umgebenen Zinkstreifens zu Platin ist demnach $7,375 + 0,9 = 8,275$. Entwickelte sich Sauerstoff am Platin, Wasserstoff am Zink, so ergab sich als verhältnissmässiger Werth der Polarisation die Zahl 16,90. Die Polarisation des Platins durch Sauerstoff entspricht folglich der Zahl $16,90 - 8,275 = 8,625$. Ungefähr dasselbe Resultat hat schon früher Poggendorff erhalten.

Aus electroscopischen und galvanometrischen Versuchen weiss man, dass ungleichartige Flüssigkeiten an ihrer Grenzfläche eine electromotorische Wirkung äussern. Es war daher anzunehmen, dass schwefelsaure Metallsalze in Schwefelsäure und Salpetersäure, und eben so beide Säuren aufeinander einen Einfluss der Art erzeugen werden.

Derselbe kann jedoch, wenn er überhaupt vorhanden ist, nur sehr gering sein, denn es gelang nicht, die Grösse desselben auf unzweifelhafte Weise durch das Maass zu bestimmen. Wohl aber bemerkt man an der Berührungsoberfläche von Salpetersäure und Kali eine, vergleichungsweise starke, electromotorische Kraft. Um sie zu bestimmen wurde

(1) Auch vergl. man Pogg. Ann. LXX, 62.

ein Glasgefäß theilweise mit rauchender Salpetersäure angefüllt, in die Mitte desselben eine Aetzkali haltende Thon-^{Electromotorische Kraft.}zelle eingesetzt und in beide Flüssigkeiten Kohlencylinder gebracht. Bei geschlossener Kette wurde der an der positiven Seite auftretende Sauerstoff unter dem gleichzeitigen Einflusse der Kohle und des Kalis sogleich zur Bildung von kohlen-saurem Kali verwendet, der an der negativen Seite sich absetzende Wasserstoff durch die Salpetersäure in Wasser oxydirt. Ein durch Polarisation bewirkter Widerstand konnte sich also nicht bilden. Die electromotorische Kraft dieser Kette war 3,59.

Die Bestimmung electromotorischer Kräfte aus der Stromstärke, mit Zugrundelegung des Ohm'schen Gesetzes, ist eines sehr hohen Grades der Genauigkeit fähig, aber sie ist nur bei constanten Ketten ausführbar. Vor längerer Zeit hat Poggendorff eine recht sinnreiche Methode angegeben, um auch die Kraft unbeständiger Ketten mit derselben Zuverlässigkeit, wie die der beständigen, zu messen. Sie beruht im Wesentlichen darauf, durch die Kraft eines constanten Elementes von bekanntem Werthe den Strom der inconstanten Kette gar nicht zum Ausbruch kommen zu lassen (1). Da dieses Verfahren, von Poggendorff die *Compensationsmethode* genannt, ungeachtet der Vortheile die es bietet, von andern Physikern, so weit bekannt, bisher nicht benutzt worden ist, so dürfte die folgende Auseinandersetzung, an diesem Orte, gerechtfertigt erscheinen.

Man denke sich ein beständiges, z. B. ein Grove'sches Paar (I) und daneben ein unbeständiges, z. B. ein Kupfer-Zinkpaar (II) in Schwefelsäure, deren electromotorische Kräfte verglichen werden sollen. Die Platten des ersteren seien durch einen Draht a unmittelbar verbunden. Ein zweiter Draht b, der ein empfindliches Galvanometer einschließt, gehe von der Platinplatte des Paares I zu der Kupferplatte des Paares II; und endlich seien beide Zinkplatten metallisch verbunden. Bei dieser Anordnung ist es

(1) Pogg. Ann. LIV, 172.

Electromoto-
rische Kraft

einleuchtend, daß der Strom des beständigen Paares an den Verbindungspunkten der Drähte a und b sich spaltet theilweise unmittelbar durch den Draht a, theilweise durch den Draht b und die Verbindungsstücke des Elementes zu der Zinkplatte I zurückzukehren trachtet. Er theilt sich der durch das unbeständige Paar etwa entwichene Strom. Er strebt, nachdem er den Draht b durch an dem Verbindungspunkte der Drähte b und a, theilweise durch a, theilweise durch die Verbindungsstücke des Elementes I zu seiner Quelle zurückzukehren.

Betrachten wir nun jeden dieser Ströme für sich und Q'' mögen ihre Stärke bei freier Entwicklung sein, K' und K'' die zugehörigen electromotorischen Kräfte. Es sei r der Leitungswiderstand des Drahtes a, ausgedrückt in Regulatorwindungen; r' der Widerstand des Theils der beständigen Kette, wenn man sich diesen theilweise unmittelbar durch den Draht a geschlossen denkt; R' der reducirte Widerstand der unbeständigen Kette, eingeschlossen den des Drahtes b.

Der reducirte Leitungswiderstand der beiden Verzweigungen des Stromes Q' , nämlich der Drahtlängen r und r' werde mit R' bezeichnet, so ist der auf die gewählte Grundeinheit (eine Regulatorwindung) bezogene Quotient $\frac{1}{R'} = \frac{1}{r} + \frac{1}{r'}$ daher $R' = \frac{r r'}{r + r'}$; der gesammte Widerstand der Kette I:

$$R' + r' = \frac{r r' + r'^2 + r' r''}{r + r'}$$

und die Stromstärke:

$$Q' = \frac{K' (r + r')}{r r' + r'^2 + r' r''}$$

Man bezeichne ferner mit R'' den reducirten Leitungswiderstand der beiden Verzweigungen r und r' des Stromes Q'' , so ist $\frac{1}{R''} = \frac{1}{r} + \frac{1}{r'}$, daher $R'' = \frac{r r'}{r + r'}$; der gesammte Widerstand der Kette II:

$$R'' + r' = \frac{r r' + r'^2 + r' r''}{r + r'}$$

und die Stromstärke :

$$Q'' = \frac{K'' (r + r')}{rr' + rr'' + r' r''}$$

Electromoto-
rische Kraft.

Die durch die Verzweigungen r und r'' laufenden Theile des Stromes Q' seien q und q'' . Es verhält sich nach dem Ohm'schen Gesetze $Q' : q = \frac{1}{R'} : \frac{1}{r}$ und $Q' : q'' = \frac{1}{R'} : \frac{1}{r''}$; hieraus folgt :

$$q = Q' \frac{R'}{r} \text{ und } q'' = Q' \frac{R'}{r''}.$$

Durch die Verzweigung r'' , nämlich durch die Verbindungsstücke des Elementes II und den Draht b , sucht der auch der ganze Strom Q'' seinen Lauf, und zwar in entgegengesetzter Richtung des Zweigstroms q'' zu nehmen. Der durch den Draht b wirklich gehende Strom ist daher :

$$q' - Q'' = Q' \frac{R'}{r''} - Q'' = \frac{K' r - K'' (r + r')}{rr' + rr'' + r' r''}$$

Hat man in dem Drahte a einen Stromregulator eingeschlossen, so läßt es sich durch passende Verlängerung oder Verkürzung dieses Drahtes dahin bringen, daß $q'' = Q''$ wird; also $K' r = K'' (r + r')$ und

$$K'' = \frac{K' r}{r + r'} \quad (\alpha)$$

In diesem Falle geht also durch den Draht b gar kein Strom, die electromotorische Kraft K'' kommt nicht zur Entwicklung, und dem durch die Kraft K' erzeugten Strome bleibt nur noch der Weg durch den Draht a offen. Es ist daher :

$$Q' = q = \frac{K'}{r' + r} \text{ und } K' = q (r' + r)$$

Diesen Werth von K' in der Gleichung (α) gesetzt, erhält man :

$$K'' = qr \quad (\beta)$$

Kennt man folglich den Leitungswiderstand r , und ist dem Drahte a eine Sinusbussole oder Tangentenbussole eingeschaltet, um die Stromstärke q messen zu können, so ergibt sich die gesuchte Kraft K'' unmittelbar aus der Gleichung (β) .

Electromoto-
rische Kraft.

Bei Anstellung des Versuchs muß die Aufmerksamkeit insbesondere darauf gerichtet sein, daß der Zeiger des in Drahte b eingeschlossenen Galvanometers sich dauernd auf Null erhalte, und auch bei wiederholtem Oeffnen und Schließen der Kette unverrückt in dieser Stellung verharre. Ohne diese Vorsicht findet man den Werth von K durch Polarisation getrübt.

Poggendorff hat schon früher die praktische Ausführbarkeit der Compensationsmethode durch einige Versuche nachgewiesen. Neuerdings kommt er aber wieder und ausführlicher auf diesen Gegenstand zurück, entwickelt alle Erfordernisse zur praktischen Benutzung seines Verfahrens und prüft dasselbe durch zahlreiche vergleichende Versuche (1). Auch hat er dieses Verfahren benutzt, um die Richtigkeit des Gesetzes der Volta'schen Spannungsreihe einer Controle zu unterwerfen. Zu diesem Behufe wurden Streifen oder Stäbe von drei verschiedenartigen Metallen zugleich in ein und dasselbe mit Flüssigkeit gefüllte Gefäß eingesenkt und abwechselnd paarweise auf ihre electromotorische Kraft untersucht. Sehr verschiedene Metalle in verschiedenen Flüssigkeiten wurden auf diese Weise der Untersuchung unterworfen, und dabei alle erdenklichen bei solchen feinen Versuchen unerlässliche Vorsichtsregeln aufs sorgfältigste beachtet.

Da die Versuchsmethode auf das Nichtzustandekommen des Stroms gegründet ist, so hätte man eigentlich erwarten sollen, daß der electromotorische Einfluß einer Flüssigkeit auf jedes der drei eingetauchten Metalle ein anderer hätte seyn müssen. Diefes war jedoch nicht, oder doch in keiner das allgemeine Gesetz störenden Weise der Fall, denn wenn auch verschiedene Flüssigkeiten die absoluten Werthe der gefundenen electromotorischen Kräfte sehr merklich änderten, so ergab sich doch eine vollständige Bestätigung des Volta'schen Gesetzes. D. h. für irgend drei aus der Reihe

(1) Berl. Acad. Ber. 1846, Juli; wovon ein Ausz. in Pogg. Ann. LXX, 60; Arch. ph. nat. IV, 399.

beliebig herausgegriffene Metalle a, b und c war immer die Electromotorische Kraft. Summe der electromotorischen Kräfte von ab und bc gleich der electromotorischen Kraft von ac. Z. B. die electromotorische Kraft von amalgamirtem Zink zu Kupfer (beide in verdünnter Salpetersäure) gleich 16,61 gesetzt, wurde die von Kupfer zu Platin gleich 11,60, die von Zink zu Platin gleich 28,18 gefunden.

Auf die drei folgenden rein theoretischen Arbeiten von G. Kirchhoff, welche sich nicht zum Auszuge eignen, müssen wir uns begnügen, den Leser hinzuweisen.

1) Ueber den Durchgang eines electrischen Stromes durch eine Ebene, insbesondere durch eine kreisförmige (1).

2) Ueber die Auflösung der Gleichungen, auf welche man bei der Untersuchung der linearen Vertheilung galvanischer Ströme geführt wird (2).

3) Ueber die Anwendbarkeit der Formeln für die Intensitäten der galvanischen Ströme in einem Systeme linearer Leiter auf Systeme, die zum Theil aus nicht linearen Leitern bestehen (3).

Man weiß, daß jeder Theil eines geschlossenen Kreises Wärme-Entwicklung in Stromleitern. von Leitern, die vom electrischen Strom durchflossen werden, eine Wärmemenge entwickelt, welche dem Quadrate der Stromstärke und der reducirten Länge des betreffenden Leiters proportional ist. Dieser Satz wurde zuerst von P. Riess für die Entladungen der in Leidener Flaschen angesammelten Electricität festgestellt (4). Seine Richtigkeit für galvanische Ströme liefs sich daraus wohl mit Wahrscheinlichkeit annehmen; experimentell erwiesen wurde sie jedoch erst mehrere Jahre später von Joule (5), durch Temperaturmessungen an Drähten und Flüssigkeiten, von E. Becquerel für flüssige Körper (6) und von Lenz durch sehr sorgsame Messungen an Metalldrähten (7).

(1) Pogg. Ann. LXIV, 497. — (2) Pogg. Ann. LXXII, 497. — (3) Pogg. Ann. LXXV, 189. — (4) Pogg. Ann. XL, 385; XLIII, 47; XLV, 1. — (5) Phil. Mag. [3] XIX, 260. — (6) Ann. ch. phys. [3] IX, 21. — (7) Pogg. Ann. LXI, 18.

Wärme-Ent-
wicklung in
Stromleitern.

Da nun dieses Gesetz für jeden der Kette eingeschlossenen Leiter, sei er fest oder flüssig, gleiche Geltung hat, so läßt sich erwarten, daß es auch für die Summe aller die Kette bildenden Leiter, d. h. für die Kette selbst richtig sein werde. Durch diesen von ihm gezogenen Schluß wurde Poggendorff (1) zu den nachstehenden weiteren Folgerungen veranlaßt.

Es sei r der reducirte Leitungswiderstand der ganzen Kette, q die Stromstärke, so gilt für die gesammte in der Zeiteinheit entwickelte Wärmemenge die Gleichung: $w = q^2 r$. Verbindet man diesen Ausdruck mit der bekannten Ohm'schen Formel: $q = \frac{K}{r}$, so erhält man: $w = qK$

oder auch $w = \frac{K^2}{r}$. Die erste Gleichung zeigt, daß für eine gegebene electromotorische Kraft die Wärmemenge wie die Stromstärke, also wie die Menge des aufgelösten Zinks, zu- und abnimmt; daß aber für eine gegebene Stromstärke die Wärmemenge sich wie die electromotorische Kraft verhält; daß z. B. durch ein Grove'sches Element bei gleicher Stromstärke im Gesammtumfange der geschlossenen Kette mehr Wärme entwickelt wird, als durch ein Daniell'sches, weil nämlich bei dem letzteren die reducirte Drahtlänge r kleiner ist.

Ferner ersieht man aus der zweiten Gleichung, daß durch Verminderung des Leitungswiderstandes bei unveränderter electromotorischer Kraft die gesammte Wärmeentwicklung gleich wie die Stromstärke selbst sich bis ins Unendliche steigern läßt.

Die Richtigkeit dieser theoretischen Betrachtungen hat Poggendorff durch einige recht passend gewählte Versuche auch experimentell gerechtfertigt (2).

Um die Wärmemenge, die durch den Strom in einem Metalldrahte erzeugt wird, zu messen, empfiehlt Poggendorff

(1) Berl. Acad. Ber. 1847, 440; Pogg. Ann. LXXIII, 337; Ann. phys. Arch. ph. nat. VIII, 204; Instit. 1848, 191. — (2) Pogg. Ann. LXXIII, 343.

Porro ein Instrument von folgender Einrichtung. Ein innerer Platindraht befindet sich in einem thermometerförmigen, mit Alkohol gefüllten Behälter spiralförmig aufgewickelt, und durchsetzt an zweien gegenüberliegenden Punkten die Glaswände. Man bestimmt seinen reducirten Leitungszustand und läßt ihn vom Strome durchlaufen. Die freiwerdende Wärme geht in die Flüssigkeit über, und bewirkt durch eine entsprechende Verlängerung der flüssigen Säule die Thermometerrohr. Poggendorff nennt diese Geräthschlange, welche vorzüglich geeignet erscheint, die Wärmewirkung des Stroms in Metalldrähten zu studiren, *Galvanometer* (1).

Wärme-Entwicklung in Stromleitern.

Hankel (2) hat einige Versuche angestellt, die Stärke elektrischer Ströme aus der Verlängerung abzuleiten, welche vom Strome durchflossener Draht in Folge der Erwärmung erfährt. Die Einrichtung des von ihm zu diesem Zwecke ausgesonnenen Instrumentes läßt sich jedoch ohne Hilfe einer Zeichnung nicht verständlich machen. Die getheilten Versuche sprechen für die Brauchbarkeit desselben; auch scheint es in einigen Fällen, namentlich zur Messung solcher Ströme, welche wie die magnet-electrischen die Richtung verändern, vor den gewöhnlichen Galvanometern wirkliche Vorzüge zu besitzen.

E. Becquerel (3) hat die bekannten Peltier'schen Versuche über Wärme- und Kälteerzeugung an den Berührungspunkten zweier verschiedenartiger Metalle, durch welche Strom geht, in der Absicht wiederholt, um den Einfluß kennen zu lernen, welchen dieses Verhalten auf den Leitungswiderstand beim Uebergange des Stroms aus einem Leiter in den andern äußert. Er konnte jedoch keinen nennenswerthen Einfluß entdecken.

Tyrtov hat bemerkt, daß, wenn man Quecksilber Pole einer Daniell'schen Batterie gebraucht und die Zelle mit irgend einem metallischen Leiter schließt, so

(1) Pogg. Ann. LXXIII, 361. — (2) Pogg. Ann. LXXV, 206. — Ann. ch. phys. [8] XX, 55.

Wärme-Ent-
wicklung in
Stromleitern.

dafs das eine Ende desselben in das Quecksilber des positiven eintaucht, das andere Ende aber nur mit der Oberfläche des negativen Pols in Berührung gebracht wird, dieses letztere Ende glühend wird und schmilzt. Verfährt man umgekehrt, so erscheint an dem Drahtende nur ein bläulicher Funke, während das Quecksilber sich stärker als vorher erhitzt und verdunstet (1).

Man erkennt sogleich die Aehnlichkeit dieses Verhaltens mit der bekannten früheren Beobachtung Neeffs (2). Tyrtov gelang es indessen nicht, dieselbe Erscheinung hervorzurufen, wenn er statt des Quecksilbers ein anderes Metall wählte. Neeff (3) bemerkt hierzu: Das Gelingen dieses Versuches erfordert, »dafs die entladende Berührung möglichst kurz dauere; denn schnell wird auch der negative Draht heifs, weil er als Leiter indifferent gegen die Pole wirkt und die Wärme des berührten positiven Pols leitet. Ferner mufs die Dicke des Drahts in einem richtigen Verhältnisse zur Stärke der Batterie stehen, er darf nicht zu dick sein. Am überzeugendsten stellt man den Versuch so an, dafs man mit jedem Pol einen Draht verbindet, jeden dieser Drähte zwischen zwei Finger nimmt und in raschen Wiederholungen mit dem einen Drahte den andern klopfend berührt; besser noch, wenn man den einen Draht sägeförmig vielfach einkerbt und mit dem andern senkrecht darüber hinführt, oft und schnell dies wiederholend.« Die erste Wahrnehmung über die Verschiedenheit des Ursprungs des electrischen Lichtes und der electrischen Wärme hat Neeff bekanntlich mit Hülfe des von ihm bereits im Jahre 1839 beschriebenen Stromunterbrechers (4) gemacht. Diese scheinbar, in Deutschland von jedermann gekannte, bei den electrischen Telegraphen mit grossem Erfolge angewendete Vorrichtung ist im Jahre 1847 von Herrn Froment in Paris von Neuem erfunden worden (5).

(1) Pogg. Ann. LXX, 85, aus den Petersb. Acad. Bull. V, 94 -

(2) Pogg. Ann. LXVI, 414. — (3) Pogg. Ann. LXIX, 142. — (4) Pogg. Ann. XLVI, 104. — (5) Compt. rend. XXIV, 428; Arch. ph. nat. IV, 294.

Die beiden Endpunkte einer galvanischen Batterie von Lichtbogen. grosser electromotorischer Kraft, einmal in Berührung gesetzt, so dass der Strom sich entwickeln konnte, lassen sich bekanntlich, je nach der Stärke der Kette mehr oder weniger, unter dem Einflusse sehr kräftiger Säulen sogar bis auf mehrere Zolle von einander entfernen, ohne dass die Fortdauer des Stroms dadurch unterbrochen wird. Man erblickt dann zwischen beiden Polen einen leuchtenden Bogen und gewahrt zugleich ein Ueberführen glühender Theilchen. Gerade dieser Uebergang fein zertheilter Substanz, der dem Strom als Leiter dient, vermittelt die Fortdauer desselben. Die Länge des Lichtbogens steht daher in enger Beziehung zu der gröfseren oder geringeren Leichtigkeit, mit welcher der Stoff der Pole sich zu zertheilen fähig ist [de la Rive (1)]. Ziemlich allgemein war bisher unter den Physikern die Meinung verbreitet, dass die den Lichtbogen begleitende Ueberführung materieller Theilchen nur von dem positiven zu dem negativen Pole vor sich gehe, und die vorerwähnte Entdeckung Neeff's, dass der positive Pol stärker als der negative erhitzt wird, schien den Schlüssel zur Erklärung dieses Verhaltens zu liefern.

Nach neueren Versuchen von van Breda in Harlem (2) ist jedoch die Sache anders, und glühende und geschmolzene Theilchen werden von beiden Polen nicht blofs gegeneinander, sondern nach allen Richtungen fortgeschleudert. Van Breda hat in verschiedenen Fällen die Gewichtsmenge der von der einen und andern Seite fortgeführten Masse bestimmt, läfst aber unentschieden, ob dieselbe nicht am positiven Pole im Uebergewicht ist.

Auch nach Beobachtungen von Maas in Namur ist die mechanische Uebertragung wägbarer Materie nicht immer vom positiven zum negativen Pol gerichtet; die Richtung der Ueberführung ist vielmehr nach ihm von der Beschaffenheit der Electroden abhängig. Es war ihm gelungen,

(1) Pogg. Ann. LXXVI, 275. — (2) Compt. rend. XXIII, 462; Pogg. Ann. LXX, 326; Arch. ph. nat. III, 32.

Lichtbogen.

zwei Kohlencylinder so zuzubereiten, daß der eine im Bruch ein feineres und härteres Korn zeigte als der andere. Wurde nun der positive Pol mit dem feinkörnigen, der negative mit dem grobkörnigen verbunden, beide nach vorne zugespitzt, so entstand bei der Bildung des Flammenbogens eine Bewegung glühender Theilchen vom negativen nach der Seite des positiven Pols. Der negative Kohlencylinder zeigte sich nachher etwas ausgehöhlt, der positive nur etwas mehr abgestumpft (1). Es ist zu verwundern, daß der Verfasser nicht auch den Einfluß einer umgekehrten Richtung des Stroms untersucht hat.

Van Breda hat ein sinnreiches Mittel angewendet, um den Lichtbogen zu erzeugen, ohne beide Pole vorher in Berührung zu bringen. Er ließ nämlich zwischen beiden den Funken einer sich entladenden Leidener Flasche überschlagen. Poggendorff bemerkt hierzu, daß derselbe Kunstgriff schon früher von J. Herschel und von Sturgeon benutzt worden sei. Nach de la Rive ist Daniell der Entdecker desselben. Er beruht darauf, daß die Entladung immer mit einer Ueberführung höchst fein vertheilter Substanz verknüpft ist, welche die Kette während der zur Bildung des Bogens nothwendigen Zeit schließt (2).

Die Abweichungen der Resultate van Breda's mit denen anderer Beobachter mögen wohl darin ihren Grund haben, daß er den electricischen Strom zu lange im Gang ließ (siehe oben), so daß der glühende Zustand des positiven Endpunctes sich dem negativen mittheilte; denn auch de la Rive hat bestätigt, daß die Fortführung der Theilchen vorzugsweise vom positiven Pole ausgeht, und daß, wenn der Lichtbogen zwischen zwei gleichartigen Metalldrähten, z. B. zwischen Platin- oder Silberdrähten, gebildet wurde, immer zuerst der positive Draht glühend wurde (3).

(1) Instit. 1849, 46; Arch. ph. nat. X, 227. — (2) Pogg. Ann. LXXVI, 273. — (3) Aus Phil. Trans. 1847, 1, in Pogg. Ann. LXXVI, 270; Arch. ph. nat. IV, 350.

Als de la Rive eine Platinplatte als positiven Pol Lichtbogen. benutzte, ihr eine Platinspitze als negativen Pol gegenüber setzte und den Lichtbogen hervorzog, so bildete sich auf dem Platin ein kreisrunder blauer Fleck, ähnlich den Nobilischen Farbenringen. De la Rive betrachtet denselben als Resultat einer Oxydation des Platins (es ist nicht gesagt, ob dieses Platin frei von fremden Einmengungen war), weil er in einer Wasserstoffatmosphäre nicht entstand. Bei Umkehrung des Versuches bedeckte sich die Platinplatte rund um die über ihr stehende Platinspitze mit zahllosen kleinen Platinkügelchen, die, mit unbewaffnetem Auge betrachtet, einen weißen Fleck bildeten. Bei längerer Dauer (1 bis 2 Minuten) des Versuches schmolz die Spitze des positiven Drahtes ab. Bildete dagegen der Draht wie vorher das negative Ende, so erhitze er sich zwar, doch ohne zu schmelzen; aber die Platte wurde, wenn sie nicht sehr dick war, leicht durchbohrt.

De la Rive (1) beobachtete einen sonderbaren Einfluß des Magnetismus auf den electrischen Lichtbogen. Er verband das eine Ende der galvanischen Batterie mit einer Platte aus Platin oder einem andern nicht leichtschmelzbaren Metall, die er auf einen der Pole eines kräftigen Electromagnets legte. Wurde dann das zugespitzte Ende eines Stabs aus demselben oder einem andern Metalle, welches mit der andern Seite der Kette zusammenhing, der Platte genähert und der Lichtbogen entwickelt, so entstand, so oft der Magnet zur Thätigkeit kam, ein vorher nicht vernehmbares Geräusch, ähnlich dem bei der Entladung einer Leidener Flasche erfolgenden; zugleich mußte die Drahtspitze der Platte genähert werden, um die Fortdauer des Lichtbogens zu erhalten.

De la Rive erklärt diese Erscheinung aus dem *Widerstande*, welchen die Materie, wenn sie noch nicht hinlänglich erhitzt ist, der Zertrennung ihrer Theilchen entgegensetzt, einem Widerstande, herbeigeführt durch eine eigen-

(1) Arch. ph. nat. IV, 355.

Lichtbogen. thümliche Veränderung, welche die Einwirkung eines Magnets in der Molekularconstitution der Substanz der Pole hervorbringt.

Die Annahme eines solchen veränderten Zustandes rechtfertigt de la Rive durch die Thatsache, daß dicke Stäbe nicht nur aus Eisen, sondern auch aus jedem andern Metalle, ja daß sogar dicke Quecksilbersäulen, auf den Polen eines kräftigen Magnets gestellt, zu tönen beginnen, wenn ein starker, jedoch unterbrochener electricischer Strom hindurch geleitet wird.

Electro-thermische Zersetzung. Vor längerer Zeit (1) hat Grove zu eudiometrischen Zwecken den Gebrauch eines durch den electricischen Strom in's Glühen versetzten Platindrahts, der am obern Ende des Eudiometer-Glasglocke eingekittet ist, empfohlen, als vorzüglich geeignet, die Gase zu verpuffen oder langsam zu vereinigen, je nachdem man durch Einschaltung von Widerständen verschiedene Stromstärken anwendet, oder auch bloß die Operation gehörig leitet; denn eine geübte Hand kann nach Belieben durch bloße Aenderung der Schließungsintervalle die Gase verpuffen oder ruhig vereinigen.

Durch eine Reihe von Versuchen, die Grove neuerdings mit diesem Eudiometer anstellte, wurde er zu der wichtigen Entdeckung geleitet, daß Wasser durch stehendes glühendes Platin, gleichgültig, ob durch den electricischen Strom oder auf andere Weise in diesen Zustand versetzt in seine gasförmigen Bestandtheile zerlegt wird (2).

Natürliches Osmium-Iridium und Palladium wirken ähnlich wie das Platin. Kieselerde und andere Oxyde, die Grove versuchte, gaben nur zweifelhafte Resultate. Grove vermuthet, daß die von Wollaston zuerst beobachtete nicht-polare Wasserzersetzung, welche bei der Entladung einer electricischen Batterie durch Platinspitzen in Wasser hervorgebracht wird, auf derselben Ursache beruhe, daß keine electricische, sondern eine Wärmewirkung sei.

(1) Phil. Mag. 1841. — (2) Aus Phil. Trans. 1847. 1; in Phil. Mag. [3] XXXI, 20. 91; Pogg. Ann. LXXI, 194. 221.

Schon im Jahre 1802 bemerkte Humphry Davy, so oft die Poldrähte einer kräftigen Säule sich unter Wasser, concentrirter Schwefelsäure, Salpetersäure, Alkohol, Aether, ätherischen oder fetten Oelen vereinigten, daß im Augenblicke des Schließens unter lebhafter Lichtentwicklung eine Gasentbindung eintrat. Poggendorff, der diese Versuche wiederholt hat (1), fand, daß die Erscheinung bei inniger Berührung der Drähte verschwand, bei jedem merklichen Abstände derselben gar nicht zu Stande kam, daß es aber zwischen beiden Fällen eine Stellung gab, wobei Lichterscheinung und Gasentwicklung im Maximum waren, ohne daß die Fortdauer des Stroms auch nur einen Augenblick unterbrochen wurde (2). Poggendorff schloß hieraus, daß die Erscheinung eine Wirkung der durch den Strom erzeugten Wärme sei und folglich mit der von Grove beobachteten zusammenfalle. Wirklich wurden die genannten Flüssigkeiten mit Leichtigkeit zersetzt, als man einen Platindraht hindurchführte, von genügender Dünne, um darin unter Einwirkung des Stroms zum Glühen gebracht werden zu können.

Electro-ther-
mische
Zersetzung.

Hare in Philadelphia beseitigt die electricen Theorien von Franklin, von Dufay und von Ampère durch Einwürfe, die nach seiner Meinung von großer Erheblichkeit sind, und versucht jene Theorien durch eine andere von ihm aufgestellte zu ersetzen, wonach die electricen Erscheinungen aus einer statischen oder undulatorischen (auf entgegengesetzter Polarität der Wellen beruhender) Polarisation abzuleiten sind (3).

Neue Theorie
der
Electricität.

Das Gesetz der Wechselwirkung electricer Ströme, das electrodynamische Grundgesetz, welches Ampère aufgestellt hat, war bisher nicht in allen Punkten auf scharfe und daher unzweifelhafte experimentelle Beweise gestützt.

Electro-
Dynamik.
Electro-Dy-
namometer.

(1) Pogg. Ann. LXXI, 226; davon ein Ausz.: Arch. phys. nat. V, 352. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 229. — (3) Phil. Mag. [3] XXXII, 461; Sill. Am. J. [2] V, 280. 343; VI, 45.

Electro-Dy-
namometer.

Diese Lücke in der experimentellen Electrodynamik hat W. Weber ausgefüllt, indem er die Richtigkeit des Ampère'schen Gesetzes in seiner ganzen Ausdehnung durch scharfe Messungen nachgewiesen hat (1). Er gebrauchte hierzu ein ihm eigenthümliches Meßinstrument, von ihm *Electrodynamometer* genannt, von folgender Einrichtung: Die beiden galvanischen Leiter, deren Wechselwirkung beobachtet werden soll, bestehen in zwei dünnen mit Seide überspannenen Kupferdrähten, welche wie Multiplicatore ringförmig in den äußeren Höhlungen zweier cylindrisch geformter Rahmen aufgewunden sind. Der eine dieser Ringe umschließt einen freien Raum, welcher groß genug ist, damit der andere darin Platz finden könne, ohne die freie Beweglichkeit zu stören.

Geht nun durch die Drähte beider Ringe ein galvanischer Strom, so übt der eine auf den andern ein Drehungsmoment aus, welches am größten ist, wenn ihre Mittelpunkte zusammenfallen, und wenn die beiden Ebenen, denen die Windungen der Ringe parallel sind, einen rechten Winkel bilden. Der gemeinschaftliche Durchmesser beider Ringe ist die Drehungsaxe.

Derjenige von beiden Ringen, der sich drehen soll, hängt an zwei langen dünnen Verbindungsdrähten, senkrecht aufwärts zur Decke gehen, wo sie an zwei einander isolirten messingenen Hacken befestigt sind. denselben Hacken führen zwei Leitungsdrähte, die mit den Polen eines Electrometers in Verbindung stehen. Der electriche Strom gelangt so zu dem bewegten Ringe, obgleich dessen Drehung die geringste Reibung oder irgend ein anderes Hinderniß entgegensteht, außer dem durch die bifilare Aufhängung bewirkten, dem Sinus des Drehungswinkels proportionalen Drehungsmomente. Derselbe oder auch ein anderer electriche Strom kann durch den fest-

(1) Abhandlung bei Begründung der kön. sächs. Ges. d. Wissenschaften herausgeg. von der fürstl. Jablonowski'schen Gesellsch., 1846, 209; auch in Pogg. Ann. LXXIII, 193.

Ring geleitet werden. Die dadurch bewirkten Ablenkungen des beweglichen Ringes werden ähnlich wie bei dem Bifilar-magnetometer aus der Entfernung gemessen. Die bewegliche Rolle trägt zu diesem Zwecke einen Spiegel. Damit sich dieselbe nicht schon durch die bloße Einwirkung des Erdmagnetismus drehen könne, muß während der Ruhelage ihre Cylinderaxe mit dem magnetischen Meridiane zusammenfallen.

Electro-Dy-
namometer.

Hinsichtlich der Detailbeschreibung des Electrodynamometers müssen wir auf die Abhandlung verweisen.

Indem W. Weber denselben Strom durch beide Ringe dieses Instrumentes und zugleich um eine Galvanometer-nadel führte und aus den beobachteten Ablenkungen die ablenkenden Kräfte bestimmte, gelang es ihm, die folgenden, vorher eigentlich nur hypothetischen Gesetze, nun auch experimentell darzuthun :

Die electrodynamische Kraft der Wechsehwirkung zweier Leitungsdrähte, durch welche Ströme von gleicher Intensität gehen, ist dem Quadrate dieser Intensität proportional.

Für die electrodynamischen Wirkungen in die Ferne gelten gleiche Gesetze, wie für die magnetischen.

Das Electrodynamometer besitzt also die Eigenschaft, daß, wenn ein electrischer Strom durch beide Rollen geht, die hieraus entspringende ablenkende Kraft dem Quadrate der Stromintensität proportional ist, während bei dem Galvanometer die ablenkende Kraft nur im einfachen Verhältnisse zur Stromstärke steht. W. Weber hat von dieser Verschiedenheit beider Werkzeuge eine sinnreiche Anwendung gemacht, um Stärke und Bewegungszeit solcher electrischer Ströme, welche wie der Entladungsschlag einer Leidner Batterie nur kurze Zeit anhalten, zu messen.

Läßt man einen Strom von sehr kurzer Dauer um eine Magnethnadel gehen, so verhält sich die Einwirkung wie die Gesamtmenge der in Bewegung gesetzten Electricität, oder auch wie das Product der Stromstärke in das Zeitelement. Denn die Geschwindigkeit, welche die Nadel

Electro-Dynamometer.

gewinnt, ist zugleich von der beschleunigenden Kraft und von der Wirkungszeit abhängig. Erstere aber verhält sich wie die Stromstärke, d. h. wie die Electricitätsmenge, welche gleichzeitig durch jeden Querschnitt fließt. Wächst also die Stromstärke und vermindert sich verhältnißmäßig die Zeit, d. h. bleibt die Electricitätsmenge ungeändert, so muß auch stets gleiche Ablenkung erhalten werden. Aus der beobachteten Ablenkung läßt sich daher in diesem Falle unmittelbar nur die Menge der Electricität ableiten. Um auch ihre Intensität bestimmen zu können, ist es nöthig die Stromdauer zu kennen.

Geht derselbe Strom durch beide Rollen des Dynamometers, so geht die entsprechende ablenkende Kraft in zusammengesetzten Verhältnisse der Dauer und des Quadrates der Intensität; sie wird folglich, immer gleiche Electricitätsmengen vorausgesetzt, um so größer, je kürzer die Stromdauer. Die gleichzeitige Beobachtung der in beiden Instrumenten bewirkten Ablenkungen führt daher zu zwei von einander unabhängigen Gleichungen, von welchen die eine das Product der Dauer in die Intensität, die andere aber das Product der Dauer in das Quadrat der Intensität enthält, und aus denen somit beide Werthe abgeleitet werden können.

Weber hat versucht auf diesem Wege die Entladungszeit einer electrischen Batterie zu messen, wenn die Entladung durch eine nasse Hanfschnur von 7 Millimeter Dichte stattfand. Seine Versuche, die er indessen nur als vorläufig betrachtet, führten zu dem Resultate, daß die Entladungszeit der Länge der nassen Schnur fast proportional war und für die Länge von 2 Metre 0,0816 Secunden betrug (A. a. O. S. 295.) Dieses Resultat widerspricht übrigens keineswegs der von Wheastone gefundenen Geschwindigkeit der Electricität bei der Entladung durch Kupferdraht, wenn man bedenkt, daß das Kupfer viele Millionen mal besser leitet als das Wasser.

Diese Verbindung des Dynamometers mit dem Galvanometer ist auch von Wichtigkeit in der Physiologie zur genaueren Erforschung der Nervenirregung durch galvanische Ströme. Denn es zeigt sich dabei, daß zumal Sinnesnerven durch fort dauernde Ströme schnell abgestumpft werden, und daß daher zu solchen Versuchen häufig momentane Ströme angewendet werden müssen. Die beobachteten Sinnesindrücke hängen dann aber weniger von der Dauer des Stromes als von seiner Intensität ab, und es ist nothwendig beide zu kennen.

Electro-Dynamometer.

Das electrische Dynamometer besitzt vor dem Galvanometer den sehr bemerkenswerthen Vorzug, daß es zur Bestimmung der Intensität einer Folge entgegengesetzter Ströme, z. B. der Inductionsströme, mit derselben Sicherheit, wie zur Bestimmung eines fort dauernd gleichgerichteten Stroms gebraucht werden kann. Geht nämlich ein Strom zugleich durch die feste und durch die bewegliche Rolle, so findet eine Umkehrung der Richtung desselben gleichzeitig in beiden Rollen statt. Die Ablenkungen der Bifilarrolle sind folglich ganz unabhängig von der Richtung der durchlaufenden Ströme. Hierdurch ist es W. Weber gelungen, Inductionsströme wahrzunehmen, welche in einer Drahtrolle durch die vibrirende Bewegung einer zum Tönen angeschlagenen magnetischen Stahlstange hervorgebracht wurden.

Die electrodynamischen Inductionerscheinungen lassen sich weder aus dem Ampère'schen Gesetze, noch aus den electrostatischen Grundgesetzen vorhersehen, dergestalt, daß die Electricitätslehre jetzt drei Hauptclassen von Erscheinungen darbietet, deren innerer Zusammenhang bisher nicht nachgewiesen war. Dieser Nachweis ist von Weber gegeben worden.

Allgemeines Inductions-Gesetz.

Nach der jetzt allgemein angenommenen Vorstellungsweise befinden sich in einem jeden Stromelemente gleiche Mengen positiver und negativer Electricität, welche sich in entgegengesetztem Sinne bewegen und dadurch jene unauf-

Allgemeines
Inductions-
Gesetz.

hörliche Störung und Wiederherstellung des electrischen Gleichgewichtes herbeiführen, die wir den *electrischen Strömen* nennen. In zwei Stromelementen, die man insbesondere in's Auge faßt, hat man also vier Wechselwirkungen electrischer Massen in Betrachtung zu ziehen, zwei abstossende, zwischen den beiden positiven und zwischen den beiden negativen Massen in den Stromelementen, und zwei anziehende, zwischen der positiven Masse in dem ersten und der negativen Masse in dem zweiten, und zwischen der negativen Masse in dem ersten und der positiven in dem zweiten.

Die Resultante dieser Wirkungen würde nach den bekannten electrostatischen Gesetzen Null sein müssen, weil die gleichartigen, sich abstossenden, Massen den ungleichartigen, sich anziehenden, gleich sind und aus gleicher Entfernung auf einander wirken. Weber hat aber gezeigt, dafs, wenn diese Resultante nicht blofs für den Fall der gegenseitigen Ruhe sondern allgemein für jede Bewegung beider electrischer Massen gegen einander richtig bestimmt werden soll, zu demjenigen Werthe, welchen die electrostatischen Gesetze für die Kraft geben, welche zwei electrische Massen auf einander ausüben, noch eine von ihrer gegenseitigen Bewegung abhängige Ergänzung hinzukommen mufs. Um diese Ergänzung ausfindig zu machen, stützt er sich auf die folgenden einfachen Sätze :

- 1) Electrische Massen, welche in entgegengesetztem Sinne bewegt werden, wirken schwächer auf einander, als diejenigen, welche in gleichem Sinne bewegt werden.
- 2) Zwei electrische Massen wirken desto schwächer (abstossend oder anziehend, je nachdem sie gleichartig oder ungleichartig sind) auf einander, je gröfser das Quadrat ihrer relativen Geschwindigkeit ist.

Der erste dieser Sätze geht unmittelbar aus der Thatsache hervor : dafs zwei Stromelemente, die in einer geraden Linie liegen, mit welcher ihre Richtung zusammenfällt, einander abstossen oder anziehen, je nachdem die Be-

wegung in gleichem oder entgegengesetztem Sinne stattfindet. Die relative Geschwindigkeit, oder der Unterschied der absoluten Geschwindigkeit zweier Massen, ist positiv oder negativ, je nachdem dadurch eine gegenseitige Entfernung oder Annäherung bewirkt wird. Diese Verschiedenheit des Vorzeichens äußert aber keinen Einfluß auf die Größe der wechselseitigen Einwirkung. Die Größe der Kraft muß daher von einer geraden Potenz, also zunächst vom Quadrate der relativen Geschwindigkeit abhängig sein.

Allgemeines
Inductions-
Gesetz.

Ausgehend von diesen Gesetzen gelangte Weber zu einem mathematischen Ausdrucke, aus welchem sich die Fundamentalgesetze der Electrostatik und Electrodynamik mit gleicher Schärfe ableiten lassen, während mit derselben inneren Nothwendigkeit ein allgemeines Gesetz der Inductionerscheinungen daraus hervorgeht.

A. Lallemand in Nîmes (1) beschreibt eine Art Torsionswage, die er eingerichtet hat, um die Wirkungen inducirter Ströme aufeinander nicht nur zu beobachten, sondern auch die Stärke ihrer wechselseitigen Anziehungen oder Abstosungen zu messen. Dünne, spiralförmig in derselben Ebene gewundene Drähte sind an dem beweglichen Querbalken der Torsionswage befestigt, und andere unbewegliche Drahtgewinde werden denselben passend gegenübergestellt. Die Enden der beweglichen Spirale tauchen, wie bei dem Ampère'schen Apparate, in Quecksilbernäpfe, die senkrecht unter dem Torsionsdrahte angebracht sind. Die Reibung ist also bei diesem Instrumente nicht vermieden, daher denn auch von sehr feinen Messungen nicht die Rede sein kann. Neue Resultate hat Lallemand mit Hülfe dieses Meßapparates nicht erhalten.

Torsionswage
zum Messen
inductiver
Ströme.

Elie Wartmann in Genf hat im Laufe mehrerer Jahre 6 Abhandlungen unter dem Titel: „*Sur divers Phénomènes d'induction*“ bekannt gemacht (2). In der ersten derselben

Weber
Inductions-
Ströme.

(1) Ann. ch. phys. [3] XXII, 19. — (2) Ann. ch. phys. [3] XIX, 257. 281. 385; XXII, 5; XXIV, 218. 360; auch Archives d'électricité IV, 34; V, 440; Arch. phys. nat. IV, 49; V, 143; VII, 287; VIII, 177.

Ueber
Inductions-
Ströme.

theilt er seine Erfahrungen mit über die Art der Abhängigkeit der Inductionsströme von der Beschaffenheit der inducirenden Ströme. Die betreffenden Versuche datiren jedoch aus dem Jahre 1842 und sind mit sehr unvollkommenen Hilfsmitteln ausgeführt, so daß sie gegenwärtig wenigstens dem deutschen Publikum nichts Neues mehr bieten können.

Die zweite Abhandlung vom März 1845: *Sur la non-interférence des courants électriques*, hat zur Aufgabe die Widerlegung einer älteren Behauptung Marianini's vom Jahre 1839, wonach mehrere electriche Ströme durch denselben Leiter zu gehen vermögen, ohne einander merklich zu stören. Eine gründliche Berücksichtigung des Ohm'schen Gesetze, so wie dieselben im Jahre 1845 bereits sich ausgebildet hatten, würde vielleicht haben können, die betreffende Frage noch mit gröfserer Sicherheit zu lösen.

Die dritte, fünfte und sechste Abhandlung charakterisiren sich, wie die vorhergehende, durch negative Resultate.

Wird ein Flintglasprisma zwischen die Pole eines Electromagnets gebracht, und läßt man ein Bündel polarisirter Lichtstrahlen darauffallen, so zeigt die Entwicklung des Magnetismus keinen Einfluß auf die Stellung der dunklen Linien im Spectrum.

Weder die statische noch die dynamische Induction äußern einen Einfluß auf die Electrolyse.

Die Magnete sind unfähig, chemische Wirkungen hervorzubringen. Inductionsströme äußern keine Rückwirkung auf die Stärke (den Gesamteffect) dauernder electriche Ströme.

Der electriche Strom pflanzt sich nicht durch Strahlung fort.

Die electriche und magnetische Induction sind nach E. Wartmann's Erfahrungen ohne merklichen Einfluß auf die Elasticität tönender Körper.

In der vierten Abhandlung beschreibt der Verfasser ein Rhéotrope (Commutator), welches dem von Jakobi erfundenen Commutator (1) nachgebildet, aber einfacher ist. Es läßt sich mit gleicher Bequemlichkeit benutzen, dauernde Ströme in unterbrochne zu verwandeln, ohne ihre Richtung zu ändern, oder auch mit abwechselnder Veränderung ihrer Richtung; ferner um den einen oder anderen der beiden Inductionsströme gesondert zu gewinnen, oder auch beide nach einerlei Richtung zu führen. Die nähere Einrichtung dieses nützlichen Apparates läßt sich ohne Beihülfe der Zeichnung nicht verständlich machen; wir verweisen in dieser Beziehung auf die Abhandlung (2).

Ueber
Inductions-
Ströme.

Viele Beobachter, welche sich der magnet-electrischen Maschine zur Hervorbringung electricischer Ströme bedienen, haben die Erfahrung gemacht, daß die Stromerregung nicht, wie man erwarten möchte, mit der Umdrehungsgeschwindigkeit gleichen Schritt hält. In manchen Fällen hat sich sogar für eine gewisse Umdrehungsgeschwindigkeit ein Maximum der Stromstärke gezeigt. Man hat dieses Verhalten daraus erklärt, daß die Entstehung und das Verschwinden des Magnetismus in den Eisenkernen eine gewisse Zeit erfordere. Diese Erklärung ist jedoch, wie Lenz (3) nachgewiesen hat, nur dann ausreichend, wenn die erregten Inductionsströme von sehr geringer Stärke sind, wenn sie z. B. aufser den Drahtwindungen, worin sie sich entwickeln, noch sehr große Drahtlängen durchlaufen müssen. — Bei Strömen dagegen, die nur mit verhältnißmäßig geringen äußeren Leitungswiderständen zu kämpfen haben, nimmt für gleiche Umdrehungsgeschwindigkeit die Stromstärke um so schneller ab und erreicht bei zunehmender Drehungsgeschwindigkeit um so früher ein Maximum, je weniger der äußere Widerstand beträgt.

Magnet-elect-
rische
Maschine.

(1) Mémoire sur l'application de l'électromagnétisme au mouvement des machines, Potsdam 1835, auch Pogg. Ann. XXXVI, 366. — (2) Arch. ph. nat. V, 143; Ann. ch. phys. [3] XXII, 5; Phil. Mag. [3] XXXI, 241. — (3) Petersb. Acad. Bull. VII, 257.

Magnet-electrische Maschine.

Lenz erklärt diese Erscheinung aus der Rückwirkung der inducirten Ströme auf die Eisenkerne, wodurch in letzteren Magnetismus erzeugt wird, dessen Maximum mit dem Maximum der Stromstärke, aber eben darum nicht mit dem Maximum des primären, durch den Magnet inducirten Magnetismus (der Eisenkerne) zusammenfällt, und folglich eine Verrückung derjenigen Punkte der Drehung, bei welchen die inducirte Stromstärke 0 oder ein Maximum ist, herbeiführt. Diese Verrückung wächst mit der Stromstärke, also mit der Schnelligkeit der Umdrehung. Man begreift hiernach, warum bei den empirisch auf die Entfaltung der größten (und zwar immer nach gleicher Richtung geführten) Stromstärke gerichteten Commutatoren der Maschine der Wechsel nicht in dem Augenblicke vorgeliegt, da die Eisenkerne den Polen der Magnete gegenüberstehen, d. h. in dem Augenblicke, da, die Sache oberflächlich angesehen, die Eisenkerne den höchst möglichen Grad des Magnetismus sollten angenommen haben, die Induction in den Kupferdrähten also Null sein müßte.



Unorganische Chemie.

fair (1) hat eine Abhandlung veröffentlicht über Allgemei-
nes.
Katalyse. schen Processe, wobei man Mitwirkung katalytisch annimmt. Er spricht sich für die Ansicht aus, vielen Fällen die s. g. katalytische Kraft mit der chemischen Affinität identisch sei, und daß die der katalytisch wirkenden Substanz in derselben thätig sei, wie die des dabei sich zersetzenden Verbindung tretenden Körpers, aber unter Umständen welchen die erstere Affinität nicht befriedigt könne. Ein katalytisch wirkender Körper sei eine Substanz, welche wirke durch Zufügung ihrer eignen Affinität eines andern Körpers, oder durch Ausübung einer Anziehung, die hinlänglich sei, unter gewissen Umwandlung hervorzubringen, aber nicht stark genug, unter Bedingungen, wie Elasticität oder Cohäsion, zu

Katalyse. die Salpetersäure zu zersetzen; man fügt hinzu einen Körper B, welcher gleichfalls Affinität zu Sauerstoff hat. Durch die Summe dieser Affinitäten wird nun die Salpetersäure zersetzt, aber der ihr entzogene Sauerstoff tritt gänzlich in den Körper mit der stärkeren Affinität zu ihm, an A; B bleibt unverändert, scheint katalytisch, nur durch Contact zu wirken, obgleich seine gewöhnliche chemische Affinität den eigentlichen Vorgang bedingt.

**Einwirkung
starker Hitze
auf zusammen-
gesetzte
Gase.**

**Zersetzung
des Wassers
durch Hitze.**

Grove (1) hat die Einwirkung untersucht, welche in durch galvanische Electricität in starkem Glühen erhaltenen Platindraht auf umgebende Gase ausübt. Stickoxyd zerfällt mit Wasser gesperirt, in Stickgas und Salpetersäure (über Quecksilber bildete sich salpetrige Säure); Stickoxydul in Sauerstoff und Stickstoff; Ammoniak in Stickstoff und Wasserstoff; ölbildendes Gas in Kohle und Wasserstoff, aber nur theilweise. Kohlensäure wurde nicht verändert. Wasser und Wasserdampf wurden in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. Diese Zerlegung bewirkte G. auch, indem er Platin auch auf andere Weise glühend gemacht einwirken liefs (2). Ein Platindraht, welcher an einem Ende zu einer Kugel von der Größe einer kleinen Erbse geschmolzen, hier im Knallgasgebläse nahe zum Schmelzen erhitzt und dann rasch in Wasser getaucht war, entwickelte aus diesem ein Gemenge von Sauerstoff- und Wasserstoffgas. Wasserdampf durch eine glühende Platinröhre geleitet, zerlegte sich gleichfalls, wie auch durch electriche, in dem Dampf zwischen zwei Platinspitzen überspringende, Funken.

Wilson (3) hat die Frage discutirt, inwiefern Groves Versuche eine Zerlegung des Wassers unter denselben Umständen darthun, unter welchen es sich sonst aus seinen Bestandtheilen bildet. — Er beobachtete, daß weißglühendes Eisenoxydoxydul, wie es bei dem Verbrennen von

(1) Phil. Mag. [3] XXXI, 20. 91. 96; Ann. ch. phys. [3] XXI, 124; Ann. Ch. Pharm. LXII, 1; Arch. ph. nat. V, 18. 112; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 632. — (2) Ann. ch. phys. [3] XIX, 253; Pogg. Ann. LXX, 447. — (3) Chem. Soc. Mem. III, 332; Phil. Mag. [3] XXII, 177.

Eisen in Sauerstoff sich bildet, in Wasser Gasblasen entwickelt; er glaubte zuerst auch hier eine Zersetzung des Wassers durch Hitze annehmen zu dürfen, aber bei näherer Untersuchung fand er das entwickelte Gas aus Wasserstoff bestehend und dem Oxydxydul metallisches Eisen eingemengt.

Wilson (1) hat das Verhalten einiger wasserfreien Säuren gegen Pflanzenfarben, namentlich Lackmus, untersucht. Man hat als Beweis für die Ansicht, die s. g. Hydrate der Sauerstoffsäuren seien als Wasserstoffsäuren zu betrachten, mitunter angeführt, daß wasserfreie Wasserstoffsäuren, wie Chlorwasserstoff, sogleich Lackmus röthen, wasserfreie Sauerstoffsäuren aber nicht, wohl aber ihre Hydrate, weshalb diese als den eigentlichen Wasserstoffsäuren ähnlich constituirt anzusehen seien. Um die Gültigkeit dieser Ansicht zu untersuchen, stellte Wilson eine Reihe von Versuchen an. Wasserfreie gasförmige schweflige Säure, mit Lackmuspapier lange Zeit in Berührung, röthete es nicht; wasserfreier Schwefelwasserstoff aber that es auch nicht. Wilson macht darauf aufmerksam, daß bei solchen Versuchen nicht bloß die Abwesenheit des Wassers auf das Resultat Einfluß haben kann, sondern auch andere Umstände, z. B. daß wässerige schweflige Säure im tropfbar flüssigen Zustande, wasserfreie gewöhnlich im gasförmigen Zustande auf das Lackmus einwirkt. Um vergleichbarere Resultate über die Einwirkung wasserfreier und wässriger schwefliger Säure zu erhalten, brachte er Lackmuspapier mit flüssiger schwefliger Säure in Berührung, mit der größten Vorsicht, die Gegenwart von Wasser zu vermeiden. Während der ersten Zeit veränderte sich die blaue Farbe des Papiers nicht; nach $\frac{1}{2}$ Stunden war es dunkel purpur gefärbt, 20 Stunden später hell geröthet. Wilson glaubt, daß die schweflige Säure allmählig der organischen Substanz die Elemente des Wassers entzogen und dadurch gewässert die Röthung bewirkt habe, daß aber die

Verhalten
wasserfreier
Säuren gegen
Pflanzen-
farben.

(1) Chem. Soc. Qu. J. I, 332.

wasserfreie tropfbare schweflige Säure das Lackmus nicht röthe; übrigens lasse sich auf solche Thatsachen hin nicht Sicheres über die chemische Constitution der Säure schliessen.

Ansichten
über
die Salze.

Gerhardt (1) hat Untersuchungen über die Salze veröffentlicht. Er macht aufmerksam auf den Einfluss, den die Ordnung, in welcher man die Mischung zweier Salze bewerkstelligt, auf die Natur des Products ausübt, ob man das eine Salz zu einem Ueberschuss des andern, oder umgekehrt, gieße; weiter auf den Einfluss der Temperatur und den der Gegenwart von Wasser. Er vertheidigt die Ansicht, Säuren und Basen seien nicht von den exclusiv genannten Salzen zu trennen; Salze seien allgemein Molecularsysteme, die Wasserstoff oder Metall enthalten, welche gegen ein anderes Metall oder Wasserstoff durch doppelte Wahlverwandschaft ausgetauscht werden können (2). Willkürlich seien die Bezeichnungen neutrales, basisches, saures Salz; passender nenne man *équivalents* die Verbindungen, welche den Producten der Vereinigung gleicher Volume Wasserstoff und eines nicht metallischen Körpers entsprechen (Chlorwasserstoff z. B.), oder denen, welche aus gleichem Volumen Wasser und einer s. g. wasserfreien Säure bestehen (wie das s. g. Schwefelsäurehydrat); *sous-sels* und *sur-sels* diejenigen, welche die Elemente eines *équivalent* + respectiv — Metalloxyd enthalten.

Sauerstoff.

Keller (3) hat einige Versuche über die Entwicklung von Sauerstoff bei dem Kochen von Chlorkalk mit Wasser beschrieben.

Kolbe (4) hat Beobachtungen über die oxydirende Wirkung publicirt, welche der mittelst einer galvanischen Säule entwickelte Sauerstoff ausübt. Bei der Zersetzung

(1) J. pharm. [3] XII, 57; theilweise Ann. Ch. Pharm. LXIV, 204. — (2) Vergl. über diese Ansicht Liebig's Abhandlung über die Constitution der organischen Säuren, Ann. Ch. Pharm. (1838) XXVI, 181. — (3) Repert. Pharm. [2] XLVII, 69. — (4) Phil. Mag. [3] XXX, 204; Chem. Soc. Mem. III, 285; J. pr. Chem. XLI, 187; im Ann. Ch. Pharm. LXIV, 236; Pharm. Centr. 1847, 558.

einer concentrirten Auflösung von sesquichlorkohlenstoff- Sauerstoff.
 unterschwefelsaurem Kali durch einen galvanischen Strom
 scheidet sich überchlorsaures Kali in Krystallen aus ($\text{KO}, \text{C}_2\text{Cl}_2, \text{S}_2, \text{O}_3 + 12\text{O} = \text{KO}, \text{ClO}_7 + 2\text{SO}_3 + 2\text{CO}_2 + 2\text{Cl}$).
 Aus Chlorkaliumlösung, selbst mit Schwefelsäure versetzter,
 bildet sich unter demselben Einfluß chlorsaures und dann
 überchlorsaures Kali; aus Cyankaliumlösung cyansaures
 Kali. In concentrirter Salmiaklösung bedeckt sich die als
 positiver Pol dienende Platinplatte mit Tröpfchen von Chlor-
 stickstoff.

Bemerkungen und Versuche über die Ozontheorie hat Ozon.
 Williamson (1) mitgetheilt. Er beleuchtet kritisch die
 von Schönbein bisher aufgestellten Ansichten, spricht
 sich dafür aus, daß das Ozon Wasserstoffhyperoxyd sei,
 und erklärt seine Bildung bei der Einwirkung von Phosphor
 auf Wasserdampf und Sauerstoff nach Liebig's Ansicht
 über die Einleitung einer chemischen Verbindung durch
 Mittheilung der chemischen Thätigkeit; die Verbindung des
 Phosphors mit dem Sauerstoff veranlasse eine gleichzeitige
 Vereinigung des Wassers mit dem Sauerstoff zu Wasser-
 stoffhyperoxyd.

Ueber die Einwirkung des Ozons, Chlors und Broms
 auf Mangan- und basische Bleisalze hat Schönbein (2)
 Versuche angestellt. Ozon — mochte es mittelst Phosphor,
 bei galvanischer Zerlegung des Wassers oder durch Rei-
 bungselectricität gebildet worden sein — zerlegte die Lösung
 von Manganoxydsalzen unter Ausscheidung von Manganhy-
 peroxydhydrat, oder bräunte ein mit solcher Lösung getränk-
 tes Papier. Chlorwasser und Bromwasser wirkten unter dem
 Einfluß des directen Sonnenlichts ebenso, doch langsamer.
 Aus basisch essigsaurem Bleioxyd wurde durch ozonhaltige
 Luft, Chlor- oder Bromwasser braunes Bleihyperoxyd ge-
 bildet. — Manganoxydlösung kann somit als sympatheti-
 sche Dinte dienen, da die damit geschriebene Schrift in ozon-

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 13. — (2) Pogg. Ann. LXXII, 450.

Ozon.

haltiger Luft braun wird (1); diese Färbung verschwindet nach einiger Zeit wieder, läßt sich aber durch Ozon nochmals hervorbringen (2). — Manganoxydullösung, mit Luft und Phosphor in Berührung (wo sich bei 15 bis 20° Ozon bildet), färbt sich colombinroth, ebenso mit Phosphorsäure oder sogenannter phosphatischer Säure versetzte Manganoxydullösung bei dem Schütteln mit ozonhaltiger Luft; nach Schönbein (3) durch die Bildung von Uebermangansäure. Unter denselben Umständen bewirken auch Chlorwasser, Bromwasser oder Bleihyperoxyd, an der Stelle des Ozons angewandt, die rothe Färbung. — Schönbein hat ferner neuere Versuche über die Anwesenheit des Ozons in der atmosphärischen Luft publicirt (4). Jodkaliumkleister bläue sich in freier Luft allmähig, mit schwefelsaurem Manganoxydul getränktes Papier bräune sich allmähig, wie dieses auch in ozonhaltiger Luft, aber schneller, geschehe, hingegen nicht in abgeschlossener Luft. Es ist ihm wahrscheinlich, daß der Gehalt der Atmosphäre an Ozon mit dem Auftreten katarrhalischer Affectionen in Zusammenhang stehe.

Während der Phosphor in feuchtem Sauerstoffgas von gewöhnlicher Temperatur und Dichtigkeit kein Ozon bildet, thut er, dies nach Schönbein (5) in verdünntem oder über 24° erwärmtem, überhaupt unter den Umständen, unter welchen der Phosphor in Sauerstoff leuchtet.

Im Zusammenhang mit den Untersuchungen über Ozon hat Schönbein (6) eine Abhandlung über verschiedene chemische Zustände des Sauerstoffs publicirt. Er sucht hier die Ansicht zu begründen, der Sauerstoff könne in zweierlei Zuständen existiren, in dem gewöhnlichen und in einem wo er zur Eingehung chemischer Verbindungen geneigter sei; in letzterem Zustand unterscheidet er ihn als oxylisirten Sauerstoff.

(1) Pogg. Ann. LXXII, 457; Phil. Mag. [3] XXXI, 176; J. r. Chem. XLII, 383. — (2) Pogg. Ann. LXXV, 366. — (3) Pogg. Ann. LXXII, 459, im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 886. — (4) Pogg. Ann. LXXII, 462. — (5) Pogg. Ann. LXXV, 367. — (6) Pogg. Ann. LXXI, 517.

Er giebt an, in welchen Verbindungen er einen Gehalt an ^{Ozon} oxylisirtem Sauerstoff vermuthet, und theilt Ideen mit, welche ihm hinsichtlich der Zusammensetzung mehrerer sauerstoffhaltiger Körper eigenthümlich sind. Er äußert Bedenken gegen die Ansicht, Ozon sei Sauerstoff in einem eigenthümlich modificirten Zustand; er giebt Andeutungen über einige Folgerungen, welche bei vollständiger Begründung dieser Ansicht sich ergeben dürften.

Osann(1) beschrieb Versuche, wonach durch Electrolyse reinen Wassers kein Ozon, durch Ausströmen von Reibungselectricität in einen mit Wasserstoff erfüllten Raum aber Ozongeruch erzeugt wurde. Die Hervorbringung des Ozongeruchs mittelst Reibungselectricität fand er unverändert, mochte die Electricität aus Platin, Kupfer, Messing oder Eisen ausströmen. Er hält die Versuche für eben so wenig der Ansicht günstig, daß das Ozon eine Oxydationsstufe des Wasserstoffs, als daß es eine solche des Stickstoffs sei, und stellt in Frage, ob der electriche Ozongeruch und der auf chemische Weise hervorgebrachte demselben Wesen angehören. — In einer späteren Abhandlung (2) erkennt er die Identität des durch Phosphor und des durch Electricität dargestellten Ozons an, und beschreibt er Versuche, welche wässrige Lösungen bei der Elektrolyse Ozon geben und welche nicht (zur Darstellung von ozonisirtem Sauerstoff empfiehlt er die Electrolyse gesättigter Zinkvitriollösung, welcher noch Stücke desselben Salzes zugesetzt sind), und Beobachtungen über ozonisirte Luft überhaupt.

Ueber Zerlegung des Wassers durch Hitze vergl. S. 326. ^{Wasser.}

Tilghman(3) hat einige, zum Theil schon früher bekannte, Beobachtungen über die zersetzende Kraft des Wasserdampfs in der Hitze veröffentlicht. Wird dieser in starker Rothglühhitze über Chlorcalcium, Chlorbaryum oder Chlorstrontium geleitet, so bildet sich Salzsäure, und Kalk u. s. w. bleibt rein zurück. Bei schwacher Rothglühhitze treibt er aus

(1) Pogg. Ann. LXXI, 458. — (2) Pogg. Ann. LXXV, 886. —

(3) Aus Trans. Amer. Phil. Soc. X, 2, in Chem. Gaz. 1848, 180.

Wasser. schwefelsaurer Magnesia, bei starker aus schwefelsaurem Kalk, bei schwacher Weißglühhitze aus schwefelsaurem Baryt die Säure aus; langsam bei starker Weißglühhitze aus basisch phosphorsaurem Kalk. Kalk, Magnesia und vorzüglich Thonerde befördern wesentlich die Zersetzung von schwefelsaurem Kali und Natron und von Chlorkalium und Chlornatrium. Alaun wurde vollständig zersetzt; Feldspat bei einer Hitze, wobei er schmolz, so weit, daß die herausgenommene Masse gepulvert Wasser stark alkalisch machte und nach dem Ausziehen durch dasselbe mit Schwefelsäure etwas Alaun gab. — Solly (1) hat über Tilghman's patentirtes Verfahren, durch Einwirkung von Wasserdampf auf Kochsalz, welches mit Thonerde oder phosphorsaurem Kalk gemengt ist, in der Hitze, und nachheriges Ausziehen sofort eine stark alkalische Lauge zu erhalten, Ausführlicheres mitgetheilt.

Hydrate. Fremy (2) hat Untersuchungen angestellt über den Einfluß des Wassers auf den sauren oder basischen Charakter chemischer Verbindungen. Er kommt zu den Schlussfolgerungen: 1) daß es in den meisten Fällen nicht der Gehalt an Wasser sei, welcher das Sauersein der Säuren bedinge, weil viele Säuren in den wasserfreien Zustand versetzt werden können, ohne das Vermögen zu verlieren, sich mit Basen zu vereinigen und schwächere Säuren aus ihren Verbindungen auszutreiben; 2) daß mehrere Hydrate, wie die von Zinnoxidul, Kupferoxyd, Chromoxyd, welche sich wie schwache Säuren verhalten, diese Eigenschaft nur einem Gehalt an Wasser verdanken, und nach Verlust desselben in Alkalien nicht mehr löslich sind; 3) daß die Metazinnsäure (anomales Zinnoxid) ihren sauren Charakter nur dem Gehalt an Wasser verdanke, die Zinnsäure (an-

(1) Pharm. J. Trans. VII, 416; Ausführlicheres auch in Sill. An. I. [2] VI, 260. — (2) Im Ausz. J. pharm. [3] XI, 169; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 223; J. pr. Chem. XL, 355; Pharm. Centr. 1847, 369; vollständig Ann. ch. phys. [3] XXIII, 385; J. pr. Chem. XLV, 198; abgekürzt Pharm. Centr. 1848, 817.

males Zinnoxid) aber nicht; 4) daß der Wassergehalt auch auf die basischen Eigenschaften von Metalloxyden Einfluß zu haben scheine, da z. B. das Kupferoxydulhydrat mit denselben Säuren Salze bilde, welche das wasserfreie Kupferoxydul zersetzen. Wir führen an dieser Stelle aus Fremy's Abhandlung nur die auf die Wirkung des Wassers bezüglichen Schlusfolgerungen an, und verweisen hinsichtlich der andern Resultate auf Kupferoxydhydrat, Chromoxydhydrat, Kupferoxydulhydrat, Zinnsäure und Antimonsäure. Hydrate.

Jacquelain (1) hat Versuche angestellt über die Einwirkung starker Hitze auf Diamant und Kohle. In der Hitze, welche zwischen zwei Kohlenspitzen durch 100 Paare einer Bunsen'schen Batterie hervorgebracht wurde, erweichte der Diamant und ging in den Zustand von Koaks über; so verwandelt zeigte er das spec. Gewicht 2,678, während es vor dem Versuch 3,336 gewesen war; er war noch so hart, daß er Glas ritzte, aber bröcklich. Ein Diamant, in einer Kohlensäureatmosphäre durch ein Knallgasgebläse oder ein mit Kohlenoxyd und Sauerstoff gespeistes erhitzt, verschwand allmählig, ohne Zeichen von Erweichung; ebenso verhielt sich harte Kohle, welche aber, auch wenn sie in Chlorgas anhaltend erhitzt worden war, sich nicht frei von Unreinigkeiten zeigte, welche zu Kügelchen schmolzen, die vor dem Löthrohr mit Soda eine klare Perle gaben. Kohlenstoff.

Versuche über die Absorption des Chlorgases und des Dampfes von Brom oder Jod durch vegetabilische Kohle, so wie über die Einwirkung der letztern auf Salpetersäurehydrat und Untersalpetersäure, sind von Schönbein (2) beschrieben worden.

R. E. und W. B. Rogers (3) haben angegeben, daß Kohlensäure. Diamant durch eine Mischung von zweifach chromsaurem Kali und Schwefelsäure bei 180° bis 230° zu Kohlensäureoxydirt werde.

(1) *Compt. rend.* XXIV, 1050; *Ann. ch. phys.* XX, 459. — (2) *Pogg. Ann.* LXXIII, 826, im *Ausz. Pharm. Centr.* 1848, 139. — (3) *Instit.* 1848, 879; *Sill. Am. J.* [2] VI, 110.

Kohlensäure.

Channing (1) hat das Verhalten fester Kohle zu Basen beschrieben. In Berührung mit Kali- oder Natriumhydrat entwickelt sie hinreichend Wärme, Schwefelbaumwolle zu entzünden. Mit wasserfreiem Baryt, Strontian und Kalk entwickelt sie keine Wärme, wohl aber mit den Hydraten dieser Erden; mit Blei-, Zink- und Kupferoxyd keine, mit den Hydraten derselben, wenn über nur wenig.

W. B. und R. E. Rogers (2) haben die Absorptionsfähigkeit der Kohlensäure durch Wasser bei verschiedenen Temperaturen untersucht; 100 Vol. Wasser absorbiren ihnen bei 30 Zoll (englisch) Barometerstand an Kohlen

bei 0°	4°,4	10°,0	15°,6	21°,1	26°,7	32°,2	37°,8	65°,6
175,7	147,9	122,2	100,5	83,8	68,6	57,5	50,3	11,4 Vol.

letztere Volume auf 15°,6 reducirt gedacht. Selbst Wasser, welches unter gewöhnlichem Luftdrucke kocht, absorbirt dabei noch merklich Kohlensäure.

Dieselben (3) haben ferner angegeben, daß bei 100° Schwefelsäurehydrat 94 und rauchendes Vitriolöl 12 Volumprocente an Kohlensäure absorbiren. Noad (4) bezieht hierauf Versuche publicirt, wonach das Gewicht der durch Schwefelsäure bei Analysen z. B. entwickelten Kohlensäure füglich vernachlässigt werden kann. W. B. und R. E. Rogers haben darauf Grundversuche angeführt (5), wonach Schwefelsäurehydrat bei beständiger Berührung mit Kohlensäure (bei Durchgang eines raschen Stromes z. B.) allerdings bis zu 76 Volumprocent davon absorbiren könne, welche selbst bei Temperatur über 100° sich noch nicht vollständig entwickeln; hinsichtlich des rauchenden Vitriolöls behaupten sie bei ihrer früheren Angabe.

(1) Sill. Am. J. [2] V, 184; Chem. Gaz. 1843, 177; Pharm. Journal, 1848, 395. — (2) Sill. Am. J. [2] VI, 96. — (3) Aus Ed. M. Journal, Febr. 1848, in Chem. Gaz. 1848, 113. — (4) Chem. Gaz. 67.1 — (5) Chem. Gaz. 1848, 477.

Vorschläge zur besten Bereitung von Sationen hat ^{Kohlensäure.} Mohr (1) gemacht; über die Zwecklosigkeit oder Zweckdienlichkeit derselben haben du Mênil (2), Mohr (3) und Gräger (4) ihre Ansichten ausgetauscht.

Lassaigne (5) hat gefunden, daß 1 Gewichtstheil der nachfolgenden kohlensuren Salze bei 10° von der beigesetzten Menge Wasser, welches mit Kohlensäure gesättigt ist, gelöst wird :

Kohlens. Kalk durch 1186	Kohlens. Silberoxyd durch 961
„ Baryt durch 588	„ Zinkoxyd durch 1428
„ Strontian d. 833	Gewässertes kohlens. Kupferoxyd durch 3833
„ Manganoxyd d. 2500	Kohlens. Bleioxyd durch 7144

Bei 0° löst sich 1 kohlens. Kalk in 1428 kohlensäurehaltigem Wasser. Bei dieser Veränderlichkeit der Löslichkeit ist es unwahrscheinlich, daß (wie Lassaigne glaubt) ein bestimmtes stöchiometrisches Verhältniß zwischen dem Kohlensäuregehalt des neutralen Salzes und dem des Lösungsmittels stattfindet.

Nach J. Davy (6) löst Wasser, welches unter Druck mit Kohlensäure gesättigt ist, phosphorsuren Kalk merklich (vergl. bei phosphors. Kalk), Gyps nicht leichter als reines Wasser, Thonerde gar nicht auf.

Eine Zusammenstellung der borsuren Salze, wie sie nach den Ansichten von Laurent und Gerhardt zusammengesetzt sind, hat der erstere (7) gegeben.

Boron.
Borsäure
Salze.

Bolley (8) hat beobachtet, daß bei dem Zusammenbringen von Boraxlösung mit gelöstem Salmiak sich Ammoniak entwickelt. Wird auf 2 Aequiv. Borax 1 Aeq. Salmiak genommen, so setzen sich aus der Flüssigkeit bei sehr langsamem Verdunsten Krystallkrusten ab, von wel-

Borsäures
Natron.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 81. — (2) Arch. Pharm. [2] LI, 23; LIV, 8. — (3) Arch. Pharm. [2] LIII, 44. — (4) Arch. Pharm. [2] LV, 159. — (5) J. chim. méd. [3] IV, 312; J. pr. Chem. XLIV, 247. — (6) Aus Edinb. new. phil. Journ. XLV, 61, in Pharm. Centr. 1848, 618. — (7) Compt. rend. XXIV, 94. — (8) Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 122; in Auss. Pharm. Centr. 1849, 155; J. pr. Chem. XLVI, 410; Chem. Gaz. 1849, 60.

Borsäure
Natron.

chen sich 1 Theil in 5 bis 6 Wasser von gewöhnlicher Temperatur löst (die Lösung reagirt weder auf Curcuma noch auf Lackmuspapier; verdünnte Schwefel- oder Salpetersäure bringen einen weissen Niederschlag von Borsäure hervor), und deren Zusammensetzung $\text{NaO}, 4\text{BO}_3 + 10\text{H}_2\text{O}$ ist. Bei überschüssigem Salmiak wird der Borax vollständig in Kochsalz und Borsäure zerlegt; Bolley ist der Ansicht, die natürlich vorkommende Borsäure könne durch Einwirkung von Salmiak auf borsäurehaltige Mineralien entstehen.

Phosphor.
Amorphe
Modification
desselben.

Schrötter (1) hat gefunden, dass die rothe Färbung, welche der Phosphor bei Einwirkung des Lichtes annimmt, nicht auf Oxydation, sondern (wie dies schon von Berzelius vermuthet wurde) auf dem Uebergang in eine andere Modification, die amorphe, beruht. Diese letztere wird nach ihm in gröfserer Menge erhalten, wenn man Phosphor in einer Atmosphäre, in welcher er sich nicht oxydiren kann, anhaltend (etwa 50 Stunden lang) bei einer seinem Siedepunkt nahen Temperatur (240 bis 250°) erhitzt. Der geschmolzene, anfangs farblose, Phosphor färbt sich bald dunkelroth und wird undurchsichtig; die neu gebildete, rothe, amorphe Modification des Phosphors wird von der gewöhnlichen durch Behandlung mit Schwefelkohlenstoff getrennt, in welchem der amorphe Phosphor unlöslich ist. Dieser letztere erscheint getrocknet als glanzloses, scharlachrothes bis dunkelkarmoisinrothes Pulver, dessen Farbe bei dem Erhitzen dunkler wird; sein spec. Gewicht ist bei 10° = 1,964, gröfser als das des gewöhnlichen Phosphors (für letztern im festen Zustand bei 10° fand Schrötter 1,826 bis 1,840, im flüssigen bei 45° 1,88). Er leuchtet im Dunkeln erst, wenn er bis nahe zu seiner Entzündungstemperatur (260°) erhitzt wird; er wird von den Lösungsmitteln des gewöhnlichen Phosphors gar nicht oder nur in geringer Menge aufgenommen; er verbindet sich mit Chlor

(1) Wien. Acad. Ber. I, 1848, 130; Ann. ch. phys. [3] XXIV, 444; im Ausz. Compt. rend. XXVII, 427; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 347.

... lässt sich der amorphe Phosphor wieder zu gewöhnlichem destilliren. — Den Siedepunkt des gewöhnlichen Phosphors fand Schrötter je unter verschiedenem Druckmaße :

165°	204mm	180°	339mm	209°	393mm	226°
170	266	200	359	218	514	230

Schrötter (1) hat hervorgehoben, dass die gelbe Färbung des Phosphors nicht auf unvollkommene Durchsichtigkeit des Phosphors zu beruhen brauche, sondern in einem bestimmten Molecularzustand begründet sein könne. Er meint es als auf der Temperatur des Wassers, in der der Phosphor geschmolzen wird, beruhend anzunehmen, dass derselbe gelb und durchscheinend, oder farblos

Schönbein (2) ist der Phosphordampf als solches geruchlos, und der Geruch, welchen der Phosphor in Gemischter, welcher gleichzeitig von Ozon und phosphoriger Säure herrührt.

Kenntnisse über die Phosphorsäure sind während der Jahre 1847 und 1848 beträchtlich erweitert worden, mehrere bisher unbekannte Modificationen dieser Säure untersucht. Eine Uebersicht über die isomeren Zu-
Phosphor-
säure.
 der Phosphorsäure hat H. Rose (3) gegeben, und

Gewöhnliche
Phosphor-
säure.

lösliche phosphorsaure Salze in einem Ueberschuß der Salzlösung löslich sind, in welcher sie durch Fällung mittelst des phosphors. Natrons entstanden; die so entstehende Auflösung hat gewöhnlich die Eigenschaft, beim Erhitzen einen starken Niederschlag zu geben, welcher bei dem Erkalten wieder verschwindet. Rose betrachtet dies als die gewöhnliche Phosphorsäure besonders charakteristisch, da bei Anwendung von überschüssigem pyrophosphors. Natron sich zwar auch eine Wiederauflösung des neu gebildeten Niederschlags und Trübung bei dem Erhitzen zeigen kann, aber nicht Verschwinden dieser Trübung bei dem Erkalten.

Phosphors.
Natron.

Nach Gerhardt (1) hält das phosphors. Natron $3\text{NaO}, \text{PO}_5$ 1 Aeq. Wasser (5,2 pC.) noch bei 100° zurück, so daß hierbei getrocknet $3\text{NaO}, \text{PO}_5 + \text{HO}$ ist; dieses Wasser entweicht vollständig noch nicht einmal bei 200° , sondern erst bei dem Glühen (2); das geglühte Salz nimmt dann 1 Aeq. Wasser mit Begierde wieder auf; schwach befeuchtet erhitzt es sich stark. Auch die entsprechende Baryt- und Kalkverbindung halten nach ihm noch bei 200° Wasser zurück.

Phosphors.
Lithion.

Rammelsberg (3) hat gefunden, daß die gewöhnliche Phosphorsäure mit Lithion wenigstens drei Verbindungen eingeht. $3\text{LiO}, \text{PO}_5$ wird erhalten durch Zersetzen von phosphors. und freiem Ammoniak zu einer sauren Auflösung von essigs. Lithion, oder nur von phosphors. Ammoniak zu einer neutralen Lösung des letzteren Salzes oder bei dem Erhitzen von kohlens. Lithion mit Wasser und schwach überschüssiger Phosphorsäure; es bildet sich ein krystallinisches Pulver, welches 1 Aeq., vor dem Glühen entweichendes, Krystallwasser enthält, sich in dem 83fachen Gewicht Wasser von 12° löst, und bei dem Erhitzen zerfällt.

(1) J. pharm. [3] XII, 63. — (2) Nach Graham's früheren Versuchen auch hier nur nach wiederholtem Pulvern und Glühen. — (3) Berl. Ann. Chem. Phys., Nov. 1848, 385; Pharm. Centr. 1849, 106; Instit. 1849, 169; ausführlicher Pogg. Ann. LXXXVI, 261.

schmilzt. — Eine Verbindung $3 \text{LiO}, \text{PO}_4 + 2 \text{LiO}, \text{HO}, \text{PO}_4 + 2 \text{HO}$ bildet sich bei dem Fällen von Chlorlithium mit phosphors. Ammoniak als ein krystallinischer Niederschlag, welcher in dem 200fachen Gewicht Wasser löslich ist, und bei 100° 2 HO verliert. — $\text{LiO}, 2 \text{HO}, \text{PO}_4$ erhält man durch Lösung des ersteren der vorstehend besprochenen Salze in Salpetersäure, Verdampfen des Ueberschusses derselben, Lösen des Rückstandes und Krystallisiren, oder durch Erhitzen von kohlen. Lithion mit überschüssiger Phosphorsäure, und Abdampfen der vom entstehenden Niederschlag getrennten Flüssigkeit, oder durch Abdampfen einer Lösung von neutralem essigs. Lithion mit Phosphorsäure; es bildet gröfsere, an der Luft zerfließliche, leicht lösliche Krystalle, verliert bei 100° kein Wasser, bei 200° 1 HO unter Uebergang in pyrophosphors. Salz.

Phosphors.
Lithion.

Nach Ludwig (1) ist der Niederschlag von gewöhnlich-phosphors. Natron und Chlorbaryum — in welcher Ordnung auch die Lösungen gemischt werden und welche sich im Ueberschufs befinden mag — $2 \text{BaO}, \text{HO}, \text{PO}_4$; 1 Gewichtstheil desselben löst sich in 4362 wässriger Flüssigkeit, welche 1,2 pC. Chlornatrium und 0,8 Chlorbaryum enthält. Wird dieser Niederschlag in Salzsäure gelöst und mit Ammoniak niedergeschlagen, so bleibt ein Theil der Phosphorsäure in Lösung, und der entstehende Niederschlag enthält Chlor, welches sich durch Auswaschen nicht entfernen läfst, aber in wechselnden Mengen; das Product einer Darstellung zeigte sich in dem 17912fachen Gewicht reinen Wassers löslich, und in 3495 eines Wassers, welches Chlorbaryum, Salmiak und Aetzammoniak enthielt, und ergab (lufttrocken) eine den Verhältnissen $15 \text{BaO}, 6 \text{PO}_4, \text{BaCl}, 6 \text{HO}$ entsprechende Zusammensetzung.

Phosphors.
Baryt.

Boussingault (2) empfahl, dem faulenden Harn ein Magnesiasalz (salzs. Magnesia z. B.) zuzusetzen, um sowohl

Phosphors.
Magnesia-
Ammoniak.

(1) Arch. Pharm. [2] LVI, 265; im Auss. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 254; Pharm. Centr. 1849, 171. — (2) Ann. ch. phys. [8] XX, 117.

die Phosphorsäure des Harns als das sich bildende Ammoniak zu sammeln, und an dem sich ausscheidenden phosphors. Magnesia-Ammoniak einen wirksamen Dünger zu gewinnen.

Phosphors.
Kalk.

Raewsky (1) schließt sich der schon früher geäußerten Ansicht an, der als künstliche Knochenerde bezeichnete phosphors. Kalk habe nicht die Zusammensetzung 8 CaO , 3 PO_5 (welche ihm Berzelius beilegte), sondern 3 CaO , PO_5 . Letztere Zusammensetzung komme indeß dem in den Knochen enthaltenen phosphors. Kalk nicht zu, sofern wenigstens die Analyse gewisser Knochen einen größeren Gehalt an Phosphorsäure ergeben habe. Den sauren phosphors. Kalk, CaO , 2 HO , PO_5 , zersetze Weingeist allerdings in freie Säure und ein phosphors. Salz, welches letztere aber nicht neutraler phosphors. Kalk sei, sondern 2 PO_5 , 3 CaO , 4 HO enthalte. Der durch Zersetzung von Chlorcalciumlösung mit der von phosphors. Natron entstehende Niederschlag habe nicht immer dieselbe Zusammensetzung; Chlorcalciumlösung zu der von phosphors. Natron gesetzt, bringe PO_5 , 2 CaO , 4 HO hervor; bei Zusatz der Lösung von phosphors. Natron zu der von Chlorcalcium entstehe hingegen PO_5 , 2 CaO , 5 HO . — Baer (2) hat Untersuchungen angestellt, zunächst in Beziehung darauf, daß der phosphors. Kalk sich bald vollständig, bald unvollständig in Essigsäure löst. Er fand, daß durch Zusatz einer Lösung von gewöhnlich-phosphors. Natron zu der von Chlorcalcium (so aber, daß ersteres nicht im Ueberschuß zugesetzt wird) ein Niederschlag gebildet wird, welcher mit Essigsäure leicht eine auch nach längerer Zeit noch klare Lösung giebt. Der bei vorwaltendem phosphors. Natron entstehende Niederschlag löse sich hingegen zwar auch in Essigsäure, aber nach einiger Zeit setzen sich aus dieser Lösung Krystalle ab. Von diesen stellte Baer eine größere Menge dar durch

(1) Compt. rend. XXVI, 205; Instit. 1848, 125; Pharm. Centr. 1848, 285. — (2) Pogg. Ann. LXXV, 152; im Ausg. Ann. Ch. Pharm. LXVII, 255; Pharm. Centr. 1849, 116.

Versetzen einer Lösung von phosphors. Natron mit Essigsäure und Zusatz von Chlorcalciumlösung. Der ausgewaschene krystallinische Niederschlag war in Salpeter- und Salzsäure leicht, in Essigsäure und Wasser schwerlöslich, und ergab (über Schwefelsäure getrocknet) die Zusammensetzung $2 \text{ CaO}, \text{HO}, \text{PO}_5 + 4 \text{ HO}$.

Phosphors.
Kalk.

Liebig (1) hat in Beziehung auf seine schon früher geäußerte Ansicht, der phosphors. Kalk sei in kochsalz-, ammoniaksalz- oder kohlensäurehaltigem Wasser löslich und werde auf diese Art den Pflanzen zugeführt, — bestimmter angegeben, daß 1 Litre mit Kohlensäure gesättigtes Wasser 0,6626 Grm. Knochenerde löst, von welchen sich bei dem Sieden 0,500 Grm. abscheiden. — Lassaigne (2) giebt an, daß Wasser, welches ein gleiches Volum Kohlensäure absorbiert enthält, bei 12stündiger Berührung bei 10° 0,000750 künstlich bereiteten basisch-phosphors. Kalk löst, 0,000166 phosphors. Kalk aus frischen und 0,000300 aus etwa 20 Jahre unter der Erde gewesenen Knochen; außerdem (3), daß 40 Cubikcentimeter Salzwasser, welches $\frac{1}{12}$ seines Gewichts Chlornatrium enthält, 0,000127 basisch-phosphors. Kalk lösen, und daß ein Gehalt des Wassers an Chlorammonium die Löslichkeit noch vermehrt. — A. Crum (4) hat untersucht, wieviel phosphors. Kalk ($3 \text{ CaO}, \text{PO}_5$) bei 37° von so verdünnten Säuren gelöst wird, daß diese auf 1 Aeq. wasserfreie Säure 1000 Aeq. Wasser enthalten. Er fand, daß 100 Theile so verdünnter Salpetersäure bei zweistündiger Berührung unter öfterem Umrühren 0,747 bis 0,768, Salzsäure 0,802 bis 0,910, Essigsäure 1,10 bis 1,12, Weinsäure 1,26 bis 1,33, Aepfelsäure 0,899 bis 0,940, Milchsäure 0,820 bis 1,150, Schwefelsäure 1,15 bis 1,30 phosphors. Kalk lösen; er sucht stöchiometrische Verhältnisse aus diesen Zahlen abzuleiten.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 128. — (2) J. chim. méd. [3] III, 11; IV, 536. — (3) J. chim. méd. [3] IV, 599. — (4) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 394; im Auss. Pharm. Centr. 1848, 141.

Phosphors.
Bleioxyd.

welche bei dem Erhitzen vor dem Schmelzen g
Erkalten aber wieder weiß wird, bis sie na
Glühen durch Abgabe einer gewissen Menge
die vorstehend besprochene Verbindung umg
wo sie dann bei dem Erhitzen nicht mehr g
Nach Heintz enthält der Niederschlag, welche
Zusammengießen wässriger Lösungen von sal
oxyd und phosphors. Natron entsteht, keine S
außer bei Gegenwart von ziemlich concentrirt
säure; jener Niederschlag hat indess keine c
sammensetzung, sofern in ihm (wenn er bei
getrocknet war) 74,7 bis 81,9 pC. Bleioxyd,
Phosphorsäure und 0,4 bis 2,7 Wasser gefun
doch war in allen Analysen der Sauerstoffgeh
oxyds und des Wassers zusammen nahe $\frac{1}{2}$ v
Phosphorsäure. — Die Verbindung 2PbO
wurde erhalten durch Fällung einer kochende
von salpetersaurem Bleioxyd durch reine Phosph
ein schöner, glänzend weißer, „perlmutterglän
stallinischer Niederschlag. — Die Verbindung
wurde rein erhalten nach den von Berzelius
scherlich angegebenen Methoden, durch u
Fällung von essigs. Bleioxyd mit phosphors.
Trocknen des weißen amorphen Niederschlag
(Glühen verminderte dann das Gewicht kaum
oder durch Digestion von 2PbO , HO , PO_5
niak. — In dem bei 110° getrockneten Nied
einer heißen Chlorbleilösung durch saures phosph
wurden 19,6 Phosphorsäure, 1,7 Chlor, 72,4 Ble
den Verlust) Sauerstoff und Wasser gefunden
Schmelzen zeigte er bei dem Erkalten weder
sations - noch eine Feuererscheinung.

Nach Gerhardt (1) hingegen giebt der
phosphors. Alkali's zu einem Ueberschuß ko

(1) Ann. ch. phys. [3] XXII, 505; Pharm. Centr. 1:
Ch. Pharm. LXVIII, 286.

sung von Chlorblei einen krystallinischen Niederschlag $2 \text{ PbO}, \text{HO}, \text{PO}_3 + \text{Pb Cl}$, welcher in Wasser unlöslich ist und bei 100° langsam seinen Wassergehalt verliert. Phosphors. Alkali zu überschüssigem salpeters. Bleioxyd gesetzt giebt nach ihm einen krystallinischen, in kaltem Wasser unlöslichen Niederschlag $3 \text{ PbO}, \text{PO}_3 + \text{PbO}, \text{NO}_3 + 2 \text{HO}$, welcher aus Salpetersäure in sechsseitigen, von einem schiefen rhombischen Prisma sich ableitenden, Tafeln krystallisire, durch kochendes Wasser in PbO, NO_3 und $3 \text{ PbO}, \text{PO}_3$ zersetzt werde (welche letztere Verbindung auch erhalten werde bei Anwendung des essigs. Bleioxyds oder durch Zusatz von salpeters. Bleioxyd zu überschüssigem phosphors. Alkali), und (1) bei dem Glühen ohne Aenderung der Form $4 \text{ PbO}, \text{PO}_3$ hinterlasse.

Phosphors.
Bleioxyd.

Schwarzenberg (2) erhielt bei dem Lösen von gelbem phosphors. Silberoxyd in Phosphorsäure und Concentriren über Schwefelsäure selbst aus der syrupdick gewordenen Lösung keine Krystalle; wohl aber schied sich weißes Krystallpulver bei Zusatz von Aether aus, welches, mit absolutem Alkohol gewaschen, die Zusammensetzung $2 \text{ AgO}, \text{HO}, \text{PO}_3$ ergab und (wie Berzelius angegeben) durch Wasser in $3 \text{ AgO}, \text{PO}_3$ und freie Phosphorsäure zersetzt wird; bei 100° entweicht kein Wasser, aber bei 170° findet die Umwandlung in pyrophosphors. Silberoxyd statt.

Phosphors.
Silberoxyd.

Schwarzenberg (3) hat Untersuchungen über die pyrophosphors. Salze publicirt. *Pyrophosphors. Kali*, $2 \text{ KO}, \text{PO}_3$ (geschmolzen), wurde erhalten durch Mischen gewöhnlicher Phosphorsäure mit alkoholischer Lösung von Kalihydrat, so dafs die Mischung etwas sauer reagirte, Zusatz von Alkohol, so dafs die Flüssigkeit milchig wird, Verdampfen und Glühen des Syrups, welcher sich nach 24 Stunden abgeschieden hat, Trennung des in der Masse ent-

Pyrophosphorsäure
Salze.

(1) J. pharm. [3] XII, 58. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 161; Pharm. Centr. 1848, 218. — (3) Inaugural-Dissertation: Untersuchungen über die pyrophosphors. Salze, Göttingen 1847; Ann. Ch. Pharm. LXV, 133; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 209; J. pr. Chem. XLVI, 247; J. Pharm. [3] XIII, 311.

Pyrophosphorsäure
Salze.

haltenen pyrophosphors. vom unlöslichen metaphosphors. Kali durch Wasser. Die wässrige Lösung reagirt alkalisch und läßt sich ohne Umwandlung in gewöhnlich phosphors. Salz kochen, wohl aber tritt diese ein bei Zusatz von Kalihydrat. Das geschmolzene Salz ist eine weisse, in der Luft zerfließende, Masse. Die syrupdicke Lösung erstarrt über Schwefelsäure zu einer blendend weissen strahligen Masse, $2 \text{ KO}, \text{ PO}_3 + 3 \text{ HO}$; 1 HO entweicht unter 100° , ein zweites At. HO bei 180° (ohne dafs das Salz dabei in gewöhnlich-phosphors. umgewandelt wird), das dritte At. HO erst bei 300° vollständig. — Bei Lösung dieses Salzes in Essigsäure und Zusatz von Alkohol scheidet sich saures pyrophosphors. Kali als ein Syrup ab, welcher über Schwefelsäure allmählig fest wird; es ist dann weifs, zerfließlich, $\text{KO}, \text{ HO}, \text{ PO}_3$; seine wässrige Lösung reagirt sauer, und läßt sich kochen ohne in gewöhnlich-phosphors. Salz überzugehen. — Wird dieses Salz mit Ammoniak übersättigt und über einem Gemenge von gebranntem Kalk und Salmiak eingedampft, so erhält man weisses zerflüchliches pyrophosphors. Kali-Ammoniak, $2 \text{ KO}, \text{ PO}_3 + \text{NH}_4\text{O}, \text{ HO}, \text{ PO}_3 + \text{HO}$, dessen Lösung bei dem Kochen unter Ammoniakverlust das vorhergehende Salz giebt. — Saures pyrophosphors. Natron, $\text{NaO}, \text{ HO}, \text{ PO}_3$, stellte Schwanzenberg dar durch Lösung von $2 \text{ NaO}, \text{ PO}_3$ (geschmolzen oder krystallisirt) in Essigsäure und Zusatz von Alkohol, wo es sich krystallinisch ausscheidet; in größeren Krystallen erhält man es, indem man über die wässrige Lösung eine Schicht Alkohol gießt. — Nach Sättigen dieses Salzes mit kohlen. Kali und Concentriren bis zu dünner Syrupconsistenz gesteht die Masse bei dem Erkalten zu einem Magneteisen, feiner, weifser, durchsichtiger Krystallnadeln von pyrophosphors. Natron-Kali, $\text{KO}, \text{ NaO}, \text{ PO}_3 + 12 \text{ HO}$. — Pyrophosphorsäure mit Ammoniak übersättigt trübte sich auf Zusatz von Alkohol, und nach 24 Stunden hatten sich kleine, zu Blättchen vereinigte, Krystallnadeln gebildet, pyrophosphors. Ammoniak, $2 \text{ NH}_4\text{O}, \text{ PO}_3$. Mit Ammoniak erhitzt

Pyrophosphorsäure Salze.

geht es in gewöhnlich phosphors. Salz über; für sich mit Wasser gekocht verliert es Ammoniak und bildet *saures pyrophosphors. Ammoniak*, welches krystallisirt erhalten wird, wenn man das eben besprochene Salz in Essigsäure löst und Alkohol zusetzt, wo sich ein dicker Syrup ausscheidet, welcher sich nach einiger Zeit in kleine perlmutterglänzende Krystallblättchen, NH_4O , HO , PO_3 , verwandelt; diese sind in Wasser leicht löslich, die Lösung reagirt sauer und verändert sich nicht bei dem Kochen. — Wird das saure Natronsalz in Wasser gelöst, mit Ammoniak übersättigt und über einem Gemenge von gebranntem Kalk und Salmiak verdunstet, so erhält man weisse Krystallprismen von *pyrophosphors. Natron - Ammoniak*, NaO , NH_4O , PO_3 + 5 HO , welche in Wasser leicht löslich sind, damit gekocht Ammoniak verlieren und in saures pyrophosphors. Natron übergehen.

Pyrophosphors. Baryt, bei 100° getrocknet 2BaO , PO_3 + HO , wird durch Fällung von Chlorbarium mit pyrophosphors. Natron oder von Barytwasser mit Pyrophosphorsäure erhalten als amorphes weisses Pulver, welches etwas löslich in Wasser, löslich in Salpetersäure und Salzsäure, unlöslich in Essigsäure und pyrophosphors. Natron ist (1). *Pyrophosphors. Strontian* wird durch Fällung von salpeters. Strontian mit pyrophosphors. Natron in der Kälte als amorphes weisses Pulver erhalten, welches in der Flüssigkeit erwärmt sich in kleine Krystalle verwandelt; die Eigenschaften sind die angeführten des Barytsalzes, die Zusammensetzung (wenn im Wasserbad getrocknet) 2SrO , PO_3 + HO ; bei Erhitzung über 100° fängt das Wasser an zu entweichen. — *Pyrophosphors. Kalk* wird durch Füllen von Chlorcalcium mit pyrophosphors. Natron als weisses amorphes Pulver erhalten, welches in wässriger schwefliger Säure gelöst und erwärmt bei dem Entweichen der schwefligen Säure krystallinische Krusten bildet; die Löslichkeits-

(1) Nach Gerhard: ist die Zusammensetzung des pyrophosphors. Barys (bei 100° getrocknet?) 2BaO , PO_3 + 2HO (J. pharm. [8] XII, 64).

Pyrophosphorsäure
Salze.

verhältnisse sind die der vorhergehenden Salze, die Zusammensetzung des amorphen wie des krystallisierten Salzes, wenn bei 100° getrocknet, $2 (2 \text{ CaO}, \text{PO}_3) + 3 \text{HO}$ (1) - *Pyrophosphors.* *Magnesia* wird aus schwefels. *Magnesia* durch *pyrophosphors.* *Natron* auch ohne Gegenwart von Ammoniumsalsen gefällt, als amorphes weißes Pulver, welches ebenso wie das vorhergehende Salz krystallinisch erhalten werden kann; sie ist etwas löslich in Wasser, vollkommen in Salpetersäure, Salzsäure und *pyrophosphors.* *Natron*; die Zusammensetzung des bei 100° getrockneten Salzes ist $2 \text{ MgO}, \text{PO}_3 + 3 \text{HO}$. *Magnesia* löst sich in einer Lösung von saurem *pyrophosphors.* *Natron* auf, aber bei dem Erwärmen scheidet sich die *pyrophosphors.* *Magnesia* ab. Die wässerige Lösung von sublimiertem Chloraluminium wird durch *pyrophosphors.* *Natron* gefällt, giebt eine amorphe, welche dem Thonerdehydrat ähnliche Masse, bei 110° getrocknet, $2 \text{ Al}_2\text{O}_3, 3 \text{PO}_3 + 10 \text{HO}$.

Chromalaunlösung mit *pyrophosphors.* *Natron* kalt gefällt giebt einen schmutzig rothen Niederschlag, kochend gefällt einen hellgrünen Niederschlag von *pyrophosphors.* *Chromoxyd*, welcher bei 100° getrocknet dunkler wird, und

(1) Der bei Fällung einer wässerigen Auflösung von *pyrophosphors.* *Natron* durch Chlorcalcium entstehende Niederschlag verschwindet nach Baer auf den Zusatz von Essigsäure, aber bedeutend schwieriger als bei gewöhnlichem phosphors. *Natron* entstehende, und nach einiger Zeit (bei Zusatz von Chlorcalciumlösung sogleich) scheidet sich *pyrophosphors.* *Kalk*, $2 \text{ CaO}, \text{PO}_3 + 4 \text{HO}$, in Krystallen ab; dieselbe Verbindung entsteht aus *pyrophosphors.* *Natron* und überschüssigem Chlorcalcium als unkrystallinischer Niederschlag. Durch allmähliges Zutropfen von Chlorcalciumlösung zu einer kochenden Auflösung von *pyrophosphors.* *Natron* wird ein krystallinischer Niederschlag $\text{CaO}, \text{NaO}, \text{PO}_3 + 4 \text{HO}$ erhalten. Wenn ebenso verfahren, aber an der Stelle des Chlorcalciums Chlorbaryum, Chlorstrontian, schwefels. *Magnesia* oder salpeters. Silberoxyd angewandt, so entstanden unkrystallinische Niederschläge, welche sich weder mit reinem noch mit ammoniakhaltigem Wasser auswaschen ließen, sondern enthielten, aber keine einfacheren stöchiometrischen Verhältnisse ergaben, so daß sie als Gemenge zu betrachten sind. (Pogg. Ann. LXXV, 184; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 255; Pharm. Centr. 1849, 117.)

getrocknet die Zusammensetzung $2 \text{Cr}_2\text{O}_3, 3 \text{PO}_5$, O hat. — Schwefels. Manganoxydul mit pyrophosphors. Natron gefällt giebt ein amorphes weißes Pulver, *pyrophosphors. Manganoxydul*, bei 100° getrocknet $2 \text{MnO}, 3 \text{HO}$, bei 120° getrocknet $2 \text{MnO}, \text{PO}_5 + \text{HO}$. — *pyrophosphors. Zinkoxyd* wird durch Fällung von schwefels. Zink durch pyrophosphors. Natron als amorphe weisse erhalten, welche bei dem Trocknen zusammenfällt, krystallinisch wird es erhalten auf die bei dem *Salz* angegebene Weise; das krystallinische bei 100° getrocknete Salz ist $2 (2 \text{ZnO}, \text{PO}_5) + 3 \text{HO}$. Dieses ist löslich in Säuren und in Alkalien; aus der ammoniakalischen Lösung fällt Alkohol eine syrupartige Masse. *pyrophosphors. Cadmiumoxyd*, durch Fällung von schwefels. Cadmiumoxyd durch pyrophosphors. Natron dargestellt ist ein weißes, schwer zu Boden sinkendes Pulver; in Lösung in schwefeliger Säure scheidet es sich in perlmutterglänzender Blättchen ab; bei 100° getrocknet ist es $2 \text{CdO}, \text{PO}_5 + 2 \text{HO}$. — Ein Eisenoxydulsalz *pyrophosphors. Natron* gefällt, giebt einen amorphen Niederschlag, an der Luft sich sogleich grünlich und später bräunlich färbenden, Niederschlag. — *Pyrophosphors. Eisenoxyd* erhalten durch Fällen einer Lösung von sublim. Eisenchlorid mit pyrophosphors. Natron, als beinahe weißes, etwas gelbliches, Pulver, bei 110° getrocknet ist es $2 \text{Fe}_2\text{O}_3, 3 \text{PO}_5 + 9 \text{HO}$. — *Pyrophosphors. Bleioxyd*, aus Bleioxyd durch pyrophosphors. Natron gefällt, ist ein amorphes weißes Pulver, bei 100° getrocknet $2 \text{PbO}, 2 \text{HO}$ (1). — *Pyrophosphors. Kupferoxyd* wird aus

Nach Gerhardt giebt pyrophosphors. Alkali zu einem Ueber-
schuss Salpeters. Bleioxyd gesetzt einen flockigen Niederschlag, wel-
cher Salpetersäure enthält, sondern die reine Verbindung $2\text{PbO}, \text{PO}_5$,
mit Zusatz von salpeters. Bleioxyd zu überschüssigem pyrophosphors.
Es sich der zuerst entstehende Niederschlag in der Hitze wieder auf,
er er dauernd geworden sei, enthalte er wechselnde Quantitäten
— Eine bestimmte Verbindung $\text{NaO}, \text{PbO}, \text{PO}_5$, könne als kör-
nigem Wasser unlöslicher, Niederschlag erhalten werden durch

Pyrophosphorsäure Salze.

einer Kupferoxydlösung durch pyrophosphors. N. amorphes grünlich weißes Pulver gefällt, welches dunkelblau wird; aus der Lösung in wässriger α Säure kann es krystallinisch erhalten werden; am krystallinisch ist es bei 100° getrocknet $2\text{CuO}, \text{PC}$. Wird dieses Salz in Ammoniak gelöst und ein Alkohol übergegossen ohne ihn mit der Lösung zu so setzen sich nach und nach ultramarinfarbene warz Krystallgruppen ab, *pyrophosphors. Kupferoxyd m oxyd - Ammoniak*, über einem Gemenge von Sal gebranntem Kalk getrocknet $3(2\text{CuO}, \text{PO}_3) + 2(\text{Cu} + 8\text{HO} - \text{Schwefels. Nickeloxydul mit pyro}$ Natron zersetzt giebt *pyrophosphorsaures Nickel* hellgrünes, durch Glühen gelb werdendes, Pulver sich aus der Lösung in wässriger schwefliger Si stallinisch ausscheidet, und bei 110° getrocknet $2 + 6\text{HO}$ ist. — *Pyrophosphors. Quecksilberoxydul*, salpetersauren durch das Natronsalz gefällt, ist ein weißes, krystallinisches Pulver; frisch gefällt ist es schüssigem Natronsalz löslich, bei dem Kochen descheidet sich ein schwarzes Pulver ab; bei 100° g ist es in pyrophosphors. Natron unlöslich und sich damit; so getrocknet ist es $2\text{Hg}_2\text{O}, \text{PO}_3 + \text{Salpeters. Quecksilberoxyd mit pyrophosphors}$ gefällt giebt zuerst einen weißen Niederschlag, mehr Zusatz des Natronsalzes gelblichroth wird, 100° getrocknet wasserfreies *pyrophosphors. Queck* $2\text{HgO}, \text{PO}_3$, ist. — Mit Essigsäure versetztes Wismuthoxyd giebt mit Natronsalz einen amor 24 Stunden krystallinisch werdenden, weißen Nie in welchem man durch das Mikroskop zweierlei unterscheidet. Saures Natronsalz löst Wismuth nicht unbedeutender Menge. Saures Natronsalz 1

Kochen der Auflösung des ersteren Niederschlags in einem l von pyrophosphors. Natron. (Ann. ch. phys. [3] XXII, 504 Centr. 1848, 333.)

el Antimonoxyd; bei dem Concentriren der Lösung über Schwefelsäure bildet sich eine blumenkohlähnliche Masse, welche bei Digestion mit Wasser den größten Theil des gelösten gewesenen Antimonoxyds ungelöst zurückläßt. — Pyrophosphors. Silberoxyd in Ammoniak gelöst und mit Alkohol gefällt, giebt farblose kleine Nadeln, welche an der Luft Ammoniak verlieren.

H. Rose (1) hielt es für wahrscheinlich, daß man aus gewöhnlich-phosphors. Natron das eine Atom basisches Wasser austreiben könne, ohne das Salz in pyrophosphorsäures zu verwandeln. Der Versuch ergab indeß, daß zwar dem Salz bei 240° fast alles Wasser entzogen werden kann, daß es aber auch dann fast ganz in pyrophosphors. Natron umgewandelt war. Er hat die Reactionen des pyrophosphors. Natrons genau untersucht. Die Umwandlung der gelösten Pyrophosphorsäure in gewöhnliche Phosphorsäure gelingt nach Weber durch einen Ueberschuß an Alkali nur dann, wenn die zur Trockniß abgedampfte Masse vollständig geschmolzen wird, durch Säuren so vollständiger, je stärker sie sind, und am besten also durch concentrirte Schwefelsäure. — Nach Rose fällt die Pyrophosphorsäure die Eiweißlösung nicht. Nach ihm giebt es noch eine zweite Art von Pyrophosphorsäure, verschieden von derjenigen, welche in dem durch Glühen des gewöhnlich-phosphors. Natrons dargestellten pyrophosphors. Natron enthalten ist; die Salze jener Art lassen sich nach derselben ähnlicher Weise darstellen, wie die (unten zu beschreibenden) unlöslichen metaphosphors. Salze von Madgill: durch Erhitzen von Salzen mit einem Ueberschuß an Phosphorsäure, aber bei nicht so starker Hitze, daß metaphosphors. Verbindungen entstehen können. So läßt sich nach ihm aus salpeters. Kupferoxyd und Phosphorsäure ein unlösliches Kupfersalz darstellen, dessen durch Schwefelwasserstoff in wässriger Lösung abgeschiedene Verbindung sich wie gewöhnliche Pyrophosphorsäure verhält.

Pyrophosphorsäure;
Submodifikationen derselben.

(1) Am S. 837 angeführten Orte.

Pyrophosphorsäure
Doppelsalze.

Persoz (1) hat Untersuchungen über pyrophosphorsäure Doppelsalze veröffentlicht (2). Die Niederschläge, welche durch Lösen von pyrophosphors. Natron oder Kali in andern Salzlösungen hervorbringt, lösen sich in einem Ueberschuß des Fällungsmittels wieder auf; einige solcher Niederschläge (pyrophosphors. Baryt, Kalk und Silberoxyd) schwerer, andere leichter, da sie in gewissen Metalllösungen (den Lösungen von Zinnoxid und Goldoxyd z. B.) durch pyrophosphorsäure keine Fällung hervorgebracht wird. In diesen Verbindungen sind häufig die Bestandtheile mit sehr veränderten Eigenschaften enthalten; so z. B. hat die Lösung von pyrophosphors. Eisenoxyd in pyrophosphors. Natron nicht den charakteristischen Geschmack der Eisenoxydlösungen, nicht die Farbe (sie ist farblos), nicht die Reactionen derselben (Schwefelwasserstoff bringt keine Abscheidung von Schwefel hervor, sondern eine braune Färbung, Schwefelammonium grüne Färbung, erst nach einiger Zeit einen Niederschlag, welcher bei Auswaschen verschwindet und die Flüssigkeit grün färbt). Im isolirten Zustande lassen sich die pyrophosphorsäure Doppelsalze erhalten durch Zusatz von pyrophosphors. Natron oder Kali zu einer Metalllösung, bis der erste Niederschlag sich nicht mehr vermehrt, Auswaschen mit Wasser, Lösen in pyrophosphors. Natron oder Kali, und Abdampfenlassen durch freiwillige Verdunstung; – besser so, daß man pyrophosphors. Natron oder Kali zu einer verdünnten salzsauren oder schwefelsauren Auflösung der Basis, welche in ein Doppelsalz eingehen soll, zusetzt, bis der zuerst entstehende Niederschlag sich wieder auflöst (was durch Schütteln zu befördern und wobei ein Ueberschuß von pyrophosphors. Alkali möglichst zu vermeiden ist), und dann die in der Lösung überhaupt befindliche

(1) Ann. ch. phys. [3] XX, 315; Ann. Ch. Pharm. LXV, 16; Chem. XLI, 353; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 609. – (2) Güthlich'sche Uebersetzung des pyrophosphors. Natrons, leicht Doppelsalze zu erhalten hatte schon Stromeyer (Schweigger's Jahrb. LVIII, 123) hervor

Verbindungen nach einander auskrystallisiren läßt, wo, je nach der Löslichkeit der andern, das pyrophosphors. Doppelsalz zuletzt oder früher sich ausscheidet. — Bezüglich einzelner so dargestellter Doppelsalze berichtet Persoz folgendes. *Pyrophosphors. Magnesia-Natron* ist sehr unbeständig, seine Auflösung sich selbst überlassen trübt sich schnell. — *Pyrophosphors. Uranoxyd-Natron* ist rein gelb, sehr löslich, so daß seine Lösung bis zur dicken Syrupconsistenz concentrirt werden kann, ohne daß sie krystallisirt; seine Lösung wird weder durch Schwefelwasserstoff noch durch Schwefelammonium zersetzt. — Eben so wenig findet dies statt bei der Lösung von *pyrophosphors. Chromoxyd-Natron*, welche die Farbe von Nickelvitriol hat, und aus welcher keine Krystalle erhalten werden konnten. — *Pyrophosphors. Thonerde-Natron* ist farblos und leicht in Wasser löslich; die Lösung bis zu einem gewissen Grade concentrirt trübt sich unter Absatz von pyrophosphors. Thonerde. — Das *pyrophosphors. Eisenoxyd-Natron* ist farblos und leicht löslich; die Lösung kann bis zur Syrupconsistenz eingedampft werden, aber dann tritt eine ähnliche Zersetzung ein wie bei der Thonerdeverbindung; hinsichtlich der Reactionen dieses Doppelsalzes vergl. S. 352; die Zusammensetzung ist $2 \text{Fe}_2\text{O}_3, 3 \text{PO}_5 + 2 (2 \text{NaO}, \text{PO}_5) + x \text{HO}$ (1). — *Pyrophosphors. Eisenoxydul-Natron* existirt nur in Auflösung, welche sich an der Luft zersetzt; Schwefelammonium bringt sogleich eine vollständige Fällung hervor. — *Pyrophosphors. Kupferoxyd-Natron* wurde in zwei verschiedenen Verbindungsverhältnissen krystallisirt erhalten: $2 \text{CuO}, \text{PO}_5 + 2 \text{NaO}, \text{PO}_5 + 12 \text{HO}$ und $2 \text{CuO}, \text{PO}_5 + 3(2 \text{NaO}, \text{PO}_5) + 24 \text{HO}$; beide Verbindungen sind him-

(1) Fleitmann und Henneberg, welche einige der von Persoz angegebenen Versuche wiederholten, fanden für das bei 100° getrocknete *Pyrophosphors. Eisenoxyd-Natron* (erhalten durch Kochen von pyrophosphoräurem Eisenoxyd mit einer zur Lösung unzureichenden Menge von *Pyrophosphorsäurem Natron* und Fällen mit Weingeist) $2 \text{Fe}_2\text{O}_3, 3 \text{PO}_5 + 2 (2 \text{NaO}, \text{PO}_5) + 7 \text{HO}$. (Ann. Ch. Pharm. LXV, 387; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 452.)

Pyrophosphorsäure
Doppelsalze.

melblau (1). — *Pyrophosphors. Kupferoxyd-Kali* wurde sein Leichtlöslichkeit wegen nur in Spuren von Krystallen erhalten; wahrscheinlich existirt auch es in mehrfachen Verbindungsverhältnissen. — In den Lösungen von Kupferoxyd-Natron- und von Kupferoxyd-Kali-Doppelsalz brühen weder Zink noch Eisen eine Trübung hervor; ersteres überzieht sich mit einer unbedeutenden Schicht Kupfer, letzteres erst nach mehreren Tagen mit mikroskopisch kleinen Kupferkrystallen. — Goldchloridlösung mit pyrophosphors. Natron gemischt bleibt klar, in der Hitze verschwindet die gelbe Farbe des Goldchlorids; Weingeist entzieht der Mischung Chlornatrium; aus der Mischung, wenn sie im Licht und organischer Substanz geschützt sich selbst überlassen bleibt, krystallisirt nach und nach Chlornatrium aus (überschüssig zugesetzt gewesenes) pyrophosphors. Natron es bleibt eine syrupdicke Flüssigkeit, welche wahrscheinlich die Verbindung $2 \text{AuO}_3, 3 \text{PO}_3 + 2 (2 \text{NaO}, \text{PO}_3) + x \text{H}_2\text{O}$ enthält. — Die Eigenschaften der Doppelverbindung, welche Wismuth-, Blei-, Cadmium-, Quecksilber-, Zinn-, Palladium-, Platin- und Ceroxyd, Quecksilber-, Nickel-, Kobalt- und Zinnoxydul, Beryll- und Yttererde enthalten, will Persoz später beschreiben. Er schließt mit der K

(1) Fleitmann und Henneberg geben hierüber Folgendes an: Kocht man einen Ueberschuß von frisch gefälltem pyrophosphors. Kupferoxyd mit einer Lösung von pyrophosphorsaurem Natron, so scheidet sich aus der heiss filtrirten Flüssigkeit beim Erkalten weisse krystallinische in Wasser unlösliche Krusten ab, bei 100° getrocknet $3 (2 \text{CuO}, \text{PO}_3 + 2 \text{NaO}, \text{PO}_3) + 7 \text{HO}$. Die überstehende Flüssigkeit im Wasserbade concentrirt giebt einen schwach blauen, krystallinischen, in Wasser unlöslichen Absatz, bei 100° getrocknet $3 (\text{NaO}, \text{CuO}, \text{PO}_3) + 2 \text{HO}$. In Mutterlauge hiervon an der Luft sich selbst überlassen giebt zuerst Krystalle von pyrophosphorsaurem Natron, und zuletzt, wenn sie Syrupconsistenz angenommen hat, warzenförmige Gruppen eines prachtvoll blauen Salzes, bei 100° getrocknet $2 \text{CuO}, \text{PO}_3 + 3 (2 \text{NaO}, \text{PO}_3) + 4 \text{HO}$. Alle diese Salze schmelzen beim Glühen; die Zusammensetzung des erst unter ihnen scheint auch dem weissen unlöslichen Pulver anzugehören, welches sich ein Theil des Kupferoxydhydrates verwandelt, wenn es in einer Lösung von saurem pyrophosphorsaurem Natron digerirt wird (Ann. Ch. Pharm. LXV, 387; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 452.)

innerung, wie die Existenz dieser Doppelverbindungen bei analytischen Untersuchungen zu berücksichtigen sei, und daß sie auch für die Heilkunde wichtig werden können, und namentlich das pyrophosphors. Eisenoxyd-Natron in dieser Beziehung Aufmerksamkeit verdiene.

Hinsichtlich einer pyrophosphors. Doppelverbindung NaO, PbO, PO_5 vergl. S. 349, hinsichtlich einer solchen $\text{CaO, NaO, PO}_5 + 4 \text{HO}$ vergl. S. 348.

Gregory (1) hatte angegeben, daß die aus Knochen dargestellte magnesiahaltige Phosphorsäure gereinigt werden könne, indem man die geglühte Säure in Wasser löse, die Lösung wieder verdunste, und den Rückstand $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunde lang bei 315° erhalte, wo sich ein unlösliches Magnesiumsalz $2 \text{MgO, } 3 \text{PO}_5$ ausscheide; die hiervon abfiltrirte wässrige Lösung gebe reine Phosphorsäure. Berzelius (2) machte in Beziehung auf die Reinheit darauf aufmerksam, daß hierbei auf den Natrongehalt der aus Knochen bereiteten Phosphorsäure keine Rücksicht genommen sei. Maddrell (3) hat nun gefunden, daß bei dem Verfahren nach Gregory's Methode sich zuerst MgO, PO_5 ausscheidet, sodann das Salz, welches Gregory für $2 \text{MgO, } 3 \text{PO}_5$ gehalten hatte, welches aber von Maddrell als $3 (\text{MgO, PO}_5) + \text{NaO, PO}_5$ erkannt wurde; die hiervon abgeschiedene Phosphorsäure enthielt aber immer noch Magnesia und Natron. Bei dem Erhitzen eines Ueberschusses derselben mit schwefels. Nickel- oder Kobaltoxydul bis über 316° setzte sich $6 (\text{NiO, PO}_5) + \text{NaO, PO}_5$ oder $6 (\text{CoO, PO}_5) + \text{NaO, PO}_5$ ab; erstere Verbindung ist ein grünlich-gelbes Pulver, letztere prächtig rosenroth; beide sind unlöslich in Wasser und verdünnter Säure, löslich in concentrirter Schwefelsäure. — Mit reiner, aus Phosphor und Salpetersäure bereiteter, Säure stellte Maddrell folgende Salze dar : *Metaphosphors. Nickeloxydul*, NiO, PO_5 ,

Metaphosphorsäure.
Maddrell's
Salze.

(1) Ann. Ch. Pharm. LIV, 94; Pharm. Centr. 1845, 587. —
(2) Jahresbericht XXVI, 133. — (3) Phil. Mag. [3] XXX, 322; Chem. Soc. Mem. III, 273; Ann. Ch. Pharm. LXI, 58; J. pr. Chem. XLI, 131; im Ann. Pharm. Centr. 1847, 299.

Maddrell's
Salze.

als grünlich-gelbes, in Wasser und verdünnten Säuren lösliches, in concentrirter Schwefelsäure lösliches, durch Mischen von Nickelvitriollösung mit überconcentrirter Phosphorsäure, Abdampfen, Erhitzen über 316° , abgeschiedet. Ebenso wurden das *Kobaltsalz*, CoO, PO_3 und MnO, PO_3 , dargestellt, welche dem vorhergehenden nur durch die Farbe unterscheiden; ersteres ist rosenroth, letzteres weiß. — Das *Kupfersalz*, CuO, PO_3 , wurde ebenso aus salpeters. Kupfer erhalten; das *Eisensalz*, $\text{Fe}_2\text{O}_3, 3\text{PO}_3$, ebenso aus Eisenchlorid als weißes Pulver. Das *Thonerdesalz*, $\text{Al}_2\text{O}_3, 3\text{PO}_3$, schied sich als Pulver ab, als eine Lösung von Thonerde in überconcentrirter Phosphorsäure abgedampft und über 316° erhitzt wurde. Ebenso dargestellt wurden das *Chromsalz*, $\text{Cr}_2\text{O}_3, 3\text{PO}_3$, prächtig grün, auch in concentrirter Phosphorsäure unlöslich; das *Baryt-*, *Strontian-*, *Kalk-* und *Magnesiumsalz*, welche allgemein nach der Formel MeO, PO_3 zusammengesetzt sind und weiße Pulver bilden. — Nach dem Aufschmelzen von 2 Theilen chlors. Kali und 1 Theil dicker Phosphorsäure, starkem Erhitzen und Digeriren der geschmolzenen Masse mit Wasser blieb das *Kalisalz*, $\text{K}_2\text{O}, \text{PO}_3$, als weißes, in Wasser unlösliches, in verdünnten und concentrirten Säuren lösliches, Pulver zurück. Ganz ähnlich verhält sich das *Natronsalz*, NaO, PO_3 , welches ebenfalls aus salpeters. Natron dargestellt wurde; es ist gleichfalls in Wasser unlösliches weißes Pulver.

Graham's
Metaphosphorsäure.

Dieses Natronsalz unterscheidet sich also auffallend vom amorph-glasartigen metaphosphors. Natron, welches an der Luft zerfließlich ist und eine Modification der Metaphosphorsäure enthält, welche mit Kalk und Magnesia Verbindungen von Terpenthinconsistenz bildet (1). Eine dritte Modification der einbasisch

(1) Das Graham'sche metaphosphorsaure Natron giebt man mit salpetersaurem Silberoxyd einen Niederschlag, welcher abfiltrirt, mit etwas kaltem Wasser gewaschen, sodann zwischen

Metaphosphorsäure ist durch Fleitmann und Henne-^{Fleitmann u. Henneberg's Salz.}berg (1) untersucht worden, und zeichnet sich dadurch aus, daß sie mit allen Basen in Wasser auflösliche und krystallisirbare Verbindungen giebt. — Der Ausgangspunct für die Darstellung dieser Verbindungen ist das Natronsalz, welches auf zweierlei Weise erhalten werden kann. Entweder durch allmählig steigende Erhitzung des gewöhnlichen phosphors. Natron-Ammoniaks (mikrokosm. Salz), wo zuerst Ammoniak und Wasser entweichen und sich eine trockne, weisse, in Wasser zu saurer Flüssigkeit vollkommen lösliche, Salzmasse bildet, welche gepulvert und unter fleisigem Umrühren weiter erhitzt das noch übrige Wasser und die saure Reaction verliert; unterbricht man das Erhitzen, wenn sich letztere Reaction eben noch zeigt, und behandelt die Masse mit Wasser, so ergiebt sich ein unlöslicher und ein löslicher Theil, welcher letztere durch Verdunstung bei etwa 30°, nicht durch Erkalten einer heissgesättigten Lösung, zum Krystallisiren gebracht wird. Oder durch sehr langsames Abkühlen des geschmolzenen (Graham'schen) metaphosphors. Natrons (durch Glühen und Schmelzen des phosphors. Natron-Ammoniaks oder des bei der eben angegebenen Bereitung sich bildenden unlöslichen Salzes), wo eine krystallinische Masse erhalten wird, welche mit nicht allzu überschüssigem warmem Wasser behandelt eine in zwei Schichten getheilte Flüssigkeit giebt, deren gröfsere zur Krystallisation gebracht werden kann. Die auf eine dieser Arten gewonnenen Krystalle des *Natronsalzes* scheinen dem triklinometrischen System anzugehören; sie lösen sich in dem 4,5fachen Gewicht reinen Wassers und geben

papier stark ausgepresst und geschmolzen die Zusammensetzung AgO, PO_3 hat; blieb der Niederschlag über Nacht mit der Flüssigkeit in Berührung und wurde er dann mit kaltem Wasser gewaschen und bei 100° getrocknet, so war seine Zusammensetzung nach Weber $3 \text{AgO}, 2 \text{PO}_3 + \text{HO}$. (H. Rose am S. 387 angef. Orte.) — (1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 304; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 385; Gerhardt u. Laurent's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 12.

Fleitmann u.
Henneberg's
Salze.

ihm einen kühlenden, rein salzigen Geschmack; die kalte wässrige Lösung hält sich lange ohne Zersetzung, bei dem Kochen tritt saure Reaction und Zersetzung ein; in Alkohol ist das Salz gar nicht, in sehr verdünntem Weingeist schwer löslich. Die Krystalle sind $\text{NaO}, \text{PO}_3 + 4 \text{HO}$; über Schwefelsäure und im Wasserbad verlieren sie den größten Theil des Wassers. — Versetzt man eine concentrirte Lösung des Natronsalzes mit vielem salpeters. Silberoxyd (bei weniger ist eine Einnischung von Natronsalz nicht zu vermeiden), so krystallisirt allmählig das *Silbersalz* in schön durchsichtigen, anscheinend dem monoklinometrischen System angehörigen, Krystallen heraus, $3(\text{AgO}, \text{PO}_3) + 2\text{HO}(l)$. — Das *Bleisalz*, ebenso krystallisirt dargestellt, ist $\text{PbO}, \text{PO}_3 + \text{HO}$. — Aus der Mischung von Chlorbaryum und dem Natronsalz krystallisirt bei Vorwalten des erstern das *Barytsalz* $\text{BaO}, \text{PO}_3 + 2 \text{HO}$ (bei 100° verliert es $\frac{1}{2}$ des Wassergehalts) in schiefen rhombischen Prismen, bei Vorwalten des letztern ein löslicheres Doppelsalz $2(\text{BaO}, \text{PO}_3) + \text{NaO}, \text{PO}_3 + 8 \text{HO}$ in sternförmigen Gruppen (5 HO entweichen bei 100°). Auch mit Kalk und Zinkoxyd lassen sich Doppelsalze darstellen, welche auf 1 NaO 2 Aeq. der andern Basis enthalten. — Noch wird angeführt, daß sich die Kalk- und die Strontianverbindung durch schöne Krystallisation auszeichnen, die Verbindungen der Magnesia, des Zinkoxyds, des Mangan- und des Kobaltoxyds hingegen weniger gut krystallisiren.

H. Rose's
vierte Sub-
modification
der Metaphos-
phorsäure.

H. Rose (2) hat eine vollständigere Vergleichung der Eigenschaften und Reactionen der drei eben besprochenen Submodificationen der Metaphosphorsäure (in den Graham'schen, in den Maddrell'schen und in den Fleitmann und Henneberg'schen Salzen) — wenn dieser Namen bei-

(1) Die in dem Silbersalz enthaltene Säure läßt sich nach Fleitmann durch Schwefelwasserstoff leicht isoliren, und giebt dann mit kaltem Natron gesättigt wieder das ursprüngliche Natronsalz, und mit Ammoniak neutralisirt und mit salpeters. Silberoxyd versetzt wieder das krystallisirte Silbersalz (H. Rose am S. 337 angef. Ort). — (2) A. S. 337 u. 9.

beibehalten wird für die Säure, deren Salze auf 1 Aeq. Basis 1 Aeq. Säure enthalten — gegeben; als eine vierte ist nach ihm wahrscheinlich die durch Verbrennen des Phosphors erhaltene Säure zu unterscheiden, welcher es vorzugsweise eigenthümlich ist, in Chlorbaryumlösung einen starken Niederschlag hervorzubringen. Alle Submodificationen der Metaphosphorsäure (und die auflöselichen Salze derselben bei Zusatz von Essigsäure) fallen in Eiweißlösung; diese Eigenschaft kommt der Pyrophosphorsäure nicht zu, obgleich diese noch neuerdings von Berzelius angegeben wurde. Bei stärkerem Erhitzen einer concentrirten Lösung gewöhnlicher Phosphorsäure, so daß sie anfängt sich zu verflüchtigen, entsteht Metaphosphorsäure, welche Chlorbaryum sogleich stark fällt; bei einem gewissen schnellen Erhitzen kann man aber auch eine Säure erhalten, welche mit Chlorbaryum keinen Niederschlag giebt. — Weber hat Rose's frühere Angaben bestätigt, daß die geschmolzene Phosphorsäure etwas weniger Wasser enthält, als der Formel $PO_3 + HO$ entspricht; solche, die lange bei einer Temperatur erhalten war, wobei sie schwach sich zu verflüchtigen anfangt, enthielt 10,2 pC. Wasser.

H. Rose's
vierte Sub-
modification
der Metaphos-
phorsäure.

Blumenau (1) hat auf eine bei dem Erhitzen und Schmelzen von Phosphorsäure, welche aus Knochen bereitet und mit Schwefelwasserstoff, Alkohol und Schwefelsäure möglichst gereinigt war, auftretende Färbung aufmerksam gemacht, welche er der Bildung von Eisensäure oder von Uebermangansäure oder von beiden zuschreibt.


Fleitmann und Henneberg nehmen, gestützt auf den Wassergehalt mehrerer Salze und die Zusammensetzung der Doppelsalze, für alle von ihnen untersuchten oben erwähnten Salze als die wahrscheinlichste Constitution an, daß sie 3 Aeq. fixer Basis auf 3 Aeq. Phosphorsäure enthalten. Sie discutiren Graham's Ansicht über die verschiedenen Zustände der Phosphorsäure, und schloß sich Liebig's Ansicht an, die Zusammensetzung der verschie-

Andere
neue Modifica-
tionen
der Phosphor-
säure.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 117.

Neue
Modificatio-
nen der Phos-
phorsäure.

denen phosphors. Salze unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, dafs man sie bei gleichem Gehalt an Basis vergleicht, z. B. nach dem Schema (wenn MO 1 Aeq. Basis bedeutet):



wo $6 \text{ MO} + 2 \text{ PO}_3$ die gewöhnlich - phosphorsauren, $6 \text{ MO} + 3 \text{ PO}_3$ die pyrophosphorsauren, $6 \text{ MO} + 6 \text{ PO}_3$ die metaphosphorsauren Salze repräsentirt, und der Uebergang der einen Art in eine folgende als auf dem Zutreten von Phosphorsäure beruhend angesehen werden kann. Sie haben die Lücken, welche sich in obigem Schema noch ergeben, auszufüllen gesucht durch Darstellung der Salze $6 \text{ MO} + 4 \text{ PO}_3$ und $6 \text{ MO} + 5 \text{ PO}_3$.

Sie stellten zuerst die Natronverbindungen dar, und zwar durch Zusammenschmelzen der Verbindungen 6 NaO , 2 PO_3 oder 6 NaO , 3 PO_3 mit 6 NaO , 6 PO_3 in den gewünschten Verhältnissen [$2 (6 \text{ NaO}, 3 \text{ PO}_3) + (6 \text{ NaO}, 6 \text{ PO}_3)$] ist $= 18 \text{ NaO}, 12 \text{ PO}_3 = 6 \text{ NaO}, 4 \text{ PO}_3$, oder $(6 \text{ NaO}, 2 \text{ PO}_3) + (6 \text{ NaO}, 6 \text{ PO}_3) = 12 \text{ NaO} + 8 \text{ PO}_3 = 6 \text{ NaO}, 4 \text{ PO}_3$. Es werden 76,87 Graham'sches metaphosphors. Natron mit 100 wasserfreiem pyrophosphors., oder 187,27 metaphosphors. Natron mit 100 der Verbindung $3 \text{ NaO}, \text{ PO}_3$ durch Pulvern innig gemischt und längere Zeit im Schmelzen erhalten; bei dem Erkalten erstarrt die Masse krystallinisch. Ein Ueberschufs des fein gepulverten Salzes wird mit heifsem Wasser übergossen, die Flüssigkeit abfiltrirt und über Schwefelsäure oder an der Luft krystallisiren lassen. Die Krystallisation tritt oft erst nach 12 bis 24 Stunden ein und ergibt eine weifse körnige Krystallmasse, welche unter dem Mikroskop zarte Blättchen zeigt. Die Mutterlauge wird durch Ablaufenlassen getrennt, das Salz mit etwas kaltem Wasser gewaschen und zwischen Fließpapier getrocknet. Das so dargestellte Natronsalz ergab die Zusammensetzung 6 NaO auf 4 PO₃ und einen Wassergehalt, welcher zwischen 7,4 und 8,9 pC. schwankte; es löst sich in etwa 2 Theilen kalten Wassers; die Lösung reagirt schwach alkalisch, aber bald tritt eine Zersetzung (Bildung anderer phos-

phosphors. Salze) und saure Reaction ein. Diese Zersetzung tritt auch schnell ein bei Behandlung mit Essigsäure, so daß durch Auflösen darin und Füllen mit Weingeist ein gesuchtes saures Salz $4 \text{ NaO}, 2 \text{ HO}, 4 \text{ PO}_5$ nicht erhalten werden konnte. Diese Zusammensetzung kommt indeß der Masse zu, welche durch das Trocknen des sauren pyrophosphors. Natrons bei 220° entsteht; eine Auflösung dieses Salzes gab jedoch mit Silberlösung einen Niederschlag von pyrophosphors. Silberoxyd. — Durch Füllen der Lösung von $6 \text{ NaO}, 4 \text{ PO}_5$ mit Silberlösung (ist diese nicht überschüssig angewandt, so ist dem Niederschlag gewöhnlich phosphors. Silberoxyd beigemischt) wurde ein Silbersalz $6 \text{ AgO}, 4 \text{ PO}_5$ dargestellt (bei 100° getrocknet, enthält es nur eine unbedeutende Menge Wasser; sein Schmelzpunkt liegt nicht sehr hoch); durch Füllen mit schwefels. Magnesia ein Niederschlag, geglüht $6 \text{ MgO}, 4 \text{ PO}_5$; ebenso mit Chlorbaryum und Chlorcalcium $6 \text{ BaO}, 4 \text{ PO}_5$ und $6 \text{ CaO}, 4 \text{ PO}_5$; letztere drei Verbindungen sind unschmelzbar, durch zu starkes Erhitzen werden sie in Säuren unlöslich. — Fleitmann und Henneberg schlagen für die in diesen Salzen enthaltene Säure den Namen *Sesquiphosphorsäure* vor, da sie gleiche Zusammensetzungsverhältnisse zeigen wie einige von Berzelius als Sesquiphosphate benannte Salze. Ein charakteristisches Unterscheidungsmittel dieser Säure konnte nicht aufgefunden werden; in ihren Reactionen steht sie in der Mitte zwischen der Meta- und Pyrophosphorsäure. Von ersterer unterscheidet sie sich indeß durch die Unlöslichkeit der Magnesiaverbindung, von letzterer durch die Löslichkeit des Silbersalzes in einem großen Ueberschuß des Natronsalzes.

Das Natronsalz $6 \text{ NaO}, 5 \text{ PO}_5$ wurde durch Zusammenschmelzen von 2 ($6 \text{ NaO}, 6 \text{ PO}_5$) + ($6 \text{ NaO}, 3 \text{ PO}_5$) [= $18 \text{ NaO}, 15 \text{ PO}_5$ = $6 \text{ NaO}, 5 \text{ PO}_5$], d. h. 307,5 metaphosphors. auf 100 pyrophosphors. Natron dargestellt; es bildet dann eine glasartige Masse und krystallisirt noch viel schwieriger als die vorher beschriebene Natronverbindung.

Neue
Modificatio-
nen der Phos-
phorsäure.

Der Niederschlag mit Silberlösung wird leicht von einem Ueberschuß des Natronsalzes aufgelöst; geschmolzen ergiebt er die Zusammensetzung $6 \text{ AgO}, 5 \text{ PO}_3$.

Schwefel-
phosphor-
säure
 PS_2O_3 .

Chlorschwefelphosphor giebt, nach Wurtz (1), mit einem Ueberschuß einer Natronlauge von mittlerer Concentration im Wasserbad erhitzt, ein nach dem Erkalten fest werdendes Gemenge von dem Natronsalz einer Schwefel- und Phosphor enthaltenden Säure (2) und Chlornatrium ($\text{PCl}_3\text{S}_2 + 6\text{NaO} = \text{PS}_2\text{O}_3, 3\text{NaO} + 3\text{NaCl}$). Das erste reinigt man durch Waschen mit wenig kaltem Wasser und Umkrystallisiren. Die Krystalle sind dünne Blättchen, nach Provostaye (3) dem hexagonalen System angehörig, gebildet durch die vorherrschenden Endflächen, ein Rhomboëder R und sein erstes stumpferes — $\frac{1}{2}$ R. Für R ist die Hauptaxe = 1,92, der Seitenkantenwinkel = $104^\circ 20'$. Die Krystalle sind unlöslich in Alkohol, leicht löslich in siedendem Wasser, an der Luft verwitternd. Sie sind zusammengesetzt nach der Formel $\text{PS}_2\text{O}_3, 3\text{NaO} + 24\text{HO}$, entsprechend dem Natronsalz der gewöhnlichen Phosphorsäure $\text{PO}_3, 3\text{NaO} + 24\text{HO}$, mit welchem sie indess nicht isomorph sind. Die Auflösung reagirt stark alkalisch; Chlor, Jod und Brom zersetzen sie sogleich, scheiden Schwefel ab, bemächtigen sich eines Theils des Natriums und bilden ein phosphors. Salz ($\text{PS}_2\text{O}_3, 3\text{NaO} + 2\text{Cl} = \text{PO}_3, \text{NaO} + 2\text{ClNa} + \text{S}_2$); Salpetersäure, selbst verdünnte, wirkt ähnlich. Nicht oxydirende Säuren, selbst die schwächsten, scheiden die Schwefelphosphorsäure aus, welche sofort sich in Schwefelwasserstoff und Phosphorsäure zersetzt ($\text{PS}_2\text{O}_3, 3\text{HO} + 2\text{HO} = \text{PO}_3, 3\text{HO} + 2\text{SH}$). Schwefelphosphors. Kali konnte nicht rein erhalten werden; es ist sehr löslich in Wasser und krystallisirt schwierig. Kalk-, Baryt- und Strontiansalz sind unlöslich in Wasser.

(1) Compt. rend. XXIV, 288; Ann. ch. phys. [3] XX, 472; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 245; J. pr. Chem. XLII, 209. — (2) Auf die Bildung dieser Säure machte auch Cloëz später aufmerksam (Compt. rend. XXIV, 389). — (3) Ann. ch. phys. [3] XX, 482; Compt. rend. XXIV, 356.

Das Nickeloxydul- und das Kobaltoxydulsalz gleichfalls; sie schwärzen sich bei dem Kochen. Das Eisenoxysalz wird als ein gallertartiger, dunkelrother Niederschlag erhalten, welcher durch Kochen nicht verändert wird. Das Bleisalz ist im Augenblick der Präcipitation weiß, wird aber nach einigen Stunden schwarz (und die Flüssigkeit sauer), indem Schwefelblei und phosphors. Bleioxyd entsteht. Das Kupfersalz zersetzt sich noch leichter; das Silber- und das Quecksilbersalz existiren gar nicht; bei dem Mischen des Natronsalzes mit Silberlösung bildet sich sogleich Schwefelsilber.

Eine zweckmäßige Vorrichtung zur Entwicklung von Phosphorwasserstoff, so daß diese nach Belieben unterbrochen und wieder eingeleitet werden kann, hat Knop (1) beschrieben.

Phosphor-
wasserstoff.

Cahours (2) hat die Einwirkung des Phosphorchlorids auf mehrere organische Substanzen untersucht; bei den einzelnen der letztern werden die von ihm erhaltenen Resultate mitgetheilt werden (vergl. Anissäure, Benzoë-säure, Benzilsäure, Cuminsäure, Zimmtsäure, Nitranssäure, Nitrobenzoësäure, Bittermandelöl, Römisch - Kümmelöl, Zimmtöl).

Phosphor-
chlorid.

Mitscherlich hatte die Dampfdichte von PCl_5 zu 4,85 bei 185° gefunden, was anzeigt, daß 1 Aequivalent PCl_5 6 Volum erfülle, das Volum von $\text{O} = 1$ gesetzt. Diese Condensation im Dampfzustand steht isolirt da, und Cahours (3) hat hierüber Versuche angestellt. Es ist bekannt, daß für mehrere organische Substanzen das Verhältniß des spec. Gew. des Dampfs zu dem der Luft je nach der Temperatur sehr verschieden ist, und erst bei Temperaturen, die sehr weit über dem Siedepunkt liegen, con-

(1) Pharm. Centr. 1848, 649. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 327; J. pr. Chem. XLV, 129; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXX, 39; Pharm. Centr. 1848, 75. 593; J. pharm. [3] XIV, 220. — (3) Ann. ch. phys. [3] XX, 369; J. pr. Chem. XLI, 868; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 618.

Phosphor-
chlorid.

stant wird; für PCl_5 fand er dasselbe, nämlich das spec. Gewicht :

bei $182^\circ = 5,078$	bei $230^\circ = 4,302$	bei $288^\circ = 3,67$	bei $327^\circ = 3,66$
190 = 4,987	250 = 3,991	289 = 3,69	336 = 3,66
200 = 4,851	274 = 3,840	300 = 3,654	

Hiernach erfüllt das Aeq. PCl_5 8 Volume (nach welcher Annahme sich das spec. Gewicht des Dampfs zu 3,61 berechnet). Diese Condensation ist auch ungewöhnlich, und Cahours meint deshalb, man müsse PCl_5 als aus PCl_3 und Cl_2 bestehend ansehen, welche beide Bestandtheile sich im Gaszustand zu gleichen Volumen und ohne Condensation vereinigt haben.

Chlor-
schwefelphos-
phor.

Für den Chlorschwefelphosphor (PS_2Cl_3), welcher mit ihm zwischen 126 und 127° siedet, fand er die Dampfdichte :

5,963 bei 168° ; 5,879 bei 244° ; 5,878 bei 298° ,
entsprechend einer Condensation auf 4 Volume. Cahours betrachtet ihn als PCl_3, S_2 .

Phosphoroxy-
chlorid.

Für die Dampfdichte des Phosphoroxychlorids (POCl_3 , Siedepunkt 109° ; vergl. das Folgende) fand er :

5,334 bei 151° ; 5,298 bei 215° ; 5,295 bei 275° ,
entsprechend einer Condensation auf 4 Volume; er betrachtet diese Verbindung als PCl_3, O_2 . Seine Anschauungsweise aller dieser Verbindungen stützt er vorzugsweise auf die an PCl_5 gemachten Beobachtungen, und zwar außer der oben angeführten auch darauf, daß Schwefelwasserstoff oder Wasserdampf aus PCl_5 nur 2 Aeq. Chlor austreten lasse, wonach der Rest, PCl_3 , als ein näherer Bestandtheil in ihm anzusehen sei.

Das Phosphoroxychlorid entdeckte Wurtz (1), welcher fand, daß Phosphorchlorid, in einem Gefäß mit einem Röhrchen, welches Wasser enthält, zusammengestellt und so fortwährend in feuchter Luft befindlich, Salzsäure bildet und ein Oxychlorid PCl_3O_2 ($\text{PCl}_5 + 2\text{HO} = \text{PCl}_3\text{O}_2 + 2\text{HCl}$). Nach Zersetzung des Phosphorchlorids destillirt man; da

(1) Am S. 362 angeführten Orte.

ergehende enthält Salzsäure, bei 110° destillirt Phosphoroxychlorid. Es ist eine farblose, das Licht stark durchdringende Flüssigkeit; sein Geruch erinnert an den des Phosphorsäurechlorürs (PCl_3). Spec. Gew. 1,7 bei 12°; Siedep. 105°. Dampfdichte wurde von Wurtz = 5,40 gefunden; erfüllt im Dampfzustand 4 Volume. Es bildet mit Wasser in Berührung löst auf unter Bildung von Salzsäure und Phosphorsäure (1).

Es stellt folgende Reihe von Körpern, als zu dem Phosphoroxychlorid gehörig, zusammen:

Phosphor	PCl_3	Phosphorsäure . . . PO_3 , 3 HO
Schwefelphosphor	PCl_2S_2	Schwefelphosphors. PO_2S_2 , 3 HO
Phosphorsäure	PS_3	Phosphorige Säure PO_2H_2 , 2 HO
Phosphoroxychlorid	PCl_2O_2	Unterphosphorige S. PO_2H_2 , HO
Phosphoroxysulfid	PCl_2Ad_2 ? (Gerhardt)	

Die Verbindungen PCl_2Br_2 , PCl_2J_2 , PCl_2Cy_2 sind nicht bekannt.

Phosphor (2) hat das spec. Gewicht des Schwefels in verschiedenen Zuständen bestimmt. Für den rhombisch kristallisirten fand er (bezogen auf Wasser vom Maximum Dichtigkeit) 2,070 bei gediegenem, 2,063 bei aus Kohlenstoff angeschossenem. Für den monoklinomorph kristallisirten fand er 1,958 sogleich nach dem Uebergehen geschmolzenen in den krystallisirten Zustand; Gew. stieg allmählig, nach acht Monaten bis 2,050. Der Schwefel zeigte gleich nach seiner Bereitung in verschiedenen Darstellungen 1,919 und 1,928; das spec. Gew. allmählig, in elf Monaten bis 2,051 und 2,061. Versuche bestätigen im Wesentlichen die früheren Angaben von Berthollet und Scheerer.

Phosphor erhielt das Phosphoroxychlorid bei der Einwirkung von Phosphorsäurechlorid (P^*Cl_3) auf Benzoylwasserstoff (Bittermandelöl) als das Destillate, welcher bei der Rectification zwischen 108 und 109° geht. Er fand den Siedepunkt gleichfalls gegen 110°, das spec. Gew. = 1,673 bei 14°, die Dampfdichte = 5,372 bei 211° (vergl. Versuche von ihm oben S. 364). (Ann. ch. phys. [3] XXIII, 329.) Compt. rend. XXV, 857; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 106.

fel.

Pasteur (1) hat beobachtet, daß auch bei gewöhnlicher Temperatur der Schwefel, aus Schwefelkohlenstoff krystallisierend, die monoklinometrische Form annehmen kann, welche sonst nur an dem aus dem geschmolzenen Schwefel in den festen Zustand übergehenden beobachtet wird.

Deville (2) hält die Bildung monoklinometrischer Krystalle von Schwefel aus einer Auflösung desselben in Schwefelkohlenstoff für verknüpft mit der Gegenwart von elementarem Schwefels in der Auflösung; durch diese werde die röthliche Färbung des so krystallisirenden Schwefels bewirkt. Weiter giebt er an, Schwefelkohlenstoff löse bei 12° 0,35 seines Gewichts an Schwefel. Rhombischer Schwefel (gleichgültig ob natürliche oder künstliche Krystalle) löse sich darin ohne Rückstand, monoklinometrischer (frisch bereiteter oder schon umgewandelter) hinterlasse einen sehr leichten Rückstand, nie über 0,03 des ursprünglichen Gewichts; rasch erkalteter Schwefel (wie Schwefel oder Schwefelblumen) hinterlasse einen Rückstand von 0,11 bis 0,35 des ursprünglichen Gewichts.

Nach Schrötter (3) ist der amorphe Schwefel löslich in Schwefelkohlenstoff; um ein an der amorphen Modification reiches Präparat darzustellen, erhielt er Schwefel 68 Stunden lang bei 360°, und kühlte ihn dann rasch ab.

Unter-
schweflige
Säure.

Jacquelain (4) hat kurz angegeben: schweflige Säure und Schwefel im Entstehungszustand können sich direct zu unterschwefliger Säure vereinigen; letztere entstehe bei der Einwirkung von schwefliger Säure und Schwefelwasserstoff bei Gegenwart von Wasser (hier entsteht Pentathionsäure, vergl. S. 376); unterschweflige Baryt könne man reichlich darstellen, indem man eine Lösung von Schwefelbaryt mit etwas überschüssiger Lösung von schwefliger Säure mische, auf 50° erwärme, filtrire u. s. w., oder indem man

(1) Compt. rend. XXVI, 48; Ann. ch. phys. [3] XXIV, 459; Pogg. Ann. LXXIV, 94; J. pr. Chem. XLIV, 120; Ann. Ch. Pharm. LXVII, 228. — (2) Compt. rend. XXVI, 117; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 200. — (3) Wien. Acad. Ber. 1848, II, 200. — (4) Ann. ch. phys. [3] XXI, 118; J. pr. Chem. XLII, 338.

schweflige Säure bei 50° in eine Barytlösung leite, welche Schwefel suspendirt enthalte. Unterschweflige Säure.

F. Kefler (1) hat mehrere unterschwefligsaure Salze genauer untersucht. Für das *Kalisalz* lagen Angaben vor, wonach es in vier Verhältnissen mit Wasser krystallisiren könne (Rammelsberg analysirte ein Salz $3(\text{KO}, \text{S}_2\text{O}_2) + \text{HO}$; Döpping erhielt durch Zerlegen von Fünffach-Schwefelkalium mit einfach-chroms. Kali bald ein prismatisches Salz $\text{KO}, \text{S}_2\text{O}_2 + \text{HO}$, bald ein in rhombischen Pyramiden krystallisirendes $2(\text{KO}, \text{S}_2\text{O}_2) + 3\text{HO}$; Plessy wollte durch Kochen von schweflgs. Kali mit Schwefel $\text{KO}, \text{S}_2\text{O}_2 + 1\frac{1}{2}\text{HO}$ erhalten haben). Kefler erhielt, nach allmählichem Zusatz von heißer Lösung zweifach-chromsauren Kalis zu gleichfalls heißer Lösung von Fünffach-Schwefelkalium und Abdampfen der Flüssigkeit bei 30°, dünne vierseitige Prismen von der Zusammensetzung $3(\text{KO}, \text{S}_2\text{O}_2) + \text{HO}$; die Mutterlauge gab stark geschüttelt kleine körnige Krystalle, welche in warmem Wasser aufgelöst bei dem Erkalten Krystalle bildeten, deren Grundform eine rhombische Pyramide und deren Zusammensetzung $3(\text{KO}, \text{S}_2\text{O}_2) + 5\text{HO}$ war, mit welcher Formel auch die in Döpping's Analysen gefundenen Resultate sich vereinigen lassen. Unterschweflgs. Kali, durch Kochen von schweflgs. Kali mit Schwefel erhalten, zeigte ganz dieselben Erscheinungen bezüglich der Bildung von beiderlei Krystallen. — Ein *Doppelsalz* von *unterschweflgs. Kali und Cyanquecksilber*, $\text{KO}, \text{S}_2\text{O}_2 + \text{Hg Cy}$, wurde nur Einmal erhalten, durch Zusatz von etwas Alkohol zu einer Lösung gleicher Aequivalente beider Salze und Concentriren der Mutterlauge im luftleeren Raum, als große vierseitige Prismen. — *Unterschweflgs. Strontian* wird am leichtesten erhalten, wenn man heiße concentrirte Lösungen gleicher Aequivalente salpeters. Strontians und unterschweflgs. Natrons mischt, wo jenes Salz bei dem Erkalten auskrystallisirt; $\text{SrO}, \text{S}_2\text{O}_2 + \text{HO}$ scheidet sich in

(1) Pogg. Ann. LXXIV, 274; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 231; Pharm. Centr. 1848, 501.

Unterschwef-
lige Säure.

kleinen prismatischen Krystallen ab bei dem Abdampfen einer Lösung bei oder über 50°. — Das *Doppelsalz* von *Magnesia* und *Kali* erhielt Kessler durch Mischen beider Lösungen gleicher Aequiv. unterschwefliger Kalis und schwefels. *Magnesia*; bei dem Erkalten scheidet sich das schwefels. aus der Mutterlauge bei dem Verdunsten in niedriger Temperatur das unterschweflige Doppelsalz aus. Das entsprechende Ammoniakdoppelsalz, $\text{MgO}, \text{S}_2\text{O}_3 + \text{NH}_4\text{O}, 8,0 + 6 \text{HO}$, erhielt er durch Zersetzung des schwefels. Doppelsalzes mit unterschwefliger Strontian; die concentrirte Lösung trübt sich leicht in der Wärme, und setzt sich unter 0° leicht zerfließliche Krystalle des Doppelsalzes ab.

Schweflige
Säure.

Die feste Verbindung der schwefligen Säure mit Wasser hat Pierre(1) genauer untersucht. Der krystallinische Körper, welcher durch Einleiten von schwefliger Säure und Wasserdampf in ein bis — 6 oder — 8° erkaltetes Gefäß erhalten war, und welchem Eis anhängen konnte, enthielt etwa 24,2 Säure auf 75,8 Wasser; Krystalle, welche sich nahe bei 0° aus einer gesättigten Auflösung von schwefliger Säure abschieden, 25,1 bis 26,1 pC. Säure; dieselben, geschmolzen und nochmals krystallisirt, 27,9 schweflige Säure nahe entsprechend der Formel $\text{SO}_2 + 9 \text{HO}$, welche 27,9 Säure auf 71,7 Wasser verlangt. — Die Krystalle scheinen monoklinometrisch zu sein, sie sind spec. schwerer als Wasser, welches bei 10° etwa die Hälfte seines Gewichtes davon auflöst; von Flüssigkeit befreit können sie eine Zeit an der Luft stehen, ohne merklich Sauerstoff zu absorbiren, bei etwas erhöhter Temperatur schmelzen sie und entwickeln dann schweflige Säure. — Pierre hat noch gefunden, daß flüssige schweflige Säure unter ihrem Siedepunkt mit Wasser in Berührung gebracht nichts davon aufnimmt; nur etwas von der Säure tritt an das Wasser zur Bildung der vorbeschriebenen Verbindung; auch in zuge-

(1) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 416; im Ausz. Compt. rend. LXV, 21; J. pr. Chem. XLV, 237; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 228; Pharm. Centr. 1848, 668.

schmolzenen Röhren mit Wasser bis $+ 12^{\circ}$ erwärmt, nimmt die flüssige schweflige Säure so gut wie gar nichts davon auf. Schweflige
Säure.

Dieselbe Verbindung, aber nicht frei von anhängendem Wasser, scheint Döpping (1) erhalten zu haben durch Einleiten von schwefligr. Gas in mit Eis umgebenes Wasser, wo sich zuletzt ein krystallinischer Körper ausschied, welcher bei $- 1$ bis $- 2^{\circ}$ schmolz. Döpping's Analysen dieser Krystalle ergaben 24,0 bis 25,6 pC. schweflige Säure; eine irrige Berechnung (2) liefs ihn glauben, dafs sie aus gleichviel Atomen schwefliger Säure und Wasser bestehen. Döpping vermuthet, dafs noch eine andere Verbindung bestehe, welche bei $- 6$ bis $- 7^{\circ}$ aus der nach Abscheidung obiger Krystalle rückständigen Flüssigkeit krystallisire; sie konnte nicht genauer untersucht werden.

J. S. Muspratt (3) hat die Zusammensetzung einiger schwefligr. Salze nochmals untersucht, für welche namentlich bezüglich des Wassergehalts seine früheren (4) und Rammelsberg's (5) Angaben nicht übereinstimmten. Für das über Schwefelsäure krystallisirte *Natronsalz* fand er wiederum NaO , SO_2 , $+ 10 \text{HO}$ (nach Rammelsberg sind darin nur 7 HO enthalten). Durch Sättigen von starker Aetzammoniakflüssigkeit mit schwefliger Säure, bis der Geruch beider Körper verschwunden war, und Zusatz von Alkohol erhielt er ein sich absetzendes *Ammoniaksalz*, welchem, über Schwefelsäure getrocknet, er die Formel $2(\text{NH}_4\text{O}, \text{SO}_2) + \text{NH}_3 + 3\text{HO}$ beilegt. *Krystallisirtes schwefligr. Eisenorydul* hat nach ihm, übereinstimmend mit Fordos und Gélis, die Zusammensetzung FeO , SO_2 , $+ 3 \text{HO}$; der gelbliche krystallinische Niederschlag, welchen Kali in der Schweflig-
saure Salze.

(1) Petersb. Acad. Bull. VII, 100; J. pr. Chem. XLIV, 255; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 446. — (2) Vergl. Arch. ph. nat. IX, 222; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 230. — (3) Phil. Mag. [3] XXX, 414; Chem. Soc. Mem. III, 292; J. pr. Chem. XLI, 211; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 240; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 473. — (4) Ann. Ch. Pharm. L, 259. — (5) Pogg. Ann. LXVII, 245. 391.

Schweflig-
saure Salze.

Lösung von frisch gefälltem Eisenoxyd in wässriger schwefliger Säure hervorbringt, ist $\text{Fe}_2\text{O}_3, \text{SO}_2 + 2(\text{K}_2\text{O}, \text{SO}_2) + 5 \text{HO}$. Aus der Auflösung von kohlen. Nickeloxyd in Wasser, welches schweflige Säure durchströmte, erhielt er wiederum Krystalle eines *Nickeloxydsalzes* mit der schon früher von ihm angegebenen Zusammensetzung $\text{NiO}, \text{SO}_2 + 4 \text{HO}$. Wenn der Niederschlag, welchen Alkohol mit der Lösung von kohlen. Cadmiumoxyd in wässriger schwefliger Säure hervorbringt, mit der Flüssigkeit mehrere Tage zusammen stehen blieb, bildeten sich in ihm Krystalle eines *Cadmiumsalses* $\text{CdO}, \text{SO}_2 + 2 \text{HO}$. Für das rothe *Kupfersalz*, welches aus der Einwirkung von schwefliger Säure auf in Wasser suspendirtes Kupferoxyd hervorgeht, und welchem Rammelsberg die Formel $\text{CuO}, \text{SO}_2 + \text{Cu}_2\text{O}, \text{SO}_2 + \text{HO}$ beigelegt hatte, beharrt Muspratt bei der Formel $\text{Cu}_2\text{O}, \text{SO}_2 + \text{HO}$; siedendes Wasser entziehe ihm die Hälfte des Gehalts an schwefliger Säure. Ein *Doppelsalz* von *schwefliger Kupferoxydul* und *schwefliger Natron* bereitete er durch Mischen gesättigter Lösungen von schwefligem Kupferoxyd und schwefligem Natron, Zusatz von absolutem Alkohol, Verdunsten der sich abscheidenden dunkelrothen Flüssigkeit im luftleeren Raume; die sich absetzenden schön gelben, Krystalle ergaben die Zusammensetzung $\text{Cu}_2\text{O}, \text{SO}_2 + 5(\text{NaO}, \text{SO}_2) + 38 \text{HO}$.

Schwefel-
säure.

Barreswil (1) hat gefunden, daß bei Destillation von Schwefelsäurehydrat mit wasserfreier Phosphorsäure wasserfreie Schwefelsäure übergeht. — Evans (2) empfiehlt diese Methode der Darstellung des letztern Körpers.

Um das Stossen bei der Rectification der Schwefelsäure zu vermeiden, empfahl Lemberg (3) Quarzstücke, Redwood (4) Stücke Bergkrystall in die Retorte zu geben; über die Rectification dieser Säure überhaupt hat Rieckher (5)

(1) Compt. rend. XXV, 80; Phil. Mag. [3] XXXI, 314; J. pr. Chem. XLII, 384. — (2) Pharm. J. Trans. VIII, 127; J. chim. méd. [3] V, 9. — (3) J. pharm. [3] XII, 166; J. pr. Chem. XLII, 841. — (4) Pharm. J. Trans. VIII, 82. — (5) Jahrb. pr. Pharm. XV, 78.

seine Erfahrungen mitgeteilt. — Hayes (1) empfiehlt; rohe Schwefelsäure durch Erhitzen mit etwas Salpeter und dann mit etwas schwefels. Ammoniak, Concentriren bis 1,78 spec. Gewicht, theilweises Krystallisiren lassen und Umkrystallisiren zu reinigen.

Bineau (2) hat das spec. Gewicht der Mischungen von Schwefelsäurehydrat und Wasser untersucht. Er bestimmte (für 0°) das spec. Gew. einer Anzahl Mischungen in verschiedenen Verhältnissen, deren Zusammensetzung er analytisch feststellte, suchte dann durch Interpolation das spec. Gew. der Mischungen in einfachen Verhältnissen, und ermittelte weiter die Aenderung des spec. Gewichts durch Temperaturänderung. Auf diese Art entstand folgende Tabelle, deren erste Columnne den Procentgehalt nach Gewicht einer wässerigen Säure an reinem Schwefelsäurehydrat, die zweite das spec. Gewicht bei 15°, die dritte die zugehörige Angabe des Baumé'schen Aräometers (für dieselbe Temperatur) enthält; letzteres unter der Voraussetzung, dafs 66° Baumé dem spec. Gewicht 1,842 entsprechen.

Mischungen
von Schwefel-
säure und
Wasser.

5	1,032	4°,5	30	1,223	28°,2	55	1,448	44°,7	80	1,734	61°,1
10	1,068	9°,2	35	1,264	30°,1	60	1,501	48°,2	85	1,786	63°,5
15	1,106	13°,9	40	1,306	33°,8	65	1,557	51°,6	90	1,822	65°,1
20	1,144	18°,1	45	1,351	37°,5	70	1,615	55°,0	95	1,838	65°,8
25	1,182	22°,2	50	1,398	41°,1	75	1,675	58°,2	100	1,842	66°,0

Bineau giebt an, dafs es ihm nicht möglich gewesen sei, durch Concentration verdünnter Schwefelsäure das reine Hydrat zu erhalten; das Präparat enthielt immer mindestens 1 pC. Wasser mehr, als die Formel verlangt. Er bespricht, dafs nach seinen Versuchen die grösste Condensation bei der Mischung von Schwefelsäurehydrat und Wasser nicht einer Mischung in stöchiometrischen Verhältnissen entspreche (es war früher behauptet worden, die-

(1) Sill. Am. J. [2] VI, 113; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 796.

— (2) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 837; J. pharm. [8] XV, 80; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 240; J. pr. Chem. XLVI, 98; Pharm. Centr. 1849, 108.

selbe finde statt für die Mischung SO_3 , $\text{HO} + 2 \text{HO}$ oder $\text{SO}_3 + 3 \text{HO}$.

Zersetzung
schwefelsauer
Salze.

Bastick (1) theilte mit, daß Brunnenwasser — welches Gyps aufgelöst enthielt, mit ätherischen Oelen geschüttelt und drei Monate lang verschlossen bei Seite gestellt worden war — sich mit Schwefelwasserstoff gesättigt zeigte, unter Verschwinden der Oele und Absatz von kohlen. Kalk.

Untersuchungen über das Verhalten von Eisen und Zink gegen die Schwefelsäure und ihre Verbindungen hat A. d'Heureuse (2) veröffentlicht. — Eisen — in der Art den Dämpfen von wasserfreier Schwefelsäure bei höherer Temperatur ausgesetzt, daß in einen mit schwefel. Wismuthoxyd gefüllten Tiegel ein mit Eisendraht angefüllt gesetzt, das Ganze verschlossen und eine halbe Stunde lang bei Rothglühhitze erhalten wurde — verwandelte sich in eine blasig geschmolzene, metallisch graue, im Bruch bronzefarbene Masse; nach d'Heureuse geben 4 SO_3 mit 13 Fe eine Mischung von 3 (FeO , Fe_2O_3) und 4 FeS ; der kleiner Theil Schwefelsäure werde aber durch die Wärme in Sauerstoff und schweflige Säure zerlegt, und aus einer solchen Gemenge nehme Eisen vorzugsweise Sauerstoff an, so daß die sich bildende Masse etwas reicher an Sauerstoff sei, als die eben gegebene Erklärung erwarten lasse. Zink wird, ebenso behandelt, zu einem grünlich-gelben Pulver, einem Gemenge aus Zinkoxyd und Schwefelzink; $\text{SO}_3 + 4 \text{Zn} = 3 \text{ZnO} + \text{ZnS}$. — Schwefels. Kali mit einem Ueberschuß von fein vertheiltem Eisen kurze Zeit mäßig roth geglüht, wird vollständig zersetzt; KO , SO_3 und 3 Fe geben KO , Fe_2O_3 und FeS . Der entstehenden schwärzlich-porösen Masse entzieht Wasser eine Auflösung von Schwefeleisen in Kali, welche heiß braungelb und kalt dunkelgrün ist, an der Luft unter Absatz eines dunklen Niederschlags sich entfärbt, und dann Schwefelkalium und

(1) Pharm. J. Trans. VII, 105; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 716.
(2) Pogg. Ann. LXXV. 255; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 24.

unterschweifigs. Salz enthält. Bei Zusatz von Kupfer wird eine Masse erhalten, aus welcher Wasser Kali auszieht, das kein Schwefeleisen, wohl aber unterschweifige Säure enthält. — Ueberschüssiges Zink mit schwefels. Kali erhitzt, zerlegt es gleichfalls vollständig (wobei sich schon vor dem Erhitzen zum Rothglühen ein schönes Erglimmen zeigt), und giebt eine compacte, schon citrongelbe, schwefelkaliumhaltige Masse; $\text{KO}, \text{SO}_3 + 4 \text{Zn} = \text{KS} + 4 \text{ZnO}$. — Schwefels. Natron verhält sich gegen Eisen und Zink entsprechend. — Eine Lösung von schwefels. Ammoniak mit Eisen oder Zink erwärmt, löst unter Entwicklung von Ammoniak Metall auf (Eisen als Oxydul). Das schmelzende Salz wirkt energischer in derselben Weise. Bei raschem Erhitzen eines Gemenges von schwefels. Ammoniak und Eisen bis zum Glühen entweicht nach den Dämpfen des Salzes auch etwas schweflige Säure, und das Eisen ist oberflächlich mit Sauerstoff und bisweilen mit etwas Schwefel verbunden. — Schwefels. Kalk mit Eisen geglüht, giebt eine metallisch aussehende schwarzgraue Masse, welche Schwefelcalcium, Eisenoxydoxydul und Eisenoxyd enthält; Zink mit schwefels. Kalk geglüht giebt, unter heftiger Deflagration, eine lockere gelbliche Masse, welche Kalk, Zinkoxyd und Schwefelzink enthält; $\text{CaO}, \text{SO}_3 + 4 \text{Zn} = \text{CaO} + 3 \text{ZnO} + \text{ZnS}$. — Schwefels. Baryt verhält sich entsprechend; er wird durch Eisen leichter als durch Kohle zerlegt, aber aus dem entstehenden Product zieht Wasser das Schwefelbaryum nur unvollständig aus. Chlorbaryum ist leicht darstellbar durch Mischen von 2 Schwerspath und 2 Eisen mit der Lösung von 1 Chlorcalcium, Abdampfen, kurzes Glühen in eisernem Tiegel, noch heifs Ausschöpfen, Ausziehen der erkalteten und gepulverten Masse mit heissem Wasser, Zusatz von wenig Salzsäure zur Zerlegung einer Spur gelösten Schwefelcalciums, Krystallisiren. — In derselben Weise läßt sich aus Cölestin Chlorstrontium bereiten: schwefels. Strontian wird übrigens durch Eisen erst bei höherer Temperatur zersetzt, als das Kalk- oder Barytsalz,

Zersetzung
 schwefelsauer
 Salz.

Zersetzung
schwefelsauer
er Salze.

und die entstehende Masse giebt an Wasser Schwefelstrontium zwar leichter, aber auch nicht vollständig, ab. — Bei dem Glühen von schwefels. Magnesia mit Eisen entwickelt sich viele schweflige Säure; es bleibt eine eisengraue Masse, welche kein Schwefelmagnesium, sondern neben Eisenoryd und Oxydul eine Spur Schwefeleisen enthält. Zink bringt eine gleiche Zerlegung, unter heftiger Deflagration, hervor. — Eisen und Zink wirken auf neutrale schwefelsaure Thonerde in der Hitze, wenn überhaupt, nur äußerst gering ein.

Di-, Tri-,
Tetra-,
Pentathion-
säure etc.

Es ist bekannt, daß in der neueren Zeit mehrere Säuren entdeckt wurden, welche auf 5 At. Sauerstoff verschiedene Mengen von Schwefel enthalten. Früher stand die von Welter und Gay-Lussac 1819 entdeckte Unterschwefelsäure S_2O_5 allein; 1841 entdeckte Langlois die bei anhaltender Einwirkung von Schwefel auf zweifach-schwefels. Kali in der Wärme sich bildende Säure S_3O_8 ; 1842 Fordos und Gélis die bei Einwirkung von Jod auf unterschweflig. Natron oder Baryt sich bildende Säure S_4O_8 ; 1846 Wackenroder eine bei Einwirkung von Schwefelwasserstoff und schwefliger Säure in Wasser sich bildende Säure, welcher er die Formel S_5O_8 beilegte. Plessy behauptete 1845, bei Einwirkung von Schwefelchlorür auf eine Lösung der schwefligen Säure in Wasser bilde sich eine Säure S_4O_8 , welche von der durch Fordos und Gélis entdeckten verschieden sei; bei der Einwirkung von Schwefelchlorür auf eine eben solche Lösung bilde sich hingegen S_5O_8 . Ueber diese Säuren (hinsichtlich deren Nomenclatur wolle uns dem Vorschlag anschließen, S_2O_5 Dithionsäure, S_3O_8 Trithionsäure, S_4O_8 Tetrathionsäure und S_5O_8 Pentathionsäure zu nennen) sind nun 1847 und 1848 Untersuchungen veröffentlicht worden von Plessy (1), Jacquelin (2).

(1) Ann. ch. phys. [3] XX, 162; J. pr. Chem. XLI, 329; in Ann. Compt. rend. XXIV, 198; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 247; Pharm. Chem. 1847, 545. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXI, 110; J. pr. Chem. XLII, 338.

Lenoir (1), Ludwig (2), Fordos und Gélis (3) und F. Kefslers (4).

Di-, Tri-,
Tetra-, Pen-
tathionsäure
etc.

Was zuvörderst die Bildung von Säuren mit mehr als 5 At. Sauerstoff angeht, so hat Plessy angegeben, Schwefelchlortür (S_2Cl) bilde mit schwefliger Säure und Wasser nur die Säuren S_3O_8 und S_4O_8 (die Identität der letzteren mit der von Fordos und Gélis entdeckten erkannte er nun an); Schwefelchlorid (aus dem Chlortür mittelst überschüssigen Chlors erhalten) bilde mit überschüssiger wässriger schwefliger Säure dieselben Säuren, mit weniger hingegen, außer S_4O_8 , noch S_3O_8 und S_5O_8 . — Fordos und Gélis hingegen, auf genauere analytische Methoden gestützt, haben gefunden, daß Schwefelchlortür und Schwefelchlorid bei der Einwirkung auf Wasser und schweflige Säure (deren Mitwirkung indess von gar keinem wesentlichen Einfluß sei) dieselben Säuren des Schwefels bilden, und daß sich nur eine Verschiedenheit zeigt in Beziehung auf die Menge des Schwefels, welcher im Anfang der Reaction sich abscheidet. Sie glauben, daß das erste Resultat dieser Reaction die Entstehung von S_3O_8 sei, daß sich aber daraus alsbald S_4O_8 , sodann S_5O_8 und andere Zersetzungsproducte bilden. Niemals fanden sie eine Säure, welche mehr als 5 At. Sauerstoff enthalten hätte.

Nach Jacquelin's kurzen Angaben entsteht in einer wässrigen Lösung schwefliger Säure, zu welcher die Luft nur sehr unvollkommen Zutritt hat, allmählig (er untersuchte eine vor zwei Jahren bereitete Lösung) neben Schwefelsäure auch Dithionsäure.

Trithionsäure erhielt Kefslers in wässriger Lösung durch Zersetzung des Kalisalzes mit Kieselflußsäure, aber

Trithion-
säure.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXII, 253; im Ausz. J. pr. Chem. XLIII, 455; Pharm. Centr. 1847, 685. — (2) Arch. Pharm. [2] LI, 259; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 697. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXII, 66; J. pr. Chem. XLIII, 456; im Ausz. Compt. rend. XXV, 623; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 249. — (4) Pogg. Ann. LXXIV, 249; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 233; Pharm. Centr. 1848, 545; Laurent u. Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 139.

Trithion-
säure.

auch bei Eiskälte liefs sich die Flüssigkeit nicht ohne Freiwerden von Schwefelsäure und schwefliger Säure concentriren. Für das krystallisirte Kalisalz bestätigte er die Formel $\text{KO}, \text{S}_3\text{O}_6$. Für das zwischen Fließpapier getrocknete Barytsalz (erhalten durch Sättigen der wässrigen Säure mit kohlen. Baryt und Mischen mit vielem wasserfreiem Alkohol, wo das Salz in glänzenden Blättchen niederschlägt) fand er $\text{BaO}, \text{S}_3\text{O}_6 + 2\text{HO}$; seine wässrige Lösung zersetzt sich sehr schnell. — Baumann's Angabe, daß trithions. Salze bei Digestion von dithionsauren mit Schwefel sich bilden, fand er nicht bestätigt.

Tetrathion-
säure.

Tetrathionsäure läfst sich nach Kefler am sichersten aus dem Bleisalz darstellen. Um dieses zu erhalten, bereitet man unterschwefligs. Bleioxyd durch Mischen einer Lösung von 2 Theilen unterschwefligs. Natrons in vielem warmem Wasser mit einer warmen und gleichfalls verdünnten Lösung von 3 Theilen essigs. Bleioxyds; den mit vielem warmem Wasser ausgewaschenen Niederschlag mischt man noch feucht mit 1 Jod und rührt häufig um. Nach einigen Tagen ist Alles in Jodblei und eine Lösung von tetrathions. Bleioxyd verwandelt, welche letztere durch Schwefelsäure, nicht durch Schwefelwasserstoff, zu zersetzen ist. — Tetrathions. Strontian wird erhalten durch Mischung von Tetrathionsäure mit einer richtigen Menge in Wasser gelösten essigs. Strontians und Zusatz von Alkohol zwischen Fließpapier getrocknet enthält er $\text{SrO}, \text{S}_4\text{O}_6 + 6\text{HO}$. Das Bleisalz, ebenso dargestellt, enthält $\text{PbO}, \text{S}_4\text{O}_6 + 2\text{HO}$; es läfst sich nicht durch Verdunsten einer wässrigen Lösung krystallisirt erhalten. Das Natrium- und das Kupfersalz ebensowenig. Das Nickel- und das Calciumsalz bilden zerfließliche Krystallmassen.

Pentathion-
säure.

Lenoir hat für das Barytsalz dieser Säure (welches er nach Wackenroder's Methode durch Zersetzung von schwefliger Säure und Schwefelwasserstoff bei Gegenwart von Wasser bereitete, und mit kohlen. Baryt sättigte, wo sich das Salz auf Zusatz von Alkohol in wasserhellen Krystallen

dratischen Prismen absetzte) BaO , $\text{S}_3\text{O}_5 + 2\text{HO}$ gefunden, Pentathionsäure.
nebst einem kleinen Gehalt an Alkohol; die wässrige Lösung zersetzt sich bei dem Erwärmen. Dieselbe Zusammensetzung fanden Fordos und Gélis, welche die Säure S_3O_5 mehrmals bei der Einwirkung von Schwefelchlorid auf wässrige schweflige Säure erhielten; sie bekamen das Salz frei von Alkohol durch Niederschlagen seiner wässrigen Lösung mit Aether, welchem sehr wenig Alkohol zugemischt war; sie machen darauf aufmerksam, daß das alkoholhaltige Salz sich länger ohne Zersetzung erhalte, als das alkoholfreie.

Ludwig giebt an, daß Pentathionsäure auch entsteht bei Einwirkung erwärmter wässriger schwefliger Säure auf frisch bereiteten Fünffach-Schwefelwasserstoff.

Kessler erinnert daran, daß Persoz schon früher Pentathionsäure durch Zersetzen unterschweflgs. Bleioxyds mit Schwefelwasserstoff erhalten, sie aber für unterschweflige Säure gehalten habe.

Kessler hat ferner das spec. Gewicht und die Zusammensetzung wässriger Pentathionsäure mit folgenden Resultaten untersucht :

Spec. Gew. bei $+ 22^\circ$:	1,233	1,320	1,474	1,506
Procentgehalt an S_3O_5 :	32,1	41,7	56,0	59,7

Kessler hat auch die Reactionen der Tri-, Tetra- und Pentathionsäure einer vergleichenden Prüfung unterworfen.

Die leichte Zersetzbarkeit der wässrigen Lösung des pentathions. Baryts unter Absatz von Schwefel ist von Le-noir, Fordos und Gélis, Ludwig und Kessler bestätigt worden. Fordos und Gélis fanden, daß die zu verschiedenen Epochen der Zersetzung durch Alkohol abscheidbaren Krystalle immer weniger Chlor erfordern, damit aller Schwefel zu Schwefelsäure werde, um so vorgeschrittener die Zersetzung ist; die Krystalle enthalten zuerst BaO , S_3O_5 mit BaO , S_4O_5 , dann BaO , S_4O_5 mit BaO , S_3O_5 , zuletzt nur das letztere Salz. Ludwig fand, daß bei dem Abdampfen von pentathions. Kali und Baryt mit überschüssiger Pen-

Jod.

sischen Steinkohlen. — Um das Jod aus den verdünntesten Lösungen zu gewinnen, empfiehlt Persoz (1), in die Flüssigkeit schweflige Säure zu leiten bis sie darnach riecht, schwefels. Kupferoxyd und zweifach-schweflgs. Natron zuzusetzen, und den sich bildenden Niederschlag von Kupferjodür auf bekannte Weise zu zersetzen.

Einen Gehalt an Jodcyan in käuflichem Jod beobachteten Scanlan (2) und F. Meyer (3).

Jodkalium.

Trez (4) gab an, in käuflichem Jodkalium selen. Kali gefunden zu haben; die Verunreinigung des Jodkaliums mit jods. Kali haben Lepage (5) und Leroy (6), die mit Bromkalium hat Moullard (7) besprochen.

Diesel (8) hat einige Versuche angestellt über das Verhalten des Jodkaliums gegen Schwefelsäure; er fand, daß Jodkalium, welches ganz frei von Schwefelkalium ist, bei Einwirkung concentrirter Schwefelsäure nicht in schweflige Säure sondern auch Schwefelwasserstoff giebt, aber nicht bei Einwirkung verdünnter Schwefelsäure; Schwefelwasserstoff entwickelt sich auch bei Einwirkung schwefelsäurehaltiger Salzsäure auf Jodkalium. Wackenroder (9) bestätigt diese Angaben über die Einwirkung der Schwefelsäure; schweflige Säure zersetzt nach ihm das Jodkalium scheinbar nicht; die kleinste Beimengung von Schwefelkalium zu Jodkalium kann nach ihm durch Zinnchlorür an der Entwicklung von Schwefelwasserstoff erkannt werden.

Brom.

Poselger (10) beobachtete, daß bei der Destillation von käuflichem Brom der Siedpunkt zuletzt bis 120° stieg; am dem zuletzt übergehenden schied wenig kaustisches Kali Bromkohlenstoff CBr (gefunden 6,7 bis 7,1 Kohlenstoff auf 91,3 Brom; berechnet 7 auf 93) als eine farblose, aromatische

(1) J. pharm. [3] XII, 105; J. pr. Chem. XLII, 346. — (2) Chem. Soc. Mem. III, 321. — (3) Arch. Pharm. [2] LI, 29; Pharm. Centr. 1847, 687. — (4) J. chim. méd. [3] IV, 201; Phil. Mag. [3] XXXII, 397. — (5) J. chim. méd. [3] IV, 587. — (6) J. chim. méd. [3] IV, 589. — (7) J. chim. méd. [3] III, 591. — (8) Arch. Pharm. [2] XLIX, 372. — (9) Arch. Pharm. [2] XLIX, 275. — (10) Pogg. Ann. LXXI, 297; in Ausz. Pharm. Centr. 1847, 542.

riechende, süße, das Licht stark brechende Flüssigkeit von 2,436 spec. Gew. und 120° Siedepunkt, bei — 25° noch nicht erstarrend. Derselbe ist nicht brennbar, wenig löslich in Wasser, in allen Verhältnissen mischbar mit Alkohol, Aether und Brom. Starke Salpeter- und Schwefelsäure zersetzen ihn nicht.

Chlorige Säure (ClO_3) erhielt de Vry (1) leicht und gefahrlos, mit Kohlensäure vermischt, durch Kochen der Flüssigkeit, welche nach dem Vermischen der Lösungen von gleichen Aequivalenten Weinsäure und chlors. Kalis und nach dem Auskrystallisiren eines Doppelsalzes aus chlors. und weins. Kali als Mutterlauge zurückblieb, und freie Chlorsäure und Weinsäure enthielt.

Chlor.
Chlorige
Säure.

Zur Darstellung chlors. Baryts empfiehlt L. Thompson (2), gleichviel Atome chlors. Kalis und sauren weins. Ammoniaks (122,6 des erstern auf 167 des letztern), in möglichst wenig siedendem Wasser gelöst, zu vermischen, nach Auskrystallisiren des sauren weins. Kalis die Flüssigkeit mit gleichviel Alkohol zu vermischen, die abfiltrirte Lösung des chlors. Ammoniaks durch Kochen mit frisch gefälltem kohlen. Baryt zu zerlegen, und die filtrirte Flüssigkeit krystallisiren zu lassen. Chlorsaurer Strontian und Kalk können ebenso dargestellt werden.

Chlorsäure.

Mène (3) schlägt als eine Verbesserung vor, Chlorkalk durch wiederholtes Behandeln von gelöschtem Kalk mit Chlorkalk darzustellen. — Bastick (4) hat die Einwirkung des Chlorkalks auf Zucker, Stärke, Baumwolle u. dergl. beschrieben. Enthält derselbe freien Kalk, so bildet sich ameisens. Kalk; ist er frei davon, Kohlensäure. Die Einwirkung auf Zuckerlösung ist besonders heftig. Chlorkalk, welcher freien Kalk enthält, bildet mit Leimlösung ameisens. Kalk und Ammoniak.

Chlorkalk.

Nach Louyet (5) enthält die bisher als wasserfrei be-

Fluor.
Fluorwasser.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 248. — (2) Phil. Mag. [3] XXXI, 510; J. pr. Chem. XLIII, 78; J. pharm. [3] XIV, 67. — (3) Compt. rend. XXV, 747. — (4) Pharm. J. Trans. VII, 467; J. pharm. [3] XIV, 20; Pharm. Centr. 1848, 325. — (5) Compt. rend. XXIV, 434; Pharm. Centr. 1847, 321.

Fluorwasser. trachtete flüssige Fluorwasserstoffsäure noch Wasser. Sie werde durch weniger Basis neutralisirt, als nach der ersteren Voraussetzung dazu nöthig sei. Bei der Destillation von Fluorspath und vorher zum Sieden erhitzter Schwefelsäure, wo das Destillationsproduct über wasserfreie Phosphorsäure strömen mußte, condensirte sich in der mit Kältemischung umgebenen Vorlage keine Flüssigkeit, wohl aber zerfloß die Phosphorsäure. Louyet schließt, daß wasserfreier Fluorwasserstoff bei -12° und unter dem gewöhnlichen Druck gasförmig sei.

Stickstoff. Stickoxydulgas wird nach Gay-Lussac (1) rein entwickelt durch Einwirkung von Zinnchlorür auf Königswasser; am gleichförmigsten, wenn man zu einer Lösung von Zinnchlorür in Salzsäure, welche in einem Wasserbad erhitzt wird, durch eine bis in die Flüssigkeit tauchende etwas weite Röhre nach und nach Salpeterkrystalle oder Cylinder von Salpeter einträgt.

Dumas (2) hat einige Eigenschaften des flüssigen Stickoxyduls beschrieben, welches er mittelst Natterer's Apparat darstellte. Ist es in offenen Gefäßen befindlich, wobei es langsam verdampft, so bringen hineingeworfene Metallstücke ein Zischen, wie das des glühenden Eisens in Wasser, hervor; Quecksilber gefriert außerdem sogleich darin. Kalium, Schwefel, Phosphor, Jod, Kohle schwimmen darauf ohne Veränderung, angezündete Kohle unter lebhafter Verbrennung. Gewöhnliche Schwefelsäure und Salpetersäure erstarren sogleich, Wasser gleichfalls, unter Bewirkung starker Verdampfung, welche eine Explosion hervorbringen kann. Alkohol und Aether mischen sich mit dem Stickoxydul ohne zu gefrieren.

Stickoxyd. Stickoxydgas wird nach Pelouze's und Gay-Lussac's (3) Erfahrungen zweckmäßig dargestellt, wie oben für

(1) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 229. — (2) Compt. rend. XXVII, 463; Instit. 1848, 350; J. pharm. [3] XIV, 411; Pharm. Centr. 1849, 13; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 224; J. pr. Chem. XLVI, 110. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 216.

das Stickoxydulgas angegeben wurde, nur daß das Zinnchlorür durch Eisenchlorür ersetzt wird.

Nach Schönbein (1) bildet sich salpetrigs. Bleioxyd und Manganoxydul durch Einwirkung von Stickoxyd auf in Wasser fein zertheiltes Blei- und Manganhyperoxyd. Stickoxyd giebt mit Silberoxyd unter denselben Umständen salpetrigs. Silberoxyd und Silber; mit Goldoxyd Salpetersäure und Gold; mit Wasserstoffhyperoxyd Salpetersäure; mit Jod oder Brom Jodwasserstoff oder Bromwasserstoff und Salpetersäure, aber nur in begrenzter Menge, weil bei großer Concentration beide Producte sich zersetzen. — Nach demselben (2) verwandeln oxydirtes Wasser, Ozon, Brom und Chlor, und wahrscheinlich auch Blei- und Manganhyperoxyd, die wässerigen Lösungen salpetrigs. Salze in die salpetersäuren.

N. W. Fischer (3) hat Beobachtungen über Darstellung und qualitatives Verhalten einiger salpetrigs. Salze veröffentlicht. *Salpetrigs. Kali* (durch Glühen des salpeters., Lösen in Wasser, Auskrystallisirenlassen des Salpeters, Neutralisiren mit verdünnter Essigsäure, Zusatz von Weingeist, im luftleeren Raum Krystallisirenlassen der wässerigen sich hier bildenden Schicht) bildet undeutliche zerfließliche Krystalle. *Salpetrigs. Natron* in ähnlicher Weise dargestellt zerfließt langsamer. Das *Barytsalz* (durch Glühen des salpeters. Baryts, Fällen des freien Baryts mit Kohlensäure, des salpeters. Baryts aus der concentrirten wässerigen Lösung mit Weingeist, und Krystallisiren dargestellt) soll zwei Formen zeigen: regulär hexagonale nadelförmige Prismen und dicke rhombische Säulen von $71\frac{1}{2}^{\circ}$; es ist luftbeständig, in Wasser und Weingeist leicht löslich. Das *Strontiansalz* (wie das Barytsalz dargestellt) zerfließt langsam an feuchter Luft. Das *Kalksalz* (am besten durch Zersetzung des Silbersalzes mit Kalkwasser darzustellen) krystallisirt

(1) J. pr. Chem. XLI, 225; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 775. —

(2) J. pr. Chem. XLI, 227; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 775. —

(3) Pogg. Ann. LXXIV, 115; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 224; J. pr. Chem. XLVI, 318; Pharm. Centr. 1848, 401.

Salpetrig-
saure Salze.

prismatisch, zerfließt an der Luft und ist in wasserfreiem Weingeist unlöslich. Das *Ammoniaksalz* (aus dem Silbersalz mittelst Salmiak dargestellt) bildet nadelförmige Krystalle, ist luftbeständig, und schon bei gelinder Wärme zersetzbar (vergl. weiter unten). Das *Magnesiumsalz* (durch Kochen der Lösung des Silbersalzes mit Magnesia) bildet eine bläuliche zerfließliche Salzmasse, die in absolutem Weingeist unlöslich ist, und sich bei dem Erwärmen leicht zersetzt. *Salpetrigs. Silberoxyd* (durch Zersetzung des salpeters. Salzes mittelst eines der vorigen) bildet ein weißes haarförmiges Pulver oder gelbe faserförmige Krystalle, Prismen von $\frac{1}{2}$ ", bei gewöhnlicher Temperatur in 300 Theilen Wasser, bei dem Siedepunkt leicht darin löslich (vergl. weiter unten). *Doppelsalze mit Kali* brachte er durch Vermischung einer salpeters. Metalloxydauflösung mit salpetrigs. Kali (letzteres im Ueberschuß) hervor. Salpetrigs. Silberoxyd - Kali krystallisirt in Tafeln und Prismen; ist gelblich, luftbeständig, bei gelinder Wärme zersetzbar. Salpetrigs. Palladiumoxyd - Kali bildet gelbe (in einem Versuche rothe) Krystalle, salpetrigs. Bleioxyd - Kali orangegelbe sechseckige monoklinometrische Krystalle, salpetrigs. Nickeloxydul - Kali bräunlichrothe Octaëder und salpeters. Kobaltoxydul - Kali ein gelbes Pulver.

Salpetrigs.
Ammoniak.

Millon (1) hat beobachtet, daß sich eine wässrige Lösung des salpetrigs. Ammoniaks durch Erhitzung in Stickstoff und Wasser zerlegt, besonders schnell, wenn ihr ein Tropfen Salpeter - Salz - oder Schwefelsäure zugesetzt ist. Zusatz von etwas Ammoniak hindert hingegen die Zersetzung. Salpetrigs. Ammoniak stellt er dar, indem er es bei der Destillation von salpeters. Bleioxyd sich entwickelnden Dämpfe in Ammoniakflüssigkeit leitet, welche durch eine Kältemischung kalt gehalten wird; bei dem Verdampfen in einer Ammoniak enthaltenden Atmosphäre über Aetzkalk krystallisirt jenes Salz zuerst.

(1) Ann. ch. phys. [3] XIX, 255; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 232; J. pr. Chem. XL, 369.

Niklès (1) hat das neutrale salpetrigs. Bleioxyd untersucht, welches mit dem salpeters. Bleioxyd gleiche Form (Reguläroctaëder) hat, und mit diesem zusammen krystallisiren kann. Er fand in ersterem 5,82 bis 5,87 pC. Wasser; PbO , NO_2 + HO erfordert 5,47. Er vergleicht die Formeln der beiden Salze: $\text{N}^{\text{O}}_{\text{H}}\} \text{PbO}$ und $\text{N}^{\text{O}}_{\text{O}}\} \text{PbO}$.

Salpetrigs.
Bleioxyd.

Nach Persoz (2) entwickelt das salpeters. Silberoxyd noch unter der Rothglühhitze Sauerstoff, und verwandelt es sich theilweise in salpetrigs. Silberoxyd. Das letztere zersetzt sich bei der höheren Temperatur leicht, wenn nicht salpeters. Salz noch zugegen wäre, als welches man auch salpeters. Kali oder Natron nehmen könne. Er empfiehlt zur Darstellung des salpetrigs. Silberoxyds gleiche Theile salpeters. Silberoxyd und salpeters. Kali zu erhitzen, und aus der heißen wässerigen Lösung das salpetrigs. Silberoxyd krystallisiren zu lassen. Dieses, AgO , NO_2 , bildet dünne Nadeln, welche in kaltem Wasser sehr wenig löslich sind.

Salpetrigs.
Silberoxyd.

Für die Entstehung von Salpetersäure aus Ammoniak durch Einwirkung von Sauerstoff *in statu nascenti* hat Kuhlmann (3) mehrere neue Beweise gegeben. Salpetersäure entweicht bei der Einwirkung von schwefels. Ammoniak und Schwefelsäure auf zweifach chroms. Kali, Manganhyperoxyd, braunes Bleihyperoxyd oder Mennige, oder Baryumhyperoxyd. Bei der Erhitzung von schwefels. Ammoniak mit salpeter- oder chlors. Kali wird das Ammoniak gänzlich in salpetrigs. Gas verwandelt.

Salpeter-
säure.

Hinsichtlich der Darstellung chlorfreier Salpetersäure — ob dieselbe besser mittelst Silber oder durch fractionirte Destillation zu bewerkstelligen sei — haben Mohr (4), Wackenroder (5) und Wittstein (6) ihre Erfahrungen und Ansichten ausgetauscht.

(1) Compt. rend. XXVII, 244; J. pr. Chem. XLV, 374. — (2) Ann. ch. Phys. [3] XXIII, 48; Ann. Ch. Pharm. LXV, 177; J. pr. Chem. XLV, 98; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 527. — (3) Ann. ch. Phys. [3] XX, 223; J. pr. Chem. XLI, 289; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 283; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 721. — (4) Arch. Pharm. [2] XLIX, 25; L, 19. — (5) Arch. Pharm. [2] L, 28. — (6) Repert. Pharm. [3] I, 44; Pharm. Centr. 1848, 784.

Salpetersäure.

A. Smith (1) hat Versuche über die Hydrate der Salpetersäure angestellt. Starke rauchende Salpetersäure, mittelst Hindurchleiten trockner Luft in der Wärme entfärbt, gab eine Flüssigkeit vom spec. Gew. 1,503, welche 81,56 pC. NO_2 enthielt. Sie fing bei 88° an zu kochen, der Siedepunkt stieg während der Destillation bis 121° . Was bei dieser Temperatur in der Retorte zurück blieb, enthielt 63,11 pC. NO_2 . Was bei 88° bis 93° überdestillirte, war, enthielt 84,96 pC. NO_2 , war aber stark roth gefärbt, auf die angegebene Weise entfärbt hatte es das spec. Gew. 1,516 bei $15^\circ,5$, kochte bei $84^\circ,4$ und destillirte fast vollständig über zwischen $84^\circ,4$ und $86^\circ,7$, und enthielt 84,54 pC. NO_2 . Was bei der Destillation dieser Säure zuerst überging, hatte, nach der Entfärbung, dieselben Eigenschaften (spec. Gew. 1,517 bei $15^\circ,5$, Siedepunkt $84^\circ,4$), und enthielt 84,74 pC. NO_2 ($\text{NO}_2 + \text{HO}$ erfordert 85,7). Mit Wasser verdünnt bis die Zusammensetzung $\text{NO}_2 + 2 \text{HO}$ erreicht war, hatte die Säure bei $15^\circ,5$ das spec. Gew. 1,486, keinen constanten Siedepunkt. Die durch weiteres Verdünnen dargestellte Säure $\text{NO}_2 + 4 \text{HO}$ hatte das spec. Gew. 1,420 bei $15^\circ,5$, und destillirte unverändert über bei 121° ; der Siedepunkt stieg gegen das Ende der Destillation bis 127° . Schwache Säure, erhitzt bis der Siedepunkt constant 121° geworden war, zeigte 1,412 spec. Gew.

Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Salpetersäure.

Leconte (2) hat die Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf reine wässrige Salpetersäure von 1,33 spec. Gew. (36°) beschrieben. Seine Versuche fügen dem bereits Bekannten wenig Neues hinzu. Den abgeschiedenen Schwefel fand er weich, wie den nach dem Schmelzen rasch erstarrten, das sich entwickelnde Gas fand er als aus Stickoxyd und Untersalpetersäure bestehend, an der Stelle, welches letztern sich nach längerer Zeit unzersetzter Schwefel

(1) Chem. Soc. Mem. III, 399; Phil. Mag. [8] XXXI, 454; in Ausz. Pharm. Centr. 1848, 203. — (2) Ann. ch. phys. [3] XII, 190; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 233; J. pr. Chem. XLII, 379; in Ausz. Pharm. Centr. 1847, 830.

felwasserstoff finde; er bestätigte die Bildung von schwefels. Ammoniak. Die Untersalpetersäure giebt mit Schwefelwasserstoff Schwefel, Wasser und Stickoxyd. Stickoxyd und Schwefelwasserstoff wirken im trocknen Zustand nicht auf einander ein.

Schönbein (1) hat das Verhalten der Salpeter-Schwefelsäure (einer Mischung von Schwefelsäure- und Salpetersäurehydrat) gegen Schwefel, Selen, Phosphor und Jod untersucht. Mit Schwefel oder Selen bildet sie schon in der Kälte schweflige oder selenige Säure, mit Phosphor Phosphor- und etwas phosphorige Säure; Wasser zu der Säure gesetzt, nachdem sie auf Schwefel, Selen oder Phosphor eingewirkt hat, entwickelt reichlich Stickoxydgas; ebenso, wenn sie auf Jod eingewirkt hat. Salpeter-Schwefelsäure löst dieses anfangs ohne sich zu färben; später scheidet sich ein schwefelgelbes Pulver aus, welches Schönbein als wahrscheinlich aus Jodsäure mit einer Oxydationsstufe des Jods und Schwefelsäure bestehend betrachtet.

S. g. Salpeter-schwefelsäure.

Cahours (2) hat die Einwirkung einer Mischung von rauchender Schwefel- und Salpetersäure auf mehrere organische Substanzen untersucht, bei welchen wir die Resultate mittheilen werden (vergl. Anissäure, Benzoëssäure, Cuminsäure, Mesitylen, salicyls. Methyloxyd).

Gay-Lussac (3) hat eine Untersuchung des Königs-Salpeters veröffentlicht. Die meisten Chemiker waren der Ansicht, daß Salpetersäure und Salzsäure Chlor und salpetrige oder Untersalpetersäure, aber beide getrennt, bilden. E. Davy hatte indeß bereits 1831 angegeben, Chlornatrium

Salpetersäure (Königswasser).

(1) Pogg. Ann. LXX, 87; Chem. Gaz. 1847, 229; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 486. — (2) Vollständig Ann. ch. phys. [3] XXV, 5; J. pr. Chem. XLVI, 321; theilweise und im Ausz. Compt. rend. XXIV, 553; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 396; LXIX, 230; J. pr. Chem. XLIII, 298; Pharm. Centr. 1849, 161. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 203; Ann. Ch. Pharm. LXVI, 213; J. pr. Chem. XLIV, 335; im Ausz. Compt. rend. XXVI, 619; Instit. 1848, 181; J. pharm. [3] XIV, 92; Pharm. Centr. 1848, 513. Gerhardt's kritische Bemerkungen in seinen und Laurent's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 87.

Salpetersäure
(Königswasser).

entwickle neben Chlor ein eigenthümliches Gas, aus gleichen Volumen Chlor und Stickoxyd bestehend; und Baudrimont 1843, aus dem gasförmigen Product der Einwirkung von Salpetersäure auf Salzsäure lasse sich eine dunkelbraunrothe Flüssigkeit condensiren, mit dem spec. Gew. 1,368, dem Siedepunkt -7° , der Dampfdichte 2,49 und der Zusammensetzung NO_2Cl_2 , welche er Chlorsalpetersäure nannte. — Gay-Lussac fand, dafs Königswasser in einem Wasserbad erwärmt ein gasförmiges Product giebt, welches getrocknet durch starke Erkaltung in Chlorgas und eine bei -7° kochende, dunkelcitrongelbe Flüssigkeit zerlegt werden kann. Diese Flüssigkeit enthält die Elemente des Stickoxyds und Chlor, der Gehalt an letzterem verwandelt sich durch Einwirkung von Wasser gänzlich in Salzsäure. Gay-Lussac fand darin 69,4 pC. Chlor; für NO_2Cl_2 berechnet sich 70,2. Die Verbindung besteht im gasförmigen Zustand aus gleichen Volumen Stickoxyd und Chlor, sie läßt sich als Untersalpetersäure betrachten, worin 2 O durch 2 Cl ersetzt sind, und in Beziehung hierauf nennt sie Gay-Lussac *hypochloronitrique*, Chloruntersalpetersäure.

Unter verschiedenen Umständen bereitet giebt das Königswasser keineswegs immer eine condensirte Flüssigkeit von derselben, eben angeführten, Zusammensetzung. Häufig bildet sich, und in veränderlicher Menge noch eine andere Verbindung, welche durch Mischen von Stickoxyd und Chlor dargestellt werden kann. Beide Gase mischen sich unter Raumverminderung, die Mischung ist orangegelb, und bei -15 bis -20° condensirt sich daraus eine dunkelrothbraune Flüssigkeit, welche indeß nach Gay-Lussac mehr Chlor enthält, als die reine Verbindung. Die Zusammensetzung der letzteren ermittelte Gay-Lussac durch Bestimmung der Raumverminderung, welche Chlor und Stickoxyd, in verschiedenen Verhältnissen gemischt erleiden; er gelangte zu dem Resultat, dafs sich 1 Vol. Chlor mit 2 Vol. Stickoxyd verbindet, oder dafs die Ver-

bindung NO_2Cl ist. Mit Beziehung auf die Zusammensetzung der salpetrigen Säure nennt er sie *acide chloronitreuse*, chloresalpetrige Säure. Salpetersäure-
analog
(Königswasser).

Die Flüssigkeit, welche aus den Dämpfen von Königswasser condensirt werden kann, ist nun ein Gemisch in wechselnden Verhältnissen von NO_2Cl , und dem etwas flüchtigen Körper NO_2Cl ; der Unterschied in der Flüchtigkeit ist zu gering, als daß durch ihn eine scharfe Trennung beider erreicht werden könnte. Jene Flüssigkeit giebt mit Wasser Salzsäure und die Producte der Untersalpetersäure mit Wasser; waltet NO_2Cl vor, so entwickelt sich bei der Einwirkung von Wasser Stickoxydgas. Die Dämpfe jener Flüssigkeit werden von concentrirter Schwefelsäure, unter grünlich-gelber Färbung, absorbirt; es entwickelt sich Chlor und Salzsäure.

Beide eben besprochene Verbindungen nebst Chlor und Wasser sind die Producte, welche aus der Einwirkung der Bestandtheile des Königswassers, namentlich in der Wärme, hervorgehen. Gay-Lussac widerlegt die von E. Davy und Baudrimont geäußerte Ansicht, das Königswasser wirke durch den Gehalt an einer Verbindung von Chlor, Stickstoff und Sauerstoff; er bestätigt die frühere Ansicht, daß dies durch den Gehalt an freiem Chlor geschieht. Auch bei der Einwirkung von Königswasser auf Gold liefs sich aus den sich entwickelnden Dämpfen eine Flüssigkeit condensiren, welche sehr nahe die Zusammensetzung NO_2Cl , zeigte; hingegen fehlte in diesen Dämpfen das Chlor.

Silber, Quecksilber, Kupfer geben mit Königswasser Stickoxydgas, ebenso arsenige Säure, Phosphor, Eisenchlorür. Zinn und die Metalle, welche das Wasser zersetzen, lösen sich in Königswasser, namentlich wenn es viele Salzsäure enthält, ohne Gasentwicklung, wegen der Bildung von Ammoniak. Zinnchlorür giebt mit Königswasser Stickoxydul.

Endlich zeigt Gay-Lussac, daß auch eine aus Salzsäure mit Untersalpetersäure bereitete Mischung das Gold

auföst; H. Davy (1) hatte angegeben, daß eine Mischung von concentrirter und mit Stickoxyd gesättigter Salpetersäure mit Salzsäure Gold nicht angreife.

Atmo-
sphärische
Luft.

Regnault (2) bestimmte das Gewicht eines Liter trockener atmosphärischer Luft bei 0° und unter 760^{mm} Druck für Paris zu 1,^{gramm}293187; Biot und Arago hatten früher dafür 1,^{gramm}299541 gefunden. Nach dieser Bestimmung von Regnault und den Versuchen desselben über die Dichtigkeit anderer Gase wiegt unter den angeführten Normalumständen 1 Liter

Stickgas	1, ^{gramm} 256167	Wasserstoffgas	0,089578 ^{gramm}
Sauerstoffgas	1,429802	Kohlensäuregas	1,977414 ^{gramm}

Doyère (3) kündigte an, daß er vom 1. September bis zum 20. December 1847 den Sauerstoffgehalt der Luft zu Paris zwischen 20,5 und 21,5 Volumprocenten schwankend gefunden habe. Regnault fand vom 24. bis zum 31. December 1847 (4) bei vielen Analysen im Durchschnitt 20,90 und 21,00, während des Januars 1848 (5) zwischen 20,89 und 20,99, und innerhalb derselben Grenzen variirten die Resultate für Luft von verschiedenen Zeiten desselben Tages. Doyère (6) beharrte dabei, daß Schwankungen zwischen 20,5 und 21,2 vorkommen; das Umwandelnde der dafür angeführten Beweise hat Regnault (7) nochmals dargethan.

R. F. Marchand (8) fand den Sauerstoffgehalt der Luft in 10 Versuchen zu 20,90 bis 21,03, im Mittel zu 20,97 Volumprocent; den Kohlensäuregehalt im Mittel aus 150 Versuchen zu 3,1 Vol. in 10000 Vol. Luft.

Ueber Ammoniakgehalt der Atmosphäre vgl. Seite 388.

R. A. Smith (9) will in dem Wasser, durch welches atmosphärische Luft anhaltend hindurchstrich, Schwefelsäure, Chlor

(1) Ann. ch. phys. [2] I, 327. — (2) Relation etc. (s. S. 70). — (3) Pogg. Ann. LXXIV, 202. — (4) Compt. rend. XXV, 928. — (5) Compt. rend. XXVI, 11. 156; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 221. — (6) Compt. rend. XXVI, 155; J. pr. Chem. XLIV, 49; Pharm. Centr. 1848, 355. — (7) Compt. rend. XXVI, 193. — (8) Compt. rend. XXVI, 233. — (9) J. pr. Chem. XLIV, 24. — (9) Instit. 1848, 379; Phil. Mag. [3] XXI, 48.

und eine organische, unreinem Albumin ähnliche, Substanz gefunden haben; auf dem Gehalt an einer solchen organischen Substanz beruhe vorzüglich die Verdorbenheit der Luft an Orten, wo viele Menschen zusammen sind. Er bespricht außerdem die Beimischungen, welche der Luft durch faulende Substanzen, Verbrennungsprocesse u. s. w. erwachsen können.

Atmosphärische Luft.

Kuhlmann (1) hat auf verschiedene Fälle aufmerksam gemacht, wo Salpetersäure in Ammoniak umgewandelt wird. Es geschieht dies bei der Einwirkung von verdünnter Schwefelsäure und Zink auf Salpeter, wo statt Schwefelsäure auch Salzsäure und statt Zink auch Eisen wirksam ist; von verdünnter Schwefelsäure (oder Salzsäure) und Schwefeleisen (oder Schwefelantimon) auf ein salpeters. Salz, wobei sich Schwefel absetzt; von Salzsäure und Zink auf ein salpeters. Metalloxyd, dessen Metall durch Zink fällbar ist (z. B. Kupfer); von einer Auflösung von Schwefelarsenik in Aetzkali auf Salpeter in gelinder Wärme, langsam; von Schwefelsäure auf eine Lösung von Salpeter in Schwefelkaliumlösung, wenn erstere Säure allmählig bis im Ueberschusse zugesetzt wird, gleichfalls langsam; von einer schwachen Salpeterlösung auf Eisenoxydulhydrat oder Zinnoxydulhydrat bei gelinder Wärme, ebenso; von Schwefelwasserstoff auf eine Lösung von Chlorantimon, in welcher sich Salpeter befindet.

Ammoniak.

Reichenbach (2) hat zur Beantwortung der Frage, ob der Stickstoff der Atmosphäre zur Bildung von Ammoniak beitrage, daran erinnert, dafs Holzkohle für sich und kohlen. Kali für sich längere Zeit geglüht kein Ammoniak entwickeln, wohl aber anhaltend, wenn beide gemengt bei Luftzutritt geglüht werden; die Ammoniakbildung beruhe hier auf vorgängiger Bildung von Cyankalium und cyans.

(1) Ann. ch. phys. [3] XX, 223; J. pr. Chem. XLI, 289; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 283; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 721. — (2) Aus den Berichten über die Mittheilungen von Freunden der Naturwissenschaften in Wien, I, 158, im J. pr. Chem. XLI, 56.

Kali und Zersetzung des letztern unter Einfluss von Wasserdampf.

Kemp (1) hat Versuche über den Ammoniakgehalt der Atmosphäre angestellt; er liefs die Luft durch Quecksilberchlorid streichen, um das Ammoniak zu absorbiren, und fand 1,8 Milligramm desselben in 24840 Kubikzoll (englisch) Luft.

Kohlen-saures
Ammoniak.

Zweifach-kohlens. Ammoniak ist in bedeutenden Quantitäten in einem Guanolager an der Westküste Patagoniens gefunden und in den Handel gebracht worden. Ulex (2) hat es untersucht; es sind krystallinische Stücke, welche nach zwei, unter 112° zu einander geneigten, Richtungen leicht spaltbar sind, vom spec. Gew. 1,45 und der Zusammensetzung $\text{NH}_4\text{O}, 2 \text{CO}_2 + \text{HO}$.

Schwefels.
Ammoniak.

Kühn (3) hat bestätigt, dafs die Formel des krystallisirten schwefels. Ammoniaks $\text{NH}_4\text{O}, \text{SO}_3$ sei; sie verlangt 60,6 pC. Schwefelsäure, gefunden wurde 59,7.

Chlorammonium:
Doppelsalze mit demselben
gebildet.

Hautz (4) hat mehrere Doppelsalze von Chlorammonium mit Chlormetallen aus der Magnesiumreihe untersucht. Das Magnesiadoppelsalz wird von constanter Zusammensetzung nur erhalten bei überschüssigem Zusatz von Ammoniak zu verdünnter Lösung von Magnesia in Salzsäure; es krystallisirt aus der Flüssigkeit in grossen durchsichtigen farblosen Prismen des 1- und laxigen Systems. In derselben Form, aber mit grüner Farbe, krystallisiert das Nickeldoppelsalz, dargestellt durch Sättigen von 2 Gewichtsth. Salzsäure mit Nickeloxydul, und 1 Salzäure mit Ammoniak, Vermischen und langsam Verdunstenssen. Das ebenso dargestellte Kobaltdoppelsalz bildet rubinrothe Krystalle des 2- und 1gliedrigen Systems. Diese drei Doppelsalze haben entsprechende Zusammensetzung: $\text{NH}_4\text{Cl}, 2 \text{Me Cl} + 12 \text{HO}$, wo $\text{Me} = \text{Mg}, \text{Ni}$ oder Co ; das

(1) Chem. Gaz. 1848, 99; Pharm. Centr. 1848, 315. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 44; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 845. — (3) Arch. Pharm. [2] L, 284; Pharm. Centr. 1847, 595. — (4) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 280; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 792.

Magnesiumsalz verliert bei 100° 4 HO, bei 135° den Rest des Wassers.

Ebenso wie die letzteren Doppelsalze wurden die mit Mangan-, Zink- und Kupferchlorid dargestellt. Diese krystallisiren in denselben Formen des 2- und 1gliedrigen Systems; das Mangansalz ist blafsroth und in $1\frac{1}{2}$ Theilen Wasser von gewöhnlicher Temperatur löslich; das Zinksalz farblos und fast zerfließlich; das Kupfersalz blaugrün und in 2 Wasser löslich. Alle drei sind zusammengesetzt NH_4Cl , $2 \text{ Me Cl} + 4 \text{ HO}$, wo $\text{Me} = \text{Mn, Zn oder Cu}$; das Mangansalz verliert bei 100° 3 HO, alle bei 135° sämmtliches Wasser.

Das schon früher erhaltene Zinkdoppelsalz NH_4Cl , $\text{Zn Cl} + \text{HO}$ ist auch von Hautz dargestellt und analysirt worden.

Townsend Harris (1) hat das bei gewöhnlicher Temperatur und das bei dem Abdampfen einer concentrirten Lösung bei 100° krystallisirende salpeters. Ammoniak untersucht, und in beiden Fällen die Zusammensetzung NH_4O , NO , gefunden, doch schien ihm das Salz in beiden Fällen verschiedene Krystallform zu besitzen. 100 Gewichtstheile Wasser lösen nach ihm 185 salpeters. Ammoniak bei 10° .

Crookewitt (2) hat untersucht, in welchen Verhältnissen chemische Verbindungen der Metalle unter sich stattfinden können. Durch Amalgamirung von Metallen und Auspressen in sämisch Leder erhielt er krystallinische Verbindungen, deren Zusammensetzung nahe Au Hg_4 (spec. Gew. 15,412), Bi Hg (10,45), Pb Hg (11,93), $\text{Cd}_2 \text{ Hg}_3$ (12,615). Mit Kalium erhielt er zwei Amalgame, $\text{K Hg}_{3,0}$ und $\text{K Hg}_{3,5}$, mit Silber (durch Zusammenbringen von Quecksilber mit gelöstem salpetersaurem Silber, je nach der Quantität des Quecksilbers) $\text{Ag}_3 \text{ Hg}_{1,6}$, Ag Hg_2 , Ag Hg_3 ,

Salpeters.
Ammoniak.

Metalle im
Allgemei-
nen.
Legirungen.

(1) Compt. rend. XXIV, 816; J. pr. Chem. XLI, 345. — (2) Specimen chemicum de conjunctionibus chemicis metallorum; Amstelodami 1848 (auch unter dem Titel: Verhandeling over scheikundige metaalverbindingen); im Ausz. J. pr. Chem. XLV, 87; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 289; Pharm. Centr. 1849, 153.

Ag Hg₄; mit Zink ein Amalgam, das 29,4 Procent Zink enthielt. — Von andern Legirungen stellte er noch dar, und bestimmte er das spec. Gew.:

Cu, Sn, 7,652	Cu, Zn, 7,939	Cu, Pb, 10,753	Sn Zn, 7,096	Sn Pb, 9,906
Cu Sn 8,072	Cu, Zn, 8,224	Cu Pb 10,375	Sn Zn 7,115	Sn Pb 9,904
Cu, Sn 8,512	Cu, Zn 8,392		Sn, Zn 7,235	Sn, Pb 9,905

Metall-
hydrüre.

Dafs der in einer Silberlösung unter gewissen Umständen am negativen Pol einer galvanischen Batterie entstehende schwarze Niederschlag nicht eine Verbindung von Silber und Wasserstoff, sondern nur Silber in höchst fein zertheiltem Zustande ist, hat Poggendorff (1) gezeigt. Auch aus Wismuth-, Antimon- oder Tellurlösung wird unter diesen Umständen nur fein zertheiltes Metall abgeschieden; nur aus einer wenig angesäuerten Lösung von schwefels. Kupferoxyd wird durch einen Strom von mäßiger Stärke an dem negativen Polende schwarzbraunes Kupferhydrür gebildet, aus welchem nach Unterbrechung des Stroms sich Wasserstoffgas entwickelt.

Kalium.
Schwefelsau-
res Kal.

Pasteur (2) hat die schon vorher bekannte Thatsache, dafs die Krystalle des schwefels. Kalis meistens zusammengesetzt sind, und dafs dieses sich in ihrem optischen Verhalten kund thut, bestätigt.

Natrium.
Chlornatrium.

Nach R. Wagner (3) löst Weingeist von 75° Gew. Proc. bei 14° 0,661, bei 15°,25 0,700, bei 38° 0,736, bei 71° 1,033 Procent Chlornatrium; 95,5 procentiger Weingeist bei 15° 0,174, bei 77°,25 0,171.

Lithium.

Rammelsberg (4) hat bei vielfach abgeänderten Versuchen gefunden, dafs schwefels. Lithion mit schwefel. Thonerde eben so wenig ein Doppelsalz (Lithionalsulfat) bildet, als mit schwefels. Magnesia, Zink- oder Kupferoxyd, Nickel-, Kobalt-, Mangan- oder Eisenoxydul.

Baryum.

Für das Atomgewicht des Baryums hatte Berselius 68,39, Pelouze später 68,64 gefunden. Marignac (5)

(1) Pogg. Ann. LXXV, 337; J. pr. Chem. XLV, 65; Berl. Acad. Ber., Juni 1848; Pharm. Centr. 1849, 39; Instit. 1848, 303. — (2) Compt. rend. XXVI, 304; J. pharm. [3] XIV, 380. — (3) J. pr. Chem. XL, 448. — (4) Berl. Acad. Ber., Nov. 1848, 385; Pharm. Centr. 1849, 104. — (5) Arch. ph. nat. VIII, 269; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 212.

hat es, wie Pelouze, dadurch zu bestimmen gesucht, dafs er ermittelte, durch wieviel Silber in Auflösung ein bekanntes Gewicht Chlorbaryum zersetzt wird, und 68,54 gefunden.

Wittstein (1) hat gefunden, dafs 1 Gewichtstheil Calcium.
Kalk. Kalk sich in 729 bis 733 Wasser von gewöhnlicher Temperatur, und in 1310 bis 1569 kochendem Wasser auflöst; auch dafs der aus Kalkwasser an der Luft sich absetzende Niederschlag wirklich CaO , CO_2 ist.

Millon (2) hat angegeben, dafs durch Fällung erhaltener schwefels. Kalk ebenso wie gebrannter und genetzter Gyps (CaO , $\text{SO}_3 + 2\text{HO}$) bei 80 bis 85° drei Viertheile seines Wassergehalts (15 pC. etwa) abgebe, während für natürlichen Gyps wie für künstlich (aus Salzsäure) krystallisirten dieses erst bei 105 bis 110° eintrete; es bilde sich die Verbindung $2(\text{CaO}, \text{SO}_3) + \text{HO}$. Das letzte Viertheil Wasser gehe aus dem Gyps erst bei 200 bis 300° weg. — Plessy (3) gab dagegen an, dafs natürlicher sowohl wie künstlich krystallisirter schwefels. Kalk in einem Strom von Wasserstoffgas auf 110—115° erhitzt seinen Wassergehalt vollständig abgebe; dafs Gyps an freier Luft auf 110 bis 115° erhitzt 15 pC. (etwa $\frac{1}{4}$ seines ganzen Gehalts) Wasser verliere und hier eine Art Stillstand in der Wasserentwicklung eintrete, dafs aber bei 130 bis 140° sich weitere 2 pC. Wasser entwickeln, und bei 200 bis 250° der Gyps wasserfrei wird; auch dieser wasserfreie Gyps nehme sein Krystallwasser wieder vollständig auf (sei also nicht todt gebrannt). Plessy bezweifelte, dafs eine bestimmte Verbindung $2(\text{CaO}, \text{SO}_3) + \text{HO}$, wie es Millon angab, gebildet werde; Millon (4) hingegen, dafs Plessy's Versuche einen Widerspruch gegen seine Ansicht begründen. Plessy (5) hat hierauf bestimmter angegeben, dafs nach Schwefels.
Kalk.

(1) Repert. Pharm. [3] I, 182. — (2) Ann. ch. phys. [3] XIX, 222; J. pr. Chem. XL, 363; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 395; Phil. Mag. [8] XXX, 299. — (3) Compt. rend. XXIV, 658. — (4) Compt. rend. XXIV, 695. — (5) Compt. rend. XXIV, 812.

seinen Versuchen krystallisirter Gyps schon bei $95 - 100^\circ$ Wasser verliere, und bei 110° 17–19 pC., also mehr, als bei der von Millon angenommenen Bildung der Verbindung $2(\text{CaO}, \text{SO}_3) + \text{HO}$ weggehen dürfe.

Magne-
sium.

Scheerer (1) hatte durch Bestimmung, wieviel schwefels. Baryt durch Zersetzung einer gewogenen Quantität reiner schwefels. Magnesia erhalten werde, das Atomgewicht der Magnesia im Mittel aus 6 Versuchen = 20,08 gefunden. Auf Berzelius' Erinnerung, daß der schwefels. Baryt noch Magnesiasalz habe enthalten können, wiederholte er den Versuch und fand Berzelius' Vermuthung bestätigt. Indem er für diese Fehlerquelle eine Correction an seinen früheren Versuchen anbringt, setzt er jetzt (2) das Atomgewicht der Magnesia = 20,11. — Svanberg und Nordenfeldt (3) haben untersucht, wieviel Magnesia aus einem bekannten Gewicht oxals. Magnesia ($\text{MgO}, \text{C}_2\text{O}_3 + 2 \text{HO}$) erhalten wird, und wieviel schwefels. Magnesia ein bekanntes Gewicht Magnesia giebt; sie fanden im Mittel mehrerer Versuche das Atomgewicht der Magnesia auf die erstere Art 20,35 und auf die zweite Art 20,37.

Magnesia.

Das spec. Gewicht der wasserfreien Magnesia ist durch H. Rose (4) bestimmt worden; er fand es für die im Porzellanofen geglühte = 3,65, nahe übereinstimmend mit dem, welches Scacchi für den Periklas (MgO mit wenig FeO) gefunden hat (3,75).

Schwefels.
Magnesia-
Natron.

Miller (5) fand die Krystallform des schwefels. Magnesia-Natrons monoklinometrisch; speciellere Bestimmungen ließen die von ihm betrachteten Krystalle nicht zu.

Salpeters.
Magnesia.

Einbrodt (6) hatte zur Darstellung der Verbindung von salpeters. Magnesia mit Alkohol das sechsfach gewässerte

(1) Pogg. Ann. LXIX, 535. — (2) Pogg. Ann. LXX, 407; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 314. — (3) J. pr. Chem. XLV, 473. — (4) Pogg. Ann. LXXIV, 437; J. pr. Chem. XLIV, 229; Berl. Acad. Ber., April 1848; Pharm. Centr. 1848, 487; Instit. 1848, 369. — (5) Chem. Soc. Mem. III, 391; Phil. Mag. [3] XXXI, 540. — (6) Ann. Ch. Pharm. LXV, 115; J. pr. Chem. XLVI, 165; Pharm. Centr. 1848, 206; Chem. Gaz. 1848, 85.

Salz in beinahe absolutem Alkohol aufgelöst, und daraus Krystalle erhalten, welche nach zwei Jahren sich zu einer gelblichen Schicht concentrirter wässeriger Lösung und zu büschelförmig vereinigten spiefsigen Krystallen verändert hatten. Letztere enthielten so viel Magnesia als MgO , NO_2 , $+6\text{HO}$, waren aber quadratisch krystallisirt und nicht zerfließlich.

Marignac (1) hat das Atomgewicht des Cerium's Cerium. bestimmt, durch Ermittlung, durch wieviel Chlorbaryum eine bekannte Menge schwefels. Ceroxyduls genau zerlegt wird, und fand 47,26. Beringer hatte 46,16, Rammelsberg 45,8, Hermann 46,0 gefunden.

Marignac giebt noch einiges auf das Cer bezügliche an. Zur Darstellung des Gemenges von Cer-, Lanthan- und Didymoxyd empfiehlt er, gepulverten Cerit mit Schwefelsäure zu dickem Teig anzurühren, das entstehende trockne Pulver in einem irdenen Tiegel längere Zeit etwas unter der Rothglühhitze zu erhalten, es sodann erkaltet sehr allmählig in kaltem Wasser zu vertheilen, wo sich die schwefels. Salze der genannten Stoffe auflösen. — Für die Scheidung des Ceroxyds nach Mosander's Methode mittelst Salpetersäure fand es Marignac nothwendig, daß gar keine Schwefelsäure zugegen sei. Das durch Glühen des salpeters. Ceroxyds erhaltene Oxyd hat etwa die Zusammensetzung 3CeO , $2\text{Ce}_2\text{O}_3$; mit Schwefelsäure behandelt giebt es gelbes schwefels. Ceroxydoxydul, welches sich bei Ueberschuß von Schwefel- oder Salpetersäure in Wasser zu einer dunkel rothgelben Flüssigkeit löst, aus welcher es durch vieles Wasser wieder als ein gelbes Pulver niedergeschlagen werden kann; bei 100° getrocknet zeigt es die Zusammensetzung 3CeO , $2\text{Ce}_2\text{O}_3$, 4SO_3 , 7HO ; wegen seiner Unlöslichkeit in Wasser eignet es sich zur Darstellung einer reinen Cerverbindung. — Schwefels. Ceroxydul krystallisirt bei allmähligem Verdunsten seiner wässerigen Lösung in rhombischen Pyramiden mit Endkanten von

(1) Arch. ph. nat. VIII, 265; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 212.

114° 12' und 111° 10', an denen häufig noch eine spitzere Pyramide mit Endkanten von 99° 48' und 95° 48' sich zeigt.

Beryllium.
Beryllerde.

H. Rose (1) hat das spec. Gew. der Beryllerde untersucht. Ueber der Spirituslampe geglüht zeigte sie 3,09 bis 3,08, im Porcellanofen geglüht 3,02 bis 3,03. H. Rose hält Berzelius' Annahme für das Atomgewicht des Berylliums, wonach die Beryllerde durch Be_2O_3 ausgedrückt ist, für begründeter, als die, wonach diese Erde die Zusammensetzung BeO hat, weil unter ersterer Annahme sich das spec. Volum der Beryllerde sehr nahe gleich dem der Thonerde berechnet.

Aluminium.
Thonerde.

H. Rose (2) hat auch das spec. Gew. der Thonerde untersucht. Ueber der Spirituslampe geglüht zeigte sie es = 3,87 bis 3,90; im Windofen 6 Stunden lang geglüht 3,75 bis 3,725, im Porcellanofen geglüht 3,999. Das stimmt mit dem der natürlichen krystallisirten Thonerde, welche als Rubin und Sapphir auch nach Schaffgotsch's neueren Versuchen das spec. Gew. 4,0 zeigt. Korund zeigte ein etwas kleineres, 3,90 bis 3,97.

Phillips (3) hat beobachtet, daß Thonerdehydrat, nach dem Füllen feucht erhalten oder unter Wasser aufbewahrt, in wenigen Tagen in Säuren schwer löslich wird.

Schwefels.
Thonerde.
Kali.

Von einer Untersuchung Jacquelain's über den Alaun sind nur die Folgerungen des Verfassers bis jetzt publicirt worden (4). Bis zur Kenntnifs der vollständigen Arbeit heben wir hier nur hervor, daß er gefunden zu haben glaubt, in dem Alaun seien nur 22 Atome Wasser enthalten; der Formel der natürlichen schwefels. Thonerde gesteht Jacquelain nur 16 Atome Wasser zu.

Gerhardt (5) vertheidigt die allgemein für den Alaun angenommene Formel. Ohne die früheren Beobachtungen

(1) Pogg. Ann. LXXIV, 438; J. pr. Chem. XLIV, 228; Pharm. Centr. 1848, 486; Berl. Acad. Ber., April 1848; Instit. 1848, 368. —

(2) Pogg. Ann. LXXIV, 430; J. pr. Chem. XLIV, 226; Berl. Acad. Ber., April 1848; Pharm. Centr. 1848, 485; Instit. 1848, 368. — (3) Chem. Gaz. 1848, 349; Pharm. Centr. 1848, 845. — (4) Compt. rend. XXIV, 441. — (5) J. pharm. [8] XII, 65.

von Geiger, Graham und Hertwig über die Einwirkung von Wärme und von Schwefelsäure auf den Alaun zu berücksichtigen, giebt er an, daß der krystallisirte Alaun bei 120° $\frac{1}{2}$ seines Wassergehalts verliere, ohne in Wasser unlöslich zu werden, was aber durch Erwärmen bis zu 200° eintrete; dieser unlösliche (wasserfreie) Alaun könne auch durch Einwirkung von concentrirter Schwefelsäure in der Wärme auf krystallisirten Alaun dargestellt werden; mit Wasser 8 bis 10 Tage in Berührung verwandle er sich wieder in löslichen.

Darüber, daß ein Lithionalaun nicht existire, vgl. S. 394.

Pierre (1) hat die Frage über das Atomgewicht des Siliciums und die Formeln seiner Verbindungen behandelt; er will zur Entscheidung hierüber hinwirken durch Untersuchung von Substitutionsverbindungen, von Doppelchloriden, von Aether- und Amidverbindungen. Bis jetzt ist nur der erste Theil seiner Untersuchungen bekannt geworden. Pierre giebt hier in Beziehung auf die Einwirkung des Schwefelwasserstoffs auf Chlorsilicium (Si Cl_3) bei höherer Temperatur allgemein an, daß man das Chlor partiell oder vollständig durch Schwefel ersetzen könne; außer der leicht zu isolirenden Verbindung Si SCl_2 (vergl. Seite 401) existire wahrscheinlich auch $\text{Si S}_2\text{Cl}$; Si S_3 könne rein erhalten werden (als Rückstand bei der Destillation des rohen Chlorschwefelsiliciums Si SCl_3). Pierre zeigt, daß für diese Verbindungen die Formeln sich am einfachsten gestalten, wenn man für das Chlorsilicium die Formel Si Cl_3 (für die Kieselerde also Si O_3) annimmt, daß sie hingegen sehr complicirt werden, wenn man für Chlorsilium und Kieselerde die Formeln Si Cl und Si O oder Si Cl_2 und Si O_2 annimmt.

Die größere Wahrscheinlichkeit der Formel Si O_3 für Kieselerde, Si Cl_3 und Si Br_3 für Chlorsilicium und Brom-

(1) Compt. rend. XXVI, 528; Pharm. Centr. 1848, 585; Phil. Mag. [3] XXXIII, 162; vollständig Ann. ch. phys. [3] XXIV, 286; im Ausz. Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 170.

silicium geht nach H. Kopp (1) auch daraus hervor, daß beide letztere Substanzen eine solche Differenz der Siedepunkte zeigen, wie sie Verbindungen zukommt, deren eine 3 Atome Cl an der Stelle von 3 Atomen Br in der andern enthält (vergl. Seite 93).

Kieselerde.

Doveri (2) hat Beobachtungen über die Kieselerde veröffentlicht, welche größtentheils schon Bekanntes betreffen. Er bespricht, daß bei Zusatz von Säure zu einer Lösung von kiesels. Alkali mehr Kieselerde gelöst bleibt, wenn die Säure auf einmal, als wenn sie allmählig zugesetzt wird; mehr bei Anwendung einer verdünnten als bei der einer concentrirten Lösung; daß doppelt kohlens. Alkali und Kohlensäure aus kiesels. Alkali die Kieselerde gallertartig abscheiden, ebenso schweflige und andere schwache Säuren. Dieser gallertartige Niederschlag scheint sich bei Zusatz von Wasser aufzulösen, aber es ist nur scheinbar; er wird nur durchsichtig und kann durch Filtriren vom Wasser getrennt werden. Ganz dasselbe zeigt sich für die aus Fluorsilicium mit Wasser erhaltene Kieselgallerte bei Behandlung mit Salzsäure. Die bei Gegenwart von Wasser ausgeschiedene und bei gewöhnlicher Temperatur getrocknete Kieselerde, sie mag aus kiesels. Alkali durch Säure oder aus Fluorsilicium durch Wasser erhalten sein, enthält stets dieselbe Quantität Wasser, entsprechend der Formel $\text{Si O}_2, \text{HO}$, und wird bei 100° zu $2 \text{ Si O}_2, \text{HO}$. Fein zertheilte Kieselerde zersetzt kohlens. Alkalien bei dem Kochen mit ihrer Lösung, und bei längerem Kochen auch doppelt kohlens. Alkalien. Doveri zersetzte Kupferchlorid mit kiesels. Kali, behandelte den gewaschenen Niederschlag mit Salzsäure, filtrirte, leitete Schwefelwasserstoff durch das Filtrat, filtrirte, und hatte nun eine klare Auflösung von

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 356; im Ausz. Pharm. Centr. 1849, 123; J. pharm. [3] XV, 226; Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 173. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXI, 40; J. pr. Chem. XLII, 194; im Ausz. Compt. rend. XXV, 109; Phil. Mag. [3] XXXI, 315; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 256; Pharm. Centr. 1847, 658.

Kieselerde, welche er durch Kochen von Schwefelwasserstoff befreite. Sie gab mit Alkalien einen Niederschlag von gallertartiger Kieselerde, im luftleeren Raum über Kalk abgedampft Krystallnadeln, sternförmig oder büschelförmig vereinigt, welche nach der Formel $\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ zusammengesetzt waren. Kieselerde.

Hinsichtlich der Zusammensetzung, Classification u. s. w. der kiesel. Salze vergl. den mineralogischen Jahresbericht.

Nach Pierre (1) bildet sich bei dem Durchleiten der Dämpfe von Chlorsilicium und von Schwefelwasserstoff durch eine rothglühende Porcellanröhre Chlorwasserstoff und eine Flüssigkeit, welche durch Rectification (wobei das zuerst Uebergehende Chlorsilicium mit wenig Chlorschwefel ist) rein erhalten werden kann. Sie raucht an der Luft, ihr Geruch erinnert an den des Chlorsiliciums und des Schwefelwasserstoffs; sie giebt mit Wasser eine Entwicklung von Schwefelwasserstoff und einen unbedeutenden Niederschlag von Schwefel; spec. Gew. 1,45 etwa bei 15°; Siedepunkt über 100°. Ihre Zusammensetzung ist SiSCl_2 . Die Dampfdichte wurde = 4,78, 5,24, 5,23 gefunden; 5,00 entspricht einer Condensation auf 3 Volume. (Vgl. noch oben, S. 399.) Chlorschwefelsilicium.

Die Ausscheidung einer sehr großen Menge metallischen Titans (mindestens 80 Pfund) in einem Hohofen zu Rübeland am Harz hat Blumenau (2) beschrieben. Titan.

Das Atomgewicht des Titans, welches von H. Rose zu 24,3, von Mosander zu 23,7 bestimmt worden war, ist der Gegenstand von Versuchen Pierre's (3) gewesen. Eine gewogene Menge Titanchlorid brachte er in Wasser, und ermittelte den Chlorgehalt nach Gay-Lussac's Methode (Messung der zur Fällung nöthigen Silberlösung von bekannter Zusammensetzung). Er fand wechselnde Resultate;

(1) Compt. rend. XXIV, 814; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 259; J. pr. Chem. XLI, 342; Pharm. Centr. 1847, 717; vollständiger Ann. ch. phys. [3] XXIV, 286; Ann. Ch. Pharm. LXIX, 73; J. pr. Chem. XLVI, 65. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 122. — (3) Ann. ch. phys. [3] XX, 257; J. pr. Chem. XLII, 65; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 220.

Titan. die Versuche mit den ersten Portionen einer Quantität Chlortitan gaben stets den Chlorgehalt etwas höher, als die mit den letzten, was er dem zersetzenden Einfluss der feuchten Luft (welche bei dem Oeffnen des Gefäßes eingewirkt habe) zuschreibt. Als das wahrscheinlich genaueste Resultat seiner Versuche betrachtet er, daß das Atomgewicht des Titans zu 25,2 zu setzen sei.

Ueber saure titans. Alkalien vgl. bei analytischer Chemie.

Chlortitan
Ti₂Cl₃.

Versuche von Ebelmen über das Titan, deren Resultate schon 1846 bekannt wurden (1), sind später (2) vollständig beschrieben worden. — Bei dem Durchleiten von Wasserstoffgas und den Dämpfen von Titanchlorid (TiCl₃) durch ein glühendes Rohr bildet sich Salzsäure und eine neue Verbindung Ti₂Cl₃, welche letztere sich im kälteren Theile des Rohres absetzt. Sie erscheint so in der Form glänzender, dunkelvioletter, breiter Schuppen, ist sehr veränderlich, entwickelt auf Platin unter Luftzutritt geglüht TiCl₃ und hinterläßt Titansäure; dieselbe Zersetzung scheint, aber langsam, bei gewöhnlicher Temperatur einzutreten. Sie ist flüchtig, aber weniger als TiCl₃, raucht nicht an der Luft, zerfließt an derselben, giebt mit Wasser unter Erwärmung eine violettrothe Lösung, welche an der Luft sich allmählig entfärbt und Titansäure absetzt; dieselbe Lösung entwickelt beim Abdampfen Salzsäure und es bleibt ein blaues Oxychlorid. Die Auflösung in Wasser giebt mit Alkalien einen dunkelbraunen Niederschlag, welcher schnell hintereinander, unter Wasserstoffentwicklung, schwarz, blau, dann weiß wird. Die kohlens. Alkalien geben fast genau dieselbe Reaction; zuerst entwickelt sich Kohlensäure, dann Wasserstoff. Schwefelwasserstoff zeigt keine Einwirkung; Schwefelammonium-Schwefelwasserstoff giebt einen braunen Niederschlag, der mit dem durch Alkalien gebildeten identisch zu sein scheint und gleichfalls zu weißer Titansäure wird.

(1) Instit. 1846, 225. — (2) Ann. ch. phys. [3] XX, 385; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 269; J. pr. Chem. XLII, 70; Pharm. Centr. 1847, 673; J. Pharm. [3] XII, 437.

$Ti_2 Cl_3$ ist ein energisches Reductionsmittel, scheidet aus schwefliger Säure Schwefel, aus Gold- Silber- und Quecksilbersalzen das Metall, aus Kupferoxydsalzen Kupferoxydul ab; Eisenoxydsalzlösungen entfärbt es, unter Bildung von Eisenoxydul. In kleiner Menge dem Wasser zugesetzt, leitet es die Auflösung des violetten Chromchlorids ein.

Chlortitan
 $Ti_2 Cl_3$.

Die Wasserstoffentwicklung, welche nach Zersetzung einer gewogenen und in Wasser gelösten Menge von $Ti_2 Cl_3$ durch Alkalien vor sich geht, entspricht der Quantität nach genau derjenigen, welche sich nach der Annahme berechnet, daß der Niederschlag das Wasser zersetzt, um Titansäure zu bilden.

Die beschriebene Bildung von $Ti_2 Cl_3$ ist gewöhnlich von der metallischen Titans begleitet, welches sich in dünnen Schichten absetzt, goldgelbes Licht reflectirt und blaues durchläßt. Einzelne Blättchen einer goldgelben Substanz finden sich auch, welche nach Ebelmen wahrscheinlich $TiCl$ sind.

Titansäure, in einem Strom trockenen Wasserstoffs stark geglüht, wird schwarz und zu $Ti_2 O_3$. Dieses Oxyd läßt sich nur bei sehr hoher Temperatur zu Titansäure rösten; Salpetersäure und Salzsäure wirken nicht darauf ein. Schwefelsäure löst es mit violetter Farbe; die Lösung, im luftleeren Raum über Kalk concentrirt, giebt nur Spuren von Krystallen und trocknet zu einer warzigen violetten Masse ein; die violette wässerige Lösung entfärbt sich beim Kochen unter Absatz von Titansäure, sie zeigt dieselben Reactionen wie die von $Ti_2 Cl_3$. Bei der Analyse des trockenen Salzes erhielt Ebelmen mehr Schwefelsäure, als der Formel $Ti_2 O_3, 3 SO_3$ entspräche; das Nähere ist nicht angegeben.

Titanoxyd
 $Ti_2 O_3$.

Ebelmen fand, daß die Einwirkung von Schwefelkohlenstoff auf glühende Titansäure kein Product von constanter Zusammensetzung giebt. Ein solches erhielt er aber bei dem Durchleiten von Schwefelwasserstoff und den Dämpfen von $TiCl_3$ durch ein eben glühendes Glasrohr; das Innere desselben bekleidet sich mit krystallinischen, glänzend messinggelben Blättern, welche stark abfärben, an der Luft

Schwefeltitan
 $Ti S_2$.

unter merklicher Entwicklung von Schwefelwasserstoff sich verändern, weder von Salzsäure noch von verdünnter Schwefelsäure aufgelöst werden, wohl aber und ohne erheblichen Rückstand von Königswasser. Erhitzt entzündet sich diese Substanz und verwandelt sich in Titansäure. Ihre Zusammensetzung ist TiS_2 . In der Retorte, in welcher behufs der Darstellung von TiS_2 Titanchlorid erhitzt wurde und wohin Schwefelwasserstoff dringen konnte, fand sich nach beendigter Operation eine olivengrünliche Substanz, welche durch Druck Metallglanz annahm, und gleichfalls TiS_2 war, dessen Bildung also schon bei einer dem Siedepunkt von $TiCl_3$ nahe liegenden Temperatur beginnt.

Ilmenium.

Hermann (1) hat neue Beweise dafür zu geben versucht, daß in dem sogenannten Yttrilmenit von Miask ein eigenthümliches Metall, Ilmenium, enthalten sei. H. Rose (2) hat neue Gründe dafür mitgetheilt, daß dieses Mineral identisch mit dem von ihm untersuchten Samarskit, und die vermeintliche Ilmeniumsäure nicht eine eigenthümliche Säure, sondern mehr oder weniger verunreinigte Niobsäure sei.

Tantal.
Tantalsäure.

H. Rose (3) hat das spec. Gewicht der Tantalsäure untersucht. Die aus dem Chlorid dargestellte und über der Spirituslampe bis zum Eintreten der Lichterscheinung erhitzte Säure zeigte ein spec. Gew. 7,03 bis 7,53, durch verschieden starkes und langes Glühen wurde das spec. Gewicht erhöht, bis 7,99 und selbst bis 8,26. Im Allgemeinen entsprach gröfsere Dichtigkeit einem deutlicheren krystallinischen Zustand; auffallende Anomalien zeigten sich auch, indem z. B. einmal geglühte Säure durch noch stärkeres Glühen specifisch leichter wurde. Diese Versuche wurden mit Säure aus finnischen Tantaliten dargestellt; Säure aus dem Yttertantal von Ytterby zeigte das spec. Gew. 7,43.

(1) J. pr. Chem. XL, 457; Pharm. Centr. 1847, 497. J. pr. Chem. XLII, 129. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 157; LXXIII, 449; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 169. — (3) Pogg. Ann. LXXIV, 285; im Ausz. Berl. Acad. Ber., März 1848; Pharm. Centr. 1848, 443; J. pr. Chem. XLIV, 223; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 166; Instit. 1848, 367.

H. Rose (1) hat auch das spec. Gewicht der Niob-säure untersucht. Die aus dem Columbit von Bodenmais dargestellte, bis zum Eintreten der Lichterscheinung erhitzt, zeigte 4,96 und 5,12, mehrere Stunden im Windofen geglüht 4,56, der Hitze des Porcellanofens längere Zeit ausgesetzt 4,60; Säure von andern Bereitungen im ersten Falle 5,25 und 4,76, im zweiten 4,58, im dritten 4,59. Säure aus dem nordamerikanischen Columbit zeigte im ersten Fall 5,26 und 4,66, im dritten constant 4,60. Säure aus dem Samarskit (Uranotantal) von Miask im ersten Fall 5,26 und 4,69, im dritten 4,63 und 4,69. Bei geringerem spec. Gewicht zeigte sie sich deutlicher krystallinisch. Rose schließt, die Säure könne amorph und krystallinisch dargestellt werden, und im ersteren Zustande sei sie dichter; die amorphe entstehe durch rasche Zersetzung des Chlorids mit Wasser, die krystallinische bei allmäliger Einwirkung feuchter Luft auf das Chlorid, und bei der Hitze des Porcellanofens.

Niobium.
Niobsäure.

H. Rose (2) hat endlich noch Versuche über das spec. Gew. der Pelopsäure angestellt. Aus dem Columbit von Bodenmais bereitete, mittelst der Zersetzung des Chlorids dargestellte, Säure zeigte, über der Spirituslampe bis zum Eintreten der Lichterscheinung erhitzt, 5,98, mehrere Stunden im Windofen geglüht 6,37, im Porzellanofen geglüht (nach welcher Operation sie krystallinisch war) 5,79. Säure von anderer Bereitung zeigte im ersten Fall 5,95, im zweiten 6,09. Im Porcellanofen geglüht, löst sich die Säure nur schwierig in schmelzendem zweifach-schwefels. Kali. Die nach dieser Behandlung dargestellte Säure zeigte im ersten Fall 6,14, im zweiten 6,48, im dritten 5,83. Andere aus dem Chlorid dargestellte Säure zeigte im ersten Fall 5,70, im zweiten 6,32, im dritten 5,79. Andere aus

Pelopium.
Pelopsäure.

(1) Pogg. Ann. LXXIII, 313; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 165; Pharm. Centr. 1848, 145. — (2) Pogg. Ann. LXXIV, 85; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 165; Pharm. Centr. 1848, 439; J. pr. Chem. XLIV, 220; Arch. ph. nat. VIII, 215.

Pelopsäure. dem Chlorid sofort nach der Bereitung durch Behandlung mit Wasser dargestellte im ersten Fall 6,24, im zweiten 6,42, länger erhitzt 6,73. Aus Chlorid an der Luft langsam gebildete Säure zeigte im ersten Fall 6,24. Aus Acichlorid dargestellte, krystallinische, zeigte im ersten Fall 5,49. — Aus nordamerikanischem Columbit dargestellte Säure (aus Pelopchlorid, welches sich an der Luft langsam zersetzt) zeigte im ersten Fall 6,10, im dritten 6,17. — Rose unterscheidet drei verschiedene Zustände der Pelopsäure: den amorphen, wenn frisch bereitetes Pelopchlorid mit Wasser behandelt wird, mit dem höchsten spec. Gewicht; einen krystallinischen Zustand bei der Säure, die bei langsamer Zersetzung des Chlorids an der Luft sich bildet, mit geringerem spec. Gewicht; einen zweiten krystallinischen Zustand bei der Säure, welche der Hitze des Porcellanofens ausgesetzt gewesen war, mit einem constanten spec. Gewicht.

Wolfram. Percy (1) hat sich vergeblich bemüht, mit Wolfram eine in technischer Beziehung brauchbare Legirung irgend eines Metalls darzustellen.

Wolframsäure Salze. Aus seinen Untersuchungen der wolframs. Salze schließt Laurent (2), daß es wenigstens 5 oder 6 verschiedene Wolframsäuren gebe. Es bilden diese mit Ammoniak verschiedene Salze; durch Erhitzen dieser Salze erhalte man Wolframsäure, welche aber verschiedene Eigenschaften besitze, je nach dem Ammoniaksalz aus welchem sie dargestellt wurde. Folgende Arten von Salzen (die Formeln sind in die gewöhnlichere Ausdrucksweise übertragen) unterscheidet Laurent:

1) *Wolframs. Salze*: WO_3 , RO mit oder ohne Wasser (R bedeutet Metall oder Wasserstoff). Dahin gehören das

(1) Chem. Gaz. 1848, 349; Pharm. Centr. 1848, 782. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXI, 54; J. pr. Chem. XLII, 116; im Ausz. Compt. rend. XXV, 538 (als ein sechster Typus von Salzen werden hier auch noch die homowolframsäuren, W_2O_{11} , RO, genannt); J. pharm. [8] XIII, 58; Pharm. Centr. 1847, 742.

Kali-, Natron- und Barytsalz, und die Mehrzahl der unlöslichen wolframs. Salze. Saure Salze dieser Art sind nicht bekannt. Die Lösung eines wolframs. Salzes in überschüssige verdünnte Salpetersäure getropft bringt einen gelatinösen Niederschlag hervor. Das hierher gehörige Wolframsäurehydrat bildet sich bei dem Einwirken von Königswasser auf Wolfram.

Wolframsäure
Salze.

2) *Parawolframs. Salze* : W_4O_{12} , 2 RO mit oder ohne Wasser. Dahin gehören die Salze, welche man bisher als zweifach-wolframs. Kali, Natron, Ammoniak, Baryt oder Strontian bezeichnete. Mit Ausnahme des Natronsalzes sind sie wenig löslich in Wasser; mit etwas warmem Wasser in Berührung löst sie der Zusatz von sehr wenig verdünnter Salpetersäure sogleich auf, und fällt etwas später einen Theil der Säure.

3) *Metawolframs. Salze* : W_3O_8 , RO mit oder ohne Wasser. Das Ammoniaksalz dieser Art bildet sich, wenn man die Lösung von parawolframs. Ammoniak mehrere Stunden lang kochen läßt; die Auflösung nach dem Erkalten filtrirt und zur Syrupdicke abgedampft giebt sehr lösliche Octaëder. Die Lösung wird durch concentrirte Salzsäure nicht gefällt.

4) *Isowolframs. Salze* : W_2O_6 , RO mit oder ohne Wasser. Das Ammoniaksalz bildet sich bei dem Sieden des metawolframs. Ammoniaks mit einem Ueberschuß an Ammoniak; es ist wenig löslich in Wasser. Die Säure, welche aus ihm durch eine andere Säure ausgeschieden werden kann, ist hauptsächlich dadurch charakterisirt, daß sie mit Ammoniak wieder das isowolframs. Salz hervorbringt.

5) *Polynwolframs. Salze* : vielleicht W_6O_{18} , 3 RO. Wird die gelbe Säure, welche aus dem Wolfram der Mineralogen dargestellt ist, mit Ammoniak behandelt und die Lösung langsam verdampft, so setzt sich zuerst para-, dann isowolframs. Ammoniak ab; die Mutterlauge theilt sich in zwei Schichten, deren eine braun und syrupartig ist, und bei dem Trocknen sich in eine leichtlösliche Krystallmasse

Wolframsäure Salze. verwandelt, welche wahrscheinlich ein Doppelsalz von Ammoniak und Eisen ist. Mit kochender concentrirter Salzsäure giebt sie einen weissen Niederschlag von Polywolframsäure, welcher nicht gelatinös ist und bei dem Kochen nicht gelb wird; die Polywolframsäure ist dadurch charakterisirt, dafs sie mit Ammoniak ein sehr lösliches, beim Abdampfen gummiartig werdendes, Salz giebt.

Laurent hat für eine grofse Menge einzelner Salze aus diesen verschiedenen Kategorien Formeln mitgetheilt, ohne die näheren Data, welche über die Zulässigkeit derselben entscheiden lassen könnten. Viele von diesen Formeln stehen in Beziehung zu seiner und Gerhardt's Ansicht, dafs Bruchtheile von Atomen in eine Verbindung eingehen können, d. h., dafs 1 Atom eines näheren Bestandtheils R dargestellt sein könne durch wechselnde Mengen von verschiedenen Metallen (auch nicht isomorphen) und Wasserstoff, z. B. durch $\frac{3}{2}K$, $\frac{3}{2}Na$, $\frac{1}{2}NH_4$, $\frac{1}{2}H$; welche Ansicht uns nicht gerechtfertigt erscheint. Was die Mittheilung der Formeln für die einzelnen Salze betrifft, mögen somit die specielleren analytischen Belege abgewartet werden.

Wolframs. Ammoniak.

Die Krystallform des wolframs. Ammoniaks, NH_4O , $2WO_3 + HO$, hat Kerndt (1) untersucht. — In einer Arbeit über die Krystallform und die Zusammensetzung der Wolframverbindungen, von welcher indefs bis jetzt nur Untersuchungen des Wolfram-Minerals erschienen sind, spricht derselbe (2) die Ansicht aus, die Wolframsäure enthalte 2 Atome Sauerstoff auf 1 Atom Metall, ohne indefs Gründe dafür beizubringen.

Molybdän.

Svanberg und Struve (3) haben umfassende Untersuchungen über das Atomgewicht und die Verbindungen des Molybdäns ausgeführt. Ersteres fanden sie = 45,96

(1) J. pr. Chem. XLI, 190. — (2) J. pr. Chem. XLII, 81. —

(3) Aus den Abhandl. der Stockholmer Acad. für 1848 im J. pr. Chem. XLIV, 257; Phil. Mag. [3] XXXIII, 409. 524; Pharm. Centr. 1848, 705. 721; theilweise Instit. 1849, 21; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 209. 293.

durch Bestimmung, wieviel Kohlensäure bei dem Zusammenschmelzen einer gewogenen Quantität Molybdänsäure mit überschüssigem kohlen. Alkali ausgetrieben wird, und = 46,06 durch Bestimmung, wieviel Molybdänsäure bei Röstung eines bestimmten Gewichts Schwefelmolybdän sich bildet.

Nach der Angabe, wie sich die Verfasser reine Molybdänsäure darstellten, beschreiben sie eine Anzahl Salze derselben. *Einfach-molybdäns. Kali*, über Schwefelsäure getrocknet $2(\text{KO}, \text{MoO}_3) + \text{HO}$, scheidet sich in der Kälte aus, wenn ein Ammoniaksalz mit überschüssigem kohlen. Kali behandelt und in der Wärme zur Syrupconsistenz abgedampft wird, oder als ölige Masse bei dem Schütteln von alkoholischer Aetzkalilösung mit dreifach-molybdäns. Kali. Es krystallisirt in vierseitigen Säulen, ist leicht löslich in Wasser, zerfließt langsam an der Luft und zieht Kohlensäure an; es zerfällt bei dem Erhitzen unter Wasserverlust, schmilzt bei der stärksten Hitze einer Spirituslampe, erstarrt bei dem Abkühlen krystallinisch und zerfällt nach dem Erkalten zu einem weißen Pulver. — *Zweifach-molybdäns. Kali* konnte nicht erhalten werden. Ein Doppelsalz mit dreifach-molybdäns. Kali, $3(\text{KO}, 2\text{MoO}_3) + (\text{KO}, 3\text{MoO}_3) + 6\text{HO}$ oder $3(\text{KO}, \text{MoO}_3) + 5(\text{KO}, 3\text{MoO}_3) + 12\text{HO}$, krystallisirt aus der Lösung von Molybdänsäure in kohlen. Kali, wenn concentrirte Salpeter- oder Salzsäure vorsichtig so lange zugesetzt worden war, bis der entstehende Niederschlag sich nicht mehr klar auflöste; es zersetzt sich mit Wasser in schwerlösliches dreifach- und in einfach-molybdäns. Kali. — *Dreifach-molybdäns. Kali*, lufttrocken $\text{KO}, 3\text{MoO}_3 + 3\text{HO}$, wird am leichtesten auf diese Art dargestellt; es erscheint bei langsamer Absonderung nadelförmig mit schönem Seidenglanz, bei schneller als ein voluminöser weißer Niederschlag; es ist fast unlöslich in kaltem, leicht löslich in kochendem Wasser, aus welchem es sich nach dem Erkalten nur sehr langsam ausscheidet. Es verliert bei dem Glühen das Krystallwasser, und ist

Molybdän-
saure Salze.

Molybdän-
saure Salze.

dann selbst in kochendem Wasser sehr schwer löslich; es wird durch Wasserstoff in der Hitze zu einfach-saurem Salz, unter Bildung von 2 MoO_3 oder MoO , MoO_3 . — Bei dem Zusatz von Salpetersäure im Ueberschuß zu der Lösung von Molybdänsäure in kohlens. Kali wird bald *vierfach-*bald *fünfach-molybdäns. Kali*, als weißes Pulver gefällt; beide sind wasserfrei, in Wasser unlöslich, leicht schmelzbar und bei dem Erkalten krystallinisch erstarrend. Die Existenz noch mehrerer anderer Kalisalze wurde erkannt, dieselben aber nicht specieller untersucht.

Einfach-molybdäns. Natron, dargestellt durch Zusammenschmelzen von MoO_3 und NaO , CO_2 im richtigen Verhältniß, zeigt sich als eine weiße krystallinische Masse, löst sich leicht und vollständig im Wasser, krystallisirt daraus als NaO , $\text{MoO}_3 + 2 \text{ HO}$ in kleinen Rhomboëdern, welche leicht schmelzen unter Verlust des Wassers. — *Zweifach-molybdäns. Natron*, ebenso dargestellt, bildete eine weiße krystallinische Masse, welche bei dem Zerrühren unter Wasser in nadelförmige Krystalle zerfiel; es löst sich schwer in kaltem, langsam in heißem Wasser; aus der Lösung krystallisirt schwierig NaO , $2 \text{ MoO}_3 + \text{HO}$. — *Dreifach-molybdäns. Natron* scheidet sich nach einiger Zeit auf vorsichtigen Zusatz von concentrirter Salpetersäure zu concentrirter Lösung von Molybdänsäure in kohlens. Natron als voluminöser Niederschlag aus, ist löslicher als das entsprechende Kalisalz, krystallisirt als NaO , $3 \text{ MoO}_3 + 7 \text{ HO}$. Beim Erhitzen in Wasserstoff verhält es sich wie das entsprechende Kalisalz. — Salpetersäure im Ueberschuß zu einer molybdäns. Natronlösung gesetzt scheidet in der Kälte Nichts, in der Wärme sogleich Molybdänsäure aus.

Einfach-molybdäns. Ammoniak, wurde erhalten durch Behandlung von überschüssiger Molybdänsäure mit concentrirter Ammoniaklösung in verschlossenem Glase, Füllen mit Alkohol, Trocknen über Aetzkalk; es bildet mikroskopische vierseitige Prismen und ist NH_4O , MoO_3 ; es wird durch Wasser zu einem sauren Salz. — *Zweifach-molybdäns.*

Ammoniak fällt als weißes krystallinisches Pulver, NH_4O , <sup>Molybd in-
saure Salze.</sup> 2MoO_3 , nieder, wenn eine Lösung von Molybdänsäure in Ammoniak, nach welchem sie immer riechen muß, stark abgedampft wird. — Aus einer Lösung von Molybdänsäure in Ammoniak krystallisirt eine Verbindung von zweifach- und dreifach-saurem Salz, NH_4O , 2MoO_3 , $+\text{NH}_4\text{O}$, 3MoO_3 , $+3\text{HO}$ in wasserhellen sechsseitigen Säulen. Noch andere Salze bilden sich durch Einwirkung von Salpetersäure auf Lösungen von Molybdänsäure in Ammoniak, wurden aber nicht weiter untersucht.

Die *Barytsalze* erhält man durch Zersetzung von Kali- oder Natronsalz mit Chlorbaryum, doch sind sie nur schwierig von einer Beimischung ersterer Salze zu befreien. Einfach-molybdäns. Baryt, BaO , MoO_3 , fällt nieder bei Zusatz von Chlorbaryumlösung zu einer Lösung von Molybdänsäure in überschüssigem Ammoniak, als fein krystallinisches, schwer in Wasser lösliches, unschmelzbares Pulver. — Svanberg und Struve zweifeln an der Existenz des von Heine (1) beschriebenen basischen Barytsalzes. — BaO , 3MoO_3 , $+3\text{HO}$ wurde durch Zersetzung des entsprechenden Kalisalzes erhalten, als weißer flockiger Niederschlag, in Wasser etwas löslich, nach dem Trocknen hornartig werdend, schmelzbar und krystallinisch erstarrend; BaO , 2MoO_3 , $+\text{BaO}$, 3MoO_3 , $+6\text{HO}$ durch Zersetzung des entsprechenden Ammoniaksalzes als flockiger, unkrySTALLINISCHER, in Wasser ziemlich leicht löslicher, schmelzbarer Niederschlag. Aus einfach-molybdäns. Baryt wurde durch Behandlung mit verdünnter Salpetersäure neunfach-saurer, BaO , 9MoO_3 , $+4\text{HO}$, erhalten; er krystallisirt in kleinen sechsseitigen Prismen, ist in Wasser unlöslich, schmelzbar.

Eine Lösung von dreifach-molybdäns. Kali gab mit salpeters. Bleioxyd *molybdäns. Bleioxyd*, PbO , MoO_3 , als weißes, erst bei hoher Temperatur schmelzbares Pulver. Es scheint nur in diesem Einen Verhältniß Verbindung statt zu haben.

(1) J. pr. Chem. IX, 204.

Molybdäns. Silberoxyd, AgO , MoO_3 , wird aus der Lösung von einfach-molybdäns. Kali durch salpeters. Silberoxyd gefällt, als flockiger gelblicher Niederschlag, am Licht dunkler werdend, wenig in reinem, leicht in salpetersäurehaltigem Wasser löslich. Dreifach-molybdäns. Kali giebt mit salpeters. Silberoxyd einen flockigen, gelblichweißen Niederschlag, vielleicht AgO , 3MoO_3 , $+\text{AgO}$, 2MoO_3 .

Verhalten der
Molybdän-
säure
zu Phosphor-
säure.

Ueber die Erscheinungen, welche die Molybdänsäure unter Einwirkung von Phosphorsäure zeigt, haben Svanberg und Struve vieles mitgetheilt, ohne indess diesen Gegenstand so weit zum Abschlufs zu bringen, dafs ein kurzer und doch vollständiger Auszug sich geben liefse. Die durch Einwirkung von Phosphorsäure gelb gefärbte Molybdänsäure löst sich leicht in Ammoniak, und Säuren fallen aus dieser Lösung einen unkrystallinischen, in Wasser und Säuren unlöslichen, citrongelben Niederschlag, welcher auch erhalten wird durch Lösung von Molybdänsäure in überschüssigem Ammoniak, Zusatz von etwas phosphors. Natron, Erwärmen und Zusatz von Schwefel- Salz- oder Salpetersäure. Der gelbe Niederschlag ist nach Svanberg und Struve fünffach-molybdäns. Ammoniak, NH_4O , 5MoO_3 , $+\text{HO}$, enthält aber auch etwas Phosphorsäure. Treibt man durch Kali in der Wärme das Ammoniak aus, so entsteht eine farblose Lösung, in welcher Säuren einen krystallinischen gelben Niederschlag von fünffach-molybdäns. Kali, KO , 5MoO_3 , $+2\text{HO}$, hervorbringen. Die Lösung des gelben Ammoniaksalzes in Ammoniakflüssigkeit giebt mit Chlorbaryum weissen molybdäns. Baryt, der aber auf Zusatz einer Säure gelb wird. Auf was die abweichenden Reactionen der Molybdänsäure, wenn Phosphorsäure zugegen ist, beruhen, ist nicht mit Bestimmtheit ermittelt.

Molybdän-
sesquioxyd.

Nach Kobell (1) entzieht Kupfer der in überschüssiger Säure aufgelösten Molybdänsäure bei dem Kochen die Hälfte ihres Sauerstoffs, und bleibt also dann Molybdänsesquioxyd, Mo_2O_3 , gelöst, und nicht, wie man bisher annahm, Mo .

(1) J. pr. Chem. XLI, 158; Pharm. Centr. 1847, 678.

lybdänoxyd MoO_3 , dessen Existenz Kobell überhaupt bezweifelt.

Vanad ist durch Deck (1) in Eisenschlacke von Staf- Vanadium.
fordshire aufgefunden worden.

Hinsichtlich der Uebervanadsäure vergl. bei Ueberchromsäure.

Ueber das Atomgewicht des Chroms, welches Ber- Chrom.
zelius zu 28,1, Péligot zu 26,0 bis 26,4, Berlin zu 26,3 bestimmt hatte, sind von Moberg (2) neuere Versuche angestellt worden. Durch Bestimmung, wieviel Chromoxyd bei dem Glühen von schwefels. Chromoxyd zurückbleibt, fand er es 26,5 bis 26,8, je nachdem Salz angewendet worden war, welches bis zu 330° oder bis zu schwacher Rothglühhitze erhitzt worden war. Durch Versuche mit schwefels. Chromoxyd-Ammoniak, in derselben Art angestellt, fand er es zu 26,7 bis 26,9. — Nach Jacquelin's Angabe (3) wäre es nur 25.

Nach Moberg (4) giebt das Chromchlorür, wenn es Chromoxydul
und
Chromchlorür.
in Wasser gelöst, mit Kali zersetzt, und der Niederschlag ausgewaschen und getrocknet wird (alles bei vollkommenem Abschlufs von Sauerstoff), dunkelbraunes Chromoxydulhydrat, $\text{CrO} + \text{HO}$, welches bei dem Glühen in Wasserstoff durch den Sauerstoff des Hydratwassers zu Chromoxyd wird. — Für das Chromchlorür hat er durch neue Analysen die Zusammensetzung Cr Cl bestätigt (5). Er hat (6) die Einwirkung verschiedener Salze auf die Lösung von Chromchlorür untersucht; wir heben hier nur hervor, dafs mit essigs. Natron eine rothe Flüssigkeit und aus dieser essigs. Chromoxydul, CrO , $\text{C}_4\text{H}_3\text{O}_3 + \text{HO}'$ (wie schon Péligot fand), in schiefen

(1) Chem. Gaz. 1848, 298; Pharm. Centr. 1848, 782. — (2) J. pr. Chem. XLIII, 114; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 300; J. pharm. [8] XIV, 76. — (3) Compt. rend. XXIV, 679; J. pr. Chem. XLI, 848. — (4) J. pr. Chem. XLIII, 125; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 301; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 303. — (5) J. pr. Chem. XLIV, 322; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 785; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 304. — (6) J. pr. Chem. XLIV, 327; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 787; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 305.

rhombischen Säulen krystallisirt erhalten wurde; mit bernsteins. Natron ein Niederschlag, welcher feucht scharlachroth, im Vacuum getrocknet heller und theilweise blaugrau (CrO , $\text{C}_4\text{H}_2\text{O}_3 + \text{HO}$) ist; mit benzoës. Kali ein heller graurother, sich an der Luft ebenso verändernder, Niederschlag, welcher getrocknet CrO , $\text{C}_{14}\text{H}_5\text{O}_3$ ist. Weiter hat Moberg (1) seine Ansichten über das mögliche Vorkommen des Chromoxyduls in der Natur, namentlich dem Chromeisenstein und dem Pyrop, dargelegt.

Chromoxyd. Nach Fremy (2) ist die Formel des Chromoxydhydrats, welches aus einem Chromoxydsalz in der Kälte gefällt und in einem Luftstrom von gewöhnlicher Temperatur getrocknet wurde, $\text{Cr}_2\text{O}_3 + 9 \text{HO}$ (der Versuch gab 51,6, die Theorie verlangt 51,4 pC. Wasser). Aus der grünen alkalischen Lösung desselben wird durch Kochen ein in Alkali unlösliches Chromoxydhydrat $\text{Cr}_2\text{O}_3 + 8 \text{HO}$ gefällt (gefunden 49,3, berechnet 48,4 pC. Wasser).

Nach Lefort (3) geben die Chromoxydsalze mit einfach- oder zweifach-kohlens. Alkalien bald ein Hydrat von besonderer Zusammensetzung, bald eine Verbindung Cr_2O_3 , $\text{CO}_2 + 4 \text{HO}$; ersteres entstehe bei Anwendung der grünen Modification des schwefels. Chromoxyds, letztere bei Anwendung der blauen. Die kohlens. Verbindung verliere 3 HO zwischen 75° und 150° , das letzte Atom HO und GO_2 erst über 300° .

Traube (4) bestreitet, dafs geglühtes Chromoxyd sich in heifser concentrirter Schwefelsäure wirklich löse. Nach ihm besteht das unlösliche rothe schwefels. Chromoxyd, welches aus einer Lösung von Chromoxydhydrat in verdünnter Schwefelsäure durch concentrirte Schwefelsäure und Erhitzen ausgeschieden wird, aus $2(\text{Cr}_2\text{O}_3, 3 \text{SO}_3) + \text{HO}$, SO_3 (Schrötter hatte die Formel $\text{Cr}_2\text{O}_3, 3 \text{SO}_3$ gegeben).

(1) J. pr. Chem. XLIII, 119. — (2) Ann. ch. phys. [8] XXIII, 388; J. pr. Chem. XLV, 196. — (3) Compt. rend. XXVII, 269; ausführlicher J. pharm. [8] XV, 24. — (4) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 87; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 936.

Dasselbe Salz bildet sich als Endproduct der Einwirkung von concentrirter Schwefelsäure auf zweifach-chroms. Kali und Chromalaun in der Hitze; doch bilden sich hier zuerst Körper, welche auch schwefels. Kali enthalten. Jenes Salz in Schwefelwasserstoffgas geglüht, wird zu Cr_2S_3 ; in Wasserstoff geglüht, zu einem Gemenge von Cr_2O_3 und CrS in veränderlichen Verhältnissen. Versuche, eine jenem Salz entsprechende Eisenoxyd- oder Thonerdeverbindung darzustellen, blieben ohne Erfolg.

Zur Darstellung der blauen, krystallisirbaren, Modification des schwefels. Chromoxyds empfiehlt Traube (1), zu einer Lösung von Chromsäure in verdünnter Schwefelsäure allmählig Weingeist zu tröpfeln oder Aetherdämpfe zutreten zu lassen.

Von einer Untersuchung Jacquelain's (2) über den Chromalaun sind nur die Folgerungen desselben bekannt geworden; wir begnügen uns mit der Angabe, dafs nach ihm der Chromalaun nur 22 Atome Wasser enthält.

Nach Traube (3) wird trockene Chromsäure durch schweflige Säure noch bei 100° nicht verändert, bei 180° aber zu chroms. Chromoxyd. — Cr_2O_3 , 3 CrO_3 wird durch Erhitzung der Chromsäure als schwarze Masse erhalten; es wird durch Wasser hinsichtlich der Zusammensetzung nicht verändert, aber durch Kochen damit aus der unlöslichen in die lösliche Modification übergeführt. Wässrige Chromsäure wird durch Alkohol zu gewässertem chroms. Chromoxyd 3 Cr_2O_3 , 2 CrO_3 .

Nach Jacquelain's Angaben (4) wäre ungewaschenes violetttes Chromchlorid eine Verbindung von Cr_2Cl_3 und CrCl_3 ; auch theilt derselbe einige Angaben über Löslichkeit des Chromchlorids bei verschiedenen Temperaturen, und ob in offenen oder verschlossenen Gefäfsen, mit. — Mo-

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 168; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 873. — (2) Compt. rend. XXIV, 439. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 103. 106. 108. — (4) Compt. rend. XXIV, 679; J. pr. Chem. XLI, 348; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 275.

berg (1) erhielt aus wässeriger Lösung des Chromchlorids die schon von Pélégot untersuchte Verbindung $\text{Cr}_2\text{Cl}_3 + 12\text{HO}$, aber nicht körnig, sondern in nadelförmigen Krystallen.

Chromsäure.

Traube (2) empfiehlt zur Darstellung der Chromsäure, 1 Theil zweifach-chroms. Kali mit $3\frac{1}{4}$ Schwefelsäure und $2\frac{1}{4}$ Wasser zu erwärmen, nach dem Erkalten von dem herauskrystallisirten zweifach-schwefels. Kali abzugießen, und noch 4 Schwefelsäure zuzusetzen, wo Chromsäure sich ausscheidet; zu erwärmen, Wasser allmählig bis zur Auflösung zuzusetzen, bis zur Bildung einer Krystallhaut abzudampfen, krystallisiren zu lassen. Die auf einem Ziegelstein getrocknete Säure kann gereinigt werden durch vorsichtiges Schmelzen im Luftbade, wobei chroms. Kali und Schwefelsäure unlösliche Chromoxydverbindungen bilden; oder durch Lösen in Wasser, Zusatz von Schwefelsäure bis zu anfangender Fällung, Abdampfen bis zur Krystallhautbildung, ruhig Krystallisirenlassen.

Chromsaure
Salze.

Jacquelain (3) empfiehlt zur Darstellung chroms. Salze von dem Kalksalz auszugehen: Chromeisenstein mit Kreide unter öfterer Erneuerung der Oberfläche zu glühen, die Masse fein gemahlen in heißem Wasser zu vertheilen und Schwefelsäure bis zu saurer Reaction zuzusetzen, mit etwas Kreide das verunreinigende Eisenoxyd auszufällen, wo eine Lösung von zweifach-chroms. Kalk und nur wenig schwefels. Kalk erhalten wird.

Darby (4) hat gefunden, daß das zweifach-chroms. Ammoniak nicht als eine Ammoniumoxydverbindung betrachtet werden kann; die Zusammensetzung desselben ist $\text{NH}_3, 2\text{CrO}_3$. Für das einfach-saure Salz fand er die schon früher

(1) J. pr. Chem. XLIV, 325. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 165; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 872. — (3) Compt. rend. XXV, 504; vollständiger Ann. ch. phys. [3] XXI, 478; J. pr. Chem. XLIII, 202; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 846. — (4) Ann. Ch. Pharm. LXV, 204; Chem. Soc. Qu. J. I, 20; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 664; J. pharm. [3] XIII, 369.

aufgestellte Formel NH_4O , CrO_3 bestätigt. Die Mischung Chromsaure
Salze. der Lösung gleicher Aequivalente von zweifach-chroms. Ammoniak und Quecksilberchlorid gab grofse, tief rothe, leicht lösliche Krystalle, NH_3 , $2\text{CrO}_3 + \text{HgCl}$. In gleicher Weise wurde das schon von Millon analysirte Doppelsalz KO , $2\text{CrO}_3 + \text{HgCl}$ in prächtig rothen spiefsigen Krystallen erhalten. Wie dieser, fand auch Darby den ziegelrothen Niederschlag, welchen einfach-chroms. Kali in Quecksilberchlorid hervorbringt, 3HgO , CrO_3 zusammengesetzt; bei dem Verdampfen der von diesem Niederschlag abfiltrirten Flüssigkeit bildeten sich kleine, schwach roth gefärbte, in Wasser zu gelber Flüssigkeit lösliche Krystalle, KO , $\text{CrO}_3 + 2\text{HgCl}$, welche Verbindung auch erhalten wird, wenn beide Bestandtheile im richtigen Verhältnifs gemischt werden unter Zusatz von so viel Salzsäure, dafs der entstehende Niederschlag sich wieder löst. Für das Doppelsalz von einfach-chroms. Kali und Cyanquecksilber (erhalten aus einer Lösung gleicher Aequivalente beider Körper als hellgelbe, grofse blätterige Krystalle) fand Darby die von Rammelsberg angegebene Formel $2(\text{KO}, \text{CrO}_3) + 3\text{HgCy}$ bestätigt. Versetzt man eine Auflösung dieses Salzes mit salpeters. Silberoxyd, so lange noch eine Fällung entsteht, und dann unter Erhitzung bis nahe zum Siedepunkt mit soviel Salpetersäure, bis Alles wieder gelöst ist, so scheidet sich beim Erkalten ein prächtig rothes nadelförmiges Doppelsalz aus, AgO , $2\text{CrO}_3 + \text{HgCy}$. — Einfach-chroms. Quecksilberoxydul, Hg_2O , CrO_3 , wird erhalten als krystallinisches, lebhaft ziegelrothes Pulver durch Kochen des aus einfach-chroms. Kali mit salpeters. Quecksilberoxydul entstehenden Niederschlags $4\text{Hg}_2\text{O}$, 3CrO_3 ; oder wenn man $2(\text{KO}, \text{CrO}_3) + 3\text{HgCy}$ mit salpeters. Quecksilberoxyd versetzt und den entstehenden Niederschlag mit etwas Salpetersäure bis zur Auflösung kocht, wo Hg_2O , CrO_3 beim Erkalten als prachtvoll rothglänzendes Krystallpulver niederfällt.

Ueberchrom-
säure.

Barreswil (1) hat seine schon früher (2) bekannt gewordenen Versuche über die Existenz einer Ueberchromsäure genauer beschrieben, welche sich durch Mischen von Chromsäure mit verdünntem Wasserstoffhyperoxyd (oder durch Mischung von zweifach-chroms. Kali mit einer verdünnten aber sehr sauren Auflösung von Baryumhyperoxyd in Salzsäure) unter blauer Färbung bildet, und sich sowohl in der wässrigen als in der ätherischen Lösung (Aether entzieht dem Wasser die blaue Farbe) unter Sauerstoffentwicklung rasch (und zwar nicht zu Chromsäure, sondern zu grünem Oxyd) zersetzt. Nur mit Chinin und Strychnin erhielt er sie verbunden, aber auch diese, schmutzig violetten, Verbindungen zersetzen sich rasch. Nach der Menge Sauerstoff, welche eine gewogene Quantität zweifach-chroms. Kalis nach Bildung der blauen Verbindung in salzsäurehaltiger Flüssigkeit bei der Zersetzung ausscheidet (wo Chromchlorid zurück bleibt), giebt er der hier auftretenden Oxydationsstufe des Chroms die Formel Mn_2O_7 .

Vanads. Ammoniak gab auf dieselbe Art eine blutrothe Färbung, welche etwas beständiger war.

Uran.

Péligot (3) hat die genauere Angabe seiner (schon 1846 (4) bekannt gewordenen) neueren Versuche über das Atomgewicht des Urans publicirt, bei welchen er durch Verbrennung des oxals. Uranoxyds (durch Vergleichung der dabei gebildeten Kohlensäure und des rückständig bleibenden grünen Uranoxydoxyduls) das Atomgewicht um so genauer = 60 fand, je reiner oder je öfter umkrystallisirt das angewandte Salz war, welche Zahl er auch durch neue Analysen des essigs. Uranoxyds bestätigt zu finden glaubt. Berzelius (5) hat Einzelheiten aus Péligot's Angaben hervorgehoben, welche Resultate ergeben, die mit der An-

(1) Ann. ch. phys. [3] XX, 364; J. pr. Chem. XLI, 393; im Auss. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 275; Pharm. Centr. 1847, 617. — (2) Instit. 1846, 320. — (3) Ann. ch. phys. [3] XX, 329; J. pr. Chem. XLI, 398. — (4) Compt. rend. XXII, 487; J. pr. Chem. XXXVIII, 152. — (5) Jahresbericht XXVII, 89.

sicht des letztern über das wahre Atomgewicht des Urans nicht übereinstimmen.

Werther (1) hat die Verbindungen des Uranoxyds ^{Phosphors. u. arsens. Uranoxyd.} mit Phosphorsäure und Arsensäure untersucht; beide Säuren können sich mit 1 und mit 2, vielleicht auch mit 3, Atomen des ersteren verbinden. — Uranoxyd mit Phosphorsäure übergossen, bildet eine hellgelbe Salzmasse, welche sich bei dem Kochen theilweise löst; aus der gelben Lösung setzen sich bei dem Verdunsten über Schwefelsäure citrongelbe Krystalle $U_2O_3, PO_5 + 5 HO$ ab, welche bei gelinder Wärme einen Theil des Wassers verlieren und matt und hellgelb werden; das letzte Atom Wasser entweicht erst bei der Rothglühhitze. Wasser zersetzt das krystallisirte Salz, entzieht Phosphorsäure und wenig Uranoxyd, und läßt ein mehrbasisches Salz zurück. — Uranoxyd mit verdünnter Phosphorsäure behandelt und ausgewaschen, bildet ein in Wasser und Essigsäure unlösliches, in Mineralsäuren und überschüssigem kohlenst. Ammoniak lösliches, unkrystallinisches, hellgelbes Pulver, $2 U_2O_3, PO_5 + 4 HO$, welches 3 At. Wasser zwischen 120 und 170° verliert, das vierte erst bei stärkerer Hitze, beim Glühen dunkelgelb, beim Erkalten wieder hellgelb wird. Phosphorsäure zu essigs. Uranoxyd gesetzt, giebt einen Niederschlag, welcher dunkler ist als der vorhergehende, sich bei dem Glühen ebenso verhält, und lufttrocken $2 U_2O_3, PO_5 + 9 HO$, bei 60° getrocknet $2 U_2O_3, PO_5 + 7 HO$ ist; letztere Zusammensetzung hat auch der Niederschlag, welchen salpeters. Uranoxyd mit NaO, 2 HO, PO₅ giebt, oder mit der Flüssigkeit, welche übrig bleibt bei unvollständiger Zersetzung von 3 NaO, PO₅ durch salpeters. Uranoxyd. — Salpeters. Uranoxyd giebt mit einem Ueberschuß von 3 NaO, PO₅ (ein zu großer Ueberschuß würde fast Alles wieder lösen) einen dunkelgelben, in Wasser unlöslichen,

(1) J. pr. Chem. XLIII, 321; im Ausz. Berl. Acad. Ber., Mai 1848; Pharm. Centr. 1848, 433; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 812; Instit. 1848, 393; J. pharm. [3] XIV, 57; Phil. Mag. [3] XXXIII, 244. 246.

Phosphors. u.
arsens. Uran-
oxyd.

Niederschlag, welcher $5 \text{ U}_2\text{O}_3$ und 1 NaO auf 2 PO_5 enthält, und vielleicht ein Gemenge ist; bestimmt glaubt dies Werther von dem, was zurückbleibt, wenn der eben besprochene Niederschlag durch zuviel 3 NaO , PO_5 wieder theilweise gelöst wird.

U_2O_3 , $\text{AsO}_5 + 5 \text{ HO}$ krystallisirt in kleinen gelben Krystallen, wenn reines, salpeters. oder essigs. Uranoxyd mit überschüssiger Arsensäure eingedampft wird, und die Flüssigkeit dann über Schwefelsäure verdunstet; es wird durch Wasser wie das entsprechende phosphors. Salz zersetzt, löst sich (wie auch die folgenden Verbindungen) in Mineralsäuren und kohlen. Ammoniak, nicht in Essigsäure; es verliert bei 150° 3 HO , und zerfällt bei starkem Glühen in arsenige Säure, Sauerstoff und ein mehrbasisches Salz. — Der gelbe Niederschlag durch Arsensäure in essigs. Uranoxyd, oder durch Wasser in einer Mischung von Arsensäure und salpeters. Uranoxyd, welche bis zum Verschwinden eines grossen Theils der Salpetersäure gekocht war, ist, über Schwefelsäure getrocknet, $2 \text{ U}_2\text{O}_3$, $\text{AsO}_5 + 9 \text{ HO}$; er verliert bei 120° 8 HO . Der Niederschlag von saurem arsens. Kali in salpeters. Uranoxyd enthält wahrscheinlich auch $2 \text{ U}_2\text{O}_3$ auf AsO_5 , aber einen andern Wassergehalt und wechselnde Mengen Kali. In dem blafsgelben Niederschlag von salpeters. Uranoxyd mit überschüssigem 3 NaO , AsO_5 wurden gefunden NaO , $2 \text{ U}_2\text{O}_3$, AsO_5 , 5 HO . — Nach einer späteren Mittheilung von Werther (1) giebt $2 \text{ U}_2\text{O}_3$, $\text{AsO}_5 + 9 \text{ HO} = 2 \text{ U}_2\text{O}_3$, HO , $\text{AsO}_5 + 8 \text{ HO}$ durch Kochen mit basisch essigs. Kupferoxyd ein grünliches Salz $2 \text{ U}_2\text{O}_3$, CuO , $\text{AsO}_5 + 8 \text{ HO}$, die dem Chalkolith entsprechende arsens. Verbindung.

Mangan.
Kohlens. Mangan-
oxyd.

Nach Lefort (2) ist der aus Manganoxydullösung durch einfach- oder zweifach-kohlen. Alkalien kalt oder warm gefällte Niederschlag MnO , $\text{CO}_2 + \text{HO}$. Gegen 90°

(1) J. pr. Chem. XLIV, 127. — (2) Compt. rend. XXVII, 268; ausführlicher J. pharm. [8] XV, 18.

fängt er an Wasser zu verlieren; es kann dieses ganz weggehen, ohne daß sich die weiße Farbe ändert.

Außer dem phosphors. Manganoxyd (vergl. S. 343) ^{Manganoxyd-salze.} hat Herrmann (1) noch andere Oxydsalze darzustellen versucht, aber ohne Erfolg. Weinsteinsäure, Oxalsäure, Aepfelsäure bilden bei der Einwirkung auf Manganoxydhydrat Kohlensäure und Oxydulsalz.

Schönbein (2) hat einige Reactionen der Uebermangansäure ^{Uebermangansäure.} beschrieben, in der Absicht, die Analogie zwischen diesem Körper, dem Wasserstoffhyperoxyd und dem Ozon deutlicher zu machen; hinsichtlich seiner Versuche über die Bildung jener Säure vergl. S. 330.

Hinsichtlich der Untersuchungen, welche eine große ^{Arsen.} Verbreitung des Arsens auf der Erdoberfläche nachgewiesen haben, vergl. bei dem Bericht über Mineralwasseranalysen.

Schönbein (3) hält die Vermuthung für beachtenswerth, der mit Arsen hervorzubringende Knoblauchgeruch entstehe nicht durch Bildung eines Suboxyds, sondern einer eigenthümlichen Modification der arsenigen Säure, As_2O_3 , welche sich später in gewöhnliche arsenige Säure, 2AsO_3 , umsetze.

H. Becker (4) hat Versuche angestellt über die Fällbarkeit des Arsens durch Schwefelwasserstoff. Nach ihm läßt sich das Arsen aus seinen Lösungen, mögen diese arsenige oder Arsensäure enthalten, weder durch Schwefelwasserstoff noch durch Schwefelalkalien absolut abscheiden; der Rückhalt an Arsen sei aber für die meisten Fälle (außer für gerichtliche Untersuchungen) unerheblich, wenn man die mit Schwefelwasserstoff gesättigte Flüssigkeit lange (6–8 Tage) in fest verschlossenen Gefäßen und in gelinder Wärme stehen lasse, und von Zeit zu Zeit auf's Neue mit Schwefelwasserstoff sättige (weil bei geringerem Gehalt an

(1) Pogg. Ann. LXXIV, 303; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 508. —

(2) J. pr. Chem. XLI, 228; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 776. —

(3) Pogg. Ann. LXXV, 377. — (4) Arch. Pharm. [2] LVI, 287.

diesem durch die Einwirkung der sauren Flüssigkeit auf das Schwefelarsen sich wieder Arsen löse), und endlich vor dem Verjagen des überschüssigen Schwefelwasserstoffs von dem entstandenen Niederschlag abfiltrire.

Arsenige
Säure.

Ueber den von Wöhler entdeckten Isodimorphismus der arsenigen Säure und des Antimonoxyds sind einige weitere Angaben von Pasteur (1) bekannt geworden. Mit arseniger Säure kochend gesättigtes Kali löst sich in Wasser, setzt aber allmählig arsenige Säure ab, und zwar fast immer in gerade-rhombischen Krystallen, der Form des natürlich vorkommenden Antimonoxyds. Antimonoxyd in regulären Formen erhielt er durch mehrtägige Digestion von frisch gefällttem und gewaschenem Algarothpulver mit überschüssigem kohlens. Natron; es zeigte unter dem Mikroskop Octaëder oder Cubooctaëder, von der gewöhnlichen Form der arsenigen Säure nicht zu unterscheiden.

Den zahlreichen und sich widersprechenden Angaben über die Löslichkeit der arsenigen Säure hat Bussy (2) folgende hinzugefügt. Die glasige Säure löse sich schneller und reichlicher in Wasser, als die undurchsichtig gewordene; dieselbe Menge Wasser, welche bei 12 bis 13° von ersterer 36 bis 38 Theile löse, löse von letzterer nur 12 bis 14. Keine von beiden Arten arseniger Säure habe im strengsten Sinne des Worts eine ihr eigenthümliche Löslichkeit. (Welchen Sinn und Werth haben dann die Angaben über die Löslichkeit?) Die undurchsichtige Säure verwandle sich bei längerem Kochen mit Wasser in glasige, d. h. sie erlange die Löslichkeit der letzteren, so daß 110 Grm. Säure in 1 Liter Flüssigkeit gelöst seien. Der andauernde Einfluß des Wassers und niedriger Temperatur verwandle die glasige Säure in undurchsichtige, d. h. die Auflösung werde nach längerer Zeit schwächer und ihr Gehalt dem

(1) J. pharm. [3] XIV, 399; Chem. Gaz. 1848, 308. — (2) Compt. rend. XXIV, 774; Phil. Mag. [3] XXXI, 151; Repert. Pharm. [2] XLVIII, 801; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 286; J. pr. Chem. XLI, 840; Pharm. Centr. 1847, 938; am vollständigsten J. pharm. [3] XII, 321.

an undurchsichtiger Säure entsprechend. Dafs in der Lösung die beiden Modificationen der arsenigen Säure enthalten sein können, erkläre die Anomalien, welche man in Beziehung auf die Löslichkeit dieser Substanz beobachtet habe. Feine Zertheilung vermehre die Löslichkeit der undurchsichtigen und vermindere die der glasigen Säure. Die durch Einwirkung von Ammoniak undurchsichtig gewordene Säure und die aus Wasser krystallisirte verhalten sich gegen Wasser gleich. In verdünnter Salzsäure löse sich die undurchsichtige Säure langsamer als die glasige. Die Lösung beider Arten von Säuren verhalte sich gleich gegen Lackmus.

Arsenige
Säure.

Ueber arsenigs. Salze haben Pasteur (1) und Filhol (2) Untersuchungen veröffentlicht.

Arsenigsaure
Salze.

Nach Pasteur giebt Kalilösung mit überschüssiger arseniger Säure in der Kälte behandelt, unter schwacher Temperaturerhöhung, eine öartige Flüssigkeit, welche nicht krystallisirt und, bei Anwendung verdünnter Lösungen, mit salpeters. Silberoxyd einen gelben Niederschlag hervorbringt, wo dann die überstehende Flüssigkeit sauer reagirt. Jene öartige Flüssigkeit giebt mit Alkohol versetzt nach 1 oder 2 Tagen Krystalle, welche gerade rechteckige Prismen ohne Abänderungsflächen sind: $\text{KO}, 2\text{AsO}_3, + 2\text{HO}$; 1 HO entweicht bei 100° . Dieses Salz mehrere Stunden mit kohlen. Kali gekocht giebt einen in Alkohol wenig löslichen syrupartigen Körper KO, AsO_3 ; mit überschüssigem kaustischen Kali versetzt, wenn der Ueberschufs an diesem durch Alkohol weggenommen wird, ein in Wasser sehr lösliches, jenem gelben Silbersalz entsprechendes Salz $2\text{KO}, \text{AsO}_3$. — Filhol spricht bei dem zweifach-arsenigs. Kali, welches er durch längeres Erhalten einer concentrirten Lösung bei 40 bis 50° krystallisirt

(1) J. pharm. [3] XIII, 395; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 308; Chem. Gaz. 1848, 309. — (2) J. pharm. [3] XIV, 331; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 308.

Arsenigsaure
Salze.

darstellte, nicht von einem Wassergehalt; KO , AsO_3 , konnte er auch nach Pasteur's Angaben nicht rein erhalten.

Natron bildet 3 entsprechend zusammengesetzte Salze, über welche Pasteur und Filhol indess wenig angeben. Ersterer konnte NaO , 2AsO_3 , nicht krystallisirt, letzterer NaO , AsO_3 , nicht rein erhalten.

Arsenigs. Ammoniak, $\text{NH}_4 \text{O}$, AsO_3 , bildet sich nach Pasteur sogleich bei dem Uebergießen concentrirter Ammoniaklösung auf arsenige Säure, als harte Masse, anscheinend aus hexagonalen Tafeln bestehend, welche sich aber von einem schiefen rectangulären Prisma ableiten. Dieses Salz erhält sich nur in Berührung mit Ammoniakflüssigkeit; für sich und in wässriger Lösung verliert es schnell seinen Gehalt an Ammoniak; letztere Lösung giebt mit salpeters. Silberoxyd gelbes 2AgO , AsO_3 , und die überstehende Flüssigkeit reagirt sauer. Ein diesem Silbersalz entsprechendes Ammoniaksalz darzustellen, gelang nicht.

Filhol konnte keine Verbindungen in bestimmten Proportionen von arseniger Säure mit Kalk oder Magnesia hervorbringen. Mit Baryt stellte er zwei dar; BaO , AsO_3 , durch Vermischen von zweifach-arsenigs. Kali oder Natron mit einem Ueberschufs von Chlorbaryum, wobei arsenige Säure frei wird, und die Verbindung sogleich oder allmählig als weißes gelatinöses Magma oder dendritenförmig aber unkrystallinisch ausgeschieden wird, in welcher Form sie in Wasser leicht löslich ist, während sie getrocknet als weißes, in Wasser unlösliches, Pulver erscheint; in den äusseren Eigenschaften ganz ähnlich ist 2BaO , AsO_3 , welches durch Zersetzen von Chlorbaryum mit 2KO , AsO_3 , erhalten wird. In entsprechender Weise entstehen PbO , AsO_3 , und 2PbO , AsO_3 . Von Silberverbindungen erhielt er ausser der oben erwähnten 2AgO , AsO_3 , auch 3AgO , AsO_3 , letztere durch Mischung einer Lösung von arseniger Säure und überschüssigem, mit Ammoniak übersättigtem, salpeters. Silberoxyd mit schön gelber Farbe, welche im Licht schnell grünlich und bei 140 bis 150° plötzlich schwarz wird, wobei nur

eine Spur Wasser entweicht; bei höherer Temperatur schmilzt diese Verbindung, und arsenige Säure entweicht.

Pasteur (1) glaubt, daß das Product der Einwirkung von Ammoniakgas auf Chlorarsen, nach H. Rose $2 \text{AsCl}_3 + 7 \text{NH}_3$, Chlorarsenimid, Chlorammonium und Ammoniak, $2 (\text{ClAs NH}) + 4 (\text{Cl NH}_3) + \text{NH}_3$, sei; erhitzt entwickle es zuerst Ammoniak, dann sublimire das Ganze, aber zuletzt vorzüglich Chlorammonium. Jenes Product wird durch kochendes Wasser in Ammoniak, arsenige Säure und Chlorammonium zerlegt; mit kaltem Wasser erhitzt es sich, entwickelt Ammoniak, und die Flüssigkeit setzt bei dem Verdunsten einen Niederschlag ab, welcher in sechsseitigen Tafeln krystallinisch ist, und in welchem Pasteur 13,4 pC. Chlor, 58,1 Arsen, 5,3 Stickstoff und 2,3 Wasserstoff fand. Dieser Körper giebt mit concentrirtem Ammoniak behandelt arsens. Ammoniak NH_4O , AsO_3 .

Chlorarsen
mit
Ammoniak.

Meurer (2) empfiehlt zur Darstellung von Jodarsen, AsJ_3 , in eine frisch bereitete Auflösung von Jod in Alkohol reines (aus Arsenzink und Salzsäure bereitetes) Arsenwasserstoffgas, aber nur bis zur Entfärbung der Flüssigkeit, einzuleiten; bei dem Verdunsten scheidet sich das Jodarsen in Krystallen aus.

Jodarsen.

Cloez (3) hat angegeben, daß bei Durchleiten von Schwefelwasserstoff durch eine Lösung von arseniks. Kali schwefelarseniks. Kali, AsO_3S_2 , $\text{KO} + 2\text{HO}$, gebildet werde.

Schwefel-
arsensäure.

Metallisches Antimon wird nach Bensch (4) immer dann nach Liebig's Methode arsenfrei erhalten, wenn es Eisen enthält; um einen eisenfreien Regulus von Arsen zu reinigen, setze man zwei pC. Schwefeleisen zu, und verfähre nach Liebig's Vorschrift. Meyer (5) empfiehlt, das Antimon mit $1\frac{1}{4}$ rohem salpeters. Natron und $\frac{1}{4}$ koh lens.

Antimon.

(1) J. pharm. [3] XIII, 395; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 307; Chem. Gaz. 1848, 309. — (2) Arch. Pharm. [2] LII, 1. — (3) Compt. rend. XXIV, 888. — (4) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 273; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 907. — (5) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 238; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 828.

Natron bis zum schwachen Glühen zu erhitzen, und das sich bildende, wohl ausgewaschene, antimons. Natron mit dem halben Gewicht Weinstein zusammen zu schmelzen.

Antimonoxyd. Hornung (1) empfiehlt, Antimonoxyd (behufs der Darstellung von Brechweinstein u. a.) darzustellen durch Mischen von 15 fein gestoßenem Schwefelantimon mit 36 concentrirter Schwefelsäure, Erhitzen bis nur noch Schwefelsäure verdampft, Waschen und Zersetzen mit kohlen. Natron.

Antimonoxydverbindungen. Péligot (2) hat mehrere Antimonoxydverbindungen untersucht.

Schwefels. Salze. Algarothpulver (wofür Péligot die Formel ClSbO_2 vorschlägt, vergl. weiter unten) gab mit Schwefelsäurehydrat ein nadelförmiges Salz, $\text{SbO}_3, 4 \text{SO}_3$; Antimonoxyd mit rauchender Schwefelsäure kleine glänzende Krystalle $\text{SbO}_3, 2 \text{SO}_3$; beide waren auf porösen Thonplatten in trockener Luft oder im luftleeren Raum getrocknet. Ein Salz, $5 \text{SbO}_3, 3 \text{SO}_3$, welches nach Berzelius das neutrale sei (?), habe er nicht erhalten können. Die beschriebenen Salze gaben mit heißem Wasser ein basisches Salz $2 \text{SbO}_3, \text{SO}_3$; die Analyse zweier anderer Proben von so erhaltenem Zersetzungsproduct sei gut ausgedrückt durch $2 \text{SbO}_3, \text{SO}_3 + 2 \text{HO}$. (Der von Brandes untersuchten Salze $\text{SbO}_3, \text{SO}_3$ und $\text{SbO}_3, 3 \text{SO}_3$ erwähnt Péligot nicht.)

Salpeters. Antimonoxyd, durch Auflösen von Antimonoxyd in rauchender Salpetersäure in der Kälte und Zusatz von Wasser dargestellt, ist $2 \text{SbO}_3, \text{NO}_3$, und bildet perlmutterglänzende Krystalle.

Oxychlorüre. Durch Behandlung von SbCl_3 mit kaltem Wasser erhielt er einen nach einigen Tagen krystallinisch werdenden Niederschlag, welcher gut gewaschen eine Zusammensetzung gezeigt habe, die mit der für das Algarothpulver aufgestellten Formel übereinstimme. Diese

(1) Arch. Pharm. [2] L, 47. — (2) Ann. ch. phys. [3] XX, 283; Phil. Mag. [3] XXXI, 230; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 280; J. pr. Chem. XLI, 376; J. Pharm. [3] XII, 210; Pharm. Centr. 1847, 603.

aber sei einfacher gegeben durch Cl SbO_2 (letztere ver-
 langt 19,6 Chlor auf 71,5 Antimon und 8,9 Sauerstoff; eine
 solche Zusammensetzung ist für Algarothpulver bisher nicht
 nachgewiesen worden). Durch Behandlung von Sb Cl_3 mit
 heißem Wasser erhalte man ein anderes Oxychlorür Cl SbO_2
 + SbO_2 (dieselbe Zusammensetzung ist ausdrückbar durch
 $\text{Sb Cl}_3 + 5 \text{ SbO}_2$, was gewöhnlich als die Formel des Al-
 garothpulvers angenommen wird).

Antimonoxyd-
verbindun-
gen.

Zweifach-weins. Antimonoxyd krystallisirt nach längerer
 Zeit aus einer syrupdicken Auflösung von Antimonoxyd in
 Weinsäure. Die Krystalle gehören nach Provostaye's (1)
 Beschreibung in des rhombische System (Makrod. : Brachyd. :
 Hauptaxe = 1:0,9308:0,429; $\infty \text{ P.} \infty \check{\text{P}}_4. \infty \bar{\text{P}} \infty. 3 \check{\text{P}} \infty. \bar{\text{P}} \infty$);
 sie sind leicht löslich in Wasser, zerfließlich an feuchter Luft
 und haben die Zusammensetzung $\text{SbO}_2, 2 \text{ C}_6\text{H}_2\text{O}_8 + 12 \text{ HO}$;
 bei 160° entweicht alles Wasser. — Auf Zusatz von Al-
 kohol zu einer concentrirten Lösung dieses Salzes entsteht
 ein Niederschlag, der bei 160° getrocknet $\text{SbO}_2, \text{C}_6\text{H}_2\text{O}_8$,
 HO ist. — Dem weins. Antimonoxyd-Kali, welches Knapp
 zuerst untersuchte, giebt Pélégot die Formel $\text{SbO}_2, \text{K}_2\text{O}$,
 $2 \text{ C}_6\text{H}_2\text{O}_8, 8 \text{ HO}$.

Oxals. Antimonoxyd bereitete Pélégot durch Kochen
 von Oxalsäurelösung mit Antimonoxyd, oder durch Be-
 handlung des Algarothpulvers mit Oxalsäure, oder durch
 Zusatz von Salzsäure zu einer heißen Lösung des oxals.
 Antimonoxyd-Kalis, wo das oxals. Antimonoxyd als krystal-
 linisches Pulver niederfällt, oder durch Zusatz von Oxal-
 säure zu einer Lösung desselben Doppelsalzes. Auf alle
 diese Arten erhielt er dasselbe Product : ein krystallinisches,
 in Wasser unlösliches Salz von der Zusammensetzung SbO_2 ,
 $2 \text{ C}_2\text{O}_3, \text{HO}$. Siedendes Wasser zerlegt es in Oxalsäure
 und Antimonoxyd. — Für oxals. Antimonoxyd-Kali, wel-
 ches durch die Einwirkung von saurem oxals. Kali auf
 Antimonoxyd entsteht und nach Bussy die Zusammen-

(1) Ann. ch. phys. [3] XX, 302; J pr. Chem. XLI, 392.

Antimonoxyd-
verbindun-
gen. setzung $\text{SbO}_3, 3 \text{ KO}, 6 \text{ C}_2\text{O}_3, 6 \text{ HO}$ hat, soll nach Pélilot die Formel $\text{SbO}_3, 3 \text{ KO}, 7 \text{ C}_2\text{O}_3, 8 \text{ HO}$ die richtige sein.

Pélilot glaubt, daß die Zusammensetzung dieser Salze anders, nach Art seiner Ansicht über die Uranoxydsalze, aufzufassen sei. Während andere Oxyde, welche 3 Atome Sauerstoff enthalten, sich leicht mit 3 Aequiv. Säure verbinden, und mit 1 Aequiv. Säure verbunden unlösliche Salze bilden, sei dieses bei den Salzen von U_2O_3 und SbO_3 nicht der Fall. Die Verbindung von 1 Aequiv. von ihnen und 1 Aequiv. Säure entspricht nach Pélilot den Salzen, welche aus 1 Aequiv. einer Basis, die 1 Atom Sauerstoff enthält, und 1 Aequiv. Säure bestehen. Diese Analogie werde ausgedrückt durch die Annahme, Antimonoxyd und Uranoxyd seien Oxyde sauerstoffhaltiger Radicale, des Antimonyls und des Uranyls; ihre Formeln seien $(\text{SbO}_2)_\text{O}$ und $(\text{U}_2\text{O}_2)_\text{O}$.

Antimonsäure
und Meta-Antimonsäure.

Fremy (1) hat die Untersuchung der Antimonsäure wieder aufgenommen und gefunden, daß dieselbe in zwei verschiedenen Modificationen existirt, welche zwei ganz verschiedene Reihen von Salzen bilden. Die von ihm als Antimonsäure bezeichnete Modification ist die von Berzelius vorzugsweise untersuchte, welche mit Kali ein gummiartiges neutrales und ein in Wasser fast unlösliches saures Salz bildet, und durch Erhitzen des Antimons mit Salpeter entsteht. Das Hydrat der Antimonsäure, dargestellt durch Fällung des neutralen antimons. Kalis mittelst Salpetersäure und Trocknen bei gewöhnlicher Temperatur in einem wasserfreien Luftstrom, fand er zusammengesetzt $\text{SbO}_3 + 5 \text{ HO}$. Für das im luftleeren Raum getrocknete neutrale antimons. Kali fand er $\text{KO}, \text{SbO}_3 + 5 \text{ HO}$; bei 160° mehrere Stunden getrocknet wird es zu $\text{KO}, \text{SbO}_3 + 3 \text{ HO}$, ist dann unlöslich in kaltem Wasser und löst sich in siedendem Wasser erst nach längerer Zeit, unter Wiederaufnahme von 2 Atomen Wasser; das siedende Wasser führt bei

(1) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 404; J. pr. Chem. XLV, 209; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 822; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 279.

längerer Einwirkung auch das geglühte Salz, KO, SbO_3 , Antimonsäure und Meta-Antimonsäure. $+ 5 \text{HO}$ über. Der durch Erhitzen von 1 Gewichtstheil Antimon und 4 Salpeter sich bildende weisse Körper ist grösstentheils KO, SbO_3 . — Ueber antimons. Ammoniak siehe weiter unten.

Meta-Antimonsäure nennt Fremy die bei Zersetzung des Fünffach-Chlorantimons durch Wasser sich bildende Säure, welche auch entsteht, wenn antimons. Kali mit einem Ueberschufs von Kali erhitzt wird. Er betrachtet die Meta-Antimonsäure als eine zweibasische Säure, welche mit Basen zwei Reihen Salze, neutrale nach der allgemeinen Formel $2 \text{MeO}, \text{SbO}_3$ und saure $\text{MeO}, \text{HO}, \text{SbO}_3$, bilde. Die ersteren bestehen nur bei Gegenwart eines grossen Ueberschusses an Alkali, und gehen unter dem Einflufs von Lösungsmitteln in saure Salze über.

Die sauren meta-antimons. Salze, $\text{MeO}, \text{HO}, \text{SbO}_3$, haben dieselbe Zusammensetzung wie die neutralen antimons. Salze, oder differiren von ihnen nur durch den Gehalt an 1 Atom Wasser; auch gehen sie unter unbedeutenden Einflüssen in diese über. Auch die Meta-Antimonsäure verwandelt sich leicht, selbst in Wasser, in Antimonsäure. Die scharfe Unterscheidung beider Modificationen wird dadurch erschwert; als distinguirendes Kennzeichen glaubt Fremy erkannt zu haben, dafs die Meta-Antimonsäure sich allmählig in wässrigem Ammoniak löse, die Antimonsäure aber darin unlöslich sei; die erstere löse sich auch in Säuren schneller als die letztere. Die Meta-Antimonsäure löst sich gänzlich in vielem kaltem Wasser, und wird durch Säuren daraus niedergeschlagen. Dieses Hydrat hat die Formel $\text{SbO}_3, 4 \text{HO}$.

Die Antimonsäure giebt, mit einem grossen Ueberschufs von Kali erhitzt, $2 \text{KO}, \text{SbO}_3$, neutrales meta-antimons. Kali, welches nur bei Gegenwart von viel Kali besteht und durch den Einflufs von Wasser zu saurem meta-antimons. Kali, $\text{KO}, \text{SbO}_3, 7 \text{HO}$, wird. Dieses saure Salz enthält Säure und Basis in demselben Verhältnifs, wie das neutrale

Antimonsäure
und Meta-Anti-
monsäure.

antimons. Kali, aber letzteres ist gummiartig, fällt nicht die Natronsalze, und seine Auflösung giebt mit Chlorammonium einen weißen flockigen Niederschlag, während ersteres körnig und krystallinisch ist, mit Natronsalzen einen Niederschlag giebt, und seine Auflösung durch Chlorammonium nicht getrübt wird. Das saure antimons. Kali gehe in Wasser gelöst schnell in antimons. über; das antimons. verliere bei gelindem Trocknen 2 Atome Wasser und verwandle sich in meta-antimons., bei allzu verlängertem Trocknen aber bilde sich das oben erwähnte unlösliche antimons. Kali, $\text{KO}, \text{SbO}_3 + 3 \text{HO}$. — Zur Darstellung des meta-antimons. Kalis theilt Fremy folgende Methode als die von ihm neuerdings angewandte mit. 1 Gewichtstheil Antimon und 4 Salpeter werden in einem irdenen Tiegel bis zum Rothglühen erhitzt; das sich bildende unlösliche antimons. Kali mit kaltem Wasser gewaschen, dann 2 bis 3 Stunden mit Wasser, das nach Maßgabe des Verdampfens ersetzt wird, gekocht; die Lösung von antimons. Kali unter Zusatz von festem Aetzkali eingedampft, bis eine herausgenommene Probe krystallinisch erstarrt; wenn dies eintritt, wird das Abdampfen unterbrochen, das meta-antimons. Kali setzt sich bei dem Erkalten reichlich ab und wird auf Platten von unglasirtem Porcellan getrocknet. Vor dem Gebrauch als Reagens auf Natron entfernt man den Ueberschuß an Alkali durch Waschen. Das Salz wird trocken aufbewahrt, weil es in Wasser gelöst in antimons. Salz übergeht.

Meta-antimons. Ammoniak bereitete Fremy durch längere Einwirkung von concentrirter Ammoniaklösung auf Meta-Antimonsäurehydrat; letzteres löst sich langsam auf und bildet ein Salz, worin auf 1 Atom Meta-Antimonsäure 2 Atome Ammoniak enthalten sind, dem Kalisalz $2 \text{KO}, \text{SbO}_3$ entsprechend. Dieses Salz ist schwer zu isoliren; bei Zusatz von einigen Tropfen Alkohol zu seiner wässrigen Lösung fällt ein krystallinisches saures meta-antimons. Salz nieder, $\text{NH}_4\text{O}, \text{SbO}_3, 6 \text{HO}$. Dieses Salz präcipitirt

die Natronsalze; bei schwacher Erwärmung verliert es Antimonsäure und Meta-Antimonsäure. Wasser und wird unlöslich. In diesem Zustand mit Wasser gekocht, verliert es das krystallinische Ansehen und verwandelt sich, ohne Ammoniak zu entwickeln, in ein weißes Pulver, unlösliches antimons. Ammoniak. Letzteres bildet sich immer, wenn man Antimon- oder Meta-Antimonsäure in der Hitze in Ammoniak löst, wo es sich bei dem Erkalten absetzt; das meta-antimons. Ammoniak läßt sich nur bei Einwirkung in der Kälte erhalten, und selbst dann geht es, wahrscheinlich vorzugsweise bei Ueberschuß von Ammoniak, oft in antimons. über. Das saure meta-antimons. Ammoniak geht selbst im trocknen und krystallinischen Zustand bei gewöhnlicher Temperatur in gut verschlossenen Gefäßen während einiger Tage, unter Verlust seiner Löslichkeit in Wasser, in antimons. über. — Das im luftleeren Raum getrocknete unlösliche antimons. Ammoniak ist zusammengesetzt NH_4O , SbO_5 , 4 HO .

In dem krystallisirten Fünffach-Schwefelantimon-Schwefelnatrium Schwefelantimon-Schwefelnatrium. (Schlippe'schem Salz) fand H. Rose (1) den Wassergehalt zu 18 At., Rammelsberg's Bestimmung bestätigend. Die bei abgehaltener Luft geschmolzene (wasserfreie) Verbindung zerfällt an der Luft zu einem voluminösen, unter dem Mikroskop krystallinisch erscheinenden, Pulver, wobei 15 At. Wasser aus der Luft aufgenommen werden.

Die Färbung, welche das nach Quesneville's Methode gereinigte Wismuth, auch das befeuchtete an der Luft, annimmt, läßt sich nach Poggendorff (2) schneller und ganz nach Willkür auf galvanischem Wege hervorbringen. Eine Wismuthplatte, welche als positive Electrode einer Platinplatte als negativen in einer Lösung von 1 Aetzkali in 4 bis 6 Wasser gegenübersteht, wird, bei Anwendung einer Batterie von zwei Grove'schen Bechern, hinter einander gleichförmig gelb, roth, violett, blau, grün, wie Wismuth.

(1) Pogg. Ann. LXXIV, 576. — (2) Pogg. Ann. LXXIV, 586; Berl. Acad. Ber., Juli 1848; Instit. 1849, 13.

derum farblos, und in derselben Reihenfolge, aber schwächer, wieder gefärbt. Durch rechtzeitige Unterbrechung des Stroms läßt sich eine bestimmte Farbe festhalten.

Kohlens. Wismuthoxyd.

Nach Lefort (1) entsteht bei Einwirkung eines einfach-kohlens. Alkalis in der Hitze oder Kälte auf ein möglichst neutrales Wismuthsalz immer ein Niederschlag von der durch Heintz angegebenen Zusammensetzung BiO_3 , CO_2 , bei Anwendung zweifach-kohlens. Alkalis ein leichter, weißer Niederschlag BiO_3 , $\text{CO}_2 + \text{HO}$, welcher sein Wasser bei 100 bis 120° verliert.

Salpeters. Wismuthoxyd.

Für das krystallisirte dreifach-salpeters. Wismuthoxyd bestimmte Gladstone (2) die Zusammensetzung BiO_3 , $3 \text{NO}_3 + 10 \text{HO}$, deren Richtigkeit auch durch Heintz (3) bestätigt wurde (früher nahm man darin nur 9 HO an). Gladstone fand, daß dieses Salz mehrere Stunden lang auf 150° erhitzt zu BiO_3 , $\text{NO}_3 + \text{HO}$ wird, und letzteres bei etwa 260° Säure und Wasser abgibt.

Die Zersetzung des dreifach-salpeters. Wismuthoxyds durch Wasser hat H. Becker (4) ausführlich untersucht. Nach ihm scheidet sich bei der Zersetzung desselben — mag es im trocknen Zustand oder in der sauersten Lösung angewandt werden — durch kaltes Wasser zunächst einfach-saures Salz, BiO_3 , $\text{NO}_3 + 2 \text{HO}$, ab, zuerst als käsiger Niederschlag, welcher sich jedoch bald in zarte perlmutterglänzende, unter dem Mikroskop als längliche Tafeln erscheinende, Schüppchen verwandelt; schon bei gelinder Wärme verliert dieses Salz einen Theil seines Wassers, und bei 100° getrocknet enthält es nur die Hälfte von dem oben angegebenen Wassergehalt. Frisch gefällt und noch feucht löst es sich ziemlich in Wasser, namentlich in salpetersäurehaltigem; ein gewisser Gehalt des Wassers an dreifach-salpeters. Wismuthoxyd hebt aber diese Löslich-

(1) Compt. rend. XXVII, 268; ausführlicher J. pharm. [3] XV, 25. — (2) Chem. Soc. Mem. III, 480; J. pr. Chem. XLIV, 179; Arch. Pharm. [2] LVII, 40. — (3) J. pr. Chem. XLV, 102. — (4) Arch. Pharm. [2] LV; 31. 129; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 282.

keit auf. Doch hält es sich nicht lange in Auflösung, sondern zerfällt je nach der vorhandenen Menge freier Säure oder der Temperatur mehr oder weniger schnell in dreifach-saures Salz, freie Salpetersäure und basischere Producte. — Ist das Auflösungswasser sauer und kalt, so setzen sich bald kleine glänzende Prismen, 5 BiO_3 , 4 NO_3 , $+ 9 \text{ HO}$, ab, das eigentliche *Magisterium bismuthi*; es kann diese Verbindung auch bei dem Auswaschen des mit Wismuthlösung und kaltem Wasser gebildeten Niederschlags entstehen und sich diesem zumengen. Rathsam ist es zur Darstellung des *Magisterium bismuthi*, den mit Wismuthlösung und Wasser gebildeten Niederschlag nicht auf dem Filter zu waschen, sondern in dem Präcipitirgefäße, nach Entfernung der sauren Flüssigkeit, mit Wasser zu übergießen und die Umsetzung abzuwarten. Kaltes Wasser löst das *Magisterium* nicht merklich und zersetzt es nur sehr langsam; heißes Wasser nimmt aus ihm neutrales Salz und freie Säure auf, und verwandelt es, namentlich bei fortgesetztem Sieden, in ein schmutzig weißes, schweres, unter dem Mikroskop amorph erscheinendes Pulver, in welchem 1 bis 2 pC. Salpetersäure gefunden wurden. — Concentrirte Wismuthlösung bei starker Hitze verdampft giebt zuweilen weiße krystallinische Rinden, die unter dem Mikroskop dicke sechseitige Tafeln zeigen; ihre Zusammensetzung ergab sich 5 BiO_3 , 4 NO_3 , $+ 12 \text{ HO}$; kaltes salpetersäurehaltiges Wasser verändert dieses Salz nicht, heißes verwandelt es in Nadeln und Prismen, wahrscheinlich in das eben besprochene eigentliche *Magisterium*; mit reinem Wasser zerfällt es zu milchiger Suspension, wie das einfach-saure Salz. — Wenn salpetersäurehaltiges heißes Wasser auf einfach-salpeters. Wismuthoxyd einwirkt, oder krystallisirtes dreifach-saures Salz oder eine saure Wismuthlösung mit heißem Wasser gemischt wird, oder ein mit kaltem Wasser gebildeter Niederschlag mit der sauren Flüssigkeit erhitzt oder in erhitztes saures Wasser gethan wird, so bildet sich 6 BiO_3 , $+ 5 \text{ NO}_3$, $+ 9 \text{ HO}$ in Form von

Salpeters.
Wismuth-
oxyd.

kleinen kurzen Prismen. Wasser löst es nicht, sondern zersetzt es allmählig, doch schneller als das *Magisterium bismuthi*; auf dem Filter mit Wasser gewaschen, bis das Ablaufende nicht mehr sauer reagiert, zeigt es sich in einen aus größeren Prismen bestehenden Rückstand 4 BiO_3 , $3 \text{ NO}_3 + 9 \text{ HO}$ verwandelt. — Wird das einfach-saure Salz mit vielem reinen Wasser behandelt, so giebt es eine fast ganz klare Auflösung, die sich aber schnell in eine milchige Suspension verwandelt, aus welcher sich langsam ein sehr zartes weißes Pulver, 5 BiO_3 , $3 \text{ NO}_3 + 8 \text{ HO}$, absetzt. — Ausführlich handelt Becker noch über die in der Praxis vortheilhafteste Darstellung des *Magisterium bismuthi*.

Auf Farbenveränderungen, welche bei der Zersetzung des krystallisirten dreifach-salpeters. Wismuthoxyds durch Hitze sich zeigen, machte Diesel (1) aufmerksam.

Zink.

Nicklès (2) giebt an, an Zink, welches nach Jacquelin's Methode (durch Destillation in Wasserstoffgas) dargestellt war, deutliche Pentagonal-dodekaëder wahrgenommen zu haben. Da Nöggerath früher für das Zink hexagonale Krystallform nachgewiesen hat, so hält Nicklès dieses Metall für dimorph.

Zinkoxyd.

Das spec. Gew. des reinen krystallisirten Zinkoxyds hat Brooks (3) zu 5,61 bis 5,66 bestimmt. — Krystallinisches Zinkoxyd, welches sich in einer irdenen zur Zinkdestillation dienenden Retorte angesetzt hatte, untersuchten W. und T. Herapath (4). Es bildete spiefsförmige Aggregate kleiner, glänzender, durchsichtiger, anscheinend rechtwinklig prismatischer Krystalle vom spec. Gew. 5,43, aus welchen Säuren ohne Aufbrausen 88,5 bis 92 pC. Zinkoxyd auszog, mit Hinterlassung eines krystallinischen Rückstands von der Zusammensetzung SnO_2 , ZnO .

(1) Arch. Pharm. [2] LIII, 296. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXII, 37; J. pharm. [3] XIII, 18; Pogg. Ann. LXXIV, 442. — (3) Pogg. Ann. LXXIV, 489. — (4) Chem. Soc. Qu. J. I, 42; im Ann. Pharm. Centr. 1848, 733.

Nicklès (1) fand das Zinkoxydhydrat, dessen Formel ZnO, HO er bestätigte, gerade rhombisch krystallisirt: $\infty \text{P} \cdot \infty \bar{\text{P}} \infty \cdot \infty \bar{\text{P}} \infty \cdot \bar{\text{P}} \infty$; den Winkel von ∞P im makro-diagonalen Hauptschnitt $62^\circ 20'$, den von $\bar{\text{P}} \infty$ in demselben $120^\circ 41'$; das spec. Gew. 2,677.

Zinkoxyd-
hydrat.

Die Niederschläge durch Schwefelwasserstoff in concentrirten und nicht hinreichend angesäuerten Zinkoxydlösungen hat Riegel (2) untersucht.

Zinkoxyd-
Balse.

Nach Lefort (3) hat der aus Zinklösung mit kohlens. Kali oder Natron kochend gefällte Niederschlag (wie getrocknet?) die Zusammensetzung $8 \text{ZnO}, 3 \text{CO}_2 + 6 \text{HO}$, der mit zweifach-kohlens. Kali oder Natron kalt gefällte $3 \text{ZnO}, \text{CO}_2 + 6 \text{HO}$.

Kohlensaures
Zinkoxyd.

Die Krystalle des schwefels. Zinkoxyd-Natron sind nach Miller (4) monoklinometrisch: $\infty \text{P} \cdot 0 \text{P} \cdot \infty \text{P} 2 \cdot + \text{P} \infty - \text{P}$, zu welcher Combination noch ein klinodiagonales Doma kommt. Orthod. zur Klinod. zur Hauptaxe = 0,744 : 1 : 0,529; der Winkel der beiden letztern = $79^\circ 38'$; $\infty \text{P} : \infty \text{P}$ im orthod. Hauptschnitt = $105^\circ 48'$, $\infty \text{P} 2 : \infty \text{P} 2 = 66^\circ 56'$, $+ \text{P} \infty : 0 \text{P} = 150^\circ 6'$.

Schwefels.
Zinkoxyd-
Natron.

Metallisches Zink bildet nach Wöhler (5) mit einer concentrirten Lösung seleniger Säure, ohne das Wasser zu zersetzen, Selenzink, freies Selen und vierfach-selenigs. Zinkoxyd $\text{ZnO}, 4 \text{SeO}_2 + 3 \text{HO}$, welches aus der abfiltrirten Flüssigkeit sehr langsam krystallisirt, wenn diese bei sehr gelinder Wärme abgedampft und dann (denn concentrirter zersetzt sie sich in der Wärme) der freiwilligen Verdunstung überlassen wird. Es bildet grofse gelbe Krystalle, schiefe rhomboidische Säulen; es ist luftbeständig, in Wasser zu saurer Flüssigkeit leicht löslich, welche beim Erhitzen in

Selenigsaures
Zinkoxyd.

(1) Ann. ch. phys. [3] XXII, 31; J. pharm. [3] XII, 406; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 58. — (2) Arch. Pharm. [2] LVI, 154. — (3) J. pharm. [3] XI, 329; J. pr. Chem. XLI, 126; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 446. — (4) Chem. Soc. Mem. III, 391; Phil. Mag. [3] XXXI, 540. — (5) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 279; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 46.

selenige Säure und sich abscheidendes einfach-selenigs. Zinkoxyd zersetzt wird.

Salpeters.
Zinkoxyd.

Gerhardt (1) giebt an, basisch salpeters. Zinkoxyd in prismatischen Nadeln und mit der Zusammensetzung 4ZnO , $\text{NO}_3 + 3 \text{HO}$ erhalten zu haben.

Cadmium.
Cadmium-
oxydhydrat.

Nicklès (2) stellte krystallisirtes Cadmiumoxydhydrat dar durch Einwirkung von Ammoniakflüssigkeit auf Cadmium, welches mit Eisen in Berührung war, und fand die Zusammensetzung annähernd CdO , HO .

Kohlensaures
Cadmium-
oxyd.

Nach Lefort (3) ist der aus Cadmiumlösung durch kohlens. Alkali gefällte Niederschlag $2 (\text{CdO}, \text{CO}_2) + \text{HO}$, und entweicht das Wasser erst zwischen 80 und 120° .

Schwefels.
Cadmium-
oxyd.

Kühn (4) berichtet, dafs bei dem Abdampfen einer Lösung von schwefels. Cadmiumoxyd, welche überschüssige Schwefelsäure enthielt, feste Krusten undeutlicher Krystalle von CdO , $\text{SO}_3 + \text{HO}$ sich abschieden; dafs das basische Salz 2CdO , $\text{SO}_3 + \text{HO}$ erhalten wurde, indem von einer Auflösung von schwefels. Cadmiumoxyd 1 Drittheil genau durch Aetzkali zersetzt und mit dem Rest der Lösung anhaltend gekocht wurde.

Zinn.
Zinnoxzydul-
salze.

Bouquet (5) hat mehrere Zinnoxzydulsalze untersucht. — *Schwefels. Zinnoxzydul*, SnO , SO_3 , krystallisirt in Blättchen aus einer heifs gesättigten Auflösung von frisch gefälltem Zinnoxzydul in verdünnter Schwefelsäure. Es ist sehr löslich in Wasser; die Lösung trübt sich bald unter Absatz eines basischen Salzes, welches einige Tropfen Schwefelsäure wieder lösen. Beim Glühen hinterläfst es Zinnoxzyd; mit schwefels. Kali oder Ammoniak vereinigt es sich zu krystallisirbaren Verbindungen. — *Unterschwefels. Zinnoxzydul* liefs sich nur in Auflösung erhalten; bei der Concentrirung im luftleeren

(1) J. pharm. [3] XII, 61. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXII, 31; J. pharm. [3] XII, 406; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 60. — (3) Compt. rend. XXVII, 268; ausführlicher J. pharm. [3] XV, 20. — (4) Arch. Pharm. [2] L, 286; Pharm. Centr. 1847, 595. — (5) Aus dem Recueil des travaux de la société d'émulation pour les sciences pharmaceutiques, Janvier 1847, 3, im J. pharm. [3] XI, 459; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 278.

Raum schied sich Einfach-Schwefelzinn aus. — *Weins.* <sup>Zinnoxidul-
salz.</sup> *Zinnoxidul*, $2 \text{SnO}, \text{C}_8\text{H}_4\text{O}_{10}$, wird leicht erhalten durch Zusatz einer concentrirten Lösung von Zinnoxidul in Essigsäure zu einer kochenden Lösung von Weinsäure, bis Krystallisation beginnt; die Krystalle scheinen rectanguläre Prismen zu sein, sie werden von Wasser gelöst und selbst beim Kochen nicht zersetzt; die Lösung wird durch Ammoniak nicht gefällt. — Zinnoxidul giebt auch mit saurem weins. Kali oder Ammoniak krystallisirbare Verbindungen. — *Oxals.* *Zinnoxidul*, $\text{SnO}, \text{C}_2\text{O}_3$, wird ebenso erhalten; es bildet glänzende Nadeln, welche in kaltem Wasser unlöslich sind, von kochendem theilweise zersetzt werden. Dieses Salz löst sich in einfach-oxals. Alkali unter Bildung von Verbindungen, welche auch durch Behandlung von zweifach-oxals. Alkali mit Zinnoxidulhydrat entstehen. Das Kalidoppelsalz, $\text{SnO}, \text{C}_2\text{O}_3 + \text{KO}, \text{C}_2\text{O}_3 + \text{HO}$, bildet grofse, anscheinend dem rhombischen System angehörige Krystalle. Das Ammoniakdoppelsalz ist damit isomorph; erhitzt schmilzt es und detonirt dann. Das Natrondoppelsalz ist wasserfrei und krystallisirbar. Diese Doppelsalze lösen sich in kaltem Wasser; die Lösungen werden nach einiger Zeit, oder sogleich bei dem Kochen, trübe. Bouquet kündigt noch an, das citrons., phosphors. und bors. Zinnoxidul dargestellt zu haben; das essigs. konnte nicht krystallisirt erhalten werden.

Nöllner (1) empfiehlt zur Darstellung des Zinnsalzes ^{Zinnchlorür.} (gewässerten Zinnchlorürs), die Salzsäure, wie sie sich aus den Retorten entwickelt, sogleich auf granulirtcs Zinn, welches in Vorlagen von Steingut eingefüllt ist, einwirken zu lassen, und die aus den Vorlagen abfließende concentrirte Zinnsalzlösung in zinnernen Pfannen unter Zusatz von granulirtem Zinn einzudampfen.

R. E. Brown (2) hat gefunden, dafs bei dem Kochen des Indigos mit Natronlauge und metallischem Zinn, wobei

(1) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 120; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 870. — (2) Chem. Gaz. 1847, 60.

sich ersterer auflöst, sich zinns. Natron bildet, und daß letzteres auch bei dem Kochen von Zinn mit Bleioxyd und Natronlauge; unter Abscheidung von metallischem Blei, entsteht.

Zinnsäure
und Metazinn-
säure.

Fremy (1) hatte behauptet, daß die zwei Modificationen des Zinnoxids, das normale (Zinnsäure, durch Zersetzung des Zinnchlorids zu erhalten) und das anomale (Metazinnsäure, aus Zinn durch Salpetersäure sich bildend) verschiedenes Aequivalentgewicht haben; das des ersteren sei durch SnO_2 , das des letzteren durch Sn_2O_3 ausgedrückt. Zu diesem Resultat war er gekommen durch Analyse der Verbindungen mit Kali und Natron, welche er durch Kochen von Metazinnsäure mit Alkali und Niederschlagen mittelst Alkohol erhalten hatte. Er findet jetzt, daß er damals Gemische von zinns. und metazinns. Alkali untersucht habe, weil bei dem Kochen die metazinns. Salze theilweise in zinns. übergehen. Seine neue Darstellung des metazinns. Kalis besteht darin, Metazinnsäure in kalter verdünnter Kalilauge zu lösen und festes Aetzkali zuzusetzen, wo die Verbindung als weißer körniger Niederschlag sich ausscheidet. Nach dem Trocknen auf einer porösen Porcellanplatte ist dieser Niederschlag harzig und durchscheinend; er ist in Wasser vollständig löslich zu einer alkalischen Flüssigkeit, welche durch Verdampfen nicht zur Krystallisation gebracht werden kann, und auf Zusatz einer Säure einen Niederschlag von (in Salpetersäure unlöslicher) Metazinnsäure giebt. Das metazinns. Kali, mit einem Ueberschuß von Kali erhitzt oder mehrere Tage in der Kälte damit in Berührung gelassen, verwandelt sich in zinns. Kali. Für das bei 130° getrocknete metazinns. Kali fand Fremy die Zusammensetzung $\text{KO}, \text{Sn}_2\text{O}_3 + 4\text{HO}$. Durch Glühen wird das Salz entwässert und zersetzt; Wasser nimmt aus dem geglühten Salz Kali und nur sehr wenig Metazinnsäure auf; aus 100 Salz bleiben nach dem Glühen und Behandeln mit Wasser

(1) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 898; J. pr. Chem. XLV, 200; im Auss. Pharm. Centr. 1848, 819.

70 Metazinnsäure ungelöst zurück. — Zinns. Kali verliert durch Erhitzen bis zum Rothglühen seine Löslichkeit in Wasser nicht, und Säuren scheiden noch nachher aus ihm Zinnsäure, welche in Salpetersäure vollkommen löslich ist.

Zinnsäure
und Metazin-
säure.

Metazinns. Natron stellte Fremy dar durch Einwirkung von concentrirter Natronlauge auf Metazinnsäure. Das Salz ist sehr schwer löslich in Wasser, weiß, körnig, krystallinisch; es zersetzt sich schon durch Erwärmung bis zu 60° (in Auflösung bei dem Kochen) in Metazinnsäure und Natron. Nach approximativen Analysen enthält das Salz auf NaO , Sn_3O_{10} 4 Atome Wasser.

Für die Zusammensetzung des bei gewöhnlicher Temperatur in wasserfreier Luft getrockneten (in Ammoniak ganz unlöslichen) Metazinnsäurehydrats ergaben Fremy's Analysen $\text{Sn}_3\text{O}_{10} + 10 \text{HO}$; im luftleeren Raum wird es zu $\text{Sn}_3\text{O}_{10} + 5 \text{HO}$, mehrere Stunden bei 130° getrocknet zu $\text{Sn}_3\text{O}_{10} + 4 \text{HO}$, bei 160° getrocknet zu $\text{Sn}_3\text{O}_{10} + 3 \text{HO}$. Am beständigsten sei das Hydrat $\text{Sn}_3\text{O}_{10} + 5 \text{HO}$; die oben genannten Kali- und Natronsalze entstehen durch Eintritt von 1 At. Alkali an die Stelle von 1 At. Wasser in ihm. (Dieselbe procentische Zusammensetzung wie dieses Hydrat hat das im luftleeren Raum getrocknete der Zinnsäure, für welches Fremy SnO_2, HO ermittelte.) Wenn eins der vorhergehenden Metazinnsäurehydrate in Alkali gelöst und mit einer Säure gefällt wird, so erhält man Metazinnsäure, die in Salpetersäure unlöslich ist, aber die besondere Eigenschaft hat, sich in Ammoniak zu lösen.

H. Rose (1) hat gleichfalls die Unterschiede der beiden Modificationen von Zinnsäure untersucht. Oxyd *a* nennt er die Modification, welche Fremy als Zinnsäure bezeichnet, und die aus einer Lösung von Zinnchlorid oder Zinnchloridhydrat (wofür Rose wie vor ihm Lewy $\text{SnCl}_2 + 5 \text{HO}$ fand) durch Ammoniak gefällt wird; Oxyd *b* die aus Zinn

(1) Berl. Acad. Ber., Juni 1848; Pogg. Ann. LXXV, 1; J. pr. Chem. XLV, 76; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 272; Instit. 1848, 400; Pharm. Centr. 1848, 678; Chem. Gaz. 1848, 377.

Zinnsäure
und Metazinn-
säure.

mit Salpetersäure entstehende, Fremy's Metazinnsäure. Die hauptsächlichsten Unterschiede sind nach Rose folgende.

Das Oxyd *a* löst sich in der Kälte in Salzsäure, auch in concentrirter; das Oxyd *b* löst sich selbst in der Hitze nicht in Salzsäure, wohl aber nach dem Erhitzen mit der Säure auf Zusatz von Wasser.

Die Lösung von Zinnchlorid oder Zinnchloridhydrat (also von Oxyd *a*) giebt mit verdünnter Schwefelsäure, Salzsäure, Salpetersäure oder Arsensäure selbst nach längerer Zeit keinen Niederschlag. Mit Phosphorsäure (solche ist stets gemeint, welche mit Silbersalzen gelben Niederschlag giebt) erstarrt sie nach einigen Tagen zu farbloser Gallerte. Eine Lösung von arseniger Säure giebt damit nach längerer Zeit eine bedeutende Fällung. Nur bei Verdünnung von Zinnchlorid mit einer außerordentlich großen Menge Wasser bringt verdünnte Schwefelsäure einen Niederschlag hervor, welcher sich auf Zusatz von Salzsäure sogleich wieder löst.

In der salzsauren, selbst mit viel Salzsäure versetzten, Lösung von Oxyd *b* bringt verdünnte Schwefelsäure einen starken Niederschlag hervor; er besteht aus Zinnoxid und Schwefelsäure, welche letztere durch warmes Wasser vollständig ausgezogen werden kann, wo Oxyd *b* mit seinen ursprünglichen Eigenschaften zurückbleibt. Jener Niederschlag löst sich mit Salzsäure oder Salpetersäure erhitzt auf Zusatz von Wasser auf; in der Lösung entsteht nach einiger Zeit von selbst eine starke Fällung. — Die Auflösung von Oxyd *b* in möglichst wenig Salzsäure giebt mit Phosphorsäure keinen, mit Arsensäure nach 12 Stunden einen starken weißen Niederschlag.

Beide Modificationen, *a* und *b*, werden aus ihren mit Wasser gehörig verdünnten Lösungen in Säuren, namentlich Salzsäure, durch Kochen gefällt, und das Zinnoxid vollständig abgeschieden, um so schneller, je weniger freie Säure vorhanden ist. Es schlägt sich hierbei, wie auch bei der Fällung einer Zinnoxidlösung durch Ammoniak,

immer Oxyd von der Modification und den Eigenschaften nieder, wie das war, was zur Bereitung der Lösung gedient hatte. Zinnsäure
und Metazinn-
säure.

Zusatz von Weinsäure zu der salzs. Lösung des Oxyds *a* verhindert die Fällung durch Ammoniak; für Oxyd *b* ist dies nicht der Fall. — Salpeters. Silberoxyd, im Ueberschufs zu einer Lösung von Oxyd *a* oder *b* gesetzt, giebt einen Niederschlag. War in der Lösung Oxyd *a*, so löst sich dieser in überschüssigem Ammoniak vollständig auf; war in der Lösung Oxyd *b*, so löst Ammoniak nur das Chlorsilber, mit Zurücklassung von Zinnoxid.

Galläpfelaufguß giebt mit der salzs. Lösung von Oxyd *a* keinen, mit der von Oxyd *b* nach einigen Stunden einen weißlich gelben Niederschlag.

Kohlens. Kali bringt in Zinnchloridlösung (Oxyd *a*) unter Aufbrausen einen starken voluminösen Niederschlag hervor, welcher sich in einem Ueberschufs des Fällungsmittels vollständig löst. In der salzs. Auflösung von Oxyd *b* bringt kohlens. Kali auch einen Niederschlag hervor, welcher aber in einem Ueberschufs des Fällungsmittels sich nicht löst.

Beide Modificationen, *a* und *b*, sind in Lösungen von Kali- und Natronhydrat löslich; die frisch bereiteten Auflösungen enthalten jede Modification in ihrem eigenthümlichen Zustand. Die Lösung des Oxyds *b* in Kali wird durch Zusatz von mehr Kali gefällt; der Niederschlag verschwindet auf Zusatz von Wasser. Weber fand ihn, bei 100° getrocknet, zusammengesetzt: $\text{KO}, \text{Sn}, \text{O}_{14} + 3 \text{HO}$.

Zinnchloridlösung, welche vor 6 Jahren bereitet war, zeigte die Reactionen einer Lösung von Oxyd *b*; in solcher, die vor 2 Jahren bereitet war, war die Umänderung noch nicht vollständig eingetreten.

Wird die Zinnchloridlösung mit soviel Salzsäure versetzt, daß bei dem Kochen keine Fällung eintritt, und sie dann längere Zeit gekocht, so zeigt sie die Reactionen der Lösung von Oxyd *b*; ebenso Zinnchloridlösung mit Kali bis zu klarer Lösung versetzt nach längerem Stehen.

Wahrscheinlich giebt es noch andere Modificationen als *a* und *b*; als eine besondere betrachtet Rose den Zinnstein und das geglühte Zinnoxid, mit welcher die durch Glühen des Zinnoxids mit kohlen. Alkalien sich bildende identisch sein dürfte. Er ist übrigens nicht geneigt, die Verschiedenheit der Oxyde *a* und *b* von einer verschiedenen Sättigungscapacität derselben als Säuren abzuleiten.

Blei. Lefort (1) giebt an, dafs der aus Bleilösung mit kohlen. Alkali in der Hitze entstehende Niederschlag nach der Formel $3 \text{ PbO}, 2 \text{ CO}_2, \text{ HO}$ zusammengesetzt sei; nur bei Fällung in der Kälte erhalte man $\text{PbO}, \text{ CO}_2$.

Nach Kühn (2) ist der Niederschlag aus drittel-essigs. Bleioxyd durch Jodkalium nicht $\text{PbJ} + 2 \text{ PbO}$ (wie Denot angab), sondern $\text{PbJ} + \text{PbO} + \text{HO}$. Mit kochend heißer Auflösung von Jodblei gab überschüssiges Ammoniak einen weissen Niederschlag, der bei gelinder Erhitzung gelb wurde, und annähernd die Zusammensetzung $\text{PbJ} + 3 \text{ PbO} + \text{HO}$ zeigte. — Nach demselben (3) wird frisch gefälltes schwefels. Bleioxyd mit Ammoniak digerirt zu $2 \text{ PbO}, \text{ SO}_2$.

Eisen. Nach Sandrock (4) wird bei der Einwirkung von verdünnter Schwefelsäure auf Gufseisen Nichts hervorgebracht, was als organische Verbindung zu bezeichnen wäre; von flüchtigen Substanzen entwickle sich Wasserstoff, Arsenwasserstoff, Phosphorwasserstoff, Schwefelwasserstoff und schweflige Säure; aus dem graphitartigen Rückstand ziehe Kalilauge nicht einen humusartigen Körper aus, sondern hauptsächlich Eisenoxyd und Kieselerde, welches erstere durch Vermittlung der letztern in Kali löslich sei.

Davon, dafs Eisen sich unter dem Einflufs von Salzlösungen und namentlich von Urin unter Volumvergrößerung rasch oxydirt, hat sich auch Persoz (5) durch eigne Beobachtungen überzeugt.

(1) Compt. rend. XXVII, 268; ausführlicher J. pharm. [3] XV, 26. — (2) Arch. Pharm. [2] L, 281; Pharm. Centr. 1847, 593. — (3) Arch. Pharm. [2] L, 284; Pharm. Centr. 1848, 595. — (4) Arch. Pharm. [2] LIV, 1; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 456. — (5) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 506; J. pharm. [3] XV, 105.

Glasson (1) fand, dafs Spatheisenstein, bei Luftab-
Kohlens.
Eisenoxydul.
 schlufs geglüht, Kohlensäure und Kohlenoxyd annähernd in
 dem Volumverhältnifs 5 : 1 giebt, und das zurückbleibende
 Eisenoxydoxydul nach der Formel $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 4 \text{FeO}$ zu-
 sammengesetzt ist.

Das spec. Gewicht des künstlichen Eisenoxyds ist durch
 H. Rose bestimmt worden. Ueber der Spirituslampe ge-
 glüht zeigte es 5,17, im Kohlenfeuer geglüht 5,04. Im
 Porcellanofen schmolz es, hatte sich aber theilweise in
 Oxydul verwandelt. G. Rose fand für das natürliche (den
 Eisenglanz) 5,19 bis 5,23 (2). Eisenoxyd.

An eisernen Nägeln, welche sich in einem Straußen-
Phosphors.
Eisenoxydul.
 magen gefunden hatten, und theilweise in schwarze thieri-
 sche Materie eingeschlossen waren, zeigten sich nach
 mehrtägiger Einwirkung der Luft blaue Flecken, welche
 Schlofsberger (3) als auf Bildung von drittel-phosphors.
 Eisenoxydul (Vivianit) beruhend erkannte. — Vorkommen
 von krystallisirtem Vivianit in einem Röhrenknochen aus
 dem Scelett eines verunglückten Bergmanns, welches in
 einem alten Baue in Tarnowitz gefunden wurde, ist durch
 Haidinger (4) bekannt geworden.

Nach Wittstein (5) ist der Niederschlag, welcher
Schwefels.
Eisenoxyd.
 sich aus Eisenvitriollösung an der Luft absetzt, bei 100°
 getrocknet, $2 \text{Fe}_2\text{O}_3, 3 \text{SO}_3 + 8 \text{HO}$ (die früher nach
 Berzelius dafür angenommene Formel war $2 \text{Fe}_2\text{O}_3,$
 $\text{SO}_3 + 6 \text{HO}$).

Jacquelain (6) hat die Existenz von drei bisher un-
 bekannten Verbindungen von Schwefelsäure und Eisenoxyd
 angekündigt; ihre Zusammensetzung sei $\text{Fe}_2\text{O}_3, 3 \text{SO}_3$
 + 10 HO (das wäre doch eine bekannte Zusammensetzung,

(1) Ann. Ch. Pharm. LXII, 89; im Ausz. J. pr. Chem. XLIV, 119;
 Pharm. Centr. 1847, 606. — (2) Pogg. Ann. LXXIV, 440; J. pr. Chem.
 XLIV, 230; Pharm. Centr. 1848, 488; Berl. Acad. Ber., April 1848;
 Insdt. 1848, 869. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXII, 882. — (4) Ber. der
 Freunde der Naturwissensch. in Wien, IV; J. pr. Chem. XLIV, 181. —
 (5) Repert. Pharm. [B] I, 185; im Ausz. Pharm. Centr. 1849, 206. —
 (6) Compt. rend. XXIV, 441.

die des Coquimbites), Fe_2O_3 , 4 SO_3 , 12 HO, und 5 Fe_2O_3 , 32 SO_3 , 36 HO. Nähere Angaben fehlen bis jetzt.

Nickel.
Nickeloxydul.

Das spec. Gew. des krystallisirten Nickeloxyduls, welches Genth früher zu 5,745 angegeben hatte, ist von ihm später genauer zu 6,605 bestimmt worden (1).

Kohlens.
Nickeloxydul.

Nach Lefort (2) giebt eine Nickellösung mit einfach-kohlens. Alkali in der Kälte einen apfelgrünen Niederschlag, 5 NiO, 2 CO_2 + 8 HO; mit zweifach-kohlens. Alkali einen ähnlich gefärbten, 3 NiO, 2 CO_2 + 6 HO; mit einfach-kohlens. Alkali bei der Siedhitze einen grasgrünen Niederschlag, 5 NiO, CO_2 + 5 HO, in welchen sich auch die beiden vorhergehenden bei dem Kochen verwandeln.

Kupfer.

Hinsichtlich der Verbreitung des Kupfers, namentlich des Gehalts von Mineralwassern an demselben, vergl. den Bericht über Mineralwasseranalysen.

Kupferoxydul-
hydrat.

Nach Fremy (3) löst sich das gelbe Kupferoxydulhydrat, welches durch Zersetzung des in Salzsäure gelösten Kupferchlorürs mittelst kohlens. Kali oder Natron erhalten wird, in allen, selbst den schwächsten, Säuren, unter Bildung von Oxydulsalz; sobald es wasserfrei ist, was nach Fremy selbst in Wasser unter noch nicht genau ermittelten Umständen eintreten kann, verliert es diese basische Eigenschaft und wird von Säuren zersetzt. — Nach demselben (4) ist das Kupferoxydhydrat, aus der schwefels. Lösung in der Kälte durch einen großen Ueberschuss an Kali gefällt und im luftleeren Raum getrocknet, zusammengesetzt nach der Formel $\text{CuO} + 2 \text{HO}$.

Kupferoxyd-
hydrat.

Salpeters.
Kupferoxyd.

Gladstone (5) hat gefunden, dass das (bei 20°) prismatisch krystallisirte einfach-salpeters. Kupferoxyd 3 Atome Wasser, wie Graham angegeben, und nicht 4 (wie Gerhardt angab) enthält. Für das durch Erhitzen des vorigen

(1) Pogg. Ann. LXXIV, 439. — (2) Compt. rend. XXVII, 268; ausführlicher J. pharm. [3] XV, 21. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 391; J. pr. Chem. XLV, 198. — (4) An. ch. phys. [3] XXIII, 388; J. pr. Chem. XLV, 195. — (5) Chem. Soc. Mem. III, 480; J. pr. Chem. XLIV, 179; Arch. Pharm. [2] LVII, 40.

dargestellte basische Salz fand er $4 \text{ CuO}, \text{NO}_3 + 3 \text{HO}$, mit Gerhardt's Angabe übereinstimmend. Dasselbe Resultat erhielt Kühn (1) auch für das Salz, welches durch unvollkommene Fällung des neutralen Salzes mit Ammoniak in der Kälte dargestellt war.

Lefort (2) hat gemischte Vitriole untersucht, von der Zusammensetzung $\text{CuO}, \text{SO}_3 + 3 (\text{FeO}, \text{SO}_3) + 28 \text{HO}$ und $\text{CuO}, \text{SO}_3 + 3 (\text{ZnO}, \text{SO}_3) + 28 \text{HO}$. Nicklès (3) hat ihre Krystallform bestimmt, und die bekannte Thatsache constatirt, daß sie die des Eisenvitriols, aber mit sehr einfachen Combinationen, ist.

Gemischte
Vitriole.

Svanberg (4) hat mehrere Methoden vergeblich versucht, das Atomgewicht des Quecksilbers neu zu bestimmen; specieller theilte er nur die Resultate mit, welche er durch Zerlegung von Quecksilberchlorid durch Kalk in der Hitze und in einem Strom von Wasserstoff erhielt, wobei bestimmt wurde, wieviel Quecksilber aus einer gewogenen Menge Chlorid erhalten wird. Er fand das Atomgewicht des Quecksilbers auf diese Art zu 99,79, 99,86 und 99,94, und ist der Ansicht, daß diese Versuche mindestens zeigen, das Atomgewicht des Quecksilbers dürfe nicht kleiner angenommen werden (Erdmann und Marchand hatten es zu 100,07 bestimmt).

Quecksilber.

Das spec. Gewicht des reinen Quecksilbers bei 0° gegen das des Wassers bei 4° als Einheit fand H. Kopp (5) = 13,595, übereinstimmend mit Regnault (6), welcher dieses Verhältniß = 13,596 gefunden hatte.

Für eine große Anzahl von Quecksilberverbindungen hat Laurent (7) die Formeln zusammengestellt, welche

Quecksilber-
verbindun-
gen.

(1) Arch. Pharm. [2] L, 283; Pharm. Centr. 1847, 594. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 95; Compt. rend. XXVI, 185; J. pharm. [3] XIV, 15; J. pr. Chem. XLV, 106; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 253. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 104; J. pr. Chem. XLV, 113. — (4) Aus den Abhandl. der Stockholmer Acad. für 1845 im J. pr. Chem. XLV, 468; im Ausz. Chem. Gaz. 1849, 135. — (5) Pogg. Ann. LXXII, 18. — (6) Ann. ch. phys. [3] XIV, 236; Relation etc. (vgl. S. 70), 158; Pogg. Ann. LXXIV, 210. — (7) Compt. rend. XXIV, 222.

Quecksilber-
verbindun-
gen.

nach seiner Betrachtungsweise jenen zukommen. Wir können die Zusammenstellung hier nicht vollständig wiedergeben, und begnügen uns mit der Angabe des Princip, auf welchem sie beruht. Die Quecksilberverbindungen werden betrachtet als bekanntere einfachere Verbindungen, Kalium- oder Ammoniumverbindungen z. B., in welchen bestimmte Atome durch Quecksilber ersetzt sind. Das Quecksilber könne mit zwei verschiedenen Atomgewichten, gleichsam wie zwei verschiedene Metalle, in Verbindungen eingehen; mit dem Atomgewicht 100 als *Mercuricum*, mit dem Atomgewicht 200 als *Mercuriosum*. Eine einfachere Ammoniumverbindung könne den Typus vieler Quecksilberverbindungen repräsentiren, wenn man sich in dem Ammonium 1 (manchmal auch $1\frac{1}{2}$), 2, 3 oder 4 At. Wasserstoff durch ebensoviel Quecksilber als *Mercuricum* oder *Mercuriosum*, und den Stickstoff durch Phosphor oder Arsenik ersetzt denke. 1 At. Quecksilber könne aber auch 1 At. Ammonium ersetzen. (Sollte nicht auch hiernach Ammonium den Wasserstoff im Ammonium ersetzen, und sonach das Ganze dem Theil gewissermaßen im chemischen Sinn gleich sein können?)

Verhalten von
Zink gegen
Quecksilber-
lösungen.

H. Rose (2) hat Untersuchungen angestellt über das Verhalten des metallischen Zinks gegen Quecksilberauflösungen. Zink fällt das Quecksilber vollständig aus der schwefels. und salpeters. Lösung des Quecksilberoxyds, nachdem durch Schwefelsäure oder Salpetersäure die Fällung basischer Salze verhindert worden ist; das Zink verbindet sich dabei nicht mit dem Quecksilber. Ebenso verhält sich Zink gegen eine Auflösung von Quecksilberchlorid. Ist aber letztere mit Salzsäure versetzt, so amalgamirt sich das Zink schnell, und das Quecksilber wird erst nach längerer Zeit vollständig gefällt, und dann mit Zink verbunden. Die Einwirkung von Salzsäure auf Zink wird sogleich unterbrochen, und das Zink amalgamirt, wenn man Quecksilberchlorid-

(1) Pogg. Ann. LXX, 311; im Ausz. Berl. Acad. Ber., Januar 1847; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 273; J. pr. Chem. XL, 308; Pharm. Centr. 1847, 841; Phil. Mag. [3] XXX, 290.

lösung zusetzt. Ähnlich wie der Zusatz von Salzsäure zu Quecksilberchloridlösung wirkt auch der von verdünnter Schwefel- oder Salpetersäure. — Quecksilberchlorür, selbst frisch gefälltes, und schwefels. Quecksilberoxydul werden durch Zink bei Gegenwart von Wasser nicht zerlegt, während dieses Metall aus einer Lösung von salpeters. Quecksilberoxydul das Quecksilber vollständig abscheidet.

Gerhardt (1) hat die salpeters. Verbindungen des Quecksilbers untersucht. Untersalpetersaure Dämpfe bilden nach ihm mit Quecksilber salpeters. Quecksilberoxydul, unter Entwicklung von Stickoxyd. Wird dieses Salz mit wenig Wasser angerührt und zum Kochen erhitzt, so bilden sich bei dem Erkalten kleine, sehr glänzende, schiefe rhombische Prismen von $2 \text{ Hg}_2\text{O}, \text{NO}_3 + \text{HO}$. Für das krystallisirte einfach-salpeters. Quecksilberoxydul fand er die Formel $\text{Hg}_2\text{O}, \text{NO}_3 + 2 \text{ HO}$ bestätigt; mit wenig Wasser erhitzt oder in Salpetersäure gelöst und anhaltend, unter Ersetzung der verdampfenden Säure durch Wasser, gekocht giebt es das eben erwähnte basische Salz, $2 \text{ Hg}_2\text{O}, \text{NO}_3 + \text{HO}$; mit vielem Wasser gekocht ein gelbes und unlösliches Salz, wahrscheinlich $3 \text{ Hg}_2\text{O}, \text{NO}_3$. Das krystallisirte einfach-salpeters. Oxydulsalz giebt bei dem Erhitzen ein gelbes Salz, welches basisch salpeters. Quecksilberoxyduloxyd und identisch mit dem von Brooks beschriebenen, $\text{Hg}_2\text{O}, 2 \text{ HgO}, \text{NO}_3$, ist. — Das von Kane angenommene Salz $6 \text{ HgO}, \text{NO}_3$ existirt nicht.

Nach Mohr (2) vereinigen sich gleiche Aequivalentgewichte Jod und Quecksilber bei dem Zusammenreiben unter Befeuchtung mit Weingeist nicht vollständig zu rothem Quecksilberjodid, sondern die entstehende Masse enthält freies Jod, welches bei dem Trocknen im Wasserbade entweicht, und Quecksilberjodür, welches sich bei der Sublimation in Quecksilberjodid und metallisches Quecksilber umsetzt.

(1) Compt. rend. XXVI, 432; J. pharm. [3] XIII, 465; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 393. — (2) Arch. Pharm. [2] LV, 29; Pharm. Centr. 1848, 719.

Zersetzungen
des
Quecksilber-
chlorürs.

Nach A. Vogel dem jüngern (1) wird Quecksilberchlorür bei Erwärmen mit Wasser und mit kohlens. Kalk (ebenso wie mit kohlens. Magnesia) zu Quecksilberoxydul (und Oxyd?) und metallischem Quecksilber zerlegt, unter Entwicklung von Kohlensäure und Bildung von Chlorcalcium. Kohlens. Baryt und Strontian wirken ebenso, aber schwächer. — Bei dem Kochen von Quecksilberchlorür mit gepulvertem Gyps bildete sich etwas Chlorcalcium und schwefels. Quecksilberoxyd; Kochen mit Glaubersalz wirkte ähnlich.

Verhalten des
Chlorqueck-
silbers-Amid-
quecksilbers.

Kosmann (2) hat die Einwirkung mehrerer Säuren und sauren Salze auf das Chlorquecksilber-Amidquecksilber (unschmelzbaren weissen Präcipitat, $\text{HgCl} + \text{HgNH}_2$) untersucht. Wasser, mit Schwefelsäure hinreichend angesäuert, um den Präcipitat auflösen zu können, und damit gekocht, gebe bei dem Abdampfen weisse blättrige Krystalle von der Zusammensetzung $2(\text{HgO}, \text{SO}_3) + \text{NH}_4\text{Cl} + \text{HgCl}$; in der Mutterlauge sei schwefels. Ammoniak und schwefels. Quecksilberoxyd. Den Krystallen entziehe Aether den Gehalt an HgCl ; Wasser färbe sie gelb unter Bildung eines basischen schwefels. Salzes. — Mit Salpetersäure stark angesäuertes Wasser wirke in der Kälte nur wenig auf den Präcipitat, in der Wärme löse es ihn auf; die Flüssigkeit gebe bei dem Abdampfen zuerst reichlich weisse blättrige silberglänzende Krystalle $4\text{HgCl} + \text{NH}_4\text{O}, \text{NO}_3$, welchen Aether viel Quecksilberchlorid entziehe, und welche sich in Wasser nicht lösen. Bei weiterem Abdampfen der Mutterlauge krystallisiren kleine metallglänzende schiefe Prismen, welche ein Gemenge von wenig Quecksilberchlorid mit vielem salpeters. Quecksilberoxyd-Ammoniak seien. — Gleiche Theile Präcipitat, Chlornatrium und Salzsäure geben mit der 15fachen Menge Wasser erwärmt eine Lösung, aus welcher bei dem Abdampfen zuerst Chlornatrium krystallisire, sodann metallglänzende vierseitige, in Wasser lösliche, Blättchen, $2\text{HgCl} + \text{NH}_4\text{Cl} + 4\text{NaCl}$. — Präcipitat mit der doppelten

(1) Repert. Pharm. [3] I, 34. — (2) J. pharm. [3] XIV, 321 J. pr. Chem. XLVI, 81.

Menge zweifach-oxals. Kalis und hinreichend Wasser gekocht, lasse einen unlöslichen Rückstand von oxals. Quecksilberoxydul, und Kohlensäure entwickele sich; aus der Lösung falle bei der directen Einwirkung der Sonnenstrahlen sogleich Quecksilberchlorür nieder. — Präcipitat mit der dreifachen Menge sauren weins. Kalis und hinreichend Wasser gekocht, entwickele Kohlensäure; aus der Lösung krystallisiren beim Abdampfen nach einander verschieden aussehende Salze von nicht genügend ermittelter Zusammensetzung. — Auch bei dem Kochen des Präcipitats mit Essigsäure entwickele sich Kohlensäure, und Quecksilberchlorür scheide sich ab; die Auflösung gebe bei dem Abdampfen gelbe krystallinische Krusten, welche sich am Licht leicht schwärzen und 72,9 pC. Quecksilber und 13,0 Chlor enthalten (sie seien ein *acétate sexbasique de chlorure amido-mercurique* + 12 HO). — Präcipitat mit schwefels. Chinin und sehr verdünnter Schwefelsäure gebe eine Lösung, welche undeutliche Krystalle liefere, die nach dem Umkrystallisiren aus Alkohol aus 12 SO₃ + 6 Chinin + 2 SO₃ + HgO, NH₄O + ClHg bestehen sollen.

Zur Ausscheidung des Silbers im metallischen Zustand aus seinen (blei- oder kupferhaltigen) Lösungen empfahl L. Kessler (1) die Anwendung des essigs. Eisenoxyduls; es bewirkt dieses eine vollständige Fällung des Silbers, was das schwefels. Eisenoxydul nicht thut. Die Auflösung muß möglichst frei von überschüssiger Säure und stark mit Wasser verdünnt sein. — Nach Mohr (2) bildet sich hierbei, wenn reine Silberlösung in der Kälte gefällt wird, zuerst blendend weißes essigs. Silberoxyd, in welchem bald schwarze Punkte entstehen, von denen aus rasch der Uebergang in metallisches Silber sich verbreitet; aus Lösung, welche Kupfer und freie Salpetersäure enthält, scheidet sich sogleich metallisches Silber ab. Mohr giebt indeß der Fällung durch

(1) J. pharm. [3] XI, 86; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 418. —
(2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 65; Arch. Pharm. [2] LIV, 15; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 478.

Silber. Salzsäure und Reduction des Chlorsilbers mittelst Zink den Vorzug vor allen andern Methoden, Chlorsilber zu reduciren. In Beziehung auf Gregory's Methode, Chlorsilber durch Kochen mit starker Kalilauge in Silberoxyd zu verwandeln, fand er, daß dabei leicht ein Theil des Chlorsilbers durch Zusammenballen der Zersetzung entgeht, und daß man noch am sichersten verfährt, wenn man das mit wenig Wasser aufgeschlammte Chlorsilber zu der bereits kochenden Kalilauge setzt. In Beziehung auf die Levot'sche Methode, Chlorsilber mit Kalilauge und Zucker zu kochen, fand er, daß die Zersetzung hier vollständig vor sich geht, und das reducirte Silber sich zu dichten Massen zusammenballt, von denen sich die Flüssigkeit leicht abgießen läßt.

Nach Malaguti und Durocher (1) haben mehrere Schwefel- und Arsenmetalle das Vermögen, Chlorsilber und Bromsilber (gelöstes schneller, langsamer bei bloßer Berührung unter Wasser) zu zersetzen. Sie geben an, es zersetzen :

100 ZnS 3 AgCl; 100 BiS₂ 2 AgCl; 100 SnS $\frac{1}{2}$ AgCl; 100 Cu₂S 360 AgCl;
 100 CdS 14 „ „ 100 PbS 5 „ „ 100 SnS₂ 30 „ „ 100 SbAs₂ ? 120 „ „

100 Arsenkobalt endlich 166 Chlorsilber. Dieselben Verbindungen, als Mineralien aber von verschiedenen Fundorten, zeigten manchmal ein sehr verschiedenes Zersetzungsvermögen. Bromsilber werde durch diese Verbindungen etwas, Jodsilber nicht merklich zersetzt.

Chlorsilber. Pierre (2) hat die Löslichkeit des Chlorsilbers in Salzsäure genauer bestimmt. Nach ihm braucht 1 Theil Chlorsilber höchstens 200 concentrirter, höchstens 600 mit dem doppelten Gewicht Wasser verdünnter Salzsäure zur Lösung.

Gold. Nach C. T. Jackson (3) erhält man Gold in der Gestalt eines gelben weichen Schwammes, wenn man zu con-

(1) Compt. rend. XXV, 160; Arch. Pharm. [2] LIII, 312; Pharm. Centr. 1848, 364. — (2) Aus Recueil des travaux de la société d'émulation etc. (vergl. S. 436), Avril 1847, 107, im J. pharm. [3] XII, 237. — (3) Sill. Am. J. [2] VI, 187; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 925.

centrirter Goldlösung wenig Oxalsäure, sodann hinlänglich koh lens. Kali um fast alles Gold als Goldoxydkali gelöst zu halten, sodann viel krystallisirte Oxalsäure setzt, und rasch zum Kochen erhitzt.

Als die beste Art, Goldoxyd darzustellen, empfiehlt Goldoxyd. Figuier (1), Goldchlorid, welches durch wiederholtes Abdampfen von Goldsolution und Wiederauflösen möglichst von überschüssiger Säure befreit ist, in Wasser zu lösen, Kali zuzusetzen bis die Flüssigkeit stark alkalisch reagirt, Chlorbaryumlösung zuzusetzen, bis der anfänglich gelbe Niederschlag anfängt weißlich zu werden, den ausgewaschenen Niederschlag von Goldoxyd-Baryt mit verdünnter Salpetersäure zu zersetzen (es ist nöthig, einige Minuten zu kochen), und das gewaschene Goldoxyd bei Lichtabschlufs trocknen zu lassen.

Yorke (2) hat die Verbindungen von Schwefelgold Schwefelgold mit Schwefelnatrium und Schwefelkalium. mit Schwefelnatrium und Schwefelkalium untersucht. In Beziehung auf die Bildung solcher Verbindungen durch Erhitzen von Gold mit Alkali und Schwefel fand er, dafs eine helle Rothglühhitze dazu nothwendig ist; dafs, wenn gleiche Aequivalente Gold und Alkali mit drei oder vier Aequivalenten Schwefel erhitzt werden, etwa die Hälfte des Goldes in eine in Wasser lösliche Verbindung übergeht; dafs, um Gold vollständig in eine solche Verbindung zu bringen, am besten auf 1 Aequivalent Gold 2 Aequivalente Alkali und 8 Aequivalente Schwefel genommen werden. — Bei Anwendung von Natron wurde ein Product erhalten, welches mit Wasser eine gelbe Lösung gab; diese, bei Abschlufs von Sauerstoff filtrirt und im luftleeren Raum über Schwefelsäure concentrirt, gab gelbliche Krystalle, welche durch Umkrystallisiren farblos erhalten wurden. Diese Krystalle gehören dem monoklinometrischen System an; sie bilden sechsseitige Säulen, welche an den Enden durch

(1) J. pharm. [3] XII, 401; J. pr. Chem. XLIV, 187; im Auss. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 295; Pharm. Centr. 1848, 44. — (2) Chem. Soc. Qu. J. I, 286.

Schwefelgold
mit Schwefel-
natrium
und Schwefel-
kalium.

4 oder 3 Flächen begrenzt sind. An der Luft färben sie sich schnell braun; bei Erhitzung entweicht Wasser und dann Schwefel. Ihre Zusammensetzung ist AuS , $\text{NaS} + 8 \text{HO}$. Die Krystalle sind löslich in Wasser (auch in Weingeist); Säuren bringen in der Lösung einen gelbbraunen Niederschlag hervor, unter Entwicklung von wenig Schwefelwasserstoff; die Zusammensetzung des Niederschlags war wechselnd, zwischen 1 und 2 Aequiv. Schwefel auf 1 Aequiv. Gold. An der Luft wird die Lösung langsam zersetzt und braun gefärbt. Dieselben Krystalle erhielt Yorke bei der Auflösung von Schwefelgold (welches er durch Fällen von Goldchloridlösung durch Schwefelwasserstoff dargestellt und dessen Zusammensetzung nahe zu AuS_2 gefunden hatte) in Einfach-Schwefelnatrium und Krystallisiren lassen. — Schwefelwasserstoff-Schwefelnatrium mit Schwefelgold digerirt löst bei gewöhnlicher Temperatur nur sehr wenig davon auf; bei dem Erhitzen tritt Reduction des Schwefelgoldes ein. — Einfach-Schwefelkalium giebt mit Einfach-Schwefelgold gleichfalls eine Verbindung, welche indeß nur schwierig krystallisirt und zerfließlich ist. Ihre Auflösung verhält sich wie die der entsprechenden Natriumverbindung.

Goldhaltiges
Glas.

Als die wahrscheinlichste Erklärung dafür, daß farbloses goldhaltiges Glas bei dem Anwärmen die rubinrothe Farbe annimmt, betrachtet H. Rose (1) die Annahme, es sei in dem farblosen Glase ein Silikat des Goldoxyduls enthalten, welches eine hohe Temperatur zu seiner Bildung erfordere und ohne Zersetzung ertrage; auf eine niedrigere Temperatur erwärmt, scheide sich ein Theil des Goldoxyduls aus und bewirke die Färbung; bei stärkerer Erhitzung werde das ausgeschiedene Goldoxydul reducirt und dadurch das Glas leberbraun und undurchsichtig. Ganz analog verhalte sich das mit Kupferoxydul gefärbte Glas.

(1) Berl. Acad. Ber., October 1847; Pogg. Ann. LXXII, 556; J. pr. Chem. XLIII, 75; Instit. 1848, 138; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 288; Pharm. Centr. 1847, 921.

Dafs das Platin viel allgemeiner verbreitet sei, als bisher geglaubt wurde, hat Pettenkofer(1) nachgewiesen; alles Silber, welches nicht direct aus einer Scheidung stamme, habe einen geringen Platingehalt. Platin.

J. Hefs (2) empfiehlt die Platinerze in der Art zu behandeln, dafs man sie mit dem 2- bis 3fachen Gewicht an Zink zusammenschmilzt, die entstehende homogene spröde Masse pulvert und siebt, mit verdünnter Schwefelsäure das Zink und den grössten Theil des Eisens auszieht, sodann mit Salpetersäure behandelt, welche Eisen, Kupfer, Blei und zuweilen Palladium aufnimmt, endlich mit Königswasser behandelt, welches den Rückstand seiner sehr feinen Zertheilung wegen leicht löst, und nun wie gewöhnlich weiter verfährt.

Nach Hittorf(3) bildet Platin, als negativer Pol einer galvanischen Kette in geschmolzenes salpeters. Kali tauchend, ein blaues Oxyd; eine blaue Flüssigkeit fliefse fortwährend von dem Platin ab, gehe aber, so wie sie das Metall verlasse, in gelbes und grünes Oxyd über, welche gemengt in dem salpeters. Kali suspendirt bleiben; wenn dieses erkaltet sei und Feuchtigkeit angezogen habe, gehe das grüne Oxyd in das gelbe über. In salpeters. Natron sei die Oxydation schwächer und die blaue Farbe heller und schöner; das blaue Oxyd gehe hier nur in gelbbraunes über. Blaues
Platinoxyd.

Kaliumplatinchlorid mit einer Lösung von schwefligs. Kali erhitzt giebt nach Claus (4) eine farblos werdende Lösung, aus welcher bei dem Abdampfen sich $3(\text{KO}, \text{SO}_2) + \text{PtO}$, $2 \text{SO}_2 + 2\frac{1}{2} \text{HO}$ als weifser Niederschlag absetzt. Salzsäure verwandelt ihn wieder in Kaliumplatinchlorid. Zweifach-
schwefligsau-
res Platin-
oxydul mit
schwefligsau-
rem Kali.

(1) Pogg. Ann. LXXIV, 316; Repert. Pharm. [2] XLVII, 72. —

(2) Petersb. Acad. Bull. VI, 80; J. pr. Chem. XL, 498; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 267. — (3) Pogg. Ann. LXXII, 481; im Auss. J. pr. Chem.

XLII, 469; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 248; Pharm. Centr. 1848, 28. —

(4) Petersb. Acad. Bull. VI, 287; Ann. Ch. Pharm. LXIII, 857; J. pr. Chem. XLII, 368; Pharm. Centr. 1847, 869; J. pharm. [8] XIV, 894.

Salze von
Platinbasen
und deren
Verhalten.

Peyrone hatte in früheren Abhandlungen (1) auf mehrere Verbindungen aufmerksam gemacht, welche mit dem grünen Magnus'schen Salz gleiche Zusammensetzung (PtClNH_3) haben, sich aber durch abweichende Eigenschaften auszeichnen. Er hat später (2) untersucht, wie sich diese isomeren Substanzen gegen schwefligs. Ammoniak verschieden verhalten; es sind nur die Resultate, nicht die analytischen Belege dieser Untersuchung bekannt geworden. — Das grüne Magnus'sche Salz, mit gleichviel schwefligs. Ammoniak zum Sieden erhitzt, gebe ein weißes, in Alkohol und kaltem Wasser gar nicht, in kochendem Wasser kaum lösliches Pulver $\text{PtN}_2\text{H}_7\text{O}_3, 2 \text{SO}_2 + 2 (\text{PtNH}_3\text{O}, \text{SO}_2)$. Bei überschüssigem schwefligs. Ammoniak und längerem Kochen entstehe eine Lösung, aus welcher Alkohol ölarartige Tropfen fälle, die sich zu einer klebrigen, nach längerer Berührung mit Alkohol festwerdenden Masse von veränderlicher Zusammensetzung sammeln; aus dem zur Fällung angewandten Alkohol setzen sich bei ruhigem Stehen kleine weiße Flocken eines Körpers $\text{PtN}_2\text{H}_7\text{O}_3, 2 \text{SO}_2 + \text{NH}_4\text{O}, \text{SO}_2$ ab. — Die in orangegelben Octaëdern krystallisirende isomere Modification werde durch schwefligs. Ammoniak leichter angegriffen, und bilde damit zwei weiße Körper; einen weißen pulverförmigen und in Wasser unlöslichen von der Zusammensetzung, welche für den ersten der aus dem Magnus'schen Salz sich bildenden angegeben wurde; und einen in jedem Verhältniß in Wasser löslichen, durch Alkohol in Form von ölarartigen Tröpfchen fällbaren und dann fest werdenden, von der Zusammensetzung $\text{PtN}_2\text{H}_7\text{O}_3, 2 \text{SO}_2 + 2 (\text{NH}_4\text{O}, \text{SO}_2)$. — Die direct dargestellte gelbe Modification (in Menge dadurch zu erhalten, daß man bei 13° Kalilauge in kleinen Portionen zu einer Lösung von mit kohle. Ammoniak neutralisirtem Platinchlorür gieße) brauche 33 siedendes Wasser zur Lösung; ein Ueberschuß davon mit schwefligs. Ammoniak gehörig gekocht gebe

(1) Ann. Ch. Pharm. LI, 1; LV, 205. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXI, 178; im Auss. Pharm. Centr. 1847, 411.

kleine weiße fettglänzende Nadeln eines Körpers $\text{PtN}_2\text{H}_7\text{O}_2$, $2\text{SO}_2 + 2(\text{NH}_4\text{O}, \text{SO}_2) + \text{PtNH}_3\text{Cl} + \text{HO}$. — Die durch Reduction dargestellte gelbe Modification brauche 140 Theile siedenden Wassers zur Lösung; ein Ueberschufs davon gebe mit schwefligs. Ammoniak hinreichend gekocht einen in dünnen durchsichtigen rhombischen Tafeln krystallisirenden Körper $\text{PtN}_2\text{H}_7\text{O}_2, 2\text{SO}_2 + \text{PtNH}_3\text{Cl} + 2\text{HO}$; mit einem Ueberschufs von schwefligs. Ammoniak hingegen das Böckmann'sche Salz $\text{PtN}_2\text{H}_7\text{O}_2, 2\text{SO}_2$. — Die Chlorverbindungen, welche man durch Behandlung dieser isomeren Körper mit Ammoniak erhalte, geben unter dem Einfluß von schwefligs. Ammoniak in der Kälte einen in prismatischen vierseitigen Nadeln krystallisirenden Körper, der durchsichtig, in kaltem Wasser kaum löslich und in dem 190fachen Gewicht kochenden Wassers löslich sei; er habe bei gewöhnlicher Temperatur die Formel $\text{PtNH}_3\text{O}, \text{SO}_2 + \text{PtN}_2\text{H}_6\text{O}, \text{SO}_2 + 2\text{HO}$. Dieselben Chlorüre verwandeln sich bei dem Kochen unter Verlust von Ammoniak in das Böckmann'sche Salz.

Salze von
Platinbasen
und deren
Verhalten.

Raewsky (1) hat mehrere Verbindungen untersucht, welche sich von dem grünen Magnus'schen Salze PtClNH_3 ableiten. Letzteres erhielt er durch Zusatz von Ammoniak zu der salzs. Lösung von Platinchlorür, je nach der Temperatur und der Concentration der Flüssigkeiten, von verschiedener Farbe, aber immer von derselben Zusammensetzung. — Gros hatte angegeben, Salpetersäure verwandle dieses Salz in der Hitze in metallisches Platin und ein weißes krystallinisches Salz $\text{PtN}_2\text{H}_6\text{ClO}, \text{NO}_2$. Raewsky hingegen fand, daß die Abscheidung von Platin etwas zufälliges sei (auf der Anwendung von zu stark erhitztem und theilweise zersetztem Magnus'schen Salze beruhe), und daß das Gros'sche Salz sich nur bei Einwirkung von

(1) Vollständig Ann. ch. phys. [3] XXII, 278; theilweise im Ausz. Compt. rend. XXIII, 353; XXIV, 1151; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 309; LXVIII, 816; Pharm. Centr. 1847, 686; 1848, 109. Gerhard's Bemerkungen dazu J. pharm. [3] XIV, 315.

Salze von
Platinbasen
und deren
Verhalten.

wenig Salpetersäure bilde. Bei der Einwirkung überschüssiger Salpetersäure färbt sich das Magnus'sche Salz sogleich braun, und röthliche Dämpfe entwickeln sich. Wird bis zum Aufhören der letztern und zur gänzlichen Umwandlung des Magnus'schen Salzes erhitzt, so setzt sich aus der Flüssigkeit bei dem Erkalten ein weißes körniges Salz ab, welches wiederholt in heißem Wasser aufgelöst und im luftleeren Raum krystallisirt, bei 120° getrocknet, die Zusammensetzung $\text{Pt}_2\text{N}_4\text{H}_{12}\text{ClO}_3$, 2NO_3 besitze. Bei Mischen einer Auflösung dieses Salzes mit dreibasisch-phosphors. Natron scheide sich (bei Anwendung heißer concentrirter Lösungen sogleich, bei Anwendung kalter verdünnter nach längerer Zeit) nadel- und büschelförmig krystallinisch ein weißes, in kaltem Wasser gar nicht und in heißem wenig lösliches, Salz aus, bei 100° getrocknet von der Zusammensetzung $\text{Pt}_2\text{N}_4\text{H}_{12}\text{ClO}_3$, HO , PO_3 ; das Wasser entweiche bei 120 bis 150°. Durch Zersetzung des salpeters. Salzes mit einfach-oxals. Ammoniak scheide sich ein weißes krystallinisch-körniges, selbst in heißem Wasser schwer lösliches Pulver ab, bei 120° getrocknet $\text{Pt}_2\text{N}_4\text{H}_{12}\text{ClO}_3$, $2\text{C}_2\text{O}_3$. Durch Zersetzung des salpeters. Salzes mit einfach-kohlens. Ammoniak scheide sich, je nach der Concentration der Lösungen sogleich oder später, ein weißer Niederschlag aus, bei 120° getrocknet $\text{Pt}_2\text{N}_4\text{H}_{12}\text{ClO}_3$, 2CO_2 . — Salzsäure bewirke in der Lösung des salpeters. Salzes einen weißen, körnigen, in Wasser löslichen Niederschlag, welcher nach seiner Zusammensetzung sich nicht den vorhergehenden Salzen, wohl aber dem folgenden anschliesse; bei 120° getrocknet sei dieser Niederschlag $\text{PtN}_2\text{H}_4\text{ClO}$, Cl oder $\text{Pt}_2\text{N}_4\text{H}_{12}\text{Cl}_2\text{O}_2$, Cl_2 .

In der Mutterlauge von der Bereitung des eben besprochenen salpeters. Salzes sei noch ein Salz enthalten, welches nur aus sehr concentrirten Lösungen krystallisire. Nach öfterem Umkrystallisiren im luftleeren Raum bilde es durchsichtige, glänzende, kleine Nadeln, von der Zusammensetzung $\text{Pt}_2\text{N}_4\text{H}_{12}\text{Cl}_2\text{O}_4$, 2NO_3 (oder $\text{PtN}_2\text{H}_4\text{ClO}_2$,

NO_3); Aetzkali zeige in der Kälte keine Einwirkung, in der Hitze verursache es gelbe Färbung und die Bildung eines Niederschlags, welcher sich bei dem Kochen unter Ammoniakentwicklung wieder löse. Silbersolution gebe mit dem Salz keinen Niederschlag.

Salze von
Platinbasen
und deren
Verhalten.

Allmäliger Zusatz von Brom zu einer ziemlich concentrirten und kochenden Lösung der Verbindung PtClN_3H_6 (möge diese nun die nach Reiset's Methode sich bildende gelbe oder die nach Peyrone's Methode sich bildende farblose Verbindung sein) bringe sogleich einen krystallinischen Niederschlag hervor; nach Zusatz von überschüssigem Brom und Verjagen des Ueberschusses durch Kochen bilden sich Krystalle aus, von der Zusammensetzung $\text{PtClBrN}_3\text{H}_6$; es finde also hierbei keine Substitution statt. Die entstehende Verbindung sei orangegelb und in kaltem Wasser fast unlöslich; Silbersolution bilde damit einen Niederschlag von Chlor- und Bromsilber.

Die Einwirkung von Chlor auf eine verdünnte kalte Lösung von PtClN_3H_6 veranlasse die Bildung einer gelblichen Verbindung, welche bei 120° getrocknet die Zusammensetzung $\text{PtCl}_2\text{N}_3\text{H}_6$, HO habe. Mit einer concentrirteren heißen Lösung von PtClN_3H_6 gebe Chlor das gelbe, in Wasser fast unlösliche, Chlorsalz aus der Reihe der Gros'schen Salze: PtClN_3H_6 , Cl.

Aus einer Abhandlung N. W. Fischer's (1) über das Palladium heben wir hervor, dafs nach ihm die rothe Modification des Palladiumchlorür-Ammoniaks PdCl_2NH_3 durch Lösen in Ammoniak und Fällern mit Salzsäure in die gelbe, die letztere hingegen durch Lösen in kochender Salzsäure und Fällern mit Ammoniak in die gelbe übergeführt wird.

Palladium.
Palladium-
chlorür-
Ammoniak.

Kaliumrutheniumsesequichlorür löst sich nach Claus (2) bei gewöhnlicher Temperatur fast gar nicht in wässriger

Ruthenium.
Schwefligsau-
res Ruthen-
oxydul-Kali.

(1) Pogg. Ann. LXXI, 431; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 260; Pharm. Centr. 1847, 554. — (2) Petersb. Acad. Bull. VI, 288; Ann. Ch. Pharm. LXIII, 359; J. pr. Chem. XLII, 364; Pharm. Centr. 1847, 869; J. pharm. [8] XIV, 894.

Schwefligsauer-
res Ruthen-
oxydul-Kali.

schwefliger Säure, sondern färbt sich nur oberflächlich isabellgelb. Eine Lösung davon mit schweflgs. Kali erhitzt nimmt eine rothe Farbe an, und aus der Flüssigkeit scheidet sich ein isabellgelber Niederschlag ab. Bei dem Abdampfen zur Trockne, Wiederauflösen und Wiederabdampfen schlägt sich noch etwas davon nieder; die Flüssigkeit bleibt immer stark orange gefärbt. Bei wiederholtem Abdampfen und Wiederauflösen bleibt zuletzt ein fast weißer Niederschlag, welcher aus Mangel an Material nicht untersucht werden konnte. Die isabellgelbe Verbindung ist KO , SO_2 + RuO , SO_2 .

Iridium-
Iridiumsilber-
chlorid.

Nach Claus (1) giebt salpeters. Silberoxyd mit Kaliumiridiumchlorid einen tief indigoblauen flockigen Niederschlag, welcher jedoch schon nach einigen Secunden blasser wird und sich dann gänzlich entfärbt; die Flüssigkeit über dem Niederschlage ist farblos und enthält kein Iridium. Der Niederschlag hat die Zusammensetzung $3 \text{ Ag Cl} + \text{Ir}_2 \text{ Cl}_3$; er löst sich nicht in Wasser noch Säuren. Mit starkem Aetzammoniak einige Tage übergossen, löst sich ein Theil davon auf, ein anderer nimmt krystallinische Form (mikroskopischer diamantglänzender Rhomboëder) an. — Bei Anwendung einer siedendheissen Lösung von Kaliumiridiumchlorid bildet sich sogleich, ohne die blaue Färbung, diese Doppelverbindung.

Einwirkung
von schwedl-
ger Säure und
schwefligsauer-
em Kali auf
Kalium-Iri-
diumchlorid.

Claus giebt weiter an, dafs, wenn man fein geriebenes Kaliumiridiumchlorid mit der 8fachen Menge Wasser übergiefst und so lange schweflige Säure zuleitet bis Alles mit olivengrüner Farbe gelöst ist, das Chlorid unter Bildung von Schwefel- und Salzsäure in Sesquichlorür umgewandelt wird; Beimengungen von Platin, Palladium, Osmium, Rhodium und Ruthenium bleiben hierbei ungelöst zurück. Auf Zusatz einer möglichst concentrirten Lösung von kohlens. Kali bis zur Neutralisation der freien Säuren entsteht sogleich ein hell olivengrüner Niederschlag von kleinen diamantglänzen-

(1) Peterab. Acad. Bull. VI, 278; Ann. Ch. Pharm. LXIII, 337; J. pr. Chem. XLII, 348; Pharm. Centr. 1847, 849; J. pharm. [3] XIV, 385.

den Prismen, $3 \text{KCl} + \text{Ir}_2 \text{Cl}_6 + 6 \text{HO}$. Dieses Salz kann auch (aber weniger zweckmäfsig) erhalten werden, wenn man Kaliumiridiumchlorid für sich oder mit $\frac{1}{2}$ seines Gewichts an kohlen. Kali gemengt schwach glüht, und mit Wasser auszieht. — Das krystallisirte Salz verwittert leicht in warmer trockener Luft; es ist unlöslich in Weingeist, leicht löslich in Wasser; es wird durch Alkalien nur schwierig zersetzt. Salpeters. Silberoxyd fällt aus der wässerigen Lösung sogleich $3 \text{AgCl} + \text{Ir}_2 \text{Cl}_6$. — Die Lösung des durch schweflige Säure reducirten Kaliumiridiumchlorids, aus welcher durch kohlen. Kali der grösste Theil des oben beschriebenen Salzes ausgefällt ist, behält bei gewöhnlicher Temperatur ihre olivengrüne Farbe; einige Zeit erhitzt wird sie roth und dann hellgelb. Es bilden sich dabei verschiedene Verbindungen, welche gemengt bei dem Abdampfen oder dem Mischen der concentrirten Lösung mit Wasser sich abscheiden, und schwer rein zu erhalten sind. Unter diesen konnten isolirt werden ein rosenrothes krystallinisches Salz; eine bernsteingelbe Substanz von Terpenthinconsistenz und eine pulverförmige weifse Verbindung; alle drei enthalten Kali, schweflige Säure, Chlor und Iridiumoxydul, alle sind schwerlöslich in Wasser, geben bei starkem Erhitzen schweflige Säure, lösen sich ziemlich leicht in Salzsäure unter Verlust von schwefliger Säure und gehen dann in leichtlösliche krystallinische Salze über. — Das rothe Salz wird erhalten, wenn man 1 Theil $3 \text{KCl} + \text{Ir}_2 \text{Cl}_6 + 6 \text{HO}$ in 12 Wasser löst, die Flüssigkeit mit der Lösung von $\frac{1}{2}$ kohlen. Kali mischt, welche zuvor vollkommen mit schwefliger Säure gesättigt war, und in einer Porcellanschale erhitzt bis die olivengrüne Farbe in roth übergegangen ist; nach einigen Tagen sind kleine fleisch- oder mennigrothe sechsseitige Prismen herauskrystallisirt, welche bei Auflösen in heifsem Wasser theilweise zersetzt werden, in Kalilauge sich leichter als in Wasser mit hellgelber Farbe lösen, die durch Erhitzen dunkelgrün, durch Salpetersäure wieder gelb (unter Bildung von wenig weifsem Niederschlag)

Einwirkung
von schwefli-
ger Säure und
schwefligsau-
rem Kali auf
Kalium-Iri-
diumchlorid.

Einwirkung
von schwefl.
ger Säure und
schwefligsau-
rem Kali auf
Kalium-Iri-
diumchlorid.

wird; die gefundene Zusammensetzung der lufttrockenen Krystalle entspricht dem atomistischen Verhältniß $\text{Ir}_2, \text{Cl}_3, 4 \text{ KO}, 4 \text{ SO}_2, 12 \text{ HO}$; das Wasser entweicht bei 180° . Dieses Salz löst sich leicht mit gelber Farbe in Salzsäure, und bei dem Abdampfen entweicht schweflige Säure; bei dem Concentriren der Lösung färbt sie sich roth, und es krystallisiren intensiver rothe diamantglänzende Prismen heraus, welche mit Wasser benetzt undurchsichtig und gelb werden, und sich in Wasser mit gelber Farbe leicht, aber nicht in Alkohol, lösen; die gefundene Zusammensetzung der lufttrockenen Krystalle entspricht dem atomistischen Verhältniß $\text{Ir}_2, \text{Cl}_3, 2 \text{ KO}, 2 \text{ SO}_2, 2 \text{ KCl}, 4 \text{ HO}$; das Wasser entweicht nur schwierig bei 180° . Claus ist der Ansicht, in beiden vorhergehenden Salzen sei Iridiumoxydul und eine Säure $\text{S}_2 \text{ O}_4 \text{ Cl}$ anzunehmen; dasselbe nimmt er für die folgende Verbindung an. — Die bernsteingelbe terpenthinähnliche Verbindung ist schwer rein darzustellen; Claus erreichte dies einigemale, indem er die Mutterlauge von der Darstellung des ersteren der vorgenannten rothen Salze bis zu geringem Volum abdampfte, von dem sich absetzenden Gemenge in dem Folgenden zu beschreibenden weissen und rothen Salzes abgoß, noch mehr concentrirte, und vieles Wasser zusetzte; der sich bildende weißgelbliche flockige Niederschlag sammelt sich, in der Flüssigkeit erhitzt, am Boden des Gefäßes als schmutzig weißgelbe klebrige Masse; zu weiterer Reinigung wird zum Sieden erhitzt, heiß filtrirt, wo nach einigen Tagen sich die Verbindung aus der Lösung als eine schön bernsteingelbe durchscheinende terpenthinähnliche Masse abscheidet, die zu einer amorphen, spröden, durchscheinenden Substanz eintrocknet und dann ein olivengelbes Pulver giebt; sie enthält $2 \text{ Ir}, 2 \text{ O}, 4 \text{ KO}, 6 \text{ SO}_2, \text{ Cl}$. — Ein weißes Salz begleitet die Bildung der vorhergehenden Verbindungen; man erhält es, jedoch immer in geringer Menge, wenn man die Lösung, aus welcher das erstere der oben beschriebenen rothen Salze herauskrystallisirt ist, mit vielem schweflgs. Kali vermischt und bis zu

einem geringen Volum eindampft, wo es sich als weißes Pulver absetzt, das mit Wasser ausgewaschen wird bis Chlorbaryum im Waschwasser einen in Salzsäure vollkommen löslichen Niederschlag giebt. Es ist in Wasser gar nicht, in Kalilauge etwas leichter löslich; seine Zusammensetzung $3(\text{KO}, \text{SO}_2) + \text{IrO}, 2 \text{SO}_2 + 5 \text{HO}$; bei 180° getrocknet ist es wasserfrei. In Salzsäure löst es sich mit hellgelber Farbe; aus der Lösung krystallisiren bläufgelbe, in Wasser leicht lösliche Prismen, $3 \text{KCl} + \text{IrO}, 2 \text{SO}_2$.

Fein geriebenes Kaliumosmiumchlorid wird nach Claus (1) — nicht in der Kälte, aber bei dem Erhitzen — von wässriger schwefliger Säure zersetzt; die Flüssigkeit färbt sich dunkelgrün von sich ausscheidendem schwarzem Osmiumoxyde, und aus der heiß filtrirten Flüssigkeit krystallisirt nach dem Erkalten unverändertes Kaliumosmiumchlorid. — Eine Lösung dieses Salzes mit schweflgs. Kali erhitzt, färbt sich anfangs dunkel-, später hellrosenroth und wird zuletzt fast farblos, wobei ein weißer, pulverförmiger, in Wasser schwerlöslicher Niederschlag entsteht, bei 100° getrocknet $3(\text{KO}, \text{SO}_2) + \text{OsO}, 2 \text{SO}_2 + 5 \text{HO}$; er wird bei 180° zersetzt und schmutzig violett. Mit Salzsäure giebt er ein braunrothes, krystallinisches, leicht lösliches Salz $3 \text{KCl} + \text{OsO}, 2 \text{SO}_2$. — Gegen Vergiftung mit Osmiumsäure wirkt nach Claus Schwefelwasserstoff, sogleich eingeathmet, sehr wohlthätig.

Fritzsche und Struve (2) haben die Untersuchung einer Säure mitgetheilt, welche Osmium, Stickstoff und Sauerstoff enthält, nach ihrer Ansicht aus Osmiumsäure gepaart mit Stickstoffosmium (wofür sie den Namen Osman vorschlagen) besteht, und von ihnen als Osman-Osmiumsäure bezeichnet wird. Zur Bildung des Stickstoffosmium OsN müßte OsO_4 durch NH_3 zersetzt werden; wohin das vierte Atom Sauerstoff kommt, wissen Fritzsche und

Osmium.
Zweifach-
schweflgs.
Osmiumoxy-
dul mit
schweflgsau-
rem Kali.

Osman - Os-
miumsäure.

(1) Petersb. Acad. Bull. VI, 285; Ann. Ch. Pharm. LXIII, 355; J. pr. Chem. XLII, 361; Pharm. Centr. 1847, 867; J. pharm. [3] XIV, 892. — (2) Petersb. Acad. Bull. VI, 81; J. pr. Chem. XLI, 97; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 263; Pharm. Centr. 1847, 885; J. pharm. [3] XII, 804.

Osman - Osmiumsäure.

Struve nicht anzugeben (1). Die Säure entsteht bei Einwirkung von Ammoniak auf Osmiumsäure; in Verbindung mit Kali wird sie leicht erhalten, wenn man zu einer Auflösung von Osmiumsäure in überschüssigem Kali Aetzammoniak setzt; die tief orangegelbe Farbe der Flüssigkeit geht schnell in die hellgelbe über, und das neugebildete Salz scheidet sich entweder sogleich als hellgelbes krystallinisches Pulver aus, oder man gewinnt es durch Abdampfen bei gelinder Wärme. Die Säure bildet sich auch ohne Gegenwart von Kali aus Osmiumsäure und Ammoniak, aber da sich das Ammoniaksalz bei dem Abdampfen leicht zersetzt, ist es besser, Basen zuzusetzen, welche stabilere und weniger lösliche Salze bilden, wie Kali, Zinkoxyd oder Silberoxyd. — Die Salze dieser Säure zersetzen sich bei dem Erhitzen mit Explosion, mit Ausnahme des Quecksilberoxydulsalzes. Aus dem Barytsalz durch verdünnte Schwefelsäure oder aus dem noch feuchten Silberoxydsalz durch verdünnte Salzsäure kann wässrige Osman-Osmiumsäure erhalten werden, welche in verdünnter (hellgelber) Auflösung mehrere Tage hindurch unzersetzt bleibt, in concentrirter aber sich bald bräunt und unter Gasentwicklung, Ausscheidung eines schwarzen osmiumhaltigen Körpers und Freiwerden von Osmiumsäure sich zersetzt. Die wässrige Osman-Osmiumsäure zersetzt die kohlens. Salze und selbst Chlorkalium; sie löst metallisches Zink unter geringer Gasentwicklung, wird aber selbst dabei theilweise zersetzt. Sie wird von Schwefelsäure, Salpetersäure und Salzsäure in der Kälte nicht zersetzt, wohl aber in der Wärme, unter Freiwerden von Osmiumsäure und Bräunung der Flüssigkeit. — Das Kalisalz — auf die oben angegebene Weise oder so dargestellt, daß man feste Osmiumsäure in einer mit Aetzammoniak versetzten concentrirten Kalilauge löst, wo es sich körnig in dem Maße abscheidet, als die Osmiumsäure sich löst — giebt bei dem Erkalten einer Lösung in möglichst

(1) Gerhardt (J. pharm. [3] XII, 804) nimmt in Beziehung hierauf die Zusammensetzung anders, $\text{Os}_2\text{O}_3\text{N}$, an.

wenig siedendem Wasser Krystalle des quadratischen Systems $P. 2P\infty$; für P ist die Hauptaxe $= 1,1335$, die Seitenkanten $= 116^{\circ}5'$, die Endkanten $= 106^{\circ}16'$. Das Salz, $KO + OsN$, OsO_4 , verträgt Erhitzung bis 180° , färbt sich aber dabei etwas dunkler; stärker erhitzt detonirt es. Bei dem Uebergießen des Salzes mit concentrirter Salzsäure entwickelt sich Chlor oder eine Oxydationsstufe desselben, die Salzsäure färbt sich schön purpurroth und die Krystalle des Salzes bedecken sich mit einer Rinde von zweierlei kleinen rothen Krystallen, in welche sie sich bei längerer Einwirkung ganz umwandeln. Verdünnte Salzsäure zu einer kalt gesättigten Lösung von osman-osmiums. Kali gesetzt, zersetzt es hingegen bei gewöhnlicher Temperatur nicht; bei erhöhter Temperatur wird die Flüssigkeit vorübergehend roth, dann braun und Osmiumsäure entwickelnd; wird bis zum Aufhören dieser Entwicklung gekocht und zur Krystallisation abgedampft, so setzen sich ein grünes Salz in sechseckigen Tafeln, ein grünes Salz in Nadeln und ein rothes ab, welche alle schon bei dem Auflösen in Wasser sich zu zersetzen scheinen und nicht genauer untersucht werden konnten. — Osman-osmiums. Natron, durch Zersetzung des Silbersalzes mit Chlornatrium dargestellt, ist leichtlöslich und krystallisirt aus der syrupdicken Auflösung zu ziemlich großen prismatischen Krystallen, welche Krystallwasser enthalten. — Das Ammoniaksalz, aus dem Silbersalz durch Zersetzung mit Chlorammonium bereitet, krystallisirt in großen Krystallen, welche mit denen des Kalisalzes isomorph zu sein scheinen, in Wasser und Alkohol leicht löslich sind, und bei 125° verpuffen. — Das Barytsalz, gleichfalls aus dem Silbersalz durch Chlorbaryum dargestellt, krystallisirt über Schwefelsäure abgedampft in gelben glänzenden Nadeln, löst sich ziemlich leicht in Wasser, verpufft bei etwa 150° , ist $BaO + OsN$, OsO_4 . — Das Zinksalz ist leicht löslich, es wurde nicht genauer untersucht; es bildet eine Verbindung mit Ammoniak, z. B. wenn man Osmiumsäure in einer ammoniakalischen Lösung eines Zinksalzes auflöst,

Osmian - Osmiumsäure.

oder eine ammoniakalische Lösung von Osmiumsäure mit einem Zinksalz versetzt, wo sich sehr bald ein hellgelbes krystallinisches Pulver, lufttrocken $\text{ZnO} + \text{OsN}$, $\text{OsO}_4 + 2 \text{NH}_3$, abscheidet, welches luftbeständig ist, aber durch Wasser zersetzt wird. Cadmium bildet eine entsprechende Verbindung. — Eine weingeistige Lösung des Kali- oder Ammoniaksalzes mit salpeters. Bleioxyd versetzt, giebt einen gelben krystallinischen Niederschlag, welcher sich schon bei dem Auswaschen dunkel färbt, wahrscheinlich $2 \text{PbO} + \text{OsN}$, OsO_4 . Die osman-osmiums. Salze geben mit neutralem essigs. Bleioxyd einen anfangs schmutziggelben, dann purpurroth werdenden Niederschlag; das Kalisalz mit einer Lösung von Chlorblei einen krystallinischen gelben Niederschlag, welcher Chlorblei und osman-osmiums. Bleioxyd nach gleichviel Aequivalenten enthält. — Das Quecksilberoxydsalz wird als hellgelber unkrystallinischer Niederschlag erhalten durch Fällung des Kalisalzes mit salpeters. Quecksilberoxydul; es verflüchtigt sich ruhig bei dem Erhitzen. — Das Silbersalz mit Quecksilberchlorid zerlegt giebt eine Flüssigkeit, aus welcher sich bald prismatische Krystalle absetzen, die sich jedoch schnell unter Schwärzung und Bildung von Osmiumsäure zersetzen. — Das osman-osmiums. Silberoxyd, $\text{AgO} + \text{OsN}$, OsO_4 , wird erhalten durch Lösung von Osmiumsäure in einer ammoniakalischen Lösung eines Silbersalzes und Uebersättigung mit Salpetersäure, oder durch Zusatz von überschüssiger Salpetersäure und dann von Silberlösung zu einer Lösung von Osmiumsäure in Ammoniak, oder durch Fällern auflöslicher osman-osmiums. Salze mit Silberlösung; es ist ein gelbes krystallinisches Pulver, schwer löslich in Wasser und kalter Salpetersäure, leicht löslich in Ammoniak, schwärzt sich bei längerem Aufbewahren auch bei Abschlufs von Licht, detonirt bei 80° und auch durch Schlag.

Organische Chemie.

Liebig (1) hat den Einfluss der Zeit auf die Bildung Allgemeines. chemischer Verbindungen genauer untersucht. — Wird Einfluss der Zeit auf die Bildung chemischer Verbindungen. Alkohol in der Wärme mit Oxalsäure gesättigt, so kry- stallisirt beim Erkalten ein Theil der letzteren heraus; bleibt das Ganze an einem 40 bis 50° warmen Orte längere Zeit stehen, so nimmt allmählig die Menge der bei dem Erkalten sich absetzenden Krystalle ab, und nach einigen Monaten krystallisirt bei dem Erkalten gar keine Säure mehr heraus; schon vor letzterem Zeitpunkt läßt sich in der Flüssigkeit eine beträchtliche Menge Oxaläther und Aetheroxalsäure nachweisen, und zuletzt ist soviel von ersterem vorhanden, daß er sich schon auf Zusatz von Wasser ab- scheidet. In gleicher Weise bildet Hippursäure mit Alkohol allmählig Hippursäureäther; Benzoësäure bewirkt mit Alkohol allein keine Aetherbildung, wohl aber nach Zusatz einiger Tropfen von rauchender Salzsäure oder Alkohol, der mit Salzsäuregas gesättigt ist. Die Bildung des Essig- äthers und des Oenanthsäureäthers bei dem Lagern der Weine scheint auf ähnliche Weise vor sich zu gehen.

Ueber die Gährung und verwandte Erscheinungen ist Gährung und Fäulnis. eine Abhandlung Liebig's (2) erschienen; von den darin

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 350; Pharm. Centr. 1848, 857. — (2) Liebig, Poggendorff u. Wöhler's Handwörterbuch der Chemie, III, 217.

Gährung und
Fäulnis.

mitgetheilten Ansichten und Beobachtungen heben wir hier folgende hervor. Als *Fäulnisproceß* definirt er allgemein jeden Zersetzungsproceß, welcher in einem Theile eines organischen Körpers durch eine äußere Ursache beginnt, und sich, ohne weitere Mitwirkung der ursprünglichen Ursache, durch die ganze Masse desselben fortsetzt; als *Gährung* die Zersetzung, welche stickstofffreie und stickstoffhaltige Körper, die für sich der Fäulnis nicht fähig sind, in Berührung mit faulenden Körpern, den Fermenten, zeigen; er unterscheidet ferner Fäulnis- und Gährungsprocesse, in denen der Sauerstoff der Luft unausgesetzt mitwirkt, von andern, welche ohne weiteren Luftzutritt sich vollenden. — Bei der Milchsäuregährung (von Zucker mit Kreide und Käse) entsteht als ein Nebenproduct, dessen Bildung nicht erklärt ist, immer Mannit (1); fällt man aus der Mutterlauge des gebildeten milchs. Kalks den Kalk durch Oxalsäure aus, dampft die saure Flüssigkeit zur Syrupconsistenz ab, behandelt den Rückstand mit kochendem Alkohol und setzt Aether zu, so scheidet sich der Mannit aus. — Setzt man zu einer Auflösung von Leucin eine Spur von in Fäulnis begriffenem Fibrin, so zersetzt sich ersteres bei Luftzutritt sehr rasch, und man findet in der Flüssigkeit eine reichliche Menge valerians. Ammoniaks; ohne Zusatz von faulendem Fibrin geht das Leucin nicht in Zersetzung über. — Läßt man Blutfibrin mit Wasser bedeckt an der Luft stehen, bis dasselbe zerflossen und die Fäulnis vollendet ist, so verhält sich die entstehende Flüssigkeit ähnlich wie eine Albuminlösung; sie scheidet beim Erhitzen ein Coagulum von der Farbe und den Eigenschaften des geronnenen Eiweißes ab. — Liebig spricht sich dagegen aus, die Gährungs- oder Fäulnisprocesse

(1) Es steht vielleicht die Mannitbildung mit der Entstehung der Bernsteinsäure in Beziehung, welche Schmidt nach einer Mittheilung an Liebig in gährenden (Zucker-) Flüssigkeiten gefunden hat, denn $C_6H_{12}O_6$ (Mannit) + $C_4H_4O_4$ (Bernsteinsäure) = $C_{10}H_{16}O_{10}$ (Traubenzucker).

als bedingt durch vitale Thätigkeit zu betrachten, z. B. die ^{Gährung und Fäulnis.} Entwicklung vegetabilischer Gebilde oder mikroskopischer Thiere; er führt an, daß bei der Gährung der Milch, wenn diese in mit Fließpapier überbundenen lufthaltigen Gefäßen einige Zeit sich selbst überlassen bleibt und Gährung und Milchsäurebildung vollkommen eingetreten ist, keine Spur eines Pflanzengebildes sich nachweisen läßt. Er hebt hervor, daß man unter den Gährungsprocessen die Alkoholgährung zu ausschließlich studirt und aus den dabei wahrgenommenen Erscheinungen zu allgemein geschlossen habe, während die Erklärung der Alkoholgährung aus dem Studium der Gährungserscheinungen im weiteren Sinne abzuleiten sei. — Er theilt mit, daß die Beobachtungen von Brendecke (1), — wonach poröse Substanzen (Stroh, Papier, Kohle, Schwefelblumen u. s. w.) bei Zusatz von etwas weins. Ammoniak Traubenzuckerlösung zur alkoholischen Gährung bringen können — nach Trautschold's Versuchen darauf beruhen, daß die Zuckerlösung einen fremden Stoff enthielt, mit dessen Entfernung das Vermögen, auf diese Art in Gährung zu kommen, aufhört; bei Behandlung von Traubenzuckerlösung mit wohl ausgeglühtem Beinschwarz geht dieser Stoff an das letztere, und das nicht vollständig ausgewaschene Beinschwarz zeigt dann bei 18 bis 20° Alkoholgährung, aber nach mehrmaliger Behandlung der Traubenzuckerlösung mit Beinschwarz bringt in ersterer keine der genannten porösen Substanzen, mit oder ohne Zusatz von weins. Ammoniak, mehr Gährung hervor.

Eine andere Abhandlung über die Gährung im Allgemeinen ist von Blondeau (2) veröffentlicht worden. Er geht von der Ansicht aus, daß jede Art der Gährung auf der Entwicklung von Pilzen beruhe. Die Alkoholgährung werde hervorgebracht durch einen von Blondeau als *Torula cerevisiae* bezeichneten Pilz; die Milchsäuregährung

(1) Arch. Pharm. [2] XL, 10; XLII, 183; Berzelius' Jahresbericht XXV, 741; XXVI, 728. — (2) J. pharm. [8] XII, 244. 836.

Gährung und
Fäulnis.

durch *Penicillium glaucum*. Letztere Gährung trete nach der ersteren ein, wenn man eine Mischung von 30^{grm} Zucker und 10 Hefe mit 200 Cub. Cent. Wasser bei etwa 25° nach vollendeter geistiger Gährung (diese sei in etwa 2 Tagen beendet) noch länger sich selbst überlasse. In Bierhefe, die mit etwas Wasser an einem dunkeln und feuchten Ort sich selbst überlassen war, seien Keime von *Torvula cerevisiae* und von *Penicillium glaucum* vorhanden; die ersteren bleiben bei dem Filtriren auf dem Filter, und versetzen Zuckerwasser in geistige Gährung, während die letzteren so klein seien, daß sie durch das Filter gehen, wo denn das Filtrat Zuckerwasser zur Milchsäuregährung bringe. Die Essiggährung beruhe auf der Entwicklung von *Torvula aceti*; Zucker verwandle sich ohne Gasentwicklung in Essigsäure, wenn 500^{grm} Zucker in einem Liter Wasser gelöst mit 200^{grm} Casein bei etwa 20° abgesperrt einen Monat hindurch sich selbst überlassen bleiben. Die Umwandlung von stickstoffhaltiger Substanz in Fett (z. B. des Caseins bei der Bereitung des Roquefort-Käses, des Fibrins unter ähnlichen Umständen), welche Blondeau als Fettgährung (*fermentation adipeuse*) bezeichnet, werde durch *Penicillium glaucum* oder *Torvula viridis* hervorgebracht; auch bei der Buttersäuregährung und der Harngährung (der Umwandlung des Harnstoffs in kohlenst. Ammoniak) sei die Entwicklung von *Penicillium glaucum* wirksam.

C. Schmidt (1) hat als Resultate seiner Versuche über Gährung Folgendes mitgetheilt. Harnstoff mit Hefe zusammengebracht zerfällt sofort in Kohlensäure und Ammoniak. Harnstoff mit Hefe und wenig Zucker zusammengebracht wird erst nach der Zersetzung des Zuckers zersetzt; bei einem bestimmten Verhältniß zwischen Hefe und Zucker ist eine Art Gleichgewicht vorhanden, bei mehr Zucker ist der Harnstoff vor Zersetzung gesichert, bei weniger Zucker wird der Harnstoff proportional dem Hefe-

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 168; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 348.

überschufs langsamer oder rascher zersetzt. Eine gewisse Menge Hefe zersetzt nur eine gewisse Menge Harnstoff; nämlich gleichviel Hefe mit gleichviel Wasser und verschiedenen Mengen Harnstoff zusammengebracht, veranlasste in gleicher Zeit die Bildung von gleichviel Ammoniak. Pilze sind für die Harnstoffgährung nicht nothwendig; eine mit Harnstoff, phosphors. Natron und schwefels. Magnesia versetzte Leimlösung, welche filtrirt, eine halbe Stunde lang zum Sieden erhitzt und dann fortwährend von Luft, die durch Schwefelsäure geleitet war, überströmt wurde, gab nach 8 Tagen dieselbe Menge phosphors. Magnesia-Ammoniak, wie unter sonst gleichen Umständen dieselbe Flüssigkeit an gewöhnlicher Luft. Pilze sind auch für die Zuckergährung nicht das *primum-movens*; das klare Filtrat von mit Wasser zerstoßenen Mandeln durch ein genäßtes Filtrum bringt Harnstoff und Traubenzucker bald in Gährung, und im letzteren Falle kann die Gährung in vollem Gange sein, ohne daß eine Spur von Hefenzellen unter dem Mikroskop wahrnehmbar ist, welche letztere erst später auftreten; bleibt die zuckerhaltige Flüssigkeit nach vollendeter Gährung noch 8 bis 14 Tage sich selbst überlassen, so nimmt die Wucherung der Zellenaggregate noch immer mehr zu, ohne daß Fäulniß eintritt; die *ausgewachsenen* (soll *ausgewaschenen* heißen?) Pilze, in frische Traubenzuckerlösung gebracht, wuchern darin trefflich fort, erzeugen aber keine, oder nur schwache und bald aufhörende, Gährung; das Wachsthum dieser Pilze ist mithin bei der Gährung nur eine secundäre Erscheinung. Die Vermehrung des Hefenrückstands bei mit Zucker in Berührung gewesenen Hefen beruht auf einer Vermehrung der Hefencellulose, welche wahrscheinlich auf Kosten des Zuckers stattfindet. Muskel, Leim, Hefe u. dergl., welche im höchsten Grad putrid und stinkend sind, verlieren, in eine Lösung von 1 Zucker auf 4 Wasser gebracht, sofort alle Fäulnißerscheinungen; es tritt nach einigen Stunden lebhaft Gährung unter Bildung von Hefenzellen ein, und in

Gährung und
Fäulniß.

Gährung und
Fäulnis.

der Flüssigkeit ist dann Alkohol, aber kein Mannit, nachzuweisen. Die Unwirksamkeit zermalmter Hefe beruht nicht auf der Zerstörung der Pilze, sondern auf der chemischen Veränderung, welche die Hefe während der langen zur völligen Zermalmung nöthigen Zeit durch die Luft erleidet; die zermalmten Hefenzellen geben mit Zuckerwasser fast ohne Gasentwicklung Milchsäure. — Schmidt ist der Ansicht, die Gährung sei, ähnlich wie die Aetherbildung, ein Proceß, in welchem sich eine oder mehrere im Entstehungsmoment wieder in Alkohol und Kohlensäure zerfallende Verbindungen von einem Hefenbestandtheil mit den Elementen des Traubenzuckers bilden, wie die Aetherschwefelsäure während des Aetherbildungsprocesses.

Bemerkungen über die Natur der Hefe hat auch R. Wagner mitgetheilt (1). Er beobachtete, daß die Zellen der Oberhefe sich von denen der Unterhefe hauptsächlich dadurch unterscheiden, daß letztere nicht zusammenhängend sind. Er wiederholte die Versuche über Fortpflanzung der Hefe, und fand bei Oberhefe bestätigt, daß ihre Fortpflanzung durch Ausdehnung der Zellenhülle stattfindet, und daß eine neu gebildete Zelle erst dann sich fortpflanzen kann, wenn sich im Innern ein Kern gebildet hat, der aber nicht von der Mutterzelle herrührt; für die Fortpflanzung der Unterhefe nimmt er ein Ausschlüpfen der neuen Zellen aus der Mutterzelle an, ohne daß er dies indeß unmittelbar beobachten konnte. Oberhefe bei $+7^{\circ}$ mit Bierwürze zusammengebracht geht zum größten Theil in Unterhefe über, während bei dem Zusammenbringen von Unterhefe mit Bierwürze bei 20° keine Bildung von Oberhefe beobachtet werden konnte. Oberhefe in einem Uhrgläschen der atmosphärischen Luft ausgesetzt, zeigt die von Kützing (2) beobachteten Vegetationen; diese gehen weiter in *Sporotrichum* und dieses endlich in *Mucor* über. Unterhefe geht unter denselben Umständen ohne Zwischenstufen in *Mucor*

(1) J. pr. Chem. XLV, 241. — (2) J. pr. Chem. XI, 890.

über. Schmidt's Beobachtung (S. 469), daß das Filtrat ^{Gährung und Fäulnis.} von mit Wasser zerstoßenen Mandeln Traubenzucker in Gährung bringe, ohne daß sich gleichzeitig Hefenzellen bilden, fand Wagner nicht bestätigt; Kohlensäureentwicklung und Hefenzellenbildung traten immer zu gleicher Zeit ein. Auch der Angabe, daß *ausgewachsene* (vergl. S. 469) Hefenpilze, in frische Traubenzuckerlösung gebracht, darin fortwachsen sollen, ohne Gährung zu veranlassen oder unter Einleitung nur schwacher und vorübergehender Gährung, stimmt Wagner nicht bei, und giebt zu bedenken, woher die Hefe hier die zu ihrer Vegetation nothwendige Proteïnsubstanz genommen haben solle. — Er untersuchte weiter, wie verschiedene Agentien auf das Vermögen der Hefe, eine Lösung von Traubenzucker in Malzauszug in Gährung zu bringen, einwirken. Bei 100° getrocknete und zu Pulver zerriebene Hefe zeigte unter dem Mikroskop nicht mehr die Form der Zellen, und bewirkte erst nach 36 Stunden Gährung. Starke Mineralsäuren verhindern schon in geringer Menge die Gährung, während Phosphorsäure sie zu befördern scheint. Organische Säuren wirken verschieden; Buttersäure wirkt anscheinend so, daß sie die vielleicht schon eingeleitete geistige Gährung, unter Umwandlung der Hefe in Buttersäureferment, in Buttersäuregährung überführt; geringe Mengen von Essigsäure, Weinsäure und besonders Milchsäure sind von dem günstigsten Einfluß auf die Vermehrung der Hefenzellen. Alkalien und Seifen heben selbst in verdünntem Zustande die Gährung auf; eine verdünnte Lösung von Chinin und Strychnin aber keineswegs. Schwefels. Eisenoxydul und Zinkoxyd, auch Quecksilberchlorid, zerstören die Hefe; schwefels. Kupferoxyd, arsenige Säure und Brechweinstein hingegen nicht. Freie schweflige Säure zerstört in geringer Menge die Hefenzellen nicht; Chlorkalk wirkt wie die Alkalien. — Wagner analysirte endlich noch nach Schloßberger's (1)

(1) Ann. Ch. Pharm. LI, 193.

Gährung und
Fäulnis.

Methode (Auswaschen, Durchpressen durch Leinwand, Ausziehen mit Alkohol und Aether) dargestellte Hefe, und fand im Mittel (die Hefe war bei 100° getrocknet):

	Kohlenstoff.	Wasserstoff.	Stickstoff.	Sauerstoff.	Asche.
Oberhefe	44,37	6,04	9,20	40,39	
Unterhefe	49,76	6,80	9,17	28,97	5,29

welche Resultate mit denen Schloßberger's nicht übereinstimmen.

Versuche über Fäulnis und Gährung haben endlich noch Döpping und Struve (1) mitgeteilt. Die von Helmholtz (2) gefundenen Resultate — daß organische Substanzen (Weinmost, Leimlösung, Fleisch u. s. w.), mit Wasser in einem Gefäß bis zum Sieden des letztern erhitzt und dann in der Art abgeschlossen, daß nur geglühte Luft Zutreten kann, nicht in Fäulnis übergehen — fanden sie nicht bestätigt, sondern sie kamen zu dem Schlusse, daß alle stickstoffhaltigen organischen Substanzen auch unter dem Einfluß ausgeglühter Luft Zersetzungen erleiden, und daß nur durch den Einfluß der Siedhitze alle Erscheinungen verlangsamt und verändert werden. Helmholtz hatte gefunden, daß eingeschlossener und mit einer Blase so abgesperrter Most, daß letztere in gährendem Moste sich befindet, nicht in Gährung übergeht, d. h., daß die Gährung sich nicht durch die Blase fortpflanzt. Bei ähnlichen Versuchen beobachteten Döpping u. Struve Einmal schwache Gasentwicklung in der abgeschlossenen Zuckerlösung, so lange die umgebende Zuckerlösung in Gährung war, und nachher auch Hefenzellen in der ersteren; in mehreren andern Versuchen wurde dieses aber nicht wieder beobachtet. — Gay-Lussac's Beobachtung — daß bei abgeschlossener Luft ausgepresster Traubensaft nicht in Gährung kommt, daß diese aber nach Zutritt einer geringen

(1) Petersb. Acad. Bull. VI, 145; J. pr. Chem. XLI, 255; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 713. — (2) J. pr. Chem. XXXI, 429; Berzelius' Jahresber. XXV, 805. Früher schon hatte Schwann ähnliche Resultate erhalten (Pogg. Ann. XLI, 184).

Menge Sauerstoff eintritt — bestätigte sich ihnen gleichfalls ^{Gährung und Fäulnis.} nicht; auf welche Art, durch Wasserstoff oder Kohlensäure, sie auch die atmosphärische Luft aus dem Apparat wegzuschaffen suchten, in welchem sie dann die Trauben ohne Luftzutritt auspressten, gieng der Saft derselben doch in Gährung über; sie glauben, der Widerspruch beruhe darauf, daß sich seit verschieden langer Zeit gepflückte Trauben verschieden verhalten. — Brendecke's Angabe (vgl. S. 467) fanden sie in so weit bestätigt, daß durch poröse Substanzen (theils mit, theils ohne weins. Ammoniak) in Traubenzuckerlösung Gährungserscheinungen hervorgerufen werden, ohne daß sie jedoch in der gegohrenen Flüssigkeit Weingeist nachweisen konnten; es bildete sich dabei eine Säure.

H. Delbrück (1) hat zur Entscheidung der wichtigen ^{Cyan- und Cyanverbindungen. Cyan und Paracyan.} Frage über Bildung des Cyans einige Versuche angestellt; er bestätigt die Angaben von Desfosses und Fownes, sofern er eine schwache aber deutliche Cyanbildung beim Glühen von kohlen. Kali und Zuckerkohle in Stickgas wahrnahm. Er erhielt ferner Cyankalium beim Hinüberleiten von Stickoxyd über glühendes Kohlenoxydkalium, von Kohlensäure und Ammoniak oder auch von Kohlensäure und Stickgas über erhitztes Kalium, so wie beim Schmelzen von Kalium mit Stücken von kohlen. Ammoniak (2).

Paracyan wird nach Delbrück nur durch Erhitzen von trockenem Cyanquecksilber rein erhalten; leitet man Blausäure in Cyankaliumlösung, oder versetzt man letztere, concentrirt, mit wenig Schwefelsäure, so erzeugt sich der braune, paracyanähnliche Körper in beträchtlicher Menge. Das bei Erhitzen von Cyansilber sich entwickelnde Gas

(1) J. pr. Chem. XLI, 161; Pharm. Centr. 1847, 667; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 296. — (2) Possoz und Boissière haben, wie im Bericht über technische Chemie erwähnt ist, die Cyanbildung auf Kosten des Stickstoffs der Atmosphäre zur Blutlaugensalz-Fabrikation benutzt.

Cyan und
Paracyan.

fand D., im Widerspruch mit H. Thaulow, in Uebereinstimmung mit Liebig, L. Gmelin und Rammelsberg, vom gewöhnlichen Cyan nicht verschieden; das rückständige Paracyansilber zerfällt durch heftiges Glühen in Metall, das nur eine geringe und veränderliche Menge Kohlenstoff enthält, und in 1 Vol. Stickgas auf 1,66 Vol. Cyangas. Mellonsilber enthält der Rückstand nicht, da bei seinem Zusammenschmelzen mit Schwefelcyankalium kein Mellonkalium entsteht. Paracyan, aus Cyanquecksilber oder Cyansilber bereitet, wird von Salpetersäure nicht verändert; die braune, durch Einwirkung von Cyankalium auf Blausäure sich bildende Verbindung ist darin theilweise löslich, die Lösung wird durch Wasser, vollständiger durch Silberoxyd- und Bleioxydsalze, so wie durch Ammoniak gefällt. Verdampft man reines Paracyan mit Salpetersäure zur Trockene und erhitzt schwach, so wird es hellgelb, in Salpetersäure löslich und daraus durch Wasser fällbar.

Bei Erhitzen von Cyanquecksilber bleibt nur etwa $\frac{1}{4}$ des Cyangehalts als Paracyan im Rückstand; es verwandelt sich durch Glühen in einem Strom von Kohlensäure oder Stickgas in reines Cyangas; andere paracyanähnliche Körper hinterlassen dabei etwas Kohle. Durch Glühen in Wasserstoffgas zerfallen sie in Blausäure, Ammoniak und Kohle: $2 \text{C}_2\text{N} + 4 \text{H} = \text{C}_2\text{NH} + \text{NH}_3 + 2 \text{C}$. — Trockenes Chlorgas erzeugt mit erhitztem Paracyan festes Chlorcyan; einmal condensirte sich ein weißer, in heißem Wasser löslicher Körper, der erst nach dem Zusammenschmelzen mit kohlens. Natron einen Gehalt an Cyan und Chlor erkennen liefs. Schwefel ist ohne Wirkung auf Paracyan.

Blauskure.

Mohr (1) hat nachgewiesen, dafs bei einmaliger Destillation von 1 Th. Ferrocyankalium, $\frac{1}{4}$ Th. Schwefelsäure und der gehörigen Menge Wasser bis zur Trockene 57—59 pC. von der dem Cyan des Cyankaliums entsprechenden Blausäuremenge übergehen; wurde die Destillation in einem

(1) Arch. Pharm. [2] LV, 11.

Strom von Wasserdampf vorgenommen, so gingen 86,49 pC. Blausäure. über, eine nahezu gleiche Quantität (85,6 pC.) bei zweimaliger Destillation von 3 Th. Salz und 2 Th. Vitriolöl; bei viermaliger Destillation wurde etwas mehr Blausäure erhalten, als dem Cyankalium entspricht, das rückständige Sediment betrug nur 21,16 pC. des Salzes und das Filtrat enthielt Eisenoxysalz. Man kann demnach nicht sagen, der wievielste Theil des Cyans im Blutlaugensalz als Blausäure erhalten wird, da dies von der Art der Destillation abhängt; bei der officinellen Säure muß der Gehalt des Destillats durch einen analytischen Versuch ermittelt werden.

Wurtz (1) erhielt durch Behandlung von wässriger Chlorcyanwasserstoff. Blausäure mit Chlor und Verdichtung des durch Chlorcalcium getrockneten Dampfs in einer Kältemischung eine aus Chlorcyanwasserstoff, Salzsäure und Blausäure bestehende Flüssigkeit, welcher durch Schütteln mit dem 2—3fachen Vol. kalten Wassers die beiden letzteren entzogen werden. Nach einer neuen Destillation über Chlorcalcium stellt der reine Chlorcyanwasserstoff ein farbloses, dünnflüssiges, sehr ätzendes Liquidum dar, das die Augen stark zum Thränen reizt, bei $+20^{\circ}$ siedet, mit violetter Flamme brennt, und dessen wässrige Lösung von salpeters. Silberoxyd weiß gefällt wird. Seine Formel ist $C_4N_3Cl_2H$, wonach er als eine Verbindung von Blausäure mit dem Chlorcyan $C_4N_2Cl_2$ betrachtet werden kann. Mit trockenem Chlorgas zerfällt er in Salzsäure und festes Chlorcyan $C_4N_3Cl_2$.

Behandelt man, nach Wurtz, Chlorcyanwasserstoff mit Flüssiges Chlorcyan. Quecksilberoxyd (das man mit Chlorcalciumpulver gemengt und gut erkaltet hat) und destillirt nach einigen Stunden im Wasserbade, so condensirt sich eine farblose, die Augen und Schleimhäute ebenfalls stark angreifende, bei $+16^{\circ}$ siedende, bei -7° krystallinisch erstarrende Flüssigkeit. Ihr Dampf ist nicht entzündlich, ihre wässrige Lösung wird

(1) Compt. rend. XXIV, 437; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 307.

durch salpeters. Silberoxyd nicht gefällt; mit Kali zerfällt sie in Kohlensäure, Ammoniak und Chlorkalium oder vielmehr in Cyansäure und Salzsäure. Ihre Formel ist $C_4N_2Cl_2$.

Cyankalium.

Nach Clemm (1) erhält man meist ein graues Cyankalium, wenn man Blutlaugensalz und kohlen. Kali bei heller Rothglühhitze so lange schmilzt, bis die Masse ruhig fließt. Nimmt man aber den Tiegel aus dem Feuer, wenn sie schwache Rothglühhitze angenommen hat, klar geworden ist und eine herausgenommene Probe nach dem Erkalten weiß erscheint, so hört die Gasentwicklung bald auf, und man kann nun, indem man durch gelindes Aufstoßen des Tiegels die Abscheidung des Eisens befördert, das Cyankalium durch einen erhitzten fein durchlöcherten eisernen Löffel in ein hohes, glattwandiges Gefäß von Silber, Eisen oder Porcellan abgießen, in welchem man es langsam erkalten läßt. Graues Cyankalium kann man neuen Schmelzungen zusetzen und durch obiges Verfahren weiß erhalten.

Cyaneures
Kali.

Man bereitet sich das cyans. Kali nach Clemm (2) am zweckmäßigsten, indem man der geschmolzenen und etwas erkalteten, aber noch flüssigen, Masse von 8 Th. Blutlaugensalz und 3 Th. kohlen. Kali nach und nach und mit der Vorsicht 15 Th. Mennige zusetzt, daß die Temperatur sich nicht zu hoch steigert. Man setzt den Tiegel alsdann nochmals ins Feuer, rührt um, gießt aus und läßt erkalten. Will man das Salz zu Harnstoff verwenden, so laugt man geradezu mit kaltem Wasser aus, löst in dem letzten Waschwasser das schwefels. Ammoniak (bei obigen Verhältnissen 8 Th.), dampft die gemischten Flüssigkeiten ab und verfährt wie gewöhnlich. Vorhandenes Blutlaugensalz entfernt man leicht in der weingeistigen Lösung durch vorsichtigen Zusatz von schwefels. Eisenoxyd und Abgießen

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 250; Pharm. Centr. 1847, 460. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 382.

der klaren Lösung von dem gebildeten Berlinerblau. 8 Th. wasserfreies Blutlaugensalz liefern so 4—5 Th. Harnstoff.

L. Kugler (1) untersuchte den gelblichweißen Niederschlag, der in einer Lösung von basisch essigs. Bleioxyd durch Blausäure unter Ammoniakzusatz ausgefällt wird und den man bisher für PbCy hielt. Er stellt dafür die Formel Pb Cy, PbO, HO auf, die indessen nicht mit den Resultaten seiner Analyse übereinstimmt. Er fand 87,22 pC. Blei, 5,07 Cyan und 1,53—1,80 Wasser. Diefs entspricht, wenn man letzteres als der Verbindung angehörendes Wasser berechnet, am nächsten der Formel 3 PbO, Pb Cy, HO. Sie verlangt 87,5 Blei, 5,4 Cyan und 1,8 Wasser.

Cyanblei.

H. Custer (2) hat die zahlreichen Doppelverbindungen des Cyanquecksilbers noch um einige vermehrt. Sie wurden durch Verdampfen der Lösungen der betreffenden Salze, in dem der Formel entsprechenden Gewichtsverhältniß, krystallisirt erhalten. *Cyanquecksilber-Jodnatrium*, 2 Hg Cy, NaJ + 4 HO, bildet seidenglänzende vierseitige Prismen, die erst bei 210° alles Wasser verlieren, leicht in Wasser und Weingeist löslich sind und durch Mineralsäuren unter Entwicklung von Blausäure und Fällung von Quecksilberjodid zersetzbar sind. *Cyanquecksilber-Jodbarium*, 2 Hg Cy, BaJ + 4 HO, und *Cyanquecksilber-Jodstrontium*, 2 Hg Cy, SrJ + 6 HO, verhalten sich ähnlich und krystallisiren in quadratischen Tafeln; *Cyanquecksilber-Bromcalcium*, 2 Hg Cy, CaBr + 5 HO, ist ebenfalls leicht in Wasser und Weingeist löslich. Ein Doppelsalz von *Cyanquecksilber* mit *essigs. Natron*, HgCy + NaO, C₄H₃O₃ + 7 HO, konnte nur Einmal aus der Mutterlauge der Lösung beider Salze erhalten werden.

Cyanqueck-
silber-
Doppelsalze.

Vermischt man, nach Monthiers (3), eine ammoniakalische Auflösung eines Kupferoxydsalzes mit Ferrocyan-

Doppel-
cyanidre. Ver-
bindung mit
Ammoniak.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 63; Pharm. Centr. 1848, 719. —

(2) Arch. Pharm. [2] LVI, 1; Pharm. Centr. 1849, 3; Chem. Gaz. 1849, 101. — (3) J. pharm. [3] XI, 249; J. pr. Chem. XLI, 113; Pharm. Centr. 1847, 390; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 297.

Doppel-
cyanüre. Ver-
bindung mit
Ammoniak.

kalium, so fällt ein hellgelbes, krystallinisches Pulver nieder, das erst bei 130° Ammoniak, in noch höherer Temperatur Cyanammonium entwickelt. Es ist Ferrocyan-
kupfer-Ammoniak, $\text{Cfy, } 2 \text{ Cu} + 2 \text{ NH}_3 + \text{HO}$ ($\text{Cfy} = \text{Ferrocyan} = \text{FeCy}_3$). Dieselbe Verbindung ist schon von Bunsen (1) beschrieben worden, der aber den Wassergehalt nur halb so groß darin annimmt. Im feuchten Zustande absorbiert diese Verbindung, so wie das Ferrocyan-
kupfer ($\text{Cfy, } 2 \text{ Cu} + 9 \text{ HO}$), unter Wärmeentwicklung und grüner Färbung 39,1 pC. Ammoniak und wird zu $\text{Cfy, } 2 \text{ Cu} + 4 \text{ NH}_3 + \text{HO}$, das aber schon an der Luft einen Theil des Ammoniaks wieder verliert. Ferrocyanzink und Ferrocyan-
silber verhalten sich ähnlich.

Kaliumkupfer-
cyanür.

Monthiers bereitet dieses, von Jttner entdeckte und von L. Gmelin und Rammelsberg näher untersuchte, Salz durch Einleiten von Blausäuredampf in Kalilauge, in welcher Kupferoxydhydrat suspendirt ist, bis letzteres gelöst und die Flüssigkeit farblos ist. M. bestätigt die von Rammelsberg gegebene Formel $\text{KC}_y, \text{Cu}_2 \text{ Cy}$. — Durch Einwirkung von Kali auf geschmolzenes Kupfercyanür entsteht nach Rammelsberg (2) ein Salz von der Formel $2 \text{ KC}_y + 3 \text{ Cu}_2 \text{ Cy}$. Schwefels. Kupferoxyd giebt mit Ammoniumkupfercyanür ($\text{NH}_4 \text{ Cy, Cu}_2 \text{ Cy}$) einen anfangs gelben, dann unter Cyanentwicklung grün werdenden Niederschlag, welcher nach Monthiers $\text{NH}_4 \text{ Cu Cy, } 2 \text{ Cu}_2 \text{ Cy, HO}$ ist.

Ammonium-
kupfercyanür.

Ferrocyan-
kupfer und
Ferrocyan-
kupferkalium.

Nach Rammelsberg (3) erhält man nur durch Fällung von essig- oder schwefels. Kupferoxyd mit Ferrocyanwasserstoffsäure reines Ferrocyan-
kupfer, das über Schwefelsäure getrocknet $\text{Cfy, } 2 \text{ Cu} + 7 \text{ HO}$ ist; nach Monthiers Angabe enthält es 9 Aeq. Wasser. Tröpfelt man das Kupferoxydsalz in überschüssiges Ferrocyan-
kalium, so erhält man nach Mosander die wasserfreie Verbindung Cfy, CuK , nach R. enthält sie 2 Aeq. Wasser und ist nach

(1) Pogg. Ann. XXXIV, 134. — (2) Pogg. Ann. LXXIII, 117. —
(3) Pogg. Ann. LXXIV, 65; Pharm. Centr. 1848, 459.

der unwahrscheinlichen Formel $\text{Cfy, 2 Cu} + \text{KCy, FeCy} + 2\text{HO}$ zusammengesetzt. Tröpfelt man umgekehrt Ferrocyankalium in überschüssiges Blutlaugensalz, so entsteht $\text{Cfy, 2 Cu} + \text{Cfy, 2 K, 2 HO} + 9(\text{Cfy, 2 Cu, 7 HO})$.

Rieckher (1) empfiehlt zur Darstellung des Ferridcyan-
kaliums eine verdünnte und kalte Lösung des gelben Salzes,
einen langsamen Chlorstrom, bis die Farbe der Flüssigkeit
bei durchfallendem Lichte dunkelroth ist, rasches Eindampfen
zur Trockne, Behandeln des Rückstandes mit dem vier-
fachen Gewicht Wasser und Einkochen des Filtrats auf die
Hälfte. — Kolb (2) schlägt statt des Einleitens von Chlor
den Zusatz von kleinen Portionen chlors. Kali's und Salz-
säure zu der kochenden Lösung des gelben Salzes vor.

Ferridcyan-
kalium.

Die von Boudault (3) beschriebene oxydirende Wir-
kung des Ferridcyankaliums bei Gegenwart von Kali, wo-
nach viele schwere Metalloxyde in höhere Oxydationsstufen,
Oxalsäure in Kohlensäure übergeführt werden, ist von
J. Mercer (4) (seiner Angabe nach schon früher, als
Boudault's Versuche bekannt wurden) in der Kattun-
druckerei zum Bleichen des Indigs angewendet worden.
Als Vorlesungsversuch tränkt man mit Indigblau gefärbten
Kattun mit Ferridcyankalium, und taucht ihn dann in ver-
dünnte Kalilauge. — Nach Monthiers (5) entwickelt sich,
bei Behandlung von Ferridcyankalium mit Ammoniak,
Stickgas, unter Bildung von Ferrocyankalium und Ferro-
cyanammonium.

Ferridcyan-
kalium als
oxydirendes
Mittel.

C. Zwenger (6) hat die den Ferridcyanverbindungen
entsprechenden Verbindungen des Kobalts einer sorgfältigen
Untersuchung unterworfen. — Die *Kobaltidcyanwasserstoff-*
säure, $\text{Co, Cy}_6, 3 \text{H} + \text{HO}$, gewinnt man am besten durch

Kobaltcyan-
verbindungen.

(1) Jahrb. pr. Pharm. XV, 1. — (2) Jahrb. pr. Pharm. XVI, 332;
Pharm. Centr. 1848, 592. — (3) J. pharm. [3] VII, 437; Berzelius' Jahresber.
XXVI, 240. — (4) Phil. Mag. [3] XXXI, 126; Chem. Soc. Mem. III,
320; J. pr. Chem. XLII, 43. — (5) J. pharm. [3] XI, 254; J. pr. Chem.
XLI, 118. — (6) Ann. Ch. Pharm. LXII, 157; J. pr. Chem. XLIV, 173;
Pharm. Centr. 1847, 625; J. pharm. [3] XII, 380; Chem. Gaz. 1847, 417.

Kobaltcyan-
verbindungen.

Zerlegung von Kobaltidcyan kupfer mit Schwefelwasserstoff und Verdampfen der farblosen, vom Schwefelkupfer abfiltrirten Flüssigkeit. Durch Zerlegung des Kobaltidcyan kaliums in concentrirter wässeriger Lösung mit wenig überschüssiger concentrirter Schwefel- oder Salpetersäure, Zusatz von absolutem Alkohol und Umkrystallisiren der nach dem Verdampfen bleibenden Masse erhält man sie ebenfalls. Sie krystallisirt in zerfließlichen, farblos durchsichtigen Nadeln, von stark saurem Geschmack. Sie zerlegt kohlen. Salze, löst Eisen und Zink unter Wasserstoffentwicklung auf, und wird in wässeriger Lösung durch Kochen kaum zerlegt. Ueber 100° entweicht aus der Säure zuerst Wasser, dann Blausäure, blaus. und kohlen. Ammoniak; bei 250° bleibt ein blaues Pulver, das in noch höherer Temperatur in schwarzes Kohlenkobalt zerfällt. Die Kobaltidcyanwasserstoffsäure ist löslich in Alkohol, unlöslich in wasserfreiem Aether; durch Salzsäure, rauchende Salpetersäure und Königswasser wird sie nicht zersetzt. Beim Erhitzen mit Vitriolöl zerfällt sie in Kohlenoxyd, Kohlen säure, schweflige Säure, schwefels. Ammoniak und schwefels. Kobaltoxydul; Wasserzusatz scheidet, vor der völligen Zersetzung, blafsrothes, beim Erwärmen unter Wasserverlust sich bläuendes Kobaltidcyan kobalt, $\text{Co}_2\text{Cy}_6, 3\text{Co} + 12\text{HO}$ ab. Das *Kobaltidcyan kalium*, $\text{Co}_2\text{Cy}_6, 3\text{K}$, bildet sich, wie schon L. Gmelin, der Entdecker dieses Salzes, angiebt, durch Behandeln von Kobaltcyanür mit Cyankalium, oder von kohlen. Kobaltoxydul mit Kali und Blausäure, unter Entwicklung von Wasserstoffgas; bei Luftzutritt unter Absorption von Sauerstoff. Z. erhielt bei Behandlung von 100 Kobaltcyanür, $\text{CoCy}, 2\text{HO}$, mit Cyankalium 0,65 Wasserstoff; die Zersetzung nach der Formel $4\text{KC}y + 2\text{CoCy} + \text{HO} = \text{Co}_2\text{Cy}_6, 3\text{K} + \text{KO} + \text{H}$ verlangt 0,68. — Concentrirte Schwefel- und Salpetersäure schlagen aus wässrigem Kobaltidcyan kalium die Kobaltidcyanwasserstoffsäure nieder, mit heißer Schwefelsäure zerfällt es wie die letztere. *Kobaltidcyan natrium* $\text{Co}_2\text{Cy}_6, 3\text{Na} + 4\text{HO}$ wird wie

die beiden folgenden Salze durch sorgfältiges Neutralisiren <sup>Kobaltcyan-
verbindungen.</sup> von kohlen. Natron mit der Säure in leichtlöslichen langen, farblosen Nadeln erhalten, die bei 100° ihren ganzen Wassergehalt (11,25 pC.) verlieren. Es ist unlöslich in Alkohol. — *Kobaltidcyanammonium*, $\text{Co}_2\text{Cy}_6, 3\text{NH}_4 + \text{HO}$, krystallisirt in geschobenen vierseitigen Tafeln, die erst bei 225° in Cyanammonium, kohlen. Ammoniak und einen blauen Rückstand zerfallen. — *Kobaltidcyanbaryum*, $\text{Co}_2\text{Cy}_6, 3\text{Ba} + 22\text{HO}$, bildet leichtlösliche, farblose, durchsichtige Prismen, welche bei 100° 23,29 pC. = 16 At. Wasser verlieren. — *Kobaltidcyankupfer*, $\text{Co}_2\text{Cy}_6, 3\text{Cu} + 7\text{HO}$, durch Fällung eines löslichen Kupferoxydsalzes mit Kobaltidcyankalium oder auch der Säure, ist hellblau, durch fixe Alkalien unter Abscheidung von Kupferoxyd zerlegbar, und verliert bei 240° 12,94 pC. (berechn. 12,06) = 5 At. Wasser. Aus seiner Lösung in Ammoniak krystallisiren glänzende, lasurblaue, vierseitige Prismen mit achtfächiger Zuspitzung; sie sind *Kobaltidcyankupferammoniak*, $\text{Co}_2\text{Cy}_6, 3\text{Cu} + 2\text{NH}_3 + 5\text{HO}$, das durch Säuren in Ammoniaksalz und Kobaltidcyankupfer, durch Alkalien wie letzteres zerlegt wird. — *Kobaltidcyankobalt*, $\text{Co}_2\text{Cy}_6, 3\text{Co} + 14\text{HO}$, wird aus Kobaltoxydulsalzen durch Kobaltidcyankalium oder die Säure als hellrothes, in Wasser und Säuren unlösliches Pulver gefällt, das bei 220° seinen ganzen Wassergehalt (ber. 29,25 pC., gef. 28,93) verliert und dann intensiv blau ist. Es enthält 2 At. Wasser mehr als die durch Zersetzung der Säure entstehende analoge Verbindung. — *Kobaltidcyannickel*, $\text{Co}_2\text{Cy}_6, 3\text{Ni} + 12\text{HO}$, wird nur durch Fällung eines Nickeloxxydulsalzes mit überschüssiger Kobaltidcyanwasserstoffsäure rein erhalten; es ist frisch gefällt gallertartig, hellblau, nach dem Trocknen grünlichblau, von muschlichem Bruch. Aus der Lösung der frisch gefällten Verbindung in Ammoniak scheidet sich beim Verdunsten oder durch Zusatz von Weingeist in Wasser unlösliches *Kobaltidcyannickelammoniak*, $\text{Co}_2\text{Cy}_6, 3\text{Ni} + 2\text{NH}_3 + 7\text{HO}$ ab. — Zersetzt man kohlen. Bleioxyd mit Kobaltidcyanwasserstoffsäure, so krystallisirt aus der Auflösung

Kobaltcyanverbindungen. neutrales *Kobaltidcyanblei*, Co_2Cy_6 , 3 Pb + 4 HO, in perlmutterglänzenden, in Alkohol unlöslichen Blättchen, die bei 100° 3 At. Wasser und bei 180° das übrige verlieren. Ihre wässerige Lösung giebt mit Ammoniak einen weissen Niederschlag von basischem Kobaltidcyanblei, Co_2Cy_6 , 3 Pb + 6 PbO + 3 HO; die überstehende Flüssigkeit enthält nur Kobaltidcyanammonium. — *Kobaltidcyansilber*, Co_2Cy_6 , 3 Ag, ist weiss, käsig, in Wasser und Säuren unlöslich; seine Auflösung in Ammoniak liefert beim Verdunsten farblose durchsichtige Säulen von *Kobaltidcyansilberammoniak*, Co_2Cy_6 , 3 Ag + NH_3 + HO, das in Wasser unlöslich ist und erst bei 170° seinen Gehalt an Wasser und Ammoniak abgiebt (1).

Platincyanverbindungen. B. Quadrat (2) hat eine Reihe von Platincyanverbindungen beschrieben, über deren wirkliche Existenz indessen weitere Untersuchungen noch zu entscheiden haben.

Das Gmelin'sche, durch Glühen von Platinschwamm mit Blutlaugensalz bereitete, Platincyankalium hat, nach den von dem Entdecker und von Rammelsberg ausgeführten Analysen, die auch von Quadrat bestätigt werden, im wasserfreien Zustande die Formel $\text{KC}_y, \text{Pt}_2\text{Cy}_3$. Knop erhielt durch vorsichtige Behandlung der gesättigten Lösung dieses Salzes mit Chlor oder Königswasser die kupferrothe Verbindung $2\text{KC}_y, \text{Pt}_2\text{Cy}_3$, das Kaliumplatinsesquicyanür, das nach L. Gmelin (Handb. IV, 440) wahrscheinlich $\text{KC}_y, \text{Pt}_2\text{Cy}_3$ ist.

Trägt man, nach Quadrat, Platinchlorür in überschüssiges Cyankalium ein und verdampft die Lösung, so erhält man dünne, lange, vierseitig prismatische Krystalle, die bei durchfallendem Lichte gelb, bei auffallendem lebhaft blau sind. Die Analyse des wasserfreien Salzes führte Q. zu der Formel $\text{Pt}_5\text{K}_6\text{Cy}_{11} = 5(\text{PtKC}_y)_2 + \text{KC}_y$, krystallisiert enthält es 21 At. (15,98 pC.) Wasser, von denen

(1) Es mag hier angeführt werden, dass Kobaltidcyankalium die salpeters. Quecksilbersalze weiss fällt, Quecksilberchlorid aber sich damit ohne Trübung mischt. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 164; Pharm. Centr. 1848, 97; J. pharm. [8] XII, 457.

18 At. (14,03) bei 100° weggehen. Kocht man dieses Salz mit Schwefelsäure, so fällt gelbes Platincyanür nieder, aus dem durch Auflösen in Cyankalium die ursprüngliche Verbindung wieder entsteht. Es ist löslich in 3 Th. Wasser, auch in Alkohol und Aether; durch Quecksilberoxydsalze wird es weiß, durch überschüssiges salpeters. Quecksilberoxydul smalteblau gefällt. Mit Kupfervitriol entsteht die in Wasser und Säuren unlösliche lichtgrüne Kupferverbindung 5 (Pt Cu Cy₂), Cu Cy, aus welcher durch Kochen mit kohlen. Natron, mit ätzendem Baryt, Strontian und Kalk die correspondirenden Salze dieser Basen 5 (Pt Na Cy₂), Na Cy + 28 HO, 5 (Pt Ba Cy₂), Ba Cy + 22 HO und 5 (Pt Ca Cy₂), Ca Cy + 27 HO erhalten werden; durch Zersetzung des Kalisalzes mit schwefels. Ammoniak und der Barytverbindung mit schwefels. Magnesia lassen sich das *Platincyanammonium* 5 (Pt NH₄ Cy₂), NH₄ Cy und das *Platincyanmagnesium* 5 (Pt Mg Cy₂), Mg Cy + 19 HO darstellen. Digerirt man die Kupferverbindung mit Ammoniak, so erhält man beim Verdunsten blaue Nadeln, die annähernd = Pt Cu Cy₂, 2 NH₃ + HO gefunden wurden. Mit Schwefelwasserstoff zerfällt das Platincyankupfer in Schwefelkupfer, Blausäure und in *Platincyanwasserstoffsäure*, Pt Cy₂ H, die in wasserhaltigen, blauschwarzen oder grüngelb-goldglänzenden Prismen krystallisirt, kohlen. Salze zerlegt, mit Ammoniakgas gelbes Platincyanammonium erzeugt, und mit Schwefelsäure in gelbes Platincyanür und Blausäure zerfällt.

Nach einer spätern Mittheilung desselben Chemikers (1) enthält die so bereitete Platincyanwasserstoffsäure so wie die damit dargestellten Salze eine Schwefelcyanverbindung, und durch directe Behandlung des Platincyankupfers (aus dem Gmelin'schen Salz mit Kupfervitriol dargestellt) mit gebrannter Magnesia oder Barytwasser erhält man Platincyanmagnesium oder Platincyanbaryum, welche der Kaliumverbindung proportional zusammengesetzt sind. Hiermit stimmen die Analysen der nach dieser Angabe von Bau-

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 249.

Platin-
cyanverbin-
dungen.




mert (1) dargestellten Verbindungen überein. Nach dem AuskrySTALLISIREN dieser letzteren bleiben, nach Quadrat, in der Mutterlauge Salze, deren Zusammensetzung von der der Kaliumverbindung abweicht; sie sind farblos und in Alkohol weit löslicher. — Laurent hält ebenfalls die Quadrat'schen Salze für analog zusammengesetzt mit dem Gmelin'schen Platincyankalium und den demselben correspondirenden Verbindungen; nach dem Vorhergehenden kann man es aber für gewiß halten, daß noch andere Verbindungen bei ihrer Darstellung entstehen, welche wahrscheinlich mit den eigentlichen Platincyanmetallen Doppelverbindungen bilden.

Quecksilber-
platincyankalium-
salpetersauer
Quecksilberoxydul.

Der smalteblaue Niederschlag, welchen salpeters. Quecksilberoxydul in Kaliumplatincyankalium bildet, hat nach Rammelsberg (2) die Formel $\text{Hg}_2\text{O}, \text{NO}_3 + 5 \text{HgCy}, \text{PtCy} + 10 \text{HO}$; er wird durch Wasser in beide erstere Bestandtheile zerlegt. — Quadrat hält das aus seiner Kaliumverbindung bereitete blaue Salz für eine Verbindung von Platincyunquecksilber, 5 (PtHgCy_2) , HgCy , mit veränderlichen Mengen von salpeters. Quecksilberoxydul.

Cyanverbin-
dungen.
Ansichten
über ihre Con-
stitution.

Ueber die Constitution der Ferrocyanverbindungen hat man bis jetzt drei Ansichten aufgestellt. Nach der einen ist



Die andere Ansicht stellt als Radicale das Ferrocyan = $\text{C}_6\text{N}_3\text{Fe}$, Ferricyan = $\text{C}_{12}\text{N}_6\text{Fe}_2$, Platinocyan = $\text{C}_4\text{N}_2\text{Pt}$, Platincyankalium = $\text{C}_{10}\text{N}_5\text{Pt}_2$ u. s. w. auf; die dritte Ansicht endlich nimmt ein polymeres Cyan, C_2N ; C_4N_2 , C_6N_3 , ..., C_{12}N_6 u. s. f. an, dessen Verbindungen man nach Laurent (3) sämmtlich auf die Formel C_2NM (nach Laurent-Gerhardt'schen Atomgewichten $\text{C}_2\text{N}_2\text{M}_2$) zurückführen kann, worin M die Summe der Aequivalente von 2 bis 3 ver-

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 250. — (2) Pogg. Ann. LXXXIII, 117; J. pr. Chem. XLI, 184; Berl. Acad. Ber. 1847, 115. — (3) Compt. rend. XXVI, 294; Pharm. Centr. 1848, 423; J. pr. Chem. XLII, 128.

schiedenen Metallen bezeichnet. Wir geben hier ein Beispiel der Laurent'schen Formeln, worin $C = 6$, $N = 7$, $H = \frac{1}{2}$ und das Atomgew. der Metalle halb so groß, als gewöhnlich, genommen ist, und erinnern daran, daß L. das Eisenoxydul OFe_2 (wo $Fe_2 = Fe$ nach dem sonst hier dafür angenommenen Atomgewicht), das Eisenoxyd Of_2 (wo $f_2 = \frac{1}{2} Fe$ nach dem sonst hier dafür angenommenen Atomgewicht) schreibt (wonach also das Eisen im Oxyd ein Atomgewicht hat, das nur $\frac{1}{2}$ von dem des Eisens im Oxydul beträgt), und das Atomgewicht des Platins im Oxydul $= OPt_2$ doppelt so groß annimmt, als im Oxyd $= O pt_2$.

Cyanverbindungen.
Ansichten
über ihre Constitution.

Ferrocyanüre $C, N, Fe_3 M_3$.

Ferrocyankalium $C, N, Fe_3 K_3 + HO$.

Ferrocyankaliumbaryum $C, N, Fe_3 Ba_3 K_3 + HO$.

Berlinerblau $C, N, Fe_3 f_3 + 2 HO$.

Ferricyanüre C, N, fM .

Kobaltcyanüre C, N, CoM .

Platinocyanüre C, N, PtM .

Platini-platinocyanüre $C, N, Pt_3 pt_3 M_3$.

Daß dies lediglich andere Ausdrücke für bekannte Zusammensetzungen sind, welche eine neue Theorie nicht einschließen oder begründen, ist klar.

Rammelsberg (1) hat das Verhalten einer Reihe von Cyanverbindungen in höherer Temperatur untersucht. — *Cyansilber* verwandelt sich in Paracyansilber, unter Entwicklung der Hälfte des Cyans in Gasform, das nicht, wie H. Thaulow angab, andere Eigenschaften als das gewöhnliche Cyangas besitzt (2). *Cyanzink* und *Cyankupfer* hinterlassen ebenfalls reine Paracyanmetalle; *Cyannickel*, *Cyankobalt* hinterlassen eine schwarze Masse, die auf 6 Aeq. Metall 12 Aeq. Kohlenstoff und 1 Aeq. Stickstoff enthält, und die als Paracyan- und Kohlenmetall zu betrachten ist; *Ferrocyanwasserstoffsäure* liefert anfangs Wasser und Blau-

Cyanverbindungen.
Verhalten in
höherer Temperatur.

(1) Pogg. Ann. LXXIII, 80; Berl. Acad. Ber. 1847, 115; J. pr. Chem. XLI, 180; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 298; Pharm. Centr. 1847, 59. —

(2) Vergl. Liebig in den Ann. Ch. Pharm. L, 357.

Cyan-
verbindun-
gen.
Verhalten in
höherer Tem-
peratur.

säure, und das rückständige *Eisencyanür* zerfällt ebenfalls in Paracyan- und Kohleneisen, auf 12 Aeq. Eisen 20 Aeq. Kohlenstoff und 5 Aeq. Stickstoff enthaltend. *Ferrocyan-kalium* hinterläßt, wie schon Berzelius nachgewiesen, Cyankalium und Kohleneisen FeC_2 . *Ferrocyan-calcium* und *Ferrocyan-zink* verhalten sich ebenso; *Ferrocyanblei* entwickelt $\frac{1}{2}$ des Kohlen- und $\frac{1}{2}$ des Stickstoffgehalts als Cyan- und Stickgas; der Rückstand ist Paracyanblei und Paracyaneisen, gemengt mit Kohle. *Ferrocyan-kupfer* liefert bei 150° Cyangas, indem ein bräunlichschwarzes Gemenge von Paracyan-kupfer und Paracyaneisen mit Kohle bleibt. *Berlinerblau* (aus Eisen-oxydsalz und Blutlaugensalz bereitet, also etwas kaliumhaltig), das lufttrocken 18 Aeq., bei $160-170^\circ$ aber 9 At. Wasser zu enthalten scheint und bei 250° wasserfrei wird, hinterläßt einen (etwa 60 pC. des letzteren betragenden) Rückstand, der etwa 15 pC. Stickstoff enthält (auf 7 Aeq. Metall 7 Aeq. Kohle und 3 Aeq. Stickstoff), und demnach als ein Ge-menge von Paracyaneisen und Kohleneisen anzusehen ist.

Cyan-
quecksilber;
Zersetzung
durch Chlor.

Cyanquecksilber zersetzt sich, nach den Untersuchun-gen von Bouis (1), wenn man seine gesättigte und heiße wässrige Lösung im Sonnenlicht mit überschüssigem Chlor behandelt, in Chlorquecksilber, Salzsäure und Salmiak, die im Wasser gelöst bleiben, in Chlorcyan, Kohlensäure und Stickstoff, die entweichen, und in eine, $\frac{1}{2}$ des Cyanqueck-silbers betragende, gelbe, öartige Flüssigkeit, für welche Bouis die Formel $\text{C}_{12}\text{N}_4\text{Cl}_{14} = \text{C}_8\text{N}_4\text{Cl}_8 + \text{C}_4\text{Cl}_6$ auf-stellt. Sie riecht äußerst heftig, zu Thränen reizend, schmeckt ätzend, ist schwerer als Wasser, darin unlöslich, aber leicht davon zersetzbar unter Bildung von Salzsäure, Kohlensäure und Stickgas (2). In Alkohol und Aether ist sie auflöslich. Mit der Zeit setzt sie, unter Entfärbung, Chlor-kohlenstoff C_4Cl_6 ab. Beim Erhitzen explodirt sie heftig,

(1) Ann. ch. phys. [8] XX, 446; J. pr. Chem. XLII, 45; Pharm. Centr. 1847, 778; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 305. — (2) Beim Einleiten von Chlor in eine Mischung von knallsaurem Silberoxyd und Wasser entsteht ein Körper von sehr ähnlichen Eigenschaften.

beim mäßigen Erwärmen zerfällt sie in Stickgas, etwas Kohlensäure und in eine farblose, bei längerem Stehen Krystalle von Chlorkohlenstoff C_4Cl_6 absetzende Flüssigkeit, die im reinen Zustande nach Bouis die Formel $C_{30}N_4Cl_{22} = C_8N_4Cl_4 + 3 C_4Cl_6$ hat.

Cyan-
quecksilber;
Zersetzung
durch Chlor.

Erwärmt man die gelbe Verbindung, $C_{12}N_4Cl_{14}$, mit starker Salpetersäure gelinde, so entwickeln sich unter äußerst heftiger Einwirkung Stickgas, Kohlensäure, salpetrige Dämpfe, während sich in der Vorlage Chlorkohlenstoff und eine im reinen Zustande farblose, sehr flüchtige, weit heftiger als die vorhergehenden riechende Flüssigkeit verdichtet, für welche Bouis die Formel $C_{12}N_4Cl_{14}O_4 = C_8N_4O_4Cl_6, C_4Cl_6$ aufstellt. Sie wäre darnach ein einfaches Oxydationsproduct der ersteren Flüssigkeit.

Durch Einwirkung von Ammoniak auf das gelbe Oel entsteht unter Gasentwicklung, neben Salmiak und Chlorkohlenstoff, ein rother, in Wasser, Alkohol und Aether wenig löslicher, pulveriger Körper, dessen Natur nicht weiter ermittelt ist. — Mit Kalium detonirt die gelbe Flüssigkeit sehr heftig.

Die schon von Stenhouse widerlegte Angabe Aimé's, daß bei der Einwirkung des Chlors auf in Alkohol oder Holzgeist gelöstes Cyanquecksilber eine Chlorcyanverbindung des Aethyls oder Methyls erzeugt werde, hat auch Bouis (1) unrichtig befunden. Er zeigte, daß die Zersetzung des Alkohols oder Holzgeists in die S. 486 beschriebenen Producte unabhängig von der des Cyanquecksilbers ist, dessen Cyan dabei vollständig in Kohlensäure, Chlorcyan und Salmiak zerfällt.

Fritzsche (2) hält die von Berzelius (3) aufgestellte, von Liebig (4) bekämpfte Ansicht, daß die Knallsäure eine gepaarte Säure sei, worin ein Stickstoffmetall, aus

Knallsäuren.
Constitution
und Nomenclatur.

(1) Ann. ch. phys. [3] XXI, 111; J. pr. Chem. XLII, 301; Pharm. Centr. 1847, 815. 902; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 316. — (2) Petersb. Acad. Bull. VII, 42; J. pr. Chem. XLIV, 150. — (3) Ann. Ch. Pharm. L, 426. — (4) Ann. Ch. Pharm. L, 429.

Knallkuren. gleichen Aeq. beider Elemente bestehend, mit der hypothetischen Säure C_4NO_3 , HO verbunden wäre, für den „allen Anforderungen genügenden Ausdruck ihrer Constitution“, die durch die Entdeckung der Osman-Osmiumsäure, womit die Existenz der fraglichen Stickstoffmetalle aufser Zweifel gesetzt sei, eine mächtige Stütze erhalten habe. Er wünscht die in Folge dieser Ansicht von Berzelius vorgeschlagenen Benennungen: *Silber-, Quecksilber-Zinkknallsäure*, durch rationellere zu ersetzen, die, nach dem Berzelius'schen Nomenclaturprincip für die Producte der trocknen Destillation angepafst, also lauten: *Argentan-, Mercuran-, Cupran-, Zincan-Tetransäure*. — Diese Ansicht läfst sich mit den folgenden Thatsachen nicht leicht in Uebereinstimmung bringen.

J. H. Gladstone (1) hat Liebig's Angabe (2), dafs das knalls. Kupferoxyd-Ammoniak bei seiner Zerlegung mit Schwefelwasserstoff in Harnstoff und Schwefelcyanammonium zerfalle, durch die Analyse bewiesen. Er hat beide Zersetzungsproducte, den Harnstoff als oxals. Salz, die Schwefelblausäure als Schwefelcyansilber, der Analyse unterworfen. Demnach zersetzten sich 1 At. knalls. Kupferoxyd-Ammoniak und 3 At. Schwefelwasserstoff zu 1 At. Schwefelkupfer, 1 At. Harnstoff, 1 At. Schwefelblausäure und 2 At. Wasser :



Cyanursäure. Erhitzt man, nach de Vry (3), salzs. Harnstoff auf 145° , so zerfällt er in Salmiak und in reine Cyanursäure. Bei 320° entsteht das von Liebig und Wöhler entdeckte Zersetzungsproduct des Harnstoffs $C_4N_4H_4O_4$. — Wurtz (4) empfiehlt als beste Bereitungsmethode der Cyanursäure die Zersetzung von geschmolzenem Harnstoff durch trocknes Chlorgas. Die Producte sind Cyanursäure, Salmiak, Salz-

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 1; Pharm. Centr. 1848, 637. — (2) Vgl. Lancet, December 1844. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXI, 249; J. pr. Chem. XL, 498; Pharm. Centr. 1847, 448. — (4) Compt. rend. XXIV, 486; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 807.

säure und Stickstoff; erstere erhält man durch Waschen der ^{Cyanursäure} Masse mit kaltem Wasser.

Nach Liebig ist die Cyanursäure eine dreibasische Säure, in der aller Wasserstoff in der Form von (im Silbersalz) vertretbarem Wasser enthalten ist, $= C_6N_3O_3 + 3HO$. Wöhler (1) hält, in Folge der näheren Untersuchung ihrer Salze, dieselbe für eine zweibasische Säure $= C_6N_3HO_4 + 2HO$, für eine gepaarte Cyansäure, worin der mit Cyansäurehydrat oder der unlöslichen Cyanursäure isomere Paarling — C_2HNO_2 , das Berzelius'sche Urenoxyd — mit 2 Aeq. Cyansäure verbunden ist.

Cyanurs. Silberoxyd, $C_6N_3HO_4, 2AgO$, entsteht durch Auflösen von kohlens. Silberoxyd in siedendheißer überschüssiger Cyanursäure, oder durch Eintröpfeln von cyanurs. Ammoniak in eine überschüssige heiße Lösung von salpeters. Silberoxyd, oder am sichersten durch Vermischen heißer Auflösungen von Cyanursäure und essigs. Silberoxyd. Es ist ein farbloses, krystallinisches Pulver, das über 200° zersetzt wird, in Wasserstoffgas aber schon bei 100° in violettschwarzes Oxydulsalz übergeht. Es ist unlöslich in Wasser und Essigsäure, leicht zersetzbar durch Salpetersäure. Durch Digestion mit concentrirtem Ammoniak verwandelt es sich, ohne sich aufzulösen, in das Salz $C_6N_3HO_4, 2AgO + 2NH_3$, das zwischen 200 und 300° alles Ammoniak verliert. Durch Digestion mit Kalilauge verwandelt sich das cyanurs. Silberoxyd in eine Verbindung, worin wahrscheinlich $\frac{1}{2}$ der Basis Kali ist.

Versetzt man, nach Liebig's Vorschrift, zur Darstellung des dreibasisch cyanurs. Silberoxyds, eine siedende Lösung von Cyanursäure mit überschüssigem Ammoniak und dann mit salpeters. Silberoxyd, so fällt ein aus mikroskopischen Prismen bestehendes, mit Kali Ammoniak entwickelndes Salz nieder, das bei 300° getrocknet, wo-

(1) Ann. Ch. Pharm. LXII, 241; Pharm. Centr. 1847, 641; J. pharm.

[3] XII, 375. Laurent's Bemerkungen Ann. ch. phys. [3] XXIII, 114; J. pr. Chem. XLV, 171.

Cyanursäure. durch es ammoniakfrei wird, 70,55 pC. Silber liefert, Wasserstoff als wesentliches Element enthält, und $C_6N_3HO_4$, 3 AgO ist. — Die von diesem Salze heifs abgelaufene Flüssigkeit setzt beim Erkalten eine weisse Verbindung ab, die nach Wöhler wahrscheinlich die Formel $C_6N_3HO_4$, 3 AgO + $C_6N_3HO_4$, 3 NH_4O hat (berechnet 49,9, gefunden 49,4 pC. Silber), und bei 250° 2 Aeq. Ammoniak und 1 Aeq. Wasser verliert. Sie entsteht auch, wenn man salpeters. Silberoxyd und krystallisirtes cyanurs. Ammoniak heifs vermischt und den Niederschlag mit der Flüssigkeit kocht. — *Cyanurs. Bleioxyd*, $C_6N_3HO_4$, 3 PbO + 2 HO, bildet sich beim Eintragen von frisch gefälltem kohlen. Bleioxyd in heisse überschüssige Cyanursäure, beim Füllen von essigs. Bleioxyd mit cyanurs. Ammoniak und mit Cyanursäure, oder am sichersten beim Eintropfen von basisch essigs. Bleioxyd in überschüssige siedendheisse Cyanursäurelösung. Es bildet mikroskopische Prismen mit schief angesetzten Endflächen, beim Erhitzen in Wasserstoff in Cyanammonium, Harnstoff und metallisches Blei zerfallend. Durch Kochen mit salpeters. Silberoxyd entsteht daraus ein Salz von der Formel $C_6N_3HO_4$, 2 AgO, PbO + HO. — *Kupfersalze* der Cyanursäure liefsen sich nicht von bestimmter Zusammensetzung erhalten; beim Vermischen von Cyanursäure mit schwefels. Kupferoxyd, beide in verdünnter ammoniakalischer Lösung, scheidet sich ein veilchenblaues, in Wasser unlösliches Salz ab, das unter dem Mikroskop als amethystfarbene vierseitige Prismen mit zwei breiteren Seitenflächen und zweiflächiger Zuschärfung erscheint, und wahrscheinlich = $C_6N_3HO_4$, 2 CuO + 2 NH_3 + 3 HO ist. — Tröpfelt man Barytwasser in eine siedende Lösung von Cyanursäure, so lange der entstehende Niederschlag sich wieder löst, so erhält man ein krystallinisches saures *Barytsalz*, $C_6N_3HO_4$, 2 BaO + $C_6N_3HO_4$, 2 HO + 4 HO, welches die 4 At. Krystallwasser bei 280° verliert. Das neutrale Salz, $C_6N_3HO_4$, 2 BaO + 3 HO, fällt aus heifser Cyanursäurelösung auf Zusatz von Chlorbaryum und

Ammoniak oder überschüssigem Barytwasser nieder. — Das schwer lösliche *Kahisalz* ist nach Wöhler $C_6N_3HO_4$, $2KO + C_6N_3HO_4$, $2HO$; das durch Wasser zersetzbare $C_6N_3HO_4$, $2KO$. — Mit der Ansicht von Wöhler über die Constitution der Cyanursäure stehen die Untersuchungen von Wurtz (1) nicht in Einklang, sofern dieser für den Cyanursäureäther die Formel $C_6N_3O_3 + 3C_4H_5O$ und für die entsprechende Methylverbindung die Formel $C_6N_3O_3$, $3C_4H_5O$ fand.

Liebig (2) hat gezeigt, daß das Cyanammonium den ^{Schwefelcyan-}höheren Schweflungsstufen des Schwefelammoniums den ^{ammonium.}Schwefelüberschufs, welchen sie mehr als das Einfach-Schwefelammonium enthalten, unter Bildung von Schwefelcyanammonium entzieht, und darauf eine Methode zur Darstellung der letzteren Verbindung gegründet. Folgende Verhältnisse sind vortheilhaft: Man sättigt 2 Th. wässriges Ammoniak von 0,95 spec. Gew. mit Schwefelwasserstoff, mischt das erhaltene Schwefelwasserstoff-Schwefelammonium mit 6 Th. desselben wässrigen Ammoniaks, und setzt dieser Mischung 2 Th. Schwefelblumen und das Destillat von 6 Th. Blutlaugensalz, 3 Th. Vitriolöl und 18 Th. Wasser zu. Diese Mischung digerirt man im Wasserbade, bis sich der Schwefel nicht mehr vermindert und die Flüssigkeit gelb geworden ist; man erhitzt sie sodann zum Sieden solange, bis das Schwefelammonium entfernt und die Flüssigkeit wieder farblos ist. Man filtrirt nun und verdampft zur Krystallisation, wo man $3\frac{1}{2}$ bis $3\frac{1}{2}$ Th. blendend weißes Salz erhält. Es bleibt $\frac{1}{4}$ Th. Schwefel ungelöst. *

Das sogenannte Schwefelcyan (aus Schwefelcyanalkium durch Chlor dargestellt) wurde von A. Jamieson (3) der ^{Mellon-}Analyse unterworfen, nachdem er es solange mit siedendem ^{verbindun-}Wasser behandelt hatte, bis das Filtrat durch Eisensalze ^{gen.}

(1) Compt. rend. XXVI, 268. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXI, 126; Pharm. Centr. 1847, 303. — (3) Ann. Ch. Pharm. LIX, 339.

Pseudo-
schwefelcyan
und Schwefel-
mellon-
wasserstoff.


nicht mehr geröthet wurde. Zu dieser Behandlung gehören viele Tage, indem es sonst nicht gelingt, die Ueberschwefelblausäure, welche in Wasser sehr schwer löslich ist und deren Entstehung bei der Darstellung des gelben Körpers nicht vermieden werden kann, davon zu trennen. Jamieson fand das Pseudoschwefelcyan nach der Formel $C_4N_2S_4H + HO$ zusammengesetzt, wonach es betrachtet werden kann als eine Verbindung von Schwefelcyan mit Schwefelcyanwasserstoff und Wasser zu gleichen Aequivalenten, $C_2NS_2 + C_2NS_2H + HO$, oder als 2 At. Schwefelcyanwasserstoffsäure, welcher 1 H entzogen und 1 HO zuge treten ist (1). Durch Behandlung mit Schwefelwasserstoff - Schwefelkalium zerfällt das Pseudoschwefelcyan nach Jamieson in Schwefelcyankalium, Schwefelmellonkalium, Fünffach-Schwefelkalium, Schwefelwasserstoff und Kohlensäure. Zur Erklärung der Bildung des Schwefelmellonkaliums stellte J. folgende Gleichung auf, in welcher dieser Körper von dem Schwefelcyan, das in dem Pseudoschwefelcyan mit Schwefelcyanwasserstoff verbunden gedacht werden kann, abgeleitet ist :



Zur Erklärung der Zersetzung des Pseudoschwefelcyans, welche Jamieson sich nicht zur besonderen Aufgabe gewählt hatte, hätte der Gleichung noch hinzugefügt werden müssen: $C_4N_2S_4H_4 + 4(KS, HS) = C_4N_2S_4K_4 + 8HS$; nach seiner Ansicht bedurfte die Bildung des Schwefelcyankaliums keiner besonderen Erläuterung. Gerhardt und Laurent hatten für die Zusammensetzung des Pseudoschwefelcyans die Formel $C_4N_2S_4H$ angenommen, und erklären (2) die Entstehung des Schwefelmellonkaliums nach folgender Gleichung: $2C_4N_2S_4H + 4HO = C_4N_2S_4H_4 + 2C_2NS_2H + 2CO_2 + S_4$. Sie nehmen demnach an,

(1) L. Gmelin's Bemerkung (Handb. IV, 489) kann nur auf den Wassergehalt und nicht auf die Zusammensetzung des wasserfrei gedachten Pseudoschwefelcyans bezogen werden. — (2) J. pharm. [3] XI, 228; Ann. ch. phys. [3] XX, 118.

dafs das Pseudoschwefelcyan in diesem Zersetzungsprocefs in Schwefelmellonwasserstoffsäure, Schwefelcyanwasserstoffsäure, Kohlensäure und Schwefel zerfalle. Dieses ist gleichfalls die Ansicht von Jamieson. Sonderbarerweise glauben aber G. und L. durch ihre Gleichung ihre Formel des Pseudoschwefelcyans wahrscheinlicher gemacht zu haben, und sehen darin eine Stütze ihrer Ansicht für dessen Zusammensetzung; allein Jamieson's Formel erklärt die Zersetzung auf eine gleich einfache Weise: $4C_4N_2S_4H_2O = C_6N_4S_4H_4 + 4(C_2NS_2H) + 2CO_2 + S_4$. Nach J. geht die Hälfte, nach L. und G. nur ein Drittel des Kohlenstoffs des Pseudoschwefelcyans in Schwefelblausäure über; eine Bestimmung der aus einer gewogenen Menge Pseudoschwefelcyan gebildeten Schwefelblausäure wäre geeignet, die Richtigkeit der einen oder der anderen Ansicht darzuthun. — Die Schwefelmellonwasserstoffsäure ist nach L. und G. Harnstoff-Ammelid (1), in dem der Sauerstoff durch Schwefel ersetzt ist:



Liebig (2) hat die Darstellung von Mellonkalium genauer beschrieben. In reines, in einer tubulirten Retorte zum Schmelzen gebrachtes Schwefelcyankalium trägt man, unter Verstärkung des Feuers, nach und nach rohes Mellon (etwa $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ vom Gewicht des Schwefelcyankaliums) ein, wobei sich Schwefel, ammoniakalische Producte und Schwefelkohlenstoff verflüchtigen. Man erhält die anfangs dickflüssige Masse in schwach glühendem, ruhigem Flufs, so lange noch entzündbares, beim Brennen nach schweflicher Säure riechendes Gas entweicht und bis die Entwicklung von Cyangas beginnt. Wenn die Operation gelungen ist, so bilden sich während des Erkaltes der geschmolzenen Masse, bei einer über dem Schmelzpunkte des Schwefelcyankaliums liegenden Temperatur, aus feinen, sternförmig vereinigten Mellonkalium.

(1) Liebig u. Wöhler in den Ann. Ch. Pharm. LIV, 371. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXI, 262; J. pr. Chem. XL, 497; Pharm. Centr. 1847, 495.

Mellithsäure. ches aus der Lösung dieses Salzes auf Zusatz von concentrirter Ammoniakflüssigkeit niederfällt, und für die Krystalle, zu welchen sich dieses Pulver nach und nach vereinigt; sie fanden, daß das verwitterte Salz 1 HO weniger enthält. *Dreifach-melliths. Ammoniak* krystallisirte aus einer Flüssigkeit, welche durch Zersetzung von ammoniakhaltigem melliths. Kupferoxyd durch Schwefelwasserstoff erhalten worden war, nach dem Abdampfen in rhombischen Krystallen (nach Naumann's Bestimmung $\infty P. \infty \bar{P} \infty. \infty \check{P} \infty. 0P$; $\infty P : \infty P = 122^\circ$) und mit der Zusammensetzung $NH_4O, 3 C_4O_3 + 6 HO$. — Bei dem Fällern eines neutralen Kupferoxydsalzes mit melliths. Kali entsteht ein Niederschlag, welchem ein Gehalt an Kali nur höchst schwierig durch Waschen entzogen werden kann. Bei Mischung von essigs. Kupferoxyd mit Mellithsäure in der Kälte entsteht eine hellblaue steife Gallerte, welche nach dem Auspressen weiß und nach dem Trocknen blau und krystallinisch wird; überläßt man die Gallerte sich selbst, so entstehen darin kleine Krystallpünktchen, welche sich zu schönen durchsichtigen dunkelblauen Krystallen vergrößern; das *melliths. Kupferoxyd* so dargestellt ist $2 CuO, 3 C_4O_3 + 12 HO$. Wird essigs. Kupferoxyd kochend durch Mellithsäure gefällt, so ist der Niederschlag flockig; beim Auswaschen wird er unter Säureverlust krystallinisch, und es bleibt $CuO, C_4O_3 + 4 HO$ (lufttrocken). Ammoniakhaltiges melliths. Kupferoxyd bildet schön himmelblaue mikroskopische Krystalle, welche lufttrocken der Formel $3 (CuO, C_4O_3) + NH_4O, C_4O_3 + 18 HO$ entsprechend zusammengesetzt befunden wurden (bei 120° entweichen 15 HO mit Spuren von Ammoniak). — *Melliths. Kalk* und *Baryt* scheinen wasserfrei aber schwer zu trocknen zu sein (vergl. unten die abweichende Angabe von Schwarz). — Mellithsäure, welcher noch etwas Schwefelsäure anhing, gab nach anhaltendem Kochen mit absolutem Alkohol, Sättigen der Flüssigkeit mit Baryt, Entfernung des überschüssigen Baryts im Filtrat durch die Kohlensäure der Atmosphäre und Eintrocknen

des Filtrats im Vacuum über Schwefelsäure ein gummi-^{Mellithsäure.}artiges Barytsalz, dessen Kohlenstoff äußerst schwierig zu verbrennen ist. Dieses Salz ist nach Erdmann und Marchand *äthermelliths. Baryt*, $\text{BaO}, \text{C}_4\text{H}_2\text{O}, 2 \text{C}_4\text{O}_3$; es löst sich klar in Wasser; auf 100° erhitzt erleidet es eine partielle Zersetzung und hinterläßt mit Wasser behandelt kohlen. Baryt.

Erdmann und Marchand geben an, auch das neutrale melliths. Aethyloxyd (Mellithäther) dargestellt, aber noch nicht in einem zur Analyse hinlänglich reinen Zustande erhalten zu haben. Schwarz (1) konnte, ebenso wenig wie Wöhler, dasselbe erhalten. Auch Schwarz fand, daß die unlöslichen Salze der Mellithsäure leicht ammoniakhaltig erhalten werden, wenn man sie durch Fällung einer Metalllösung mit melliths. Ammoniak darstellt; das melliths. Silberoxyd erhält man nach ihm rein, wenn man die Auflösung des Ammoniaksalzes tropfenweise in einen Ueberschuß einer siedend heißen Lösung von salpeters. Silberoxyd fallen läßt; auch das so bereitete Silbersalz bleibt noch bei 200° weiß, während das ammoniakhaltige violettbraun wird. Schwarz bestätigte gleichfalls für das bei 100° getrocknete Silberoxyd- und Bleioxydsalz die Formel $\text{MeO}, \text{C}_4\text{O}_3$, für die krystallisirte Säure $\text{HO}, \text{C}_4\text{O}_3$ (nach dem Trocknen im Vacuum verlor diese bei 200° nur Spuren von Feuchtigkeit). Der *melliths. Baryt* scheidet sich bei der Bildung durch wechselseitige Zersetzung als dicke gallertförmige Masse ab, die zu glänzenden Krystallschuppen zusammensinkt; aus sehr verdünnten Lösungen kann er in feinen Nadeln erhalten werden; bis zu 100° erhitzt verliert er nur hygroskopisches Wasser und hält 1 At. Wasser zurück, welches erst bei etwa 330° weggeht. Für das *melliths. Ammoniak* fand auch Schwarz $\text{NH}_4\text{O}, \text{C}_4\text{O}_3 + 3 \text{HO}$, für das *melliths. Kupferoxyd* $\text{CuO}, \text{C}_4\text{O}_3 + 4 \text{HO}$ (3 HO entweichen bei 100° , unter grüner Färbung des

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 46.

Mellithsäure. Salzes, das 4. At. Wasser wird selbst bei 230° noch nicht ganz ausgetrieben). — Für die Bereitung der *Euchronsäure* fand Schwarz es am besten, das melliths. Ammoniak in einer weiten flachen Porcellanschale über freiem Kohlenfeuer unter beständigem Umrühren und Zerreiben so lange vorsichtig zu erhitzen, bis sich kein Ammoniak mehr entwickelt und das Salz in ein blafsgelbes Pulver verwandelt ist. Für die bei 200° getrocknete Euchronsäure fand er die Formel $2 \text{HO}, \text{C}_{12} \text{NO}_6$ bestätigt; durch Eintropfen von Barytwasser in eine warme überschüssige Lösung dieser Säure erhielt er ein blafsgelbes pulveriges Barytsalz, dessen Zusammensetzung nahe mit $\text{BaO}, \text{HO}, \text{C}_{12} \text{NO}_6$ stimmte. — Für das *Paramid* fand er die Zusammensetzung $\text{C}_6 \text{NHO}_4$ bestätigt (nach einem neueren Versuch von Wöhler wird dieses bei dem Kochen mit essigs. Bleioxyd, unter Bildung von essigs. Ammoniak, rein auf in melliths. Bleioxyd verwandelt). Paramid mit kaustischem Ammoniak übergossen wird sogleich gelb, voluminös, und partiell aufgelöst. Läßt man diese Lösung sogleich in Salzsäure fallen, so schlägt sich ein schneeweißer, pulveriger, aus mikroskopischen Krystallnadeln bestehender Körper nieder, welcher in heißem Wasser etwas löslich ist, auf Zink die blaue Reaction der Euchronsäure giebt, und aus der Lösung in Ammoniak durch Salzsäure gefällt wird; nach eintägigem Stehen dieser Lösung enthält sie nur melliths. Ammoniak. Für diesen (bei 179° getrockneten) Körper betrachtet Schwarz die Formel $\text{C}_{14} \text{H}_8 \text{N}_2 \text{O}_{14}$ als die wahrscheinlichste (die nur im Vacuum getrocknete Substanz enthält 1 HO mehr); er nennt ihn *Paramidsäure*. — Hinsichtlich des *Euchrons* beobachtete er, daß es sich in geringer Menge an dem den Wasserstoffpol bildenden Platin absetzt, wenn man den galvanischen Strom durch eine Euchronsäurelösung leitet.

Ozalsäure. L. Thompson(1) erhielt in 8 Versuchen von 28 Unzen Rohrzucker bei Behandlung mit 124 Unzen Salpetersäure

(1) Pharm. J. Trans. VIII, 117; Repert. Pharm. [3] I, 383.

von 1,245 spec. Gew. im ersten Versuch $17\frac{1}{2}$, in den folgenden (wo immer die oxalsäurehaltige Mutterlauge des vorhergehenden Versuchs zugesetzt wurde) 30 bis $32\frac{1}{2}$ Unzen krystallisirte Oxalsäure und $20\frac{1}{2}$ bis $22\frac{1}{2}$ Kohlensäure. Concentrirtere Salpetersäure bringt nach ihm zu starke Erhitzung unter Bildung von Ameisensäure hervor. Als das Schema, welches das Endresultat ausgedrückt giebt, nimmt er an: $C_{12}H_{11}O_{11} + 7NO_3 = 6CO_2 + 2HO + 7NO_2 + 3(C_2O_3, 3HO)$; im Anfang der Einwirkung gehe der Rohrzucker in Traubenzucker über.

Nach Anderson (1) bildet sich nach dem Auflösen gleicher Aequivalente Oxalsäure und Chlorkalium, Chlor-natrium oder Chlorammonium in heissem Wasser bei dem Abkühlen vierfach-oxals. Kali, zweifach-oxals. Natron oder Ammoniak; die Quantität des gebildeten sauren Salzes ist veränderlich je nach der Concentration der Flüssigkeit.

Das Vorkommen von *oxals. Kalk* in den einfachsten Zellenpflanzen und dem Secret der Schleimhäute (2), und eigenthümliche Krystallisationsphänomene dieses Salzes (3), wie sie unter dem Mikroskop beobachtet werden, hat C. Schmidt beschrieben.

Wird Wismuthoxyd mit saurem oxals. Kali gekocht, so verwandelt es sich nach Schwarzenberg (4) in ein weisses krystallinisches Pulver von *oxals. Wismuthoxyd*, das nur Spuren von Kali enthält und bei 100° getrocknet $BiO_3, 3C_2O_3 + 4HO$ ist.

In fast allen der am Ostseestrande des Samlandes aufgefundenen fossilen Hölzern, Coniferenzapfen und Braunkohlen hat G. Reich (5) einen Gehalt an Bernstein-säure nachgewiesen. — Bley (6) empfahl den Pharmaceuten, die Bernsteinsäure selbst darzustellen; er erhielt

(1) Chem. Soc. Qu. J. I, 231. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXI, 288; Pharm. Centr. 1847, 664. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXI, 307. — (4) Ann. Ch. Pharm. LXIV, 126; Pharm. Centr. 1847, 927. — (5) Arch. Pharm. [2] LIV, 155; Pharm. Centr. 1848, 543. — (6) Arch. Pharm. [2] LIII, 49; Pharm. Centr. 1848, 270.

**Bernstein-
säure.** (bei Anwendung von Glasretorten) von 16 Unzen Bernstein 0,4 bis 0,85 Unzen Bernsteinsäure, 9 bis 10½ Unzen Colophon (welches auch bei Zusatz von Schwefelsäure zu dem Bernstein, die mit einem gleichen Gewicht Wasser verdünnt war, zur Firnisbereitung nach dem Auswaschen mit soda-haltigem Wasser brauchbar war) und 3 bis 4½ Unzen Oel. Bei Destillation von 32 Unzen Bernstein mit 2 Unzen roher concentrirter Salzsäure wurden 1½ Unzen Bernsteinsäure, 21½ Unzen eines grünlich braunen ziemlich dünnflüssigen Oels, und 3 Unzen fast ganz verkohltes Colophon erhalten.

**Chlorsuccin-
säure.** Gerhardt (1) hat die Ansicht ausgesprochen, die wahre Zusammensetzung der Chlorsuccinsäure (*acide chloro-succique* von Malaguti (2), wofür dieser die Formel $C_6H_2Cl_3O_3$ gegeben hatte) sei $C_6H_3Cl_3O_4$, Metacetonsäure in welcher 3 H durch 3 Cl ersetzt sind.

Nicklès (3) hat die Krystallform der Chlorsuccinsäure untersucht, hält indefs seine Messungen für unzureichend zur genauen Ermittlung des Axensystems dieser Substanz. Sie scheint im monoklinometrischen System zu krystallisiren.

Äpfelsäure. Dessaignes und Chautard (4) theilen die Beobachtung mit, daß *neutraler äpfels. Kalk* mit Wasser in Berührung sich während 2 Tagen größtentheils in rauhe, durchscheinende Krystalle von etwa 1^{mm} Durchmesser verwandelte; die Zusammensetzung dieser Krystalle wurde zu $2CaO, C_6H_4O_8 + 6HO$ gefunden; bei 100° entweichen 5 HO. Die Wiederholung dieser Umwandlung gelang nicht. (Diese Krystalle bilden sich übrigens immer, wenn der Saft der Vogelbeeren mit Kalkmilch nahezu neutralisirt und, anstatt zu kochen, ruhig stehen gelassen wird, wo sie sich nach 2 bis 3 Tagen oft in dicken Krusten allmählig absetzen.)

Winkelmessungen an dem *saueren äpfels. Ammoniak* hat Nicklès (5) angestellt (vergl. S. 27).

(1) J. pharm. [3] XIV, 235. — (2) Berzelius' Jahresbericht XXVI, 772. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXII, 31. — (4) J. pharm. [3] XIII, 243; J. pr. Chem. XLV, 48; Pharm. Centr. 1848, 495. — (5) Compt. rend. XXVII, 270; J. pr. Chem. XLV, 372.

Citrons. Magnesia ist von Rogé-Delabarre (1) als Citronensäure. angenehm schmeckendes Purgirmittel empfohlen, und Mittheilung über die beste Bereitungsart dieses Arzneimittels von ihm, von Mialhe (2), von Massignon (3) und von Winkler (4) gemacht worden.

Cahours (5) hat die Einwirkung von Brom auf citrons. Einwirkung von Brom auf Citronensäure, Itaconsaure u. Citraconsaure Salze. itakons. und citrakons. Salze untersucht. Fügt man Brom in kleinen Portionen zu einer concentrirten Lösung von citrons. Kali, so verschwindet es, unter Erwärmung der Flüssigkeit und Entwicklung von Kohlensäure. Wird Brom zugesetzt bis kein Aufbrausen mehr eintritt und die Flüssigkeit dauernd röthlich gefärbt ist, und der Ueberschufs von Brom vorsichtig durch verdünnte Kalilauge weggenommen, so schlägt sich eine öltartige farblose Flüssigkeit von aromatischem Geruche nieder, welche eine Mischung von drei verschiedenen Substanzen ist; die flüchtigste unter diesen ist Bromoform (C_2HBr_3 ; Cahours beobachtete dafür das spec. Gew. 2,90 bei 12°, den Siedepunkt 152°, die Dampfdichte 8,63, welche letztere unter Voraussetzung einer Condensation auf 4 Vol. sich zu 8,55 berechnet), die wenigst flüchtige ist krystallisirbar und wird durch Erhitzung theilweise zersetzt, die dritte Substanz bildet sich nur in geringer Menge und ist von den beiden andern nicht zu befreien. Wenn man bei der Destillation der öltartigen Flüssigkeit mit Wasser die Operation unterbricht, sobald auf dem übergehenden Wasser bei dem Verdichten sich Oeltröpfchen nicht mehr ausscheiden, so erstarrt der Rückstand in der Retorte bei dem Erkalten krystallinisch. Man wascht diesen mit Wasser und löst ihn dann in kochendem Alkohol; aus einer heifs gesättigten Lösung krystallisiren bei dem Erkalten lange seidenglänzende weisse Nadeln, aus einer verdünnten Lösung bei freiwilligem Verdunsten durchsichtige

(1) J. pharm. [3] XI, 431. — (2) J. pharm. [3] XII, 27. — (3) J. pharm. [3] XII, 31. — (4) Jahrb. pr. Pharm. XVII, 280. — (5) Ann. ch. phys. [3] XIX, 484; J. pr. Chem. XLI, 59; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 350; J. pharm. [3] XIII, 292.

Einwirkung
von Brom auf
citronsaure,
itaconsaure u.
citraconsaure
Salze.

breite Tafeln. Der so erhaltene, in kaltem und heißem Wasser unlösliche, in Alkohol, Aether und Holzgeist lösliche Körper hat die Zusammensetzung $C_6HBr_2O_4$, und wird von Cahours als *Bromoxaform* bezeichnet; er schmilzt bei 74 bis 75°; stärker erhitzt sublimirt er zum Theil unzersetzt, zum Theil zersetzt er sich unter Entwicklung von Brom; concentrirte Kalilauge löst ihn in der Kälte und zersetzt ihn in der Hitze unter Bildung von Bromkalium, oxals. Kali und Bromoform; concentrirte Schwefelsäure löst ihn in gelinder Wärme etwas, und zersetzt ihn bei dem Kochen unter Entwicklung von Bromdämpfen und Bildung einer öligen Substanz; Salpetersäure von mittlerer Concentration wirkt in der Kälte darauf nicht ein, in der Hitze löst sie einen kleinen Theil davon (der bei dem Erkalten sich in feinen Nadeln ausscheidet), während der ungelöst bleibende Theil zu einem Oel schmilzt. das bei dem Erkalten krystallinisch erstarrt. — Citrons. Natron und Baryt verhalten sich dem citrons. Kali analog; citrons. Ammoniak verhält sich anders, indem es zwar mit Brom Kohlensäure reichlich entwickelt, aber keine ölartige Flüssigkeit bildet. — Wenn Brom tropfenweise einer concentrirten Lösung von neutralem itacon- oder citracons. Kali zugesetzt wird, so erhöht sich die Temperatur, es entwickelt sich Kohlensäure und allmählig scheidet sich eine ölartige Flüssigkeit ab. Diese wird mit Wasser gewaschen, dann in sehr verdünnter Kalilauge gelöst, wobei ein geringer aromatisch riechender Rückstand bleibt; aus der alkalischen Lösung scheidet verdünnte Salzsäure manchmal einen ölartigen, manchmal einen butterartigen, bald fest werdenden Körper ab — zwei ganz gleich zusammengesetzte Körper, welche außer dem Aggregatzustand noch dadurch verschieden sind, daß der feste löslicher ist als der flüssige. Der flüssige Körper ist, gewaschen und im Vacuum über Schwefelsäure getrocknet, eine schwach ambergelbe Flüssigkeit von eigenthümlichem Geruch, scharfem Geschmack und größerem spec. Gew. als Wasser, welche sich wenig in Wasser, nach jedem Ver-

hältniß in Alkohol und Aether löst, nach der Formel $C_6H_5Br_2O_4$ zusammengesetzt ist, bei längerer Aufbewahrung manchmal flüssig bleibt, manchmal krystallisirt, bei der Destillation sich theilweise unter Entwicklung von Bromwasserstoff und Bildung eines kohligen Rückstandes zersetzt, durch Salpetersäure von mittlerer Concentration kaum angegriffen wird, von concentrirter Schwefelsäure bei gelinder Wärme gelöst und aus dieser Lösung durch Wasser theilweise wieder gefällt wird, und durch concentrirte Kalilauge unter Erhitzung und Entwicklung eines ganz eigenthümlichen Geruchs in der Art zersetzt wird, daß Säuren aus der Lösung kein Oel mehr abscheiden; dieser Körper ist eine (von Cahours als *Bromotriconsäure* bezeichnete) Säure, welche mit Ammoniak ein in gelblichweißen, fettig anzuühlenden Schuppen krystallisirendes, in Wasser und in Alkohol lösliches Ammoniaksalz $NH_4O, HO, 2(C_6H_5Br_2O_3)$, mit Silberoxyd (durch Zersetzung dieses Ammoniaksalzes mit salpeters. Silberoxyd als einen molkigen, in Wasser etwas löslichen, nach einiger Zeit zu einer zähen Masse werdenden Niederschlag) ein Silberoxydsalz $AgO, C_6H_5Br_2O_3$, mit Aethyloxyd (durch Lösen der Säure in Alkohol, Sättigen mit Chlorwasserstoff bei 70 bis 80°, Destilliren, Zusatz von Wasser zum Destillat, wo sich ein schweres Oel ausscheidet, das erst mit alkalischem, dann mit reinem Wasser gewaschen wird) einen flüssigen, erhitzt durchdringend riechenden, nach Rettig schmeckenden Aether $C_6H_5O, C_6H_5Br_2O_3$ giebt, welcher schwerer als Wasser ist und bei der Destillation sich theilweise zersetzt. Die feste Säure, in welche sich auch die flüssige manchmal allmählig verwandelt, wird durch Umkrystallisiren aus Aether in Form langer seidenglänzender Nadeln erhalten; sie hat dieselbe Zusammensetzung wie die vorhergehende flüssige, schmilzt bei wenig erhöhter Temperatur, verflüchtigt sich bei vorsichtiger Erhitzung fast vollständig ohne Zersetzung, ist in Wasser, namentlich in kochendem, ziemlich löslich und scheidet sich bei dem Erkalten in feinen Nadeln aus dieser

Einwirkung
von Brom auf
citronsaure,
itaconsaure u.
citraconsaure
Salze.

Einwirkung
von Brom auf
citronsaure,
itaconsaure u.
citraconsaure
Balsc.

Lösung ab; sie bildet mit den Alkalien lösliche und krystallisirbare, mit Bleioxyd und Silberoxyd wenig lösliche Verbindungen. — Wenn man Brom auf eine Lösung von citracons. Kali einwirken läßt, welche überschüssiges Alkali enthält, so entwickelt sich auch Kohlensäure und tritt Bildung eines gelblichen Oels ein, welches verdünnte Kalilauge theilweise löst, unter Zurücklassung eines angenehm riechenden Oels; die von dem Kali aufgenommene, durch Säuren in weissen krystallinischen Flocken abscheidbare, Säure wird durch Waschen mit sehr wenig Wasser, Auspressen zwischen Fließpapier, Trocknen im Vacuum, Umkrystallisiren aus Aether in Form langer Nadeln erhalten, welche die Zusammensetzung $C_6H_4Br_2O_4$ haben, in Wasser, besonders in kochendem, sich ziemlich, und in allen Verhältnissen in Alkohol und Aether lösen, und bei vorsichtiger Erwärmung fast ganz ohne Zersetzung flüchtig sind; Cahours nennt sie *Bromitonsäure*. — Die Säuren $C_6H_4Br_2O_4$ und $C_6H_4Br_2O_4$ lassen sich als Buttersäure und Metacetonsäure betrachten, in welchen 2 H durch 2 Br ersetzt sind. Aus der Buttersäure konnte durch Einwirkung von Brom die Verbindung $C_6H_4Br_2O_4$ nicht dargestellt werden. Wenn die Einwirkung von Brom auf neutrales citracons. Kali nur so lange andauerte, bis sich eben einige Tropfen der ölartigen Flüssigkeit abschieden, so erhielt Cahours durch Verdampfung eine Salzmasse, aus deren in Alkohol löslichem Theil einige Tropfen Schwefelsäure eine in Alkohol und Wasser lösliche Substanz abschieden, deren Geruch dem der flüchtigen fetten Säuren ähnlich, aber schwächer, und von dem der Buttersäure etwas verschieden war. Bei Behandlung der alkoholischen Lösung von $C_6H_4Br_2O_4$ mit Kaliumamalgam bildete sich Bromkalium, und im Alkohol blieb ein Kalisalz gelöst, aus welchem Säuren eine krystallisirbare, namentlich in heissem Wasser sehr lösliche, wie die flüchtigen fetten Säuren riechende, Substanz abschieden. — Die im Vorhergehenden mehrerwähnte, bei der Darstellung der bromhaltigen Säuren als in verdünnter Kalilösung unlöslich zu-

rückbleibende und angenehm riechende Flüssigkeit löst sich auch in reinem Wasser nicht, aber in Alkohol und Aether; sie hat ein großes spec. Gewicht, beim Erhitzen entwickelt sich Bromwasserstoff und es bleibt ein kohligter Rückstand; die Analysen entsprachen der Formel $C_6H_5Br_3O_2$, welche Cahours indess nicht als definitiv festgestellt betrachtet. — Hinsichtlich der Einwirkung des Broms auf andere Salze organischer Säuren giebt Cahours noch folgendes an. Bei tropfenweisem Zusatz von Brom zu einer schwach alkalischen Lösung von oxals. Kali oder Natron tritt in der Kälte keine Einwirkung ein, bei Erwärmung auf 40 bis 50° bilden sich hingegen Bromkalium oder Bromnatrium und Kohlensäure; oxals. Bleioxyd und Silberoxyd verhalten sich entsprechend. Auf essigs. Kali oder Natron wirkt Brom nicht verändernd ein. Pyroschleims. und pyromekons. Alkali werden von Brom heftig angegriffen, unter Bildung eines schweren röthlichen Oels und Entwicklung eines durchdringenden, die Augen heftig reizenden Geruchs. Weins. Kali bildet mit Brom Bromkalium und saures weins. Kali. Aepfels. Kali verhält sich gegen Brom wie citrons. Kali, doch treten die Zersetzungsresultate nicht so scharf geschieden hervor. Galluss. und gerbs. Alkalien werden durch Brom heftig angegriffen, aber man erhält nur ein bräunliches, bald zähes bald sprödes, Harz.

Einwirkung
von Brom auf
citronsaure,
Itaconsaure u.
citraconsaure
Salze.

Mohr (1) hat Erfahrungen über die Reinigung des Weinsteins von Kalksalz mitgetheilt, und dabei bestimmt, daß sich 1 weinsaurer Kalk in 6265 Wasser von 15° und in 352 siedendem Wasser löst. Knop (2) hat in rohem Weinstein einen Gehalt an gelbem, nicht in kohlens. Natron aber in ätzendem Ammoniak und Kali löslichem, Farbstoff gefunden.

Weinsäure.

Berlin (3) hat den Wassergehalt verschiedener weins. Salze neuerdings bestimmt. Für das krystallisirte

(1) Arch. Pharm. [2] LIII, 161; Pharm. Centr. 1848, 251. —

(2) Pharm. Centr. 1848, 63. — (3) Arch. Pharm. [2] LII, 257; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 358; Pharm. Centr. 1848, 60; J. pharm. [3] XIV, 379.

Weinsäure. *neutrale Kalisalz* fand auch er $2 \text{ KO}, \text{C}_6\text{H}_4\text{O}_{10} + \text{HO}$ (letzteres entweicht nicht bei 100° , wohl aber bei 180°); für das *weins. Kali-Natron* übereinstimmend mit Schaffgotsch, Mitscherlich und Fresenius $\text{KO}, \text{NaO}, \text{C}_6\text{H}_4\text{O}_{10} + 8 \text{ HO}$; für das *weins. Antimonoxyd-Kali*, wie es auch dargestellt war, $\text{KO}, \text{SbO}_3, \text{C}_6\text{H}_4\text{O}_{10} + \text{HO}$ (von dem Wasser entweichen in einem Strom trockener Luft bei 100° etwa $\frac{3}{4}$ HO rasch, das letzte $\frac{1}{4}$ sehr langsam; über 100° vereinigen sich die Elemente des Wassers und bei 130 bis 180° entweicht 1 At. neugebildetes Wasser, bei 200 bis 220° ein zweites); für das dem vorigen isomorphe *weins. Antimonoxyd-Ammoniak* $\text{NH}_4\text{O}, \text{SbO}_3, \text{C}_6\text{H}_4\text{O}_{10} + \text{HO}$ (1 HO entweicht bei dem Verwittern oder schneller bei 70 bis 80° ; bei 100° werden weitere 2 HO ausgetrieben; bei Erhitzung auf 200° entweicht noch kein Ammoniak), und für ein *weins. Antimonoxyd-Ammoniak* mit anderem Wassergehalt, welches sich bei starker Abkühlung der Lösung unter Umrühren als Krystallmehl und bisweilen bei dem freiwilligen Verdunsten der Lösung mit dem vorigen oder allein in Form leicht verwitternder großer flacher vierseitiger Prismen absetzt, $\text{NH}_4\text{O}, \text{SbO}_3, \text{C}_6\text{H}_4\text{O}_{10} + 5 \text{ HO}$ (bei 100° entweichen die 5 At. Krystallwasser und 1 At. neu gebildetes Wasser); für *weins. Antimonoxyd-Baryt* übereinstimmend mit Dumas und Piria $2 (\text{BaO}, \text{SbO}_3, \text{C}_6\text{H}_4\text{O}_{10}) + 5 \text{ HO}$ (bei 100° entweichen außer den 5 At. Krystallwasser noch 2 At. neugebildetes, und bei 250° weitere 2); *weins. Antimonoxyd-Silberoxyd* fand auch er wasserfrei.

Nach F. Kefslers (1) setzt sich aus der Mischung in der Wärme gesättigter Lösungen von gleichen Äquivalenten *weins. Antimonoxyd-Kali* und *salpeters. Strontian* ein krystallinischer Brei ab, welcher mit heißem Wasser gewaschen und nach Lösung in kaltem wässerigem *salpeters. Strontian* bei dem Erhitzen auf 100° in kleinen Prismen

(1) Pogg. Ann. LXXV, 410; J. pr. Chem. XLV, 361; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 334; Pharm. Centr. 1849, 26; Chem. Gaz. 1849, 97.

krystallisirt erhalten werden kann. Diese Verbindung ist Weinsäure.
weins. Antimonoxyd-Strontian, SrO , SbO_3 , $\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_{10}$; selbst
 auf 210° längere Zeit erhitzt zeigt sie keinen erheblichen
 Gewichtsverlust. Wird sie bei 30 bis 35° mit einer Lösung
 von 1 salpeters. Strontian in 2 Wasser digerirt, und die
 Flüssigkeit dann dem freiwilligen Verdunsten überlassen,
 so bilden sich schöne grofse Krystalle einer Verbindung
 SrO , SbO_3 , $\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_{10} + \text{SrO}$, $\text{NO}_3 + 12\text{HO}$, welche sich
 leicht in kaltem Wasser lösen (bei dem Erhitzen scheidet
 sich das vorhergehende Doppelsalz aus), von kalter Schwe-
 felsäure gar nicht verändert, von warmer unter Bildung
 von Kohlenoxyd und dann von Stickoxyd und schwefliger
 Säure zersetzt werden.

Schwarzenberg (1) erhielt nach dem Kochen von
 Wismuthoxyd mit Weinstein ein klares schwerflüssiges Fil-
 trat, welches durch Säuren aber nicht durch Wasser gefällt
 wurde, und bei dem Concentriren im Wasserbad ein schweres
 weifses krystallinisches Pulver von *weins. Wismuthoxyd-Kali*
 absetzte, das bei 100° getrocknet die Zusammensetzung
 KO , BiO_3 , $\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_8$ zeigte, und durch Wasser zersetzt
 wird (dieses wird sauer, ohne Wismuth gelöst zu ent-
 halten).

Beiträge zur Kenntnifs der Eisenweinsteine hat Mars-
 son (2) mitgetheilt. — Hinsichtlich der aus Weinstein und
 Borsäure oder Borax entstehenden Verbindungen hat G.
 Krug (3) die Ansicht zu begründen gesucht, es verhalte
 sich darin die Borsäure keineswegs als Basis (dem Anti-
 monoxyd im Brechweinstein analog), sondern es sei darin
 eine eigenthümliche, aus Borsäure und Weinsäure zusam-
 mengesetzte Doppelsäure enthalten.

Fremy (4) hatte angegeben, dafs die krystallisirte Veränderung
der Weinsäure durch
Erwärmung.
 Weinsäure (2HO , $\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_{10}$) bei dem Erhitzen zuerst $\frac{1}{2}\text{HO}$

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 244; Pharm. Centr. 1847, 384. —
 (2) Arch. Pharm. [2] LIII, 169; Pharm. Centr. 1848, 296. — (3) Arch.
 Pharm. [2] LV, 17; Pharm. Centr. 1849, 124. — (4) Ann. ch. phys.
 [2] LXVIII, 363.

Veränderung
der Weinsäure
durch
Erwärmung.

verliere und in Tartralsäure, sodann bei Verlust von 1 HO im Ganzen in Tartrelsäure, sodann unter Verlust der 2 HO in wasserfreie Weinsäure übergehe. Laurent und Gerhardt (1) geben hingegen Folgendes an. Die krystallisirte Weinsäure vorsichtig in einem Oelbad bis zum eben vollendeten Schmelzen erhitzt, verwandelt sich ohne Gewichtsverlust in eine andere Säure, *Metaweinsäure*, welche das Ansehen eines durchsichtigen Gummi hat, deliquesceirt, mit Kali und Ammoniak saure Salze von anderer Krystallform und gröfserer Löslichkeit als die der weinsäuren giebt, für sich die Kalksalze gar nicht und mit Ammoniak neutralisirt sie nur aus concentrirten Lösungen und langsam fällt, unter Hervorbringung eines in vielem Wasser löslichen Niederschlags von anderer Krystallform als die des weins. Kalks. Sie dreht nach Pasteur's Beobachtung die Polarisationsebene in demselben Sinne wie die Weinsäure. Das saure metaweins. Ammoniak schlägt sich bald nieder bei Zusatz von wenig Ammoniak zu geschmolzener Weinsäure, in Form spindelförmig vereinigter Nadeln; es hat dieselbe Zusammensetzung wie saures weins. Ammoniak (NH_4O , HO , $\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_{10}$), aus der Lösung in lauem Wasser läfst es sich umkrystallisiren, aber bei dem Kochen mit Wasser geht es in weins. Salz über. Das saure metaweins. Kali zeigt dasselbe Ansehen und Verhalten, und hat eine ganz entsprechende Zusammensetzung. Wird Metaweinsäure mit Kali neutralisirt, so schlägt sich auf Zusatz von Alkohol ein durchsichtiges Oel nieder, welches langsam zu weins. Kali krystallisirt. Das neutrale Kalksalz ist krystallisirt 2CaO , $\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_{10} + 8\text{HO}$, bei 160° getrocknet enthält es 2 At. Wasser, bei 230° getrocknet ist es wasserfrei; einmal krystallisirt löst es sich schwierig in kochendem Wasser, unter Umwandlung in gewöhnlich weins. Salz. Das neutrale Barytsalz schlägt sich nieder bei Zersetzung eines Baryt-

(1) Compt. rend. XXVII, 318; Instit. 1848, 293; Pharm. Centr. 1848, 842; vollständig Laurent u. Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1848, 1 (J. pr. Chem. XLVI, 360) u. 97.

salzes durch neutrales metaweins. Ammoniak in Form von an einander hängenden Kugeln, und hat dieselbe Zusammensetzung wie der krystallisirte weins. Baryt. — Wird die Weinsäure längere Zeit im Schmelzen erhalten, so bildet sich neben Metaweinsäure noch eine andere Säure, *Isoweinsäure*, deren neutrale Salze mit den sauren der Weinsäure isomer sind, und deren Kalksalz (eine sehr lösliche, neutrale, syrupartige, unkrystallisirbare Verbindung) bei dem Kochen sauer wird, unter Bildung von Metaweinsäure und neutralem metawcins. Kalk. Dieses Kalksalz in unreinem Zustand ist Fremy's tartrals. Kalk. Nicht ganz rein von metaweinsäurem stellt man es dar durch Sättigen der längere Zeit etwas über ihrem Schmelzpunkt erhaltenen und dann in Wasser gelösten Weinsäure mit Kreide, wo es neben einem zähen unlöslichen Salz (dem s. g. tartrels.) als ein sehr lösliches neutrales Salz erhalten wird. Rein bekommt man es mittelst der (sogleich zu besprechenden, aus Weinsäure bei Erhitzung bis zum Aufblähen sich bildenden) Isotartridsäure, wenn man diese in kaltem Wasser löst, mit Ammoniak sättigt, die Flüssigkeit zu einer concentrirten Lösung von essigs. Kalk setzt, und unter Umrühren tropfenweise Alkohol zusetzt, wo es sich als ein dickes, durchsichtiges, kaum gefärbtes Oel niederschlägt; die überstehende Flüssigkeit wird abgegossen, und zu dem Niederschlag unter fortwährendem Umrühren Alkohol gesetzt, worauf bald alles fest und scheinbar krystallinisch wird; diese Masse wird mit Alkohol abgespült und getrocknet. So erhält man, wenn man schnell operirt hat, ein in kaltem Wasser leicht lösliches neutrales Salz, bei 160° getrocknet CaO , $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_{11}$. Das isoweins. Kali schlägt sich als ein Oel nieder, wenn man in der Kälte Isotartridsäure zu einer alkoholischen Lösung von etwas überschüssigem Kali setzt; es ist unkrystallisirbar und zerfließlich, und verwandelt sich in der Wärme in saures metaweins. Salz. Das isoweins. Ammoniak wird ebenso erhalten, ist gleichfalls unkrystallisirbar, und wird bei Er-

Veränderung
der Wein-
säure durch
Erwärmung.

Veränderung
der Weinsäure
durch
Erwärmung.

wärmen ohne Ammoniak zu verlieren zu saurem metaweins Salz. Wird es zu essigs. oder schwefels. Kupferoxyd gesetzt, so entsteht kein Niederschlag, aber bei Zusatz von Alkohol wird isoweins. Kupferoxyd als ein klebriges grünes Salz gefällt. — Das von Braconnot entdeckte zähe Kalksalz, welches man aus stärker erhitzter Weinsäure und Kreide erhält, hatte Fremy als tartrelesures (vergl. S. 509) betrachtet; nach Laurent und Gerhardt ist die darin enthaltene Säure (nach der allgemeiner angenommenen Ansicht das Hydrat derselben), *Isotartridsäure*, isomer mit der wasserfreien Weinsäure ($C_6H_4O_{10}$). Die Salze der Isotartridsäure werden leicht dargestellt, wenn man diese Säure zu Lösungen essigs. Salze setzt; mit Alkalien bildet sie indeß sogleich isoweins. Salze. Die Isotartridsäure trübt das Kalkwasser und bringt einen syrupartigen Niederschlag hervor mit essigs. Kalk und Baryt, aber nicht mit salpeters. Baryt. Das Kalksalz wird ähnlich wie das isoweinsäure dargestellt. Für den isotartrids. Baryt, Strontian und Bleioxyd wurde als Zusammensetzung gefunden $MeO, C_6H_3O_9$.


Pyro-
weinsäure.

Arppe (1) hat die Pyroweinsäure genauer untersucht. Einer Angabe von Millon und Reiset folgend stellte er sie dar durch Destillation von gepulverter Weinsäure mit gepulvertem Bimsstein (es bildet sich außer Pyroweinsäure noch Kohlensäure, Wasser, etwas Essigsäure, und brenzliches Oel), Trennen des wässerigen Destillats von dem öligen mittelst eines nassen Filters, Abdampfen des erstern in mäßiger Wärme bis zur anfangenden Krystallisation, Ausbreiten der entstehenden krystallinischen Masse auf Fließpapier in einer Atmosphäre von Alkoholdampf, wo bei längerem Verweilen die Unreinigkeiten aufgelöst und eingesogen werden, Digeriren der so reiner erhaltenen und in Wasser gelösten Krystalle mit Salpetersäure, Krystallisiren, und Schmelzen zum Austreiben der Salpetersäure;


(1) Im Ausz. aus seiner Dissert. de acido pyrotartarico, Helsingf. 1847, in Ann. Ch. Pharm. LXVI, 73; Pharm. Centr. 1848, 865.

so erhielt er etwa 7 pC. vom Gewicht der angewandten Weinsäure an reiner Pyroweinsäure. — Diese schmeckt angenehm und kühlend sauer, ist geruchlos, schmilzt und fängt an zu rauchen bei 100°, kocht bei 190°, worauf der Siedepunkt nach und nach bis 220° steigt; sie löst sich bei 20° in 1½ Theilen Wasser und treibt die Kohlensäure aus ihren Verbindungen aus. Krystallisirt oder bei 100° geschmolzen ist sie (wie schon Pelouze gefunden) $C_4H_4O_3 + HO$. Geschmolzen und längere Zeit in einer Glasröhre gekocht krystallisirt sie nicht mehr oder nur theilweise; der flüssig bleibende Theil reagirt nicht sauer, und scheidet sich vom Wasser in Form von Oeltropfen, die indess nach einiger Zeit verschwinden. Durch Destillation von Pyroweinsäure mit wasserfreier Phosphorsäure erhält man diese ölige Flüssigkeit (im ersten Theil des Destillats) rein; sie ist farblos, bei 20° geruchlos, bei 40° nach Essigsäure riechend, schwerer als Wasser, bei - 10° noch flüssig, bei 230° fast ohne Zersetzung kochend, neutral, in Alkohol leicht löslich und durch Wasser wieder ab-scheidbar, wird durch Wasser und schneller durch Alkalien zu krystallisirender Brenzweinsäure, und hat die Zusammensetzung der wasserfreien Brenzweinsäure. — Hinsichtlich der von ihm untersuchten pyroweins. Salze giebt Arppe folgende Zusammenstellung (wir setzen $X = C_4H_4O_3$):


Saure Salze.



Neutrale Salze.



Basische Salze.



Traubensäure. Hinsichtlich Pasteur's Angaben über die Zusammensetzung der Traubensäure vergl. S. 32. — Laurent und Gerhardt (in der S. 508 angef. Abhandlung) fanden, daß auch die Traubensäure ohne Gewichtsverlust schmelzen und in Metaweinsäure übergehen kann.

Milchsäure. Ueber das Vorkommen der Milchsäure im Fleisch vgl. bei diesem.

Ueber Bensch's Vorschrift zur Darstellung der Milchsäure vergl. bei Buttersäure. — Nach dieser Vorschrift erhielten Engelhardt und Maddrell (1) aus 18 Pfund Rohrzucker etwa 21 Pfund milchsauren Kalk; die aus dem Zinksalz durch Schwefelwasserstoff oder aus dem Kalksalz durch eine genau zureichende Menge Schwefelsäure abgeschiedene und zur Syrupdicke eingedampfte Säure reinigten sie weiter durch Auflösen in Aether und Verdampfen desselben. Was das Auftreten von Buttersäure betrifft, so sind sie nicht der von Wackenroder (2) geäußerten Ansicht, daß bei Anwendung eines fettfreien Ferments diese Säure sich nicht bilde. Sie fanden, daß fettfreies Casein als Ferment mit reinem milchs. Kalk unter den übrigen zur Buttersäurebildung erforderlichen Bedingungen diese bald hervorbringt; ohne Ferment verwandelte sich indeß der reine milchs. Kalk nicht in buttersauren. Sie fanden, daß der Luftzutritt zwar beschleunigend auf die Umwandlung des milchs. Kalks in butters. wirkt, aber nicht für diese Umwandlung nothwendig ist; das sich bei dieser Umwandlung entwickelnde Gas fanden sie aus etwa 3 Kohlensäuregas auf 4 Wasserstoffgas zusammengesetzt. — Bei der Milchsäurebereitung aus Zucker konnten sie die Entstehung von Mannit nicht wahrnehmen (dieser ist später stets als gegenwärtig nachgewiesen worden; vergl. S. 466), wohl aber die eines gummiartigen Körpers. Die zur Syrupdicke eingedampfte Mutterlauge

(1) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 83; im Ausz. J. pr. Chem. XLIII, 390; Pharm. Centr. 1847, 753; J. pharm. [3] XII, 447 (wo Gerhardt die Priorität für die Betrachtung der Milchsäure als einer zweibasischen Säure reclamirt). — (2) Arch. Pharm. [2] XLVII, 249.

löste sich theilweise in kochendem gewöhnlichem Weingeist, ^{Milchsäure.} und daraus schied sich beim Erkalten eine krystallinische Kalkverbindung, welche mehrmals aus Alkohol umkrystallisirt die Zusammensetzung $\text{CaO}, \text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_{14} + 12 \text{HO}$ ergab (das Wasser entweicht schon im luftleeren Raum); wurde die wässerige Lösung dieser Verbindung mit kohlen. Ammoniak gefällt und stark eingedampft, so zeigte der erhaltene Syrup nicht den geringsten süßen Geschmack. — Die Milchsäure konnten auch sie nicht in fester Form erhalten, selbst nicht bei -20 bis -24° . — Die untersuchten milchs. Salze fanden sie alle unlöslich in Aether, schwerlöslich in kaltem Wasser und Alkohol; kochender Alkohol löst nur wenige leicht und reichlich, kochendes Wasser thut dies in höherem Grade. Mit Ausnahme des Nickeloxydulsalzes. geben die milchs. Salze ihr Krystallwasser bei 100° vollständig ab, die meisten können bis 150 bis 170° , das Zinksalz bis 210° ohne Zersetzung erhitzt werden. — Wird überschüssiges kohlen. Silberoxyd mit Milchsäure gekocht, so krystallisirt aus der sich bildenden neutralen Flüssigkeit *milchs. Silberoxyd* in seidenglänzenden, gewöhnlich warzenförmig gruppirten, Nadelchen heraus, welche sich am Licht leicht schwärzen und bei 100° unter Zersetzung schmelzen; lufttrocken ist es $\text{AgO}, \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_5 + 2 \text{HO}$, das Wasser entweicht im luftleeren Raum und bei 80° . — *Milchs. Kupferoxyd* ebenso dargestellt und von einem gewöhnlich sich zugleich bildenden basischen Salz durch Umkrystallisiren getrennt, bildet grofse, nach Ettling's Bestimmung monoklinometrische, Krystalle, deren Farbe zwischen blau und grün wechselt. Diese sind $\text{CuO}, \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_5 + 2 \text{HO}$; sie lösen sich in 115 Th. kaltem und 26 kochendem Alkohol, in 6 kaltem und 2,2 kochendem Wasser; die Lösung reagirt stark sauer; aus der wässerigen Lösung erhält man durch Zusatz von wenig Alkohol das Salz mit hellblauer Farbe und atlasglänzend, aber mit unveränderter Zusammensetzung. — Ein basisches Salz, bei 100° getrocknet $2 \text{CuO}, \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_5$, scheidet sich bei der

Milchsäure. Bereitung des vorhergehenden bald nach dem Erkalten mit hellblauer Farbe ab; es ist sowohl in kaltem als kochendem Wasser schwer löslich, und von einem andern zugleich mit ihm sich bildenden durch Schlämmen als der schwerere Theil trennbar. — *Milchs. Cadmiumoxyd* (wie das Silbersalz bereitet) krystallisirt aus einer bis zum Krystallhäutchen abgedampften Lösung wasserfrei in kleinen farblosen Nadeln CdO , $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_5$, ist unlöslich in kaltem und warmem Alkohol, löslich in 10 Th. kaltem und 8 kochendem Wasser; die Lösung reagirt neutral. — *Milchs. Quecksilberoxydul* wird erhalten durch Mischung concentrirter Lösungen von milchs. Natron und salpeters. Quecksilberoxydul. Die Mischung ist anfangs farblos, dann schön rosen- oder carminroth; es setzt sich etwas Quecksilber ab, und aus dem Filtrat scheiden sich nach 24 Stunden prächtige rosettenartig gebildete Gruppen des ebenso gefärbten Salzes ab. Dieses ist Hg_2O , $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_5 + 2\text{HO}$; es wird bei 100° dunkel gefärbt, doch nicht zersetzt; es ist schwer löslich in kaltem Wasser, in kochendem Wasser und Alkohol, unlöslich in kaltem Alkohol; die Lösung reagirt stark sauer; die wässrige wird bei dem Kochen unter Bildung von metallischem Quecksilber und Oxydsalz zersetzt. — *Basisch milchs. Quecksilberoxyd*, 2HgO , $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_5$, bildet sich bei Kochen von Quecksilberoxyd mit Milchsäure bis zur Sättigung der Lösung, Eindampfen derselben bis zu Syrupconsistenz, Behandeln der dann sich ausscheidenden krystallinischen Masse mit kochendem Wasser, wo es sich (mit Zurücklassung einer andern, hellgelben, pulverförmigen) Verbindung löst, und dann in stark glänzenden wasserfreien Prismen krystallisirt; es ist leicht löslich in kaltem und kochendem Wasser, schwer löslich in kaltem und kochendem Weingeist. Die Lösungen reagiren stark sauer, und werden bei dem Kochen nicht zersetzt. — *Basisch milchs. Zinnoxid*, 2SnO , $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_5$, scheidet sich wasserfrei ab bei dem Mischen von milchs. Natron mit einer sauren Lösung von Zinnchlorür als weißes krystallinisches Pulver, welches sich nicht in kaltem und

kochendem Alkohol, nicht in kaltem und sehr wenig in kochendem Wasser (zu sauer reagirender Lösung), leicht in Salzsäure, langsam in Essigsäure löst. — Mit Zinnchlorid giebt milchs. Natron weder einen Niederschlag noch bei dem Abdampfen bis zu Syrupconsistenz Krystalle. — *Milchs. Bleioxyd* konnte nicht krystallisirt oder mit bestimmten Eigenschaften erhalten werden; die neutrale Lösung trocknet zu einer gummiartigen Masse ein, welche in gewöhnlichem Weingeist leicht, in Alkohol nur in der Hitze und dann wenig löslich ist. — *Milchs. Uranoxyd* wurde dargestellt durch Lösung von Uranoxyd in Milchsäure, Eindampfen bis zu Syrupconsistenz, wo bei dem Erkalten das Salz sich in hellgelben Krusten wasserfrei ($U_2O_3, C_6H_5O_5$) absetzt. Es löst sich nur sehr wenig in Weingeist, leicht in kaltem und kochendem Wasser; die Lösung reagirt stark sauer und wird durch die Sonnenstrahlen unter grüner Färbung und späterer Ausscheidung von braunem Uranoxyd zersetzt. — Antimonoxyd löst sich kaum in Milchsäure, aber in beträchtlicher Menge in saurem milchs. Kali, ohne dafs jedoch eine krystallisirte Verbindung zu erhalten war; auch die Verbindungen von Milchsäure mit Eisenoxyd, Chromoxyd und Thonerde konnten nicht krystallisirt erhalten werden. — *Milchs. Eisenoxydul* stellten sie dar nach Pagenstecher's Vorschrift (aus der Mischung von milchs. Ammoniak mit Eisenchlorür scheidet sich nach 24 Stunden das milchs. Eisenoxydul krystallisirt ab), oder besser durch Zersetzung des schwefels. Eisenoxyduls durch milchs. Baryt in einem Kolben bei Kochhitze, und Zusatz von Weingeist zu dem Filtrat; es krystallisirt aus Wasser in ziemlich grofsen hellgelben Nadeln, aus wässerigem Weingeist in kleinen weissen Nadeln; lufttrocken ist es $FeO, C_6H_5O_5 + 3HO$, es ist luftbeständig und verliert bei 50 bis 60° Wasser (an der Luft unter Oxydation und dunkler Färbung); es löst sich schwer in kaltem, ziemlich in kochendem Wasser und Alkohol, die Lösungen reagiren sauer und färben sich an der Luft dunkelbraun. — Für das *milchs. Zinkoxyd* im krystallisirten lufttrockenen Zu-

Milchsäure.

Milchsäure. stand bestätigten sie die Formel $\text{ZnO}, \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_5 + 3\text{HO}$; es löst sich nach ihnen in 58 kaltem, 6 kochendem Wasser, kaum in kaltem und kochendem Alkohol; die Lösungen sind sauer. Eine ganz entsprechende Zusammensetzung hat das *milchs. Nickelorydul* (apfelgrüne Nadelchen oder krystallinische Krusten; 2 Atome Wasser entweichen bei 100° , das dritte erst bei 130°), *Kobaltoxydul* (pfirsichblüthrothe) und *Manganoxxydul* (farblose oder schwach amethystfarbige Krystalle), und die *milchs. Magnesia* (Krystallkrusten, welche nicht verwittern). — *Einfach-milchs. Kalk* krystallisirt aus der wässerigen concentrirten Lösung in harten Körnern, die aus concentrisch gruppirten strahligen Krystallen bestehen, $\text{CaO}, \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_5 + 5\text{HO}$ (E. und M. fanden, daß alles Wasser bei 100° entweicht), und sich in 9,5 kaltem, nach jedem Verhältniß in kochendem Wasser, gar nicht in absolutem Alkohol lösen; die wässerige Lösung reagirt neutral; aus der Lösung in wässrigem Weingeist setzt sich der *milchs. Kalk* als ein Brei von Krystallen ab, welche gleichfalls den angegebenen Wassergehalt besitzen. Die wässerige Lösung dieses Salzes mit überschüssigem Chlorcalcium versetzt und stark eingedampft, giebt luftbeständige prismatische Krystalle einer Verbindung $\text{CaCl} + \text{CaO}, \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_5 + 6\text{HO}$, welche in Wasser und kochendem wässrigem Weingeist leicht, in kaltem Alkohol wenig, in warmem ziemlich löslich ist, bei 110° 5 HO verliert, und bei dem Umkrystallisiren aus Wasser ein Salz von geringerem Chlorgehalt giebt. *Zweifach-milchs. Kalk* wird dargestellt durch Zusatz von Milchsäure zu der Lösung des einfach-sauren Salzes; die Lösung giebt zuerst Krystalle des letztern Salzes, bis zur Syrupconsistenz eingedampft concentrisch-faserige Krystallmassen von $\text{CaO}, \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_5 + \text{HO}, \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_5 + 2\text{HO}$; dieses saure Salz löst sich in Alkohol, verliert bei 80° 2 HO und zersetzt sich bei stärkerer Erhitzung. — *Milchs. Strontian* ist ein neutral reagirendes, dem Kalksalz ähnliches, Salz, lufttrocken $\text{SrO}, \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_5$, bei 100° wasserfrei werdend. — *Einfach-milchs. Baryt* war nicht krystallisirt zu erhalten, *zweifach-milchs.* wurde aber als ein

sehr sauer reagirendes, deutlich krystallisirtes, luftbeständiges Milchsäure.
 Salz dargestellt, lufttrocken $\text{BaO}, \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_5 + \text{HO}, \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_5$; bei
 bei 100° sinkt es etwas zusammen und riecht empyreumatisch.
 — Das Kali-, Natron- und Ammoniaksalz konnte nicht in Kry-
 stallen erhalten werden. — E. und M. glauben, daß die Milch-
 säure eine zweibasische Säure und ihre Formel zu verdoppeln
 sei, und daß die Existenz der beschriebenen sauren Salze und
 die Umwandlung in Buttersäure hierfür sprechen (1).

Engelhardt (2) hat auch *milchs. Wismuthoxyd* unter-
 sucht. Kohlens. Wismuthoxyd oder Wismuthoxydhydrat
 löst sich nur in geringer Menge in Milchsäure, ohne daß
 sich ein unlösliches Salz bildet; aus der eingedampften, stark
 sauren, Lösung setzt sich bei dem Erkalten in kleinen Na-
 deln ein Salz ab, welches reichlicher erhalten wird, wenn
 man etwas überschüssiges milchs. Alkali mit einer salpeters.
 Lösung von Wismuthoxyd kalt mischt, und den bei con-
 centrirtten Lösungen entstehenden Krystallbrei in möglichst
 wenig Wasser löst, wo sich das milchs. Wismuthoxyd bald
 in krystallinischen Krusten absetzt (die Mutterlauge, mit
 Weingeist bis zur milchigen Trübung versetzt, giebt nach
 einiger Zeit noch mehr davon); dieses Salz ist $\text{BiO}_3, 2\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_5$;
 es löst sich nur wenig in kaltem, mehr in heißem Wasser,
 letztere Lösung bildet indess bei dem Erkalten keine Kry-
 stalle, sondern bei dem Eindampfen Krystallkrusten, die in
 wenig Wasser löslich sind und mit mehr Wasser eine starke
 Trübung geben. — Bei der Mischung von milchs. Natron
 und salpeters. Wismuthoxyd in der Wärme, oder Zusatz von
 letzterem zu der mäßig verdünnten Lösung des überschüs-
 sigen ersteren Salzes und Kochen, entsteht ein reichlicher
 pulveriger Niederschlag $\text{BiO}_3, \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_5$, welcher auch durch
 kochendes Wasser nicht gelöst noch zersetzt wird.

Liebig (3) beobachtete, daß die aus Muskelfleisch
 dargestellte Milchsäure ein krystallisirtes Kalksalz bildet

(1) Man kann hinzufügen, daß dann die Formel der Milchsäure auch
 zu der des Milchzuckers und des Traubenzuckers in einfacherer Beziehung
 steht. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 367; Pharm. Centr. 1848, 491. —
 (3) Ann. Ch. Pharm. LXII, 326.

Milchsäure. welches 4, ein Zinkoxydsalz welches 2 At. Wasser enthält; er betrachtete es als möglich, daß diese Verschiedenheiten des Wassergehalts von dem für diese Salze sonst (vergl. das Vorhergehende) gefundenen darauf beruhen, daß er die krystallisirten Salze durch Verdampfen, nicht durch Abkühlen dargestellt hatte. — Engelhardt (1) zeigte indeß, daß die aus Fleisch erhaltene (*a*) und die aus Zucker dargestellte (*b*) Milchsäure wirklich Salze von verschiedenem Wassergehalt geben, welche sich auch sonst noch in Beziehung auf die Temperatur, wo sie Wasser abgeben oder zersetzt werden, auf die Löslichkeit und auf die äußeren Eigenschaften verschieden zeigen. Der *a* milchs. Kalk aus Wasser krystallisirt enthält stets 4, der *b* milchs. ebenso stets 5 At. Wasser; aus Weingeist krystallisiren beide mit 5 At. Wasser, aber dieses Salz der *a* Milchsäure in Wasser umkrystallisirt zeigt dann wieder einen Gehalt von 4 At. Wasser. Der *a* milchs. Kalk muß länger bei 100° erhalten werden um alles Wasser zu verlieren, als der *b* milchsäure; ersterer braucht 12,4, letzterer 9,5 kaltes Wasser zur Auflösung. Die *a* milchs. Magnesia löst sich leichter in Wasser und Weingeist als die *b* milchsäure; erstere enthält wahrscheinlich 4, letztere 3 At. Wasser. Das *a* milchs. Zinkoxyd enthält stets 2, das *b* milchs. 3 At. Wasser; ersteres verliert das Wasser bei 100° langsamer und zeigt bei 150° Zersetzung, während letzteres das Wasser bei 100° schnell abgibt und noch bei 210° keine Zersetzung zeigt; ersteres löst sich in 5,7 kaltem, 2,88 kochendem Wasser, in 2,23 kaltem und in fast ebenso viel kochendem Alkohol, letzteres in 58 kaltem, 6 kochendem Wasser und fast gar nicht in Alkohol. Das *a* milchs. Kupferoxyd krystallisirt in kleinen matten himmelblauen Wärrchen, das *b* milchsäure in ziemlich großen, glänzenden, wohlausgebildeten, dunkelblauen oder grünlichen Krystallen; ersteres löst sich in 1,95 kaltem, 1,24 kochendem Wasser und viel leichter in Alkohol, letz-

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 859; Pharm. Centr. 1848, 465.

teres in 6 kaltem, 2,2 kochendem Wasser, 115 kaltem und 26 kochendem Alkohol; ersteres verliert über Schwefelsäure nur wenig Wasser, und auf 140° längere Zeit erhitzt löst es sich nur theilweise in Wasser unter Zurücklassung von Kupferoxydul, während der Wassergehalt des letzteren schnell über Schwefelsäure oder bei 100° entweicht und es sich bei 200 bis 210° unter Verglimmen und Zurücklassung von metallischem Kupfer zersetzt; ersteres enthält etwa 9 pC. Wasser, letzteres 2 Atome (13,0 pC.). — Liebig hatte ein basisches Zinksalz mit der Milchsäure des Sauerkrauts erhalten, Engelhardt vermochte nicht ein solches mit der aus Zucker bereiteten Milchsäure darzustellen. Engelhardt hält es für möglich, die *a* Milchsäure könne eine einbasische (in Verbindung mit Basen $C_6H_8O_6$), die *b* Milchsäure eine zweibasische Säure ($C_{12}H_{10}O_{10}$) sein. — Heintz (1) hat für das Zinkoxydsalz Engelhardt's Beobachtungen bestätigt, und zugleich gezeigt, daß die *a* und die *b* Milchsäure keineswegs etwa in der Art verschieden sind, daß die eine weniger Sauerstoff und Wasserstoff (im Verhältniß wie im Wasser) enthalte als die andere und nur ein Rückhalt an Wasser in den Salzen der ersteren sie als isomer mit der zweiten erscheinen lasse; er schlägt für die im Muskelfleisch enthaltene Säure den Namen *Paramilchsäure* vor.

Marsson (2) hat auf die Igasursäure wieder aufmerksam gemacht, welche Pelletier und Caventou in den Ignatiusbohnen und Krähenaugen entdeckt, Carriol der Milchsäure ähnlich gefunden und Berzelius als mit dieser identisch betrachtet hatte. Marsson fällte die Flüssigkeit, aus welcher das Strychnin und Brucin durch Magnesia abgechieden waren, durch essigs. Bleioxyd, wo ein starker Niederschlag entstand, während das milchs. Bleioxyd leicht löslich ist. Die nach Zersetzung der Bleioxydverbindung durch Schwefelwasserstoff erhaltene Flüssigkeit konnte nicht

(1) Pogg. Ann. LXXV, 391; Pharm. Centr. 1849, 184; Chem. Gaz. 1849, 89. — (2) Arch. Pharm. [2] LV, 295; Pharm. Centr. 1849, 93.

zum Krystallisiren gebracht werden, eben so wenig die Verbindung mit Kalk, Ammoniak oder Zinkoxyd; durch Sättigen mit Barytwasser und Entfernung des überschüssigen Baryts mit Kohlensäure wurde ein nicht krystallisirendes Salz erhalten, welches bei 100° getrocknet einen dem milchs. Baryt nahe entsprechenden Barytgehalt ergab. Mangel an Material verhinderte eine vollständigere Untersuchung.

Schleimsäure.

Hagen (1) hat die Schleimsäure und ihre Salze untersucht. Er fand, dafs bei der Erzeugung der Schleimsäure durch Einwirkung von Salpetersäure auf Milchzucker jedesmal Oxalsäure als Nebenproduct auftritt, und zwar vorzugsweise als directes Oxydationsproduct des Milchzuckers und nur in geringer Quantität als Oxydationsproduct der Schleimsäure; dafs man bei der Anwendung einer mäfsig concentrirten Salpetersäure ein Maximum an Schleimsäure erhält; dafs bei Anwendung concentrirterer Salpetersäure wahrscheinlich ein Theil der sich bildenden Schleimsäure, bei verdünnterer Salpetersäure aber der Milchzucker fast ausschliesslich in Oxalsäure verwandelt werde. Im günstigsten Falle erhielt er von 100 Milchzucker 35,9 Schleimsäure (2). — Hagen schliesst sich der Ansicht an, dafs die Schleimsäure eine zweibasische Säure ($C_{12}H_8O_{14}$) sei, und findet eine Stütze dafür darin, dafs bei der Annahme eines nur halb so grofsen Atomgewichts für die Säure der Wassergehalt mehrerer Salze in complicirten und ungewöhnlichen Atomverhältnissen stehe. — *Neutrales schleims. Kali*, durch Sättigung der Säure mit Kali oder kohlens. Kali zu erhalten, setzt sich aus einer siedend heifsen Lösung in weifsen krystallinischen Körnern ab, lufttrocken und bei 100° $2 KO, C_{12}H_8O_{14} + HO (HO$

(1) Pogg. Ann. LXXI, 531; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 347; Pharm. Centr. 1847, 561; J. pharm. [3] XII, 310. — (2) Guckelberger erhielt 60 bis 65 Procent Schleimsäure durch Erwärmen von 2 Milchzucker und 4 Salpetersäure von 1,42 spec. Gew. bis zum Eintreten einer stürmischen Einwirkung, Abkühlen und abermaliges gelindes Erwärmen.

entweicht bei 150°); die Mutterlauge nimmt, selbst bei Anwendung sorgfältig gereinigter Schleimsäure, eine braune Farbe an; auf Zusatz einer mit wenig Ammoniak versetzten Lösung von salpeters. Silberoxyd und Erwärmen scheidet sich an den Wänden des Gefäßes metallisches Silber ab, ohne daß indeß die Gegenwart von Zuckersäure nachzuweisen gewesen wäre. *Saures schleims. Kali* (lufttrocken und bei 100° $\text{KO}, \text{HO}, \text{C}_{12}\text{H}_8\text{O}_{14} + 2 \text{HO}$), dessen Existenz Hefs geläugnet hatte, wird erhalten, indem man von zwei gleichen Gewichtsmengen Schleimsäure die eine mit kohlenst. Kali sättigt und die andere hinzufügt; es bildet kleine durchsichtige Krystalle, die in Wasser leichter löslich sind als das neutrale Salz. — *Neutrales schleims. Natron* krystallisirt bei allmählichem Abdampfen einer mit kohlenst. Natron neutralisirten Lösung von Schleimsäure in großen wasserklaren Krystallen $2 \text{NaO}, \text{C}_{12}\text{H}_8\text{O}_{14} + 9 \text{HO}$, welche an der Luft verwittern und auf 100° erhitzt zu $2 \text{NaO}, \text{C}_{12}\text{H}_8\text{O}_{14} + \text{HO}$ werden; letzteres Salz scheidet sich bei dem raschen Eindampfen einer Lösung von schleims. Natron ab. — Schleimsäurelösung wird durch schwefels. Magnesia nicht gefällt; die Lösungen von schleims. Ammoniak und schwefels. Magnesia geben bei der Mischung einen Niederschlag von *schleims. Magnesia*, dessen Menge sich bei dem Kochen bedeutend vermehrt, bei 100° getrocknet $2 \text{MgO}, \text{C}_{12}\text{H}_8\text{O}_{14} + 4 \text{HO}$. — Gegen Chlorcalciumlösung verhält sich die Schleimsäure ebenso; der *schleims. Kalk* ist bei 100° getrocknet $2 \text{CaO}, \text{C}_{12}\text{H}_8\text{O}_{14} + 3 \text{HO}$, und in Essigsäure löslich. — Auch mit Chlorbaryum giebt Schleimsäure keinen Niederschlag, wohl aber auf Zusatz von Ammoniak, namentlich und zuerst an den Stellen der Gefäßwandung, welche man mit einem Glasstab berührt hat; der krystallinische Niederschlag von *schleims. Baryt* ist, bei 100° getrocknet, $2 \text{BaO}, \text{C}_{12}\text{H}_8\text{O}_{14} + 3 \text{HO}$. — *Schleims. Kupferoxyd* wird erhalten durch Fällung von schwefels. Kupferoxyd mit schleims. Ammoniak; es ist ein bläulich-weißes, in Wasser unlösliches Pulver, bei 100° getrocknet

Schleimsäure. $2 \text{ CuO}, \text{ C}_{12} \text{ H}_8 \text{ O}_{14} + \text{ HO}.$ — *Schleims. Eisenoxyd*, auf ähnliche Weise dargestellt, ist ein gelblich-weißes, an der Luft sich nicht veränderndes Pulver, bei 100° getrocknet $2 \text{ FeO}, \text{ C}_{12} \text{ H}_8 \text{ O}_{14} + 4 \text{ HO}$; auf 150 bis 160° erhitzt wird es zu einer braunen, an der Luft sich selbst entzündenden, Masse. — *Schleims. Bleioxyd*, durch Fällung einer Schleimsäurelösung mit essigs. Bleioxyd erhalten, ist ein weißes, körniges, in Wasser unlösliches Pulver; bei 100° getrocknet ist es $2 \text{ PbO}, \text{ C}_{12} \text{ H}_8 \text{ O}_{14} + 2 \text{ HO}$, bei 150° wasserfrei und dann zimtbraun; die Angabe, daß man ihm durch Ammoniak einen Theil der Säure entziehen könne, wurde nicht bestätigt gefunden. Durch Fällung von schleims. Ammoniak mit basisch essigs. Bleioxyd wurde ein schleimiger, wenig in Wasser löslicher, essigsäurehaltiger Niederschlag von sehr wechselndem Bleioxydgehalt (69 — 79 pC.) erhalten. Für *schleims. Silberoxyd*, aus salpeters. Silberoxyd und schleims. Ammoniak dargestellt, wurde die Formel $2 \text{ AgO}, \text{ C}_{12} \text{ H}_8 \text{ O}_{14}$ bestätigt gefunden.

Camphersäure. Blumenau (1) hat Mittheilungen gemacht über eine Säure, welche er aus Campher durch Behandlung mit Salpetersäure und Erhitzen bis zum Auftreten weißer Dämpfe erhielt, und welche Verschiedenheiten von der gewöhnlichen Camphersäure zeigte.

Chinonsäure. Woskresensky hatte für das Chinon die relative Atomzusammensetzung $\text{C}_6 \text{ HO}$ bestimmt (2), Wöhler für dasselbe die Formel $\text{C}_{12} \text{ H}_8 \text{ O}_8$, Laurent später die (mit Woskresensky's Bestimmung übereinstimmende) Formel $\text{C}_{12} \text{ H}_8 \text{ O}_8$ angenommen. Wöhler (3) hat nun gefunden, daß letztere Formel der Zusammensetzung des Chinons sowohl als der seiner Verwandlungsproducte besser entspricht, als die von ihm früher angenommene.

Adstringirende Extracte. Ueber die unter den Namen Catechu, Gambir und Kino im Handel vorkommenden adstringirenden Extracte

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 119. — (2) W. ist, Gerhard's Behauptung (Compt. rend. des trav. chim. 1849, 228) entgegen, von dieser Formel nie abgegangen. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXV, 849; Compt. rend. XXVI, 121.

hat Guibourt(1) eine umfassende Monographie veröffentlicht. — Ueber verfälschtes braunes Catechu (aus gelbem durch Zusatz von Alaun dargestellt) hat Reinsch (2) Mittheilung gemacht. Adstringiren-
de Extracte.

Nach Pelouze ist von den zwei Schichten, welche bei Gerbsäure. Ausziehen der Galläpfel mit wasserhaltigem Aether erhalten werden, die untere eine Auflösung von viel Gerbsäure in Wasser, die obere eine von wenig Gerbsäure in Aether. Nach Mohr (3) hingegen ist die untere Schicht eine Auflösung von Gerbsäure in Aether, welche das sonderbare Verhalten zeigt, sich nicht mit mehr Aether zu mischen; setzt man zu einer gesättigten Lösung von Gerbsäure in Aether mehr Aether und dann Wasser, so erhält man drei Schichten (unten Gerbsäure in Wasser gelöst, in der Mitte Gerbsäure in Aether gelöst, oben Aether mit Farbstoff und wenig Gerbsäure). Er empfiehlt zur Ausziehung der Gerbsäure eine Mischung von gleichen Volumen Aether und Weingeist.

Wetherill (4) fand zur Umwandlung der Gerbsäure in Gallussäure am geeignetsten, Schwefelsäure von 1,84 spec. Gew. mit dem 4fachen Volum Wasser zu mischen, und 500 Cubikcentim. der Mischung mit 50 Grm. trockner Gerbsäure kochen zu lassen, bis die Flüssigkeit bei dem Erkalten krystallisiren konnte. Er erhielt aus 100 Gerbsäure höchstens 87,4 Gallussäure. Seine Analyse der bei 110° getrockneten Gerbsäure stimmt mit der Formel $C_{11}H_8O_{12}$; er hält es indess für wahrscheinlich, daß die Formel $C_{14}H_8O_{10}$ richtiger, und die Gerbsäure mit der bei 100° getrockneten Gallussäure ($C_7H_4O_5$) isomer sei.

Ferner hat Mulder (5) Untersuchungen über die Gerbsäure veröffentlicht. Er betrachtet sie, im wasserfreien

(1) J. pharm. [8] XI, 24. 260. 860; XII, 87. 188. 267; im Auss. Repert. Pharm. [2] XLVIII, 321. — (2) Jahrb. pr. Pharm. XVII, 201; Pharm. Centr. 1849, 159. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXI, 352. — (4) J. pharm. [3] XII, 107; J. pr. Chem. XLII, 247; Pharm. Centr. 1847, 749. — (5) Scheikundige Onderzoekingen IV, 639; Repert. Pharm. [8] I, 311; II, 88.

Gerbkure. Zustand gedacht, als $C_{28}H_6O_{17}$. Um die Gerbsäure von hygroscopischem Wasser zu befreien, müsse man sie lange in einem Strom trockner Luft bei 120° erhalten, dann sei sie $C_{28}H_6O_{17} + HO$, und verliere sie etwa 3 pC. (berechnet 2,8) Wasser, wenn man sie mit Wasser und Bleioxyd menge und bei 120° trockne. Werde Ammoniak längere Zeit über Gerbsäurehydrat bei gewöhnlicher Temperatur geleitet, und das überschüssige Ammoniak durch einen Luftstrom entfernt, so entstehe eine Verbindung $NH_4O, C_{28}H_6O_{17} + 3NH_3$, welche bei 100° bräunlich werde und dann eine Verbindung $2NH_4O, C_{28}H_6O_{17}$ sei, bei 120° getrocknet aber (noch brauner) $NH_4O, C_{28}H_6O_{17}$ sei. Er sucht zu zeigen, dafs sowohl frühere als unter seiner Leitung angestellte neuere Analysen gerbsaurer Salze mit seiner Ansicht über die Zusammensetzung dieser Säure übereinstimmen, wobei er indefs manchmal etwas complicirte atomistische Verhältnisse zu Hülfe nimmt; 5 verschiedene Bleioxydsalze (1 At. Säure auf $\frac{1}{2}$, 2, 3, 4, 5 PbO) nimmt er an; ein von Büchner untersuchtes Natronsalz deutet er als auf 4 At. Gerbsäure 5 NaO enthaltend; als ein Salz, welches auf 1 At. Säure 1 At. Basis enthalte, führt er nur ein von Büchner untersuchtes Kalisalz an. — Er fand die Angaben von Pelouze bestätigt, dafs die Zerlegungsproducte von Gerbsäure wie von Gallussäure bei längerer, 250° nicht übersteigender Erhitzung Wasser, Kohlensäure, sublimirende Pyrogallussäure und zurückbleibende Melangallussäure sind; von letzterer erhielt er 53 bis 58 pC. der angewandten Gerbsäure. Auch für die Eigenschaften und die Zusammensetzung der Pyrogallussäure fand er Pelouze's Angaben bestätigt; für die bei 140° getrocknete Melangallussäure hält er aber die Formel $C_{40}H_{10}O_{14}$, für das durch Digeriren überschüssiger Säure mit Kali und Abdampfen erhaltene und bei 130° getrocknete Kalisalz die Formel $KO, C_{40}H_{10}O_{14}$ für wahrscheinlich. — Die Bildung der bei der Umwandlung der Gerbsäure in Gallussäure durch Säuren auftretenden braunen Substanz kann man nach ihm

sehr beschränken, wenn man die Gerbsäure mit Wasser und Salzsäure mehrere Tage bei 100° und völlig abgeschlossener Luft digeriren läßt. Gerbsäure.

Wittstein (1) schließt aus seinen Versuchen über die Verbindungen des Eisenoxyds mit der Gerbsäure, daß dem Niederschlag, welcher sich nach und nach in gemischten Lösungen von Gerbsäure und schwefels. Eisenoxydul bildet, constante Zusammensetzung aus 1 At. Eisenoxyd auf 4 At. Gerbsäure (diese als $C_{12}H_8O_{12}$ betrachtet) zukomme; der in Eisenoxydlösungen durch Gerbsäure entstehende Niederschlag sei hingegen von veränderlicher Zusammensetzung.

Rochleder hat die im Kaffee, im Thee und im Paraguaythee vorkommenden Säuren untersucht. In einer früheren Arbeit (2) hatte er für die Kaffeegerbsäure, wie sie in Verbindungen enthalten ist, die Formel $C_{14}H_8O_8$ gegeben, Payen (3) hatte hingegen dafür die Formel $C_{14}H_8O_7$ aufgestellt; Rochleder hat sich später (4) überzeugt, daß letztere Formel die richtige ist. Dieselbe Säure fand er (5) an Caffein gebunden in dem Paraguaythee (den Blättern von *Ilex paraguayensis*), und stellte sie daraus dar, indem er diesen Thee mit 40grädigem Weingeist auszog, so lange dieser eine gelbe Färbung annahm, den alkoholischen Auszug so lange mit einer alkoholischen Lösung von essigs. Bleioxyd versetzte als der Niederschlag nicht ganz rein gelb war, die abfiltrirte Flüssigkeit mit essigs. Bleioxyd vollständig fällte, den dann entstehenden schön eigelben Niederschlag mit Weingeist auswusch und mit Weingeist angerührt durch Schwefelwasserstoff zersetzte. — Rochleder hat außerdem die Veränderung der Kaffeegerbsäure durch Sauerstoff bei Gegenwart von Basen untersucht (6); Kaffeegerbsäure.

(1) Repert. Pharm. [2] XLV, 289. — (2) Ann. Ch. Pharm. LIX, 300. — (3) J. pharm. [3] X, 266. — (4) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 35; Wien. Acad. Ber. II (1848), 224; Pharm. Centr. 1848, 697. — (5) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 39; Wien. Acad. Ber. II (1848), 228; Pharm. Centr. 1848, 701. — (6) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 193; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 913.

Kaffee-
gerbsäure.

diese Veränderung ist anders bei Gegenwart von Ammoniak als bei der von Kali oder Natron; ist Baryt oder Kalk zugegen, so tritt zuerst dieselbe Veränderung ein wie bei Ammoniak, aber diese geht bald über in die bei Kali oder Natron sich zeigende. Genauere Angaben hat er über die Veränderung bei Gegenwart von Ammoniak mitgeteilt; es bildet sich hier eine Säure, welche er *Viridinsäure* nennt und deren Darstellung in folgender Art geschieht. Man bereitet eine Auflösung von reiner Kaffeegerbsäure durch Ausziehen getrockneter und gestofsner Kaffeebohnen mit Weingeist, Vermischen des Auszugs mit Wasser um das Fett abzuscheiden, Erhitzen der filtrirten Flüssigkeit zum Sieden, Füllen mit essigs. Bleioxyd, Auswaschen des Niederschlags und Zersetzung desselben mit Schwefelwasserstoff. Die durch Erwärmen von Schwefelwasserstoff befreite weingelbe Lösung wird bei Zusatz von überschüssigem Ammoniak dunkelgelb, dann unter Absorption von Sauerstoff grüngelb, nach 36 Stunden dunkel blaugrün und bei längerem Stehen braun. Die blaugrüne Flüssigkeit wird auf Zusatz von Essigsäure kastanienbraun; Zusatz von Alkohol bewirkt die Ausscheidung schwarzer Flocken (diese sind in wässrigem und reinem Alkohol unlöslich, löslich in Alkalien, und geben hieraus mit essigs. Bleioxyd gefällt, ein schwarzes Bleioxydsalz; sie gleichen in allen Eigenschaften der Metagallussäure von Pelouze und der Japonsäure von Svanberg; ihr Atomgewicht ist nach Einer Bestimmung 237); die von den schwarzen Flocken abfiltrirte braune Flüssigkeit (die durch Sättigen mit einer Basis sogleich wieder grünblau wird) giebt mit essigs. Bleioxyd einen blauen Niederschlag, welcher (mit heifsem Weingeist gewaschen, im Vacuum und bei 100° getrocknet) nahe die Zusammensetzung $PbO, C_{14}H_6O$, zeigte. Durch Ausziehen von gepulverten (früher mit Weingeist ausgekochten) Kaffeebohnen mit Wasser, Erhitzen der filtrirten Flüssigkeit zum Sieden, Füllen mit essigs. Bleioxyd, Zersetzen des mit Alkohol angerührten Niederschlags, Mischen der entstehenden

Flüssigkeit mit Ammoniak und 24stündiges Stehenlassen an der Luft, Zusatz von Weingeist, Abfiltriren des entstehenden grünblauen Niederschlags, Auswaschen desselben mit Weingeist dem etwas Essigsäure zugesetzt war (er löst sich in Essigsäure mit brauner Farbe), Füllen der braunen Lösung mit essigs. Bleioxyd wurde eine indigblaue Verbindung erhalten, welche bei 100° getrocknet die Zusammensetzung $\text{PbO}, \text{C}_{14}\text{H}_8\text{O}_8$ ergab. Durch Zersetzung eines solchen Bleisalzes mit Schwefelwasserstoff erhält man nach dem Verdampfen eine amorphe, in Wasser leicht lösliche Masse, welche sich in concentrirter Schwefelsäure mit carminrother Farbe auflöst und daraus durch Wasser in blauen Flocken gefällt wird. Die braune vom Schwefelblei abfiltrirte Flüssigkeit wird durch Alkalien sogleich grün gefärbt; mit Barytwasser giebt sie einen bläulich-grünen Niederschlag, bei 100° getrocknet $2 \text{BaO}, \text{C}_{14}\text{H}_8\text{O}_8$. Die Kaffeebohnen verdanken ihre grüne Farbe einer kleinen Menge viridins. Kalkerde. — Kaffeegerbsäure giebt mit Kali an der Luft eine dunkelbraune Lösung, aus welcher Alkohol ein braunes, in Wasser lösliches Kalisalz fällt. — Eine zweite, neben der Kaffeegerbsäure in den Kaffeebohnen enthaltene, von Pfaff zuerst aufgefunden, Säure erhielt Rochleder auf dem von diesem angegebenen Weg, durch Fällung des wässerigen Dekokts von Kaffeebohnen (welche vorher mit etwas heissem Weingeist behandelt waren) mit essigs. Bleioxyd, Zersetzen des Niederschlags mit Schwefelwasserstoff, Abdampfen der Flüssigkeit zur Syrupdicke und Eintragen derselben in Alkohol, wo sich leichte Flocken ausschieden, die zu einem lockeren Pulver eintrockneten; diese Säure scheint Kohlenstoff und Wasser in demselben Verhältniß wie die Kaffeegerbsäure zu enthalten, aber mehr Sauerstoff.

Bei einer neuen Untersuchung des Thees (der Blätter Kaffeegerbsäure. von *Thea bohea*) fand Rochleder (1) darin aufser gewöhnlicher Gerbsäure und einer sehr kleinen Menge einer nicht

(1) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 202; Pharm. Centr. 1848, 25.

Boheasäure. näher untersuchten krystallisirbaren Säure eine andere neue Säure, die er *Boheasäure* nannte. Durch Fällen eines siedendheissen Decocts von Theeblättern mit essigs. Bleioxyd, Abfiltriren, Trennung von dem nach 24 Stunden entstandenen geringen Niederschlag, Neutralisation der Flüssigkeit mit Ammoniak, Zersetzen des (mit Alkohol angerührten) Niederschlags mit Schwefelwasserstoff, Fällen der Flüssigkeit mit alkoholischer Lösung von essigs. Bleioxyd wurde ein Bleioxydsalz erhalten, welches bei 100° getrocknet annähernd die Zusammensetzung PbO, C, H_5, O_6 hatte; in ähnlicher Weise (nur wurde die letzte Fällung mit ammoniakalischer Bleizuckerlösung vorgenommen) ein anderes, bei 100° getrocknet $2 PbO, C, H_4, O_6$. Durch Fällen der aus dem Bleioxydsalz abgeschiedenen Säure mit Barytwasser entstand ein Barytsalz BaO, C, H_5, O_6 ; die eingedampfte, bei 100° und im luftleeren Raum abwechselnd getrocknete Säure ist eine im gepulverten Zustande blafsgelbe, bei 100° zu einem harzartigen rothen Körper schmelzende, an der Luft zerfließliche, in Wasser und Alkohol lösliche Substanz von der Zusammensetzung C, H_5, O_6 . Ein Pfund Thee giebt nicht mehr als 1,5 Grm. reines boheas. Bleioxyd.

**Angelika-
säure.**

Ricker und Reinsch (1) haben nachgewiesen, daß die von Reinsch in der Moschus- oder Sumbulwurzel aufgefunden und als Sumbulolsäure bezeichnete (2) Säure mit der Angelikasäure nach den physikalischen Eigenschaften und nach der Zusammensetzung identisch ist. — Hinsichtlich dieser Säure vergl. auch bei Römisch-Kamillenöl.

Benzoäure.

Ueber Bildung von Benzoäure vergl. die Zersetzung von Casein u. s. w. mit Schwefelsäure und Braunstein und zweifach-chroms. Kali.

Saint-Evre (3) hat verschiedene Zersetzungsproducte der Benzoäure untersucht. Löst man 60 Grm. Benzoäure

(1) Jahrb. pr. Pharm. XVI, 12; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 341. —

(2) Jahrb. pr. Pharm. XIII, 68. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXV, 484; J. pr. Chem. XLVI, 449; theilweise im Ausz. Compt. rend. XXV, 912; Pharm. Centr. 1848, 62, und Compt. rend. XXVII, 437; Pharm. Centr. 1848, 950.


und 200 Kalihydrat in 300 bis 350 Wasser, und läßt in ^{Benzoësäure.} der Kälte einen Strom von Chlorgas durch die Flüssigkeit streichen, so färbt sich diese gelb, grüngelb, grün, dann wieder gelb, und zuletzt setzt sich ein grauer krystallinischer Niederschlag ab; während der ganzen Operation entwickelt sich Kohlensäure. Der Niederschlag besteht aus chlors. Kali, wenig unverändertem benzoës. Kali, und dem Kalisalz einer neuen Säure; in der Flüssigkeit bleibt benzoës. Kali und Chlorkalium gelöst. Man setzt ein halb so großes Volum Wasser zu, sättigt mit Kohlensäure und zuletzt mit sehr wenig verdünnter Salzsäure, und bringt Alles zum Kochen, wo sich der Niederschlag wieder auflöst und sich bald eine ölartige Flüssigkeit abscheidet. Man trennt diese, welche bei dem Erkalten zu einer harten spröden, gelblichen Masse gesteht; man befreit sie von einem Gehalt an Benzoëssäure durch wiederholtes Schmelzen in kochendem Wasser, und zuletzt durch Umkrystallisiren in Alkohol oder einer Mischung von Alkohol und Aether. So erhält man den neuen Körper in blumenkohlförmig gruppirten mikroskopischen Krystallen; er schmilzt bei 150° und hat geschmolzen das spec. Gew. 1,29, er kocht bei 215° und ist ohne Zersetzung flüchtig; seine Zusammensetzung ist $C_{12}H_4ClO_4$; Saint-Evre nennt ihn *Chloroniceïnsäure*. Chloroniceïns. Silberoxyd, AgO , $C_{12}H_4ClO_4$, scheidet sich bei der Bereitung aus alkoholischen Lösungen in weißen Flocken ab, welche bei dem Auswaschen und Trocknen zu einem krystallinischen Pulver werden. Das Barytsalz hat entsprechende Zusammensetzung und ist ein weißes krystallinisches, in Wasser wenig, in heißem Alkohol ziemlich lösliches Pulver, welches sich bei dem Erhitzen unter Bildung eines festen und eines flüssigen Kohlenwasserstoffs und Zurücklassung eines kohligen Rückstandes zersetzt. Chloroniceïns. Ammoniak, durch Sättigung der alkoholischen Lösung der Säure mit Ammoniak, krystallisirt frisch bereitet in breiten glimmerartigen Blättern, NH_4O , $C_{12}H_4ClO_4$, welche schmelzbar und unzersetzt flüchtig sind,

Benzoësäure. von durchdringendem Geruch und Geschmack, löslich in Alkohol und Aether, in breiten Blättern krystallisirend; man reinigt es durch Auspressen zwischen Fließpapier, Waschen mit wenig kaltem Aether und Sublimiren über frischgeglühtem Kalk; sein spec. Gew. ist 1,24, sein Siedepunkt 365° , seine Zusammensetzung $C_{20}H_{12}$; die Dampfdichte wurde zu 4,79 beobachtet, sie berechnet sich (für eine Condensation auf 4 Vol.) zu 4,62. Das Paranicen löst sich unter heftiger Einwirkung in rauchender Salpetersäure, und giebt bei dem Abkühlen nadelförmige, in Alkohol und Aether lösliche Krystalle von $C_{20}H_{11}(NO_4)$. — *Paranicin* wird ein Körper genannt, welcher durch Behandlung des Paranicens mit Ammoniak und Schwefelwasserstoff in der oben angegebenen Weise entsteht, und aus dem salzs. Salz durch Ammoniak in hellgelben, in Wasser unlöslichen Flocken niedergeschlagen wird; es ist $C_{20}H_{13}N$, in Wasser unlöslich, in Aether löslich; wird es frisch bereitet in letzterem gelöst und abgedampft, so verwandelt es sich in ein ambergelbes Oel, welches in Salzsäure löslich ist und wo dann Ammoniak weißse Flocken niederschlägt. Das salzs. Paranicin krystallisirt in Octaëdern, welche an der Luft, in der Wärme und am Licht sich zersetzen und sauer reagiren; das Doppelsalz mit Platinchlorid, $C_{20}H_{13}N, HCl + PtCl_2$, ist ein krystallinischer, in Aether kaum löslicher Niederschlag.

Erwärmt man Phosphorchlorid mit gut getrockneter Benzoësäure, so destillirt, nach Cahours (1), eine rauchende Flüssigkeit über, welche neben Phosphoroxychlorid und überschüssigem Phosphorchlorid das von Liebig und Wöhler entdeckte Chlorbenzoyl enthält. Man trennt letzteres von den beiden ersteren durch Destillation und Auffangen der zwischen 195 und 200° übergehenden Portion. Es hat ein spec. Gew. 1,250 bei 15° , eine Dampfdichte von 4,987 (4,901 berechnet sich für eine Condensation auf 4 Vol.), gab auch

(1) In der S. 363 angeführten Abhandlung.

bei der Analyse Zahlen, die mit der Zusammensetzung des ^{Benzoësaure.} Chlorbenzoyls übereinstimmen, und lieferte mit Alkohol Benzoëäther, mit Ammoniak Benzamid und mit Anilin Benzanilid. Die Zersetzung ist also :



Benzoës. Kali verhält sich gegen Phosphorchlorid genau wie die Säure. Benzoëäther wird davon nicht zersetzt.

Durch Kochen von Benzoëssäure mit concentrirter oder besser mit rauchender Salpetersäure entsteht die von Mulder entdeckte Nitrobenzoëssäure, Benzoëssäure worin 1 H durch 1 (NO₂) ersetzt ist. Durch einstündiges Kochen von Benzoëssäure mit einer Mischung von rauchender Schwefel- und Salpetersäure werden nach Cahours (1) 2 H in der Benzoëssäure durch 2 (NO₂) ersetzt, es entsteht *Binitrobenzoëssäure*. Um diese zu bereiten, setzt man geschmolzene Benzoëssäure zu der auf 50 bis 60° erwärmten Säuremischung; während sich die Benzoëssäure löst, findet eine schwache Gasentwicklung statt. Man erwärmt dann allmähig bis sich die Flüssigkeit zu trüben beginnt; wenn sie erkaltet ist, so scheiden sich auf Zusatz von Wasser gelbliche Flocken ab, welche durch Waschen mit Wasser weiß werden; reagirt das Waschwasser nicht mehr sauer, so preßt man die Substanz zwischen Fließpapier, und löst sie in kochendem Alkohol, aus welchem sie sich bei dem Erkalten in glänzenden kleinen Krystallen ausscheidet. Die so erhaltene Binitrobenzoëssäure, C₇H₃(NO₂)₂O₂, schmilzt bei wenig erhöhter Temperatur, und sublimirt bei vorsichtiger Erhitzung unzersetzt; sie löst sich fast gar nicht in kaltem, etwas mehr in kochendem Wasser, ziemlich leicht in Alkohol und Aether, leicht und ohne Zersetzung in Salpetersäure, ohne Zersetzung in gelind erwärmter concentrirter Schwefelsäure, während bei stärkerer Erhitzung Zersetzung eintritt. Sie bildet mit Natron, Kali und Ammoniak lösliche und krystallisirbare, mit Bleioxyd und Silberoxyd wenig lösliche

(1) In der S. 387 angeführten Abhandlung.

Benzoësäure. Salze; das Silberoxydsalz, $\text{AgO}, \text{C}_{14}\text{H}_3(\text{NO}_4)_2 \text{O}_3$, ist weifs. Binitrobenzoës. Aethyloxyd, $\text{C}_4\text{H}_5\text{O}, \text{C}_{14}\text{H}_3(\text{NO}_4)_2 \text{O}_3$, bildet sich, wenn man bis zur Sättigung Binitrobenzoësäure in kochendem Alkohol löst, wo sich nach einiger Zeit, und noch reichlicher auf Zusatz von Wasser, der Aether als ein Oel abscheidet, welches bei dem Erkalten fest wird; aus der heifs gesättigten alkoholischen Lösung krystallisirt er bei dem Erkalten in langen, dünnen, glänzenden, kaum gelblich gefärbten Nadeln.

Nitrobenzoë-säure. Blumenau (1) giebt an, dafs Drachenblut mit Salpetersäure von 1,33 bis 1,35 spec. Gew. behandelt Oxalsäure giebt, mit Salpetersäure, welcher ihr gleiches Gewicht Wasser zugemischt ist, hingegen eine nichtflüchtige und eine flüchtige Säure, welche letztere mit Nitrobenzoësäure identisch sei.

Nitrobenzoësäure liefert nach Cahours (2) bei Erwärmung mit Phosphorchlorid eine überdestillirende schwere, zwischen 265 und 268° siedende Flüssigkeit, die in Wasser unlöslich ist und sich mit heifser Kalilauge in Chlorkalium und nitrobenzoës. Kali zerlegt. Sie besitzt die Formel $\text{C}_{14}\text{H}_4\text{ClNO}_6 = \text{C}_{14}\text{H}_4(\text{NO}_4)\text{ClO}_2$, und ist demnach Chlorbenzoyl, in welchem 1 H durch NO_4 ersetzt ist. Mit trockenem Ammoniakgas bildet dieser neue Körper ein festes, aus Wasser in gelben Nadeln krystallisirbares Product, welches wahrscheinlich mit dem von Field durch Erhitzen von nitrobenzoës. Ammoniak erhaltenen Körper identisch ist.

Cuminsäure. Die Cuminsäure zersetzt sich nach Cahours (3) bei 50–60° mit Phosphorchlorid unter reichlicher Entwicklung von Salzsäure; es destillirt dann Phosphoroxychlorid, und zwischen 250 und 260° eine farblose, leicht bewegliche Flüssigkeit, das *Chlorcumyl*, $\text{C}_{20}\text{H}_{11}\text{ClO}_2$. Es siedet zwischen 258 und 260°, hat ein spec. Gew. von 1,070 bei 15°, zersetzt sich an feuchter Luft, rascher beim Kochen mit Kali, in Salzsäure und Cuminsäure, liefert mit Alkohol

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 127. — (2) In der S. 363 angef. Abhandlung. — (3) In der S. 363 angef. Abhandl.

Cuminsäureäther, mit Ammoniak Chlorammonium und Cuminamid, mit Anilin Cuminanilid. Cuminsäure.

Cuminsäure löst sich, nach Cahours (1), bei gelinder Wärme in rauchender Salpetersäure; bei dem Kochen entwickeln sich röthliche Dämpfe; wenn man einige Minuten kocht und dann Wasser zusetzt, scheidet sich ein schweres, gelbes, bald erstarrendes Oel ab, welches man mit Wasser wascht und aus Alkohol umkrystallisirt. Dieser Körper ist *Nitrocuminsäure*, $C_{20}H_{11}(NO_4)O_4$, Cuminsäure in welcher 1 H durch 1 NO_4 ersetzt ist. Diese Säure krystallisirt in gelblich weissen Schuppen, ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether, und bildet mit den Alkalien krystallisirbare Salze. — Setzt man geschmolzene Cuminsäure in kleinen Portionen zu einer schwach erwärmten Mischung von Schwefel- und Salpetersäure, so verschwindet die Cuminsäure ohne Gasentwicklung oder stürmische Reaction; erhitzt man die Flüssigkeit, so tritt Entwicklung rother Dämpfe und plötzlich Trübung ein; in der Flüssigkeit befinden sich dann viele glänzende krystallinische Flitter, welche gewaschen und aus Alkohol umkrystallisirt glänzende Blättchen geben. Diese Verbindung hat die Zusammensetzung der Binitrocuminsäure, $C_{20}H_{10}(NO_4)_2O_4$, ist aber keine Säure.

Beim Erhitzen von Phosphorchlorid mit Zimmtsäure Zimmtsäure. geht, nach Cahours (2), eine ganz analoge Zersetzung vor sich, wie mit Benzoësäure; es bildet sich, neben Phosphoroxychlorid und Salzsäure, eine bei 262° siedende Flüssigkeit vom spec. Gewicht 1,207 bei 16° , *Chlorcinnamyl*, $C_{11}H_7ClO_2$ (also Zimmtöl, in welchem 1 At. Wasserstoff durch 1 At. Chlor ersetzt ist). Das Chlorcinnamyl wird an feuchter Luft zu Salzsäure und Zimmtsäure; mit Alkohol bildet es Zimmtsäureäther; mit trockenem Ammoniakgas Chlorammonium und einen weissen krystallisirbaren, dem Benzamid analogen Körper. Mit Anilin bildet es Cinn-

(1) In der S. 387 angef. Abhandl. — (2) In der S. 363 angef. Abhandlung.

Zimmtsäure. anilid (vergl. dieses). — Durch wiederholte Destillation von Chlorcinnamyl über Cyanquecksilber oder Cyankalium erzeugt sich Chlorquecksilber oder Chlorkalium und ein an der Luft unter Bildung von Blausäure und Zimmtsäure braunwerdendes, noch etwas chlorhaltiges Liquidum, das *Cyancinnamyl*, $C_{10}H_7NO_2 = C_{11}H_7CyO_2$. Die von Cahours angestellte Analyse beweist, obwohl ihre Resultate mit der Formel nicht ganz übereinstimmen, doch die Existenz dieser Verbindung.

Benzilsäure. Benzilsäure giebt, nach Cahours (1), mit Phosphorchlorid Salzsäure, Phosphoroxychlorid und ein bei 270° siedendes farbloses stark riechendes Liquidum, das mit Kali, Ammoniak und Anilin die entsprechenden Zersetzungsproducte liefert wie Chlorbenzoyl, Chlorcumyl u. s. w. Es ist $C_{11}H_{11}ClO_4$, und von Cahours als *Chlorbenzyl* bezeichnet worden.

Anissäure. Anissäure löst sich nach Cahours (2) bei gelinder Erwärmung leicht in rauchender Salpetersäure; Wasser fällt dann Nitranissäure in gelben Flocken. Wird hingegen die Lösung zum Kochen erhitzt, so entwickelt sich Kohlensäure, und man erhält ein aus zwei Substanzen bestehendes Product, deren eine in Kali löslich ist und die Zusammensetzung der Pikrinsäure hat, die andere in Kali und selbst in kochendem Wasser unlöslich ist. Letztere löst sich leicht in kochendem Weingeist und Aether, und scheidet sich aus dieser Lösung ab in Form glänzender blafsgelber Nadeln, welche bei 85 bis 86° schmelzen und vorsichtig erhitzt in verschlossenem Gefäße sublimirbar sind; sie ist *Binitranisol*, $C_{14}H_6(NO_4)_2O_2$. Dieses wird durch kochende verdünnte wässrige Kalilauge gar nicht, durch concentrirte nur bei lang andauerndem Kochen zersetzt; alkoholische Kalilösung zersetzt es schnell bei dem Kochen, und giebt damit ein in langen orangegelben Nadeln krystallisirendes Salz, aus welchem Salpeter-

(1) In der S. 363 angef. Abhandl. — (2) In der S. 387 angef. Abhandl.; im *Atsz. Compt. rend.* XXVII, 485; *Instit.* 1848, 351.

säure oder verdünnte Salzsäure Laurent's Nitrophenesäure, $C_{12}H_4N_2O_{10}$, abscheidet. Anissäure.

In einer Mischung von rauchender Schwefelsäure und Salpetersäure löst sich Anissäure bei gelinder Erwärmung ohne sie zu färben; bei schwacher Erhitzung entwickelt sich Kohlensäure; fährt man mit Erhitzen fort bis die Flüssigkeit sich zu trüben beginnt und überläßt sie dann sich selbst, so theilt sie sich in zwei Schichten. Die obere ist ölartig und wird bei dem Erkalten fest; aus der sauren Flüssigkeit gewinnt man durch Zusatz von vielem Wasser noch mehr von dieser Substanz. Sie ist in Wasser fast unlöslich (und kann dadurch von Säure rein erhalten werden), löslich in heißem Alkohol, noch besser in einer Mischung von gleichviel Alkohol und Aether, aus welchem sie bei langsamer Verdunstung in stark glänzenden, kaum gelblichen, rhombischen, bei 58 bis 60° schmelzenden Tafeln krystallisirt. Concentrirte Salpetersäure und Schwefelsäure lösen sie bei gelinder Erwärmung ohne Zersetzung. Sie ist *Trinitranisol*, $C_{14}H_5(NO_4)_3O_2$; dieses bildet sich auch bei Einwirkung der Mischung von rauchender Schwefel- und Salpetersäure auf reines Anisol. — Trinitranisol wird durch verdünnte Kalilauge oder selbst concentrirtere Ammoniakflüssigkeit auch bei dem Kochen nicht zersetzt, aber bei dem Kochen mit mäßig concentrirter Kalilauge färbt es sich intensiv braun, und es bildet sich ein in kaltem Wasser kaum lösliches Kalisalz, welches in vielem kochendem Wasser gelöst bei dem Erkalten in langen, kastanienbräunlich-goldfarbigen Nadeln auskrystallisirt; die Zusammensetzung dieses Salzes ist $KO, C_{12}H_4N_2O_{13}$. Kochende verdünnte Salpetersäure scheidet daraus die *Pikranissäure*, $C_{12}H_5N_3O_{14}$, welche bei dem Erkalten der heiß gesättigten wässrigen Lösung in gelben glänzenden Nadeln krystallisirt; sie ist wenig in kaltem, leicht in kochendem Wasser und in Alkohol und Aether löslich; sie ist isomer mit der Pikrinsäure, und unterscheidet sich von dieser durch die Krystallform, die Löslichkeit, den Schmelzpunkt und die

Anissäure. äufseren Eigenschaften einiger Salze. Mit Ammoniak giebt sie ein in langen Nadeln krystallisirendes Salz NH_4O , $\text{C}_{12}\text{H}_2\text{N}_3\text{O}_{13}$, welches bald gelb mit schwachem Stich in orange, bald roth wie zweifach-chroms. Kali ist; bei dem Umkrystallisiren wechselt oft* die Farbe. Sie löst das Silberoxyd, und bei langsamer Verdunstung der Lösung scheidet sich das Silberoxydsalz in feinen orangegelben Nadeln ab. Das Natronsaltz krystallisirt in langen goldgelben Nadeln und ist viel löslicher als das Kalisaltz; das Baryt- und das Strontiansaltz bilden gelbe, seidenglänzende, wenig lösliche Nadeln.

Das mit der Anissäure isomere salicyls. Methyloxyd erleidet durch die Mischung von rauchender Schwefel- und Salpetersäure eine andere Zersetzung (vergl. bei letzterem).

Anissäure giebt nach Cahours (1) mit Phosphorchlorid Salzsäure, Phosphoroxychlorid und *Chloranisyl* $\text{C}_{16}\text{H}_6\text{ClO}_4$. Letzteres ist farblos, flüssig, stark riechend, von 1,261 spec. Gew. bei 15° ; es siedet bei 262° , zersetzt sich an feuchter Luft zu Salzsäure und Anissäure, und giebt mit Alkohol oder Holzgeist die entsprechenden Aether, mit Ammoniakgas Anisamid.

Nitranissäure. Nitranissäure bildet nach Cahours (2) mit Phosphorchlorid neben Phosphoroxychlorür einen nicht näher untersuchten, erst bei sehr hoher Temperatur kochenden Körper, welcher an feuchter Luft sich zu Salzsäure und Nitranissäure zersetzt, mit Alkohol Nitranissäureäther bildet, und also wohl Chlornitranisyl $\text{C}_{16}\text{H}_6(\text{NO}_4)\text{ClO}_4$ ist.

Anilsäure. Nach Stenhouse (3) wird Anilsäure in wässriger Lösung durch Digestion mit chlors. Kali und Salzsäure oder durch längere Einwirkung von Chlor in der Wärme in Chloranil verwandelt; bei dem Kochen mit Chlorkalk tritt dunkelbraune Färbung ein, und Salzsäure schlägt dann ein gelbliches, nicht krystallisirbares Harz nieder.

(1) In der S. 363 angef. Abhandl. — (2) In der S. 363 angef. Abhandl. — (3) Phil. Mag. [3] XXXIII, 281; Pharm. Centr. 1848, 829.

Für die von Schunck unter den Oxydationsproducten ^{Pikrinähure.} der Aloë mit Salpetersäure aufgefundenen, von ihm früher Chrysolepinsäure genannte und als isomer mit der Pikrinsäure betrachtete Säure wurde von Schunck (1) selbst, von Marchand (2), von Mulder (3) und von E. Robiquet (4) nachgewiesen, daß sie im reinen Zustand mit der Pikrinsäure identisch ist. Marchand fand gleiche Löslichkeit (100 Wasser lösen bei 5° 0,626, 15° 1,161, 20° 1,225, 22,°5 1,292, 26° 1,380 77° 3,89 Säure) und gleiche Krystallform für beide Substanzen, mit welchen auch die s. g. Nitrophenissäure identisch ist.

Blumenau (5) hält es für wahrscheinlich, daß bei sehr langem Kochen der Pikrinsäure mit Salpetersäure erstere doch zerstört werde.

Wenn man, nach Stenhouse (6), eine wässrige Lö- ^{Chlorpikrin.} sung von Pikrinsäure in einer Retorte mit Chlorkalk mischt, so tritt eine Temperaturerhöhung ein, und erhitzt man bis zum Kochen, so destillirt zugleich mit den Wasserdämpfen ein farbloses schweres Oel über. Dasselbe bildet sich auch bei dem Kochen von Pikrinsäure mit chlors. Kali und Salzsäure (wobei Chloranil in der Retorte zurückbleibt) oder mit Königswasser (mit letzterem jedoch in geringerer Menge), auch bei dem Erhitzen von pikrins. Kali mit Chlorkalk, oder bei lang andauernder Einwirkung von Chlor auf heiße wässrige Pikrinsäure. Styphninsäure und Chrysaminsäure verhalten sich wie die Pikrinsäure; aber Chloranil war auf keine Weise in diesen ölartigen Körper umzuwandeln.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 284. — (2) J. pr. Chem. LXIV, 91. — (3) Scheikund. Onderzoek. IV, 506. — (4) J. pharm. [3] XIV, 179. — (5) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 115. — (6) Phil. Mag. [3] XXXIII, 53; Ann. Ch. Pharm. LXVI, 241; J. pr. Chem. XLV, 56; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 586; Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 83. Am letztern Ort sprach Gerhardt die Ansicht aus, die wahre Formel des Chlorpikrins möge wohl $C_6Cl_2NO_4$ sein, und später (Laur. u. Gerh. Compt. rend. des trav. chim. 1849, 170) theilte er Analysen von Cahours mit, welche allerdings letztere Zusammensetzung für das Chlorpikrin ergaben. Den Siedepunkt fand Cahours 114 bis 115°.

Chlorpikrin. Stenhouse nennt diesen Körper Chlorpikrin; er reinigt ihn durch Waschen, Trocknen mit geschmolzenem Chlorkalcium und vorsichtige Rectification im Wasserbad. Dieser Körper ist dann ein farbloses, das Licht stark brechendes Oel, vom spec. Gew. 1,6657, in verdünntem Zustand von eigenthümlich aromatischem, concentrirt von Nase und Augen heftig angreifendem Geruch, in Wasser beinahe unlöslich, in Alkohol und Aether leicht löslich; er wird nicht angegriffen durch Schwefel- Salpeter- oder Salzsäure, langsam zersetzt durch eine weingeistige Lösung von Aetzkali (unter Bildung von Chlormetall und salpeters. Kali), kaum durch wässrige Lösungen der Alkalien, unter Explosion bei Erwärmen mit Kalium; er siedet bei 120° und wird selbst bei 150° noch nicht zersetzt, aber bei dem Durchleiten seines Dampfs durch eine stärker erhitzte (doch nicht glühende) Glasröhre entwickelt sich Chlor und Stickoxyd, und an den kälteren Theilen der Röhre setzt sich fester Chlorkohlenstoff C_4Cl_6 ab. Die Zusammensetzung fand Stenhouse $C_4Cl_7N_2O_{10}$; eine geringe Quantität Wasserstoff (0,22 bis 0,26 pC.) liefs er unberücksichtigt.

Nitrobichlor-Phensäure. Durch Einleiten von Chlor in den Theil von Steinkohlenöl, welcher bei 180 bis 200° siedet, nachherige Einwirkung von Salpetersäure, Waschen des entstehenden Products mit Wasser, Neutralisiren mit Ammoniak, Kochen mit Wasser und Filtriren, Zusatz von Salpetersäure zu dem Filtrat und Umkrystallisiren der bei dem Erkalten sich abscheidenden Substanz in Alkohol, erhielten Laurent und Delbos (1) *Nitrobichlor-Phensäure*, $C_{12}H_3Cl_2NO_6$. Sie krystallisirt in schiefen rhombischen Prismen, wo die Seitenflächen unter einander unter 88°, die Endflächen zu den Seitenflächen unter 108°20' bis 108°30' geneigt sind; sie ist gelb, wenig löslich in Wasser, ziemlich löslich in kochendem Alkohol und in Aether; bei raschem Erhitzen in geschlossenem Gefäfs zersetzt sie sich unter Lichtentwicklung.

(1) Ann. ch. phys. [3] XIX, 380; J. pr. Chem. XL, 382; Pharm. Centr. 1847, 374.

Das Ammoniaksalz, $\text{NH}_4\text{O}, \text{C}_{12}\text{H}_2\text{Cl}_2\text{NO}_3$, krystallisirt in orangerothern Nadeln, welche vorsichtig erhitzt sich theilweise unzersetzt verflüchtigen; das Kalisalz krystallisirt in glänzenden Schuppen, welche in verschiedenen Richtungen betrachtet carmoisinroth oder goldgelb sind, und scheint wasserfrei ($\text{KO}, \text{C}_{12}\text{H}_2\text{Cl}_2\text{NO}_3$) zu sein.

Ueber die Säure, welche unter den Oxydationsproducten der Aloë durch Salpetersäure auftritt und von Schunck als Chrysamminsäure bezeichnet wurde, sind von Mulder (1) und von Schunck (2) Untersuchungen veröffentlicht worden.

Mulder fand für die bei 120° getrocknete Chrysamminsäure die Zusammensetzung $\text{C}_{14}\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_{11}$, für die wasserfreien neutralen Salze, z. B. das bei 120° getrocknete Kalisalz, $\text{MeO}, \text{C}_{14}\text{HN}_2\text{O}_{11}$. Lufttrocken enthält das neutrale Natronsalz 3, das Magnesia- und das Kalisalz 6; das Manganoxydul- und das (durch Digestion von Chrysamminsäure mit neutralem essigs. Bleioxyd bei 80° sich bildende) Bleioxydsalz 5, das Kupferoxydsalz 4 HO; bei 155° getrocknet sind diese Salze wasserfrei. Das bei 110° getrocknete neutrale Barytsalz enthält noch 2 HO; das aus chrysammins. Kali und neutralem essigs. Bleioxyd sich bildende Bleioxydsalz ist 2 PbO, $\text{C}_{14}\text{HN}_2\text{O}_{11}$. Chrysamminsäure verwandelt sich in einem Strom von trockenem Ammoniakgas bei 100° in Chrysamid, $\text{C}_{14}\text{H}_4\text{N}_2\text{O}_{11}$, welches sich mit Basen vereinigen läßt und z. B. durch Zusatz seiner Lösung zu essigs. Bleioxyd eine Verbindung $\text{PbO}, \text{C}_{14}\text{H}_4\text{N}_2\text{O}_{11} + 3 \text{HO}$ (lufttrocken) giebt.

Schunck fand, dafs das bei der Einwirkung von Salpetersäure auf Aloë sich bildende gelbe Pulver aus zwei Säuren, Aloëtinsäure und Chrysamminsäure, besteht, und dafs die erstere durch Behandlung mit starker Salpetersäure

(1) Scheikund. Onderzoek. IV, 456; Repert. Pharm. [3] II, 62. 145; im Ausz. Ann. ch. phys. [3] XXII, 122; J. pharm. [3] XIII, 140; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 339; J. pr. Chem. XLII, 250; Pharm. Centr. 1848, 168; Phil. Mag. [3] XXXII, 236. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 234; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 266; J. pharm. [3] XIII, 299.

Chrysammin-
säure. in letztere umgewandelt wird; für die Aloëtinsäure bestimmte er die Zusammensetzung $C_{16}H_4N_2O_{13}$. Die nach dem Kochen von Chrysamminsäure mit wässerigem Ammoniak bei dem Erkalten der Flüssigkeit in Nadeln sich abscheidende, im durchfallenden Licht röthlichbraune, im reflectirten Licht grünliche Substanz nennt er *Chrysamminamid*; die Analyse gab den beiden Formeln $C_{28}H_{10}N_7O_{21}$ und $C_{30}H_{10}N_7O_{23}$ gleichgut entsprechende Resultate. Durch Zusatz von Salzsäure oder verdünnter Schwefelsäure zu der heißen wässrigen Lösung dieser Substanz erhielt er bei dem Erkalten herauskrystallisirende, nach dem Waschen und Trocknen dunkel olivengrüne Nadeln von der Zusammensetzung $C_{14}H_4N_3O_{11}$ oder $C_{15}H_4N_3O_{12}$, die er als *Amidochrysamminsäure* bezeichnet. Diese Säure giebt in Ammoniak gelöst auf Zusatz von Chlorbaryum einen rothen krystallinischen Niederschlag; sie verwandelt sich bei dem Kochen mit Salpetersäure in Chrysamminsäure, während die überstehende Flüssigkeit salpeters. Ammoniak enthält; sie entwickelt bei der Behandlung mit kaustischem Kali Ammoniak; sie bildet mit Wasser eine dunkle purpurfarbene Lösung, und wird daraus von starken Säuren theilweise gefällt, ohne daß (wie bei der Chrysamminsäure) die Farbe dabei in Gelb übergeht. Ihre Salze gleichen den chrysammins. und detoniren ebenso bei dem Erhitzen, entwickeln aber bei dem Behandeln mit Aetzkali Ammoniak; sie entstehen auch aus Chrysamminamid bei Zusatz von Ammoniak (aus einer wässrigen Lösung von Chrysamminamid schlägt sich auf Zusatz von Chlorbaryum und Ammoniak sogleich amidochrysammins. Baryt nieder, ohne Zusatz von Ammoniak in der Kälte gar nicht und bei dem Kochen nur allmählig, wobei Salmiak in Lösung bleibt). — Chrysamminsäure löst sich bei dem Erwärmen mit nicht allzu concentrirter Kalilauge ohne Ammoniakentwicklung zu einer braunen Flüssigkeit, welche bei dem Sieden, unter Abgabe von Kohlensäure an das Kali, dunkler wird und dann keine Chrysamminsäure mehr enthält; Säuren fällen daraus einen dunkelbraunen

Niederschlag, der sich nicht in säurehaltigem, aber in rei-<sup>Chrysammin-
säure.</sup> nem Wasser mit brauner Farbe löst, welche Lösung durch Säuren und durch Alkalisalze gefällt wird. Durch Kochen von Chrysamminsäure mit Kalilauge und Zusatz von Chlorbaryum entsteht ein brauner Niederschlag, welcher mit wenig Schwefelsäure behandelt eine braune barythaltige Flüssigkeit giebt, die bei dem Abdampfen einen braunen Rückstand in feinen Blättchen von der Zusammensetzung $\text{BaO}, \text{C}_{12}\text{H}_4\text{N}_2\text{O}_9$ (der Stickstoff wurde nicht bestimmt) hinterläßt; die hier mit Baryt verbundene Substanz hält Schunck für die früher von ihm als Aloëresinsäure bezeichnete. — Chrysamminsäure bildet mit einer siedenden, überschüssiges Kali enthaltenden, Lösung von Schwefelkalium eine intensiv blaue Flüssigkeit, aus welcher sich bei dem Abkühlen krystallinische, im durchfallenden Licht blaue, im reflectirten Licht kupferrothe Nadeln abscheiden, welche getrocknet eine indigblaue, fast schwarze, Masse darstellen, und durch Umkrystallisiren aus siedender Kalilauge gereinigt werden können. Diese neue Substanz nennt Schunck *Hydrochrysammid*; bei dem Erhitzen detonirt sie nicht; in einer Proberöhre erhitzt bildet sie violette Dämpfe, welche blaue Krystalle absetzen, während der größte Theil unter Entwicklung von Ammoniak und Bildung eines kohligen Rückstandes zersetzt wird; sie ist unlöslich in Wasser, wenig löslich in kochendem Alkohol unter schwach blauer Färbung, mit brauner Farbe löslich in concentrirter Schwefelsäure und daraus durch Wasser in blauen Flocken fällbar, in ätzendem und kohlen. Kali mit blauer Farbe löslich und daraus durch Säuren fällbar; die Analyse ergab mit den Formeln $\text{C}_{14}\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_6$ und $\text{C}_{30}\text{H}_{12}\text{N}_4\text{O}_{13}$ gleich gut stimmende Resultate. Diese Substanz wird auch gebildet durch Einwirkung von Chrysamminsäure auf eine kochende Lösung von Zinnchlorür, welche sich augenblicklich blau färbt. Das Hydrochrysammid wird zersetzt durch Chlor und durch kochende Salpetersäure. Bei letzterer Zersetzung entwickelt sich salpetrige Säure und es bleibt eine dunkel-

braune Flüssigkeit, welche bei dem Abdampfen einen braunen Syrup giebt; bei der Behandlung desselben mit Wasser bleibt ein braunes Pulver zurück, das sich in kohlenst. Kali mit brauner Farbe löst und dem aus Chrysamminsäure und Kali entstehenden Körper gleicht; die von dem braunen Pulver getrennte Flüssigkeit enthält Oxalsäure und Ammoniak.

Constitution
der Säuren
 $C_n H_n O_4$.

Frankland und Kolbe (1) haben die Ansicht entwickelt, die Säuren $C_n H_n O_4$ (im s. g. Hydratzustand; n bedeutet eine ganze Zahl) seien gepaarte Verbindungen von Oxalsäure mit Wasserstoff, Methyl, Aethyl u. s. f., z. B.

Ameisensäure	Essigsäure	Metacetonsäure	Buttersäure
$H, C_2 O_3 + HO$	$C_2 H_3, C_2 O_3 + HO$	$C_4 H_7, C_2 O_3 + HO$	$C_6 H_{11}, C_2 O_3 + HO$

Von der weiteren Ansicht ausgehend, daß die Benzoösäure ($C_{14} H_8 O_4$) gleichfalls eine gepaarte Oxalsäure (Phenylloxalsäure, $C_{12} H_6, C_2 O_3 + HO$) sei, daß die als Nitrile bezeichneten Verbindungen richtiger als Cyanverbindungen aufzufassen seien (das Benzonnitril $C_{14} H_8 N$ z. B. als Cyanphenyl $C_{12} H_6 Cy$), vermutheten sie, daß ebenso wie das Cyanphenyl in Phenylloxalsäure übergehe, aus Cyanmethyl, Cyanäthyl, Cyanamyl sich Methyloxalsäure, Aethyloxalsäure, Amyloxalsäure, d. i. Essigsäure, Metacetonsäure, Capronsäure werde darstellen lassen. Die Resultate ihrer Versuche waren ihren Erwartungen entsprechend; wir werden über sie unten bei den letztgenannten Säuren berichten.

Acetone der
Säuren
 $C_n H_n O_4$.

Chancel (2) hat die Ansicht zu vertheidigen gesucht, daß jedes Aceton (nach den bisherigen Ansichten $C_{n-1} H_{n-1} O$) einer Säure $C_n H_n O_4$ aus dem Aldehyd dieser Säure ($C_n H_n O_2$) und einem Kohlenwasserstoff der vorhergehenden Reihe ($C_{n-2} H_{n-2}$) zusammengesetzt sei; das gewöhnliche

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 288; im Ausz. J. pr. Chem. XLVI, 301; theilweise (namentlich die Angaben über Cyanäthyl und Metacetonsäure enthaltend) Phil. Mag. [3] XXXI, 266; Chem. Soc. Mem. III, 386; J. pr. Chem. XLII, 313; Pharm. Centr. 1847, 810; J. pharm. [3] XIV, 294.—

(2) J. pharm. [3] XIII, 468.

Aceton (der Essigsäure) z. B., dessen Formel $C_2H_4O_2$ zu schreiben, aus $C_4H_4O_2$ und C_2H_2 .

Du Mênil (1) hat auf das Vorkommen flüchtiger Säuren in dem Wermuthwasser und in dem Lavendelwasser aufmerksam gemacht, und auf Verschiedenheiten ihrer Verbindungen mit Zinkoxyd von dem valerians. Zinkoxyd. — In dem Destillat der Blüten von Schafgarbe (*Achillea millefolium*), welches auch nach Butter- und Valeriansäure roch, fand Krämer (2) Metacetonsäure, in dem von Kümmel Essigsäure, in dem von *Tanacetum vulgare*, *Arnica montana* und *Rosa centifolia* Säuren, deren Geruch an Butter- und Valeriansäure erinnerte. — Die Früchte des Seifenbaums (*Sapindus saponaria*) gaben, mit Wasser und Schwefelsäure destillirt, nach Gorup-Besanez (3) ein ameisensäure- und buttersäurehaltiges Destillat. Tamarindenfrüchte eben so behandelt ergaben Ameisensäure und Essigsäure; zugleich roch das Destillat nach Buttersäure, die indess nicht bestimmter nachzuweisen war. Gorup-Besanez hält es nicht für unwahrscheinlich, daß sich die genannten Säuren aus der in jenen Früchten ursprünglich enthaltenen Weinsäure durch Sauerstoffaufnahme bilden. — Böhme (4) zeigte, daß unter den Producten der Fäulniß von Erbsen und Linsen vorzugsweise Metacetonsäure und Buttersäure auftreten. — Nach Dessaignes und Chautard (5) ist in gebrauchter Lohe außer Buttersäure wahrscheinlich auch Metacetonsäure enthalten. (Vergl. auch die einzelnen Säuren.)

Vorkommen
von Säuren
 $C_nH_nO_n$.

Ueber Bildung von Ameisensäure, Essigsäure, Metacetonsäure und Capronsäure vergl. auch die Zersetzung von Casein, Fibrin u. s. w. mit Schwefelsäure und Manganhypoxyd oder zweifach-chroms. Kali.

- (1) Arch. Pharm. [2] LI, 18. — (2) Arch. Pharm. [2] LIV, 9. — (3) Gel. Anz. d. bair. Acad. Nr. 232; Ann. Ch. Pharm. LXIX, 369; J. pr. Chem. XLVI, 151. — (4) J. pr. Chem. XLI, 278; im Ausg. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 328; Pharm. Centr. 1847, 705. — (5) J. pharm. [3] XIII, 244; J. pr. Chem. XLV, 49; Pharm. Centr. 1848, 496.

Ameisensäure.

Ueber das Vorkommen der Ameisensäure in Früchten vergl. S. 545. Hinsichtlich der Bildung derselben in Citronenöl hat Fr. Müller (1) Beobachtungen und Versuche mitgetheilt, welche er selbst nicht für genügend hält, um Aufschluss über die im Citronenöl sich bildende Säure zu geben.

Fr. Will (2), in Erlangen, hat nachgewiesen, daß der wirksame schädliche Stoff in den Raupen und besonders in der Processionsraupe (*Bombyx processionea*) Ameisensäure ist. Sie ist in allen Theilen der Raupe, besonders aber in den *Faeces*, in dem grünlich gelben Saft, der ausfließt, wenn man die Raupe anschneidet, und endlich in den hohlen, leicht zerbrechlichen Haaren in freiem, concentrirtem Zustande vorhanden.

Für die Darstellung der wässerigen Ameisensäure empfiehlt Cloez (3), 500 Grm. Stärkmehl mit 2000 Grm. Braunstein zu mengen, in einem 25 bis 30 Liter fassenden Destillirapparat 1 Liter Wasser zuzusetzen, umzurühren, 2 Kilogramme Schwefelsäure die mit 2 Liter Wasser verdünnt sind zuzusetzen, und bei der Destillation heisses Wasser in dem Maasse nachzugeben als überdestillirt; man könne 12 bis 15 Liter sehr saurer Flüssigkeit überdestilliren mit einem Gehalt von etwa 412 Grm. Ameisensäurehydrat.

Aus einer Lösung von einfach-ameisens. Kali in heisser concentrirter Ameisensäure erhielt Bineau (4) bei dem Erkalten Krystallnadeln; die Mutterlauge gab im luftleeren Raum über Schwefelsäure und Aetzkali eine Krystallmasse, von welcher ein Theil im luftleeren Raum gelassen wurde, so lang der Geruch nach Ameisensäure sich daraus entwickelte, ein anderer in Alkohol gelöst und im luftleeren Raum zur Trockne verdampft. Diese drei Präparate ent-

(1) Arch. Pharm. [2] LI, 149. — (2) Froriep's Notizen VII, 141. — (3) J. chim. méd. [3] IV, 306. — (4) Ann. ch. phys. [3] XIX, 291, und (dieselbe Abhandlung) XXI, 188; im Ausz. J. pr. Chem. XL, 354; Pharm. Centr. 1847, 394.

hielten Kali und Ameisensäure im Verhältniß der Formel ^{Ameisensäure.} $\text{KO}, \text{C}_2\text{HO}_3 + \text{HO}, \text{C}_2\text{HO}_3$, aber außerdem das erste 2,6, das zweite 7,6, das dritte 11,0 pC. Wasser. Die Lösung von ameisens. Natron in concentrirter Ameisensäure gab im luftleeren Raum undeutliche Krystalle, welche gleichfalls Säure und Basis im Verhältniß der Formel $\text{NaO}, \text{C}_2\text{HO}_3 + \text{HO}, \text{C}_2\text{HO}_3$ und außerdem 7 pC. Wasser enthielten. — Beide saure Salze schmecken sehr sauer, sind sehr zerfließlich, gehen bei dem Auflösen in vielem Wasser und Abdampfen größtentheils in einfach-saure Salze über, und verlieren bei längerem Verweilen im luftleeren Raum einen Theil ihrer Säure.

Ueber das Vorkommen von Essigsäure vergl. S. 545; ^{Essigsäure.} über ihre Bildung in Tinkturen hat Bastick (1) Mittheilungen gemacht.

Cyanmethyl (durch Destillation von trockenem methylschwefels. Kali mit Cyankalium, Zusatz von Chlorcalcium zu dem Destillat und Abdestilliren bei gelinder Wärme erhalten, aber nicht frei von Blausäure) bildet nach Frankland und Kolbe (2), wenn es einige Zeit hindurch mit einer kochenden, mäßig concentrirten, wässerigen Kalilösung in der Art behandelt wird, daß das Verdampfende immer wieder zu der Kaliflüssigkeit zurückfließt, unter bedeutender Ammoniakentwicklung essigs. Kali.

Auch Dumas, Malaguti und Leblanc (3) erkannten die Bildung von Essigsäure durch Einwirkung von wässerigem Kali auf Cyanmethyl, welches sie sowohl durch Ausscheidung der Elemente des Wassers aus essigs. Ammoniak (vergl. bei den Nitrylen), als durch Einwirkung von trockenem Cyankalium auf schwefels. Methyloxyd erhielten, im letzteren Fall zuerst verunreinigt durch etwas Cyanammonium und ameisens. Ammoniak, welche Verunreinigung ihm unerträglichen Geruch und Geschmack und giftige

(1) Pharm. J. Trans. VII, 268; Pharm. Centr. 1848, 48. — (2) In der S. 544 angeführten Abhandlung. — (3) Compt. rend. XXV, 474; Pharm. Centr. 1847, 824.

Essigsäure. Eigenschaften mittheilt, aber durch Kochen mit Quecksilberoxyd und dann mit wasserfreier Phosphorsäure entfernt werden kann.

Nach Taddei(1) bringt Kalilösung von 1,06 spec. Gew., tropfenweise und unter Schütteln zu einer siedend heißen Lösung von einfach-essigs. Bleioxyd von 1,25 bis 1,30 spec. Gew. gesetzt, längere Zeit keinen bleibenden Niederschlag hervor, bis plötzlich die ganze Flüssigkeit zu einem weissen Brei erstarre, welcher durch ein in heißem Wasser mässig lösliches Doppelsalz gebildet werde, welches 3 PbO, 2 KO, 3 C₄H₃O₃ nebst Wasser enthalte.

Wittstein (2) hat die freiwillige Zersetzung untersucht, welche der *Liquor ferri acetici oxydati* und die *Tinctura ferri acetici aetherea Klaprothii* zeigen, indem sie nach einiger Zeit einen braunen gallertartigen Niederschlag fallen lassen. Er ist zu dem Resultat gekommen, daß dieser Niederschlag als ein überbasisches essigs. Eisenoxyd betrachtet werden könne, dessen Zusammensetzung aber nicht constant sei, sofern es um so mehr Säure enthalte, um je saurer die Flüssigkeit selbst gewesen sei; die Ursache dieser Zersetzung sei noch unbekannt, eine Oxydulbildung finde dabei nicht statt, aber letztere könne eintreten und beschleunigend einwirken, wenn die Präparate dem Tageslicht ausgesetzt seien.

Aldehyd. Weidenbusch (3) hat die Einwirkung von Alkalien und von Säuren auf Aldehyd untersucht. Das bei der Einwirkung von Alkali auf Aldehyd unter Entwicklung eines stechenden Geruchs sich ausscheidende gelbe Harz konnte auch er nicht rein erhalten, weil derjenige Körper, welchem der erwähnte stechende Geruch eigenthümlich ist (ein flüchtiger, ölartiger Körper, welcher sich an der Luft

(1) Aus Raccolta fisico-chimica italiana, II, 562, in Chem. Gaz. 1848, 169; im Aus. Pharm. Centr. 1848, 426. — (2) Repert. Pharm. [3] I, 289. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 152; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 852; J. pr. Chem. XLVI, 252; Chem. Gaz. 1849, 84; Laurent u. Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 28.

rasch, noch schneller durch Salpetersäure, verdickt und in ein goldgelbes, dickflüssiges, zimmtartig riechendes, in Alkohol und Aether und auch etwas in Wasser lösliches, von dem eigentlichen Aldehydharz verschiedenes Harz übergeht), nicht davon getrennt werden kann. Das Aldehydharz ist ein feurig orangegelbes, durch Trocknen bei 100° blasser werdendes Pulver, welches sich in Weingeist, Aether und etwas in Wasser, kaum in Alkalien, theilweise in concentrirter Schwefelsäure löst; aus letzterer Lösung wird es durch Wasser wieder ausgefällt. In Weingeist gelöst wird es schon durch wenig Chlor rasch entfärbt, so daß Wasser dann ein schneeweißes, aber schon Chlor enthaltendes, Pulver fällt. In dem möglichst gereinigten Aldehydharz wurden 76,4 pC. Kohlenstoff und 8,0 pC. Wasserstoff gefunden; bei seiner Entstehung bilden sich noch Essigsäure, Ameisensäure und auch Aldehydsäure (acetylige Säure), welche mit dem Alkali sich vereinigen. — Wenn Aldehyd unter 0° mit einer Spur Schwefelsäure oder Salpetersäure zusammengebracht wird, so scheiden sich bald feine nadelförmige Krystalle ab, wahrscheinlich unschmelzbares Metaldehyd; wird die überstehende Flüssigkeit mit Wasser geschüttelt, so schwimmt oben eine Flüssigkeit, welche mit Chlorcalcium entwässert und rectificirt die Zusammensetzung und Dampfdichte (4,583 wurde gefunden) des Elaldehyds ($C_{12}H_{12}O_6$) zeigt, aber den höheren Siedepunkt 125° hat, mit einer Spur Schwefelsäure oder Salpetersäure *erwärmt* wieder in Aldehyd übergeht, und sowohl für sich als mit Wasser rasch in eine Säure übergeht, deren Barytsalz krystallisirt, in Wasser leicht löslich ist, Silbersalze leicht reducirt und mit Quecksilberoxydul- und Oxydsalzen einen weißen Niederschlag giebt (der mit ersteren gebildete wird durch Erhitzen zu Metall reducirt, der mit letzteren gebildete bleibt auch beim Kochen weiß). — Bei anhaltendem Einleiten von Schwefelwasserstoff in eine Mischung von Aldehyd und Wasser entsteht Trübung, und es setzt sich ein dickflüssiges wasserhelles Oel ab, welches im luftleeren

Aldehyd. Raum getrocknet wird. Dieses hat 1,134 spec. Gew., einen heftigen unangenehmen Knoblauchgeruch, ist in Wasser etwas, in Alkohol und Aether leicht löslich, und mit fetten und ätherischen Oelen mischbar; seine Zusammensetzung entspricht der Formel $C_{12}H_{13}S_7$; es beginnt bei 180° zu sieden, aber der Siedepunkt steigt fortwährend unter Bräunung des Oels und zuletzt bleibt eine braune schmierige Masse zurück, welche zu einem Kuchen von Krystallen erstarrt. Das Oel bildet mit Chlorcalcium unter Entwicklung von Aldehyd Schwefelcalcium; mit Ammoniakgas Thialdin. Der Zusatz von einem Tropfen concentrirter Schwefelsäure (oder auch das Einleiten gasförmiger Salzsäure) läßt es unter Entwicklung von Schwefelwasserstoff zu einer weißen krystallinischen Masse erstarren, welche sich in mehr Schwefelsäure löst und durch Wasser wieder ausgefällt wird, sich in Alkohol, Aether und etwas in Wasser löst, mit letzterem überdestillirt, und in blendend weiße glänzende Nadeln von unangenehmem knoblauchartigem Geruch umkrystallisirt werden kann, die bei 45° zu sublimiren beginnen, und deren Zusammensetzung $C_{12}H_{13}S_7 - HS = C_{12}H_{11}S_6$ oder $C_4H_4S_2$ ist, also die des Aldehyds wenn der Sauerstoff desselben durch Schwefel ersetzt ist (Weidenbusch gebraucht in Beziehung darauf den Namen Acetylmercaptan). Diese Verbindung entsteht aus dem Oel $C_{12}H_{13}S_7$ auch auf andere Weise; bei Erhitzung desselben (als die oben erwähnte krystallinische Masse, welche bei der Destillation zurückbleibt); bei dem Stehen des mit Oel gesättigten Wassers an der Luft (wobei sich Schwefelwasserstoff entwickelt, und Einleiten dieses Gases das Oel wieder herstellt); bei dem Verweilen des Oels über Schwefelsäure unter einer Glasglocke; bei Einwirkung von wenig Chlorgas (mehr des letzteren bildet eine ölartige Flüssigkeit von furchtbarem Geruch). Die Verbindung $C_4H_4S_2$ verhält sich neutral; Ammoniak, Kali und Quecksilberoxyd wirken auf sie nicht ein; mit Salpetersäure übergossen braust sie stark auf. Wird ihre weingeistige Lösung mit

einer weingeistigen Lösung von salpeters. Silberoxyd gemischt, so entsteht ein ziemlich dicker, weißer, seine Farbe schnell ändernder Niederschlag, bei dessen Erhitzung sich Schwefelsilber ausscheidet und eine Silberverbindung in dem heißen Weingeist gelöst bleibt. Diese Lösung wird kochend filtrirt; bei dem Erkalten scheiden sich perlmutterglänzende Flittern ab, welche mit Weingeist abgespült eine der Formel $2(\text{AgO}, \text{NO}_3) + 3(\text{C}_4\text{H}_4\text{S}_2)$ entsprechende Zusammensetzung zeigten, nach $\text{C}_4\text{H}_4\text{S}_2$ riechen (welcher Körper auch durch Alkalien aus ihnen abgeschieden werden kann), sich am Licht dunkler färben, für sich erhitzt unter Schwärzung salpetrige Säure entwickeln, und in wässriger Lösung bei dem Abdampfen derselben sich unter Bildung von Schwefelsilber zersetzen.

Aldehyd.

Hinsichtlich der Aldehyde anderer Säuren, der Metacetonsäure und Buttersäure, vergl. die Zersetzung von Casein u. s. w. mit Schwefelsäure und Manganhyperoxyd oder zweifach-chroms. Kali.

Ueber das Vorkommen von Metacetonsäure vergleiche Seite 545.

Dumas, Malaguti u. Leblanc (1) haben die Identität der Säure, welche Nöllner in gegohrner Mutterlauge von Weinstein beobachtet und Pseudoessigsäure genannt, Nicklès als $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_4$ erkannt, aber als verschieden von der Metacetonsäure betrachtet und Butteressigsäure genannt hatte, mit der Metacetonsäure erwiesen. Beide Säuren zeigen außer derselben Zusammensetzung dasselbe Ansehen, denselben Geruch, denselben Siedepunkt (gegen 140°), sie bilden dasselbe Silbersalz und dasselbe Barytsalz, welches letztere aus beiderlei Säure dargestellt von Provostaye krystallographisch untersucht wurde. Die genannten Chemiker schlagen für diese Säure den Namen *Propionsäure* (erste fette Säure) vor, weil unter den Säuren $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_4$ sie zuerst den Charakter der fetten Säuren hat,

Metaceton-
säure.

(1) Compt. rend. XXV, 781; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 329; Pharm. Centr. 1848, 95.

Metaceton-
säure.

sich aus ihrer Lösung in Form einer Oelschicht abscheiden zu lassen und mit Alkalien sich fettig anfühlende Salze zu bilden. Sie stellten diese Säure dar durch Einwirkung von Kali auf Cyanäthyl (1). Das metacetons. Kali erhielten sie als ein weißes, perlmutterartiges, in Wasser sehr lösliches Salz; für das aus ihm durch Fällung mit salpeters. Silberoxyd erhaltene Silbersalz fanden sie die Zusammensetzung $\text{AgO}, \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_3$ bestätigt. Sie beobachteten, daß bei Abscheidung der Metacetonsäure aus dem Kalisalz durch Destillation mit syrupartiger Phosphorsäure die zuletzt übergehende Säure krystallisirt und bei gewöhnlicher Temperatur und vor Feuchtigkeit geschützt fest bleibt.

Auf dieselbe Art erhielten auch Frankland und Kolbe (2) die Metacetonsäure. Cyanäthyl (durch Destillation von ätherschwefels. Kali und Cyankalium, Schütteln des Destillats mit Wasser, Abscheidung davon mittelst Chlornatrium, Trocknen mit Chlorcalcium und Rectificiren als eine bei 80° siedende Flüssigkeit von 0,7889 spec. Gew. bei $12,6^\circ$ rein dargestellt, welche, im Widerspruch mit Pelouze's Angabe, in Wasser ziemlich löslich ist, aus dieser Lösung durch Chlornatrium oder Chlorcalcium gröfstentheils wieder abgeschieden werden kann, und bei 88° siedet) gab mit kochendem wässerigem Kali so behandelt, daß das Verdampfende zurückfloß, metacetons. Kali, und dieses mit Schwefelsäure destillirt wässrige Metacetonsäure. Das Barytsalz der letztern krystallisirt schwierig, bei 100° getrocknet ist es $\text{BaO}, \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_3$; das Silberoxydsalz scheidet sich bei dem Erkalten einer heiß gesättigten Lösung in kleinen Krystallblättchen ab, ist im Wasser weniger löslich als das essigs. Salz, und zeigt im Vacuum über Schwefelsäure getrocknet die von Gottlieb angegebene Zusammensetzung $\text{AgO}, \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_3$; das Bleioxydsalz schmeckt süß, und seine Lösung trocknet zu einer zähen gummiähnlichen Masse ein, welche ebenso getrocknet $\text{PbO}, \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_3$ ist.

(1) Compt. rend. XXV, 656; Pharm. Centr. 1848, 121. — (2) In der S. 544 angeführten Abhandlung.

Ueber Metacetonsäure, in welcher Wasserstoff durch Chlor vertreten ist, vergl. Seite 500.

Mischt man, nach Laurent und Chancel (1), gleiche Nitrometaceton-
säure. Volume Butyron (C_4H_8O) und Salpetersäure von gewöhnlicher Concentration, so tritt bei gelinder Erwärmung eine heftige Reaction, unter Entwicklung salpetriger Dämpfe und von Kohlensäure, ein; wird die Erwärmung nach Eintreten der Einwirkung sogleich unterbrochen und nach Beendigung der Gasentwicklung die Flüssigkeit in vieles Wasser geschüttet, so scheidet sich unter diesem ein öliges, mit Alkohol in allen Verhältnissen mischbares Liquidum ab, *Nitrometaceton* oder Metacetonsäure, worin 1 H durch 1 (NO_4) ersetzt ist. Reiner wird diese Säure erhalten durch Zusatz einer starken Säure zu einer wässrigen Lösung des Kali- oder Ammoniaksalzes; sie bleibt selbst bei starker Kälte flüssig, riecht aromatisch, schmeckt süß und ist entzündlich. — Eine alkoholische Auflösung der Säure giebt mit alkoholischer Kalilösung alsbald gelbe krystallinische Nadeln des Kalisalzes, welche durch Umkrystallisiren gereinigt werden. Das Ammoniaksalz wird auf gleiche Weise, die andern Salze, namentlich das Silbersalz, durch doppelte Wahlverwandtschaft dargestellt. Alle Salze sind krystallisirbar, und entzünden sich, mit Ausnahme des Ammoniaksalzes, bei gelinder Erwärmung unter einer Art von Explosion. Die Säure ist $C_4H_7(NO_4)O_4$. Das krystallisirte Kalisalz ist $KO, C_4H_7(NO_4)O_4 + 2HO$. Das damit isomorphe Ammoniaksalz, $NH_4O, C_4H_7(NO_4)O_4 + 2HO$, sublimirt ohne Zersetzung, explodirt aber mehrere Tage aufbewahrt von selbst; Schwefelwasserstoff zersetzt es unter Absatz von Schwefel. Die Lösung des Kalisalzes giebt mit salpeters. Silberoxyd einen gelben Niederschlag, wahrscheinlich von basischem Salz, aus welchem kochendes Wasser unter Zurücklassung von Silberoxyd neutrales

(1) J. pharm. [3] XIII, 462; Compt. rend. XXV, 883; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 331.

Silbersalz auszieht, das in rhombischen Tafeln, AgO , $\text{C}_6\text{H}_4(\text{NO}_2)_2 + 2\text{HO}$, krystallisirt.

Buttersäure. Ueber das Vorkommen und die Bildung von Buttersäure vergl. S. 512 und 545.

Wackenroder (1) hat gezeigt, daß bei der Umwandlung des Milchzuckers in Milchsäure durch Milch sich auch etwas Buttersäure bildet.

Bensch (2) hat darauf aufmerksam gemacht, daß bei der Darstellung von Milchsäure nach Gobley's Vorschrift man keinen Anhaltspunkt zur Beurtheilung hat, wann der Uebergang des Zuckers in Milchsäure geschehen ist, was einen Verlust an Milchsäure durch Bildung von Buttersäure (welche sogleich nach der Milchsäurebildung beginnt) veranlassen kann. Bensch giebt zur Darstellung der Milchsäure und Buttersäure folgende Vorschrift. 6 Pfund Rohrzucker und $\frac{1}{4}$ Unze Weinsäure werden in 26 Pfund siedendem Wasser gelöst und einige Tage stehen gelassen, sodann zwei stinkende alte Käse (von etwa 4 Unzen), welche in 8 Pfund abgerahmter geronnener saurer Milch vertheilt sind, und 3 Pfund Schlemmkreide zugesetzt, das Ganze an einem 30 bis 35° warmen Ort stehen gelassen, und täglich mehrere Male gut umgerührt. Nach 8 bis 10 Tagen erstarrt die ganze Masse zu einem Brei von milchs. Kalk, welchem man 20 Pfund siedendes Wasser und $\frac{1}{4}$ Unze Aetzkalk zusetzt; nach halbstündigem Kochen wird durch einen Spitzbeutel filtrirt, und das Filtrat zu Syrupdicke eingedampft; nach 4 Tagen ist der milchs. Kalk krystallinisch körnig abgeschieden. Er wird ausgeprefst, 3- bis 4mal mit $\frac{1}{10}$ seines Gewichts an kaltem Wasser angerührt und ausgeprefst, dann in seinem doppelten Gewicht an kochendem Wasser gelöst, auf je 1 Pfund ausgeprefsten milchs. Kalk werden $3\frac{1}{4}$ Unzen Schwefelsäure zugesetzt, welche vorher mit einem gleichen Gewicht Wasser verdünnt worden, die heiße Flüssigkeit wird abfiltrirt und mit

(1) Arch. Pharm. [2] LI, 188; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 748. —

(2) Ann. Ch. Pharm. LXI, 174; Pharm. Centr. 1847, 405.

1½ Pfund kohlens. Zinkoxyd auf je 1 Pfund angewandter ^{Buttersäure.} Schwefelsäure ¼ Stunde lang (nicht länger) gekocht; aus der kochend filtrirten Flüssigkeit setzt sich nach einiger Zeit farbloses milchs. Zinkoxyd in krystallinischen Krusten ab, welches mit kaltem Wasser gewaschen und (in dem 7½fachen Gewicht kochendem Wasser gelöst) durch Schwefelwasserstoff zersetzt wird. — Läßt man das obige Gemisch von Zucker, Kreide u. s. w. länger als 10 Tage bei 35° unter Ersetzung des verdunstenden Wassers stehen, so wird die Masse unter Gasentwicklung wieder dünnflüssiger, und nach 5 bis 6 Wochen ist die Milchsäure in Buttersäure übergegangen. Man mischt die Flüssigkeit mit einem gleichen Volum kaltem Wasser, setzt eine Auflösung von 8 Pfund krystallisirter Soda zu, filtrirt den kohlens. Kalk ab und wäscht ihn aus, dampft die Flüssigkeit auf 10 Pfund ein, und setzt vorsichtig 5½ Pfund Schwefelsäure zu, welche vorher mit einem gleichen Gewicht Wasser verdünnt worden. Die als eine dunkel gefärbte ölige Schicht sich abscheidende Buttersäure wird abgenommen; die andere Flüssigkeit destillirt, das Destillat mit kohlens. Natron gesättigt und die darin enthaltene Buttersäure gleichfalls durch Schwefelsäure abgeschieden. Alle rohe Buttersäure rectificirt man, mit Zusatz von 1 Unze Schwefelsäure auf je 1 Pfund; das Destillat sättigt man mit Chlorcalcium, wodurch die Essigsäure geschieden wird, und destillirt abermals, wo zuerst verdünnte Buttersäure mit Spuren von Salzsäure, dann concentrirte Buttersäure übergeht. So erhält man aus 6 Pfund Rohrzucker 28 Unzen reine concentrirte Buttersäure.

Nach Laroque(1) läßt sich die Buttersäure von der Valeriansäure dadurch unterscheiden, daß letztere zu einer Auflösung von essigs. Kupferoxyd gesetzt zuerst eine oben schwimmende grüne ölarartige Schicht bildet und erst bei dem Schütteln einen festen Niederschlag, während die But-

(1) Aus Recueil des trav. de la soc. d'émulat. pour les sc. pharm., Janvier 1847, in J. pharm. [3] XII, 67.

Buttersäure. tersäure letzteren sogleich hervorbringt (1). Vom *butters. Zinkoxyd* beobachtete Laroque, daß das krystallisirte Salz gegen 100° schmilzt, und weiter erhitzt sich unter Ausstoßung saurer Dämpfe, wasserfreien Salzes und Butyron zersetzt; das wasserfreie Salz schmelze bei 140°; bei dem Kochen der Lösung entweiche Buttersäure und es bilde sich ein unlösliches basisches Salz. — Lies (2) fand für die Zusammensetzung des krystallisirten *butters. Kupferoxyds* $\text{CuO}, \text{C}_4\text{H}_7\text{O}_3 + \text{HO}$.

Valeriansäure. Ueber das Vorkommen der Valeriansäure vergl. S. 545.

Thirault (3) hat sich für die Ansicht ausgesprochen, die Valeriansäure präexistire nicht in der Baldrianwurzel, sondern bilde sich erst bei Oxydation des darin enthaltenen Baldrianöls durch den Sauerstoff der Luft; Wasser und kaustische Alkalien begünstigen diese Oxydation, obgleich letztere keine directe chemische Einwirkung auf das Baldrianöl ausüben. Er empfiehlt, die Wurzeln mit schwacher wässriger Lösung eines Alkalis (nach vorherigem Kochen) einen Monat lang unter öfterem Umrühren der Luft auszusetzen, und dann erst zur Ausscheidung der Säure zu schreiten. — Leudet (4) hingegen fand, daß bei dem Stehen von Baldrianöl mit Wasser an der Luft keine Valeriansäure sich bildet; er hält hingegen die Bildung einer davon verschiedenen, aus der wässrigen Lösung durch Salpetersäure harzartig abscheidbaren, Säure für wahrscheinlich. Die von Lefort etwas abgeänderte Vorschrift

(1) Es mag hier mitgetheilt werden, daß die Trennung der Buttersäure von der Valeriansäure in der Art sich ausführen läßt, daß man das Gemisch beider Säuren zur Hälfte mit Natron sättigt und destillirt, wo nach dem Verhältnisse beider Säuren allein oder vorzugsweise Buttersäure übergeht; enthält das Destillat Valeriansäure, so ist in dem Rückstand keine Buttersäure mehr enthalten; im entgegengesetzten Falle wird das rückständige Natronsalz mit Schwefelsäure zerlegt, die abgeschiedene Säure wieder zur Hälfte mit Natron gesättigt, wieder destillirt u. s. f., wo bei den späteren Destillationen immer mehr reine Valeriansäure erhalten wird. — (2) *Compt. rend.* XXVII, 321. — (3) *J. pharm.* [3] XII, 161; *Repert. Pharm.* [2] XLVII, 389; *Pharm. Centr.* 1848, 107. — (4) *J. pharm.* [3] XI, 444; *Pharm. Centr.* 1847, 525.

von Brun-Buisson zur Darstellung von *valerians. Zink-*^{Valeriansäure.}*oxyd* (4 Kilogramm. Baldrianwurzel mit 25 Liter Wasser, 400 Grm. Schwefelsäure und 240 Grm. zweifach-chroms. Kali 24 Stunden lang maceriren zu lassen, dann 10 Liter Flüssigkeit abzudestilliren und diese mit Zinkoxyd zu sättigen) gab ihm zwar reichliche Ausbeute an Zinksalz, welches aber größtentheils aus schwefels. Zinkoxyd bestand. Das *valerians. Zinkoxyd* zersetzt sich nach ihm beim Kochen der wässerigen Lösung. — Das letztere fand auch Laroque (1), und daß das *valerians. Zinkoxyd* bei dem Erhitzen weniger leicht als das *butters. flüchtiges wasserfreies Salz* giebt; das destillierte Salz habe das Ansehen des Paraffins. — Wittstein (2) beobachtete, daß die wässerige Lösung dieses Salzes bei kürzerem Erhitzen trübe aber bei dem Erkalten wieder klar wird, bei längerem Kochen aber ein bei dem Erkalten sich nicht wieder auflösendes basisches Salz absetzt; er giebt noch an, daß frisch gefälltes und mit Wasser zu einem dünnen Brei angerührtes kohlen. Zinkoxyd mit Valeriansäure vermischt ein wasserhaltiges Salz ($\text{ZnO}, \text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_8 + 12 \text{HO}$) bildet, dessen Wasser noch nicht bei 50° aber bei 100° entweicht, während das aus der wässerigen Lösung bei dem Verdunsten oder bei dem Mischen der Lösungen von schwefels. Zinkoxyd und *valerians. Natron* sich abscheidende Salz wasserfrei ist; das wasserhaltige Salz löst sich in dem 44-, das wasserfreie nach seinen neueren Versuchen in dem 90fachen Gewicht Wasser.

Für das *valerians. Eisenoxyd* gab Wittstein früher (3) die Formel $3 \text{Fe}_2\text{O}_3, 7 \text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_8 + 2 \text{HO}$. Rieckher (4) betrachtete das durch Zusatz einer Lösung von Eisenchlorid zu einer mäfsig warmen von *valerians. Natron* erhaltene (einen amorphen, glänzenden, an den Kanten dun-

(1) Aus *Recueil des trav. de la soc. d'émulat. pour les sc. pharm.*, Janvier 1847, 44, in *J. pharm.* [3] XII, 68. — (2) *Repert. Pharm.* [3] I, 189; *Pharm. Centr.* 1849, 221. — (3) *Repert. Pharm.* [2] XXXVII, 300. — (4) *Jahrb. pr. Pharm.* XV, 151; *Pharm. Centr.* 1847, 766.

Condensation auf 4 Vol. berechnete 3,351 ist), mit alkoholischer Kalilösung (welche schneller einwirkt, als wässerige) so behandelt, daß das Verdampfende zurückfließt, caprons. Kali; zur Constatirung wurden das Baryt- und das Silberoxydsalz dieser Säure daraus dargestellt und analysirt.

Fette Säuren
des
Cocosnufsöls.

In dem Cocosnufsöl hatte Fehling (1) früher die Gegenwart von Capronsäure ($C_{12}H_{22}O_4$) und Caprylsäure ($C_{18}H_{36}O_4$) nachgewiesen; A. Görgéy (2) hat aufer diesen auch die Caprinsäure ($C_{20}H_{40}O_4$) darin gefunden. Der Hauptbestandtheil des Cocosnufsöls ist aber nach den Versuchen Görgéy's die Pichurimalgsäure Sthamer's oder Laurostearinsäure Marsson's ($C_{24}H_{48}O_4$). Eine Säure von der Formel $C_{22}H_{42}O_4$, wie sie Saint-Evre (3) nachgewiesen haben will, konnte Görgéy nicht erhalten; dagegen machte er es wahrscheinlich, daß aufer den schon genannten in dem Cocosnufsöl auch noch Myristinsäure ($C_{22}H_{42}O_4$) und Palmitinsäure ($C_{32}H_{64}O_4$) vorhanden sind. In dem Gemische der fetten Säuren des Cocosnufsöls lassen sich nach Görgéy die Caprin- und die Pichurimalgsäure an dem Verhalten ihrer Barytsalze bei der Krystallisation aus der heißen wässerigen Lösung erkennen. Beim Abkühlen trübt sich nämlich dieselbe, schon während des Abfließens vom Trichter, und setzt zarte, weißse Flocken ab. Diese sind pichurimalgs. Baryt. Die überstehende klare Flüssigkeit trübt sich aber bald von Neuem, indem caprins. Baryt als feines weißes

(1) Ann. Ch. Pharm. LIII, 390; Berzelius' Jahresber. XXVI, 619. —

(2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 290; Pharm. Centr. 1849, 8; Ann. ch. phys.

[3] XXV, 102. — (3) Saint-Evre nennt *Cocinsäure* die Säure des Cocosöls, welche er erhielt, als er das Cocosöl verseifte, die Säuren wieder abschied, auspreßte, aus Alkohol umkrystallisirte und mit Natron verseifte, die Natronverbindung mit essigsaurem Bleioxyd fällte, die Bleioxydverbindung mit Aether auszog und den Rückstand mit Weinsäure zersetzte; die Formel $C_{22}H_{42}O_4$ für die krystallisirte Säure (vom Schmelzpunkt $34^{\circ},7$) leitete er aus der Analyse derselben, aus der ihrer Aethyloxyd- und Silberoxydverbindung ab; das Product der trocknen Destillation des Kalksalzes (Cocinon) ergab bei der Analyse Zahlen, entsprechend der Formel $C_{22}H_{42}O_4$. (Ann. ch. phys. [3] XX, 91; J. pr. Chem. XLI, 144; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 341; Pharm. Centr. 1847, 409.)

Pulver zu Boden fällt. — Barytsalze der Säuren mit niedrigerem Atomgewicht als das der Caprylsäure ($C_{16}H_{32}O_4$) lassen sich leicht mittelst Barytwasser darstellen; bei den Säuren mit höherem Atomgewicht dagegen fällt man zweckmäßiger die Ammoniaksalze mit Chlorbaryum. War in dem Säuregemisch Caprylsäure vorhanden, so erkennt man diese daran, daß die von dem Niederschlag durch Chlorbaryum abfiltrirte Flüssigkeit nach raschem Einkochen und Erkaltenlassen nicht wasserhell bleibt, sondern trüb wird wie eine verdünnte Ammoniakseifenlösung.

Fette Säuren
des
Cocosnufsöls.

Wir theilen hier noch einige Angaben Görges über Caprinsäure und Pichurimalgsäure mit.

Caprinsäure. — Sie ist nur in geringer Menge im Cocosnufsöl enthalten. Sie schmilzt bei 30° und besitzt einen schwachen Bocksgeruch. In heißem Wasser löst sie sich merklich auf, scheidet sich aber beim Erkalten so vollständig in glänzenden Krystallflimmern wieder ab, daß das Wasser kaum noch sauer reagirt. — Das Barytsalz krystallisirt beim Eindampfen seiner wässerigen Lösung bis zum Krystallhäutchen in zarten Dendriten.

Pichurimalgsäure. — Sie setzt sich aus der alkoholischen, kalt gesättigten Lösung beim Erkalten auf 0° in haselnußgroßen Drusen von kleinen spießigen Krystallen ab. Ihr spec. Gew. ist = 0,883 bei 20° , ihr Schmelzpunkt liegt zwischen 42 und 43° . — Das pichurimalgs. Aethyloxyd, C_4H_2O , $C_{24}H_{48}O_8$, erstarrt bei -10° , hat ein spec. Gew. = 0,86 bei 20° und siedet bei 264° , welcher Siedepunkt mit dem nach H. Kopp's Gesetz berechneten genau zusammenfällt. Das berechnete spec. Gew. seines Dampfes ist 7,9; das beobachtete 8,4. — Der pichurimalgs. Baryt fällt aus seiner heißen wässerigen Lösung in spärlichen weißen Flocken nieder. 1 Th. desselben löst sich in 10864 Th. Wasser bei $16,5^\circ$, in 1982 Th. bei 100° ; ferner in 1468 Th. gewöhnlichem Alkohol bei $15,5^\circ$ und in 211 Th. Alkohol in der Siedhitze.

Fette Säuren
des
Ricinusöls.

Nach den früheren Untersuchungen von Bussy und Lecanu (1) betrachtete man das Ricinusöl als eine Verbindung von Glyceryloxyd mit 3 fetten Säuren, von denen die eine, bei 130° schmelzbare, *Margaritinsäure*, die anderen flüssigen *Ricin-* und *Elaiodinsäure* genannt wurden. B. und L. hielten die beiden letzteren für identisch mit den bei der trockenen Destillation des Ricinusöls auftretenden Säuren.

Saalmüller (2) hat diese Untersuchung wieder aufgenommen und gezeigt, daß eine bei 130° schmelzbare fette Säure in dem Ricinusöl nicht existiert, und daß der von den erwähnten Chemikern beobachtete hohe Schmelzpunkt und die Schwerlöslichkeit der Margaritinsäure in Alkohol einem Rückhalte an Alkali zuzuschreiben ist. Der von ihm für diese Säure gefundene Schmelzpunkt liegt bei 70°, ihr Erstarrungspunkt zwischen 68 und 70°. Eine Analyse gab Zahlen, die genau der Zusammensetzung der Talsäure entsprechen; drei andere Analysen einer Säure von einer zweiten Bereitung lieferten dagegen Resultate, welche am nächsten mit der Zusammensetzung der Palmitinsäure übereinstimmen. Es bleibt somit noch zweifelhaft, ob in allen Sorten Ricinusöl stets eine und dieselbe und welche feste Fettsäure vorhanden ist, immer aber ist ihre relative Menge nur sehr unbedeutend.

Die Hauptmasse der durch Verseifung des Oels gewonnenen fetten Säuren bildet eine bei gewöhnlicher Temperatur syrupdicke, hellweingelbe, geruchlose, aber unangenehm, scharf und kratzend schmeckende Säure, deren spec. Gewicht bei 15° = 0,940 ist, und die erst bei -6 bis -10° zu einer aus kugeligen Aggregaten bestehenden Masse erstarrt. Sie wird am besten nach der von Gottlieb für die Gewinnung der nicht trocknenden Oelsäure angegebenen Methode rein erhalten.

Saalmüller nennt diese Säure *Ricinölsäure*. — Sie mischt sich mit Alkohol und Aether in allen Verhältnissen,

(1) J. pharm. XIII, 57. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXIV, 108; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 929; J. pharm. [3] XIII, 891.

ihre Lösung reagirt sauer und zersetzt kohlen. Alkalien. Fette Säuren
des
Ricinussöls. Sie erleidet mit Sauerstoff in Berührung keine Veränderung; bei der trockenen Destillation liefert sie keine Fettsäure, wohl aber, wie Bussy nachgewiesen hat, Oenanthol und Oenanthylsäure. — Die Ricinölsäure ist nach Saalmüller's Untersuchung nach der Formel $C_{33}H_{54}O_8 = C_{33}H_{52}O_8, HO$ zusammengesetzt. Die untersuchten Salze der Ricinölsäure mit den alkalischen Erden und schweren Metalloxyden sind fast sämmtlich krystallisirbar, sie sind alle in Weingeist, einige auch in Aether löslich, und nach dem Trocknen im luftleeren Raum mit Ausnahme des Kalksalzes wasserfrei, $MeO, C_{33}H_{52}O_8$. Sie nehmen, so wenig wie die Säure selbst, keinen Sauerstoff aus der Luft auf. — Durch Fällen einer sehr verdünnten Lösung der Säure in überschüssigem Ammoniak mit der wässrigen Lösung eines Chlormetalls wurden dargestellt das Barytsalz (krystallisirt aus der alkoholischen Lösung in weissen, sehr zart anzufühlenden Blättchen), das Strontiansalz (krystallisirt in weissen kleinen Körnern), das Kalksalz (bildet kleine, schuppige, blendend weisse Krystalle, welche 1 At. Wasser enthalten und bei 80° schmelzen). Das Magnesiasalz krystallisirt in feinen Nadeln, das Zinkoxydsalz in kleinen weissen Körnchen. Das Bleioxydsalz wurde durch Fällung einer Lösung der Säure in überschüssigem Ammoniak durch essigs. Bleioxyd nicht von constanter Zusammensetzung erhalten, wohl aber durch Digestion der Säure mit überschüssigem Bleioxyd in gelinder Wärme und Umkrystallisiren der entstehenden Verbindung aus der ätherischen Lösung; bei 100° ist es geschmolzen. Das Silberoxydsalz wird nur schwer von constanter Zusammensetzung erhalten. Das ricinöls. Aethyloxyd ist eine weingelbe, ölarartige, ohne Zersetzung nicht destillirbare Flüssigkeit.

Saalmüller hat ferner, in Widerspruch mit den Angaben von Boudet (1), gefunden, daß weder das Ricinusöl

(1) Ann. ch. phys. [2] L, 391; Berzelius' Jahresber. XIII, 284.

Fette Säuren
des
Ricinusoils. noch die Ricinölsäure durch Behandlung mit schwefliger Säure eine Veränderung in der Zusammensetzung oder in der physikalischen Beschaffenheit erleidet.

Svanberg und Kolmodin (1) erhielten bei der Untersuchung der flüssigen Säure des Ricinusöls andere Resultate. Nach der Verseifung des Oels wurden die Säuren durch Salzsäure abgeschieden, gewaschen, und durch Filtration bei 3 bis 5° die sich ausscheidenden festeren Säuren getrennt. Was durch das Filter ging, wurde mit unzureichendem Ammoniak behandelt, die entstehende Seife mit Chlorbaryum gefällt, und das Barytsalz so lange aus Alkohol umkrystallisirt bis sich der Barytgehalt nicht mehr änderte; nach Einer Analyse stellen Svanberg und Kolmodin dafür die Formel $\text{BaO}, \text{C}_{36}\text{H}_{52}\text{O}_8$ auf. Nach ihnen ist die reine Ricinölsäure (aus dem Barytsalz durch Salzsäure abgeschieden) eine schwache, in Alkohol gelöst das Lackmuspapier kaum röthende, ungefähr bei 0° erstarrende Säure.

Die festen Säuren des Ricinusöls wurden auch durch Scharling (2) untersucht. Krystalle, welche sich in Ricinusöl abgesetzt hatten, wurden wiederholt in kochendem Alkohol aufgelöst und durch Abkühlen ein Fett abgeschieden, welches bei 44° schmolz und durch Verseifen eine fette Säure von 72° Schmelzpunkt gab. Nach dem Verseifen des Oels, in welchem sich die Krystalle gebildet hatten, Fällen der Natronverbindung mit essigs. Bleioxyd und Behandeln mit Aether blieb eine Bleiverbindung, deren Säure wiederholt aus Alkohol umkrystallisirt gleichfalls bei 72° schmolz. Die Analyse des Silbersalzes stimmte ungefähr mit der Zusammensetzung des palmitins. Silberoxyds ($\text{AgO}, \text{C}_{32}\text{H}_{52}\text{O}_8$), aber Scharling betrachtet es als zusammengesetzt nach der Formel $\text{AgO}, \text{C}_{32}\text{H}_{52}\text{O}_8$, und die darin enthaltene

(1) Aus Oefversigt af Kongl. Vetensk. Förhandl. 1847, 124, in J. pr. Chem. XLV, 431. — (2) Oversigt over det Kongl. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. 1847; Trier und Faber's Archiv for Pharmacie og teknisk Chem. II, 25; J. pr. Chem. XLV, 434.

Säure als eine eigenthümliche, Ricinstearinsäure, welche sich von der Palmitinsäure (diese schmilzt bei 60°) durch höheren Schmelzpunkt, von der gewöhnlichen Stearinsäure durch etwas gröfsere Flüchtigkeit unterscheide.

Bussy (1) fand früher unter den Destillationsproducten des Ricinusöls eine eigenthümliche, bei 155 bis 158° siedende Flüssigkeit, welche er Oenanthol nannte, deren Reindarstellung er lehrte, und für welche er die Formel $C_{14}H_{14}O_3$ gab. Diese Substanz ist der Gegenstand weiterer Forschungen von Williamson und von Tilley gewesen.

Williamson (2) bestätigte die von Bussy für das Oenanthol aufgestellte Formel; den Siedepunkt fand er 155 bis 156°. — Bei Behandlung des Oenanthols mit concentrirtem wässerigem Kali fand Temperaturerhöhung statt, und der Geruch des oben aufschwimmenden Oels veränderte sich; mit dem Kali hatte sich eine durch Weinsäure in öligem Zustand abscheidbare Säure verbunden, welche als Oenanthylsäure erkannt wurde (das Barytsalz, BaO , $C_{14}H_{13}O_3$, und das Silbersalz wurden analysirt); die Zusammensetzung des bei dieser Zersetzung sich bildenden, bei der Behandlung des Oenanthols mit Kali zurückbleibenden, Oels wurde bei verschiedenen Bereitungen sehr verschieden gefunden. (Dieses Oel unterscheidet sich von dem Oenanthol noch dadurch, dafs ersteres mit Salpetersäure ein im Wasser untersinkendes, letzteres damit ein angenehm riechendes Product bildet, welches leichter als Wasser ist.) — Nach Einwirkung von Salzsäuregas auf eine Lösung von Oenanthol in seinem vierfachen Volum Alkohol scheidet sich auf Zusatz von Wasser ein von Oenanthol verschiedenes Oel ab, welches sich mit Wasser und bei genauer Regulirung der Temperatur auch für sich destilliren läfst, eine farblose, angenehm riechende Flüssigkeit ist, und als önanthyls. Aethyloxyd ($C_4H_5O, C_{14}H_{13}O_3$)

(1) Compt. rend. XXI, 84. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXI, 38; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 297.

Oenanthol. erkannt wurde. — Bei Einwirkung von Chlor auf Oenanthol bildet sich Salzsäure und ein dickflüssiges Oel von angenehmem Geruch, schwerer als Wasser, für sich nicht destillirbar, $C_{14}H_{11}Cl_3O_2$. Williamson war der Ansicht, die Formel des Oenanthols könne verdoppelt und es selbst als eine Art Aether betrachtet werden, $C_{28}H_{22}O_4 = C_{14}H_{11}O + C_{14}H_{11}O_3$, woraus sich die Bildung von Oenanthylsäure bei Einwirkung von Kali oder Salzsäure erkläre.

Tilley (1) fand gleichfalls Bussy's Formel für das Oenanthol richtig, den Siedepunkt 155° ; er bemerkte, daß es bei langem Kochen braun und sauer, unter Erhöhung des Siedepunkts, wird. — Fällt Oenanthol tropfenweise in eine Retorte zu starker Salpetersäure, so findet heftige Einwirkung statt; in der Salpetersäure bleiben Oenanthylsäure, Capronsäure und Oxalsäure gelöst, in der Vorlage findet man ein Gemenge von Oenanthylsäure, Capronsäure und *Nitracrol*. Letzteres wurde von Redtenbacher unter den Zersetzungsproducten der Choloidinsäure durch Salpetersäure entdeckt; bei Destillation von Oenanthol mit Salpetersäure kann es aus dem Destillat durch Zusatz von Wasser als schwere niedersinkende Tropfen abgeschieden werden, welche eine farblose, in Wasser schwer lösliche Flüssigkeit von durchdringendem reizendem Geruch bilden; beim Erhitzen mit Wasser auf 100° wird es zersetzt, und neben salpetriger Säure geht ein anderer, von Redtenbacher Cholacrol genannter, Körper (eine klare, etwas gelbliche Flüssigkeit, concentrirt gleichfalls von intensivem Geruch, nach Redtenbacher $C_8H_5N_2O_{11}$) über, welcher Kalilauge gelb färbt, und damit bald, unter Zurückbleibung eines schweren Oels, Krystalle des von Redtenbacher entdeckten nitrochols. Kalis ($KO, C_8H_5NO_9$) bildet. Die Entstehung der Oenanthyl- und Capronsäure wurde durch die Analyse der Barytsalze ($BaO, C_{14}H_{11}O_3$,

(1) Phil. Mag. [3] XXXIII, 81; Ann. Ch. Pharm. LXVII, 105; J. pr. Chem. XLV, 806; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 645; J. pharm. [3] XV, 237.

und $\text{BaO}, \text{C}_{14}\text{H}_{11}\text{O}_2$) dargethan. — Bildung von Oenanthyl- Oenanthol.
säure fand Tilley sowohl bei Einwirkung von schmelzen-
dem als von wässerigem Kali auf Oenanthol. Das in
letzterem Fall übrigbleibende Oel wird mit Wasser destillirt,
wo es langsam übergeht; es ist dann farblos, riecht schwach
nach Citronen, siedet bei 220° unter einiger Zersetzung,
ist in Wasser wenig, in Alkohol und Aether nach allen
Verhältnissen löslich, brennt mit heller Flamme, und hat
die Zusammensetzung $\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{O}$; Tilley nennt es *Oenan-*
thylwasserstoff. Die Zersetzung des Oenanthols durch wä-
sseriges Kali in Oenanthylsäure und Oenanthylwasserstoff
ist somit ausgedrückt durch: $3(\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{O}_2) = \text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{O}_4$
 $+ 2(\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{O})$. Der Oenanthylwasserstoff giebt mit Sal-
petersäure Oenanthylsäure, bei Erhitzen mit Kali unter
Entwicklung von Wasserstoff Oenanthylsäure und einen
pechartigen Körper. — Bei der Einwirkung von Ammoniak-
gas auf Oenanthol bildet sich *Oenanthylammoniak*; wird durch
die Lösung des letzteren in starkem Weingeist schweflige
Säure geleitet, so scheidet sich ein weißes krystallinisches
Pulver (bei Anwendung verdünnterer Lösung deutliche kleine
Prismen) ab, welches *schweflgs. Oenanthylammoniak*, $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{O}$,
 $\text{SO}_2 + \text{NH}_4\text{O}, \text{SO}_2$, ist, eine dem von Redtenbacher
entdeckten schweflgs. Aldehyd-Ammoniak ganz analoge
Verbindung. Das schweflgs. Oenanthylammoniak löst sich
wenig in Alkohol und in Wasser; erhitzt schmilzt es, läßt
weiße Dämpfe entweichen, schwärzt sich dann und verbrennt
mit Flamme; mit Wasser in Berührung zersetzt es sich in
der Kälte allmähig, in der Hitze rascher, wobei Oenanthol
entweicht und zweifach-schweflgs. Ammoniak bei dem
Wasser zurückbleibt; bei Gegenwart von Säuren findet diese
Zersetzung noch schneller statt.

Scharling (1) hat den Thran von dem Dögling der Döglingthran.
Faröer (der *Balaena rostrata* des Chemnitz, dem Hyperodon
der Neueren) untersucht. Dieser Thran ist ein besserer Brenn-

(1) Aus Trier's Archiv for Pharm. og technisk Chem. I, in J. pr.
Chem. XLIII, 257; Pharm. Centr. 1848, 821.

Döglingshran. stoff für Lampen als gewöhnlicher Thran oder gewöhnliches Oel, und zeigt ein spec. Gew. von 0,868. Durch Wasser und Stehenlassen an der Sonne, oder durch Schütteln mit dünner Kalkmilch, oder durch Lösen in kochendem Alkohol (1 Theil desselben löst $\frac{1}{4}$, 1 Theil Alkohol von 37° $\frac{1}{2}$ Döglingshran) kann er von etwaigem üblem Geruch befreit werden. Er absorbirt Sauerstoff und wird dabei schwerer und dickflüssiger. Salpetrige Säure färbt ihn dunkler, und bald wird er fest; durch Behandlung mit Weingeist kann man nun eine darin schwerer lösliche krystallinische Substanz ausscheiden, welche sich in dem 10fachen Gewicht kochenden Alkohols löst und bei 32° schmilzt. Bei 8° wird der Döglingshran trübe, bei einigen Graden über 0° bildet er eine breiartige Masse. Durch längeres Erkalten auf -8° und Abfließenlassen des schmelzbareren Fettes bei immer höheren Temperaturen wurde zuletzt ein bei 24° schmelzendes Fett erhalten, welches unter anderm auch etwas Wallrath enthielt; dieses Fett wurde verseift, die Natronverbindung mit Aether ausgezogen, und aus dem Rückstand ein Silbersalz dargestellt von der Zusammensetzung AgO , $\text{C}_{20}\text{H}_{10}\text{O}_8$. Die Hauptmasse des Thrans wird von einer Oelsäure gebildet, welche nach Scharling von der gewöhnlichen etwas verschieden ist. Der Thran wurde mit Bleioxyd und Wasser gekocht, die Bleioxydverbindung mit Aether behandelt (aus dem hierbei ungelöst bleibenden Theil wurde eine Fettmasse abgeschieden, welche größtentheils aus einem bei 49° schmelzendem und zum kleineren Theil aus einem bei 100° ohne Schmelzen sich zersetzenden Körper bestand), und das in Aether lösliche Bleisalz mit Schwefelwasserstoff zersetzt. Die so erhaltene Säure war fest bei einigen Graden über 0° , klar geschmolzen bei 16° , gelb und lackmusröthend. Scharling bestimmte für ihre Zusammensetzung $\text{C}_{38}\text{H}_{38}\text{O}_4$, für ihr Barytsalz BaO , $\text{C}_{38}\text{H}_{38}\text{O}_8$, für die Aethyloxydverbindung $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$, $\text{C}_{38}\text{H}_{38}\text{O}_8$; er nennt sie *Döglingsäure*. — Bei rascher Destillation des Döglingshrans bleibt nur sehr wenig Rückstand; es bildet

sich Kohlensäure, Kohlenwasserstoffgas, sehr wenig Acrolein, ^{Döglingsäure} und das Destillat ist eine wasserhelle Flüssigkeit, welche hauptsächlich aus mehreren Kohlenwasserstoffen besteht. Scharling digerirte das Destillat mit kohlen. Natron, rectificirte es im Wasserbad, trocknete es mit Chlorcalcium, destillirte es über Kalium, und erhielt so eine Flüssigkeit von der Zusammensetzung $C_{12}H_{12}$, deren Dampfdichte (unter Voraussetzung einer Condensation auf 2 Volume) zu 5,8 sich berechnet und eben so groß gefunden wurde. Scharling nennt 2 At. dieses Kohlenwasserstoffs + 1 At. Wasser *Döglingsäure*, und nach ihm kann der reine Döglingsäure als döglingsäure betrachtet werden.

Walter (1) hatte angegeben, im Behenöl (von *Moringa aptera*) sei neben Margarinsäure und etwas Talgsäure eine eigenthümliche feste, bei 53° schmelzende Säure, Behensäure, $C_{30}H_{58}O_4$, und eine eigenthümliche flüssige, bei 0° erstarrende, Moringasäure, $C_{30}H_{58}O_4$, enthalten. Völcker (2) hatte aus dem Behenöl (von *Moringa oleifera*) unter andern eine bei 76° schmelzende Säure (von ihm Behensäure genannt) erhalten, ihre Baryt-, Natron-, Aethyloxyd- und Bleioxydverbindung so wie sie selbst im krystallisirten Zustand untersucht, und für sie im letztern die Formel $C_{44}H_{88}O_4$ aufgestellt. Strecker (3) hat darauf aufmerksam gemacht, daß die Analysen der drei erstern Verbindungen und der krystallisirten Säure der Formel $C_{44}H_{88}O_4$ für letztere besser entsprechen.

Säuren
im Behenöl.

Braconnot (4) untersuchte das Brennmaterial, welches in einer antiken, wahrscheinlich aus dem 4. Jahrhundert stammenden, Lampe gefunden wurde. Kochender 36grädiger Alkohol löste es theilweise; aus der Auflösung schied sich bei dem Erkalten in weißen Flocken eine bei 64°

Untersuchung
von altem
Lampen-
Brennmate-
rial.

(1) Compt. rend. XXII, 1143; Ann. Ch. Pharm. LX, 271; Berzelius' Jahresber. XXVII, 429. — (2) Scheikund. Onderzoek. III, 545; J. pr. Chem. XXXIX, 351; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 342; Berzelius' Jahresber. XXVII, 427. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXIV, 346. — (4) Ann. ch. phys. [3] XXI, 484.

Untersuchung
von altem
Lampen-
Brennmate-
rial.

schmelzende Substanz ab, welche Cerin zu sein schien, und welche mit Kali sich theilweise verseifen liefs unter Bildung eines Products, aus welchem Alkohol in der Kälte margarins. Kali auszog, unter Zurücklassung einer mit dem Ceraïn übereinstimmenden weissen Substanz. In dem Alkohol blieb ein Körper gelöst, welcher nach dem Abdampfen weifs, hart, spröde und bei etwa 51° schmelzbar war, dessen alkoholische Lösung Lackmus röthete und bei langsamem Verdunsten kleine körnige Krystalle absetzte; Braconnot nennt ihn Cerantsäure. — Der in kochendem Alkohol unlösliche Theil enthielt Myricin.

Fettmasse aus
einem ver-
westen Thier-
körper.

Gregory (1) untersuchte die Fettmasse, in welche sich der in feuchtem Boden begrabene Körper eines Schweines innerhalb 15 Jahre, unter Verschwinden der Knochen, verwandelt hatte. Die Masse war wachsartig, an verschiedenen Stellen von ungleichem (1,5 bis 3,5 pC.) Gehalt an Asche (kohlens. Kalk); sie bestand zu $\frac{1}{4}$ aus Stearinsäure, zu $\frac{1}{2}$ aus Margarinsäure und Oelsäure.

Zersetzung
fetter Oele
mit Schwefel
in der Hitze.

Anderson (2) hat die Zersetzungsproducte untersucht, welche fette Oele in Berührung mit Schwefel bei dem Erhitzen geben. Bei dem Erwärmen von fettem Oel mit Schwefel schmilzt der letztere, löst sich nach und nach auf, und bildet eine dicke dunkelrothe Flüssigkeit. Bei gesteigerter Hitze tritt eine heftige Einwirkung ein; unter Aufschwellen der zähen Flüssigkeit entwickelt sich viel Schwefelwasserstoff. Wenn man jetzt die Mischung sich abkühlen läfst, gesteht sie zu einer zähen steifen Masse; wenn man weiter erhitzt, so dauert die Entwicklung von Schwefelwasserstoff fort, und es destillirt ein Oel von eigenthümlichem Geruch nach Knoblauch über. Stearinsäure mit Schwefel erhitzt giebt dieses flüchtige Product nicht, wohl aber Oelsäure; bei dem Destilliren der letztern oder

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 362. — (2) Transact. of the royal soc. of Edinburgh XVI, 363; Phil. Mag. [3] XXXI, 161; Ann. Ch. Pharm. LXIII, 370; J. pr. Chem. XLII, 1; Ann. ch. phys. [3] XXI, 492; in Ausz. Pharm. Centr. 1847, 787; J. pharm. [3] XII, 369.

von Mandelöl mit Schwefel zeigten die zuletzt übergehenden Portionen einen Gehalt an Margarinsäure, was bei der Destillation von Oelsäure für sich nicht eintrat; die Bildung der Margarinsäure wurde durch die Analyse derselben, ihrer Silberoxyd- und Aethyloxydverbindung nachgewiesen. — Zur Darstellung größerer Mengen des mit der Margarinsäure übergehenden Oels destillirte Anderson Leinöl mit Schwefel, in der Art, daß das Oel mit wenig Schwefel in einer geräumigen Retorte bis zum Eintreten der Reaction erhitzt, und dann fortwährend Schwefel in kleinen Mengen durch eine in die Retorte eingehende Röhre nachgetragen wurde, unter Regulirung des Feuers, daß nicht bei zu niedriger Temperatur die Flüssigkeit in der Retorte zu dickflüssig, und nicht bei zu hoher die Einwirkung zu heftig werde. Das übergehende Oel fängt bei 71° an zu kochen, aber der Siedepunkt steigt fortwährend. Zur Darstellung einer reineren Verbindung wurde der Umstand benutzt, daß das Oel mit Quecksilberchlorid und mit Platinchlorid Niederschläge bildet. — Der weiße Niederschlag aus alkoholischen Lösungen des Oels und von Quecksilberchlorid wurde mit Aether ausgewaschen und mit Alkohol gekocht, in welchem sich ein Theil löste, welcher aus der heißen filtrirten Lösung als weißes krystallinisches perlmutterglänzendes Pulver sich absetzte. Die Zusammensetzung dieses Pulvers entsprach den atomischen Verhältnissen $C_{16}H_{16}S_2Hg_2Cl_2$; Anderson giebt als rationelle Formel $(C_8H_8S_2 + Hg_2Cl_2) + (C_8H_8S_2 + Hg_2S)$, indem er die Verbindung C_8H_8 (welche er *Odmyl* nennt, von $\acute{o}\delta\mu\gamma\acute{\iota}$, Geruch) als dem Allyl analog betrachtet. Wird diese Quecksilberverbindung in Wasser suspendirt und Schwefelwasserstoff hindurchgeleitet, so färbt sie sich schwarz, ein eigenthümlicher Geruch entsteht, und bei der Destillation geht ein auf Wasser schwimmendes Oel über, welches in Alkohol gelöst mit Quecksilberchlorid einen ähnlichen Niederschlag giebt, wie der aus welchem es entstanden, und nach Anderson's Ansicht wahrscheinlich Schwefelodmyl,

Zersetzung
fetter Oele
mit Schwefel
in der Hitze.

$C_8H_8S_2$, ist. — Die alkoholische Lösung des erstgedachten Oels giebt mit Platinchlorid einen gelben, allmählig sich vermehrenden, Niederschlag, dessen Eigenschaften und Zusammensetzung veränderlich sind, je nachdem der mehr oder weniger flüchtige Theil des Oels zu seiner Bereitung angewandt war. Die Zusammensetzung des mit dem flüchtigsten Oel bereiteten Niederschlags näherte sich (Chlor- und Schwefelgehalt wurden nicht bestimmt) der Formel $C_{10}H_{10}S_2Pt_2Cl_2$.

Säuren
des Flechten-
harzes.

Der Pinin- und der Sylvinsäure wurde von H. Rose (1) bei der ersten Untersuchung derselben die Zusammensetzung $C_{40}H_{32}O_4$ beigelegt; H. Trommsdorff (2) zeigte dann für die Sylvinsäure und Liebig (3) für die Pininsäure, daß diesen Säuren die Formel $C_{40}H_{30}O_4$ zukommt, was Laurent (4) bestätigte. Dieselbe Zusammensetzung fand Laurent später (5) für eine in dem Harz von *Pinus maritima* enthaltene und von ihm Pimarsäure genannte Säure, von welcher er angab, daß sie sich bei der Destillation im luftleeren Raum ohne Aenderung der Zusammensetzung in eine andere Säure, Pyromarsäure, verwandle, und daß sie sich selbst überlassen in eine andere isomere Modification, amorphe Pimarsäure, übergehe. Für die Salze dieser Säuren wurde die Zusammensetzung $MeO, C_{40}H_{30}O_4$ ermittelt, welche mit Laurent und Gerhardt's Ansichten nicht übereinstimmt. Eine Berichtigung erwartete Laurent (6)

(1) Pogg. Ann. XXXIII, 33. — (2) Ann. Ch. Pharm. XIII, 169. — (3) Ann. Ch. Pharm. XIII, 174. — (4) Ann. ch. phys. [2] LXV, 324. — (5) Compt. rend. IX, 797. — (6) Ann. ch. phys. [3] XXII, 459; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 335; J. pr. Chem. XLV, 61; Pharm. Centr. 1848, 305. Strecker (Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 338) macht darauf aufmerksam, daß wohl auch die Pimarsäure mit der Pyromar- oder Sylvinsäure identisch sein könne, da sie fast alle Eigenschaften gemeinsam haben und Laurent als Unterschiede nur angab, daß die Pyromarsäure mit essigs. Bleioxyd einen krystallinischen, die Pimarsäure einen amorphen Niederschlag gebe, und daß die mikroskopischen Krystalle beider Säuren verschieden gestaltet seien. Daß letzteres keinen Anhaltspunkt dafür abgeben kann, die Pyromar- oder Sylvinsäure für verschieden von der Pimarsäure zu halten, geht schon daraus hervor, daß Laurent

weniger durch neue Analysen der Salze als vielmehr durch die Ermittlung, ob bei der Verbindung dieser Säuren mit wasserfreien Basen sich Wasser entwickle oder nicht. Frisch geschmolzene und pulverisirte Sylvinsäure oder Pimarsäure entwickelte mit Bleioxyd erhitzt nur wenig Wasser, aber wenn zu der Mischung etwas Aether zugesetzt und dann bei 140° getrocknet wurde, entwickelte sich Wasser in dem Verhältniß von 1 HO auf 1 At. Säure, weshalb Laurent für die Salze dieser Säuren die Formel MeO , $\text{C}_{40}\text{H}_{28}\text{O}_8$ annimmt. Er bemerkt ferner, daß die von ihm für eigenthümlich gehaltene Pyromarsäure mit der Sylvinsäure identisch sei; das aus *Pinus maritima* ausfließende Harz sei, nachdem das Terpenthinöl durch Erhitzen davon getrennt, ein Gemenge von Sylvinsäure und Pimarsäure; er erinnert noch daran, daß die krystallisirte Pimarsäure sich mit der Zeit in amorphe Säure oder Pininsäure verwandle, die geschmolzene hingegen keine Modification erleide. Bei der Untersuchung der Pimarsäure hatte er den Körper, welcher durch längere Einwirkung kochender Salpetersäure auf dieselbe entsteht, als Azomarsäure bezeichnet; bei einer Wiederholung des Versuchs, wo er aber nur 7 bis 8 Minuten kochen liefs, das Product mit Wasser wusch, in Alkohol löste und mit Wasser wieder fällte, erhielt er eine gelbe, amorphe, harzartige Substanz, welche unter Zersetzung schmilzt und dieselbe Zusammensetzung wie die Azomarsäure zeigt; er nimmt jetzt für diese Zusammensetzung die Formel $\text{C}_{40}\text{H}_{26}\text{N}_2\text{O}_{16}$ an. Das Ammoniaksalz dieser Säure ist sehr löslich und trocknet zu einer orangerothten Masse ein. Das Bleisalz (2PbO , $\text{C}_{40}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}_{14}$) explodirt schwach bei dem Erhitzen. Deswegen, und weil die Salze dieser Säure gelb gefärbt sind, nimmt Laurent an, der Stickstoff sei in der Säure als Untersalpetersäure enthalten, und ihre Formel $\text{C}_{40}\text{H}_{26}(\text{NO})_2\text{O}_8$.

Säuren
des Fichten-
harzes.

auf denselben Grund hin auch die Pyromarsäure als von der Sylvinsäure verschieden betrachtete, welche beide er jetzt als identisch anerkennt.

Untersuchung
der
Anacardium-
Früchte.

Die unter den Namen westindische Elephantenlaus, Mahagonynuß, *Noix d'acajou*, bekannte, von *Anacardium* oder *Cassavum occidentale* abstammende nußähnliche, nierenförmige Frucht schließt in dem Pericarpium einen braunen balsamähnlichen Körper ein, der brennend scharf schmeckt und auf der Haut Entzündung erregt.

Dieser balsamartige Körper ist von Städeler (1) einer genauen Untersuchung unterworfen worden. Man erhält ihn leicht durch Ausziehen der von den Kernen befreiten, zerquetschten Nüsse mit Aether, Abdestilliren des klaren Auszugs und wiederholtes Waschen des Rückstands mit Wasser, das etwas Gerbsäure aufnimmt, als ein rothbraunes, fast geruchloses, dem peruvianischen Balsam ähnliches Liquidum. Die Ausbeute beträgt etwa $\frac{1}{2}$ vom Gewicht der Schalen. Er ist leicht löslich in Alkohol und Aether; die Lösungen röthen Lackmus. Er enthält, außer einer geringen, durch Säuren ausziehbaren Menge von Ammoniak und färbenden Stoffen, nur zwei eigenthümliche Körper; eine fette, krystallisirbare Säure, die *Anacardsäure*, und einen ölartigen, auf der Haut Entzündung und Blasen erregenden Stoff, das *Cardol* (von *Anacardium* und *Oleum*).

Anacardsäure.

Man trennt die Anacardsäure von dem Cardol durch Digestion der alkoholischen Lösung des Gemenges beider mit frisch gefälltem Bleioxydhydrat, von welchem erstere zugleich mit einem sauren Zersetzungsproduct aufgenommen wird, während nur Cardol in Lösung bleibt. Die Bleiverbindung wird mit starkem Alkohol ausgewaschen, mit Wasser zu einer Milch angerührt und mit Schwefelammonium digerirt. Man decantirt nun das anacards. Ammoniak von dem Schwefelblei und zersetzt es mit verdünnter Schwefelsäure, welche die Anacardsäure in weichen, in der Kälte erstarrenden Massen abscheidet. Sie wird wiederholt mit kaltem Wasser gewaschen, und in Alkohol

(1) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 187; im Ausz. J. pr. Chem. XLIII, 250; Pharm. Centr. 1848, 65; Chem. Gaz. 1848, 29. 58; J. pharm. [3] XIII, 457.

gelöst, die gefärbte mäfsig concentrirte Lösung mit Wasser^{Anacardsäure} vermischt, bis sich eine geringe bleibende Trübung zeigt, darauf zum Sieden erhitzt und tropfenweise Bleiessig zugesetzt, bis sich die färbende Materie zugleich mit etwas Anacardsäure in Gestalt dunkler öltiger Tropfen abscheidet. Nach 12 Stunden kocht man die klar abgegossene Flüssigkeit kurze Zeit mit frisch gefälltem kohlen. Baryt, decantirt nach 12 Stunden die nun wasserhelle Lösung der Anacardsäure, mischt sie mit starkem Alkohol und fällt sie in der Siedhitze mit einer alkoholischen Bleizuckerlösung. Das weifse pulverige (mischt man keinen Alkohol zu, so fällt der Niederschlag flockig aus und ist schwer auszuwaschen) anacards. Bleioxyd wird nach dem Auswaschen in Alkohol suspendirt und mit Schwefelwasserstoff oder zweckmäfsiger mit Schwefelsäure zerlegt. Nach dem Abdestilliren des Alkohols und Vermischen mit Wasser scheidet sich die Anacardsäure öllähnlich ab, und erstarrt nach dem völligen Abdunsten des Alkohols krystallinisch. — Sie bildet eine weifse, krystallinische, geruchlose, schwach aromatisch, später brennend schmeckende Masse. Sie schmilzt bei 26°, erstarrt nur langsam wieder, riecht bei 100° eigenthümlich und zersetzt sich über 200° in flüssige, nicht weiter untersuchte Producte. Auf Papier erzeugt sie Fettflecken; an der Luft zerfließt sie langsam, indem sie einen Geruch wie rancides Fett ausstößt. Ihre Lösungen in Alkohol oder Aether röthen stark Lackmus.

Städeler fand für ihre Zusammensetzung $C_{44}H_{30}O_7$. Sie ist, wie aus den Analysen des anacards. Baryts und anacards. Bleioxyds hervorgeht, eine zweibasische Säure; ihre Formel ist also $C_{44}H_{30}O_8 + 2HO$.

Mit Basen bildet die Anacardsäure theils krystallinische, theils amorphe Verbindungen; die neutralen enthalten 2 At. Basis, die sauren 1 At. Basis und 1 At. Wasser. Die meisten erleiden bei 100° eine theilweise Zersetzung. Städeler hat folgende untersucht. *Anacards. Kali* und *Ammoniak* sind amorph, seifenartig in Wasser löslich und

Anacardsäure werden durch Salze aus ihrer Lösung abgeschieden. Das saure Kalisalz hat die Formel $\text{KO}, \text{C}_{44}\text{H}_{30}\text{O}_5$. — *Anacards. Kalk*, $2 \text{CaO}, \text{C}_{44}\text{H}_{30}\text{O}_5 + 2 \text{HO}$, und *anacards. Baryt*, $2 \text{BaO}, \text{C}_{44}\text{H}_{30}\text{O}_5$, sind weisse, beim Trocknen braun werdende Niederschläge. — *Anacards. Eisenoxyd*, $2 \text{Fe}_2\text{O}_3, 3 \text{C}_{44}\text{H}_{30}\text{O}_5 + \text{Fe}_2\text{O}_3, 3 \text{HO} + 6 \text{HO}$, erhält man als dunkelbraunen, harzartigen, in Wasser und Alkohol unlöslichen, in Aether löslichen Niederschlag beim Vermischen alkoholischer Lösungen von Eisenchlorid und der Säure unter tropfenweisem Zusatz von Ammoniak. Neutralisirt man die Säure mit Ammoniak, so entstehen basischere Salze. — Das *Eisenoxydul* und *Nickeloxydulsalz* sind weiss, das *Kobaltoxydulsalz* violett. — *Anacards. Bleioxyd*, $2 \text{PbO}, \text{C}_{44}\text{H}_{30}\text{O}_5$, wird durch Vermischen heisser alkoholischer Lösungen von Säure und Bleizucker als weisser, körniger Niederschlag erhalten. Es wird mit der Zeit gelb und rancid. — Ein Doppelsalz von *anacards.* mit essigs. Bleioxyd entsteht beim Vermischen der cardolhaltigen alkoholischen Lösung der Säure, zuerst mit Wasser bis zur anfangenden Trübung, dann mit weingeistiger Bleizuckerlösung. Es ist amorph, setzt sich aber bei längerem Digeriren mit essigsäurehaltigem Alkohol in cholesterinähnlichen Blättchen ab. Die Analyse führte zur Formel $\text{PbO}, \text{C}_4\text{H}_3\text{O}_3 + \text{PbO}, \text{HO}, \text{C}_{44}\text{H}_{30}\text{O}_5$. Es ist in Wasser unlöslich, beim Kochen mit Alkohol zerfällt es in Essigsäure und in neutrales Salz; in Aether löst sich saures Salz, unter Abscheidung von essigs. Bleioxyd. — *Anacards. Silberoxyd*, $\text{AgO}, \text{HO}, \text{C}_{44}\text{H}_{30}\text{O}_5$, ist ein weisser pulveriger, in Alkohol löslicher Niederschlag, der sich bei 130° zersetzt. — Durch Behandlung mit Salpetersäure scheint die *Anacardsäure* dieselben Producte — Korksäure, Buttersäure — zu liefern, wie andere fette Säuren.

Cardol.

Das Cardol ist, wie schon erwähnt, in der Flüssigkeit enthalten, aus welcher die Anacardsäure durch Bleioxydhydrat entfernt wurde. Es sind ihm einige seiner Oxydationsproducte, mit Ammoniak verbunden, beigemischt. Zu seiner Reindarstellung kocht man die Flüssigkeit mit wenig Blei-

Cardol

oxydhydrat, filtrirt und destillirt den Alkohol ab. Der Rückstand ist noch nicht völlig reines, dunkelweinrothes Cardol. Seine concentrirte Lösung wird nun bis zur Trübung mit Wasser vermischt, wässrige Bleizuckerlösung zugesetzt, zum Sieden erhitzt und nun tropfenweise Bleiessig zugefügt, bis die Flüssigkeit fast farblos geworden ist. Aus der entfärbten Lösung entfernt man das überschüssige Blei durch Schwefelsäure, destillirt den Alkohol theilweise ab und vermischt mit Wasser, wo sich Cardol abscheidet. Es ist eine gelbe, in größeren Massen röthliche, völlig rein wahrscheinlich farblose Flüssigkeit, welche erst beim Erwärmen einen schwachen angenehmen Geruch entwickelt. Sein spec. Gewicht ist 0,978 bei 23°. Es ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether, nicht flüchtig, brennbar, und nimmt an der Luft langsam, schneller bei Gegenwart von Bleiessig, Sauerstoff auf, indem es dunkler wird. Die Analyse führte zu der Formel $C_{42}H_{31}O_4$. — Das Cardol verbindet sich mit Basen, doch nur mit geringer Verwandtschaft, und die Verbindungen mit solchen Metalloxyden, die ihren Sauerstoff leicht abgeben, werden dadurch reducirt. Neutrales essigs. Bleioxyd wird von Cardol nicht gefällt; basische Bleisalze geben weisse, in Alkohol leicht lösliche, im feuchten Zustand an der Luft bald fleischroth und rothbraun werdende Niederschläge. Eine vorsichtig bereitete Verbindung der Art gab bei der Analyse die Formel $PbO, C_4H_3O_3 + 3 PbO, C_{42}H_{31}O_4$. Diese Verbindung giebt beim Waschen mit Wasser fortwährend Bleioxyd ab. — Durch Einwirkung von Salpetersäure auf das Cardol oder von Sauerstoff auf seine Auflösung in Kali entstehen rothe Oxydationsproducte, wie es scheint von verschiedenem Sauerstoffgehalt. Die Analyse eines solchen, durch längere Einwirkung von Luft auf die alkalische Lösung entstandenen und mit Bleioxyd verbundenen Körpers gab Zahlen, welche der Formel $3 PbO + 2 C_{42}H_{30}O_7$ entsprechen. Hiernach hätte das Cardol, unter Abscheidung von 1 At. Wasser, ebensoviel Sauerstoff aufgenommen, als es

Cardol. für sich schon enthält. Diese Oxydationsproducte bedingen die rothe Farbe des aus den Anacardiumfrüchten ausgezogenen Gemenges von Anacardsäure und Cardol; sie sind als Ammoniakverbindungen darin enthalten, und zwar scheinen alte oder verkrüppelte Früchte mehr davon als gesunde und kräftige zu geben.

Städeler macht noch auf die Verwendung des Cardols als Arzneimittel aufmerksam, sofern es dem theuren Cantharidin in der Schnelligkeit der Wirkung nicht nachsteht und außerdem den Vorthail einer länger dauernden Nachwirkung gewährt. Zu medicinischen Zwecken ist die völlige Reinheit keine Bedingung; es reicht zu seiner Gewinnung hin, die zerquetschten, von den Kernen befreiten Früchte mit Alkohol auszuziehen, und den Auszug mit Bleioxydhydrat zu digeriren, bis die saure Reaction verschwunden ist. Das Filtrat wird durch Destillation vom Alkohol befreit und in einem cylindrischen Gefäße mit Wasser vermischt, wo sich das Cardol als ölige Schichte oben abscheidet. — Bestreicht man die Haut, der Brust z. B., mit etwas Cardol und bedeckt die Stelle mit etwas Löschpapier, so stellt sich nach 3 — 7 Minuten ein lebhaftes Brennen ein, es entsteht ein weißer Fleck und nach 6 — 8 Stunden eine Blase, die langsam und ohne unangenehme Nebenwirkungen heilt.

Harnsäure. In einer früheren Arbeit über die Harnsäure und ihre Verbindungen mit Basen zeigte Bensch (1), daß die rationelle Formel der Säure $C_4H_4N_4O_6 + HO$ sei, und daß diese mit Kali und Natron neutrale Salze bilde, in welchen das Hydratwasser der Säure durch 1 Aeq. Alkali vertreten ist. Er stellte außerdem durch genaue Versuche die Zusammensetzung und die Löslichkeitsverhältnisse einer Reihe von sauren harns. Salzen fest. Er hat diese Arbeit nun gemeinschaftlich mit J. Allan fortgesetzt (2), und es ist ihnen gelungen, auch die neutralen Verbindungen der Harnsäure mit den alkalischen Erden, sowie mit

(1) Ann. Ch. Pharm. LIV, 189. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 181; Pharm. Centr. 1848, 228.

Bleioxyd darzustellen. Wir stellen hier die Ergebnisse ^{Harnsäure.} dieser Arbeiten übersichtlich zusammen ($\bar{U} = C_5H_{N_2}O_3$).

Neutrales Kalisalz . . . \bar{U}, KO	Neutrales Strontiansalz $\bar{U}, SrO, 2 HO$
Saures Kalisalz . . . $2\bar{U}, KO, HO$	Saures Strontiansalz . . $2\bar{U}, SrO, 3 HO$
Neutr. Natronsatz bei 140° \bar{U}, NaO	Neutrales Barytsalz . . \bar{U}, BaO, HO
Saures Natronsatz bei 100° $2\bar{U}, NaO, 2 HO$	„ „ bei 170° \bar{U}, BaO
„ „ „ 170° $2\bar{U}, NaO, HO$	Saures Barytsalz. . . $2\bar{U}, BaO, 3 HO$
Saures Ammoniaksalz . $2\bar{U}, NH_4O, HO$	Neutrales Bleioxydsalz . \bar{U}, PbO
Saur. Magnesiasatz b. 100° $2\bar{U}, MgO, 7 HO$	Saures Bleioxydsalz . $2\bar{U}, PbO, 2 HO$
„ „ „ 170° $2\bar{U}, MgO, 2 HO$	Kupferoxydsalz, üb. SO_3
Neutrales Kalksalz . . \bar{U}, CaO	getrockn. $2\bar{U}, 3CuO, 5HO$
Saures Kalksalz . . . $2\bar{U}, CaO, 3 HO$	„ bei 140° „ $2\bar{U}, 3CuO, 2HO$

1 Th. folgender Salze erfordert zur Lösung im Mittel an Wasser :

	kaltes: siedendes:			kaltes: siedendes:	
Harnsäure . . .	14500	1850	Neutraler harns. Baryt	7900	2700
Neutrales harns. Kali	44	35	Saurer „ „ unlös.	unlös.	unlös.
Saures „ „	790	75	Neutral. harns. Strontian	4300	1790
Neutral. harns. Natron	77	85	Saurer „ „	5300	2300
Saures „ „	1150	122	Neutraler harns. Kalk	1500	1440
Saur. harns. Ammoniak	1600	—	Saurer „ „	603	276
			Saure harns. Magnesia	3750	160

Das *neutrale harns. Kali* scheidet sich in feinen, krystallinischen Nadeln aus, wenn man eine in der Kälte mit Harnsäure gesättigte, kohlensäurefreie Lauge in einer Retorte eindampft; es schmeckt ätzend, zieht Kohlensäure aus der Luft an und zersetzt sich beim Kochen mit Wasser. — Das entsprechende Natronsatz wird in gleicher Weise in harten Warzen erhalten. — Das *saure Kali-* oder *Natronsatz* fällt nieder, wenn man in eine Lösung von Harnsäure in dem ätzenden Alkali Kohlensäure leitet. Beide reagieren neutral, absorbiren keine Kohlensäure, und ihre Lösungen werden durch Salmiak und doppelt-kohlens. Alkalien, durch Baryt-, Bleioxyd- und Silberoxydsalze gefällt. — *Neutrales harns. Ammoniak* scheint nicht zu existiren; Bensch und Allan erhielten stets saures Salz, welches bald eine weiße, harte, amorphe Masse, bald feine, nadelförmige, zu einem leichten Pulver eintrocknende Krystalle bildet. Es zerlegt sich durch längeres Kochen mit

Harnskure. erneuertem Wasser unter Verlust des ganzen Ammoniakgehalts. Trockne Harnsäure nimmt in einer trocknen Ammoniakatmosphäre an Gewicht nicht zu; trocknet man Harnsäure mit überschüssigem wässerigem Ammoniak ein, so nimmt sie gerade soviel (auf 100 Th. 10,17) von letzterem auf, als dem sauren Salz entspricht. — Die Darstellung von *neutraler harns. Magnesia*, so wie von Doppelsalzen derselben mit dem Ammoniak-, Kali- oder Natronsalz gelang in keiner Weise; stets wurden Gemenge von saurem Salz mit Magnesiahydrat erhalten. Die *saure harns. Magnesia* setzt sich nach mehreren Stunden in warzenförmig gruppirten, seidenglänzenden Krystallen ab, wenn man eine gesättigte heisse Auflösung von saurem Kalisalz mit schwefels. Magnesia vermischt. — *Neutralen harns. Kalk, Baryt und Strontian* erhält man leicht rein durch Kochen der wässerigen Auflösungen dieser Basen mit Harnsäure, oder beim Vermischen ihrer löslichen Salze mit neutralem harns. Kali, mit der Vorsicht jedoch, daß man die Lösung des letzteren Salzes zuvor mit ein wenig des Baryt-, Strontian- oder Kalksalzes im Sieden erhält und den zum größten Theil aus kohlen. alkalischer Erde bestehenden Niederschlag abfiltrirt. Diese neutralen harnsauren Salze sind entweder in feinen, sternförmig gruppirten Nadeln krystallisirt (Strontiansalz), oder sie bilden undurchsichtige, körnige Massen, ohne krystallinische Structur (Baryt- und Kalksalz), sie werden durch Wasser nicht zersetzt, ihre Lösungen reagiren alkalisch und ziehen leicht Kohlensäure aus der Luft an. — Die sauren Salze derselben Basen sind amorphe Niederschläge, die beim Vermischen von saurem harns. Kali mit einem löslichen Salz der alkalischen Erde entstehen. — *Neutrales harns. Bleioxyd* erhält man, als völlig weissen, amorphen, in Wasser und Alkohol unlöslichen Niederschlag durch Eintröpfeln einer verdünnten Lösung von neutralem harns. Kali in eine ebenfalls verdünnte siedende Lösung von salpeters. Bleioxyd, mit der Vorsicht, daß man die zuerst entstehende gelbe Fällung abfiltrirt. Mit Bleizucker erhält man

eine essigsäurehaltige Verbindung. — Das *saure harns. Bleioxyd* Harnsäure. ist ein weißes, in Wasser, Weingeist und Aether unlösliches, leicht zerreibliches Pulver. Seine Existenz spricht sehr für die zweibasische Natur der Harnsäure, deren wahre Formel dann $C_{10}N_4H_2O_4 + 2HO$ wäre. — Das *Kupferoxydsalz*, das beim Vermischen von saurem harns. Kali mit schwefels. Kupferoxyd niederfällt, ist grün und kalihaltig; es giebt erst beim Kochen alles Kali als saures Salz ab und wird dabei braun, beim Trocknen violett. — Neutrale harns. Salze mit anderen schweren Metalloxyden als Bleioxyd sind nicht rein darzustellen; Silberoxydsalze werden durch neutrales harns. Kali sogleich schwarz gefällt.

Schlieper (1) hat Untersuchungen über die Oxydation Harnsäure; Zersetzung durch Ferridcyankalium u. Kali. der Harnsäure mittelst Ferridcyankalium und Kali veröffentlicht. Zu einer lauwarmen Lösung von Harnsäure in wenig mehr wässrigem Kali, als zur Bildung von neutralem harns. Kali ($2KO, C_{10}N_4H_2O_4$) nöthig ist, wurde nach und nach abwechselnd Ferridcyankalium (welches in dem Mafse, als es sich löst, sich in Ferrocyanalium verwandelt) und Kali (letzteres, um das sich ausscheidende harns. Kali wieder als neutrales zu lösen) bis zur vollständigen Zersetzung der Harnsäure zugefügt. Die entstehende alkalische, schwach nach Ammoniak riechende, überschüssiges Kali, Ferrocyanalium und die Zersetzungsproducte der Harnsäure enthaltende Flüssigkeit wurde mit Schwefelsäure fast vollständig neutralisirt (wobei sich viele Kohlensäure entwickelte) und kochend abgedampft (wobei sie constant nach Ammoniak roch). Der grösste Theil des Ferrocyanaliums wurde durch Krystallisation getrennt, die zurückbleibende Mutterlauge stärker abgedampft und mit Alkohol versetzt, wodurch Ferrocyanalium und schwefels. Kali gefällt wurden; die präcipitirte Salzmasse mehrmals mit Alkohol ausgekocht gab eine weingeistige Lösung, aus welcher sich bei dem Abdampfen krystallinische Krusten einer organischen Verbindung ausschieden, unter Zurücklassung eines klebrigen,

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 214; Chem. Gaz. 1849, 1.

Harnsäure;
Zersetzung
durch Ferri-
cyankalium u.
Kali.

nach langem Stehen nur Spuren von undeutlicher Krystallisation zeigenden, Kali enthaltenden Syrups. — Eine andere Menge Harnsäure wurde auf dieselbe Art behandelt, nur mit dem Unterschied, daß mit Essigsäure statt mit Schwefelsäure neutralisirt wurde; die nach dem AuskrySTALLISIREN des meisten Ferrocyankaliums zurückbleibende Mutterlauge wurde mit Alkohol gefällt; die abfiltrirte alkoholische Lösung lieferte jetzt gar keine Krystalle, sondern nur den klebrigen Syrup, welcher durch Behandlung mit absolutem Alkohol von dem darin enthaltenen essigs. Kali getrennt wurde. Die in Alkohol unlöslich zurückgebliebene Salzmasse wurde in Wasser gelöst und aus der heißen Lösung das Ferrocyankalium durch schwach überschüssiges essigs. Kupfer ausgefällt; in der abfiltrirten Lösung entstand auf Zusatz von Alkohol ein Niederschlag von neutralem oxals. Kali. — Die oben erwähnte krystallinische organische Verbindung wurde durch Umkrystallisiren aus Wasser gereinigt, und erwies sich nach ihren Reactionen und der Analyse als Allantoin. — Der oben erwähnte klebrige Syrup löst sich leicht in Wasser, und absoluter Alkohol fällt aus dieser Lösung weiße Flocken, welche nach dem Trennen von der Flüssigkeit an der Luft bald zerfließen. Die wässrige Lösung wurde mit essigs. Bleioxyd versetzt, und das entstehende oxals. Bleioxyd abfiltrirt; auf Zusatz von kohlen-säurefreiem Ammoniak entstand dann ein weißer, käsiger Niederschlag einer Bleioxydverbindung von veränderlichem Bleioxydgehalt, in welcher (bei 100° getrocknet) eine in den Atomverhältnissen $C_6N_4H_4O_6$ zusammengesetzte organische Substanz enthalten ist. Diese nennt Schlieper *Lantanersäure*. Wird der Syrup in sehr wenig Wasser gelöst, so viel Weingeist zugesetzt bis eine schwache Trübung eintritt und diese dann wieder durch einige Tropfen Wasser aufgehoben, so setzen sich aus dieser Flüssigkeit (unter Verschwinden der sauren Reaction derselben) sehr langsam krystallinische Rinden ab, welche durch Umkrystallisiren gereinigt werden können und saures lantanurs.

Kali, KO , $\text{C}_6\text{N}_4\text{H}_4\text{O}_6 + \text{HO}$, $\text{C}_6\text{N}_4\text{H}_4\text{O}_6 + 4 \text{HO}$, sind Harnsäure;
Zersetzung
durch Ferrid-
cyankalium u.
Kali. (4 HO entweichen bei 100°). Das lantanurs. Silberoxyd scheint durch Trocknen bei 100° zersetzt, und aus der Säure 3 HO ausgetrieben zu werden; es wird zu AgO , $\text{C}_6\text{N}_4\text{H}_4\text{O}_6$.

Schlieper betrachtet Allantoin und Kohlensäure als die wesentlichen Zersetzungsproducte bei Behandlung der Harnsäure mit Ferridcyankalium und Kali. 1 At. Harnsäure ($\text{C}_{10}\text{N}_4\text{H}_4\text{O}_6$) mit 2 At. Ferridcyankalium, 4 At. Kali und 2 At. Wasser gebe 4 At. Ferrocyankalium, 2 At. kohlen. Kali und 2 At. Allantoin. Harnstoff, welchen er unter den Zersetzungsproducten einmal in geringer Menge fand, und einen rothen, dem Allantoin hartnäckig anhängenden, Körper betrachtet er als secundäre Zersetzungsproducte.

Bleibt Allantoin längere Zeit (1 bis 2 Tage) in concentrirter Kalilauge gelöst, so wird es nicht mehr durch Säuren ausgefällt, die Lösung bildet bei dem Kochen nur sehr wenig Ammoniak und keine Spur von Oxalsäure. 2 At. Allantoin haben 2 At. Wasser aufgenommen, und sich in eine Säure, *Hidantoinensäure*, verwandelt. Wird die alkalische Lösung mit Essigsäure bis zur sauren Reaction und dann mit Alkohol versetzt, so trübt sich die Flüssigkeit milchig, und dann scheidet sich hidantoin. Kali unten als farblose ölarartige Flüssigkeit ab; dieses Salz konnte nicht krystallisirt erhalten werden. — Die wie eben angeführt mit Essigsäure übersättigte Flüssigkeit giebt mit essigs. Bleioxyd bald einen weissen Niederschlag, bei 100° getrocknet PbO , $\text{C}_6\text{N}_4\text{H}_4\text{O}_6$. Die Säure, welche aus dem Bleioxydsalz durch Schwefelwasserstoff abgeschieden wurde, konnte in Syrupform aber nicht zum Krystallisiren gebracht werden; durch Zusatz von Alkohol wird dieser Syrup zu einer weissen bröcklichen, bald wieder zerfließenden, Masse; die abgedampfte Säure entwickelt mit kalter Kalilauge Ammoniak; sie giebt mit Baryt- und Kalkwasser keine Fällung, aber auf Zusatz von Alkohol scheiden sich dicke weisse Flocken aus; mit Chlorbaryum giebt sie nach Zusatz von Ammoniak weisse Fällung; sie treibt aus kohlen.

Natron die Kohlensäure nicht aus; nach der Neutralisation mit Ammoniak entweicht dieses beim Abdampfen im Wasserbad. Die Säure hatte sich also beim Abdampfen zersetzt, was sich auch bei der Analyse eines mit solcher Säure bereiteten Silbersalzes (es enthielt 2 Ag auf 5 N) bestätigt fand.

Hippursäure.

Gregory (1) schlägt zur rascheren Darstellung der Hippursäure vor, den frischen Harn von Pferden oder Kühen mit überschüssiger Kalkmilch zu versetzen und während einiger Augenblicke zu kochen, die heisse Flüssigkeit zu coliren, und die klare, hippurs. Kalk enthaltende, Auflösung so rasch, als möglich auf $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{10}$ des ursprünglichen Volums (je nach der Concentration des Harns) einzukochen und mit Salzsäure zu übersättigen, wo nach dem völligen Erkalten eine ansehnliche Krystallisation von etwas röthlich oder gelblich gefärbter Hippursäure erhalten wird. (Im Laboratorium zu Gießen angestellte Versuche haben gezeigt, daß dieses Verfahren sehr empfehlungswürdig ist.)

Behandelt man, nach Strecker (2), die Lösung von Hippursäure in concentrirter Salpetersäure mit Stickoxydgas, so tritt eine Entwicklung von Stickgas ein, und man erhält die Säure $C_{10}H_8O_6$, als deren Amidverbindung sich die Hippursäure betrachten läßt. Die auf diese Art erhaltene stickstofffreie Säure löst sich leicht in Aether; das Barytsalz krystallisirt in seidenglänzenden, in Wasser leicht löslichen Nadeln; das Silberoxydsalz, $AgO, C_{10}H_8O_6$, löst sich in kochendem Wasser ziemlich reichlich, und krystallisirt bei dem Erkalten in feinen Nadeln, beim Erhitzen entwickelt es Bittermandelöl.

(1) Chem. Soc. Mem. III, 330; Phil. Mag. [3] XXXI, 127; Ann. Ch. Pharm. LXIII, 125; J. pr. Chem. XLII, 40; Pharm. Centr. 1847, 688.
— (2) Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 54.

Wir stellen hier in einen besondern Abschnitt eine Klasse von Verbindungen zusammen, welche als aus Salzen des Ammoniaks oder organischer Basen durch Austreten von Wasser gebildet betrachtet werden können. So leiten sich aus den Ammoniakverbindungen ab die Amide (Ammoniumoxydsalze — 2 HO) und die Nitryle (Ammoniumoxydsalze — 4 HO), und entsprechende Verbindungen sind aus dem Anilin und dem Naphthalidam erhalten worden.

Amide,
Nitryle,
Anilide und
Aehnliches.

Bei Gelegenheit von H. Rose's Untersuchung einer Verbindung des Phosphors mit Stickstoff veröffentlichten Liebig und Wöhler (1) Einiges über die Producte der Einwirkung von Ammoniakgas auf Phosphorsuperchlorid, als Resultate einer unvollendeten Arbeit, welche weder auf Schärfe noch auf Genauigkeit Anspruch machen sollten, aber doch späteren Untersuchungen Anhaltspunkte abgeben könnten. Sie fanden, dafs das eine hier entstehende Product bei dem Behandeln mit Wasser einen ungelöst zurückbleibenden Körper giebt, dessen Zusammensetzung durch $\text{PN}_2\text{H}_2\text{O}_2$ ausdrückbar sei, und dafs neben jenem Product sich immer noch ein anderes von campherartigem Aussehen bildet. — Gerhardt (2) betrachtete den eben besprochenen in Wasser unlöslichen Körper als $\text{PN}_2\text{H}_2\text{O}_2$ (welche Formel, mit Ausnahme des Wasserstoffs, fast genau dieselbe procentische Zusammensetzung verlangt, als die von Liebig und Wöhler vermuthete $\text{PN}_2\text{H}_2\text{O}_2$), und als eine Verbindung, welche zu phosphors. Ammoniak in einem ähnlichen Verhältnisse stehe wie die Amide zu den Ammoniaksalzen ($2\text{NH}_4\text{O}, \text{HO}, \text{PO}_3 - 6\text{HO} = \text{PN}_2\text{H}_2\text{O}_2$). Er nannte ihn deshalb *Phosphamid*. Die Entstehung des erwähnten campherartigen Körpers erklärt sich nach Gerhardt's Betrachtungsweise nicht, und er hält die Entstehung desselben für eine zufällige und unwesentliche. — Zur Unterstützung seiner Ansicht hat Gerhardt (3) jetzt noch ange-

Amide.
Phosphamid.

(1) Ann. Ch. Pharm. XI, 139. — (2) Ann. ch. phys. [3] XVIII, 188; vergl. Berzelius' Jahresber. XXVII, 44. — (3) Ann. ch. ph. [3] XX, 255; J. pharm. [3] XI, 457; Pharm. Centr. 1847, 607.

führt, daß der von ihm als Phosphamid betrachtete Körper sich in verdünnter Schwefelsäure bei gelinder Erwärmung vollständig ohne Gasentwicklung löse, und die syrupdicke Lösung Krystalle von zweifach-schwefels. Ammoniak gebe, während in der Mutterlauge Phosphorsäure enthalten sei.

Sulfocarb-
amid.

Wenn Schwefelkohlenstoff mit einem großen Ueberschuß von Ammoniakgas in Berührung ist, so überzieht sich nach Laurent (1) innerhalb 24 Stunden der Boden des Gefäßes mit einem gelben Absatz, welcher unter der Loupe sich als ein Gemenge krystallinischer Nadeln und einer gelben amorphen Substanz zeigt. Dies Gemenge entwickelt bei dem Erhitzen Schwefelwasserstoff und mehrere andere Substanzen; in Wasser gelöst und zur Austreibung von Schwefelwasserstoff mit Salzsäure versetzt, färbt es sich mit Eisenchlorid blutroth. Laurent schließt, der Schwefelkohlenstoff gebe mit Ammoniak geschwefeltes Carbamid, identisch mit Schwefelcyanwasserstoff, und Schwefelwasserstoff ($2 \text{CS}_2 + \text{NH}_3 = \text{C}_2\text{NS}_2\text{H} + 2 \text{HS}$), der Schwefelcyanwasserstoff mit Ammoniak Schwefelcyanammonium, und der Schwefelwasserstoff verbinde sich entweder mit dem Ammoniak oder mit Schwefelkohlenstoff und Ammoniak zu Hydrothiocarbon-Ammoniak (Ammoniumsulfocarbonat).

Metacetamid.

Dumas, Malaguti und Leblanc (2) fanden, daß metacetons. Aethyloxyd mit Ammoniakflüssigkeit in Berührung sich rasch in *Metacetamid* verwandelt. *Acetamid*,

Acetamid.

$\text{C}_4\text{H}_9\text{NO}_2$, erhielten sie in gleicher Weise aus dem Essigäther; es ist fest, weiß, krystallinisch, zerfließlich, schmilzt bei 78° und giebt bei dem Erkalten schöne Krystalle; es

Valeramid.

siedet bei 221° . Auch *Valeramid* bildet sich auf dieselbe Weise wie das Butyramid (3). Sie fanden, daß die Amide

(1) Ann. ch. phys. [3] XXII, 103; J. pr. Chem. XLIV, 162; Pharm. Centr. 1848, 116. — (2) Compt. rend. XXV, 656; Pharm. Centr. 1848, 121. — (3) Dessaignes und Chautard theilen mit, daß bei Einwirkung von Valerianäther auf das 7- bis 8fache Volum concentrirter Ammoniakflüssigkeit während 4 Sommermonaten und bei öfterem Umschütteln der Aether verschwand, und dann durch Abdampfen bei gelinder Wärme Valeramid, $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{NO}_2$, in großen, dünnen, glänzenden krystallinischen

der Säuren $C_nH_nO_4$ mit Kalium bei wenig erhöhter Temperatur unter Gasentwicklung Cyankalium geben. Sie machen darauf aufmerksam, daß man ein solches Amid $C_nH_{n+1}O_2N$ als bestehend betrachten könne aus Cyanwasserstoff C_2NH und einem Alkohol $C_{n-2}H_{n-2}O_2$; aber es gelang nicht, in dem Acetamid z. B. die Präexistenz von Holzgeist darzuthun. Die Amide anderer Säuren, z. B. das Benzamid und das Cuminamid, geben mit Kalium bei ihrer Schmelztemperatur kein Cyankalium; daß Liebig und Wöhler bei dem Benzamid die Bildung von Cyanür beobachteten, betrachten D. M. u. L. als auf einer secundären Zersetzung beruhend. — Später (1) theilten sie mit, daß die Amidbildung bei Aethern, auf welche Ammoniak bei gewöhnlicher Temperatur langsam einwirkt, rasch statt findet, wenn man die Einwirkung in verschlossenen Röhren über 100° vor sich gehen läßt.

Valeramid.

Nach Gerhardt (2) ist das aus Chlorkohlensäureäther mit Ammoniak entstehende Chlorcarbethamid, für dessen Zusammensetzung Malaguti's Untersuchung (3) $C_{10}H_9ClN_2O_3$ ergeben hatte, nach allen Eigenschaften (nur die Zusammensetzung untersuchte er nicht) mit dem Chloracetamid identisch; auch ersteres habe die Zusammensetzung $C_4H_2Cl_2NO_2$. Malaguti's chlorcarbethamids. Ammoniak, für welches dieser $NH_4O, C_{10}H_9Cl, N_2O_3$ gefunden hatte, ist nach Gerhardt $NH_4O, C_4Cl_2O_3$, chloressigs. Ammoniak. — Malaguti (4) gesteht zu, daß das mittelst wässerigen Ammoniaks bereitete Chlorcarbethamid mit dem Chloracetamid identisch sei, aber nicht das mittelst gasförmigen Ammoniaks be-

Chlorcarbethamid.
Chloracetamid.

Blättern erhalten wurde. Das Valeramid ist nach ihnen im Wasser leicht löslich, schmilzt über 100° und sublimirt fast bei derselben Temperatur. Erst bei dem Kochen mit kaustischem Kali entwickelt es Ammoniak. (J. pharm. [3] XIII, 244; J. pr. Chem. XLV, 48; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 333.) — A. W. Hofmann erhielt das Valeramid auf dieselbe Art (Ann. Ch. Pharm. LXV, 56). — (1) Compt. rend. XXV, 734. — (2) Compt. rend. XXVII, 116; J. pharm. [3] XIV, 283; Pharm. Centr. 1848, 666. — (3) Vergl. Berzelius' Jahresber. XXVI, 760. — (4) Compt. rend. XXVII, 188; J. pharm. [3] XIV, 289; Pharm. Centr. 1848, 695.

reitet, dessen Formel indeß $C_{10}H_6ClN_3O_4$ sein könne. Er giebt weiter an, gefunden zu haben, daß auch das aus Chloroxaläther mit wässerigem Ammoniak bereitete und von ihm als Chloroxethamid bezeichnete Product nichts anders als Chloracetamid ist, und spricht die Ansicht aus, daß, wenn auch alle zusammengesetzten Aether, deren Wasserstoff gänzlich durch Chlor ersetzt ist, mit wässerigem Ammoniak wahrscheinlich Chloracetamid bilden, doch einige von ihnen mit wasserfreiem Ammoniak andere Producte geben. — Gerhardt (1) fand nun auch für das mittelst wasserfreien Ammoniaks dargestellte Chlorcarbethamid dieselben Eigenschaften, wie für Chloracetamid.

Anisamid. „Chloranisyl (S. 538) erhitzt sich nach Cahours (2) stark mit Ammoniakgas und liefert das aus Alkohol in schönen Prismen krystallisirende *Anisamid*. Dieses entsteht auch durch Behandlung von Anisäther mit Ammoniak. Seine Zusammensetzung ist $C_{10}H_9NO_4$.

Cuminamid. Nach Field (3) wird bei der Erhitzung einer zur Trockene abgedampften Auflösung von Cuminsäure in starker Ammoniakflüssigkeit Ammoniak entwickelt, Cuminsäure sublimirt, und zugleich ein anderer Theil des cumins. Ammoniaks unter Wasserausscheidung zersetzt, wobei sich ein weißer, krystallinischer, in Wasser schwierig löslicher Körper und dann ein farbloses, stark riechendes Oel (Cumonitryl; vergl. S. 595) bilden (nur die Erfahrung lehrt die Temperatur angemessen zu reguliren, so daß der eine oder der andere der beiden letzteren Körper hervorgebracht wird). — Der weiße krystallinische Körper ist *Cuminamid*, $C_{20}H_{13}NO_2 = NH_4O, C_{20}H_{11}O_3 - 2HO$. Man kann auch das cumins. Ammoniak in einer starken zugeschmolzenen Glasröhre in einem Oelbad allmählig bis nahe zum

(1) Compt. rend. XXVII, 238; J. pharm. [3] XIV, 291; Pharm. Centr. 1848, 798. — (2) In der S. 363 angef. Abhandl. — (3) Chem. Soc. Mem. III, 404; Phil. Mag. [3] XXXI, 459; Ann. Ch. Pharm. LXV, 45; J. pr. Chem. XLIV, 136; Pharm. Centr. 1848, 151; J. pharm. [3] XIII, 225.

Siedepunkt des Oels erhitzen; nach dem Abkühlen ist die Masse fest und krystallinisch, unlöslich in kaltem Wasser und Ammoniak, sehr löslich in heissem Wasser, aus welcher Lösung sie sich bei dem Erkalten krystallinisch abscheidet. Durch Umkrystallisiren aus heissem Wasser (welchem man etwas Ammoniak zusetzt, um etwa beigemengte Cuminsäure wegzunehmen) erhält man das Cuminamid in glänzenden, weissen, tafelförmigen, dem Benzamid ähnlichen Krystallen, wenn es aus concentrirter Lösung sich rasch abscheidet; hingegen in langen undurchsichtigen Nadeln, wenn es aus verdünnter Lösung allmählig auskrystallisirt. Es ist in kaltem und warmem Alkohol nach jedem Verhältniss löslich, und wird durch Mineralsäuren und starke Kalilösung nur schwierig bei langem Kochen nach Art der Amide überhaupt zersetzt.

Cuminamid.

Aus nitrobenzoës. Ammoniak erhielt Field nach längerem Schmelzen eine in kaltem Wasser und Ammoniak unlösliche Substanz, welche aus der Lösung in heissem Wasser in schönen gelben Nadeln krystallisirte, *Nitrobenzamid*, $C_{14}H_6(NO_2)NO_2$. Das Schmelzen mufs mit grosser Vorsicht vorgenommen werden, da das nitrobenzoës. Ammoniak bei dem Erhitzen leicht explodirt. — Eine Chlorbenzoësäure, von welcher es nicht gewiss war, ob sie $HO, C_{14}H_5Cl_2O_3$ oder $HO, C_{14}H_2Cl_3O_3$ war, gab in Ammoniaksalz verwandelt und dann dem Vorgehenden gemäss behandelt, ein in kaltem Wasser und Ammoniak unlösliches, aus der heissen wässerigen Lösung in langen Nadeln krystallisirendes Product; die eigens dargestellte Chlorbenzoësäure $HO, C_{14}H_4ClO_3$ aber schwärzte sich, als sie mit Ammoniak verbunden erhitzt wurde, unter Abscheidung von Kohle.

Nitrobenzamid.

Chlorbenzamid.

Ueber Chlorniceinamid vergl. S. 530.

Nach Marignac (1) entsteht bei der Einwirkung von Ammoniak auf wasserfreie Phtalsäure ($C_{16}H_4O_6$) Phthalamid ($C_{16}H_6NO_3$). Laurent (2) giebt über diese Einwirkung Folgendes an. Löst man wasserfreie Phtalsäure in heissem Al-

Phthalamid.

(1) Ann. Ch. Pharm. XLII, 215; Berzelius' Jahresber. XXIII, 542. —

(2) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 117; J. pr. Chem. XLV, 174.

Phtalam-
säure.

kohol und fügt dann Ammoniak zu, so setzen sich bei dem Erkalten kleine farblose, an jedem Ende durch zwei Flächen begrenzte Prismen ab, welche sehr leicht in Wasser löslich sind; werden sie in wenig Wasser gelöst, mit etwas Alkohol und dann mit Platinchlorid versetzt; so bildet sich sogleich ein Niederschlag von Platinsalmiak; die filtrirte Flüssigkeit mit einem Ueberschufs von Platinchlorid gekocht, giebt aufs Neue einen Niederschlag von Platinsalmiak. Die Krystalle sind nämlich das Ammoniaksalz einer neuen Säure, der *Phtalamsäure*, und haben die Zusammensetzung NH_4O , $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{NO}_8$; durch Platinchlorid wird zuerst das Ammoniak und dann bei dem Kochen der Stickstoff der Säure gleichfalls als Ammoniak abgeschieden. Wird das phtalams. Ammoniak mit essigs. Bleioxyd gefällt, der Niederschlag mit Schwefelwasserstoff zersetzt und die Flüssigkeit abgedampft, so krystallisirt saures phtals. Ammoniak; die Phtalamsäure, $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{NO}_8$, nimmt also bei dem Abdampfen 2 HO auf. Bei Zusatz von concentrirter salpeters. Silberoxydlösung zu einer kochenden alkoholischen Lösung von phtalams. Ammoniak entsteht nach einigen Minuten eine Menge feiner Nadeln von phtalams. Silberoxyd, AgO , $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{NO}_8$; diese werden durch kochendes Wasser unter Absatz glänzender Blättchen zerlegt, welche Laurent für Phtalimidsilberammonium, $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N} \left(\begin{smallmatrix} \text{Ag} \\ \text{H} \end{smallmatrix} \text{N} \right) \text{O}_4$ hält. Bei Zusatz von salpeters. Silberoxyd zu einer kochenden alkoholischen Lösung von Phtalimid bildet sich kein Niederschlag, aber auf Zusatz von Ammoniak entsteht ein solcher, welcher bald in Blättchen krystallinisch, bald pulverförmig ist; letztern hält Laurent für Phtalimidsilber, $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N} \text{AgO}_4$.

Einwirkung
von Schwefel-
wasserstoff
auf
Hydramide.

Die Versuche von Liebig und Wöhler über die Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Aldehyd-Ammoniak (vergl. Thialdin) veranlaßten Cahours (1), die Einwirkung des ersteren Körpers auf die von Gerhardt als Hydramide bezeichneten Verbindungen zu untersuchen. — Wird ein Strom von Schwefelwasserstoff durch eine alkoholische Lö-

(1) Compt. rend. XXV, 457; Pharm. Centr. 1847, 826.

sung von Hydrobenzamid geleitet, so trübt sich die Flüssigkeit bald, und wenn der Schwefelwasserstoff im Ueberschufs zugeleitet wird, tritt vollständige Zersetzung ein; Schwefel wird dabei nicht abgeschieden. Die Flüssigkeit wird in der Ruhe klar und enthält dann Schwefelammonium; der sich absetzende Niederschlag bildet nach dem Waschen mit Alkohol ein weißes mehliges Pulver, Laurent's Schwefelhydrobenzoyl $[C_{14}H_{11}N_2 + 8 HS = 3(C_{14}H_8S_2) + 2 NH_4S]$. — Ein gleiches Ansehen hat das auf dieselbe Art aus dem Cinnhydramid entstehende Product $C_{14}H_8S_2$ (Cahours nennt es *Thiocinnol*) und das aus dem Anishydramid entstehende Product $C_{16}H_8S_2O_2$ (*Thianisiol*). — Fownes' Furfuramid, $C_{10}H_{11}N_2O_4$, giebt durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff $C_{10}H_4S_2O_2$ als gelbliches Pulver, welches von Cahours in Beziehung auf die Analogie mit dem Furfurol ($C_{10}H_4O_4$) als *Thiofurfol* bezeichnet wird. — Salhydramid giebt in alkoholischer Auflösung mit Schwefelwasserstoff behandelt ein ähnliches Pulver, welches die Eisenoxydsalze violettroth färbt und sich mit Alkalien verbinden kann, wie Salicylwasserstoff (salicylige Säure), aber viel Schwefel in seiner Zusammensetzung enthält; Cahours glaubt, es sei letztere Verbindung, in welcher die Hälfte des Sauerstoffgehalts durch Schwefel ersetzt sei, $C_{14}H_8S_2O_2$. — Cahours erinnert daran, dafs, wie Laurent zeigte, das Schwefelhydrobenzoyl durch Einwirkung von Schwefelammonium auf eine alkoholische Lösung von Bittermandelöl entstehen kann; er selbst überzeuete sich, dafs das Thiocinnol oder das Thianisiol sich bilden kann, wenn man Schwefelammonium auf eine alkoholische Lösung von Zimmtöl oder Anisylwasserstoff einwirken läfst. Bei ähnlicher Behandlung von Kümmelöl wurde ein schwefelhaltiges harzartiges Product erhalten, welches schwer zu reinigen war und dessen Zusammensetzung annähernd der Formel $C_{20}H_{12}S_2$ entsprach.

Frankland und Kolbe (1) betrachten die als Nitrile bezeichneten Körper als Cyanverbindungen (das Benzo-

Einwirkung
von Schwefel-
wasserstoff
auf
Hydramide.

Nitrile.

(1) In der S. 544 angeführten Abhandlung.

Nitryl. nitryl $C_{14}H_5N$ z. B. als Cyanphenyl $C_{11}H_5Cy$, in welchen das Cyan eben so wenig direct durch Reagentien nachzuweisen sei, als das Chlor in dem Chloräthyl z. B. Sie führen zur Begründung ihrer Ansicht an, daß die Siedepunkte des Valeronitryls ($C_{10}H_9N$; 125°) und des Cyanamyls ($C_{12}H_{11}N$; 146°) um die Anzahl Grade verschieden sind, welche für mehrere analoge, in ihrer Zusammensetzung um C_2H_2 differirende, Körper gefunden wurde; und daß Metacetonsäurehydrat und Cyanäthyl, Valeriansäurehydrat und Valeronitryl, Capronsäurehydrat und Cyanamyl, und Benzoësäurehydrat und Benzonitryl nahe dieselbe Siedepunktsdifferenz zeigen.

Acetonitryl. Zu derselben Ansicht gelangte Dumas. Dieser fand (1), daß durch Einwirkung von wasserfreier Phosphorsäure auf krystallisirtes essigs. Ammoniak bei der Destillation eine Flüssigkeit übergeht, welche durch Digestion mit einer gesättigten Lösung von Chlorcalcium und Rectification über festes Chlorcalcium und Magnesia rein erhalten wird; sie siedet bei 77° und ist mit Wasser in allen Verhältnissen mischbar. Ihre Zusammensetzung ist C_4H_5N (*Acetonitryl*; essigs. Ammoniumoxyd — 4 At. Wasser); 1 Aeq. erfüllt im Dampfzustand 4 Vol.; nach ihren Reactionen läßt sie sich auch als Cyanmethyl (C_2H_3 , C_2N) betrachten. Bei dem Kochen derselben mit Kalilösung entwickelt sich Ammoniak, und Essigsäure wird wieder gebildet; Chromsäure und kochende Salpetersäure bewirken mit jener neuen Verbindung keine Zersetzung. Kalium wirkt auf sie schon in der Kälte heftig und unter Wärmeentwicklung ein; es bildet sich Cyankalium und es entwickelt sich ein entzündbares Gasgemenge von Kohlenwasserstoff und freiem Wasserstoff. Dumas erinnert an das von Fehling entdeckte Benzonitryl, welches aus dem benzoës. Ammoniumoxyd gleichfalls durch Verlust von 4 At. Wasser entsteht; er giebt an, daß sich letzteres gleichfalls bei Destillation von

(1) Compt. rend. XXV, 383; Pharm. Centr. 1847, 813.

benzoës. Ammoniak mit wasserfreier Phosphorsäure bildet. Dumas hielt es für wahrscheinlich, dafs hiernach wohl allgemein aus den Ammoniumoxydverbindungen flüchtiger Säuren NH_4O , $\text{C}_n\text{H}_{n-1}\text{O}$, sich ätherartige Cyanverbindungen $\text{C}_{n-1}\text{H}_{n-1}\text{O}$, C_nN und aus diesen Alkohole $\text{C}_{n-1}\text{H}_n\text{O}$ darstellen lassen (n bedeutet immer eine gerade Zahl). — Dumas hat diese Untersuchungen gemeinsam mit Malaguti und Leblanc weiter verfolgt. Sie fanden zunächst (1), dafs das chloessigs. Ammoniumoxyd (NH_4O , $\text{C}_4\text{Cl}_3\text{O}_3$) in ganz analoger Weise eine Verbindung $\text{C}_4\text{Cl}_3\text{N}$ (*Chloracetoniätryl*) giebt, welche flüssig ist, das spec. Gew. 1,444 besitzt, bei 81° siedet und im Dampfzustand auf 4 Vol. condensirt ist; mit Kali regenerirt sie Chloessigsäure; sie entsteht auch bei Einwirkung von wasserfreier Phosphorsäure auf Chloracetamid. Das butters. und das valerians. Ammoniumoxyd verlieren auf dieselbe Art 4 At. Wasser, und geben analoge Verbindungen, welche mit wässerigem Kali die ursprüngliche Säure wieder bilden und mit Kalium Cyankalium und ein Gemenge von Wasserstoff und einem um so leichter condensirbaren Kohlenwasserstoff geben, um je gröfser n in der Formel der angewandten Säure (diese allgemein $\text{C}_n\text{H}_n\text{O}_4$ geschrieben) ist. Sie machen darauf aufmerksam, dafs die Umwandlung des oxals. Ammoniumoxyds in Cyan und die des ameisens. Ammoniumoxyds in Cyanwasserstoff (beides durch Austreten von 4 At. Wasser) sich den vorstehend besprochenen Fällen ganz anschliesst. — Sodann (2) haben sie die Identität des Acetonitrils mit dem Cyanmethyl (vergl. S. 547) dargethan, und dafs die ätherartigen Cyanverbindungen C_nH_{n+1} , C_nN durch wasserhaltiges Kali nicht nach Art der andern Aetherarten unter Bildung eines Alkohols $\text{C}_n\text{H}_{n+2}\text{O}$ zersetzt werden, sondern unter Bildung einer Säure $\text{C}_{n+1}\text{H}_{n+2}\text{O}_4$ und Entwicklung von Ammoniak. Sie gaben noch an, dafs auch das Butyramid und das Benzamid durch wasserfreie Phos-

Chlor-
acetoniätryl.

(1) Compt. rend. XXV, 442; Pharm. Centr. 1847, 824. — (2) Compt. rend. XXV, 473; Pharm. Centr. 1847, 824.

phorsäure in dieselben Substanzen übergeführt werden, wie die entsprechenden Ammoniumoxydverbindungen, und daß das Benzonitril sich mit Kalium anders verhält; als die Nitrile der Säuren $C_nH_nO_4$, sofern sich dabei weder ein Cyanür bildet noch ein Gas entwickelt. — Weiter (1) haben sie die Bildung der entsprechenden Nitrile aus Acetamid, Metacetamid, Butyramid und Valeramid bei Einwirkung wasserfreier Phosphorsäure dargethan. Das *Butyronitril* (C_4H_7N) oder Cyanmetacetyl (C_3H_5, C_2N) ist eine ölige Flüssigkeit von angenehmem Geruch, der etwas an Bittermandelöl erinnert, vom spec. Gewicht 0,795 bei $12^\circ,5$ und dem Siedepunkt $118^\circ,5$; mit Kalium giebt es Cyankalium, Wasserstoff und einen neuen Kohlenwasserstoff. Das *Valeronitril* ($C_{10}H_{17}N$) oder Cyanbutyryl (C_8H_{15}, C_2N) ist identisch mit dem durch Schlieper mit dem erstern Namen bezeichneten Körper (vergl. auch die Zersetzung des Caseins u. s. w. durch Schwefelsäure und zweifach-chroms. Kali); es verhält sich gegen Kalium wie das vorhergehende.

Durch Destillation von essigs., butters. oder valerians. Ammoniak bilden sich nach A. W. Hofmann (2) die entsprechenden Nitrile nicht. Er erhielt aber Butyronitril und Valeronitril, indem er die Dämpfe von Butyramid und von Valeramid durch eine glühende, mit Kalk gefüllte Röhre leitete. Das Butyronitril und das Valeronitril geben, wie das Cumonitril, mit Kalium Cyankalium. Die Bildung dieser Nitrile auf dem eben angegebenen Weg erfolgt nach Hofmann nur schwierig, und er hält die von Dumas angewandte Darstellung mittelst wasserfreier Phosphorsäure für vorzüglicher. — Auch Laurent und Chancel (3) haben gefunden, daß bei dem Ueberleiten des Dampfs von Butyramid ($C_4H_7NO_2$) über dunkelroth-glühenden caustischen Baryt eine farblose klare Flüssigkeit erhalten wird, welche *Butyronitril*, C_4H_7N , ist. Sie glauben,

(1) Compt. rend. XXV, 656; Pharm. Centr. 1848, 121. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 55. — (3) Compt. rend. XXV, 884; J. pharm. [3] XIII, 464; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 332.

dafs diese Methode der Darstellung der Nitryle in manchen Fällen den andern vorzuziehen sei. Benzoës. Ammoniak auf diese Art behandelt gab nur Benzol.

Wird cumins. Ammoniak zum Schmelzen erhitzt (vgl. *Cuminitryl*. S. 588) und die geschmolzene Masse in lebhaftem Kochen erhalten, so destilliren nach Field (1) mit dem Wasser Tropfen eines schwach gelblichen Oels; geht von diesem Oel weniger über, so trennt man das übergegangene von dem wässerigen Destillat, setzt letzteres dem Rückstand in der Retorte zu, destillirt wieder, und wiederholt dieses Verfahren. Das erhaltene Oel wäscht man zuerst mit Ammoniak, dann mit Salzsäure, dann mit Wasser, trocknet es mit Chlorcalcium und rectificirt es; das in der Mitte der Rectification übergehende zeigt mit Platindraht erhitzt den Siedepunkt 239° bei $758^{\text{mm}},5$ Barometerstand; es ist *Cuminitryl*, $\text{C}_{20}\text{H}_{11}\text{N} = \text{NH}_4\text{O}$, $\text{C}_{20}\text{H}_{11}\text{O}_3 - 4\text{HO}$, eine farblose, das Licht stark brechende, stark und angenehm riechende und brennend schmeckende Flüssigkeit, welche etwas in Wasser, nach jedem Verhältnifs in Alkohol und Aether löslich ist, von dem spec. Gew. $0,765$ bei 14° ; ihr Dampf brennt mit heller Flamme, wobei sich viel Kohle absetzt. Starke Salpetersäure wirkt nur wenig darauf ein; nach dem Kochen mit derselben setzen sich nach einigen Tagen Krystalle von Cuminsäure ab. Bei dem Erhitzen mit Kalium färbt sich das Cuminitryl dunkler, und eine andere ölarartige Verbindung bildet sich; die mit Wasser behandelte Masse gab bei der gewöhnlichen Prüfung auf Cyan einen reichlichen Niederschlag von Berlinerblau. Alkoholische Kalilösung wirkt nicht unmittelbar auf das Cuminitryl ein, aber nach 1 oder 2 Tagen erstarrte die Flüssigkeit bei dem Uebergießen zu einer krystallinischen Masse, einem Gemenge von Cuminamid und Cuminitryl.

Sättigt man, nach Cahours (2), eine alkoholische, mit etwas Ammoniak versetzte Lösung von Benzonitryl mit

Einwirkung
von Schwefel-
wasserstoff
auf
Benzonitryl.

(1) In der S. 588 angeführten Abhandlung. — (2) Compt. rend. XXVII, 239; J. pr. Chem. XLV, 354; Pharm. Centr. 1848, 780.

Einwirkung
von Schwefel-
wasserstoff
auf
Benzonitryl.

Schwefelwasserstoff und vermischt dann die auf $\frac{1}{4}$ verdampfte gelbbraune Flüssigkeit mit Wasser, so scheiden sich schwefelgelbe Flocken ab, die aus der heißen wässerigen Lösung in langen, atlasglänzenden Nadeln krystallisiren. Sie sind $C_{14}H_7NS_2$ oder Benzamid, in welchem der Sauerstoff durch Schwefel ersetzt ist. Behandelt man diesen Körper mit Quecksilberoxyd, so entsteht Wasser, Schwefelquecksilber und Benzonitryl; Kalium zersetzt ihn unter Bildung von Schwefel- und Cyankalium (1).

Anilid-
verbindun-
gen.


Gerhardt zeigte 1846, daß das Anilin sich dem Ammoniak auch insofern ähnlich verhält, als aus seinen Salzen Wasserstoff und Sauerstoff im Verhältniß wie im Wasser austreten können, unter Bildung von Verbindungen, welche den Amidverbindungen analog sind und als Anilidverbindungen bezeichnet wurden. Untersuchungen über hierher gehörige Verbindungen sind während der Jahre 1847 und 1848 namentlich von Laurent und von ihm gemeinschaftlich mit Gerhardt veröffentlicht worden.

Chlorcyananilid.

Laurent (2) fand, daß bei dem Zusammenbringen von gepulvertem festem Chlorcyan mit Anilin, etwas warmem Wasser und so viel Alkohol, als zur Auflösung des Anilins nöthig ist, sogleich weißes, in Wasser unlösliches, aus

(1) Cahours erörtert bei dieser Gelegenheit das Verhalten des Schwefelwasserstoffs zu stickstoffhaltigen Körpern im Allgemeinen. — Manchmal giebt er, unter Abscheidung von Schwefel, Wasserstoff an den Körper ab (Alloxan, blauer Indigo). — Oder es findet Abscheidung von Schwefel, Austreten von Wasser und Aufnahme von Wasserstoff statt (Bildung der organischen Basen und Amidsäuren aus Schwefelwasserstoff und neutralen oder sauren Körpern, die durch Substitution von Untersalpetersäure an die Stelle von Wasserstoff entstanden). — Oder es findet Bildung von Wasser, Austreten eines Theils von Stickstoff in der Form von Schwefelammonium und Bildung von schwefelhaltigen organischen Basen statt (Thialdin). — Oder es tritt aller Stickstoff als Schwefelammonium aus und es entstehen neutrale schwefelhaltige Körper (Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf die Hydramide). — Oder endlich der Schwefelwasserstoff verbindet sich direct (mit den Nitrylen) zu den Amidén correspondirenden Körpern. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXII, 97; J. pr. Chem. XLIV, 157; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 113.

heißem Alkohol in glänzenden Blättchen krystallisiren. Chlorcyananilid.
des *Chlorcyananilid* niederfällt. Seine Zusammensetzung ist $C_{30}H_{12}ClN_5$.



Seine Bildung ist somit der das Chlorcyanamids entsprechend. Das Chlorcyananilid ist nicht ohne Zersetzung flüchtig; beim Erhitzen wird es flüssig und erstarrt bei dem Erkalten krystallinisch; stärker erhitzt verliert es allmähig bis zu 11,8 pC. Salzsäure, und wird dabei weniger flüssig, blasig, dann fest und von ähnlichem Aussehen wie getrocknetes Albumin. Den durchsichtigen grünlichen Rückstand hält Laurent für $C_{30}H_{11}N_5$ (die Bildung dieser Verbindung setzt das Weggehen von 12,2 pC. Salzsäure voraus). — Chlorcyananilid löst sich langsam in kochender Kalilauge, und Salpetersäure fällt dann einen weissen, flockigen, in Ammoniak unlöslichen, in heisser verdünnter Salpetersäure löslichen Körper, welcher sich bei dem Erkalten letzterer Lösung gallertartig abscheidet; Laurent betrachtet diesen als $C_{30}H_{13}N_5O_2$ (die Analyse gab indeß für diese Formel 2 pC. Kohlenstoff zu wenig) und seine Bildung der des Ammelins aus dem Chlorcyanamid entsprechend.

Laurent giebt weiter an, daß nach Versuchen von ihm und Delbos Fluorsiliciumgas durch Anilin (40,5 durch 59,5) absorbiert wird, unter Bildung einer weissen, schwach gelblichen, Masse, welche mit Weingeist ausgekocht, ausgepresst und bei 100° getrocknet durch langsame Erhitzung zu einer leichten weissen Kruste sublimiert werden konnte. Es wurden in diesem Sublimat 39,5 pC. Kohlenstoff und 4,4 Wasserstoff gefunden; mit Bleioxyd gemengt, etwas befeuchtet und erwärmt, dann mit Salpetersäure befeuchtet und stark erhitzt brachte 1 des Sublimats eine Vermehrung des Gewichts des Bleioxyds um 0,422 hervor. Laurent hält dieses Sublimat für *Fluosilicanilid*, $C_{40}H_{38}N_4F_{11}Si_4O_6$, und seine Bildung durch die Wirkung des Wassers bei

Fluosilicanilid.

Fluosilicanilid.

der Behandlung mit wässerigem Weingeist für bedingt, macht aber selbst darauf aufmerksam, daß auch der noch nicht mit Weingeist behandelte (und nach ihm also noch nicht zu Fluosilicanilid umgewandelte) sublimirt. Das Fluosilicanilid löst sich wenig in kochendem Alkohol, und setzt sich aus dieser Lösung in kleinen sehr glänzenden Blättchen ab.

Laurent ergeht sich in dieser Abhandlung weiter in Betrachtungen über die Constitution und den chemischen Charakter dieser und ähnlicher Verbindungen, und in Vorschlägen für die Nomenclatur derselben.

Untersuchungen, welche Gerhardt und Laurent (1) gemeinschaftlich über die Anilidverbindungen ausführten, ergaben folgende Resultate.

Oxanilid.

Das dem Oxamid entsprechende Oxanilid (2) war bereits durch Gerhardt dargestellt worden. L. und G. suchten auch die der Oxaminsäure entsprechende Verbindung darzustellen, die *Oxanilsäure*. Letztere erhält man leicht, wenn man Anilin mit einem großen Ueberschuß von Oxalsäure schmilzt und während 8 bis 10 Minuten stark erhitzt; man kocht mit Wasser und filtrirt; aus dem Filtrat setzen sich gefärbte Krystalle von oxanils. Anilin ab, während Oxanilid auf dem Filter bleibt (die Mutterlauge enthält überschüssige Oxalsäure, eine gewisse Menge Oxanilsäure oder oxanils. Anilin und etwas Formanilid). Die zuerst sich absetzenden Krystalle sind braun gefärbt, und behalten diese Färbung selbst wenn sie 2- bis 3mal umkrystallisirt sind; um daraus reine Oxanilsäure darzustellen, kocht man sie mit Barytwasser, läßt erkalten, wascht den entstandenen

Oxanilsäure.

(1) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 163; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 15; im Ausz. Compt. rend. XXVII, 13. 165; Instit. 1848, 221; J. pharm. [8] XIV, 130; Pharm. Centr. 1849, 65. 81. — (2) Die zur Darstellung der Nitrile benutzte Methode (S. 594) hat A. W. Hofmann auch auf die Anilinsalze und das Anilin angewandt; von den hier erlangten Resultaten theilt er zunächst nur mit, daß das Oxanilid auf diese Art einen Körper liefert, welcher als ein mit dem Kohlenwasserstoff $C_{11}H_9$ gepaartes Cyan angesehen werden muß, (Ann. Ch. Pharm. LXV, 56.)

oxanils. Baryt mit kaltem Wasser und zersetzt ihn bei der Siedhitze mit einer genau zureichenden (ja nicht überschüssigen) Menge verdünnter Schwefelsäure, wo aus dem Filtrat bei dem Concentriren sich schöne Blätter von Oxanilsäure absetzen. Man kann auch die Krystalle von oxanils. Anilin in Ammoniak lösen, die Lösung in der Kälte mit Chlorbaryum zersetzen, und dann wie angegeben verfahren, oder oxanils. Kalk darstellen (durch Zusatz von Chlorcalcium zum Ammoniaksalz, Kochen und Krystallisirenlassen) und diesen durch Schwefelsäure, welcher Alkohol zugemischt ist, zersetzen. Man kann die Oxanilsäure nicht durch Fällung des Ammoniaksalzes mittelst einer Säure rein erhalten, weil sie dann immer etwas Ammoniak zurückhält. — Die krystallisirte Oxanilsäure ist $C_{10}H_7NO_6 (= C_{12}H_7N, HO, C_2O_3 + HO, C_2O_3 - 2HO, \text{zweifach-oxals. Anilin} - 2HO)$; sie ist wenig löslich in kaltem, leicht löslich in heissem Wasser und in Alkohol, die Lösung röthet stark Lackmus; die wässrige Lösung zersetzt sich nicht bei dem Kochen; concentrirte wässrige Kalilösung zersetzt die Säure nach und nach bei dem Kochen unter Freiwerden von Anilin (das Ammoniak bringt diese Einwirkung nicht hervor); Salzsäure und verdünnte Schwefelsäure bewirken bei dem Kochen mit der Säure das Freiwerden von Oxalsäure und die Bildung eines Anilinsalzes; erhitzt entwickelt die Oxanilsäure Wasser und ein Gemenge von Kohlensäure und Kohlenoxyd, während zugleich ganz reines Oxanilid sich bildet ($C_{10}H_7NO_6 = HO + CO + CO_2 + C_{14}H_6NO_2$). — Die oxanils. Salze sind mit den isatins. isomer; sie sind farblos; sie entwickeln, wie die isatins., bei dem Erhitzen mit Kalihydrat Anilin, und theilweise tritt dies schon ein bei dem Kochen derselben mit wässrigem Kali oder concentrirten Säuren. — *Einfach-oxanils. Ammoniak*, $NH_4O, C_{10}H_7NO_6$, wird leicht in schönen Blättern erhalten, welche der Oxanilsäure ähnlich aussehen, in kaltem Wasser oder Alkohol wenig, in heissem Wasser oder Alkohol sehr löslich sind; wird dieses Salz durch Salzsäure gefällt und umkrystal-

Oxanilsäure. lisirt, so erhält man in kaltem Wasser wenig lösliche Flittern von *zweifach-oxanils. Ammoniak*, $\text{NH}_4\text{O}, \text{HO}, 2\text{C}_{12}\text{H}_6\text{NO}_3$ (1). Beide Ammoniaksalze zersetzen sich bei dem Erhitzen (das einfach-saure bei etwa 190°) unter Entwicklung von Ammoniak, dann eines Gemenges von Kohlensäure und Kohlenoxyd so wie von etwas Anilin, und lassen einen Rückstand von Oxanilid. — *Zweifach-oxanils. Anilin*, $\text{C}_{12}\text{H}_6\text{N}, 2\text{HO}, 2\text{C}_{12}\text{H}_6\text{NO}_3$, auf die oben angegebene Art dargestellt, wird erst nach wiederholtem Umkrystallisiren farblos und in gewundenen und verfilzten, nicht glänzenden Nadeln erhalten, welche in kaltem Wasser wenig, in heißem sehr löslich sind und eine sehr saure Lösung geben; Zusatz von Salzsäure fällt nicht die Oxanilsäure, sondern immer krystallisirt wieder dieses saure Salz aus der Flüssigkeit; es zersetzt sich bei dem Erhitzen und giebt dabei Anilin und die Zersetzungsproducte der Oxanilsäure. — Aus oxanils. Ammoniak wird durch salpeters. Silberoxyd *oxanils. Silberoxyd* (der krystallinische weiße Niederschlag ist in kaltem Wasser fast unlöslich, in vielem heißem Wasser löslich, und aus dieser Lösung krystallisirt das Salz bei dem Erkalten in Blättern von unbestimmter Form), durch Chlorcalcium *oxanils. Kalk* (bei Anwendung nicht allzu verdünnter Lösungen; der Niederschlag krystallisirt bei dem Abkühlen einer kochend gesättigten Lösung in Büscheln), durch Chlorbaryum *oxanils. Baryt* (der Niederschlag krystallisirt auf dieselbe Art in glänzenden Blättchen, welche unter dem

(1) Laurent und Gerhardt finden in ihrer Abhandlung hier eine Gelegenheit, ihre schon früher ausgesprochene Ansicht zu wiederholen, daß bei der Einführung der Begriffe „einbasische und zweibasische Säuren“ bestimmte Kennzeichen dieser Säuren nicht aufgestellt worden seien. Sie selbst betrachten als solche, daß einbasische Säuren Amidsäuren und Aethersäuren nicht bilden, nicht zu Anhydriden (Säuren im s. g. wasserfreien Zustand) werden können, und nur neutrale Amide und Aether geben, und zwar solche Aether, von deren Dampf 1 Vol. die Elemente von 1 Vol. Alkoholdampf in sich enthält; daß hingegen die zweibasischen Säuren außer den neutralen Aethern und Amidn auch Aethersäuren und Amidsäuren bilden und Anhydride geben können, und daß 1 Vol. des Dampfes ihrer Aether die Elemente von 2 Vol. Alkoholdampf in sich enthält.

Mikroskop als Rhomben erscheinen) gefällt; alle drei Salze (das Kalksalz scharf getrocknet) sind nach der Formel MeO , $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{NO}_8$ zusammengesetzt.

Laurent und Gerhardt glauben, daß die von Wöhler Oxaluranilid. und Liebig bei der Untersuchung der Harnsäure erhaltene Oxalursäure den Amid- oder Anilidsäuren analog sei, insofern sie die Elemente von zweifach-oxals. Harnstoff — 2HO in sich enthalte, und bei dem Kochen in Harnstoff und Oxalsäure zerfalle; der Harnstoff würde hiernach dem Ammoniak und dem Anilin sich ähnlich verhalten können, und die aus ihm entstehenden, den Amid- oder Anilidverbindungen analogen Verbindungen ließen sich als Uridverbindungen bezeichnen; von der Parabansäure, welcher sie an und für sich den Charakter einer Säure absprechen, glauben sie, daß sie zu der Oxalursäure (in welche sie sich durch Aufnahme von Wasser verwandelt) sich verhalte wie das Camphorimid zu der Camphoramsäure. Eine Bestätigung dieser Ansicht finden sie in der raschen Bildung von *Oxaluranilid* durch Parabansäure. Fein gepulverte Parabansäure mit trockenem Anilin leicht erwärmt, bildete augenblicklich eine krystallinische Masse, ohne daß sich Wasser entwickelte; das Product wurde mit kochendem Alkohol behandelt (um etwa der Einwirkung entgangenes Anilin oder Parabansäure wegzunehmen), in welchem das Oxaluranilid nur sehr schwer löslich ist; gewaschen und getrocknet bildet dieses ein weißes, schwach perlmutterglänzendes krystallinisches Pulver, welches sich unter dem Mikroskop als aus Nadeln bestehend zeigt, und die Zusammensetzung $\text{C}_{18}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_8$ ($= \text{C}_{12}\text{H}_8\text{N} + \text{C}_6\text{H}_4\text{N}_2\text{O}_6$, Anilin + Parabansäure) hat. Das Oxaluranilid bildet sich auch, wenn man Anilin zu einer kochenden Lösung von Parabansäure setzt, wo es sich nach einigen Secunden in krystallinischen Flocken abscheidet; es ist geruch- und geschmacklos, unlöslich in kochendem Wasser und fast unlöslich in kochendem Alkohol, schmilzt bei dem Erhitzen und zersetzt sich bei noch höherer Temperatur unter Ausstofsung reizender Dämpfe,

Oxalanilid. in welchen man Blausäure erkennt; mit Kalihydrat schwach erwärmt entwickelt es Anilin und Ammoniak. In concentrirter Schwefelsäure vertheilt löst es sich leicht, und bei dem Erwärmen entwickelt die Mischung ohne sich zu schwärzen Kohlensäure und Kohlenoxyd; die rückständige Mischung giebt an feuchter Luft nach einiger Zeit Krystalle von zweifach-schwefels. Ammoniak, und die mit Wasser verdünnte Mutterlauge zeigt in Berührung mit Chromsäure die für die Sulfanilsäure charakteristische rothbraune Färbung.



**Succinanil u.
Succinanil-
säure.**

Ein Gemenge von Wasser, Bernsteinsäure und Anilin giebt leicht bernsteins. Anilin, welches in schönen, schwach rosenroth gefärbten, in Wasser und Alkohol leicht löslichen Nadeln (schiefen rectangulären Prismen) krystallisirt. Erhitzt man gepulverte Bernsteinsäure in einem Kolben mit trockenem Anilin, so schmilzt das Gemenge allmählig, und Wasser und überschüssig zugesetztes Anilin entweichen. War die Masse etwa 8 bis 10 Minuten im Schmelzen erhalten, so erstarrt sie bei dem Erkalten vollständig zu kugelförmig gruppirten Nadeln. Man behandelt dieses Product mit vielem kochendem Wasser, welches den gröfseren Theil desselben auflöst und bei dem Erkalten in farblosen Blättchen, *Succinanil*, absetzt; der bei der Behandlung mit vielem kochendem Wasser ungelöst zurückbleibende Theil ist *Succinanilid*. — Das Succinanil krystallisirt man aus Alkohol um, und erhält es dann in Form langer verfilzter Nadeln; es ist $\text{C}_{20}\text{H}_{10}\text{NO}_4 (= \text{C}_{12}\text{H}_8\text{N}_2\text{HO}, \text{C}_4\text{H}_2\text{O}_3 + \text{HO}, \text{C}_4\text{H}_2\text{O}_3 - 4\text{HO})$ zweifach - bernsteins. Anilin - 4 HO) und steht zu dem Anilin in derselben Beziehung wie d'Arcet's *Bisuccinamid* (Succinimid) zu dem Ammoniak; es schmilzt bei 155°, ist unlöslich in kaltem Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether; wässrige Kalilösung wirkt nicht auf es ein, mit festem Kalihydrat hingegen entwickelt es sogleich Anilin; es löst sich leicht in Salpetersäure und in Salzsäure; erhitzt

scheint es ohne Zersetzung zu sublimiren. Wässeriges kochendes Ammoniak löst es und verwandelt es dabei in *Succinanilsäure*; zur Darstellung der letztern löst man das Succinanil in verdünntem und kochendem Ammoniak, welchem etwas Alkohol zugesetzt ist, erhält das Kochen zum Verjagen des letztern und neutralisirt dann mit Salpetersäure. Bei dem Erkalten setzt sich die Succinanilsäure in länglichen Blättchen ab, welche man durch Umkrystallisiren aus Alkohol reinigt; ihre Zusammensetzung ist $C_{20}H_{11}NO_8$ (Succinanil + 2 HO); sie löst sich wenig in kaltem, mehr in heißem Wasser (die Lösung röthet Lackmus), leicht in Alkohol und in Aether; sie schmilzt bei 157° und erstarrt krystallinisch; stärker erhitzt zersetzt sie sich in Wasser und sublimirendes Succinanil. Sie löst sich leicht in Kali (mit Kali geschmolzen entwickelt sie Anilin) und in Ammoniak; das succinanils. Ammoniak krystallisirt undeutlich, und löst sich leicht in Wasser, welche Lösung durch Chlorkalcium nicht gefällt, durch Chlorbaryum kaum getrübt wird (wenn die Flüssigkeiten verdünnt sind, erfolgt kein Niederschlag; der succinanils. Baryt löst sich leicht in heißem Wasser), mit salpeters. Silberoxyd einen weissen, in Wasser unlöslichen Niederschlag von succinanils. Silberoxyd ($AgO, C_{20}H_{10}NO_8$), mit schwefels. Kupferoxyd einen hellblauen, mit schwefels. Eisenoxydul einen weißgelben giebt. Aus den löslichen succinanils. Salzen fällen die Mineralsäuren krystallinische Succinanilsäure. — Das *Succinanilid* (S. 602) löst sich leicht in kochendem Alkohol und setzt sich daraus in kleinen Nadeln ab; es ist $C_{16}H_8NO_2$ ($= C_{12}H_7N, HO, C_4H_2O_3 - 2 HO$, einfach - bernsteins. Anilin - 2 HO), schmilzt erst gegen 220° , löst sich nicht in Wasser aber leicht in Alkohol und in Aether, und entwickelt bei dem Schmelzen mit Kali sogleich Anilin.

Wird ein Gemenge von Wasser, Anilin und Korksäure erwärmt, so findet keine Einwirkung statt. Schmilzt man ein Gemenge ungefähr gleicher Volume trockenen Anilins und geschmolzener Korksäure, so entwickelt sich Wasser

Succinanil u.
Succinanil-
säure.

Succinanilid.

Suberanilid u.
Suberanil-
säure.

Suberanilid u.
Suberanil-
säure.

während die Säure sich löst. Man erhält das Gemenge während 10 Minuten bei einer dem Kochpunkt nahen Temperatur im Schmelzen, und gießt alsdann ein gleiches Volum Alkohol zu, welcher es sogleich löst; nach einigen Minuten gesteht die Flüssigkeit; man löst alles in kochendem Alkohol und läßt krystallisiren, wo sich perlmutterglänzende Schuppen von *Suberanilid* ausscheiden, welche Abscheidung man durch Zusatz von Wasser noch befördert; in der Flüssigkeit gelöst bleibt *Suberanilsäure*. Das Suberanilid zeigt unter dem Mikroskop Schuppen von rektangulärer Form; es ist in kaltem Alkohol wenig löslich, in Wasser unlöslich, in heißem Alkohol und Aether leicht löslich; seine Zusammensetzung ist $C_{20}H_{11}NO_2$ ($C_{12}H_7N$, HO , $C_8H_6O_3 - 2HO$, korks. Anilin $- 2HO$); es schmilzt bei 183° ; es wird nicht angegriffen durch Ammoniak und kochende Kalilösung; mit festem Kalihydrat geschmolzen entwickelt es sogleich Anilin; destillirt giebt es ein Oel, welches bei dem Erkalten fest wird, unter Hinterlassung eines leichten Rückstands von Kohle. — Die *Suberanilsäure* ist in der oben besprochenen alkoholischen Auflösung enthalten; man dampft diese ab, und nach dem Verjagen des Alkohols scheidet sich ein bräunliches Oel ab, welches bei dem Erkalten fest wird. Zur Reinigung löst man dieses in kochendem wässerigem Ammoniak, und fällt aus der Lösung durch Salzsäure farblose Suberanilsäure (aus kochender ammoniakalischer Lösung wird sie so als ein schwach gefärbtes, bei dem Erkalten fest werdendes, Oel abgeschieden). Sie bildet Blättchen, welche selbst unter dem Mikroskop keine regelmässige Form zeigen; ihre Zusammensetzung ist $C_{22}H_{10}NO_6$ ($= C_{12}H_7N, 2HO, 2C_8H_6O_3 - 2HO$, zweifach-korks. Anilin $- 2HO$); sie schmilzt bei 128° und erstarrt krystallinisch, löst sich in kaltem Wasser gar nicht, in heißem wenig (zu sauer reagirender Lösung), in Aether leicht; mit schmelzendem Kalihydrat entwickelt sie Anilin; bei der trockenen Destillation giebt sie eine dicke ölige Substanz, welche bei dem Erkalten theilweise fest wird und

worin Anilin enthalten ist (bei dem Behandeln dieser Sub-^{Suberanilid u. Suberanilsäure.}stanz mit Aether läßt dieser ein weißes Pulver, wahrscheinlich *Suberanil*, ungelöst zurück, welches in vielem kochendem Alkohol oder Aether sich löst und aus der Lösung krystallinisch ausscheidet, in kochender Kali- oder Ammoniaklösung unlöslich ist, und mit schmelzendem Kalihydrat Anilin entwickelt), und einen reichlichen Rückstand von Kohle. Die Suberanilsäure bildet mit Ammoniak ein Salz, welches in kleinen, in Wasser ziemlich löslichen Körnern krystallisirt, und dessen wässrige Lösung durch Chlorkalk nicht gefärbt wird; diese Lösung giebt mit salpetersaurem Silberoxyd einen weißen, in Wasser unlöslichen, am Licht sich violett färbenden Niederschlag von suberanils. Silberoxyd (AgO , $\text{C}_{28}\text{H}_{18}\text{NO}_5$), mit Chlorcalcium, Chlorbaryum und Bleisalzen einen weißen, mit Kupferoxydsalzen einen hellblauen, und mit schwefels. Eisenoxydul einen weißgelben Niederschlag.

Trockenes Anilin verhält sich zu Phtalsäure wie Am-^{Phtalanil und Phtalanilsäure.}moniak. Schmilzt man ein Gemenge von Phtalsäure und Anilin, so erstarrt die Masse bei dem Erkalten; man pulvert sie und behandelt sie zur Reinigung mit kochendem Alkohol, wobei *Phtalanil* (welches dem Phtalimid entspricht) als krystallinisches Pulver zurückbleibt; weiter noch kann man dieses reinigen, indem man es destillirt und das Destillat in kochendem Alkohol löst, aus welchem das Phtalanil in schönen Nadeln krystallisirt. Es ist $\text{C}_{28}\text{H}_8\text{NO}_4$ ($= \text{C}_{12}\text{H}_7\text{N}$, 2HO , $\text{C}_{16}\text{H}_4\text{O}_6 - 4 \text{HO}$, saures phtals. Anilin $- 4 \text{HO}$), schmilzt bei 203° , und sublimirt schon vor dem Schmelzen zu schönen Nadeln. Es löst sich nicht in Wasser und giebt mit schmelzendem Kalihydrat Anilin. Kocht man es mit wässrigem Ammoniak, welchem Alkohol zugesetzt ist, läßt noch einige Minuten nach vollendeter Auflösung sieden, und neutralisirt die noch heiße Flüssigkeit mit Salpetersäure, so scheidet sich beim Erkalten *Phtalanilsäure* in Blättchen ab; diese ist $\text{C}_{28}\text{H}_{11}\text{NO}_6$ (Phtalanil $+ 2 \text{HO}$), wenig löslich in kaltem, löslicher in heißem Wasser (die

Sulfo-
carbanilid.

Schwefelwasserstoff entwickelt ($C_{12}H_7N + CS_2 = C_{12}H_7NS + HS$). Laurent und Gerhardt erhielten diesen Körper auch durch Destillation eines Gemenges von Anilin, Schwefelcyankalium und Schwefelsäure, wo Sulfocarbanilid übergeht und schwefels. Ammoniak sich bildet (die Schwefelsäure setzt zunächst Schwefelcyanwasserstoff in Freiheit; $C_{12}H_7NS + 2 C_{12}H_7N = 2 C_{12}H_7NS + NH_3$); das Destillat wird zur Reinigung aus kochendem Alkohol umkrystallisirt.

Wird eine wässrige Lösung von Schwefelcyanwasserstoff und Anilin bis zu Syrupconsistenz abgedampft und mit kochendem Alkohol behandelt, so setzen sich bei dem Erkalten kleine in Wasser unlösliche Nadeln ab, welche in zu geringer Menge erhalten wurden, als daß sie genauer hätten untersucht werden können; erhitzt geben sie viel Ammoniak und ein festwerdendes Oel (Sulfocarbanilid) unter Zurücklassung von wenig Kohle. — Eine Mischung von Anilin und Alkohol löst Ueberschwefelcyanwasserstoffsäure in der Wärme nicht auf; wenn aber trockenes Anilin mit dieser Säure erhitzt wird, so schmilzt die ganze Masse und gesteht dann bei dem Erkalten krystallinisch. Das Product ist unlöslich in Wasser, löslich in kochendem Alkohol oder Aether; es ist ein Gemenge von Schwefel und einer eigenthümlichen, schwer zu reinigenden Substanz. Durch Kochen mit schwach alkalischem Wasser, Filtriren und Neutralisiren mit Salzsäure wird letztere, nicht ganz frei von einer Beimengung von Schwefel, abgeschieden, und kann durch Erkalten einer Lösung in kochendem Alkohol in Flittern krystallisirt erhalten werden; auch in Aether ist diese, nicht näher untersuchte, Substanz löslich.

Laurent und Gerhardt schlossen ihre Untersuchung mit allgemeinen Betrachtungen über die Entstehung und die Eigenschaften der Anilidverbindungen, deren Zusammensetzung sie als eine neue Stütze der von Gerhardt aufgestellten Ansicht (1) über das Sättigungsvermögen

(1) Der Begriff „gepaarte Verbindungen“ ist in die Wissenschaft durch die Erkenntniß eingeführt worden, daß bei der Verbindung zweier

gepaarter Verbindungen betrachten, und mit einer vergleichenden Uebersicht der entsprechenden Anilide, Amide und Aether.

Anilin erhitzt sich mit Chlorcinnamyl (S. 535) stark, Cinnanilid.
und liefert eine leicht schmelzbare, flüchtige, aus Alkohol

Substanzen die chemischen Eigenschaften derselben sich nicht immer gegenseitig aufheben, sondern, daß der chemische Charakter der einen noch in der Verbindung hervortreten kann. Laurent und Gerhardt glauben, daß dieser Begriff nur nach ihrer Auffassung ein bestimmter und unzweideutiger sei, und diese Auffassung geht dahin, gepaarte Verbindungen seien diejenigen, welche entstehen durch directe Vereinigung zweier Substanzen unter Ausscheidung der Elemente des Wassers, und welche diese beiden Substanzen wieder hervorbringen können, wenn die Elemente des Wassers wieder fixirt werden; solche Verbindungen seien die Amide, die Anilide und die Aetherarten. Diese Definition umfaßt indeß nicht den Begriff so, wie ihn die Wissenschaft auffaßt, sondern sie ist lediglich eine Formulirung des Vorgangs der Bildung oder Zersetzung vieler gepaarter Verbindungen. Die Eigenschaften der neu entstehenden Verbindungen suchen Laurent und Gerhardt folgendermaßen durch eine allgemeine Formel auszudrücken. Das Sättigungsvermögen oder die Basicität (d. h. die Anzahl Aequiv. Basis, welche 1 Aequiv. der Verbindung sättigt), B , der eben genannten Verbindungen sei ausgedrückt — wenn b und b' die Basicität der beiden Substanzen vor der Verbindung, 0 die Basicität eines neutralen Körpers, 1, 2, 3 die einer ein-, zwei-, dreibasischen Säure bedeutet — durch $B = b + b' - 1$, welcher Ausdruck besage, daß eine einbasische Säure nur neutrale Aetherarten, Amide und Anilide gebe, die zweibasischen Säuren hingegen einbasische Aether-, Amid- und Anilidsäuren. — Strecker (Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 47; im Ausz. Pharm. Centr. 1849, 85) suchte zu zeigen, daß Laurent und Gerhardt's Definition der gepaarten Verbindungen nicht einmal alle die umfasse, welche diese Chemiker selbst als gepaarte betrachteten, und daß sie auch solche Körper einschliesse, welche sie nicht als gepaarte betrachten. Ferner, daß für mehrere gepaarte Verbindungen, zu deren Bildung sich mehrere Aequiv. einer Substanz mit Einem einer andern vereinigen, die oben angegebene Formel, wenn unmittelbar angewandt, unrichtige Resultate giebt, und mit der Erfahrung übereinstimmende Resultate nur dann, wenn man sich die gepaarte Verbindung nicht auf einmal, sondern successive gebildet denkt (indem mit dem 1 Aequiv. der einen Substanz 1 Aequiv. der andern, mit der entstehenden Verbindung wieder 1 Aequiv. der letztern u. s. f. sich vereinigt); daß aber bei mehreren Verbindungen, für welche die Annahme einer solchen successiven Bildung unzulässig ist (Phtalanil, Succinimid u. a.), die berechnete Basicität mit der Erfahrung nicht übereinstimme. Er selbst schlug als Ausdruck der Basicität B einer gepaarten Verbindung die Formel

in Nadeln krystallisirbare Substanz, die nach Cahours (1) *Cinnanilid* = $C_{30}H_{13}NO_2$ ist. Es zersetzt sich bei der Destillation mit Kalihydrat zu Zimmtsäure und Anilin. — Das *Cumanilid* stellte Cahours, wie das vorhergehende, durch Zusammenbringen von Chlorcumyl (S. 534) mit Anilin dar; es bildet lange, der Benzoësäure ähnliche, in Alkohol schwerlösliche Nadeln, und ist $C_{20}H_{11}NO_2$. — *Anisanilid*, $C_{28}H_{13}NO_4$, wurde von Cahours aus Chloranisyl (S. 538) und Anilin in sublimirbaren, weissen, glänzenden Nadeln erhalten.

Amidartige
Verbindungen
des Naphtalidams.

Naphthalidam-
Carbamid.

Die vorhergehenden Untersuchungen dienen zur Bestätigung dafür, daß das Anilin dem Ammoniak analog Verbindungen bilden kann, welche man als aus Anilinsalzen durch Ausscheidung von Wasserstoff und Sauerstoff als Wasser entstanden betrachten kann. Delbos (2) hat angegeben, daß auch das Naphtalidam entsprechende Verbindungen bilden kann. — Wird neutrales oxals. Naphtalidam der trocknen Destillation unterworfen, so schmilzt es unter Verlust von Krystallisationswasser, und fast zugleich beginnt eine Zersetzung, indem die geschmolzene Masse sich aufbläht und Wasser, Kohlenoxyd und Kohlensäure entweichen; bei verstärkter Hitze destillirt ein Gemenge von Naphtalidam und einer neuen Verbindung, *Naphtalidam-Carbamid*. Rein wird diese erhalten, wenn man das Destillat

$B = b + b' - \frac{n}{2}$ vor, wo n die Anzahl der bei Bildung der Verbindung austretenden Wasseratome bedeutet, und führte für die Gültigkeit dieser Formel viele Beispiele an. — Gerhardt (in seinen und Laurent's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 76) hat hierauf zu zeigen gesucht, wie die Folgerungen aus seiner Definition der gepaarten Verbindungen durch die Erfahrung nicht immer oder nur theilweise bestätigt zu werden brauchen, daß ferner Verbindungen, für welche seine Formulirung nicht passe (wie z. B. die Mandelsäure), auch nicht als gepaarte in seinem Sinn betrachtet werden dürfen, und daß das von Strecker aufgestellte Basicitätsgesetz in seinen Resultaten ganz mit dem Gerhardt'schen (letzteres in der von Strecker hervorgehobenen Weise angewandt) übereinstimme (er spricht nicht von den Fällen, von welchen Strecker hervorgehoben hatte, daß diese Art der Anwendung für sie unzulässig sei). — (1) In der S. 363 angeführten Abhandlung. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXI, 68; Compt. rend. XXIV, 1091; J. pharm. [3] XII, 237; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 370; J. pr. Chem. XLII, 244; Pharm. Centr. 1847, 637.

anhaltend mit Alkohol kocht, wo sie ungelöst zurückbleibt. (Noch besser ist es, zweifach-oxals. Naphtalidam bis zum gänzlichen Schmelzen zu erhitzen, und dann wie eben angegeben zu reinigen.) Das Naphtalidam-Carbamid ist ein leichter weißer Körper, welcher am Licht bald roth wird; es destillirt über 300° unter theilweiser Zersetzung und Verkohlung; es ist unlöslich in Wasser und sehr wenig löslich in kochendem Alkohol, aus welcher Lösung es sich bei dem Erkalten als ein weißes, aus mikroskopischen Nadeln bestehendes Pulver absetzt. Seine Zusammensetzung ist $C_{21}H_8NO$, seine Entstehung ausgedrückt durch die Formel $C_{20}H_8N, HO, C_2O_3 = C_{21}H_8NO + 2HO + CO$ (die Bildung von Kohlensäure ist eine secundäre). Eine alkoholische Kalilösung löst es ohne Zersetzung, und Wasser schlägt es aus dieser Lösung wieder nieder; verdünnte Säuren wirken nicht auf es ein. — Bei Einwirkung von Schwefelkohlenstoff auf eine Lösung von Naphtalidam in absolutem Alkohol bekleiden sich nach einem oder zwei Tagen die Wandungen des Gefäßes mit dendritenförmigen krystallinischen Aggregaten einer weißen Substanz; einige Tage später schwärzt sich das Gemenge, und die Mutterlauge enthält dann schwefelwasserstoff's. Naphtalidam. Bei Anwendung sehr verdünnter Lösungen von Naphtalidam und Schwefelkohlenstoff in absolutem Alkohol setzt sich die krystallinische Verbindung in glänzenden farblosen Nadeln ab, welche man durch Waschen mit heißem Alkohol reinigt. Delbos betrachtet sie als zusammengesetzt nach der Formel $C_{21}H_8NS$, und bezeichnet sie als *Schwefel-Naphtalidam-Carbamid* (seine Analyse stimmt indefs nicht ganz mit der Formel überein); für ihre Entstehung giebt er das Schema $C_{20}H_8N + CS_2 = C_{21}H_8NS + HS$. Sie ist unlöslich in Wasser und in Alkohol, wird von verdünnten Säuren nicht angegriffen, und zersetzt sich bei dem Erhitzen; mit alkoholischer Kalilösung gekocht wird sie zu Naphtalidam-Carbamid.

Naphtha-
lidam-
Carbamid.

Schwefel-
Naphtha-
lidam-
Carbamid.

Organische
Basen.
Nicotin.

Schloesing (1) hält folgende Methode zur Darstellung des Nicotins für die beste. Das wässerige, bis zur Extractdicke concentrirte Decoct des Tabaks wird, noch heiß, mit dem doppelten Vol. Alkohol geschüttelt, die in der Ruhe sich abscheidende obere, dünnflüssigere Schicht von der unteren, zum großen Theil aus äpfelsaurem Kalk bestehenden durch Decantiren getrennt, der Weingeist abdestillirt und der syrupartige Rückstand von Neuem in gleicher Weise mit Alkohol behandelt. Der alles Nicotin enthaltende, vom Weingeist befreite Auszug wird, noch etwas warm, mit concentrirter Kalilauge und nach dem Erkalten mit Aether geschüttelt, welcher das Nicotin nebst gelbfärbenden Materien aufnimmt. Aus der ätherischen Lösung fällt man das Nicotin durch gepulverte Oxalsäure als oxalsaures, eine syrupartige Masse bildendes Salz, das man, nach wiederholtem Waschen mit Aether, zuerst mit Kalilauge, dann mit Aether schüttelt und letzteren im Wasserbade abdestillirt. Der Rückstand wird dann durch tagelanges Erwärmen in einem Strom von trockenem Wasserstoffgas auf 140° von allem Aether, Wasser und Ammoniak befreit und zuletzt bei 180° destillirt, wo das Nicotin farblos und rein übergeht.

S. hat auch den Nicotingehalt mehrerer französischen und amerikanischen Tabaksorten ausgemittelt. Es enthalten nach ihm 100 Th. trockner entrippter Tabak aus :

	Nicotin		Nicotin
dem Dep. Lot . . .	7,96	dem Elsaßs	3,21
„ Lot-et-Garonne .	7,34	Virginien	6,87
„ Nord	6,58	Kentucky	6,09
„ Ille-et-Vilaine .	6,29	Maryland	2,29
„ Pas-de-Calais .	4,94	Havannah weniger als	2,0

Trockner Schnupftabak enthält noch 2 pC. Nicotin; durchschnittlich sind im nicht getrockneten 33 pC. Wasser, was den Nicotingehalt auf 1,36 pC. herabdrückt. Die Tabaksblätter enthalten das Nicotin in Form eines Salzes,

(1) Ann. ch. phys. [3] XIX, 280; Pharm. Centr. 1847, 171.

denn ihre wässerigen Auszüge reagiren sauer und reiner Aether entzieht ihnen nur sehr wenig von der Base. Im Schnupftabak ist das Nicotin theils frei, theils als neutrales oder basisches (wahrscheinlich essigsaures) Salz vorhanden; das Ammoniak ist darin ebenfalls an eine Säure gebunden; beiden Salzen verdankt der Tabak seine reizende Wirkung auf die Nasenschleimhaut. — Die Methode, nach welcher S. das Nicotin im Tabak bestimmt, ist sehr einfach und nach seinen Versuchen auch zuverlässig.

Nicotin.

In einem Aetherextractionsapparate, ähnlich den von Payen und Mohr (Lehrb. der pharm. Technik, S. 109) beschriebenen, mit etwa $\frac{1}{2}$ Liter fassendem, tubulirtem Ballon, werden 10 Grm. Tabakspulver von bekanntem Feuchtigkeitsgehalte mit ammoniakhaltigem Aether erschöpft, das Ammoniak von dem Aether durch Kochen entfernt, der Aether in einer Schale an der Luft verdunstet und der gefärbte Rückstand, in welchem sich eine weiche harzartige Substanz abscheidet, mit Schwefelsäure von bekanntem Gehalt sorgfältig neutralisirt. Aus der Quantität A der verbrauchten Schwefelsäure (SO_3) berechnet man die Menge B des Nicotins ($\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{N}_2$) nach der Formel $40 : 162 = A : B$.

Das Nicotin ist von Schloesing und von Barral (1) mit gleichem Resultate, wie früher von Melsens analysirt worden. Sie stellen die Formel $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{N}_2$ fest.

	Melsens	Schloesing	Barral	$\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{N}_2$
C	74,3	73,77 — 73,40	73,69	74,08
H	8,8	8,62 — 8,89	8,86	8,64
N	17,3	— —	17,04	17,28

Durch Bestimmung der Quantität Schwefelsäure, die zur völligen Neutralisation des Nicotins nothwendig ist, so wie der Menge von kohlens. Kalk und kohlens. Baryt, die aus einem mit Nicotin versetzten Kalk- oder Barytsalz durch Kohlensäure ausgefällt wird, erhielt S. Zahlen, welche

(1) Ann. ch. phys. [3] XX, 345; Compt. rend. XXIV, 818; J. pr. Chem. XLI, 466; Pharm. Centr. 1847, 622.

Nicotin. für die Formel $C_{20}H_{14}N_2$ sprechen; die Analyse des Platindoppelsalzes führte zur Formel $C_{10}H_7N$. Um diese Frage der Entscheidung näher zu bringen, hat Barral das spec. Gew. des Nicotindampfs bestimmt und dasselbe = 5,607 und 5,630 gefunden. Die Rechnung nach der nur 2 Vol. Dampf entsprechenden Formel $C_{10}H_7N$ giebt 5,578. B. hält es für entschieden, daß das Aeq. des Nicotins, wie das des Ammoniaks und Anilins, 4 Vol. entspricht, also durch die Formel $C_{20}H_{14}N_2$ ausgedrückt wird.

Das Nicotin absorbirt aus der Luft die Feuchtigkeit so schnell, daß es davon, nach Schloesing, in einem Tag $\frac{1}{10}$ seines Gewichts, nach Barral in 3 Wochen 177 pC. aufnimmt; in einer trocknen Atmosphäre giebt es dieselbe wieder völlig ab.

Das spec. Gew. des Nicotins ist, nach Barral, bei 4° = 1,033; bei 15° = 1,027; bei 30° = 1,018; bei 50° = 1,0006; bei 101°,5 = 0,9424. 100 Nicotin lösen bei 100° unter dunkelbrauner Färbung 10,58 Schwefel; Phosphor ist darin unlöslich. — Von Chlor wird es unter Bildung von Salzsäure und einer blutrothen, im Sonnenlicht farblos werdenden Flüssigkeit zersetzt, welche unter 8° in Nadeln krystallisirt und auf Wasserzusatz einen weißen Körper abscheidet.

Nicotin und
Platinchlorür.

Trägt man, nach Raewsky (1), Nicotin nach und nach in eine lauwarme, saure Lösung von Platinchlorür, unter Umschütteln und Vermeidung zu starker Erhitzung, so scheidet sich eine orangegelbe, krystallinische Verbindung (a) ab. Die davon abgegossene Mutterlauge liefert beim Verdampfen eine in geraden Prismen anschließende rothe Verbindung (b). Diese letztere entsteht auch durch Auflösen der orangegelben in der Mutterlauge und Verdunsten im leeren Raum. — a) *Orangegelbes Nicotinplatinchlorür*, $PtCl$, $C_{10}H_7N$, 2 HCl. Es ist unlöslich in kaltem, löslich

(1) Ann. ch. phys. [3] XXV, 332; J. pr. Chem. XLVI, 470; im Ausz. Compt. rend. XXVII, 609; Pharm. Centr. 1849, 60. 329.

in heißem Wasser, wie auch in Salz- und Salpetersäure und daraus wieder, ohne Aenderung der Zusammensetzung, krystallisirbar; aus Salzsäure setzt es sich in prachtvollen orangegelben rhombischen Prismen, aus Salpetersäure in kleinen gelben Krystallen ab. Beim Behandeln mit heißem Wasser bleibt ein amorpher Rückstand, welcher ebenfalls, wie die von R. ausgeführte Analyse zeigte, nach obiger Formel zusammengesetzt ist. In Nicotin löst es sich völlig mit dunkelrother Farbe; die Lösung bildet durch Verdunstung eine zerfließliche, gallertartige, mit Wasser, Alkohol, Aether und Säuren mischbare Masse, die nicht krystallinisch wird. Mit Vitriolöl wird es weifs. — b) *Rothes Nicotinplatinchlorür*, PtCl , $\text{C}_{10}\text{H}_7\text{N}$, HCl . Es ist wenig in kaltem, leichter in heißem Wasser löslich und daraus in blafsgelben Schuppen sich absetzend, die mit der rothen Modification gleich zusammengesetzt sind. In Alkohol und Aether ist es unlöslich, in Salz- und Salpetersäure löslich, von letzterer in der Hitze zersetzbar. Vitriolöl färbt es braun.

Nicotin und
Platinchlorür.

Laurent (1) stellt für das Chinin die Formel $\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}_4$ auf; sie verlangt 43,4 Kohlenstoff, 7,1 Wasserstoff; gefunden 43,27 bis 73,54 Kohlenstoff und 7,14 bis 7,07 Wasserstoff. Das Chininplatinchlorid = $\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}_4$, 2 HO, 2 HCl + 2 PtCl₂ verlangt 26,5 pC. Platin (gefunden wurden von Laurent 26,4; von Liebig 26,4 — 26,5 — 26,6; von Gerhardt 26,3) und 29,6 Chlor (gefunden von Gerhardt 29,5).

Chinin.

Winckler (2) zeigte, daß unterschwefligs. Natron mit salzs. Chinin einen flockigen, in kaltem Wasser unlöslichen Niederschlag hervorbringt; derselbe krystallisirt aus der alkoholischen Lösung in Nadeln, die bei 100°, unter Verlust von Krystallwasser, zu einem stark elektrischen Pulver zerfallen. C. M. Wetherill (3) hat für dieses Salz die Formel $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}_4$, S_2O_2 , HO aufgestellt, wonach das

Unter-
schwefligsaures
Chinin.

(1) Ann. ch. phys. [3] XIX, 363; Ann. Ch. Pharm. LXII, 95; Compt. rend. XXIV, 219; J. pr. Chem. XL, 400; Pharm. Centr. 1847, 381. — (2) Jahrb. pr. Pharm. XV, 281. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 150; Pharm. Centr. 1848, 814.

Chinin 2 Aequiv. Wasserstoff mehr enthielte, als Laurent annimmt. W. fand 6,65 bis 6,79 pC. Wasserstoff; obige Formel verlangt 6,77 pC., die Rechnung nach $C_{3,6}H_{2,2}N_2O_4$, S_2O_2 , HO dagegen 6,27 pC., was für letztere spricht, da dann die Wasserstoffbestimmung mit dem gewöhnlichen Fehler behaftet ist.

Phosphorsäure
Chinin.

Durch Auflösen von Chinin in warmer Phosphorsäure erhielt Anderson (1) ein in zarten, seidenglänzenden Nadeln krystallisiertes, gegen Pflanzenfarben neutrales Salz, das ihm bei der Analyse 61,85 pC. Kohlenstoff und 6,81 Wasserstoff gab. Er hält es für ein phosphors. Salz mit 3 Aeq. Chinin, $3 C_{20}H_{12}NO_2$, $3 HO, PO_3$ (bei 100°). Bei 121° verlor das Salz einmal 7,85 pC., von einer anderen Bereitung 15,3 pC. Wasser, was auf die Existenz zweier Salze deutet. — A. hat die Phosphorsäure nicht bestimmt, weshalb es noch zweifelhaft bleibt, ob das Salz wirklich 3 Aequiv. Chinin enthält. Mit Zugrundelegung der Laurent'schen Formel stimmt am nächsten $3 C_{1,9}H_{1,1}NO_2, PO_3$; sie verlangt 61,8 pC. Kohlenstoff und 6,2 Wasserstoff.

Schwefel-
blausäure
Chinin.

Schwefelblausäure bildet nach Dollfus (2) mit Chinin zwei Salze, ein weißes und ein gelbes, harzartig zusammenbackendes, die immer mit einander krystallisiren.

Ferro- und
Ferricyan-
wasserstoffs-
Chinin.

Beim Vermischen alkoholischer Lösungen von Ferro- cyanwasserstoffsäure und Chinin erhält man einen orangegelben krystallinischen Niederschlag, der nach Dollfus in 100 Th. 52,9 Kohlenstoff, 6,0 Wasserstoff und 9,1 Eisen enthält. D. entwickelt daraus die Formel $C_{2,0}H_{1,2}NO_2$, $Cfy, H_2 + 3 HO$; sie verlangt 52,5 Kohlenstoff, 5,7 Wasserstoff und 9,4 Eisen. Legt man der Zusammensetzung dieser Verbindung, welcher ihrer leichten Zersetzbarkeit halber kein Stimmrecht über die Formel des Chinins zuerkannt werden darf, die obige von Laurent aufgestellte Chininformel zu Grunde, so erhält man, als am nächsten mit dem Versuch übereinkommend, $C_{3,6}H_{2,2}N_2O_4$, $2 Cfy, 4 H + 4 HO$. Sie

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 55 (vergl. bei Strychnin). — (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 215. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXV, 224.

verlangt 53,2 Kohlenstoff, 5,3 Wasserstoff und 9,9 Eisen. — Mit Ferridcyankalium erzeugt salzs. Chinin einen krystallinischen, dem Musivgold sehr ähnlichen Niederschlag, der nach D. 54,6 Kohlenstoff, 5,4 Wasserstoff und 9,8 Eisen enthält.

Stresemann (1) hat eine Verfälschung des schwefels. Chinins mit 30 bis 40 pC. Salicin, Sckeyde (2) mit 10 bis 18 pC. Milhzucker, Winckler (3) mit 40 pC. kohlenst. Kalk beobachtet.

Chinin-Verfälschung.

Spatzier (4) empfiehlt neuerdings die von Alms 1832 untersuchte und als Heilmittel gegen Wechselfieber gerühmte *Variolaria amara* Ach. (*Persutaria communis* DC.) der Beachtung als Chininsurrogat. Knop (5) erinnert bei dieser Gelegenheit an die möglichen Heilkräfte der sehr bitteren Salze der Cetrar- und Stiktinsäure, welche dem von Alms aus der *V. amara* erhaltenen Picrolichenin wahrscheinlich sehr nahe stehen. — Winckler (6) macht wiederholt auf das gereinigte Chinoidin und auch auf das Chinidin und Cinchonin aufmerksam, welches letztere nach dem Zeugniß ausgezeichneter Aerzte als Salz seine fieberwidrige Kraft nie versage. Auch das Bebeerin sei als Chininsurrogat beachtenswerth.

Chinin-Surrogate.

Laurent (7) hat auch die Formel des Cinchonins einer Aenderung unterworfen, die dasselbe dem Chinin wieder anreicht. Es ist darnach $C_{38}H_{21}N_2O_2$ (berechnet 77,55 Kohlenstoff, 7,48 Wasserstoff; gefunden 77,22 — 77,36 Kohlenstoff und 7,47 — 7,51 Wasserstoff). Damit stimmen auch die von Regnault für das schwefels., jods. und salpeters. Cinchonin erhaltenen Zahlen, so wie die nachstehend angeführten Untersuchungen anderer Cinchoninverbindungen. Das Platindoppelsalz ist $C_{38}H_{21}N_2O_2 \cdot 2HCl, 2PtCl_2 + 2HO$

Cinchonin.

(1) Arch. Pharm. [2] LII, 151; Pharm. Centr. 1847, 911. — (2) Arch. Pharm. [2] LVI, 171. — (3) Repert. Pharm. [2] XLVII, 403; Jahrb. pr. Pharm. XV, 165. — (4) Arch. Pharm. [2] LVI, 166. — (5) Pharm. Centr. 1848, 943. — (6) Jahrb. pr. Pharm. XVII, 83; Pharm. Centr. 1848, 862. — (7) Ann. ch. phys. [3] XIX, 365 (andere Citate vgl. S. 615).

(berechnet 27,26, gefunden 27,2 bis 27,3 Platin). Es verliert die beiden Wasseratome bei 140°.

Salzsaures
Cinchonin.

Aus einer etwas überschüssige Säure enthaltenden Lösung in wässrigem Alkohol krystallisirt salzsaures Cinchonin, nach Laurent (1), bei langsamer Verdunstung in Tafeln mit rhombischer Basis, deren spitze Winkel abgestumpft sind. Die Analyse entsprach genau der Formel $C_{38}H_{22}N_2O_2, 2 HCl$. Es röthet Lackmus, löst sich leicht in Wasser, weniger in Alkohol.

Schwefel-
blausaures
Cinchonin.

Durch die Analyse des in glänzenden Nadeln krystallisirenden schwefelblaus. Cinchonins hat Dollfus (2) die Laurent'sche Cinchoninformel bestätigt. Er fand in 100 Th. 67,86 Kohlenstoff und 6,63 Wasserstoff. Die Rechnung nach $C_{38}H_{22}N_2O_2, C_2NS_2, H$ verlangt 67,9 Kohlenstoff und 6,5 Wasserstoff; das Atomgewicht des Cinchonins ist darnach = 294. D. fand 289.

Ferro- und
Ferricyan-
wasserstoffs.
Cinchonin.

Dollfus (3) hat auch das ferro- und das ferricyanwasserstoffs. Cinchonin der Analyse unterworfen, mit Resultaten, die ebenfalls der Laurent'schen Formel der Base entsprechen. Das ferrocyanwasserstoffs. Cinchonin ist $C_{38}H_{22}N_2O_2, 2 Cfy, H_4 + 4 HO$, das ferricyanwasserstoffs. Salz $C_{38}H_{22}N_2O_2, 2 Cfy, H_8 + 4 HO$. — Beide sind gelbe, krystallinische Niederschläge, die für sich oder in wässriger Lösung beim Erhitzen in Blausäure und einen sich bläuenden Rückstand zerfallen. Gegen Eisenoxydul- und Oxydsalze verhalten sie sich wie die entsprechenden Kaliumverbindungen.

Chlor-
und Brom-
Cinchonin.

Beim Einleiten von Chlor in eine warme, concentrirte Lösung von salzs. Cinchonin setzt sich, nach Laurent (4), ein schweres krystallinisches Pulver ab, das durch Umkrystallisiren aus kochendem Wasser reines salzs. Chlorcinchonin, $C_{38}H_{20}Cl_2N_2O_2, 2 HCl$, darstellt. Es ist (wie

(1) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 302; Ann. Ch. Pharm. LXIX, 9. —

(2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 222. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXV, 225. —

(4) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 302; Ann. Ch. Pharm. LXIX, 9; J. pharm. [8] XIV, 456.

auch die folgenden entsprechenden Verbindungen) mit dem salzs. Cinchonin isomorph, in Wasser nur wenig, in 50 Th. Alkohol löslich. Das durch Ammoniak aus diesem Salz gefällte Chlorcinchonin, $C_{38}H_{20}Cl_2N_2O_2$ (berechnet 19,5, gefunden 18,9 Chlor) ist krystallisirbar und liefert, mit Kali destillirt, chlorfreies Chinolin. Das Platindoppelsalz, $C_{38}H_{20}Cl_2N_2O_2 \cdot 2HCl \cdot 2PtCl_2 + 2HO$, ist ein blafs gelbes Pulver. Das bromwasserstoffs. Chlorcinchonin, $C_{38}H_{20}Cl_2N_2O_2 \cdot 2HBr$, ist schwer löslich. Durch Behandlung von salzs. Cinchonin mit Brom erhielt L. ein Gemenge zweier Verbindungen mit verschiedenem Bromgehalt. Die eine, deren salzs. Salz in Alkohol löslich ist, ist $C_{38}H_{21}BrN_2O_2$; die andere, von L. Anderthalb-Bromcinchonin genannte, ist wahrscheinlich ein Gemenge der ersteren mit zweifach Bromcinchonin, $C_{38}H_{20}Br_2N_2O_2$, das als isomorphe Verbindung damit krystallisirt, ohne sich zu theilen. Die Analyse gab die Formel $C_{38}H_{41}Br_3N_2O_2$, womit auch die des salzs. und des Platindoppelsalzes übereinstimmt. L. erwähnt ferner eines chlorbromwasserstoffs. Bromcinchonins $C_{38}H_{41}Br_3N_2O_2 \cdot 2HCl \cdot 2HBr$, das beim Uebergießen von salzs. Cinchonin mit Brom entsteht. Die Form der im Vorstehenden aufgezählten isomorphen Verbindungen ist ein gerades rhombisches Prisma ∞P , durch Vorherrschen der Endfläche OP zur Tafel verkürzt; die schärferen Kanten des Prismas sind durch je zwei sich in Punkten berührende Flächen von $\check{P}\infty$ ersetzt. Laurent mafs die Winkel

	$\infty P : \infty P$	$\check{P} \infty : 0 P$
bei $C_{38}H_{21}N_2O_2 \cdot 2HCl$	101°	137 — 138°
" $C_{38}H_{20}Cl_2N_2O_2 \cdot 2HCl$	106	136½ — 137½
" $C_{38}H_{20}Cl_2N_2O_2 \cdot 2HBr$	104	137
" $C_{38}H_{41}Br_3N_2O_2 \cdot 2HCl$	107 — 108	

Winckler (1) hat gezeigt, dafs das Cinchonin beim Erhitzen mit überschüssiger concentrirter Schwefelsäure

(1) Jahrb. pr. Pharm. XV, 281; Repert. Pharm. [2] XLVIII, 391; Pharm. Centr. 1847, 815. 905.

seine Krystallisationsfähigkeit verliert und ganz die Eigenschaften des von ihm schon früher aus käuflichem Chinoidin dargestellten amorphen Cinchonins annimmt. Die salzs. Lösung von amorphem Chinin und Cinchonin wird von unterschwefligs. Natron nicht gefällt, während die der krystallinischen Basen davon sogleich krystallinisch gefällt werden.

Nach Roder's (1) Angabe wäre das Chinoidin eine Verbindung von Chinin und Cinchonin, in krystallinischem Zustande, mit einem Harze, das man durch Behandlung der weingeistigen Lösung mit Zinnchlorür davon trennen könne. Winckler (2) wies jedoch nach, daß reines amorphes Chinin auch bei Behandlung mit Zinnchlorür amorph bleibt, und daß die von R. erhaltene krystallinische Base in dem von ihm angewendeten Chinoidin vorhanden war, was bei dem käuflichen Producte stets der Fall ist.

Chinidin.

In einer Chinarinde, die genau so verpackt wie *China regia* im Handel vorkommt, aber in ihrem Aeußeren die größte Aehnlichkeit mit *China Huamakes* zeigt, hat Winckler (3) eine neue organische Base, das *Chinidin*, aufgefunden. Es ist dieselbe, die nach seiner Beobachtung bisweilen dem käuflichen schwefels. Chinin beigemengt ist. Aus einer größeren Quantität rohen Chinidins, das von Zimmer bei der fabrikmässigen Gewinnung des Chinins erhalten worden war und im Wesentlichen aus Chinin und der neuen Base bestand, entfernte W. durch Behandlung mit Aether das Chinin nebst gelber harzartiger Materie; der unlösliche Rückstand lieferte, durch Auflösen in 80 procentigem Weingeist, Behandlung mit Thierkohle und langsames Verdunsten, gefärbte Krystalle von Chinidin, das durch Verwandlung in schwefels. Salz, Fällung mit kohlens. Natron, Auswaschen und Umkrystallisiren aus Alkohol rein erhalten wurde.

(1) Mittheilungen des Schweizer Apotheker-Vereins I, 31; *Pharm. Centr.* 1848, 430; *Repert. Pharm.* [3] I, 100. — (2) *Jahrb. pr. Pharm.* XVII, 32. — (3) *Repert. Pharm.* [2] XLVIII, 384; XLIX, 1; *Pharm. Centr.* 1848, 308.

Das Chinidin krystallisirt in grofsen, glasglänzenden, Chinidin.
geraden vierseitigen Säulen, die entweder gerade abgestumpft oder mit einer oder zwei Flächen zugespitzt sind; bei rascher Ausscheidung bildet es ein krystallinisches, unter dem Mikroskope als rhombische Tafeln erscheinendes Pulver. Beim Erhitzen schmilzt es, in höherer Temperatur sublimirt ein kleiner Theil, der gröfsere zersetzt sich unter Entwicklung nach Chinon riechender Dämpfe. Das Pulver ist kaum electrisch. Es ist nur wenig löslich in Wasser, leicht löslich in Weingeist; 100 Th. Aether lösen nur 0,69 Chinidin. Es neutralisirt Säuren vollkommen; überschüssige Säure veranlafst ein Schillern der Lösung, wie beim Chinin. Die Auflösungen besitzen einen ebenso bitteren Geschmack wie die des Chinins. Das Chinidin verliert bei 100° nichts an Gewicht. Das basische schwefels. Chinidin, so wie das Platindoppelsalz ist, nach W., mit den entsprechenden Chininverbindungen gleich zusammengesetzt; das lufttrockne neutrale schwefels. Salz verliert beim Schmelzen 19 pC. Wasser; es enthält 16,55 pC. Schwefelsäure. Winckler vermuthet, das Chinidin sei gleich zusammengesetzt mit dem Chinin; die Entscheidung hierüber bleibt der genaueren analytischen Untersuchung noch anheimgestellt.

In einem Chinaextract von unbekanntem Ursprung hat Pseudochinin.
Mengardue (1) weder Chinin, noch Cinchonin oder Cinchovatin, wohl aber eine organische Salzbase gefunden, die in ihrem Verhalten und Zusammensetzung von den eben genannten abweicht. Sie neutralisirt Säuren vollständig, zersetzt Ammoniaksalze, ist unlöslich in Aether und Wasser, löslich in Alkohol, aus dem sie in unregelmäfsigen Prismen krystallisirt. Ihre Lösung in Chlorwasser wird auf Zusatz von Ammoniak rothgelb, während Chinin grün wird. Sie ist geschmacklos, und auch das in flachen Prismen krystallisirbare schwefels. Salz schmeckt kaum bitter. Die

(1) Compt. rend. XXVII, 221; J. pr. Chem. XLV, 356; Pharm. Centr. 1848, 795; J. pharm. [3] XIV, 343; J. chim. méd. [8] V, 17.

Analyse der Base gab 76,5 — 76,7 pC. Kohlenstoff, 8,1 — 8,2 Wasserstoff, 10,2 — 10,4 Stickstoff und 5,2 — 4,7 Sauerstoff.

Morphin.

Laurent (1) hat das Morphin einer nochmaligen Analyse unterworfen und es = $C_{34}H_{19}NO_6$ gefunden (welche Formel 1 H mehr als die ursprünglich von Liebig festgesetzte enthält). Die Analyse gab 71,63—71,59 pC. Kohlenstoff und 6,58—6,66 Wasserstoff; die Rechnung verlangt 71,58 Kohlenstoff und 6,66 Wasserstoff. Es unterschiede sich hiernach von dem Codein nur durch 1 Aeq. Sauerstoff, das letzteres weniger enthält.

Schwefel-
blausaures
Morphin.

Dollfus (2) analysirte das schwefelblaus. Morphin und fand dafür $C_{34}H_{18}NO_6$, C_2NS_2H , HO, wonach das Morphin 1 Aeq. Wasserstoff weniger enthielte, als Laurent annimmt.

Morphin-
gehalt des
Opiums.

Aubergier (3) hat durch eine Reihe von Versuchen mit in Algier 1844 und 1845 cultivirten Varietäten des Mohns (*Papaver somniferum*) nachgewiesen, daß die Qualität des daraus erzielten Opiums, d. h. sein Morphingehalt, abhängt einerseits von der Varietät der Pflanze, andererseits von der mehr oder minder vorgeschrittenen Reife der Kapsel zur Erntezeit. Der Milchsaft ist am reichsten an Morphin, wenn die Kapseln noch nicht vollkommen reif, wenn sie noch grün sind; so wie sie gelbbraun werden, was die Reife des Samens andeutet, ist es für die Opiumernte zu spät. Wird beim Anritzen der Mohnköpfe nicht zu tief eingeschnitten, daß die Luft nicht durch das verletzte Pericarpium eindringen kann, so reifen die Samen noch, unbeschadet der Opiumausbeute. A. bewirkt dieses mit einem Instrument, das 4 nebeneinander liegende Klingen trägt, die so gestellt sind, daß sie nur 1—2 Millimeter tief einschneiden können. Der auslaufende Milchsaft wird sogleich gesammelt, bevor er auf der Kapsel trocknet, was den Ver-

(1) Ann. ch. phys. [3] XIX, 361 (vergl. S. 615). — (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 216. — (3) Ann. ch. phys. [3] XX, 303; Pharm. Centr. 1847, 615.

lust durch Regen verhindert. — Die Bestimmung des Morphins geschah nach der Angabe von Payen. Auberger entfärbte aber die Morphinlösung mit Thierkohle, was seine Zahlen unzuverlässig macht, da diese bekanntlich organische Basen aus ihren Auflösungen an sich zieht. Er erhielt folgende Zahlen.

Morphin-
gehalt des
Opiums.

Mohnvarietät.	Ernteseit.	Morphin in 100 Th. Opium von 7,6 pC. Wassergehalt.
Weißer Mohn	1844. 1. Ernte 5.—11. Juli.	8,570
Derselbe	" 2. " 17.—20. Juli.	1,520
Rother Mohn	" 11.—13. Juli.	10,690
Weißer Mohn	" 1. " 9. Juli.	6,630
Derselbe	" 2. " 28. Juli.	5,580
Derselbe	" 3. " 13. August.	3,270
Rother Mohn	" 1. " 21. Juli.	10,370
Derselbe	1845. 2. " 26. Juli.	10,649
Derselbe	" 3. " 16. August.	11,230
Oeillette	" 1. " 29.—30. Juli.	17,833
Derselbe	" 2. " 21. August.	14,780

Arppe (1) beschrieb 1845 einen weissen, an der Luft grün werdenden Körper, den er durch Einwirkung von überschüssiger Schwefelsäure auf Morphin erhalten hatte. Seine Analysen führten ihn zu der Formel $4\text{C}_{35}\text{H}_{20}\text{NO}_6 + 5\text{SO}_3$. A. sprach dabei, von der Annahme ausgehend, dafs das Morphin eine gepaarte Ammoniakverbindung sei, die Vermuthung aus, die weisse Verbindung enthalte wasserfreies schwefels. Ammoniak, wonach ihre rationelle Formel $= \text{C}_{35}\text{H}_{17}\text{O}_6, \text{NH}_3, \text{SO}_3 + 3(\text{C}_{35}\text{H}_{17}\text{O}_6, \text{NH}_3) + 4\text{SO}_3$ wäre. Laurent und Gerhardt (2) unterwarfen diese Verbindung ebenfalls der Analyse, und betrachten sie darnach als neutrales schwefels. Morphin, minus 2 Aeq. Wasser, also als der Reihe der Amide und Anilide angehörig. Ihre Analyse gab 63,0 pC. Kohlenstoff; 5,8 Wasserstoff und 5,4 Schwefel. Die Formel $\text{C}_{34}\text{H}_{18}\text{NO}_5\text{S} = \text{C}_{34}\text{H}_{18}\text{NO}_5, \text{SO}_3$

Sulfomorphid
und
Sulfonarcotid.

(1) Ann. Ch. Pharm. LV, 96. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 112; Compt. rend. XXVII, 80; J. pharm. [3] XIV, 302; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 358; J. pr. Chem. XLV, 369; Pharm. Centr. 1848, 809.

Sulfomorphid und Sulfonarcotid. verlangt 64,5 Kohlenstoff, 5,7 Wasserstoff und 5,1 Schwefel. Den Verlust von 1,5 pC. Kohlenstoff betrachten sie als unvermeidlich bei unkrystallisirbaren, schwer verbrennlichen Körpern. Sie bezeichnen die Verbindung mit *Sulfomorphid*. — Durch Behandeln von Narcotin mit verdünnter Schwefelsäure erhielten L. und G. einen dunkelgrünen, in kaltem Wasser unlöslichen, in Alkohol löslichen Körper, der sich dem Sulfomorphid analog verhält, und deshalb von ihnen *Sulfonarcotid* genannt wird. Die Analyse gab 59,1 pC. Kohlenstoff, 5,3 Wasserstoff und 3,6 Schwefel. Die Formel des neutralen schwefels. Narcotins minus 2 Aeq. Wasser, $C_{46}H_{23}NO_{14}, SO_3, HO - 2HO = C_{46}H_{21}NO_{13}, SO_3$, verlangt 60,2 Kohlenstoff, 5,2 Wasserstoff und 3,5 Schwefel. Die Basen, Morphin und Narcotin, lassen sich aus diesen Verbindungen nicht wieder reproduciren.

Cotarnin. Laurent (1) verändert die Formel des von Wöhler mittelst Braunstein und Schwefelsäure, von Blyth mittelst Platinchlorid aus dem Narcotin erhaltenen Cotarnins in $C_{26}H_{13}NO_6$. Er wiederholte ferner die Analyse der bei diesem Oxydationsprocesse neben Hemipinsäure auftretenden Opiansäure und betrachtet sie darnach als $C_{20}H_{10}O_{10}$ (berechnet 57,15 pC. Kohlenstoff, 4,77 Wasserstoff; gefunden 57,10 Kohlenstoff und 4,88 Wasserstoff), wonach sie 1 Aeq. Wasserstoff mehr, als nach der Wöhler'schen Formel enthielte. Die Entstehung dieser Körper erklärt sich dann aus der Gleichung :



Die Opiansäure geht durch Aufnahme von 2 weiteren Sauerstoffatomen in Hemipinsäure, $C_{20}H_{10}O_{12}$, über. — Addirt man die Formeln des Narcotins und Cotarnins, so hat man 2 Aeq. Narcogenin, $2 C_{36}H_{19}NO_{10}$, oder es entstehen aus 2 Aeq. Narcotin, durch Aufnahme von 4 Aeq. Sauerstoff, 2 Aeq. Narcogenin, 1 Aeq. Opiansäure und 2 Aeq. Wasser.

(1) Ann. ch. phys. [3] XIX, 370 (andere Citate vergl. S. 615).

Schwefelblaus. Codein fällt beim Vermischen von Schwefelblausäure mit weingeistiger Codeinlösung in bei 100° schmelzbaren Nadeln nieder, für die Dollfus (1) die Formel $C_{34}H_{10}NO_8$, C_2NS_2 , $H + HO$ aufstellt. Er fand 62,30 Kohlenstoff und 6,13 Wasserstoff; die Formel verlangt 62,60 Kohlenstoff und 6,08 Wasserstoff.

Schwefel-
blausaures
Codein.

G. Merck (2) beschreibt als Papaverin eine von ihm in den Rückständen von der Darstellung des Morphins aufgefundene neue organische Basis des Opiums. Das Papaverin, $C_{40}H_{21}NO_8$, krystallisirt aus Weingeist und Aether, worin es in der Kälte nur wenig, leichter in der Wärme löslich ist, in weissen Spießsen, die kaum geröthetes Lackmus bläuen. Mit Vitriolöl färben sie sich blau. — Die Salze sind meist in Wasser schwerlöslich; das salzs. Papaverin, $C_{40}H_{21}NO_8$, HCl , krystallisirt, nach H. Kopp's Bestimmung, in geraden rhombischen Säulen mit Kanten von 80 und 100°. Es wird aus seiner wässrigen Lösung durch Salzsäure in ölartigen Tropfen ausgefällt, die beim Stehen in gelinder Wärme sich in ein Haufwerk von Krystallen verwandeln. Schwefelsäure und Salpetersäure verhalten sich ähnlich. Das Platinchlorid-Doppelsalz, $C_{40}H_{21}NO_8$, HCl , $PtCl_2$, ist ein gelber, in Wasser und Weingeist unlöslicher Niederschlag. Die Darstellung der Base, ihr chemisches Verhalten und die analytischen Resultate sind von Merck noch nicht mitgetheilt.

Papaverin.

Das Piperin ist, nach einer wiederholten Analyse von Laurent (3), welche indessen die Regnault'sche Formel $C_{34}H_{10}NO_8$ bestätigt, isomer mit dem Morphin.

Piperin.

Th. Anderson (4) hat zwei Verbindungen der Phosphorsäure mit Strychnin beschrieben.

Phosphorau-
res
Strychnin.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 217. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 125; Pharm. Centr. 1848, 939; Arch. Pharm. [2] LVI, 312; Repert. Pharm. [3] I, 96; J. pharm. [3] XV, 167. — (3) Ann. ch. phys. [3] XIX, 363; Ann. Ch. Pharm. LXII, 98. — (4) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 55; Chem. Soc. Qu. J. I, 55; Phil. Mag. [3] XXXIII, 163; Pharm. Centr. 1848, 682; J. pharm. [3] XIV, 49.

Phosphorsau-
res
Strychnin.

Digerirt man mäfsig verdünnte dreibasische Phosphorsäure mit Strychnin in gelinder Wärme, so lange es noch leicht gelöst wird, so setzen sich beim Erkalten halbzoll-lange, strahlenförmig gruppirte Nadeln ab, die bei $127^{\circ} = C_{44}H_{24}N_2O_4, HO, PO_5 + 2 HO$ sind (gefunden 59,05 — 58,72 Kohlenstoff, 5,97 — 5,96 Wasserstoff; berechnet 59,14 Kohlenstoff und 6,04 Wasserstoff). Das krystallisirte Salz verliert bei 127° 4 At. (7,42 pC.) Wasser; gefunden wurden 7,95 pC. Es löst sich in 5—6 Th. kaltem Wasser und reagirt sauer.

Digerirt man die Lösung des sauren Salzes längere Zeit mit überschüssigem Strychnin, so erhält man, nach mehrmaligem Umkrystallisiren, grofse rectanguläre Tafeln, deren Lösung nicht sauer reagirt: sie sind $= 2 (C_{44}H_{24}N_2O_4, HO), HO, PO_5 + 18 HO$. Bei 100° verliert diese Verbindung die 18 At. (17,6 pC.) Krystallwasser.

Schwefel-
blausaures
Strychnin.

Dollfus (1) hat durch die Analyse des schwefelblaus. Strychnins, das beim Vermischen von Schwefelblausäure mit einer weingeistigen Strychninlösung oder von Schwefelcyan-
kalium mit einem Strychninsalz in wasserhellen, schwerlöslichen Nadeln niederfällt, die von Gerhardt angenommene Formel der Base bestätigt. Er bestimmte in dieser, wie in den übrigen von ihm untersuchten schwefelblaus. Basen, das Atomgewicht durch Fällung des Säuregehalts als Schwefelcyansilber. Die Resultate ergaben genau $C_{44}H_{24}N_2O_4, C_2NS_2, H$ (gefunden 67,70 Kohlenstoff, 6,39 Wasserstoff; berechnet 67,81 Kohlenstoff und 6,14 Wasserstoff).

Salzsaures
Strychnin und
Cyan-
quecksilber.

D. Brandis (2) hat den beim Vermischen von salzs. Strychnin mit Cyanquecksilber entstehenden krystallinischen Niederschlag auf seine Zusammensetzung untersucht. Aus heifsen Lösungen setzt er sich erst beim Erkalten in perlmutterglänzenden, meist rechtwinklig vierseitigen Tafeln ab. Er ist $= C_{44}H_{24}N_2O_4, HCl + 4 HgCy$.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 221. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 269; Pharm. Centr. 1848, 952.

Beim Vermischen kalt gesättigter Lösungen eines neutralen Strychninsalzes und Ferrocyankalium entsteht, nach Brandis (1), ein starker, aus fast farblosen Krystallen bestehender Niederschlag. Verdünntere Lösungen liefern $\frac{1}{2}$ –1 Zoll lange, hellgelbe, rechtwinklig vierseitige Prismen, deren Enden durch zwei gegen die Kanten gerichtete Flächen zugespitzt sind. Brandis' Analyse führt zu der Formel $2 C_{44}H_{24}N_2O_4 + C_{10}H_8 + 8 HO$. Bei 100° verliert die Verbindung 6 Aeq. = 6,12 pC. Wasser. — Das Salz verhält sich gegen Eisen-, Blei- und Kupfersalze ganz wie Ferrocyankalium. — Löst man es in heissem Wasser oder erhitzt man seine gesättigte wässrige Lösung zum Sieden, so krystallisirt zuerst Strychnin, dann die folgende Verbindung heraus.

Ferrocyan-
wasserstoff-
saures
Strychnin.

Durch Vermischen heiss gesättigter Lösungen von Strychninsalz und von Ferridcyankalium erhält man schön goldgelbe, lebhaft glänzende Krystalle, die den vorher beschriebenen ähnlich sind. Ihre Zusammensetzung ist = $3 C_{44}H_{24}N_2O_4 + 2 C_{10}H_8 + 12 HO$. Von den 12 Aeq. Wasser verliert die Verbindung im leeren Raum 3, bei 100° 6 und bei 136° 8 Aeq. Stärker erhitzt zerfällt sie unter Blausäureentwicklung.




Ferridcyan-
wasserstoff-
saures
Strychnin.

Kocht man Berlinerblau mit Strychnin, so erhält man ferridcyanwasserstoffs. Strychnin, was sich aus dem Verhalten der vorhergehenden Verbindung beim Kochen mit Wasser erklärt.

Vermischt man alkoholische Lösungen von Strychnin oder von ferridcyanwasserstoffs. Strychnin mit Eisenblausäure bis zur schwach sauren Reaction, so entsteht ein weisser, pulveriger, in Wasser und Alkohol fast unlöslicher Niederschlag, der seinen Eigenschaften und seiner Constitution nach von den eben beschriebenen ganz abweicht. Die Verbindung reagirt sauer, verwandelt sich beim Uebergiessen mit Kali in eine amorphe, weisse, an der Luft

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 257; Instit. 1848, 194.

blauwerdende Masse, die sich beim Behandeln mit Alkohol in eine amorphe blaue Verbindung, in ferrocyanwasserstoffs. Strychnin und in Ferrocyankalium zerlegt. Mit heissem Wasser zersetzt sie sich in einen blauen Niederschlag und in ferridcyanwasserstoffs. Strychnin. Brandis stellt für diesen Körper die Formel $C_{44}H_{24}N_2O_4, Fe_2Cy_2, H_2Cy_2 + 5HO$ auf, welche auch die einzige ist, die mit den Zahlen der Analyse in Einklang steht. Als blaus. Salze betrachtet haben die von Brandis untersuchten Verbindungen folgende Formeln:



Sie halten demnach, soweit getrocknet als es ohne Zersetzung möglich ist, stets noch 1 Aeq. Wasser zurück.

Chlor-
und Brom-
Strychnin.

Chlor färbt, nach Laurent (1), eine warme Lösung von salzs. Strychnin rosenroth, unter Ausscheidung einer harzartigen Substanz. Die Lösung liefert bei vorsichtiger fractionirter Fällung mit Ammoniak einen weissen Niederschlag, der mit Schwefelsäure neutralisirt ein krystallinisches Salz von der Formel $C_{44}H_{23}ClN_2O_4, SO_3, HO + 7HO$, also analog dem schwefels. Strychnin, giebt. — Durch ähnliche Behandlung von salzs. Strychnin mit Brom wurde ein Bromstrychnin erhalten, in dem nicht ganz 1 Aeq. Wasserstoff ($\frac{1}{8}$) durch Brom ersetzt war.

Phosphor-
saurer Brucin.

Durch Digestion von Phosphorsäure mit Brucin erhielt Anderson (2) kurze dicke Prismen, leicht löslich in Wasser, neutral, bei 100° schmelzend. Sie sind bei 100° getrocknet = $2C_{44}H_{26}N_2O_8, HO, PO_3 + 2HO$. Der Gehalt an Krystallwasser wurde nicht bestimmt. — Digerirt man saures phosphors. Natron mit Brucin, so erhält man ein Doppelsalz, dessen Analyse (deren Resultate aber nicht

(1) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 312; Ann. Ch. Pharm. LXIX, 14; J. pr. Chem. XLVI, 52. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 55 (vgl. S. 625).

mitgetheilt sind) annähernd zu der Formel: Br^+ , HO, NaO, HO, PO₃ führen sollen.

Schwefelblaus. Brucin krystallisirt beim Vermischen von Schwefelblausäure mit Brucinlösung in wasserfreien Blättchen, die sich ziemlich leicht in Wasser lösen. — Dollfus (1) betrachtet es nach seiner Analyse = $\text{C}_{46}\text{H}_{26}\text{N}_2\text{O}_8, \text{C}_2\text{NS}_2\text{H}$ (gefunden 63,23 Kohlenstoff und 6,13 Wasserstoff; berechnet 63,57 Kohlenstoff und 5,96 Wasserstoff). — Die wahre Formel des Brucins ist damit festgestellt.

Schwefel-
blausaures
Brucin.

Das Brucin bildet, nach Brandis (2), mit Ferro- und Ferridcyanwasserstoffsäure Säuren Verbindungen, die den beschriebenen Strychninsalzen ganz ähnlich sind. Das ferrocyanwasserstoffsäure Brucin ist = $2 \text{C}_{46}\text{H}_{26}\text{N}_2\text{O}_8, \text{FeCy}_3\text{H}_2 + 2 \text{HO}$, oder als blausaures Salz und lufttrocken $2 (\text{Br}^+, \text{HCy}) + \text{FeO}, \text{HCy} + \text{HO}$.

Ferro- und
ferridcyan-
wasserstoffe.
Brucin.

Durch Behandlung einer wässrigen Lösung von schwefels. Brucin mit in schwachem Alkohol gelöstem Brom bis $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{2}$ des ersteren sich als harzartiger Körper gefällt hat, Niederschlagen der abgegossenen Lösung mit Ammoniak und Umkrystallisiren des gefällten Brombrucins aus alkoholhaltigem Wasser, erhielt Laurent (3) kleine, schwach braungefärbte Nadeln, deren Bromgehalt der Formel $\text{C}_{46}\text{H}_{25}\text{BrN}_2\text{O}_8$ entsprach (berechnet 16,9, gefunden 47,5 pC. Brom). Sie färben sich mit Salpetersäure nicht roth.

Brom-Brucin.

Gerhardt (4) gab 1845 an, bei der Einwirkung von Salpetersäure auf Brucin entwickle sich der Dampf von salpetrigs. Aethyloxyd; auf das Auftreten des letztern schloß er daraus, daß das sich entwickelnde Gas den charakteristischen Geruch jener Verbindung habe, in Wasser und Wein-geist löslich sei, und mit grünlicher Flamme und unter Entwicklung salpetriger Dämpfe brenne. Er schloß, das Brucin gebe mit Salpetersäure nur salpetrigs. Aethyloxyd

Brucin.
Zersetzung
durch
Salpetersäure.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 219. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 257. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 314; Ann. Ch. Pharm. LXIX, 8. — (4) Compt. rend. des trav. chim. Avril 1845.

Brucin.
Zersetzung
durch
Salpeter-
säure.

und einen zurückbleibenden Körper, und gab für die Erklärung dieser Zersetzung ein Schema, in welchem dem letztern Körper eine Zusammensetzung beigelegt wurde, mit welcher Gerhardt's Analysen selbst nicht übereinstimmten. Gerhardt's Angaben enthielten keine Beweise für die Identität des sich entwickelnden Gases mit dem Dampf von salpetrigs. Aethyloxyd, welche auf die wohlbekannten charakteristischen Eigenschaften (Siedepunkt, Zusammensetzung, Zersetzung mit Kali u. s. w.) basirt gewesen wären; über die Eigenschaften des salpetrigs. Aethyloxydes selbst hatte Gerhardt irrige Ansichten, was Liebig (1) hervor hob, welcher fand, daß das Brucin sich bei gelinder Wärme in Salpetersäure allerdings unter Entwicklung eines mit grüner Farbe brennenden Gases löst, aus welchem aber eine Flüssigkeit condensirt werden kann, die schwerer ist als Wasser (salpetrigs. Aethyloxyd ist leichter) und bei 70 bis 75° siedet (salpetrigs. Aethyloxyd bei 16,05). Gerhardt (2) theilte hierauf mit, die Verschiedenheit der Resultate beruhe darauf, daß Liebig die Einwirkung durch Erwärmen unterstützt habe, während nur ohne Zuthun künstlicher Wärme sich das salpetrigs. Aethyloxyd rein entwickle; bei einer Wiederholung des Versuchs erhielt Gerhardt wieder ein farbloses, nach Reinetten riechendes, Eisenvitriollösung schwarz färbendes, mit grünlich weißer Farbe verbrennendes Gas, aus welchem er aber selbst bei dem Durchleiten durch eine Kältemischung nur einen Anflug von Flüssigkeit condensiren konnte. — Laurent (3) erhielt durch die Einwirkung von Salpetersäure auf 15 bis 20 Grm. Brucin, Ueberleiten des entstehenden Dampfes über Kalk und Condensiren desselben in einer Kältemischung etwa 1 Grm. einer Flüssigkeit, welche leichter war als Wasser, nach ReINETTE-Aepfeln roch, und bei 10° ohne daß sie kochte überdestillirt werden konnte; die Analyse dieses Destillats

(1) Ann. Ch. Pharm. LVII, 94. 95. — (2) J. pharm. [3] IX, 317. — (3) Compt. rend. XXII, 633; Ann. ch. phys. [3] XXII, 463; XXIV, 814; J. pr. Chem. XLV, 848; Pharm. Centr. 1848, 335.

ergab 29 pC. Kohlenstoff und 6,1 Wasserstoff, Zahlen, welche in dem Atomverhältniß 4 C : 5 H stehen, aber viel geringer sind als die dem salpetrigs. Aethyloxyd angehörigen (32,0 und 6,6), was Laurent einem Verlust bei der Analyse zuschreibt. Den Gehalt an Stickstoff nimmt Laurent zu 1 At. an, weil eine so niedrig siedende (der Siedepunct wurde indefs nicht bestimmt) und nur 29 pC. Kohlenstoff und 6 Wasserstoff enthaltende Flüssigkeit nur 1 At. Stickstoff enthalten könne. (Es ist hier zu bemerken, dafs zwar ein Zusammenhang zwischen der atomistischen Zusammensetzung von Verbindungen und dem Siedepunkt nachgewiesen ist, aber keiner zwischen Procentgehalt und Siedepunkt, und dafs man sich nicht darauf stützen kann, man könne vom Siedepunkt auf das atomistische Zusammensetzungsverhältniß und von diesem auf das procentische schliessen, weil bei gleichem atomistischem Zusammensetzungsverhältniß, wo aber das Atomgewicht verschieden ist, der Siedepunkt sehr verschieden sein kann.) Laurent theilt noch mit, dafs auch Fournet auf diese Art eine Flüssigkeit von allen Eigenschaften des salpetrigs. Aethyloxyds erhalten habe, ohne jedoch anzugeben, welche Eigenschaften hier unter „allen“ verstanden sind. Nach beendigter Einwirkung der Salpetersäure auf das Brucin bei gewöhnlicher Temperatur setzt sich eine orangegelbe krystallinische Substanz ab, welche Laurent *Kakothelin* nennt, und deren Zusammensetzung nach ihm $C_{42}H_{22}N_4O_{20}$ ist; die Zersetzung des Brucins durch Salpetersäure erklärt er durch die Gleichung $C_{42}H_{22}N_4O_{20} + 3(NO_3,HO) = C_{42}H_{22}N_4O_{20} + C_4H_5O, NO_3 + 2HO$. Das Kakothelin giebt mit wässerigem Ammoniak eine gelbe Lösung, welche bei dem Kochen grün und dann braun wird; einmal setzte sich hieraus eine gelbe, in Wasser und Alkohol unlösliche, Untersalpetersäure enthaltende Substanz ab, welche basische Eigenschaften besitzt; letztere löst sich in Salzsäure, und diese Lösung giebt mit Ammoniak einen gelben gallertartigen, mit Ammoniak und Platinchlorid einen orangerothern Niederschlag, welcher bei ver-

Brucin.
Zersetzung
durch
Salpeter-
säure.

Brucin.
Zersetzung
durch
Salpeter-
säure.


schiedener Wärme getrocknet schwarz oder bläulichroth erscheint. — Rosengarten (1) fand, daß das bei Einwirkung von Salpetersäure auf Brucin in der Kälte sich entwickelnde, über Kalk und über Chlorcalcium geleitete Gas Kohlenstoff und Wasserstoff in dem Atomgewichtsverhältniß 4 zu 6,1 bis 6,5 enthält, was nicht das dem salpetrigs. Aethyloxyd zukommende Verhältniß ist. Für das Kakothelin fand er den Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalt der von Laurent dafür gegebenen Formel nahe entsprechend, den Stickstoffgehalt etwa um 1 pC. größer; er fand, daß es aus der Lösung in mit Salpetersäure stark angesäuertem Wasser in schönen gelben Blättchen krystallisirt, und daß die Lösung mit Ammoniak und salpeters. Silberoxyd versetzt einen flockigen, bei dem Erhitzen verpuffenden, Niederschlag giebt. Durch Einwirkung von Schwefelsäure und Braunstein auf Brucin wurde in dem wässerigen Destillat ein eigenthümlich riechender Körper erhalten, welcher salpeters. Silberoxyd reducirte und durch Kali nicht verändert wurde (2).

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 111; Pharm. Centr. 1848, 199; J. pharm. [3] XIII, 232. — (2) Der von Liebig erhaltene schwere ätherartige Körper ist ein constantes Product der Einwirkung von Salpetersäure auf Brucin in der Wärme, und kann durch einen gewöhnlichen Kühlapparat condensirt erhalten werden; derselbe konnte bei dem Ueberleiten des sich entwickelnden Dampfes über Kalk oder Chlorcalcium bei diesen condensirt bleiben, und ist offenbar verschieden von der durch Laurent analysirten Flüssigkeit. — Baumert fand, daß aus Brucin mit Braunstein und Schwefelsäure eine flüchtige und brennbare Flüssigkeit erhalten wird, welche zwei Körper enthält, von denen der eine sauer reagirt und die Silbersalze reducirt; der andere, eigentlich brennbare Körper ist in allen Verhältnissen mit Wasser mischbar und wird aus der wässerigen Lösung nicht durch Chlorcalcium, wohl aber durch kohlens. Kali abgeschieden. Nach Einer Rectification über Chlorcalcium wurden in letzterem 31 pC. Kohlenstoff und 12,3 bis 12,5 Wasserstoff, nach einer zweiten 33,8 bis 33,9 Kohlenstoff und 12,3 bis 12,5 Wasserstoff gefunden. G. Merck, welcher dieselbe Substanz freier von Wasser erhalten zu haben scheint, fand darin 34,5 Kohlenstoff und 12,2 Wasserstoff, nach einer neuen Destillation 37,8 Kohlenstoff und 12,4 Wasserstoff, welche letztere Zahlen mit dem Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalt des Holzgeistes übereinstimmen. — Es mag hier daran erinnert werden, daß das Leucin, welches Analogie

Für das von Woskresensky in den Cacaobohnen ^{Theobromin.} entdeckte Theobromin hat man bisher, gestützt auf die Analysen seines Entdeckers, die Formel $C_7H_8N_2O_2$ angenommen. W. hatte das Atomgewicht dieser organischen Base nicht festgestellt, weshalb dieser Formel kein Vertrauen geschenkt werden konnte. Glasson (1) hat nun die Analyse wiederholt und denselben Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalt gefunden wie Woskresensky, dagegen einen um 4 pC. niedrigeren Gehalt an Stickstoff. Er berechnet die Formel $C_{14}H_8N_4O_4$, die in der Analyse des Silber- und Platindoppelsalzes ihre Bestätigung findet.

Löst man Theobromin in concentrirter Salzsäure, so krystallisirt die durch Wasser leicht zersetzbare Verbindung $C_{14}H_8N_4O_4, HCl$ heraus; sie verliert schon bei 100° alle Säure. Aus der Lösung in warmer Salpetersäure schießen schiefe rhombische Säulen an, die $= C_{14}H_8N_4O_4, NO_2, HO$ sind. Versetzt man eine verdünnte Lösung von salpeters. Theobromin mit salpeters. Silberoxyd, so erhält man sehr schwerlösliche, glänzende Nadeln, die eine Verbindung der Base mit dem Silbersalz $= C_{14}H_8N_4O_4 + AgO, NO_2$ sind. Mit Platinchlorid bildet das Theobromin eine Doppelverbindung, die in schönen monoklinometrischen Prismen, mit Combinationsflächen von $\infty P. OP$ krystallisirt. Sie enthält 8,53 pC. = 4 At. Krystallwasser, und hat bei 100° getrocknet die Formel $C_{14}H_8N_4O_4, HCl + PtCl_2$.

Glasson's Versuche stellen fest, daß für sauerstoffhaltige Basen ein ähnlicher Zusammenhang stattfindet in der Zusammensetzung wie für einige flüchtige, sauerstofffreie Basen und für die Reihe der Säuren $C_n H_n O_4$.



mit organischen Basen zeigt, bei Destillation mit Braunstein und Schwefelsäure eine flüchtige brennbare Flüssigkeit giebt, welche Valeronitryl ist; dasselbe giebt bei Destillation mit Bleihyperoxyd im Anfang Aldehyd der Buttersäure und zuletzt Ammoniak, welche beide sich in der übergegangenen Flüssigkeit zu Krystallen von Butyraldehyd-Ammoniak verbinden. — (1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 335; J. pr. Chem. XLI, 92; Pharm. Centr. 1847, 424.

Theobromin. Gegen Oxydationsmittel zeigen beide Basen ein analoges Verhalten; Glasson beobachtete, daß aus dem Theobromin durch vorsichtige Oxydation mittelst Bleihydroperoxyd und Schwefelsäure ein Körper gebildet wird, der schwach sauer reagirt, die Haut purpurroth färbt und Schwefelwasserstoff unter Abscheidung von Schwefel zerlegt. Viele organische Salzbasen liefern bekanntlich durch kräftige Oxydationsmittel prachtvoll gefärbte Verbindungen, ein näheres Studium der Zersetzungsproducte in dieser Richtung verspricht die belohnendsten Resultate für unsere Kenntnisse der Constitution dieser merkwürdigen Klasse von chemischen Verbindungen.

Caffein. In Folge der Angabe von Payen (1), daß das Caffein nach der Formel $C_{10}H_{10}N_4O_2$ zusammengesetzt sei, hat Nicholson (2) die Analyse dieser Base und ihres Platindoppelsalzes wiederholt und, wie vorauszusehen war, die Formel $C_{10}H_{10}N_4O_4$ bestätigt, die aus den übereinstimmenden Resultaten von Liebig und Pfaff, Wöhler, Mulder und Stenhouse hervorgegangen war; N. hat außerdem einige neue Caffeindoppelsalze untersucht. — *Salpeters. Silberoxyd-Caffein*, $C_{10}H_{10}N_4O_4$, AgO , NO_2 , krystallisirt in weißen, an die Gefäßwände sich ansetzenden Halbkugeln, wenn man eine concentrirte wässerige oder weingeistige Auflösung der Base mit überschüssigem salpeters. Silberoxyd vermischt. — *Caffeinquicksilberchlorid*, $C_{10}H_{10}N_4O_4 \cdot 2HgCl$, bildet dem Caffein ähnliche Nadeln, ist leichtlöslich in Wasser, Alkohol, Salzsäure und Oxalsäure, fast unlöslich in Aether. — *Caffeingoldchlorid*, $C_{10}H_{10}N_4O_4$, HCl , $AuCl_3$, erhält man beim Vermischen von überschüssigem Goldchlorid mit einer concentrirten Auflösung von Caffein in Salzsäure als einen schön citrongelben Krystallbrei, der nach dem Waschen mit kaltem Wasser aus seiner

(1) J. pr. Chem. XXXVIII, 437; Berzelius' Jahresber. XXVII, 339.

— (2) Ann. Ch. Pharm. LXII, 71; J. pr. Chem. XLI, 457; Phil. Mag. [8] XXXI, 115; Chem. Soc. Mem. III, 321; Pharm. Centr. 1847, 568; J. pharm. [8] XII, 293.

alkoholischen Lösung lange orangegelbe Nadeln absetzt. Seine Lösung wird in höherer Temperatur unter Abscheidung von metallischem Gold zersetzt. — Auch mit Cyanquecksilber und Chorpalladium geht das Caffein Verbindungen ein. Caffein.

Nach Rochleder (1) enthält das Caffein einen Theil seines Kohlenstoffs und Stickstoffs in der Form von Cyan, sofern es, mit Mehrfach-Schwefelammonium gekocht, eine Flüssigkeit liefert, die mit Eisenchlorid eine vorübergehende Schwefelcyanreaction zeigt und mit Natronkalk auf 180° erhitzt, neben Kohlensäure und Ammoniak, viel Cyankalium erzeugt, ein Verhalten, das dem Piperin, Morphin, Chinin und Cinchonin abgeht. Mit chlors. Kali und Salzsäure gekocht und vorsichtig eingedampft zerfällt das Caffein in einen Körper, dessen Auflösung die Haut roth färbt, durch Alkalien und Eisenoxydulsalze indigblau wird und eigenthümlich riecht. Aehnliche Erscheinungen beobachtete schon Stenhouse bei der Oxydation des Caffeins mit Salpetersäure und Glasson bei der Behandlung des Theobromins mit Bleihyperoxyd und Schwefelsäure. — Das Caffeinplatinchlorid zerfällt beim Kochen mit verdünnter Salpetersäure in ein neues, in sechsseitigen Tafeln krystallisirendes Doppelsalz.

Bödeker (2) hat nachgewiesen, dafs die officinelle Columbowurzel neben Columbin- und Columbasäure eine nicht unbedeutende Menge an die letztere Säure gebundenes Berberin enthält, das in den gelben Verdickungsschichten der Zellmembranen gemengt mit einer fetten Substanz abgelagert ist, während das Columbin krystallisirt in den Zellen der Wurzel vorkommt. B. bestätigt durch seine Analysen die von Fleitmann für das Berberin aufgestellte Formel $C_{42}H_{18}NO_9$. — Es liefert schon beim Destilliren mit Kalkmilch oder Bleioxydhydrat Chinolin. Berberin.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 201; Pharm. Centr. 1847, 916. —

(2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 384; LXIX, 37; J. pr. Chem. XLIII, 501; Instit. 1848, 193.

Berberin. G. Kemp (1) erinnert, daß er schon 1839, also vor Fleitmann, die Fähigkeit des Berberins, mit Säuren Verbindungen einzugehen, nachgewiesen habe; er hält die von diesem Chemiker aufgestellte Formel für unrichtig und nimmt sie, von der Analyse des Platindoppelsalzes (gefunden 46,23 Kohlenstoff, 3,68 Wasserstoff und 18,05 Platin) ausgehend, $= C_{42} H_{11} NO_7$ an. Aber Bödeker zeigte, daß dieses Salz, vorsichtig bereitet, den richtigen Platingehalt (17,53 pC.) giebt.

Harmalin. Fritzsche (2) hat eine umfassende Arbeit über die in den Samen der Steppenraute (*Peganum Harmala*) fertig gebildet enthaltenen organischen Basen — das Harmalin und Harmin — publicirt, von denen erstere schon 1837 von Göbel beschrieben und von Varrentrapp und Will der Analyse unterworfen wurde. Beide Basen kommen in der Schale des Samens und der darunter liegenden Membran vor, während der Kern fast frei davon ist. Zu ihrer Darstellung zieht man den gepulverten Samen mit essig- oder schwefelsäurehaltigem Wasser aus, sättigt den gefärbten Auszug beinahe mit kohlen. Natron, und setzt dann nach und nach Kochsalz zu, wodurch beide Basen als salzs. Salze so vollständig gefällt werden, daß aus dem Filtrat durch Kali kaum noch Spuren davon abgeschieden werden können. Die ausgefüllten salzs. Salze, denen noch färbende Materien anhängen, werden mit concentrirter Kochsalzlösung gewaschen, ihre wässrige Lösung alsdann mit Thierkohle entfärbt, und dem auf 50 — 60° erwärmten gelben Filtrat allmählig und unter starkem Umrühren Ammoniak zugesetzt, wodurch zuerst Harmin ausgefällt wird, das unter dem Mikroscope in Nadeln erscheint, während das Harmalin Blätter bildet. Bei vorsichtigem Ammoniakzusatz erreicht man eine genaue Trennung; das Harmalin wird

(1) Chem. Gaz. 1847, 209. — (2) Petersb. Acad. Bull. VI, 49; J. pr. Chem. XLI, 31; XLII, 275; Pharm. Centr. 1847, 449; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 360; J. pharm. [3] XIII, 373.

zuletzt durch überschüssiges Ammoniak niedergeschlagen. Harmalin.
 Fr. erhielt nahezu 4 pC. aus dem Samen, wovon $\frac{1}{3}$ Harmalin war. Aus dem so erhaltenen rohen Harmalin gewinnt man die reine Base, indem man es in Wasser theilt, tropfenweise Essigsäure zusetzt, bis der grösste Theil gelöst ist und das verdünnte Filtrat mittelst salpeters. Natron, Kochsalz oder Salzsäure ausfällt; das niedergefallene Harmalinsalz wird, nach dem Auswaschen mit einer verdünnten Lösung des Fällungsmittels, in warmem Wasser aufgelöst, mit Thierkohle digerirt, bis die Lösung rein schwefelgelb ist, und dann noch heifs mit überschüssigem Aetzkali gefällt. Ist die niederfallende Base noch nicht ganz weifs, so wird die Operation ganz oder theilweise wiederholt. Beim Filtriren und Auswaschen nimmt das Harmalin gewöhnlich eine bräunliche Farbe an, die bei Anwendung von Ammoniak noch leichter eintritt. Es bildet so blattartig ausgebreitete, schuppige, perlmutterglänzende Krystalle, die um so gröfser sind, je allmäliger die Ausfällung geschah. Bei vollkommenem Luftabschlufs schiefst es aus Alkohol in grosen farblosen Krystallen an, deren Form nach Nordenskiöld's (1) Bestimmung eine rhombische Pyramide P, mit $\infty\bar{P}\infty$, $\infty\bar{P}\infty$ und $\bar{P}\infty$ ist. Das Verhältnifs der Hauptaxe zu den beiden Nebenaxen ist 1 : 1,804 : 1,415; die Endkantenwinkel an P $116^{\circ}34'$ und $131^{\circ}18'$, der Seitenkantenwinkel $83^{\circ}54'$.

Das Harmalin ist in Wasser schwer löslich und fast geschmacklos, seine löslichen Salze schmecken rein bitter. Es ist wenig in kaltem, reichlich in heifsem Alkohol und nur wenig in Aether löslich; concentrirte alkoholische Lösungen werden durch Aether gefällt. Es zersetzt in der Wärme Ammoniaksalze. Fr. erhielt durch die Analyse des Harmalins und mehrerer seiner Salze Zahlen, die nur mit der Formel C_2, H_{14}, N_2, O_2 in Einklang zu bringen sind; gefunden wurden in 6 Analysen 73,15—73,92 Kohlenstoff, 6,52—

(1) Petersb. Acad. Bull. VI, 58.

Harmalin. 6,70 Wasserstoff und 12,33 Stickstoff; es berechnen sich 73,6 Kohlenstoff, 6,34 Wasserstoff und 12,7 Stickstoff. Für diese Formel sprechen auch die Analysen des Harmins und der in dem folgenden beschriebenen, aus dem Harmalin durch Einwirkung von Blausäure oder Salpetersäure entstehenden Basen. Gegen dieselbe spricht die ungerade Anzahl der Kohlenstoffatome, die sich wie die des mit dem Harmalin verwandten Berberins auf eine durch 14 theilbare Zahl, auf 28 nämlich, erhöhen möchte, bei nochmaliger sorgfältiger Bestimmung dieses Elements.

Die *Harmalinsalze* sind rein schwefelgelb und auch die reinste Base giebt mit Säuren gelbe Auflösungen, welche mit Alaun gebeizten Zeugen zwar eine gelbe Farbe mittheilt, aber so schwach und wenig haltbar, dafs man das Harmalin den Farbstoffen nicht anreihen kann.

Salzs. Harmalin, $C_{27}H_{14}N_2O_2$, $HCl + 4HO$, erhält man am besten durch Fällung von essigs. Harmalin mit überschüssiger Salzsäure und Auswaschen mit derselben verdünnten Säure; es bildet feine gelbe, in Wasser und Alkohol leicht lösliche Nadeln, die lufttrocken 12,30 pC. (4 At.) Krystallwasser enthalten. Das jod- und bromwasserstoffs. Salz sind dem salzsauren ähnlich. — Das Harmalinplatinchlorid, $C_{27}H_{14}N_2O_2$, HCl , $PtCl_2$, ist gelb und krystallinisch (berechnet 38,07 Kohlenstoff, 3,51 Wasserstoff und 23,12 Platin; gefunden 37,62 Kohlenstoff, 3,54 Wasserstoff und 23,27 Platin). — Mit Quecksilberchlorid geht die Base ebenfalls eine krystallinische Verbindung ein. Von den zahlreichen von Fr. beschriebenen Harmalinsalzen erwähnen wir noch des *chromsauren*, von dem ein neutrales und ein saures Salz existirt. Das erstere bildet sich, wenn man eine concentrirte Lösung von essigs. Harmalin mit festem neutralem chroms. Kali sättigt, wo sich nach einiger Zeit eine gelbe dickflüssige Masse von neutralem Salz abscheidet, das in dieser Form leicht in Wasser löslich ist, sich selbst überlassen aber allmählig krystallinisch und unlöslich wird. Das saure chroms. Harmalin, $C_{27}H_{14}N_2O_2$,

HO, 2 CrO₃, schlägt sich sogleich in orangerothern büschelförmigen Krystallen nieder, wenn man eine Lösung der Base mit Chromsäure oder saurem chroms. Kali versetzt. Die Fällung ist fast vollständig. Es zersetzt sich über 120° in sublimirendes Harmin und in einen chromoxydhaltigen Rückstand. — Auch vom schwefels. Harmalin existirt ein neutrales und ein saures Salz; beide sind krystallisirbar; das schwefligsaure bildet einen gelben Firnifs; das ferrocyanwasserstoffsäure ein ziegelrothes Pulver, das ferridcyanwasserstoffsäure grünbraune Prismen, das schwefelcyanwasserstoffsäure, salpetersäure und phosphorsaure gelbe Nadeln; das schwefelwasserstoffs. und das kohlenst. Harmalin, bei Vermischen von essigsäurem mit Schwefelammonium oder doppelt-kohlenst. Natron in krystallinischer Form niederfallend, sind leicht zersetzbar; das essigs. Harmalin krystallisirt schwierig und verliert in der Wärme Säure.

Harmalin.

Das *Harmin* (1) (von Fr. früher Leukoharmin genannt) ist, wie schon erwähnt, in den Harmalasamen neben Harmalin fertig gebildet vorhanden und läßt sich aus dem letzteren künstlich darstellen. Erhitzt man chroms. Harmalin in einem geräumigen Kolben und bei möglichstem Luftabschluß auf 120°, so tritt eine plötzliche Zersetzung durch die ganze Masse ein, wobei ein Theil des gebildeten Harmins sublimirt. Durch Behandlung mit Alkohol oder salzsäurehaltigem Wasser entzieht man dem dunkel gefärbten, 65 pC. betragenden Rückstand etwa 25 pC. des angewandten Salzes an Harmin, das man durch Fällung mit einem Alkali abscheidet. In größerer Menge gewinnt man es durch Erhitzen von salpeters. Harmalin mit einem Gemische aus gleichen Theilen Alkohol und Salzsäure, bis durch Einwirkung der Säure auf den Alkohol Sieden eintritt. Kühlt man nun rasch ab, so fällt salzs. Harmin nieder, das durch Waschen mit säurehaltigem, Auflösen in reinem

Harmin.

(1) Petersb. Acad. Bull. VI, 242; Pharm. Centr. 1847, 769.

Harmi. Wasser und Fällung mit einem Alkali rein erhalten wird. Das rohe, harmalinhaltige Harmin löst man in Alkohol und gerade hinreichender Salz- oder Essigsäure, digerirt heiß mit Thierkohle und fällt heiß mit hinreichendem Ammoniak. Das Harmin scheidet sich bei raschem Abkühlen zuerst aus, weshalb man die erkaltete Mutterlange sogleich von den Krystallen abgießt. — Das Harmin bildet farblose, sehr spröde, glänzende, das Licht stark brechende rhombische Säulen von $124^{\circ} 18'$ und $55^{\circ} 42'$. Es zeigt gleiche Löslichkeitsverhältnisse wie das Harmalin, ist eine etwas schwächere Base als dieses, und bildet rein bitter schmeckende, farblose Salze, aus deren Auflösung die Base auf Zusatz eines Alkalis zuerst in öartigen, nach und nach krystallinisch werdenden Tröpfchen niederfällt, wie dies auch bei den Harmalinsalzen stattfindet. Für das Harmin nimmt Fr. die Formel $C_{27}H_{12}N_2O_2$ an (berechnet 74,35 Kohlenstoff, 5,49 Wasserstoff und 12,83 Stickstoff; gefunden in 5 Analysen 73,89–74,61 Kohlenstoff, 5,32–5,77 Wasserstoff und 13,02 Stickstoff). Es entsteht demnach aus dem Harmalin, indem diesem 2 Aeq. Wasserstoff entzogen werden.

Salzs. Harmin, $C_{27}H_{12}N_2O_2$, $HCl + 4 HO$, scheidet sich aus der Lösung der Base in verdünnter Säure auf Zusatz eines großen Ueberschusses derselben fast vollständig in feinen Nadeln ab, die lufttrocken 12,38 pC. (4 At.) Wasser enthalten. Aus starkem Weingeist krystallisirt es wasserfrei. In dem Platin-Doppelsalz fand Fritzsche 37,90 Kohlenstoff, 3,17 Wasserstoff und 23,25 Platin; berechnet nach $C_{27}H_{12}N_2O_2$, HCl , $PtCl_2$, 38,25 Kohlenstoff, 3,06 Wasserstoff und 23,23 Platin. — *Neutrales schwefels.* Harmin, $C_{27}H_{12}N_2O_2$, $SO_3 + 2 HO$, so wie das saure, $C_{27}H_{12}N_2O_2$, $2 SO_3$, HO , bilden nadelförmige Krystalle, ebenso das saure oxals. Salz, $C_{27}H_{12}N_2O_2$, $2 C_2O_3 + 2 HO$. Die Lösung des essigs. Harmins zersetzt sich beim Erwärmen, unter Ausfällung der Base; das saure chroms. Harmin, $C_{27}H_{12}N_2O_2$, $2 CrO_3$, HO ,

verhält sich dem entsprechenden Harmalinsalze ähnlich und zersetzt sich beim Erhitzen unter Bildung einer neuen, von Fr. noch nicht beschriebenen Base. Verbindungen mit Kohlensäure und Schwefelwasserstoff ließen sich nicht darstellen.

Das Harmalin hat grofse Neigung sich mit Blausäure zu vereinigen, zu einem Körper, der sich nicht wie ein blaus. Salz verhält, sofern er weder durch Alkalien noch durch stärkere Säuren zerlegbar ist, dagegen alle Eigenschaften einer organischen Base besitzt. Fr. nannte ihn deshalb *Hydrocyan-Harmalin* (1). Man erhält dieses durch Auflösen von Harmalin in verdünnter alkoholischer Blausäure, oder durch Vermischen von essigs. Harmalin mit Blausäure, oder rascher durch Zersetzung eines Harmalinsalzes mit Cyankalium; aus wässerigen Lösungen fällt es amorph, aus alkoholischen krystallinisch nieder; durch verdünnte Essigsäure läßt sich ihm beigemengtes Harmalin entziehen. Es krystallisirt in dünnen rhombischen Tafeln, die sich an der Luft nicht verändern, bei 180° aber, sowie beim Kochen mit Wasser oder Alkohol vollständig in Blausäure und in Harmalin zerfallen. Die Analyse führte zu der Formel $C_{20}H_{15}N_3O_2 = C_{20}H_{14}N_2O_2, CyH$ (berechnet 70,48 Kohlenstoff und 6,05 Wasserstoff; gefunden 69,81 Kohlenstoff und 6,49 Wasserstoff). Es enthält darnach 10,92 pC. (gefunden 10,96) Blausäure.

Hydrocyan-
harmalin.

Das Hydrocyanharmalin sättigt dieselbe Säuremenge, wie das darin enthaltene Harmalin; die farblosen Salze zerfallen sehr leicht beim Trocknen, Aufbewahren oder auch schon bei ihrer Darstellung mit verdünnten Lösungen in Blausäure und in die entsprechenden gelben Harmalinsalze. Man erhält sie durch Uebergießen der Base mit der Säure; das salzs. Salz, $C_{20}H_{15}N_3O_2, HCl$, bildet mikroskopische farblose, mit secundären Flächen versehene Rhomben-

(1) Petersb. Acad. Bull. VI, 289; J. pr. Chem. XLIII, 144; Pharm. Centr. 1848, 49; J. pharm. [3] XIV, 78; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 351.

octaëder (berechnet 12,85, gefunden 12,86 pC. Chlorwasserstoff).

Mit überschüssiger Salpetersäure erhitzt verwandelt sich das Hydrocyanharmalin, unter Entwicklung rother Dämpfe, in eine purpurrothe Flüssigkeit, die beim Erkalten ein ebenso gefärbtes Pulver fallen läßt, das wenig beständig ist und mit Ammoniak grün wird. Aufser diesem rothen erzeugen sich noch andere Körper, die von Fr. noch nicht näher untersucht worden sind.

Nitro-
harmalidin.

Das *Nitroharmalidin* (1), von Fr. früher *Chrysoharmin* genannt, entsteht durch Einwirkung überschüssiger Salpetersäure auf Harmalin, wobei diesem 1 Aeq. Wasserstoff entzogen wird, an dessen Stelle 1 Aeq. Untersalpetersäure tritt. Man versetzt am besten eine Auflösung von 1 Th. Harmalin in 6 bis 8 Th. 80procentigem Alkohol und 2 Th. concentrirter Schwefelsäure mit 2 Th. mässig concentrirter Salpetersäure und erwärmt gelinde; nach kurzem Sieden kühlt man rasch ab, worauf sich die Base als saures schwefels. Salz abscheidet, das man mit schwefelsäurehaltigem Alkohol auswäscht, in warmem Wasser löst und mit einem Alkali zerlegt, wobei man letzteres in der Kälte zuerst tropfenweise zusetzt, bis ein geringer, bleibender Niederschlag erfolgt und das Filtrat rein goldgelb geworden ist, und nun dieses, nach dem Zusatz einiger Tropfen Säure, bei 40 – 50° mit auf einmal zugegossenem überschüssigem Alkali vollkommen ausfällt. Enthält das Nitroharmalidin noch Harmalin oder Harmin, so löst man das in Wasser vertheilte Gemenge in gesättigter wässriger schwefliger Säure; aus der Auflösung setzt sich bald schweflgs. Nitroharmalidin ab, das man mit schwefliger Säure auswäscht und wie oben angegeben zerlegt.

Das Nitroharmalidin bildet hellgelbe, sehr feine prismatische Krystalle, die in kaltem Wasser nur wenig, in heissem reichlicher löslich sind; Alkalien fällen es nur

(1) Petersb. Acad. Bull. VII, 129; J. pr. Chem. XLIV, 370; Pharm. Centr. 1848, 561; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 355.

unvollständig aus seinen Salzlösungen. Es ist leicht löslich in Alkohol, in heißen ätherischen und fetten Oelen, nur in geringer Menge in Aether; eine kalt gesättigte Lösung der Base in Alkohol wird durch Aether nicht gefällt. Es zersetzt Ammoniaksalze in der Siedhitze. In vier Analysen des Nitroharmalidins erhielt Fr. 60,37 – 61,84 Kohlenstoff, 5,01 – 5,22 Wasserstoff und 14,61 – 16,24 Stickstoff. Er berechnet daraus, mit Zugrundelegung der Analyse des salzs. und des Platindoppelsalzes, die Formel $C_{27}H_{13}N_3O_6$, welche 61,17 Kohlenstoff, 4,89 Wasserstoff, 15,83 Stickstoff und 18,09 Sauerstoff verlangt.

Salzs. Nitroharmalidin, $C_{27}H_{13}N_3O_6$, HCl (gefunden 12,14, berechnet 12,08 Chlorwasserstoff), fällt auf Zusatz von Salzsäure aus der alkoholischen Lösung der Base oder der wässerigen des essigs. Salzes in feinen, gelben, prismatischen Krystallen nieder. Das Platindoppelsalz, $C_{27}H_{13}N_3O_6$, HCl, $PtCl_2$, fällt hellgelb und flockig nieder, und wird dann dunkler und krystallinisch (berechnet 34,43 Kohlenstoff, 2,96 Wasserstoff und 20,91 Platin; gefunden 34,21 Kohlenstoff, 3,08 Wasserstoff und 21,09 Platin). — *Schwefels. Nitroharmalidin* existirt im neutralen und sauren Zustande; beide sind gelb, krystallinisch, ersteres leicht löslich, letzteres nur wenig löslich in kaltem Wasser und nach der Formel $C_{27}H_{13}N_3O_6$, $2 SO_3 + 2 HO$ (berechnet 22,04, gefunden 21,98 Schwefelsäure) zusammengesetzt. Fr. erwähnt außerdem noch Verbindungen des Nitroharmalidins mit Quecksilberchlorid, Jod-, Brom-, Ferrocyan-, Ferridcyan- und Schwefelcyanwasserstoffsäure, schwefliger Säure, Salpetersäure, Kohlensäure (nur in Auflösung existirend), Oxalsäure, Essigsäure (beide leicht löslich) und Chromsäure. Gegen Blausäure verhält es sich ähnlich wie Harmalin, soferne es damit eine neue, noch nicht näher untersuchte Verbindung bildet.

Ruickholdt (1) hat das Corydalin von Neuem der Analyse unterworfen, mit anderem Resultat als Fr. Dö-

(1) Arch. Pharm. [2] XLIX, 189; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 869.

Corydalin. bereiner. R. fand 60,19 Kohlenstoff, 5,89 Wasserstoff, 3,01 Stickstoff und 30,89 Sauerstoff, allein die von ihm darauf berechnete Formel $C_{45}H_{27}NO_{18}$ hat keinen Werth. Wackenroder (1) fand, dafs das salzs. Corydalin in geraden rhombischen Prismen mit ebener sechsseitiger Endfläche krystallisirt, die gelblichgrün, spröde und von penetrant bitterm Geschmack sind. Es löst sich in Wasser und Alkohol, Ammoniak fällt das Corydalin daraus in weissen Flocken; ätzendes Natron im Ueberschufs löst die Base leicht auf. Das salzs. Corydalin verliert, nach W., bei 100° 12,5 pC., bei 170° noch 3,01 pC. Wasser, es enthält 10,78 pC. Salzsäure; er berechnet darnach die Formel $C_{50}H_{30}NO_{20}$, 2 HCl + 12 HO, welche ebenfalls der Stütze noch weiterer analytischer Versuche bedarf. — R. hat die Base aus den Knollen der *Corydalis tuberosa* nach einem Verfahren dargestellt, das von dem von Wackenroder (1) beschriebenen nicht wesentlich abweicht. Das Corydalin scheint dabei theilweise durch die Wirkung überschüssiger Säuren in den amorphen Zustand überzugehen.

Digitalin. Walz (3) theilt folgende Bereitungsmethode des Digitalins als die zweckmäfsigste mit. Der alkoholische Extract der trocknen Pflanze (mit der 8fachen Menge Weingeist von 0,852 spec. Gew. erhalten) wird mit Wasser behandelt, so lange es noch einen bitterm Geschmack annimmt, der wässerige Auszug mit feingeschlammtem Bleioxyd und etwas Bleiessig digerirt, bis letzterer keine Fällung mehr hervorbringt, aus dem Filtrat das Bleioxyd durch Schwefelsäure entfernt und aus der nun mit Ammoniak neutralisirten Flüssigkeit das Digitalin mittelst Gerbstoff gefällt. Der ausgewaschene Niederschlag wird mit frischgefälltem Bleioxyd oder mit Glätte und etwas Bleiessig zusammengerieben und mit Alkohol wiederholt ausgezogen. Der vom Blei durch Schwefelwasserstoff befreite Auszug liefert durch

(1) Arch. Pharm. [2] XLIX, 153. — (2) Kastn. Arch. VII, 417; Berzelius' Jahresber. VII, 220. — (3) Jahrb. pr. Pharm. XIV, 20.

Verdunstung die Base als krystallinische, gelblichweiße Masse. — Man kann auch, zur Ersparnis des Alkohols, das wässerige Decoct der Pflanze in gleicher Weise behandeln, wie den wässerigen Auszug des alkoholischen Extracts.

Durch Behandlung der *Gratiolia officinalis* nach demselben Verfahren, welches eben bei dem Digitalin beschrieben wurde, erhielt Walz (1) eine der letzteren ähnliche Substanz, das Gratiolin.

Gratiolin.

Durch Ausziehen der Samen von *Agrostemma Githago* mit schwachem essigsäurehaltigem Weingeist, Kochen der vom Weingeist befreiten Tinctur mit Bittererde und Behandeln des Niederschlags mit Alkohol erhielt Schulze (2) schmelzbare, gelblichweiße, in Wasser schwerer, in Alkohol leichter lösliche Blättchen, deren Lösung alkalisch reagirt und ganz das Verhalten einer organischen Base zeigt. Das Agrostemmin, dessen Eigenthümlichkeit durch die Analyse noch festzustellen ist, kommt nach S. vorzugsweise in den Samenschalen obiger Pflanze vor.

Agrostemmin.

P. Thenard hat seinen früheren (3) vorläufigen Mittheilungen über die durch Einwirkung von Phosphorcalcium auf Methylchlorür in höherer Temperatur entstehenden Producte noch folgendes hinzugefügt (4). Es treten dabei 5 neue phosphorhaltige Körper auf, von denen zwei fest und drei flüssig sind. Der eine dieser letzteren ist eine mächtige, durch Oxydation in eine Säure übergehende organische Base C_6H_5P , der andere ist selbstentzündlich und C_4H_5P . Dieser letztere ist eine farblos durchsichtige, etwas dickliche, in Wasser unlösliche stinkende Flüssigkeit. Diese siedet bei 250° , entzündet sich von selbst an der Luft und verwandelt sich bei langsamer Sauerstoff-

Phosphorhaltige organische Basen.

(1) Jahrb. pr. Pharm. XIV, 22. — (2) Arch. Pharm. [2] LV, 298; LVI, 163; Pharm. Centr. 1848, 951; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 350. — (3) Aus Instit. 1846, Nr. 602 in Berzelius' Jahresber. XXVI, 598. — (4) Compt. rend. XXV, 892; Pharm. Centr. 1848, 77; Phil. Mag. [3] XXXII, 153.

Phosphor-
haltige orga-
nische Basen.

absorption in eine krystallinische Säure. Mit salzs. Gas bildet sie zuerst eine feste, beständige, krystallisirbare Verbindung, alsdann eine saure, flüssige, weniger beständige, und bei weiterer Einwirkung des Gases zerfällt sie in das salzs. Salz der Base C_4H_9P und in einen Körper C_2H_5P , der gelb, geschmack- und geruchlos ist. — Die krystallisirbare salzs. Verbindung des Körpers C_4H_9P löst sich in Wasser von 0° unverändert auf; erwärmt man aber, so zerfällt sie unter Aufnahme der Elemente des Wassers in dieselbe Säure, die aus der Base C_4H_9P entsteht, und in einen neuen gasförmigen Körper $C_2H_5P = C_2H_4, PH_3$, der sich einerseits mit seinem gleichen Vol. Sauerstoff zu einer sehr sauren Flüssigkeit, anderseits mit 1 oder 2 Vol. salzs. Gas zu einer krystallinischen Verbindung condensirt, aus welcher durch Wasser sogleich wieder das neue Gas entbunden wird. P. Thenard betrachtet diese höchst merkwürdigen Körper als Verbindungen der 3 Phosphorwasserstoffe P_2H_4 , PH_3 und PH_2 mit 1, 2 und 3 Aequiv. Methylen, C_2H_2 . Die Base ist darnach $PH_3, 3 C_2H_2$, der selbstentzündliche Körper $PH_3, 2 C_2H_2$ und der gelbe P_2H_4, C_2H_2 . Th. erwähnt noch, daß er eine ähnliche Reihe von Körpern aus Aethylchlorür und Phosphorcalcium erhalten habe, deren Interesse durch die kürzlich (1849) gemachte Entdeckung von Wurtz (1) gesteigert wird, wonach das Ammoniak in der That mit Methyl und Aethyl analoge basische Körper erzeugt, wie es Th. vermuthungsweise ausgesprochen hatte.


Thalidin.

Leitet man, nach Liebig und Wöhler (2), durch eine Auflösung von äther- und weingeistfreiem Aldehydammoniak in 12 — 15 Th. Wasser, welchem letzteren man auf je eine Unze 10 — 15 Tropfen Salmiakgeist zugesetzt hat, Schwefelwasserstoffgas, so scheiden sich nach einiger Zeit grofse, campherähnliche Krystalle einer sauerstofffreien,

(1) Compt. rend. XXVIII, 223. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXI, 1; Pharm. Centr. 1847, 273; Phil. Mag. [3] XXX, 470; Chem. Soc. Mem. III, 303; J. pharm. [3] XI, 398.

schwefelhaltigen organischen Basis aus, die von L. und W. den Namen *Thialdin* (zusammengezogen aus $\theta\epsilon\iota\omega\nu$, Schwefel, und Aldehyd) erhalten hat. Die nach 4 – 5 Stunden vollständig abgeschiedenen Krystalle werden auf einem Trichter durch Waschen mit Wasser von anhängendem Schwefelammonium befreit, nach dem Trocknen zwischen Löschpapier in Aether gelöst, und die mit $\frac{1}{2}$ ihres Vol. Alkohol versetzte Lösung der langsamen Verdunstung ausgesetzt, wo regelmässig gebildete, rhombische Tafeln von ansehnlicher Grösse entstehen. — Erhält man, wie dies zuweilen eintritt, statt des krystallinischen Körpers ein farbloses, schweres, stinkendes Oel, so läßt man dasselbe sich klar ablagern, gießt die obere wässerige Schicht ab, und schüttelt den Rückstand mit dem halben Vol. Aether, worin er sich sogleich löst. Diese ätherische Lösung mischt man in einem verschließbaren Gefäße mit etwas concentrirter Salzsäure, bringt den entstehenden Brei von salzs. Thialdin auf ein Filter und befreit ihn durch Waschen mit Aether von anhängendem Oel. Aus dem salzs. Salz gewinnt man die reine Base, indem man es im trockenen Zustande mit concentrirtem Ammoniak benetzt und dann mit Aether das Thialdin auflöst. Man läßt es daraus, wie oben erwähnt, krystallisiren. — Das Thialdin bildet durchsichtige, farblose, glänzende Krystalle von der Form des Gypses, die das Licht stark brechen, eigenthümlich aromatisch, auf die Dauer aber unangenehm riechen, bei 43° schmelzen und bei 42° zu einer krystallinischen Masse erstarren. Sie verdampfen schon bei gewöhnlicher Temperatur, gehen mit Wasser ohne Zersetzung über, lassen sich aber, ähnlich dem Aldehydammoniak, für sich nicht unzersetzt destilliren. — Das Thialdin ist wenig löslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether, sein Pulver zerfließt in dem Dampfe des Letzteren; es reagirt nicht alkalisch. Es hat die Formel $C_{11}H_{11}NS_4$. — Bei seiner Bildung haben sich demnach 3 Aeq. Aldehydammoniak mit 6 Aeq.


Thialdin. Schwefelwasserstoff umgesetzt in 1 Aeq. Thialdin, 6 Aeq. Wasser und 2 Aeq. Schwefelammonium :



Es läßt sich, nach W. und L., betrachten als eine gepaarte Verbindung von 1 Aeq. NH_4S mit 3 $\text{C}_4\text{H}_5\text{S}$, d. h. mit 3 Aeq. der dem Acetyloxyd, $\text{C}_4\text{H}_5\text{O}$, correspondirenden Schwefelverbindung. — Mit Säuren bildet das Thialdin leicht krystallisirbare, in Alkohol lösliche, in Aether unlösliche Salze. Sie werden, wie das Thialdin selbst, beim Erwärmen mit salpeters. Silberoxyd unter Fällung von Schwefelsilber und Entwicklung von Aldehyd zerlegt. — Cyanquecksilber giebt mit Thialdin einen weißen, beim Kochen in amorphes Schwefelquecksilber übergehenden Niederschlag. Nimmt man diesen Versuch in einer Retorte vor, so sublimiren feine, in Wasser unlösliche, in Alkohol und Aether lösliche Nadeln, die noch nicht weiter untersucht sind, in denen aber ein Theil oder aller Schwefel gegen Cyan ausgetauscht zu sein scheint. — Beim Erhitzen mit Kalkhydrat liefert das Thialdin Chinolin. — *Salzs. Thialdin*, $\text{C}_{12}\text{NH}_{15}\text{S}_4$, ClH . Eine gesättigte Lösung der Base in verdünnter Säure liefert beim Verdampfen glänzende, farblos durchsichtige, oft zolllange Prismen, die beim Erhitzen unter Braunwerden ein stinkendes brennbares Gas entwickeln, indem Salmiak sublimirt. — *Salpeters. Thialdin*, $\text{C}_{12}\text{NH}_{15}\text{S}_4$, NO_3 , HO . Man erhält es am bequemsten durch Schütteln einer ätherischen Lösung von ungereinigtem Thialdin mit mäfsig starker Salpetersäure, Auswaschen des entstandenen Krystallbreis mit Aether und Umkrystallisiren aus Wasser. Im Wasser sehr leicht lösliche, in Aether unlösliche, feine weisse Nadeln. — Läßt man krystallisiertes Thialdin mit Schwefelammonium einige Zeit in Berührung, so bildet es damit einen schweren, mit Wasser nicht mischbaren ölähnlichen Körper, wie er auch bei der Bereitung zuweilen erhalten wird. Er verdient, sowie auch das oben erwähnte cyanhaltige Zersetzungsproduct, eine nähere Untersuchung.

Durch Einleiten von (aus Seleneseisen in einem luftfreien Selenaldin. Apparat mittelst verdünnter Schwefelsäure entwickeltem) Selenwasserstoff erhielten Liebig und Wöhler Krystalle von *Selenaldin*, das mit dem Thialdin isomorph zu sein scheint, aber so unbeständig ist, daß es nicht der Analyse unterworfen werden konnte. Es riecht schwach, aber unangenehm, wird an der Luft sogleich gelb und auch seine Lösungen scheiden an der Luft sogleich einen orangegelben, amorphen, in Alkohol und Aether unlöslichen, in heißem Wasser schmelzbaren Körper ab. — Die Darstellung von *Telluraldin* gelang nicht.

Versetzt man, nach Liebig und Redtenbacher (1), Carbothialdin. ein alkoholische Lösung von Aldehydammoniak mit Schwefelkohlenstoff, so scheiden sich nach einigen Minuten glänzende, weiße Krystalle einer neuen organischen Basis ab, welche von ihnen *Carbothialdin* genannt wird. Es ist in Wasser und kaltem Aether unlöslich, leicht löslich in heißem Alkohol und daraus unverändert krystallisierbar. In verdünnter Salzsäure löst es sich sogleich ohne Veränderung; nach einiger Zeit erstarrt die Lösung zu einem in Wasser unlöslichen, weißgelben Brei; beim Kochen mit Salzsäure zerfällt es in Salmiak, Schwefelkohlenstoff und Aldehyd. Beim Vermischen einer heißen alkoholischen Lösung von Carbothialdin mit Oxalsäure und dann mit Aether scheidet sich oxals. Ammoniak in Krystallen ab; Silbersalze erzeugen einen grünlich-schwarzen, bald in Schwefelsilber übergehenden Niederschlag; Quecksilberchlorid wird weißlich-gelb, Kupfersalze grün gefällt. Die Analyse führte zu der Formel $C_4H_5NS_2$; die noch fehlende Bestimmung des Atomgewichts dürfte aber wohl eine Verdoppelung oder Vervielfachung derselben veranlassen. Die Bildung des Carbothialdins erklärt sich demnach durch die Gleichung:



(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 43; Pharm. Centr. 1848, 171.

Kyanäthin.

Wie bei Cyanäthyl angegeben ist, zerfällt dieses, nach den Versuchen von Frankland und Kolbe (1), bei Behandlung mit Kalium in ein Gas, welches die Zusammensetzung und Condensation des Methyls, C_2H_3 , zeigt, und in einen zähen, gelblichen Rückstand, welcher Kohlenstoff, Wasserstoff und Cyan in dem Verhältniss C_2H_2Cy enthalten müßte. Kaltes Wasser nimmt aus diesem Rückstand viel Cyankalium auf und hinterläßt einen weissen Körper, der sich aus seiner Auflösung in heissem Wasser in perlmutterglänzenden Blättchen absetzt, die alle Eigenschaften einer organischen Base besitzen und von F. und K. *Kyanäthin* genannt wurden. — Das Kyanäthin ist weiss, geruch- und fast geschmacklos, schmilzt bei 190° , siedet unter theilweiser Zersetzung bei 280° , löst sich leicht in Alkohol und nur wenig in kaltem Wasser. Es reagirt schwach alkalisch, und wird durch heisse Kalilauge oder beim Schmelzen mit Kalihydrat kaum zersetzt. Seine Analyse führte zu der Formel $C_{18}H_{15}N_3$, es hat demnach die Zusammensetzung des Cyanäthyls, aber ein dreimal höheres Atomgewicht. Das Kyanäthin löst sich in allen Säuren leicht auf, und giebt damit in Wasser und Alkohol lösliche, theilweise schön krystallisirende, bitterlich herbe schmeckende Salze, aus denen die Base durch ätzende und kohlens. Alkalien unverändert fällbar ist. — Das salpeters. Kyanäthin, $C_{18}H_{15}N_3, NO_3, HO$, ist neutral, in grossen farblosen Prismen krystallisirbar; das schwefels. und salzs. Salz krystallisiren nicht, das Platindoppelsalz, $C_{18}H_{15}N_3, HCl, PtCl_2$, krystallisirt aus Wasser in grossen rubinrothen Octaëdern und ist in Alkohol wie in einer Mischung von Alkohol und Aether ziemlich leicht löslich. Die Bedingungen der Umsetzung des Cyanäthyls in Kyanäthin sind von Fr. und K. vergebens aufgesucht worden; man erhält letzteres nur in geringer Menge (wenige Procente des

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 269; Chem. Soc. Qu. J. I, 60; Pharm. Centr. 1848, 369.

Cyanäthyls), wenn das Cyanäthyl tropfenweise auf das Kalium fällt; verfährt man umgekehrt, so bildet sich kein Kyanäthin. Das Cyanäthyl erleidet, mit trockenem Cyankalium in einer verschlossenen Röhre auf 240° erhitzt, keine Veränderung.

Anderson (1) hat eine Untersuchung der in den Destillationsproducten thierischer Stoffe vorhandenen flüchtigen Basen vorgenommen. Als Material diente ihm das bei der Beinschwarzbereitung gewonnene Knochenöl, das im Wesentlichen Zersetzungsproducte des Leims enthält, soferne die Knochen zur Entfernung des Fetts zuerst mit vielem Wasser ausgekocht und sodann trocken in eisernen Cylindern der Rothglühhitze ausgesetzt werden. Das rohe, käufliche Oel ist dunkelbraun, fast schwarz, von 0,970 spec. Gew.; Säuren entziehen ihm die basischen Bestandtheile, bei grossem Ueberschufs concentrirter Säure löst sich gleichzeitig ein leicht zersetzbares, nicht basisches Oel auf; Alkalien nehmen saures Oel und ziemlich viel Blausäure daraus auf. Mit Salzsäure befeuchtetes Fichtenholz über die Oeffnung eines Knochenöl enthaltenden Gefäßes gehalten, nimmt rasch die das Pyrrol characterisirende purpurrothe Färbung an. Durch fractionirte Destillation in nur halb gefüllten eisernen Retorten und in Portionen von je 15 Pfund, erhält man anfangs eine wässerige, Ammoniak und flüchtige Basen enthaltende Flüssigkeit, begleitet von einem gelben Oele; die letzten drei Fünftel des Destillats werden nach und nach mit steigendem Siedpunkt dunkler und dickflüssiger; die letzte Portion ist vorübergehend bei durchfallendem Lichte dunkelrothbraun, bei reflectirtem grün, scheinbar undurchsichtig. Alle Destillate enthalten basische Körper, dem Gewicht nach etwa $\frac{1}{2}$ pC. des rohen Oels an flüchtigeren und 2–3 pC. an weniger flüchtigen Basen. A. beschreibt zuerst die Abscheidung der Basen in dem flüchtigeren Antheil des

Organische
Basen im
Oleum ani-
male Dippell.

(1) Aus Trans. royal soc. of Edinb. XVI, 4, in Phil. Mag. [3] XXXI, 174; Ann. Ch. Pharm. LXX, 32; J. pr. Chem. XLV, 153; Pharm. Centr. 1848, 778; J. pharm. [3] XIV, 372.

Organische
Basen im
Öleum ani-
male Dippell.

Destillats. Man läßt diesen mit Schwefelsäure, die mit 10 Th. Wasser verdünnt ist, 8—14 Tage in Berührung, setzt mehr Wasser zu, decantirt und wiederholt die Behandlung mit Säure so lange diese noch Basen aufnimmt. Die rothe oder dunkelbraune, eine gewisse Menge nicht basischen Oels, sowie auch Pyrrol enthaltende Flüssigkeit wird mit mehr Schwefelsäure versetzt, verdampft, filtrirt und mit überschüssigem Alkali destillirt. Das erste Destillat ist wässrig und enthält die flüchtigeren Basen aufgelöst; man wechselt die Vorlage, wenn ein Oel übergeht, das schwerer als Wasser ist; in der Retorte bleibt, auf der concentrirten Salzlösung schwimmend, ein Oel zurück, das einige der weniger flüchtigen Basen enthält. Aus dem Destillat scheiden sich auf Zusatz von festem Aetzkali die gelösten öligen Basen ab; eine kleinere Quantität der flüchtigsten bleibt gelöst und kann nur durch Destillation mit mehr Kali gewonnen werden. Unterwirft man die gemischten Basen der fractionirten Destillation, so entweicht zuerst Ammoniak, bei 71° tritt Sieden ein, indem ein durchsichtiges helles Oel übergeht; von 100° an wechselt man die Vorlage, wenn das Thermometer um je 10° gestiegen ist; man erhält so zwischen 115 und 121°, zwischen 132 und 137° reichliche Mengen Destillat; die Temperatur steigt dann rasch und es gehen jetzt zwischen 151 und 179° Basen über, die sich schwer in Wasser lösen; wenn ein Tropfen des Destillats mit Chlorkalklösung die Reaction des Anilins zeigt, so wechselt man die Vorlage nicht mehr; es besteht dann fast nur aus dieser letzteren Base.

Petinin.

A. beschreibt zuerst die von ihm in dem flüchtigsten Theil des Destillats entdeckte Base; er nennt sie *Petinin* (von *πετεινός*, flüchtig). Man erhält es rein, indem man den ersten Antheil des Destillats, gemischt mit der kleinen Menge, die nur durch Destillation mit mehr Kali zu gewinnen war, wiederholt der Rectification unterwirft; es entweicht viel Ammoniak, das bei 80° etwa übergehende

ist das Petinin. Es ist durchsichtig, farblos, stark lichtbrechend, von äußerst stechendem unangenehmem Geruch, der im verdünnten Zustande dem fauler Aepfel etwas ähnlich ist. Es schmeckt brennend scharf, siedet etwa bei $79,5^{\circ}$, ist leichter als Wasser, löslich nach allen Verhältnissen in Wasser, Alkohol, Aether und Oelen; es reagirt stark alkalisch, bildet mit salzs. Gas reichliche Nebel, vereinigt sich mit concentrirten Säuren unter starker Erwärmung. Es schlägt Eisenoxyd- und Kupferoxydsalze nieder, letzteres Oxyd löst sich in der überschüssigen Base mit blauer Farbe auf. Es bildet mit Platin- und Quecksilberchlorid lösliche, mit Goldchlorid eine gelbe unlösliche Verbindung. A. stellt für das Petinin die Formel $C_8H_{10}N$ auf; sie verlangt 66,66 Kohlenstoff, 13,88 Wasserstoff und 19,37 Stickstoff; gefunden wurden 66,66 Kohlenstoff und 13,97 Wasserstoff. Das Petinin-Platinchlorid gab 35,34 — 35,54 und 35,51 pC. Platin, 16,93 Kohlenstoff und 4,17 Wasserstoff; die Rechnung nach der Formel $C_8H_{10}N$, HCl , $PtCl_2$ verlangt 17,26 Kohlenstoff, 3,96 Wasserstoff und 35,45 Platin. Gerhardt (1) hält es für wahrscheinlicher, daß das Petinin $C_8H_{11}N$ sei; die berechneten Procente sind aber darnach für die Base 65,75 Kohlenstoff und 15,0 Wasserstoff, für das Platin-Doppelsalz 17,2 Kohlenstoff, 4,3 Wasserstoff und 35,26 Platin. Nach der letzteren Formel wäre das Petinin die Base in der Reihe der Buttersäure, welche den von Wurtz kürzlich entdeckten, aus der Methyl- und Aethylreihe, C_2H_5N und C_4H_7N entspräche.

Die Petininsalze sind leicht krystallisirbar, unveränderlich an der Luft, löslich in Wasser und unzersetzt sublimirbar, wenn sie eine flüchtige Säure enthalten. Das neutrale schwefels. Petinin geht beim Verdampfen seiner Auflösung in blättriges, an feuchter Luft zerfließliches saures Salz über; das salpetersaure sublimirt in feinen wolligen, das salzsaure in nadelförmigen Krystallen. Das Platindoppel-

(1) J. pharm. [3] XIV, 378; Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 121.

salz schieft aus heißem Wasser in goldgelben, dem Jodblei ähnlichen Blättchen an. — Von concentrirter Salpetersäure wird das Petinin nur schwierig zersetzt; von unterchlorig. Kalk wird es augenblicklich zerlegt, unter Entwicklung eines sehr stechenden Geruchs; die Lösung bleibt farblos. Bromwasser scheidet aus wässriger Petininlösung ein schweres gelbes, in Säuren unlösliches Oel ab, während bromwasserstoffs. Petinin in Lösung bleibt.

Picolin.

In einer 1846 erschienenen Abhandlung (1) zeigte Anderson, daß das Steinkohlentheeröl neben Anilin, Leukol und Pyrrol eine mit ersterem isomere Base enthält, die er *Picolin* nannte. Seine dort ausgesprochene Vermuthung, daß diese Base die Hauptmasse des von Unverdorben als Bestandtheil des Dippel'schen Thieröls beschriebenen Odorins ausmache, hat sich bei näherer Untersuchung nun als richtig erwiesen. Das Picolin, $C_{12}H_7N$, ist in der zwischen 132 und 137° übergehenden Portion der flüchtigen Basen enthalten. Die von A. angestellte Analyse der aus Knochenöl dargestellten reinen Base wie ihres Platindoppelsalzes lassen hierüber keinen Zweifel.

Anilin.

Barral (2) hat die Dampfdichte des Anilins = 3,210 gefunden. Die Rechnung nach der 4 Vol. Dampf entsprechenden Formel $C_{12}H_7N$ verlangt 3,202.

Anilin und
Phosphor-
säure.

Nicholson (3) hat die Verbindungen des Anilins mit Phosphorsäure untersucht; es gelang ihm Salze dieser Base mit gewöhnlicher, mit Pyro- und Meta-Phosphorsäure darzustellen. Versetzt man concentrirte dreibasische Phosphorsäure mit überschüssigem Anilin, so erhält man einen Krystallbrei, der aus heißem Alkohol in perlmutterglänzenden, dem thionurs. Ammoniak ähnlichen Blättchen anschießt. Das Salz reagirt schwach sauer, ist leicht löslich in Aether und Wasser, wenig in kaltem Alkohol,

(1) Aus Trans. of the roy. soc. of Edinb. XVI, in Ann. Ch. Pharm. LX, 80; J. pr. Chem. XL, 124; Pharm. Centr. 1846, 897; Berzelius' Jahresber. XXVII, 370; J. pharm. [3] XI, 393. — (2) Ann. ch. phys. [3] XX, 348. — (3) Ann. Ch. Pharm. LIX, 213; Phil. Mag. [3] XXX, 10.

schmilzt in gelinder Wärme und verliert bei 100° Anilin, indem es roth wird. Es ist $= 2(C_{12}H_7N, HO), HO, PO_5$. — Fügt man zu der Lösung dieses Salzes dreibasische Phosphorsäure, so lange noch mit Chlorbarium eine Fällung erfolgt, und verdampft im Wasserbade, so erhält man weisse, an der Luft rosenroth werdende Nadeln, die sich leicht in Aether, Alkohol und Wasser, in letzterem unter Zersetzung, lösen. Es ist $= (C_{12}H_7N, HO), 2 HO, PO_5$. — Ein Salz in dem die drei basischen Wasseräquivalente durch Anilin ersetzt sind, konnte nicht erhalten werden.

Anilin und
Phosphor-
säure.

Aus Pyrophosphorsäure fällt auf Zusatz von Anilin ein Gemenge von neutralem und saurem Salz nieder; erwärmt man den Niederschlag mit überschüssiger concentrirter Säure bis alles gelöst ist, und verdampft, so erhält man weisse, an der Luft sich röthende Nadeln des sauren Salzes, $(C_{12}H_7N, HO), HO, PO_5$, die löslich in Wasser, unlöslich in Alkohol und Aether sind und sehr sauer reagiren.

Metaphosphors. Anilin, $(C_{14}H_7N, HO) PO_5$, fällt als weisse gallertartige Masse nieder, wenn man einen grossen Ueberschuss von Anilin oder seiner Lösung in Alkohol oder Aether zu concentrirter Metaphosphorsäure bringt. Es reagirt sauer, ist unlöslich in Alkohol und Aether, löslich in Wasser, und geht bei längerem Kochen in gewöhnlich phosphors. Anilin über.

Nach einer vorläufigen Mittheilung von Raewsky (1) geht das Anilin mit Platinchlorür Verbindungen ein, von denen die eine, violette, $PtCl, C_{12}H_7N$, dem grünen Salze von Magnus entsprechende wie dieses in mehreren isomeren Zuständen auftritt; die andere, rosenrothe, $PtCl, 2 C_{12}H_7N$, entspricht Reiset's Ammoniakverbindung; die dritte, granatrothe, ist das salzs. Salz der violetten und hat die Formel $PtCl, C_{12}H_7N, HCl$.

Anilin und
Platinchlorür.

A. W. Hofmann hat das Verhalten des Anilins und einiger analoger Basen zu Jod, zu Cyan und Chlorcyan

Aus dem
Anilin hervor-
gehende
Basen.

(1) Compt. rend. XXVI, 424.

studirt und durch seine umfassenden und wichtigen Untersuchungen die organische Chemie mit einer Anzahl neuer Verbindungen bereichert, die grofsentheils dem Gebiet der organischen Basen angehören.

Jodanilin.

Wasserfreies Anilin erstarrt, mit $1\frac{1}{4}$ Th. Jod nach und nach versetzt, zu einer braunen krystallinischen Masse, die neben freiem Jod, einem braunen, in Säuren, Alkalien und Wasser unlöslichen jodhaltigen Zersetzungsproducte des Anilins und jodwasserstoffs. Anilin vorzugsweise aus jodwasserstoffs. Jodanilin besteht (1). Versetzt man diese Masse mit verdünnter Salzsäure (von 1,11 spec. Gew.), so scheidet sich schwerlösliches salzs. Jodanilin ab, während salzs. Anilin in Lösung bleibt. Concentrirte Säure würde auch letzteres Salz ausfällen. Das salzs. Jodanilin wird mit etwas Salzsäure gewaschen und seine Lösung in heifsem Wasser mit Thierkohle entfärbt, worauf es in der Benzoësäure ähnlichen perlmutterglänzenden Tafeln krystallisirt. Ammoniak fällt aus der Lösung dieses Salzes weifses, krystallinisches Jodanilin, das man durch Fällung seiner alkoholischen Lösung mit Wasser ganz rein erhält. Beim Verdampfen der Lösung im Wasserbade bilden sich gelbe, beim Erkalten krystallinisch erstarrende Oeltropfen.

Die Zusammensetzung des Jodanilins entspricht der Formel $C_{12}H_6JN$. — Seine Bildung erfolgt also einfach, indem 1 Aeq. Wasserstoff durch 1 Aeq. Jod substituirt wird. Das Jodanilin gleicht in vieler Beziehung dem Anilin und mehr noch dem Chlor- und Bromanilin. Es hat denselben weinartigen Geruch, denselben scharfen Geschmack, dieselbe Löslichkeit in Alkohol, Aether, Holzgeist, Aceton, Schwefelkohlenstoff, fetten und flüchtigen Oelen. Es ist nur wenig löslich in Wasser, schwerer als dieses, und wirkt nicht auf Pflanzenfarben. Es bildet nur prismatische Krystalle, die bei 60° schmelzen und bei 51° erstarren; es ist

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 1; Chem. Soc. Qu. J. I, 269; Ann. ch. phys. [3] XXV, 230.

unzersetzt destillirbar, sowohl für sich wie mit Wasser; es Jodanilin.
färbt Fichtenholz und Hollundermark intensiv gelb, wie Chlor- und Bromanilin, erzeugt aber mit unterchlorigs. Kalk nicht die purpurviolette Reaction des Anilins. Mit fester Chromsäure zersetzt es sich ohne Entzündung. An der Luft wird es, unter Abscheidung von Jod, nach und nach schwarz.

Die Salze des Jodanilins krystallisiren eben so leicht als die des Anilins, sie sind weniger löslich und durch Anilin, unter Abscheidung von Jodanilin, zersetzbar. Jodanilin fällt Thonerde-, aber nicht Eisenoxyd- und Zinkoxydsalze. — Das *salzs. Jodanilin*, $C_{12}H_6JN$, HCl , krystallisirt in Blättern und breiten dünnen Nadeln, die schwer löslich in kaltem Wasser und concentrirter Salzsäure, löslich in Alkohol, unlöslich in Aether sind. Das *bromwasserstoffsäure* gleicht ihm in jeder Beziehung; das *jodwasserstoffsäure* ist leichter löslich und schnell zersetzbar. *Schwefels. Jodanilin*, $C_{12}H_6JN$, SO_3 , HO , krystallisirt in glänzenden Schuppen, deren wässrige Lösung sich beim Sieden zu zerlegen scheint. *Oxals. Jodanilin*, $C_{12}H_6JN$, C_2O_3 , HO , bildet lange abgeplattete Nadeln, wenig löslich in Alkohol und Wasser, unlöslich in Aether. Das löslichere, in haarfeinen Nadeln anschliessende *salpeters. Salz* wird durch *salpeters. Silberoxyd* nicht gefällt. Das *Jodanilin-Platinchlorid*, $C_{12}H_6JN$, HCl , $PtCl_2$, ist orange gelb, krystallinisch. — Mit Goldchlorid giebt *salzs. Jodanilin* einen scharlachrothen, leicht zersetzbaren Niederschlag.

Das Jodanilin wird von Kalium leicht zerlegt, unter Bildung von Jod- und Cyankalium. Weingeistige oder wässrige Kalilösung ist ohne zersetzende Einwirkung; Chlor liefert damit Trichloranilin und Chlorphenissäure, unter Entwicklung von Chlorjod. Brom verhält sich ebenso. Chlorsaures Kali und Salzsäure erzeugt, wie mit Anilin, Chloranil und Chlorphenissäure; Salpetersäure liefert Pikrinsäure. Kaliumamalgam, so wie metallisches Zink und eine freie Säure, regenerirt aus Jodanilinsalzen Anilin.

Cyananilin.

Cyangan wird von Anilin unter Wärmeentwicklung absorbiert; die Flüssigkeit wird nach und nach undurchsichtig, riecht nach Blausäure und es bildet sich ein krystallinischer Absatz, der vorzugsweise aus einer von Hofmann *Cyananilin* genannten Salzbase besteht, wenn man nur so lange Cyan einleitet, bis die Flüssigkeit stark danach riecht (1). Eine kalte Lösung von Anilin in 5—6 Th. Weingeist verhält sich ganz wie reines Anilin, liefert aber reinere Krystalle, weshalb man zur Darstellung des Cyananilins zweckmäßig diese wählt. Löst man die, durch Waschen mit etwas Alkohol von der Mutterlauge befreiten, Krystalle in verdünnter Schwefelsäure und versetzt mit Ammoniak, so fällt noch gelbliches Cyananilin nieder, das aus heißem Alkohol wiederholt krystallisiert farblos wird. H. stellt für das Cyananilin die Formel $C_{14}H_7N_2 = Cy, C_{12}H_7N$ auf, wonach es also durch directe Vereinigung von Anilin und Cyan entsteht.

Das Cyananilin bildet farb-, geruch- und geschmacklose, silberglänzende Krystallfitter; es ist schwer löslich in Alkohol, Aether, Holzgeist, Schwefelkohlenstoff, Benzol, fetten und ätherischen Oelen, ganz unlöslich in Wasser; schmilzt zwischen 210 und 220° und sinkt im geschmolzenen Zustande im Wasser unter, während die Krystalle darauf schwimmen; über den Schmelzpunkt erhitzt zerfällt es, unter Verkohlung, in Anilin und Cyanammonium; es ist auch nicht mit Wasserdämpfen flüchtig. Fichtenholz wird von sauren Lösungen der Base nicht gelb gefärbt, ebenso wenig zeigt sie mit Bleichkalk oder Chromsäure die Reactionen des Anilins.

Mit Säuren längere Zeit in Berührung erleidet das Cyananilin eine Zersetzung, bei der Anilin abgeschieden wird, indem das Cyan mit den Elementen des Wassers sich umsetzt; dies erschwert die Darstellung reiner Cyananilinsalze, die im Uebrigen den Anilinsalzen entsprechend zusammen-

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 129; Chem. Soc. Qu. J. I, 159; Ann. ch. phys. [3] XXIV, 67; J. pharm. [8] XIV, 805.

gesetzt sind. — *Salzs. Cyananilin*, $\text{Cy}, \text{C}_{12}\text{H}_7\text{N}, \text{HCl}$, fällt Cyananilin.
 aus der Auflösung der Base in siedender verdünnter Säure
 auf Zusatz des gleichen Vol. rauchender in farblosen Kry-
 stallen nieder, die sich mit Aether auswaschen lassen. Es
 ist leicht löslich in Wasser und Alkohol und von süßem
 Geschmack. Im feuchten Zustande zersetzt es sich. Das
brom- und jodwasserstoffs. Cyananilin sind dem salzs. ganz
 ähnlich; das letztere ist noch leichter zersetzbar. Das
salpeters. Salz, $\text{Cy}, \text{C}_{12}\text{H}_7\text{N}, \text{NO}_3, \text{HO}$, ist schwer löslich,
 schiefst in langen Nadeln an und bildet mit salpeters. Sil-
 beroxyd ein krystallisirbares Doppelsalz. Das *Cyananilin-*
platinchlorid, $\text{Cy}, \text{C}_{12}\text{H}_7\text{N}, \text{HCl}, \text{PtCl}_3$, fällt in orange-
 gelben, in Wasser und Alkohol löslichen Nadeln nieder,
 wenn man eine siedend gesättigte Auflösung der Base in
 ziemlich starker Salzsäure mit Platinchlorid mischt. Es
 zersetzt sich sehr leicht in Anilinplatinchlorid, Platinsalmiak
 und andere Producte. Goldchlorid fällt aus einer alko-
 holischen oder salzs. Cyananilinlösung ein orangegelbes Doppel-
 salt, $\text{Cy}, \text{C}_{12}\text{H}_7\text{N}, \text{AuCl}_3$, dessen Lösung in Aether Anilin-
 goldchlorid absetzt.

Nicotin und Leucolin (Chinolin) liefern mit Cyan keine
 dem Cyananilin entsprechende Base, sondern braune, nicht
 krystallinische Zersetzungsproducte, die keine basischen
 Eigenschaften besitzen.

Gasförmiges Chlorcyan, sowie man es durch Einwir- Melanilin.
 kung von Chlor auf befeuchtetes Cyanquecksilber erhält,
 wird von wasserfreiem Anilin unter beträchtlicher Tempe-
 raturerhöhung verschluckt, die Flüssigkeit wird dunkel und
 verdickt sich nach und nach zu einer krystallinischen
 Masse (1). Wird, auch beim Erwärmen, kein Chlorcyan
 mehr absorhirt, so hat man eine durchsichtige, braune,
 harzähnliche Substanz, die zum grofsen Theil aus dem
 salzs. Salze einer organischen Base besteht, welche Hof-
 mann als *Melanilin* bezeichnet. Man löst sie, zur Gewin-

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 129; Pharm. Centr. 1849, 17; Chem.
 Soc. Qu. J. I, 286.

Melanilin. nung dieser Base, in heißem Wasser unter Zusatz von etwas Salzsäure, fällt mit Kali, und krystallisirt das ausgeschiedene, mit kaltem Wasser ausgewaschene Melanilin aus einer Mischung von gleichen Theilen Alkohol und Wasser. Es ist nach der Formel $C_{26}H_{13}N_3 = C_{12}H_7N, C_{12}H_6N, Cy$, zusammengesetzt, wonach sich also bei seiner Bildung 2 Aeq. Anilin mit 1 Aeq. Chlorcyan in 1 Aeq. salzs. Melanilin umgesetzt haben: $2 C_{12}H_7N + C_2NCl = C_{26}H_{13}N_3, HCl$.

Das Melanilin bildet weißse, harte, an feuchter Luft sich röthende Krystallblättchen, die ohne Geruch, aber von bitterem Geschmack sind. Es schmilzt bei $120 - 130^\circ$, zersetzt sich bei $140 - 150^\circ$ in Anilin, das überdestillirt, und in eine durchsichtige bräunliche Masse, die zurückbleibt. Die krystallisirte Base schwimmt auf Wasser, die geschmolzene sinkt darin unter. In Wasser ist das Melanilin schwer löslich, in Alkohol, Aether, Holzgeist, Aceton, Schwefelkohlenstoff, fetten und ätherischen Oelen löst es sich leicht. Es reagirt kaum auf Pflanzenfarben, seine Salze färben Fichtenholz nicht gelb, und mit Chromsäure und Bleichkalk erleiden sie nicht die eigenthümliche Veränderung, welche die Salze des Anilins characterisirt.

Das Melanilin bildet mit den meisten Säuren krystallisirbare, farblose oder röthliche Salze, deren Lösungen bitter schmecken und mit ätzenden und kohlens. Alkalien weißes, schnell krystallisirendes Melanilin fallen lassen. — *Schwefels. Melanilin*, $C_{26}H_{13}N_3, SO_3, HO$, bildet rhombische, zu Sternen vereinte Blättchen, löslich in Wasser, Alkohol und Aether. *Salpeters. Melanilin*, $C_{26}H_{13}N_3, NO_3, HO$, fällt in Form von Nadeln aus seiner heißen Auflösung so vollständig nieder, daß die Mutterlauge durch Alkalien nur noch schwach getrübt wird, weshalb man Salpetersäure zur Erkennung der Base benützen kann. Es ist auch in heißem Alkohol, kaum in Aether löslich. *Saures oxals. Melanilin*, $C_{26}H_{13}N_3, 2 C_2O_3, 2 HO$, ist dem schwefels. Salz ähnlich, in Wasser und Alkohol schwer, in Aether fast unlöslich; es zerfällt beim Erhitzen in gleiche Vol.

Kohlensäure und Kohlenoxyd und in Anilin, das von einem durchdringend riechenden, auch bei der Bereitung des Cyananilins auftretenden Körper begleitet ist; der Retortenhals belegt sich mit strahligen Krystallen und es bleibt ein harzartiger Rückstand. Die *phosphors.* Salze sind leicht löslich, nur allmählig krystallisirend; das *salzs.* ist das löslichste und trocknet zu einem Gummi ein, das nur langsam krystallinisch wird; *bromwasserstoffs.* *Melanilin*, $C_{26}H_{13}N_3$, HBr, krystallisirt leicht in sternförmig gruppirten Nadeln, die in concentrirter Säure weniger löslich sind, als in Wasser. *Jodwasserstoffs.* *Melanilin*, $C_{26}H_{13}N_3$, HJ, scheidet sich beim Behandeln der Base mit concentrirter Säure als gelbes, nach und nach krystallinisch erstarrendes Oel ab, das sich in heißem Wasser und Alkohol löst und an der Luft zersetzt. *Fluorwasserstoffs.* *Melanilin* ist krystallisirbar, leicht löslich in Wasser. *Melanilin-Platinchlorid*, $C_{26}H_{13}N_3$, HCl, Pt Cl₂, ist ein blafsgelber, krystallinischer Niederschlag, etwas löslich in heißem Wasser. *Melanilin-Goldchlorid*, $C_{26}H_{13}N_3$, HCl, Au Cl₃, setzt sich aus der Mischung der *salzs.* Base mit Goldchlorid in goldglänzenden Nadeln oder als gelber Niederschlag ab, der schwer löslich in Wasser, etwas löslicher in Alkohol und sehr leicht löslich in Aether ist. *Salpeters.* *Melanilin-Silberoxyd*, $2 C_{26}H_{13}N_3$, AgO, NO₂, setzt sich aus alkoholischen Lösungen in harten weißen Krystalldrusen ab. Quecksilberchlorid liefert mit *Melanilin*-lösungen eine weiße, aus säurehaltigem Wasser in Nadeln anschießende Verbindung.

Melanilin.

Ueberschüssiges Chlorwasser schlägt aus *salzs.* *Melanilin* eine harzartige Masse nieder, die keine basischen Eigenschaften besitzt; setzt man das Chlorwasser allmählig zu, bis sich der harzartige Körper nicht länger wieder auflöst, filtrirt und verdampft, so erhält man nadelförmige Krystalle oder ein krystallinisch erstarrendes Oel, die das *salzs.* Salz einer chlorhaltigen, von H. *Dichloromelanilin* genannten Base sind. Ammoniak giebt in der wässerigen Lösung dieses Salzes einen weißen Niederschlag, der aus

Metamorphosen des
Melanilins.
Dichloromelanilin.

Alkohol in harten Krystallblättchen anschießt. Das Platindoppelsalz dieser Base ist krystallinisch, orangegelb und nach der Formel $C_{26}H_{11}Cl_2N_3, HCl, PtCl_2$ zusammengesetzt.

Dibromomelanilin.

Brom verhält sich gegen salzs. Melanilin genau wie Chlor. Das Dibromomelanilin, $C_{26}H_{11}Br_2N_3$, ist fast unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und Aether und von sehr bitterem Geschmack. Ueber seinen Schmelzpunkt erhitzt zerfällt es in Bromanilin und in einen harzartigen Rückstand. Das salzs. Salz, $C_{26}H_{11}Br_2N_3, HCl$, ist in Wasser schwer löslich und krystallisirt in seidenglänzenden langen Nadeln; das in goldglänzenden Schuppen anschießende Platindoppelsalz, $C_{26}H_{11}Br_2N_3, HCl, PtCl_2$, ist in Wasser fast unlöslich.

Dijodomelanilin.

Diese Base bildet sich nicht durch directe Einwirkung von Jod auf Melanilin, wohl aber wenn man Chlorcyan in eine ätherische Lösung von Jodanilin leitet. Es fällt anfangs salzs. Jodanilin nieder, das endlich in harzartiges, nach und nach krystallinisch werdendes salzs. Dijodomelanilin übergeht, aus welchem durch Kali die den vorhergehenden ganz ähnliche Base abgeschieden wird. Sie ist $= C_{26}H_{11}J_2N_3$; ihre Bildung erklärt sich dann nach der Gleichung: $2 C_{12}H_6 JN + C_2 NCl = C_{26}H_{11}J_2N_3 + HCl$. — Das Platindoppelsalz ist $C_{26}H_{11}J_2N_3, HCl, PtCl_2$.

Dinitromelanilin.

Rauchende Salpetersäure verwandelt das Melanilin, je nach der Dauer der Einwirkung, in eine orangegelbe Base oder in citronengelbe Prismen einer Säure, die mit Alkalien scharlachrothe Salze bildet. Beide sind noch nicht weiter untersucht, die Base ist aber nicht das Dinitromelanilin, das von Hofmann durch Einwirkung von Chlorcyan auf eine Lösung von Nitranilin in Aether erhalten wurde. Durch ein Alkali aus dem salzs. Salz abgeschieden bildet das Dinitromelanilin glänzende, hellgelbe Krystallschuppen, die ganz unlöslich in Wasser und schwer löslich in Alkohol und Aether sind; beim Erhitzen zerfällt es, ähnlich dem Melanilin, in einen braunen Rückstand und in

Nitrilanilin. Die Analyse ergab die Formel $C_{26}H_{11}(NO_4)_2N_3$, die auch in der Analyse des in Wasser schwer löslichen salzs. Salzes und des Platindoppelsalzes ihre Bestätigung fand.

Eine mit Cyangas gesättigte alkoholische Auflösung von Melanilin erstarrt nach einigen Stunden zu einem Krystallbrei, indem an die Stelle des Cyangeruchs der von Blausäure tritt. Nach dem Abtropfen der braunen Mutterlauge erhält man durch Umkrystallisiren aus Alkohol das Dicyanomelanilin in schwach gelb gefärbten Nadeln. Es hat die Formel $C_{30}H_{13}N_5 = Cy_2, C_{26}H_{13}N_3$; und entsteht demnach einfach aus dem Melanilin durch Aufnahme von 2 Aeq. Cyan, ähnlich dem Cyananilin. Es zerfällt beim Erhitzen in Anilin, Cyanammonium und in einen harzartigen Rückstand. In verdünnten Säuren ist es zwar sehr leicht löslich und daraus durch Alkalien wieder unverändert fällbar, wenn diese sogleich zugesetzt werden; läßt man aber die salzs. Lösung nur wenige Minuten stehen, oder erhitzt man sie, so setzt sich ein krystallinisches, noch nicht untersuchtes Zersetzungsproduct ab, während die Mutterlauge Ammoniak enthält.

Dicyano-
melanilin.

Bromcyan verwandelt das Anilin in bromwasserstoffs. Melanilin, Jodcyan dagegen in Jodanilin, unter Freiwerden von Blausäure.

E. Ch. Nicholson (1) hat diese Base aus dem Cumol erhalten, in gleicher Weise wie das Anilin aus dem Benzol gewonnen wird. Aus der Auflösung des Cumols in rauchender Salpetersäure fällt auf Wasserzusatz Nitrocumol, $C_{10}H_{11}NO_4$, nieder, dessen weingeistige Lösung zuerst mit Ammoniak, dann mit Schwefelwasserstoff gesättigt wird, was so oft wiederholt wird, bis alles Nitrocumol verschwunden ist. Durch Destillation der gesättigten Flüssigkeit wird die Zersetzung beschleunigt. Aus dem Rückstand der letzten Destillation zieht man das Cumidin mit

Cumidin.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 58; Chem. Soc. Qu. J. I, 2; im Ausg. Pharm. Centr. 1848, 188.

	Mit Ammoniak:	Mit Schwefelcyankallium:
Strychnin	sogleich prismatische Krystalle.	platte, abgestutzte oder in spitzem Winkel zugeschärfte Nadeln.
Brucin	sternförmige Gruppen.	feine Büschel.
Morphin	Rhomboëder.	amorph.
Narcotin	verzweigte Krystalle.	amorph.
Cinchonin	concentrische Nadeln oder körnige Massen.	sechseckige Krystalle mit unregelmäßigen und platten rectangulären gemischt.
Atropin	amorphe Masse.	—

Constitution
der
organischen
Basen.

Fresenius (1) hat die Ansicht entwickelt, daß die sauerstoffhaltigen organischen Basen (z. B. Strychnin, Caffein) — ohne Rücksicht auf ihre Entstehung, ob natürliche oder künstliche — wenn sie mehr als 1 Aeq. Stickstoff enthalten, dem Nitränilin analog zusammengesetzt seien, d. h. er betrachtet sie als einfache Basen (zu welchen Anilin, Nicotin, Sinamin gerechnet werden), in welchen 1 Aeq. Wasserstoff durch 1 Aeq. eines Stickstoffoxyds (NO , NO_2 , NO_3 , NO_4 und NO_5) vertreten seien. A. W. Hofmann (2) hat auf die Willkürlichkeit dieser Ansicht aufmerksam gemacht, sofern die Existenz des Hydrocyanharmalins, Cyananilins und der anderen hierher gehörigen, von Hofmann entdeckten Basen beweist, daß ein Mehrgehalt von Stickstoff auch in Form einer Cyanverbindung darin enthalten sein kann. — Hofmann (3) giebt eine Zusammenstellung aller Thatsachen, die für die Ansicht von Berzelius sprechen, wonach die organischen Basen gepaarte Ammoniakverbindungen sind. Das Cyananilin, Melanilin u. s. w. sind dann gepaarte Basen zweiter Ordnung, worin sich dem Ammoniak außer dem Paarling $\text{C}_{12}\text{H}_4 = \text{An}$ noch andere Verbindungen, wie Cyan u. s. w. zugelegt haben. Das Anilin ist hiernach $\text{NH}_3 + \text{An}$; das Cyananilin $\text{NH}_3 + \text{AnCy}$; das Melanilin $\text{NH}_3 + \text{An}, \text{AdCy An}$; das Dicyanomelanilin $\text{NH}_3 + \text{An Cy}, \text{Ad Cy An Cy}$.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 149; Pharm. Centr. 1847, 332. —

(2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 148. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 166; Chem. Soc. Qu. J. I, 312.

Aus dem rohen Holzgeist hatten Scanlan und nach ihm Gregory eine in gelben Nadeln krystallisirende Substanz erhalten, und ersterer als Eblanin, letzterer als Pyroxanthin bezeichnet; Gregory (1) stellte sie dar durch Sättigen des bei der Destillation von rohem Holzgeist zuerst Uebergehenden mit Kalk, Destilliren, Ausziehen des Rückstands mit Salzsäure und dann mit kleinen Portionen Alkohol, welcher zuerst ein Harz, dann Pyroxanthin auflöst. Schweizer (2) erhielt denselben Körper, als er bei fractionirter Destillation von rohem Holzgeist im Wasserbad das Destillat, als das übergehende kaum mehr brennbar war, besonders auffing und mit Kali übersättigte; es bildete sich bald ein chromgelber Niederschlag, welcher wiederholt mit kleinen Mengen kochenden Alkohols behandelt an diesen zuerst ein Harz, dann Pyroxanthin abgab. Da die Flüssigkeit, aus welcher das Pyroxanthin durch Kali erhalten wurde, ungefärbt war, eine selbst verdünnte Lösung von Pyroxanthin jedoch intensiv gelb ist, so vermuthete Schweizer, das Pyroxanthin werde erst durch die Einwirkung des Kalis auf einen in der Flüssigkeit enthaltenen eigenthümlichen Körper gebildet. Letzteren erhielt er isolirt, indem er die erwähnte Flüssigkeit von der Destillation des rohen Holzgeistes mit überschüssigem Aether unter öfterem Umschütteln 24 Stunden lang zusammen stehen liefs; bei der Destillation der ätherischen Schicht blieb ein schweres bräunlich gefärbtes Oel, welches wiederholt mit Wasser gewaschen, dann durch Destillation mit Wasser von einem dunkelbraunen Harz getrennt und nochmals mit Wasser rectificirt wurde. So erhielt er eine Flüssigkeit, welche schwerer als Wasser ist, unangenehm nach geräucherten Fischen riecht, beissend schmeckt, in Wasser schwierig aber vollständig löslich ist und sich aus der gesättigten heifsen Lösung bei dem Erkalten theilweise ausscheidet, in Weingeist, Holzgeist und Aether leicht löslich ist, und

Methylver-
bindungen
und dahin
Gehöriges.
Rohrer Holz-
geist.
Neuer Körper
darin.

(1) Ann. Ch. Pharm. XXI, 143. — (2) Aus Nr. 21 der Mittheil. der naturforsch. Gesellsch. in Zürich, in J. pr. Chem. XLIV, 129.

ohne bedeutende Zersetzung nicht für sich destillirt werden kann. Namentlich unter dem Einfluss von Luft und Licht färbt sie sich gelblich; bei -28° gesteht sie zu einer weissen fettartigen Masse. Kali, Baryt und Kalk bewirken mit der wässerigen oder geistigen Lösung Bildung von Pyroxanthin, kohlens. Alkalien dieselbe in der Wärme; Ammoniak dieselbe in der Kälte erst nach mehreren Stunden, beim Sieden in einigen Minuten. Ausser dem Pyroxanthin entsteht bei dieser Zersetzung ein indifferentes Harz und eine flüchtige Säure, welche Quecksilberoxydsalze äusserst leicht reducirt.

Einwirkung
von Chlor auf
Holzgeist.

Bouis (1) hat die Einwirkung von Chlor auf (reinen?) Holzgeist untersucht. Trocknes Chlorgas wird im zerstreuten Licht von Holzgeist absorbirt; die Flüssigkeit erhitzt sich, und färbt sich vorübergehend rosenroth; es entwickelt sich Salzsäure, ein mit grüner Farbe brennendes Gas und später Kohlensäure. Unterbricht man die Einwirkung, wenn eine ölige Schicht unten im Gefäss sich absetzt, so findet man nach einigen Stunden eine grosse Menge trichterförmiger, dem Chlornatrium ähnlicher, Krystalle; die Schicht öligiger Flüssigkeit, in welcher sie entstanden, wird in flachen Gefässen der Luft ausgesetzt fest, unter Ausstossung eines starken, die Augen reizenden Geruchs. Die Krystalle sind unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether, unveränderlich an der Luft, flüchtig; sie lassen sich gleich der Benzoësäure durch ungeleimtes Papier hindurch sublimiren, und zeigen sich dann als lange prismatische Nadeln. Sie schmelzen gegen 50° , fangen an zu sieden gegen 75° , aber der Siedepunkt steigt fortwährend. Ihre Zusammensetzung entspricht der Formel $C_{10}H_{10}Cl_2O_4$. Bouis bezeichnet sie als *chloromésitate de méthylène*; er glaubt, dass dieser Körper aus Methylal $C_6H_8O_4$ entstehe ($2[C_6H_8O_4] + Cl_2 = C_{10}H_{10}Cl_2O_4 + 2CO_2 + 6ClH$); das Methylal

(1) Ann. ch. phys. [3] XXI, 111; J. pr. Chem. XLII, 801; in Ausz. Compt. rend. XXV, 256; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 816; Pharm. Centr. 1847, 815. 902.

sie entstehen aus dem Holzgeist unter dem Einfluß des Einwirkung von Chlor auf Holzgeist.
 Chlors $3[C_2H_4O_2] + Cl_2 = C_6H_8O_4 + 2HCl + 2HO$
 und, bei der wechselnden Zusammensetzung und den
 Schwierigkeiten der Reinigung des käuflichen Holzgeistes,
 leicht auch schon fertig gebildet in diesem enthalten
 sind. Die besprochenen Krystalle scheinen von Kali und
 Ammoniak nur schwierig angegriffen zu werden; Salpeter-
 säure löst sie auf; mit Schwefelsäure geben sie eine Lö-
 sung, welche sich nach einiger Zeit schön rosenroth und
 bei geringer Erwärmung sogleich schwarz färbt. Trocknes
 Silber wirkt auf die trocknen Krystalle im zerstreuten Licht
 nicht ein; im direkten Sonnenlicht wird es von ihnen rasch
 zertrümmert und bildet eine ölige, erstickend riechende, in
 Wasser unlösliche, in Alkohol und Aether lösliche Flüs-
 sigkeit. — Bei längerer Einwirkung von Chlor auf Holz-
 geist verschwinden die schon gebildeten Krystalle, und die
 Flüssigkeit wird ölig. Als Endproduct bildet sich
 eine ölartige Flüssigkeit, welche gewaschen und getrocknet
 der Formel $C_6H_8Cl_4O_2$ entsprechende Zusammen-
 setzung ergab. Wird diese ölartige Flüssigkeit (deren
 Dampf die Augen stark reizt und auf die Haut ätzend
 wirkt) ungewaschen der Luft ausgesetzt, so gesteht sie zu
 Krystallen, perlmutterglänzenden, in Wasser, Alkohol und
 Aether leicht löslichen Krystallen; die wässerige Lösung
 fällt durch salpeters. Silberoxyd nicht gefällt und aus ihr
 fallen sich die Krystalle grofs und regelmäfsig ausgebildet
 aus, welche so dargestellt nur schwach riechen. Diese
 Krystalle schmelzen gegen 35° , fangen an zu kochen gegen
 100° , und zersetzen sich dabei unter Steigen des Siedepunkts.
 Die Zusammensetzung entspricht der Formel $C_6H_8Cl_4O_2$
 + $2HO$. Die Alkalien wirken heftig auf sie ein. Im luft-
 freien Raum verwittern sie unter Wasserverlust; mit wasser-
 stoffiger Phosphorsäure destillirt geben sie eine farblose flüch-
 tige Flüssigkeit $C_6H_8Cl_4O_2$, welche an der Luft unter
 Einwirkung von Wasser zu Krystallen wird. Die Verbin-

dungen $C_6H_3Cl_3O_2$ und $C_6H_2Cl_4O_2$ lassen sich als Aceton betrachten, in welchem Wasserstoff durch Chlor ersetzt ist.

Methyl. Hinsichtlich eines Körpers von der Zusammensetzung des hypothetischen Methyls vergl. unten die Zersetzung des Cyanäthyls durch Kalium.

Jodmethyl. Jodmethyl (C_2H_5J) wird nach Pierre (1) durch hineingeleitetes Chlorwasserstoffgas nicht angegriffen; leitet man hingegen an einem wenig erleuchteten Ort langsam Chlor in Jodmethyl, welches mit einer Schicht Wasser bedeckt ist, so färbt sich die Flüssigkeit sogleich braun und es entwickelt sich reines Chlormethylgas (C_2H_5Cl) unter Absatz von Jod.

Brommethyl. Pierre (2) hat auch Brommethyl (C_2H_5Br) untersucht. 50 Gew. Th. Brom werden vorsichtig (in kleinen Parthien) in 200 gereinigtem Holzgeist bei 5 bis 6° und bei Abschluss direkten Sonnenlichts gelöst; in einer tubulirten Retorte werden, bei einer Temperatur unter 5°, 7 Phosphor allmählig zugesetzt, und im Wasserbad langsam erhitzt; bei 7 bis 8° beginnt die Einwirkung und Erwärmung bis zum Schmelzen des Phosphors; von der erkalteten Flüssigkeit nimmt man die entstandene strohgelbe Schicht ab, und destillirt sie vorsichtig mit dem was etwa schon vorher überdestillirte; das Destillat wird mit sehr schwach alkalischem und mit reinem Wasser bei 0° gewaschen, mit Chlorcalcium bei 0° getrocknet, und bei einer 20 bis 22° nicht übersteigenden Temperatur im Wasserbad rectificirt. Man erhält eine farblose, neutrale, stark riechende Flüssigkeit von 1,664 spec. Gew., welche bei ungefähr 13° unter 759— Druck siedet und bei — 35°,5 noch ebenso durchsichtig und flüssig ist. Die Analyse entsprach der Formel C_2H_5Br .

Cyanmethyl. Ueber Cyanmethyl und seine Zersetzung durch wässriges Kali vergl. S. 547, über seine Bildung bei den Nitylen S. 592.

(1) Aus Recueil des trav. de la soc. d'émulat. pour les sc. pharm., Juillet 1847, 3, in J. pharm. [3] XIII, 156. — (2) Aus Recueil etc., Octobre 1847, 172, in J. pharm. [3] XIII, 157.

J. S. Muspratt (1) hat gefunden, daß starke Salpetersäure mit Schwefelcyanmethyl ($C_4H_3S_2N$, erhalten als schwere öartige Flüssigkeit von widrigem lauchartigem Geruch durch Destillation gleicher Volume der gesättigten Lösungen von methylätherschwefels. Kalk und von Schwefelcyankalium in einer geräumigen Retorte) *Methylunterschwefelsäure* bildet (dieselbe Säure, welche Kolbe früher aus der Chlorkohlenunterschwefelsäure, $C_2Cl_2S_2O_5$, HO darstellte, indem er sie in Berührung mit Zink der Einwirkung des electrischen Stroms aussetzte). Bezüglich der Darstellung der Säure und der Salze gilt das weiter unten bei der Aethylunterschwefelsäure in dieser Hinsicht Angegebene. Die Methylunterschwefelsäure ist geruchlos, und verträgt eine hohe Temperatur ohne Zersetzung. — Das Barytsalz ist leicht in Wasser löslich, und wird aus dieser Lösung durch Weingeist gefällt; im luftleeren Raum getrocknet ist es BaO , $C_2H_3S_2O_5 + HO$ (HO entweicht bei 100°). — Das Bleioxydsalz krystallisirt aus der wässerigen Lösung in schönen rhombischen Prismen, PbO , $C_2H_3S_2O_5 + HO$; das Wasser verliert es beim Erhitzen unter Aufblähen. — Das Kupferoxydsalz wird in schönen Krystallen, CuO , $C_2H_3S_2O_5 + 5HO$, bei langsamem Verdunsten der wässerigen Lösung erhalten.

Einwirkung
der Salpeter-
säure auf
Schwefelcyan-
methyl. —
Methylunter-
schwefel-
säure.

Bei Behandlung von Zweifach-Schwefelmethyl mit Salpetersäure erhielt Muspratt *Sulfmethylschwefelsäure*; das Bleisalz krystallisirt in schönen rhombischen Tafeln, PbO , $C_2H_3S_2O_4 + HO$, aus welchen beim Erhitzen wässerige Dämpfe von durchdringendem Geruch entweichen (2).

Einwirkung
der Salpeter-
säure auf
Zweifach-
Schwefel-
methyl. —
Sulfmethyl-
schwefel-
säure.

Zeise (3) und später Cahours (4) haben durch Einwirkung von Jod auf die Lösung des methylxanthons. Kali's

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 251; Chem. Soc. Qu. J. I, 45; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 273; J. Pharm. [3] XIII, 302. — (2) Mehrere Chemiker sind der Ansicht, die Sulfäthylschwefelsäure sei im hypothetisch-wasserfreien Zustand $C_4H_3S_2O_5$; die Sulfmethylschwefelsäure müßte dann $C_2H_3S_2O_4$ und gleich zusammengesetzt mit der vorhergehenden Säure sein. — (3) Ber. der dänischen Acad., April 1846, 55; Ann. Ch. Pharm. LXII, 375; J. pr. Chem. XL, 292; Pharm. Centr. 1847, 426; Ann. ch. phys. [3] XX, 121; Berzelius' Jahresber. XXVII, 549. — (4) Compt. rend. XXIII, 821; Ann. ch. phys. [3] XIX, 158; J. pr. Chem. XL, 335; Pharm. Centr. 1847, 183; Berzelius' Jahresber. XXVII, 549.

Bildung des
Methyloxyd-
Schwefel-
kohlenstoffs.

(KO , $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}$, 2CS_2) Methyloxyd-Schwefelkohlenstoff (Methyloxyd - Sulfocarbonat, $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}$, CS_2) hervorgebracht. Desains (1) ist der Ansicht, das erste Resultat der Einwirkung sei hier die Entstehung von Jodkalium und einer Verbindung $\text{C}_4\text{H}_3\text{S}_4\text{O}_2$, aus welcher erst bei der Destillation Methyloxyd - Schwefelkohlenstoff entstehe (vergl. unten bei der entsprechenden Aethylverbindung). Die Verbindung $\text{C}_4\text{H}_3\text{S}_4\text{O}_2$ wird nach ihm bei der Einwirkung einer Lösung von Jod in Holzgeist auf eine wässrige Lösung von methylxanthons. Kali in der Form öligler Tropfen erhalten, deren Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalt der angegebenen Formel entsprach.

Einwirkung
von Chlor auf
oxalsäures
Methyloxyd.

Cahours (2) hat gefunden, daß Chlor unter dem Einfluß direkten Sonnenlichts das oxals. Methyloxyd ($\text{C}_4\text{H}_3\text{O}_4$) rasch in die von Malaguti aufgefundene Verbindung $\text{C}_4\text{HCl}_2\text{O}_4$ verwandelt; bei weiterer Einwirkung verschwindet diese und geht über in einen festen, in perlmutterglänzenden weissen Blättchen krystallisirenden Körper $\text{C}_4\text{Cl}_3\text{O}_4$. Erwärmt schmilzt dieser und sublimirt dann unter Zersetzung eines Theils und unter Entwicklung von Chlorkohlenoxydgas (COCl). Wird der Dampf dieses Körpers durch eine auf 350° bis 400° erhitze Glasröhre geleitet, so zerfällt er vollkommen in Chlorkohlenoxyd und Kohlenoxyd ($\text{C}_4\text{Cl}_3\text{O}_4 = 3\text{COCl} + \text{CO}$). Aceton und Aether zersetzen diesen Körper rasch, unter Entwicklung von Chlorkohlenoxyd und unter Bildung flüssiger oder schleimiger nicht genauer untersuchter Verbindungen. Fixe Alkalien in wässriger Lösung geben damit Chloralkalimetall, kohlenst. und oxals. Alkali. Trocknes Ammoniakgas verwandelt ihn in ein Gemenge von Chlorammonium und Carbamid. Anilin und Nicotin zersetzen ihn rasch; die Producte sind nicht untersucht. Die verschiedenen Al-

(1) Ann. ch. phys. [3] XX, 496; J. pr. Chem. XLII, 292; im Ausz. Compt. rend. XXIII, 1089; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 325; Pharm. Centr. 1847, 806. — (2) Ann. ch. phys. [3] XIX, 342; J. pr. Chem. XL, 425; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 312; Pharm. Centr. 1847, 875.

kohole zersetzen ihn heftig, unter Entwicklung von Wärme und von Chlorkohlenoxydgas; Wasser scheidet dann ölige Producte ab, welche zur Entfernung von Salzsäure wiederholt gewaschen und durch Digestion mit Chlorcalcium getrocknet werden. — Bei Anwendung von Alkohol erhält man so ein öliges Product, welches bei 92° zu sieden anfängt, dessen Siedepunkt aber bis 190° allmählig steigt. Das im Anfang Ueberdestillirende giebt mehrmals rectificirt eine farblose, zwischen 94 und 96° kochende Flüssigkeit von heftigem, die Augen reizendem Geruch, $C_6H_5ClO_4$, also von der Zusammensetzung des ameisens. Aethyloxyds, worin 1 H durch 1 Cl vertreten ist. Das bei 187 bis 188° Ueberdestillirende ist Oxaläther, $C_2H_2O_4$. Die Einwirkung von Alkohol auf $C_4Cl_3O_4$ scheint also zu sein: $C_4Cl_3O_4 + 2 C_2H_5O_2 = 2 ClH + C_2H_5O_4 + C_6H_5ClO_4$. — Bei Anwendung von Holzgeist wird ein öliges Product erhalten, dessen Siedepunkt von 80 auf 162° steigt; die bei 78 bis 82° überdestillirende wasserhelle, erstickend riechende Flüssigkeit hat die Zusammensetzung des ameisens. Methyl- oxyds, worin 1 H durch 1 Cl ersetzt ist: $C_4H_3ClO_4$; die bei 162° überdestillirende ist oxals. Methyloxyd, $C_4H_3O_4$. — Das bei Anwendung von Fuselöl erhaltene ölige Product besteht aus einer bei 150 bis 160° siedenden Flüssigkeit (wahrscheinlich ebenso substituirtem ameisens. Amyloxyd, $C_{11}H_{11}ClO_4$) und bei 260° siedendem oxals. Amyloxyd $C_{11}H_{11}O_4$ (1).

Einwirkung
 von Chlor auf
 oxalsäures
 Methyloxyd.

Nach Cahours absorbirt das ameisens. Methyloxyd, besonders im directen Sonnenlicht, Chlorgas anfangs rasch, später langsamer, und 10 bis 15 Tage bei starker Beleuchtung sind nothwendig, bis die Einwirkung auf 20 bis 25 Grm. Substanz beendet ist. Die entstehende, von absorbirtem

Einwirkung
 von Chlor auf
 ameisens.
 Methyloxyd.

(1) In den Siedepunkten der verschiedenen Ameisenätherarten und der hier besprochenen Substitutionsproducte derselben zeigt sich eine einfache Regelmäßigkeit (für dieselbe Zusammensetzungsdifferenz findet sich übrigens in andern Fällen eine andre Siedepunkts-Differenz):

$C_4H_5O_4$	33°	} 45	$C_6H_5O_4$	55°	} 41	$C_{11}H_{11}O_4$	116°	} 44
$C_4H_5ClO_4$	78		$C_6H_5ClO_4$	96		$C_{11}H_{11}ClO_4$	160	

Einwirkung
von Chlor auf
ameisensa-
Methyloxyd.

Chlor gelbe, Flüssigkeit wird bei der Destillation farblos; das meiste geht zwischen 176 und 190° über und wird durch wiederholte Rectification zu einer farblosen, zwischen 180 und 185° siedenden Flüssigkeit von 1,724 spec. Gew. bei 12° und starkem erstickendem Geruch; es ist $C_4Cl_4O_4$, ameisens. Methyloxyd worin aller Wasserstoff durch Chlor ersetzt ist, ein mit Chlorkohlenoxyd ($CClO$) polymerer Körper. In letzteres Gas geht $C_4Cl_4O_4$ über, wenn es einer Hitze von 320 bis 350° ausgesetzt wird. Mit Alkohol oder Holzgeist erhitzt es sich; Zusatz von Wasser zu der Mischung scheidet die oben besprochenen Verbindungen $C_6H_5ClO_4$ oder $C_4H_3ClO_4$ aus. Wässerige, selbst concentrirte, Kalilösung zersetzt es nicht; wässriges Ammoniak sogleich selbst in der Kälte unter Wärmeentwicklung, Bildung von Chlorammonium, und Abscheidung weißer, perlmutterglänzender, in Wasser unlöslicher, in Aether löslicher Schuppen, welche Chloracetamid, $C_4H_2Cl_3NO_2$, sind.

Salicylsaures
Methyloxyd.
Einwirkung
von Salpeter-
Schwefel-
säure.

Wenn man, nach Cahours (1), salicyls. Methyloxyd ($C_{10}H_8O_6$) tropfenweise in eine Mischung gleicher Theile rauchender Schwefel- und Salpetersäure einträgt, und Erwärmung durch Zusatz von kaltem Wasser verhütet, so erhält man eine durchsichtige tief orangegelbe Flüssigkeit. Fügt man, sobald der letzte Tropfen salicyls. Methyloxyd sich nicht mehr löst, noch etwas von der Säuremischung zu, schüttelt bis zur vollständigen Auflösung, und verdünnt nach einigen Minuten mit dem 7- bis 8fachen Volum Wasser, so scheidet sich ein fester hellgelber Körper aus, welchen man durch Umkrystallisiren aus Alkohol rein erhält (in der alkoholischen Mutterlauge bleibt eine unten zu besprechende Substanz gelöst). So gereinigt bildet er schwachgelbliche Schuppen; er ist schwerer als Wasser, und schmilzt bei 124 bis 125° zu einer hellgelben Flüssigkeit, welche bei dem Erkalten faserig erstarrt. Seine Zusammensetzung ist $C_{10}H_8(NO_4)_2O_6$, salicyls. Methyloxyd,

(1) In der S. 387 angeführten Abhandlung. Im Ausz. Compt. rend. XXVII, 485; Inst. 1848, 351.

worin 2H durch 2NO₄ ersetzt sind; in Beziehung darauf, daß sich das salicyls. Methyloxyd wie eine Säure verhält (von dem Vorkommen in *Gaultheria procumbens* Gaultheriasäure genannt), nennt ihn Cahours *Binitrogaultheriasäure* (*acide gaulthérique binitrique*). Bei dem Auflösen in heißer etwas überschüssiger Ammoniakflüssigkeit bildet er ein bei langsamem Erkalten in gelben Nadeln krystallisirendes Salz, NH₄O, C₁₀H₆(NO₄)₂O₆, welches in kaltem Wasser wenig, in heißem sehr löslich ist, und in verdünnter Lösung mit salpeters. Silberoxyd versetzt ein chromgelbes Silberoxydsalz von entsprechender Zusammensetzung giebt. — Wird die Binitrogaultheriasäure in einem kleinen verschlossenen Gefäß mit Vorsicht erhitzt, so sublimirt sie unzersetzt zu kleinen glänzenden Blättchen; rasch erhitzt zersetzt sie sich. — In concentrirter Schwefelsäure löst sie sich, bis zu 30 oder 40° erwärmt, unzersetzt, und wird durch Wasser wieder abgeschieden; bei Erwärmung auf 75 bis 80° tritt hingegen eine heftige Einwirkung ein, Kohlensäure entwickelt sich, die Flüssigkeit wird roth; läßt man die Temperatur (durch Eintauchen in Wasser) nicht höher steigen, so findet nur diese Entwicklung von Kohlensäure statt; Zusatz von Wasser trübt dann die Flüssigkeit, und bei dem Erkalten setzen sich kleine gelbe Nadeln ab, welche in Alkohol und Wasser in der Hitze leicht löslich sind und bei dem Erkalten sich wieder abscheiden. Steigt die Temperatur über 100°, so entwickelt sich auch schweflige Säure, die Flüssigkeit schwärzt sich, und Wasser scheidet daraus nur braune amorphe Flocken ab. — Gewöhnliche oder rauchende Salpetersäure löst bei 30 bis 40° die Binitrogaultheriasäure ohne Zersetzung (Wasser scheidet diese wieder ab), aber bei dem Kochen wird letztere ganz in Pikrinsäure verwandelt. — Wässerige Alkalien lösen sie in der Kälte ohne Zersetzung, unter Bildung krystallisirbarer Salze; bei dem Kochen mit verdünnter Kalilauge wird aber die Säure zersetzt, und man erhält ein nur wenig lösliches, prächtig rothes Salz, welches mit verdünnter Salpetersäure

Salicylaures
Methyloxyd.
Einwirkung
von Salpeter-
Schwefel-
säure.

welcher mit dem Product der Einwirkung von wässerigem Ammoniak auf cyans. Aethyloxyd isomer ist. Dem letzteren, weiter unten zu besprechenden, verhält sich das cyans. Methyloxyd bezüglich der Zersetzungsproducte ganz analog.

Chloroform.

Ueber die Darstellung des Chloroforms (welches nach Huttmann (1), unter Berufung auf Porta's *Magia naturalis* [1567] und Scott's Briefe über Dämonologie, schon in früherer Zeit bekannt und als betäubendes Mittel angewandt worden sein soll) sind viele Arbeiten publicirt worden. Die Darstellung aus Weingeist mittelst Chlorkalk wurde beschrieben von Soubeiran (2), Meurer (3), Laroque und Huraut (4), Godefrin (5), Carl (6), und die im Großen von L. Kefsler (7); die aus einer Mischung von Chloräthyl und Weingeist mittelst Chlorkalk von Pierloz-Feldmann (8); die aus essigs. Natron mittelst Chlorkalk von R. Böttger (9); die aus essigs. Natron mittelst unterchlorigs. Natron von Reich (10). Ueber die Resultate prüfender Versuche hinsichtlich der Bereitung aus Weingeist oder aus essigs. Natron mittelst Chlorkalk hat Wackenroder (11) berichtet, hinsichtlich der aus Weingeist, Aceton und Holzgeist mittelst Chlorkalk Siemerling (12). (Bei allen Darstellungsarten des Chloroforms ist ein Ueberschuss von Kalk beim Chlorkalk wesentlich, Zusatz von Kalkmilch deshalb nützlich; der Absatz ist krystallinisch und eine

- (1) J. chim. méd. [3] IV, 476. — (2) Compt. rend. XXV, 799; J. pharm. [3] XII, 427; J. chim. méd. [3] IV, 5; Pharm. Centr. 1848, 41; Arch. Pharm. [2] LIII, 274. — (3) Arch. Pharm. [2] LIII, 282; Pharm. Centr. 1848, 154. — (4) J. pharm. [3] XIII, 97; J. chim. méd. [3] IV, 150; Compt. rend. XXVI, 103; Instit. 1848, 38; J. pr. Chem. XLIII, 396; Pharm. Centr. 1848, 202. — (5) J. pharm. [3] XIII, 101; Pharm. Centr. 1848, 202. — (6) Pharm. Centr. 1848, 236. — (7) J. pharm. [3] XIII, 161; Pharm. Centr. 1848, 311. — (8) J. chim. méd. [3] IV, 309; Instit. 1848, 196; Pharm. Centr. 1848, 830; Arch. Pharm. [2] LVI, 185; J. pr. Chem. XLIV, 244. — (9) Polytechn. Notizblatt 1848, Nr. 1. — (10) Gewerbevereinsblatt der Prov. Preussen, 1848, Nr. 2; Arch. Pharm. [2] LV, 65. — (11) Arch. Pharm. [2] LIII, 273. — (12) Arch. Pharm. [2] LIV, 23.

Verbindung von Chlorcalcium mit kohlens. Kalk, welche Chloroform. durch Waschen mit Wasser zersetzt wird.)

Soubeiran (a. a. O.) prüft die Reinheit des Chloroforms darnach, ob es in einer Mischung gleicher Theile concentrirter Schwefelsäure und Wasser untersinkt; L. Kefler (1) hat auf die Verfälschung mit Aether aufmerksam gemacht, und bemerkt, daß das Chloroform mit der Soubeiran'schen Probeflüssigkeit geschüttelt nicht an Volum abnehmen dürfe, was Gehalt an Alkohol anzeige; nach Mialhe (2) bleibt das reine Chloroform in Wasser gegossen klar, das alkoholhaltige wird opalisirend; nach Cattel (3) färbt sich das alkoholhaltige mit Chromsäure oder zweifach-chroms. Kali und Schwefelsäure grün, das reine nicht.

Das spec. Gew. des Chloroforms fand Swan (4) 1,493 bis 1,497; Morson (5) giebt an, daß es sich unter dem Einfluß von Luft und Licht, mit Bildung von Chlor, Salzsäure und anderer Producte, zersetze, unter Wasser aufbewahrt aber nicht.

Wenn man, nach St. Evre's (6) Angabe, Cyangas in eine alkoholische Lösung von Jodoform leitet, bis es nicht mehr aufgenommen wird, so tritt Erwärmung und violette Färbung ein; in der Ruhe setzen sich dann prismatische goldgelbe, weinblattförmig gruppirte Krystalle ab. Durch Behandlung mit kaltem verdünntem Weingeist kann man aus dieser krystallinischen Masse zwei verschiedene metallglänzende Substanzen gewinnen, eine violette, $C_4HJ_2N = C_2HJ_2Cy$, und eine grünlich-goldgelbe, welche noch weniger Jod enthält.

Jodoform;
Zersetzungs-
producte des-
selben.

Ueber Bromoform vergl. S. 501.

(1) J. chim. méd. [3] IV, 398; auch in der oben angef. Abhandl. — (2) J. chim. méd. [3] IV, 279. — (3) J. chim. méd. [3] IV, 257. 401; J. pharm. [3] XIII, 359; J. pr. Chem. XLIV, 246; Arch. Pharm. [2] LVI, 322; Pharm. Centr. 1848, 591. — (4) Phil. Mag. [3] XXXIII, 38. — (5) Pharm. J. Trans. VIII, 69; Pharm. Centr. 1848, 831. — (6) Compt. rend. XXVII, 533.

Aethyl-
verbindun-
gen und
dahin
Gehörige.
Alkohol.

Wackenroder (1) hat seine Erfahrungen über die Bereitung des absoluten Alkohols mittelst Aetzkalk mitgetheilt; er fand das spec. Gew. desselben 0,7905 bis 0,7897 bei 21°. — Verschiedene Methoden zur Darstellung des *spiritus vini alcoholisatus* hat Mohr (2) geprüft.

Mischungen
von Alkohol
und Wasser.

Drinkwater (3) hat das spec. Gewicht des reinen Alkohols und solcher Mischungen mit Wasser, welche bis 10 Gewichtsprocent Alkohol enthalten, untersucht; alle Bestimmungen des spec. Gewichts gelten für 15°,6 (ohne Zweifel bezogen auf Wasser von derselben Temperatur als Einheit). Durch wiederholte Digestion des Alkohols mit frisch geglühtem und rasch gepulvertem Aetzkalk wurde das spec. Gewicht bis auf 0,79381 heruntergebracht, welches als das des wasserfreien Alkohols betrachtet wurde. Im Folgenden ist das spec. Gewicht B der wässerigen Mischungen, welche A Gewichtsprocente Alkohol enthalten, angegeben:

A	0,5	1	2	3	4	5
B	0,99905	0,99813	0,99629	0,99454	0,99283	0,99121
A	6	7	8	9	10	
B	0,98963	0,98813	0,98668	0,98527	0,98389	

Die Zusammensetzung des Weingeists, auf welchen sich die Besteuerung geistiger Flüssigkeiten in England bezieht (*proof-spirit*), und welcher nach Parlamentsacte bei 51° F. das spec. Gewicht $\frac{1}{3}$ von dem des Wassers haben soll, fand Drinkwater zu 49,24 Gew. Proc. Alkohol.

Fownes (4) hat das spec. Gewicht der Mischungen von Wasser und Alkohol mit folgenden Resultaten untersucht (die Mischung ist angegeben nach Gewichtsprocenten Alkohol A; die spec. Gew. B gelten für 15°,6):

A	B	A	B	A	B	A	B
5	0,9914	30	0,9578	55	0,9069	80	0,8483
10	0,9841	35	0,9490	60	0,8956	85	0,8357
15	0,9778	40	0,9396	65	0,8840	90	0,8228
20	0,9716	45	0,9292	70	0,8721	95	0,8089
25	0,9652	50	0,9184	75	0,8603	100	0,7938

- (1) Arch. Pharm. [2] L, 162. — (2) Arch. Pharm. [2] LIV, 295; Pharm. Centr. 1848, 685. — (3) Phil. Mag. [3] XXXII, 123; Chem. Soc. Mem. III, 447; Pharm. J. Trans. VII, 488; Pharm. Centr. 1848, 842. — (4) Pharm. J. Trans. VII, 375.

Despretz (1) hat, in Gemeinschaft mit Pouillet und Babinet, der Pariser Academie Bericht abgestattet über zwei Instrumente, den Alkoholgehalt geistiger Flüssigkeiten zu bestimmen, welchen lösliche, das specifische Gewicht vergrößernde Substanzen zugesetzt sind. Beide gründen sich darauf, daß der Siedepunkt solcher Flüssigkeiten um so niedriger liegt, je mehr Alkohol sie enthalten, und beide sind als *Ebullioscop* bezeichnet. Bei Brossard-Vidal's Instrument (2) taucht in die zu untersuchende Flüssigkeit ein Thermometer von großen Dimensionen, in dessen Röhre das Quecksilber einen Schwimmer trägt, welcher mit einer über eine Rolle geschlungenen und durch ein leichteres Gegengewicht gespannt gehaltenen Schnur versehen ist; an der Rolle ist ein Zeiger, und je nach dem verschiedenen Stand des Quecksilbers in der Thermometerröhre zeigt dieser auf einen andern Punkt einer empirisch graduirten Scale (wie bei Hooke's Radbarometer). Conaty's *Ebullioscop* ist ein gewöhnliches Thermometer, dessen Scale aber unmittelbar den Alkoholgehalt einer Mischung anzeigt, in welche während des Siedens das Instrument taucht; die Scale ist außerdem beweglich, um je nach dem verschiedenen Barometerstand gestellt werden zu können und eine weitere Correction hierfür überflüssig zu machen. — Beide Vorrichtungen sollen den Alkoholgehalt einer Flüssigkeit bis auf 1 bis 2 Hunderttheile genau angeben, und das Conaty'sche bequemer sein.

Bestimmung
des Alkohol-
gehalts in
Mischungen.

Ure (3) fand den Gebrauch des Brossard-Vidal'schen Instruments nicht vortheilhaft, und construirte selbst ein anderes, dem Conaty'schen ähnliches. Wir verweisen bezüglich des Details in der Anwendung auf seine Abhandlung, und geben aus dieser noch folgende Beobachtungen des Siedepunkts A (bei 29,5 engl. Zoll Bar.

(1) Compt. rend. XXVII, 374. — (2) Eine genauere Beschreibung mit Abbildung findet sich in Pharm. J. Trans. VII, 166. — (3) Pharm. J. Trans. VII, 166; Pharm. Centr. 1847, 822.

Stand?) für Mischungen von Alkohol und Wasser von dem spec. Gew. B (bei 15°, 5?).

A	81°,4	82°,1	82°,5	83°,3	84°,1	85°,3	87°,2	88°,8	91°,3	94°,4
B	0,9200	0,9321	0,9420	0,9516	0,9600	0,9665	0,9729	0,9786	0,9850	0,9920

Silbermann (1) hat vorgeschlagen, den Gehalt des wässerigen Weingeists an Alkohol durch Bestimmung der Ausdehnung durch die Wärme zu ermitteln, und ein zu diesem Zwecke eingerichtetes Instrument beschrieben.

Alkoholate.

Bedenken, ob die als Alkoholate (Verbindungen von Alkohol mit wasserfreien Salzen) beschriebenen Körper nicht eigentlich Gemenge von Krystallen eines wasserhaltigen Salzes mit einer alkoholischen Lösung des Salzes seien, hat Einbrodt (2) erhoben.

Selen-
mercaptan.

Selenäthyl - Selenwasserstoff (Selenmercaptan) wurde von C. Siemens (3) dargestellt. Selenkalium - Selenwasserstoff ($KSe + HSe$, bereitet durch Sättigen von Kalilauge mit Selenwasserstoff unter gleichzeitiger Einleitung von Wasserstoff zur Abhaltung der Luft) wurde rasch mit einer concentrirten Lösung von ätherschwefels. Kalk gemischt und destillirt; zuerst wurde Schwefelwasserstoff frei, dann destillirte mit dem Wasser eine darin untergehende stinkende Flüssigkeit über, welche mit Chlorcalcium getrocknet und der fractionirten Destillation unterworfen das Selenmercaptan (C_4H_9Se, HSe) als den flüchtigeren Theil gab. Dieses ist farblos, den Kakodylverbindungen ähnlich stinkend, schwerer als Wasser in dem es sich nicht löst, weit unter 100° siedend, leicht entzündlich und mit intensiv hellblauer Flamme und unter Bildung von Dämpfen von seleniger Säure und von Selen verbrennend. Mit Quecksilberoxyd vereinigt es sich unter Zischen und Erhitzung zu einem gelben, leicht schmelzbaren, in heißem Alkohol

(1) Compt. rend. XXVII, 418; Pharm. Centr. 1848, 906; Chem. Gaz. 1849, 25. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 115; Pharm. Centr. 1848, 206; Chem. Gaz. 1848, 85; J. pr. Chem. XLVI, 165. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXI, 360; im Ausz. J. pr. Chem. XL, 503; Pharm. Centr. 1847, 663.

löslichen und beim Erkalten sich amorph daraus abscheidenden Körper; die Lösung von Selenmercaptan in Alkohol giebt mit Quecksilberchlorid einen dicken gelben Niederschlag. — Die weniger flüchtige bei obiger Bereitung erhaltene Flüssigkeit ist entweder ein Gemenge von Selenmercaptan mit Zweifach-Selenäthyl, oder von Einfach- und Zweifach-Selenäthyl; sie ist gelb, schwerer als Wasser, sehr stinkend und ohne Wirkung auf Quecksilberoxyd.

Nicklès (1) hat die Krystallform zweier Substitutionsproducte des Aethers untersucht, der Verbindungen C_4Cl_2O und $C_4Cl_2Br_2O$. Beide Verbindungen sind isomorph, und gehören dem quadratischen System an; sie zeigen eine quadratische Pyramide P, deren Endecken manchmal durch OP abgestumpft sind. Die Länge der Hauptaxe für P berechnet sich aus den von Nicklès mitgetheilten Messungen für beide Substanzen zu 0,952 (die Neigung der Flächen in den Seitenkanten von P ist $= 106^\circ 46'$); die Pyramide ist also einem Reguläroctaëder sehr ähnlich, wie denn letzteres auch früher als die Krystallform dieser Substanzen irrig angegeben wurde. Beide sind spaltbar parallel OP.

Aether.
Krystallform
von Substitu-
tionsproduc-
ten desselben.

Eine dem Chloräthyl, worin 4 H durch 4 Cl vertreten sind, isomere Flüssigkeit hat Pierre (2) bei Einwirkung von Chlor auf Oel des ölbildenden Gases (Flüssigkeit der holländischen Chemiker, Chlorelayl, $C_4H_4Cl_2$) hervorgebracht. Chlor wurde rasch während 10 bis 12 Stunden in 400—500 Grm. dieser Flüssigkeit, welche mit einer Wasserschicht bedeckt war, im directen Sonnenlicht unter Abkühlung eingeleit, die untere Schicht nachher destillirt, und das bei $145-160^\circ$ Uebergehende so lange mit Entfernung des zuerst und zuletzt Ueberdestillirenden rectificirt, bis der Siedepunkt constant war. Man erhält so eine Flüssigkeit von 1,66267 spec. Gew. bei 0° , welche ange-

Chloräthyl;
damit isomere
Flüssigkeit.

(1) Ann. ch. phys. [3] XXII, 28. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXI, 439; J. pr. Chem. XLIII, 301; im Ausz. Compt. rend. XXV, 430; Pharm. Centr. 1847, 799; 1848, 89.

nehm und etwas honigartig riecht, süß und warm schmeckt, bei 0° flüssig bleibt und bei 153°,8 unter 763^{mm},4 Druck siedet, von der Zusammensetzung C_4HCl_3 ; die Dampfdichte wurde = 7,087 gefunden, 7,101 ist die für eine Condensation auf 4 Vol. berechnete. Mit weingeistiger Kalilösung giebt diese Verbindung Chlorkohlenstoff C_4Cl_6 , Chlorkalium und Wasser.

Krystallform
von
 $C_4Br_2Cl_4$
und
 C_4Cl_6 .

Nicklès (1) hat die Krystallform des Bromchlorkohlenstoffs ($C_4Br_2Cl_4$) untersucht, und sie mit der des Chlorkohlenstoffs C_4Cl_6 übereinstimmend gefunden. Von letzterem weiß man durch Brooke's (2) und Laurent's (3) Messungen, daß er als gerades rhombisches Prisma ∞P (dessen Winkel 58° und 122° nach Brooke, 59° und 121° nach Laurent) krystallisirt, an welchem $\infty \check{P} \infty$ auftritt und das brachydiagonale Doma $\check{P} \infty$ (dessen Flächen oben und unten unter 59° 20' nach Brooke, unter 59° 0' nach Laurent geneigt sind), und wo also die Axenverhältnisse sind :

$$\text{Brachydiagonale : Makrodiagonale : Hauptaxe} \begin{cases} = 0,554 : 1 : 1,804 \text{ nach Brooke,} \\ = 0,566 : 1 : 1,768 \quad \text{Laurent.} \end{cases}$$

Jodäthyl.

Chlor bildet nach Pierre (4) mit Jodäthyl (C_4H_5J) Chloräthyl (C_4H_5Cl) und Jod.

Schwefel-
äthyl.

Bei etwas raschem Einleiten von Chlor in Schwefeläthyl (C_4H_5S), selbst an einem sehr wenig erleuchteten Ort und bei Abschlufs der Luft, erhitzt sich nach Pierre (5) die Flüssigkeit, und manchmal tritt selbst Entzündung in ihr ein (weßhalb die Anwendung größerer Mengen zu vermeiden ist); es bildet sich Chloräthyl (C_4H_5Cl), und etwas Schwefel setzt sich ab. Die Bildung von Chlorschwefel ist hierbei nicht leicht zu vermeiden und bei zu rasch geführter Operation bildet sich außerdem $C_4H_4Cl_2$.

Cyanäthyl.

Ueber Cyanäthyl und seine Zersetzung durch wässeriges Kali vergl. S. 552.

(1) Ann. ch. phys. [3] XXII, 30. — (2) Annals of philosophy XXIII, 364. — (3) Quesneville's revue scientifique, IX, 33. — (4) Aus Recueil etc. (vgl. S. 672) in J. pharm. [8] XIII, 157. — (5) Aus Recueil etc. in J. pharm. [8] XIII, 157.

Frankland und Kolbe (1) haben die Zersetzung des Cyanäthyls durch Kalium untersucht. Läßt man Cyanäthyl tropfenweise auf Kalium einwirken, so entwickelt sich, unter anfangs heftiger Reaction und selbst Feuererscheinung, ein Gas, und das Kalium wird zuletzt in eine zähe gelbliche Masse verwandelt, welche mit Wasser behandelt eine Lösung von Cyankalium giebt und Kyanäthin (vgl. S. 650) zurückläßt. Das Gas hat die Zusammensetzung C_2H_3 ; sein spec. Gew. wurde zu 1,075 gefunden, einer Condensation auf 2 Vol. entspricht das berechnete 1,037. Es ist farblos, bei -18° nicht condensirbar, von schwach ätherartigem Geruch, in Wasser unlöslich; Alkohol absorbirt von ihm das 1,13 fache Volum. Concentrirte Schwefelsäure wirkt nicht auf es ein; auch nicht mit ihm erhitzter Schwefel oder Jod. Chlor mischt sich mit ihm im Dunkeln ohne Einwirkung; im zerstreuten Licht verschwindet die Farbe des Chlors, und ohne Volumverminderung bildet sich ein Gemenge aus gleichen Volumen Salzsäuregas und eines Gases von der Zusammensetzung des Chloräthyls (C_2H_5Cl), mit dessen Dampf es auch gleiches spec. Gew. hat; dieses Gas ist indeß mit Chloräthyl nur isomer, nicht identisch, sofern ersteres noch bei -18° gasförmig bleibt und in der doppelten Menge von Wasser absorbirt wird.

Cahours hatte angegeben, daß Schwefelcyanäthyl ($C_2H_5S_2N$) sich in ziemlich concentrirter Salpetersäure in der Wärme löse, und bei dem Abkühlen wieder vollständig ausscheide. J. S. Muspratt (2) hat hingegen gezeigt, daß Schwefelcyanäthyl (durch Destillation gleicher Volume der gesättigten Lösungen von ätherschwefels. Kalk und Schwefelcyankalium in einer geräumigen Retorte erhalten) durch einigermassen concentrirte Salpetersäure sehr schnell verändert wird; bei gelinder Erwärmung gleicher Gewichte beider Substanzen in einer Retorte entweichen unter An-

Cyanäthyl.
Zersetzung
durch Kalium.

Einwirkung
der Salpeter-
säure auf
Schwefel-
cyanäthyl. —
Aethylunter-
schwefel-
säure.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 269; Chem. Soc. Qu. J. I, 60; Pharm. Centr. 1848, 369. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 251; Chem. Soc. Qu. J. I, 45; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 273; J. pharm. [8] XIII, 302.

Einwirkung
von Salpeter-
säure auf
Schwefel-
cyanäthyl. —
Aethylunter-
schwefel-
säure.

fangs heftiger Einwirkung salpetrige Säure, Stickoxyd und Kohlensäure; Schwefelsäure bildet sich um so mehr, je concentrirter die angewandte Salpetersäure war. Wird das Ueberdestillirte wiederholt zurückgegossen und der Inhalt der Retorte zuletzt im Wasserbad bis zur Verjagung aller Salpetersäure verdampft, so bleibt eine dem Vitriolöl ähnliche Flüssigkeit zurück von schwach lauchartigem Geruch, *Aethylunterschwefelsäure*. Rein wird diese erhalten durch Zersetzung des Barytsalzes mit Schwefelsäure, Sättigen des Filtrats mit kohlens. Bleioxyd, abermaliges Filtriren und Zersetzen der Lösung des Bleisalzes mit Schwefelwasserstoff. Die vom Schwefelblei abfiltrirte, im Wasserbad abgedampfte Säure ist rein. Wird sie mit Kalihydrat geschmolzen und Schwefelsäure oder Salzsäure zugesetzt, so entweicht reichlich schweflige Säure. Sie erträgt eine hohe Temperatur ohne zersetzt zu werden, schmeckt sauer und unangenehm, mischt sich mit Wasser und Alkohol in jedem Verhältniß, und bildet nur lösliche Salze. — Das Barytsalz ist so löslich, daß es nur aus concentrirten Lösungen bei langsamem Verdampfen in schönen rhombischen Prismen, $\text{BaO}, \text{C}_4\text{H}_5\text{S}_2\text{O}_3 + \text{HO}$, erhalten werden kann; das Wasser entweicht daraus bei 100° . Das Salz ist auch leicht löslich in wässrigem Weingeist und Aether, aber unlöslich in wasserfreiem Alkohol, der es auch aus der wässrigen Lösung niederschlägt. Starke Hitze treibt aus dem Salz weiße Dämpfe von erstickendem Geruch aus, unter Hinterlassung eines pyrophorischen Rückstands. — Das Bleioxydsalz krystallisirt aus der heißen concentrirten Lösung in farblosen Tafeln, $\text{PbO}, \text{C}_4\text{H}_5\text{S}_2\text{O}_3 + \text{HO}$, welche in Wasser und in Alkohol leicht löslich sind, bei 100° das Krystallwasser verlieren, und stark erhitzt sich aufblähen, schwärzen und im Rückstand schwefels. Bleioxyd hinterlassen. — Das Kupferoxydsalz ist wegen seiner großen Löslichkeit nur schwierig in deutlichen Krystallen, $\text{CuO}, \text{C}_4\text{H}_5\text{S}_2\text{O}_3 + 5\text{HO}$, zu erhalten.

Durch Behandlung von Schwefelcyanäthyl mit chlors. Kali und Salzsäure entsteht nach Muspratt gleichfalls Aethylunterschwefelsäure. Durch Chlor wird Schwefelcyanäthyl nur langsam zersetzt; nach längerer Einwirkung entsteht reichlich Chlorcyan, dann ein schweres, gelbes, in Wasser lösliches Oel. Kalte alkoholische Kalilösung während mehrerer Tage mit Schwefelcyanäthyl in Berührung gelassen, zersetzt es; die Flüssigkeit wird blutroth und eigenthümlich riechend.

Einwirkung von chlors. Kali u. Salzsäure, von Chlor und von alkoholischer Kalilösung auf Schwefelcyanäthyl.

Nach Muspratt entsteht aus Zweifach-Schwefeläthyl ($C_4H_8S_2$) mit Salpetersäure die von Löwig und Weidmann entdeckte Sulfäthylschwefelsäure. Für das bei 100° getrocknete Kupferoxydsalz derselben fand er die Zusammensetzung $CuO, C_4H_8S_2O_4 + 4HO$.

Einwirkung der Salpetersäure auf Zweifach-Schwefeläthyl.

Gerhardt (1) hat die Zersetzungen der zusammengesetzten Aetherarten, in welchen aller oder der größte Theil des Wasserstoffs durch Chlor ersetzt ist, durch Wärme, durch wässeriges Kali und durch Ammoniak, mit Zugrundelegung der von ihm dafür angenommenen Formeln, übersichtlich zusammengestellt.

Zersetzung der Substitutionsproducte zusammengesetzter Aetherarten.

Nach E. Kopp (2) wirkt Schwefelwasserstoff rasch und heftig auf salpetrigs. Aethyloxyd ein; Schwefel schlägt sich nieder, und aus der überstehenden Flüssigkeit läßt sich eine ammoniakalische Flüssigkeit abdestilliren, welche mit Salzsäure gesättigt bei der Destillation eine alkoholische, schwach lauchartig riechende giebt; $C_4H_5O, NO_2 + 6HS = C_4H_5O_2 + 2HO + NH_3 + 6S$. Hunt (3) ist zu demselben Resultat gekommen.

Salpetrigs. Aethyloxyd. Einwirkung von Schwefelwasserstoff.

E. Kopp fand weiter, daß die Einwirkung des Schwefelwasserstoffs auf salpeters. Aethyloxyd weniger heftig ist. Strömt Schwefelwasserstoff in salpeters. Aethyloxyd, welches mit einer Lösung von Ammoniak in Alkohol vermischt ist,

Salpeters. Aethyloxyd. Einwirkung von Schwefelwasserstoff.

- (1) J. pharm. [3] XIV, 229. — (2) Quesneville's Revue scientifique XXVII, 273; J. pharm. [3] XI, 320; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 320. — (3) Sill. Am. J. [2] IV, 350.

so erwärmt sich die Flüssigkeit auf 35 bis 40° und wird dunkler; Schwefel setzt sich ab. Bei der Destillation findet man im Rückstand nur Spuren von salpeters. Ammoniak; das Destillat enthält Ammoniak und Mercaptan, letzteres auch wenn kein Alkohol zugesetzt war. $C_4H_5O, NO_2 + 10 HS = C_4H_5S_2 + NH_3 + 6 HO + 8 S$.

Bildung von
Aethyloxyd-
Schwefel-
kohlenstoff.

Nach Desains (1) beruht die Bildung von Aethyloxyd-Schwefelkohlenstoff (Aethyloxyd - Sulfocarbonat, C_4H_5O, CS_2) durch Einwirkung von Jod auf eine alkoholische Lösung des xanthons. Kalis ($KO, C_4H_5O, 2 CS_2$) und Destillation auf der vorgängigen Bildung einer Verbindung $C_4H_5S_4O_2$, die aus dem xanthons. Kali einfach durch Abgabe von 1 Aeq. Kalium an 1 Aeq. Jod entstehe. Diese Verbindung wird nach ihm rein erhalten, wenn man eine alkoholische Auflösung von xanthons. Kali durch eine eben zureichende Menge Jod entfärbt und der freiwilligen Verdunstung überläßt; nach einigen Tagen setzt sich die Verbindung bei niedrigerer Temperatur in Form blättriger Krystalle ab, welche nur mit Wasser gewaschen zu werden brauchen. Sie schmelzen schon bei der Temperatur der Hand zu einem gelblichen Oel. Dieselbe Verbindung erhält man bei niedriger Temperatur als weißliches Pulver bei Zusatz von Jodtinktur zu wässrigem xanthons. Kali. Salzsäure verändert sie selbst nicht in der Hitze; Schwefelsäure zersetzt sie unter Entwicklung schwefliger Säure. Kali brachte mit einer alkoholischen Lösung dieser Verbindung einen Absatz von xanthons. Kali hervor; eine alkoholische Ammoniaklösung färbte sich damit braun, Schwefel setzte sich ab, und die Flüssigkeit gab krystallinische Krusten, welche ein Gemenge verschiedener Körper zu sein schienen. In einem Oelbad bei 200 bis 210° destillirt, giebt diese Verbindung Aethyloxyd-Schwefelkohlenstoff, in der Retorte bleibt eine feste Masse, aus welcher Schwefelkohlenstoff Schwefel auszieht; es entwickelt sich außerdem Koh-

(1) In der S. 674 angeführten Abhandlung.

lensäure und Schwefelkohlenstoffdampf [Desains giebt die Formel $2(C_4H_5S_4O_2) = 2(C_4H_5O, CS_2) + CS_2 + CO_2 + S_2$].

Cyanurs. Aethyloxyd wird nach Wurtz (1) erhalten durch Destillation von alkalischem cyanurs. Kali mit ätherschwefels. Kali. Es condensirt sich in dem Hals der Retorte und in dem Recipienten eine krystallinische Masse, welche durch Umkrystallisiren aus Alkohol in schönen Krystallen rein erhalten wird. Der Cyanursäureäther schmilzt bei 85° zu einer farblosen Flüssigkeit von größerem spec. Gew. als das Wasser; bei 276° siedet er und verdampft ohne Zersetzung; die Dampfdichte wurde = 7,4 gefunden; 7,37 ist die berechnete unter der Voraussetzung, daß $3 C_4H_5O$, $C_4N_3O_3$, 4 Volume Dampf giebt. Er ist wenig löslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether.

Cyanursäures
Aethyloxyd.

Bei der Destillation von trockenem cyans. Kali mit ätherschwefels. Kali erhält man ein Gemenge von cyanurs. und cyans. Aethyloxyd; letzteres läst sich durch seine größere Flüchtigkeit (es siedet gegen 60°) leicht daraus isoliren. Das cyans. Aethyloxyd (2), mehrmals über Chlorcalcium rectificirt, ist eine leicht bewegliche, das Licht stark brechende Flüssigkeit, leichter als Wasser, deren Dampf die Augen heftig zum Thränen reizt. Die Dampfdichte wurde = 2,4 gefunden, einer Condensation von C_4H_5O , C_2NO auf 4 Volume im Dampfzustand entsprechend. — Das cyans. Aethyloxyd löst sich in wässerigem Ammoniak unter Wärmeentwicklung; bei dem Abdampfen erhält man dann einen in schönen Prismen krystallisirenden, schmelzbaren, in Wasser und Alkohol löslichen, mit kochender Kalilauge Ammoniak entwickelnden Körper $C_6H_8N_2O_2$, welcher also die Elemente von cyans. Aethyloxyd und von Ammoniak in sich enthält, und mit dem S. 679 angeführten Zersetzungsproduct des cyans. Methyloxyds durch Wasser isomer ist. — Wird das cyans. Aethyloxyd mit Wasser

Cyansäures
Aethyloxyd.

(1) Compt. rend. XXVI, 368; Pharm. Centr. 1848, 831. — (2) Compt. rend. XXVII, 241; Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 117; J. pr. Chem. XLV, 816; Pharm. Centr. 1848, 808.

zusammengebracht, so entwickelt sich Kohlensäure und es bildet sich ein krystallinischer, durch Auflösen in Wasser oder Alkohol zu reinigender Körper $C_{10}H_{12}N_2O_2$.

Schwefels.
Aethyloxyd.

Schwefelsäureäther (neutrales schwefels. Aethyloxyd, C_4H_8O, SO_3) hat Wetherill (1) dargestellt durch Zuleiten der Dämpfe von wasserfreier Schwefelsäure zu Aether, den eine Kältemischung umgiebt, Schütteln der entstehenden syrupdicken Flüssigkeit mit einem gleichen Volum Aether und der vierfachen Menge Wasser, Abnehmen der entstehenden oberen Schicht, welche den Schwefelsäureäther in Aether gelöst enthält, Schütteln mit Kalkmilch, Waschen mit Wasser, Filtriren, Verdampfen des Aethers, abermaliges Waschen der rückständigen sauren öligen Flüssigkeit, Trocknen im luftleeren Raum. Man erhält so die genannte Verbindung als eine ölartige, scharf schmeckende, dem Pfeffermünzöl ähnlich riechende, im reinen Zustand farblose aber gewöhnlich gelb gefärbte Flüssigkeit vom spec. Gew. 1,120, welche auf Papier Fettflecken macht, die nach einiger Zeit wieder verschwinden, und welche nur mit der größten Vorsicht und in einem Strom von Kohlensäure unzersetzt destillirt werden kann. Sie giebt mit Schwefelkalium-Schwefelwasserstoff Mercaptan und schwefels. Kali; sie löst sich in rauchender Salpetersäure, und wird durch Wasser wieder abgeschieden; die Lösung durch Kali neutralisirt und erhitzt giebt Salpeteräther (C_4H_8O, NO_3). Mit Wasser erhitzt bildet der Schwefelsäureäther ohne Abscheidung von Weinöl eine saure Flüssigkeit, welche bei dem Kochen Alkohol abgiebt, und mit kohlen. Baryt behandelt drei verschiedene lösliche Barytsalze liefert: methions. Baryt (bei 100° getrocknet BaO, CH_3, S_2, O_7 , welcher zuerst auskrystallisirt und durch Weingeist aus der wässerigen Lösung ausgefällt werden kann), ätherschwefels. und isäthions. Baryt.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 117; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 922; J. pharm. [3] XIV, 225.

Millon (1) hat beobachtet, daß Alkohol und Schwefelsäure (SO_3 , HO), zu gleichen Aequivalenten bei 0° und unter Vermeidung jeder Temperaturerhöhung gemischt, während mehrerer Tage gar keine Aetherschwefelsäure bilden, bei 10 bis 15° aber allmählig, bis nach einigen Tagen 77 Hundertheile der Menge Aetherschwefelsäure gebildet sind, welche die zugesetzte Menge Schwefelsäure überhaupt bilden könnte. Bei 30 bis 35° geht die Bildung in wenigen Stunden, bei Erwärmen des Gemisches im Wasserbad in einigen Minuten, und bei Eingießen der Säure in Alkohol, so daß eine beträchtliche Temperaturerhöhung erfolgt, in einem Augenblick vor sich; stets aber bildet sich nur die angegebene Menge. 2 Aeq. Alkohol auf 1 Schwefelsäure verhalten sich eben so, bilden aber etwas weniger (73 bis 74 Hundertheile der möglichen Menge) Aetherschwefelsäure. Bei Mischung von 2 Aeq. Schwefelsäure mit 1 Aeq. Alkohol bildet sich unter allen Umständen gleichviel Aetherschwefelsäure (54 Hundertheile der möglichen Menge).

Aether-
schwefel-
säure.

R. F. Marchand (2) hat untersucht, welche Veränderungen vor zwölf Jahren dargestellte ätherschwefels. Salze erlitten. Unzersetzt waren geblieben das Kali-, Natron-, Lithion-, Ammoniak-, Magnesia-, Kupferoxyd-, Nickeloxydul-, Kobaltoxydul- und Zinkoxydsalz. Zuerst hatte sich das Strontiansalz zersetzt, mit einer sauren Flüssigkeit von angenehmem Weingeruch bedeckt, und bald ganz in schwefels. Salz verwandelt; dann auch das Barytsalz. Nicht vollständig zersetzt war das Kalksalz, vollständig das Thonerde-, Eisenoxyd-, Manganoxydul-, Uranoxyd-, Bleioxyd- und Silberoxydsalz. Aus der entstehenden sauren Flüssigkeit konnte kein Weinöl erhalten werden. Marchand hat, wie auch Gerhardt (3), beobachtet, daß bei dem Kochen einer Lösung des Barytsalzes, Neutralisiren der entstehenden sauren Flüssigkeit mit Baryt, neuem Kochen

Aether-
schwefelsäure
Salze.

(1) Ann. ch. phys. [3] XIX, 227; J. pr. Chem. XL, 366; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 396; Phil. Mag. [3] XXX, 211. — (2) J. pr. Chem. XLIV, 122; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 543. — (3) Grundr. d. org. Chem. I, 400.

u. s. f. zuletzt eine Lösung erhalten wird, welche sich nicht mehr bei dem Kochen zerlegt, und Krystalle von derselben Zusammensetzung aber andern Eigenschaften wie der ätherschwefels. Baryt giebt.

Aetherphos-
phorsäure.
Biätherphos-
phorsäure.

Zeise hatte beobachtet, dafs, wenn Phosphor mit Aether einige Zeit in Berührung gelassen, dann die Flüssigkeit abgegossen, bis auf $\frac{1}{10}$ abdestillirt und die zurückbleibende saure Flüssigkeit mit Wasser verdünnt und mit Barytwasser gesättigt wird, drei verschiedene Barytsalze, ein unlösliches, ein schwerlösliches und ein leichtlösliches erhalten werden; die Säure des letztern bezeichnete er als Phosphätsäure. — Voegeli (1) fand, dafs hierbei wahrscheinlich eine vorgängige Oxydation des Phosphors und eine Einwirkung seiner Oxydationsstufen auf den Aether stattfinden (2). Er beobachtete weiter, dafs bei Einwirkung von wasserfreier Phosphorsäure auf Aether oder Alkohol, oder bei der Absorption der Dämpfe letzterer Substanzen durch erstere Säure bei gewöhnlicher Temperatur, neben Aetherphosphorsäure (für deren Bleioxydsalz auch er die Zusammensetzung 2PbO , $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$, PO , fand, und deren Bildung er auch bei der Einwirkung wasserhaltiger Phosphorsäure von Syrupconsistenz auf Aether constatirte) sich eine andere Säure bildet, deren Barytsalz in Wasser leichter löslich und deren Bleioxyd- und Silberoxydsalz im Wasser löslich sind. Aus dem Bleioxydsalz wurde letztere Säure, welche Voegeli *Biätherphosphorsäure* nennt, durch Schwefelwasserstoff abgeschieden und im luftleeren Raum zu einem Syrup concentrirt, welcher nicht krystallisirte und theilweise Zersetzung zeigte. Das biätherphosphors. Bleioxyd ist in kaltem Wasser, und noch mehr in warmem, leicht löslich, in kaltem absolutem Alkohol schwer, in 40° warmem und in

(1) Pogg. Ann. LXXV, 282; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIX, 180; J. pr. Chem. XLVI, 157; Pharm. Centr. 1849, 129. — (2) Auch in dem Laboratorium zu Gießen haben sich bei Wiederholung die Angaben von Zeise nicht bestätigt.

verdünntem leicht löslich; es krystallisirt wasserfrei in Nadeln, theinartigen Gruppen oder seidenglänzenden Massen, hat die Zusammensetzung $\text{PbO}, 2 \text{C}_4\text{H}_8\text{O}, \text{PO}_3$, schmilzt bei 180° und erstarrt bei 175° zu einer krystallinischen Masse; über den Schmelzpunkt erhitzt zersetzt es sich unter Ausstossung weißer, angenehm ätherisch riechender Dämpfe. Das Kalksalz ist leicht löslich in Wasser, etwas schwieriger in verdünntem, wenig in absolutem Alkohol; auch es krystallisirt wasserfrei in seidenglänzenden Gruppen, $\text{CaO}, 2 \text{C}_4\text{H}_8\text{O}, \text{PO}_3$. Das Magnesiasalz läßt sich nur schwierig, das Kupferoxydsalz gar nicht krystallinisch erhalten, das Nickeloxydsalz aber in wasserhaltigen Krystallen; alle drei Salze sind in Wasser sehr leicht löslich.

Bei der Einwirkung der wasserfreien Phosphorsäure auf Alkohol und bei der Zersetzung der biätherphosphors. Salze durch Hitze bemerkte Voegeli einen angenehm-ätherischen Geruch; der Körper, dem dieser eigenthümlich ist, wurde durch trockne Destillation des biätherphosphors. Bleioxyds in einem Oelbad von 180 bis 190° als wasserhelle Flüssigkeit erhalten, über frisch geglühtem kohlen. Kali getrocknet und rectificirt. Er ist phosphors. Aethyloxyd, $3\text{C}_4\text{H}_8\text{O}, \text{PO}_3$. Ganz wasserfrei wurde diese Verbindung nicht erhalten; der höchste beobachtete Siedepunkt (1) war $142^\circ,5$. Ihre Entstehung aus dem biätherphosphors. Bleioxyd ist ausgedrückt durch: $2 (\text{PbO}, 2 \text{C}_4\text{H}_8\text{O}, \text{PO}_3) = 3 \text{C}_4\text{H}_8\text{O}, \text{PO}_3 + 2 \text{PbO}, \text{C}_4\text{H}_8\text{O}, \text{PO}_3$.

Cloez (2) hat angegeben, daß bei Einwirkung von Chlorschwefelphosphor (PS_2Cl_2) auf Alkohol sich eine der Aetherphosphorsäure analoge Aetherschwefelphosphorsäure bilde, von der Formel $\text{PO}_3\text{S}_2, \text{C}_4\text{H}_8\text{O}, 2 \text{HO}$. Sie bilde krystallisirbare Salze mit Baryt, Kalk, Strontian u. s. w. Das Barytsalz habe die Formel $\text{PO}_3\text{S}_2, \text{C}_4\text{H}_8\text{O}$,

(1) Voegeli bestimmte den Siedepunkt durch Einfüllen der Substanz in eine Röhre über Quecksilber, und Ermittlung, bei welcher Temperatur die Spannkraft ihrer Dämpfe dem Luftdruck das Gleichgewicht hält. —

(2) Compt. rend. XXIV, 388.

$2 \text{ BaO} + \text{HO}$. Das Kalisalz und das Natronsalz erhalte man leicht durch Zersetzung des Chlorschwefelphosphors durch eine alkoholische Lösung von Kali oder Natron ($\text{PCl}_3\text{S}_4 + \text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2 + 5 \text{ KO} = \text{PO}_3\text{S}_2, \text{C}_4\text{H}_8\text{O}, 2 \text{ KO} + 3 \text{ KCl} + \text{HO}$).

Aether-
mellithsäure.

Hinsichtlich der Aethermellithsäure vergl. S. 496; hinsichtlich der Aethylverbindungen organischer Säuren auch bei letzteren.

Acetal.

Stas (1) erhielt bei der Darstellung von Acetal nach Liebig's Vorschrift eine Flüssigkeit, deren Siedepunkt keineswegs constant war, sondern von 88 auf 110° stieg, sich theilweise in concentrirter Kalilauge löste und damit essigs. Kali bildete; diese Flüssigkeit ist nach ihm eine Mischung von Essigäther und eigentlichem Acetal. Letzteres erhält man nach ihm am besten und von constanter Zusammensetzung auf folgende Weise. Man benetzt Bimssteinstücke, welche mit Salzsäure gewaschen und zum Rothglühen erhitzt waren, mit fast wasserfreiem Alkohol, und bringt sie in einen 40 bis 50 Liter fassenden Ballon, dessen Mündung weit genug ist um Hand und Arm durchzulassen; auf den Bimsstein stellt man möglichst viele flache Glasschalen, welche mit einer dünnen Schicht Platinschwarz bedeckt sind; man schließt die Mündung des Ballons mit einer aufgeschliffenen Glasplatte, und überläßt Alles bei mindestens 20° sich selbst bis zur fast vollständigen Umwandlung des Alkohols in Essigsäure; dann gießt man unten in den Ballon 1 bis 2 Liter 60procentigen Weingeist, schließt den Ballon wieder und überläßt ihn wie vorher sich selbst, läßt aber von Zeit zu Zeit Luft Zutreten. Nach 15 bis 20 Tagen wird die Flüssigkeit unter dem Bimsstein (dieser darf nie ganz mit Flüssigkeit bedeckt sein) dickflüssig; man nimmt sie heraus und ersetzt sie durch eine entsprechende Menge 60procentigen Weingeists. Wenn man so einige Liter saurer Flüssigkeit erhalten hat, neutralisirt man sie mit kohlens. Kali und löst Chlorcalcium bis zur

(1) Ann. ch. phys. [3] XIX, 146; J. pr. Chem. XL, 340; im Auss. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 322; Pharm. Centr. 1847, 359; Phil. Mag. [3] XXX, 220.

Sättigung darin auf, oder setzt auch nur ohne zu neutralisiren essigs. Kali bis zur Sättigung zu. Man destillirt mit Vorsicht, und fängt das erste Viertheil des Destillats in einer gut abgekühlten Vorlage auf. Chlorcalcium zu diesem gesetzt scheidet sogleich eine erhebliche Menge einer sehr flüchtigen und erstickend riechenden Flüssigkeit, welche abgenommen wird; mehr davon scheidet sich noch ab durch Zusatz von Wasser zum Rest, und etwas erhält man noch durch vorsichtige Destillation der dann zurückbleibenden Chlorcalciumlösung. Die so erhaltene Flüssigkeit enthält Aldehyd, Essigäther, Alkohol und Acetal. Man löst Chlorcalcium bis zur Sättigung darin auf, und destillirt im Wasserbad (ohne dafs bis zum Sieden der Flüssigkeit erhitzt werden darf) bis das Uebergehende nicht mehr ammoniakalisches essigs. Silberoxyd reducirt; die so von Aldehyd befreite Flüssigkeit bringt man zur Zerstörung des Essigäthers mehrere Tage hindurch mit sehr überschüssiger concentrirter Kalilauge in Berührung, wäscht das Acetal sodann ein oder zweimal mit einem gleichen Volum Wasser, trocknet mit Chlorcalcium und rectificirt unter Zusatz von Quecksilber oder Platindraht (wegen des Stofsens bei dem Sieden). So erhält man das Acetal rein als eine ätherische farblose Flüssigkeit von eigenthümlichem angenehmem Geruch und erfrischendem Geschmack, 0,821 spec. Gewicht bei 22°,4 und 104 bis 106° Siedepunkt bei 768^{mm} Barometerstand. Die Analysen entsprachen der Formel $C_{12}H_{14}O_4$ (1); die Dampfdichte wurde 4,069 bis 4,240 gefunden, der Formel entspricht bei einer Condensation auf 4 Vol. die berechnete 4,082. Es enthält also die Elemente von 2 At. Aether und 1 At. Aldehyd, als deren Verbindung indefs Stas es nicht betrachtet; er glaubt, es entstehe durch Vereinigung von 3 At. Aether und Vertretung von 1 At. Wasserstoff durch 1 At. Sauer-

Acetal.

(1) Diese Formel ist in dem Laboratorium zu Gießen von Dr. Price bestätigt worden.

Acetal. stoff. — Das Acetal löst sich bei 25° in etwa dem 18fachen Volum Wasser, bei höherer Temperatur ist es darin weniger löslich; Salze scheiden es aus der Lösung ab. In Aether und Alkohol löst es sich nach allen Verhältnissen; aus letzterer Lösung wird es durch Chlorcalcium nur bei Zusatz von Wasser abgeschieden. An der Luft scheint es keine Veränderung zu erleiden; Platinschwarz verwandelt es rasch in Aldehyd und dann in Essigsäure; verdünnte Salpetersäure bringt dieselben Veränderungen, Chromsäure nur Essigsäure hervor. Ammoniakalisches essigs. Silberoxyd und Alkalien verändern es weder in der Kälte noch in der Hitze. — Das Acetal bildet sich auch bei Einwirkung von Chlor auf 80procentigen, durch Abkühlung bei 10 bis 15° gehaltenen Weingeist; man unterbricht die Einwirkung, wenn sich Substitutionsproducte zu bilden anfangen, d. i., wenn Zusatz von Wasser Trübung hervorbringt; man destillirt alsdann und unterwirft die zuerst übergehende saure Flüssigkeit der oben angegebenen Behandlung (1).

Amylver-
bindungen.
Amyloxyd-
hydrat.

Rieckher (2) hat mehrere Amylverbindungen dargestellt und untersucht. Für das Amyloxydhydrat (Fuselalkohol) fand er das spec. Gew. 0,8185 bei 15°, den Siedepunkt 134°; er analysirte das auf gewöhnliche Art gereinigte wie das aus benzoës., oxals. und essigs. Amyloxyd regenerirte mit Resultaten, welche der Formel $C_{10}H_{12}O_2$ entsprachen. — Bei der Destillation des Amyloxydhydrats mit Schwefelsäure erhielt er ein Destillat von veränderlichem Siedepunkt, welches durch Schwefelsäure in eine darin unlösliche und in eine darin mit rother Farbe lösliche Substanz zerlegt werden konnte; letztere, aus der schwefels. Lösung durch Wasser abgeschieden, stellte eine Flüssigkeit von veränderlichem Siedepunkt dar, aus welcher bei 175 bis 183° ein Destillat vom spec. Gew. 0,779 und der Zusammensetzung des Amyläthers ($C_{10}H_{14}O$) überging. — Chloramyl

Amyläther?

(1) Auch aus den Rückständen von der Darstellung des Aldehyds wurde von Dr. Price das Acetal in reichlicher Menge erhalten. — (2) Jahrb. pr. Pharm. XIV, 1; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 336; J. pharm. [8] XIV, 300.

($C_{10}H_{11}Cl$) stellte er dar durch Einleiten von salzs. Gas in Amyloxydhydrat (welches sich dabei grün färbt), und Destilliren bei möglichst gelinder Hitze; das übergehende Chloramyl ist durch einen Gehalt an Salzsäure amaranth-roth gefärbt; rein siedet es bei 102° . — Bei dem Einleiten gasförmiger Cyansäure in Amyloxydhydrat erstarrte dieses zu einem dicken Brei von Krystallen, welche in Alkohol umkrystallisirt und zwischen zwei Uhrgläsern sublimirt werden konnten, und deren Stickstoffgehalt der Formel $3C_{10}H_{11}O, 3HO, 2Cy_3O_3$ entsprach. — Salpetrigs. Amyloxyd ($C_{10}H_{11}O, NO_3$) stellte Rieckher dar durch Einleiten von salpetriger Säure in Amyloxydhydrat und Destillation bei möglichst gelinder Wärme und stetem Einleiten jener Säure; durch Rectification und fractionirte Destillation erhielt er es von 0,8773 spec. Gew. und 91° Siedepunkt. — Salpeters. Amyloxyd ($C_{10}H_{11}O, NO_3$) bereitete er durch behutsame Destillation von Amyloxydhydrat mit Salpetersäure unter Zusatz von Harnstoff oder salpeters. Ammoniak; die reine Verbindung hatte das spec. Gew. 0,902 bei 22° , den Siedepunkt 137° (1). — Benzoës. Amyloxyd ($C_{10}H_{11}O, C_{14}H_5O_3$) siedet nach ihm zwischen 252 und 254° .

Chloramyl.

Einwirkung
von
Cyansäure auf
Amyloxyd-
hydrat.Salpetrigsäu-
ren Amyloxyd.Salpetersäu-
ren Amyloxyd.Benzoësäure
Amyloxyd.

O. Henry d. j. (2) hat Zweifach-Schwefelamyl und Schwefelcyanamyl dargestellt. — Bei der Destillation gleicher Volume concentrirter Lösungen von amylotherschweifels. Kali und Zweifach-Schwefelkalium erhält man eine auf dem Wasser schwimmende gelbe, ölartige, stark riechende Flüssigkeit, welche über Chlorcalcium rectificirt als den zuerst übergehenden Theil (der gegen 210° siedet) Einfach-Schwefelamyl, und als den später übergehenden (zwischen 240 und 260° siedenden) Zweifach-Schwefelamyl giebt.

Zweifach-
Schwefel-
amyl.

(1) P. W. Hofmann, welcher das salpeters. Amyloxyd gleichfalls dargestellt und analysirt hat, fand das spec. Gew. 0,994 bei 10° und den Siedepunkt 148° (Ann. ch. phys. [3] XXIII, 374; J. pr. Chem. XLV, 358; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 832; Pharm. Centr. 1848, 621). — (2) Ann. ch. phys. [3] XXV, 246; im Ausz. Compt. rend. XXVIII, 48; Instit. 1849, 9; J. pharm. [3] XIV, 247; J. pr. Chem. XLVI, 160; Pharm. Centr. 1848, 905.

Schwefel-
cyanamyl.

Letzteres ($C_{10}H_{11}S_2$) ist eine schön ambergelbe, mit weißer Flamme hellbrennende, stark lauchartig riechende Flüssigkeit von 0,918 spec. Gew. bei 18°, auf welche die Säuren und Alkalien keine bemerkenswerthe Einwirkung hervorbringen. — Schwefelcyanamyl wurde erhalten durch Destillation gleicher Volume krystallisirten amylätherschwefels. Kalis und Schwefelcyanalkalium; von der mit Wasser übergehenden weißgelben, öltartigen, zwischen 170 und 260° siedenden Flüssigkeit von 0,905 spec. Gew. bei 20° zeigte der durch Rectification erhaltene zwischen 195 und 210° siedende Theil eine der Formel $C_{12}H_{11}NS_2 = C_{10}H_{11}C_2NS_2$ entsprechende Zusammensetzung; die Dampfdichte desselben wurde = 5,4, 6,0 und 6,6 gefunden; unter Voraussetzung einer Condensation auf 4 Vol. berechnet sich dafür 4,5. Sowohl das Zweifach - Schwefelamyl als das Schwefelcyanamyl geben mit Salpetersäure die zuerst von Gerathewohl aus Amylmercaptan mit Salpetersäure dargestellte Sulfamylschwefelsäure, deren Barytsalz im krystallisirten Zustande als $BaO, C_{10}H_{11}S_2O_4 + HO$, übereinstimmend mit Gerathewohl's Angabe, befunden wurde.

Cyanamyl.

Ueber Cyanamyl und seine Zersetzung durch Kali vergl. Seite 559.

Amyloxyd-
Schwefel-
kohlenstoff.

Desains (1) hat Amyloxyd - Schwefelkohlenstoff, $C_{10}H_{11}O, CS_2$ (Amyloxyd-Sulfocarbonat) dargestellt. Man reibt Kali mit reinem Amylalkohol (Kartoffelfuselöl) zusammen, und setzt zu dem Brei unter fortwährendem Reiben Schwefelkohlenstoff (ein Ueberschufs an Amylalkohol ist zu vermeiden). Es bildet sich amyloxanthons. Kali, welchem man sofort etwas Wasser und dann pulveriges Jod zusetzt. Sogleich bildet sich als gelbes Oel die der oben (Seite 690) besprochenen Aethylverbindung $C_6H_5S_4O$, entsprechende Amylverbindung $C_{12}H_{11}S_4O_2$. Auf 187° erhitzt fängt dieses Oel an zu siedend, und giebt als Destillat Amyloxyd - Schwefelkohlenstoff, eine amberfarbige, stark riechende Flüssigkeit.

(1) In der S. 674 angeführten Abhandlung.

Die verhältnißmäßig kleine Anzahl bisher bekannter alkoholartiger Körper ist um zwei neue Glieder (Melissin = $C_{60}H_{62}O_2$ und Cerotin = $C_{54}H_{56}O_2$) vermehrt worden, welche Brodie bei seinen ausdauernden und wichtigen Untersuchungen über das Bienenwachs und über chinesisches Wachs entdeckte. Die Untersuchungen Brodie's über diese Wachsorten überhaupt, mit Einschluss der von ihm gefundenen Resultate über Bestandtheile welche nicht in die Reihe der Alkohole gehören, mögen hier mitgetheilt werden.

Neue
Alkohole in
Wachs.

Die erste Mittheilung Brodie's (1) betrifft das Bienenwachs. Durch Behandeln des Wachses mit kochendem Alkohol (2) kann ihm eine (bisher als Cerin bezeichnete) Substanz entzogen werden, welche härter ist und einen höheren Schmelzpunkt hat als der Rückstand (Myricin). Diese Substanz wird durch Aetzkaliösung leicht verseift; wird die Seife durch eine Säure zersetzt, mit der ausgeschiedenen Säure ein Barytsalz dargestellt, und dieses getrocknet mit Aether behandelt, so entzieht dieser eine gewisse Menge einer Substanz (Ceraïn), auf welche Kali nur wenig einwirkt. Brodie ist nun der Ansicht, das Ceraïn, welches sich in dem Rückstand, dem s. g. Myricin, in größerer Menge findet, sei dem wie oben dargestellten Cerin nur beigemischt, bilde sich aber nicht durch Zersetzung desselben; Cerin sei eine in dem Wachs fertig gebildete Säure. Lewy's (3) Angabe, daß das Wachs bei dem Erhitzen mit Kalk- und Kalihydrat zu Talgsäure werde, und die darauf

Untersuchung
des Bienen-
wachses.

(1) Phil. Mag. [3] XXXIII, 217; J. pr. Chem. XLV, 335; Ann. Ch. Pharm. LXVII, 180; im Ausz. J. pharm. [3] XV, 145; Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 50. — (2) Vogel d. j. giebt an, daß Chloroform von reinem Bienenwachs immer eine constante Menge, $\frac{1}{4}$ des Ganzen, auflöse, von solchem, welches mit Talg oder Stearinsäure verfälscht sei, mehr. Das Chloroform entziehe dem Wachs eine weiche klebrige Substanz; der Rückstand sei körnig und leicht zerreiblich. (Repert. Pharm. [3] II, 117.) — (3) Ann. ch. phys. [3] XIII, 439; Berzelius Jahresber. XXIV, 468.

Untersuchung
des Bienen-
wachses. gegründete Ansicht von der Constitution des Wachses be-
zweifelt Brodie.

Zur Darstellung der im Wachs enthaltenen Säure, welche Brodie *Cerotinsäure* nennt, giebt er folgende Vorschrift. Bienenwachs wird 4- bis 5mal mit starkem Weingeist ausgekocht, und die Flüssigkeit von dem Rückstand heifs abgossen; die bei dem Abkühlen entstehenden Niederschläge werden in derselben Weise wiederholt mit Alkohol behandelt, bis die aus diesem sich ausscheidende Substanz bei 70° etwa schmilzt. Dann löst man diese vollständig in vielem kochenden Alkohol, fällt mit einer kochendheissen alkoholischen Lösung von essigs. Bleioxyd, kocht und filtrirt heifs, kocht den noch feuchten Niederschlag aufs Neue mit starkem Alkohol und dann mit Aether, und wiederholt dies bis diese Reinigungsmittel dem Niederschlag nichts mehr entziehen. Das so gereinigte Bleisalz wird dann mit starker Essigsäure zersetzt; die sich abscheidende Cerotinsäure wird mit kochendem Wasser gut gewaschen, in heissem absolutem Alkohol gelöst und die Lösung heifs filtrirt; bei dem Erkalten scheidet sich die Cerotinsäure in feinen körnigen Krystallen ab. Man kann sie noch weiter reinigen, indem man die so dargestellte Säure wieder mit Kali kocht, durch vieles Chlorbaryum und kohlen. Natron das Barytsalz niederschlägt, dieses mit Aether wäscht und wiederum mit einer Säure zersetzt, und die so erhaltene Säure nochmals aus Alkohol krystallisirt. Die Cerotinsäure schmilzt bei 78 bis 79° und erstarrt krystallinisch; ihre Zusammensetzung wurde der Formel $C_{54}H_{94}O_4$ entsprechend gefunden, welche auch durch die Analyse des Silbersalzes $AgO, C_{54}H_{93}O_3$ (erhalten durch Fällung der ammoniakalisch-alkoholischen Lösung der Säure durch eine alkoholische Lösung von salpeters. Silberoxyd) und der Aethyl-oxydverbindung $C_4H_5O, C_{54}H_{93}O_3$ (erhalten durch Einwirkung von salzs. Gas auf eine Lösung der Säure in absolutem Alkohol als eine wachsähnliche, bei 59 bis 60° schmelzende Masse) bestätigt wurde. — Wird Chlorgas mehrere

Tage lang über geschmolzene Cerotinsäure geleitet, bis sich kein salzs. Gas mehr entwickelt, so entsteht eine durchsichtige, gelbliche, gummiartige, zu Fäden ausziehbare Masse, von der Zusammensetzung $C_{54}H_{42}Cl_{12}O_4$. Brodie nennt sie *Chlorcerotinsäure*; sie bildet auf gleiche Weise, wie für den Cerotinsäureäther angegeben wurde, eine diesem ähnliche Aethyloxydverbindung $C_4H_6O, C_{54}H_{42}Cl_{12}O_3$. — Reine Cerotinsäure kann ohne Zersetzung destillirt werden. unreine Säure hingegen (s. g. Cerin) nicht. Bei 70° schmelzendes Cerin gab bei der Destillation zuerst ein ölartiges Destillat, gegen das Ende der Operation wenig von einer festen Substanz. Das Oel schied sich bei dem Stehen in zwei Schichten; die untere (etwa $\frac{1}{10}$ des ganzen) wurde weggenommen, und die obere mit Kali gekocht, welches indeß nur sehr wenig Säure aufnahm. Letzteres so behandelte Oel löste sich fast gänzlich in Alkohol, mit Zurücklassung einer geringen Menge eines festen, dem Paraffin gleichenden Körpers; es ist ein Gemenge verschiedener Öle, und bei der Destillation steigt der Siedepunkt fortwährend. Brodie analysirte 1) das bei 210 bis 220°, 2) bei 220 bis 230° (wo das meiste überdestillirt) und 3) bei 230 bis 250° übergehende, und fand die Zusammensetzung

	1)	2)	3)
Kohlenstoff	84,17	84,80	85,37
Wasserstoff	13,73	14,05	14,05
Sauerstoff	2,10	1,65	0,58

wonach der Siedepunkt um so höher ist, um je sauerstofffreier das Destillat ist.

Brodie giebt noch an, dafs in der alkoholischen Mutterlauge, aus welcher die Cerotinsäure krystallisirte, noch eine andere Säure enthalten ist; eine alkoholische Lösung von essigs. Bleioxyd bringt damit einen Niederschlag hervor, welcher von dem cerotins. Bleioxyd sich dadurch unterscheidet, dafs er sich bei dem Kochen in der alkoholischen Flüssigkeit wieder auflöst und bei dem Abkühlen in krystallinischen Körnern absetzt. Diese Säure gleicht der

Untersuchung
des Bienen-
wachses.

Untersuchung
des Bienen-
wachses.

Margarinsäure und auch in der Zusammensetzung nähert sie sich dieser; sie ist indeß in dem Wachs in so kleiner Menge enthalten, daß Brodie sie sich nicht in hinlänglicher Menge zur genaueren Untersuchung verschaffen konnte.

In einer Art von englischem Wachs fand Brodie 22 pC. Cerotinsäure, in Bienenwachs von Ceylon hingegen gar keine.

Der Rückstand von der Behandlung des Wachses mit Alkohol, das s. g. Myricin, ist von Brodie gleichfalls untersucht worden (1). Er ist grünlich, von der Consistenz des Wachses, und schmilzt bei 64°. Durch verdünnte Kalilauge wird er nur schwierig angegriffen, aber bei anhaltendem Kochen mit concentrirter Kalilauge oder besser mit alkoholischer Kalilösung, oder durch Schmelzen mit Kalihydrat, wird er verseift; bei der Verseifung vereinigt sich eine Säure mit dem Kali und ein in die Reihe der Alkohole gehörender Körper wird frei.

Die Reinigung der Säure und der neuen Alkoholart ist äußerst schwierig; beiden sind andere Substanzen zugemischt, welche schon in dem Myricin enthalten sind oder sich bei der Verseifung bilden. Eine von Brodie angewandte Methode zur Darstellung der Säure und der Alkoholart besteht darin, die Kaliseife in einer großen Menge Wasser zu lösen und die kochende Lösung durch Salzsäure zu zersetzen; die geschmolzene Masse, welche sich aus der Flüssigkeit ausscheidet, wird mit kochendem Wasser ausgezogen und in vielem Alkohol gelöst; bei dem Erkalten dieser Lösung scheidet sich der alkoholartige Körper fast gänzlich ab, während die Säure in Auflösung bleibt. Der erstere ist so dargestellt noch nicht rein; er wird in heißer Naphtha gelöst, aus welcher Lösung er sich bei dem Erkalten reiner abscheidet. So dargestellt schmilzt diese den Alkoholen zugehörige Substanz, welche Brodie als *Melissin* bezeichnet,

(1) Aus Phil. Trans. for 1848, I, im Ausz. J. pharm. [3] XVI, 66.

bei 85°; ihre Zusammensetzung ist $C_{60}H_{62}O_2$. — Mit Untersuchung
des Bienen-
wachses. Kali- und Kalkhydrat erhitzt, entwickelt das Melissin Wasserstoff und verwandelt sich in *Melissinsäure*, $C_{60}H_{60}O_4$, welche bei 88 bis 89° schmilzt. — Durch Einwirkung von Chlor verliert das Melissin 2 Aeq. Wasserstoff ohne daß diese ersetzt werden, und eine andere Menge Wasserstoff wird durch Chlor substituirt; Brodie analysirte eine solche Verbindung, deren Zusammensetzung durch $C_{60}H_{45.5}Cl_{14.5}O_2$ ausdrückbar war, und giebt dafür den Namen *Chloromelal*.

Bei dem Eindampfen der alkoholischen Flüssigkeit, aus welcher sich das Melissin ausgeschieden hatte, setzt sich die im Myricin enthaltene Säure ab; zu ihrer Darstellung im reineren Zustand sammelt man die ersten Krystalle, welche sich hierbei absetzen, verbindet sie mit Kali, zerlegt die gebildete Kaliseife mit Chlorbaryum und behandelt das Barytsalz mit Aether. Salzsäure scheidet dann aus dem so gereinigten Barytsalz eine fette Säure, welche der Margarín- oder Palmitinsäure gleicht; durch wiederholtes Umkrystallisiren aus Aether steigt der Schmelzpunkt dieser Säure auf 62°, und die Zusammensetzung wie die Eigenschaften der so gereinigten Säure sind dann die der Palmitinsäure, $C_{32}H_{64}O_2$.

Das gereinigte Myricin läßt sich betrachten als zusammengesetzt nach der Formel $C_{92}H_{92}O_4 = C_{60}H_{61}O, C_{32}H_{31}O_3$, d. i. als eine Verbindung von Palmitinsäure mit dem Aether des Melissin-Alkohols. Die Reinigung des Myricins ist nur schwierig auszuführen, durch wiederholtes Umkrystallisiren des rohen Myricins aus Alkohol, und dann aus Naphtha; man erhält so zuletzt das Myricin in büschelförmig vereinigten Krystallen, welche sich nur schwierig in Alkohol lösen und bei 87°,5 schmelzen. — Unter den Substanzen, welche in dem rohen Myricin noch enthalten sind, hebt Brodie eine Säure hervor, welche das Melissin begleitet und bei dem Umkrystallisiren des letztern aus Aether oder Naphtha aufgelöst bleibt; diese

Untersuchung
des Bienen-
wachses.

Säure scheint in die Reihe der Säuren $C_nH_{2n}O_4$ zu gehören, und für ihre Zusammensetzung wurde $C_{44}H_{88}O_{88}$ gefunden, welche Formel indeß von Brodie selbst als eine noch zweifelhafte betrachtet wird.

Bei der Destillation des Myricins gehen zuerst feste fette Säuren, zuletzt Kohlenwasserstoffe über (1). Die Destillationsproducte werden mit kochendem Wasser ausgezogen, mit Kali behandelt, und die sich nicht verseifenden Kohlenwasserstoffe von dem Kalisalz getrennt. In dem Kalisalz ist Palmitinsäure enthalten. — Durch Auflösen der Kohlenwasserstoffe in Aether und wiederholtes Umkrystallisiren aus diesem Lösungsmittel wird zuletzt ein fester Kohlenwasserstoff erhalten, welcher bei 56° schmilzt und aus gleichviel Aeq. Kohlenstoff und Wasserstoff zusammengesetzt ist; Brodie giebt ihm die Formel $C_{80}H_{80}$ und die Bezeichnung *Melen*.

Untersuchung
von
chinesischem
Wachs.

Eine andere Mittheilung Brodie's (2) hat die Untersuchung einer aus China kommenden Wachsart zum Gegenstand. Es wird diese gewöhnlich als ein vegetabilisches Wachs betrachtet, aber Brodie hält es für wahrscheinlicher, daß auch sie durch ein Insect secernirt werde. Dieses Wachs gleicht in seinem äußeren Ansehen dem Wallrath; es schmilzt bei etwa 83° ; Alkohol entzieht ihm nur sehr geringe Mengen einer fetten Substanz, und bei der Destillation giebt es nur Spuren von Akrolein.

Dieses Wachs wird durch Kochen mit verdünntem oder concentrirtem wässerigem Kali kaum irgend merklich angegriffen, durch Schmelzen mit Kalihydrat wird es hingegen rasch zersetzt, und es bildet sich eine Masse, welche

(1) Hinsichtlich der Destillationsproducte des Bienenwachses giebt Poleck an, daß die hierbei übergehende flüchtige Säure ein Gemenge von Essigsäure und Metacetonsäure, die dabei auftretende feste Säure wahrscheinlich ein Gemenge von Palmitinsäure und Margarinsäure sei (*Ann. Ch. Pharm.* LXVII, 174). — (2) *Phil. Mag.* [3] XXXIII, 378; *Ann. Ch. Pharm.* LXVII, 199; *J. pr. Chem.* XLVI, 30; im Ausz. *J. pharm.* [3] XV, 147; Laurent u. Gerhardt's *Compt. rend. des trav. chim.* 1849, 53.

mit Wasser eine milchige Lösung giebt. Wird diese Lösung durch Chlorbaryum gefällt, und der entstehende Niederschlag (welcher auch das Barytsalz der in dem Wachs enthaltenen Säure, Cerotinsäure, enthält) mit Alkohol oder Aether behandelt, so entziehen diese eine Substanz, welche Brodie als *Cerotin* bezeichnet, und welche aus Alkohol oder Aether umkrystallisirt, bis ihr Schmelzpunkt 79° ist, die Zusammensetzung $C_{54}H_{108}O_2$ hat, also die eines Alkohols. Bei dem Erhitzen mit Kalk- und Kalihydrat entwickelt das Cerotin Wasserstoff und verwandelt sich in Cerotinsäure $C_{54}H_{104}O_4$, welche auf diese Art dargestellt den Schmelzpunkt 81° zeigte. Wenn concentrirte Schwefelsäure auf fein zertheiltes Cerotin (so dafs die ganze Mischung einen dünnen Teig bildet) in der Kälte einige Stunden lang einwirkt, so bildet sich *schwefels. Cerotyl oxyd*; die Masse wird in kaltes Wasser geworfen, mit diesem ausgewaschen, im luftleeren Raum getrocknet, in Aether gelöst und aus diesem krystallisiren lassen; das Präparat ist löslich in Wasser, namentlich in mit etwas Weingeist versetztem, und hat die Zusammensetzung $C_{54}H_{108}O, SO_2$ (der Schwefelgehalt wurde in der Analyse nicht bestimmt). — Bei der Einwirkung von Chlor auf geschmolzenes Cerotin bildet sich ein durchsichtiger, gelblicher, gummiartiger Körper, dessen Zusammensetzung nahe der Formel $C_{54}H_{101}Cl_{13}O_2$ entsprechend gefunden wurde, und welchen Brodie als *Chlor-Cerotal* bezeichnet, um an die Analogie mit Chloral zu erinnern, bei dessen Bildung gleichfalls 2 Aeq. Wasserstoff aus dem Alkohol ohne Substitution ausgeschieden werden. — Bei der Destillation des Cerotins erhält man einen farblosen festen Körper, dessen Schmelzpunkt durch Umkrystallisiren von 70 auf 79° gebracht werden konnte; Brodie glaubt, ein Theil des Cerotins verflüchtigt sich unzersetzt, während ein anderer zu einem festen Kohlenwasserstoff und Wasser zersetzt werde.

Das ganze Wachs — aus Alkohol und Naphtha umkrystallisirt, mit Aether gewaschen, mit Wasser gekocht,

Verhalten
flüchtiger
Öle zu Jod.

Kochen; concentrirte Schwefelsäure färbt es sogleich dunkel braunroth und bei dem Erwärmen bildet sich eine zwiebelrothe Lösung, die durch Verdünnen mit Wasser farblos wird. Es ist frei von Jod; für seine Zusammensetzung wurde gefunden:

	aus Fenchelöl		aus Anisöl		$C_{30}H_{18}O_4$	$C_{30}H_{18}O_4$
Kohlenstoff	77,9	78,0	77,7	77,2	78,2	78,0
Wasserstoff	—	8,2	8,5	8,5	7,8	8,2
Sauerstoff	—	13,8	13,8	14,3	13,9	13,8

Die Formel $C_{30}H_{18}O_4$ wird für wahrscheinlicher gehalten, nach welcher man sich die Entstehung so denken kann, daß zu 3 At. des Stearoptens des Fenchel- und Anisöls (nach Blanchet und Sell $C_{10}H_6O$) 1 At. Sauerstoff tritt. — Bei dem Ueberleiten von Chlor bei gewöhnlicher Temperatur färbt sich dieser Körper violett, unter Erwärmung, Absorption von Chlor und Entwicklung von salzsa. Gas; findet die Einwirkung bei 100° statt, so zeigt sich keine Färbung. Der auf die letztere Art veränderte Körper zeigte die Zusammensetzung

	aus Fenchelöl	aus Anisöl	$C_{30}H_{18}Cl_2O_4$
Kohlenstoff	52,7	51,5	54,0
Wasserstoff	4,7	4,8	4,5
Chlor	31,9	32,7	31,6
Sauerstoff	10,7	11,0	9,9

Man kann also die analysirten Substanzen betrachten als $C_{30}H_{18}O_4$, worin 3 H, und wohl auch etwas mehr, durch Chlor vertreten sind.

Bitter-
mandelöl.

Lepage (1) bestätigte die Angabe von Winckler, daß die frischen Blätter des Kirschchlorbeers Bittermandelöl und Blausäure fertig gebildet enthalten, und daß beide beim Trocknen völlig verloren gehen. Die getrockneten Blätter enthalten aber noch einen durch heißes Wasser, besser durch Alkohol ausziehbaren Körper (Winckler's amorphes Amygdalin), der mit Mandelemulsion wieder Blausäure und Bittermandelöl liefert, weshalb in dem Destillat davon zwar noch diese beiden Verbindungen sich vorfinden, aber in weit geringerer Menge als in dem von frischen Blättern.

(1) J. chim. méd. [3] IV, 365; Pharm. Centr. 1848, 877.

Erwärmt man, nach Cahours (1), Phosphorchlorid mit Bittermandelöl (Benzoylwasserstoff), so destilliren 2 Körper über, von welchen der eine, bei 110° siedende, das von Wurtz entdeckte Phosphoroxychlorid PCl_3O_2 ist; der andere, erst bei 206° siedende und von Cahours *Chlorobenzol* genannte, ist $\text{C}_{14}\text{H}_6\text{O}_2$, also Bittermandelöl in welchem der Sauerstoff durch Chlor ersetzt ist. ($\text{PCl}_3 + \text{C}_{14}\text{H}_6\text{O}_2 = \text{PCl}_3\text{O}_2 + \text{C}_{14}\text{H}_6\text{Cl}_2$.) Das Chlorobenzol ist farblos, durchsichtig, erwärmt durchdringend riechend, von 1,245 spec. Gew. bei 16°; die beobachtete Dampfdichte ist 5,649, die für eine Condensation auf 4 Vol. berechnete ist 5,595; es ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether, und unzersetztbar durch Kalilauge. — Mit einer alkoholischen Auflösung von Schwefelwasserstoff-Schwefelkalium zersetzt sich das Chlorobenzol in Chlorkalium und in einen weissen, bei 64° schmelzbaren Körper, das *Sulfobenzol*. Dieses krystallisirt aus Alkohol in glänzenden Schuppen, ist nicht ohne partielle Zersetzung flüchtig, und liefert durch Behandlung mit Salpetersäure Schwefelsäure und einen gelben, krystallisirbaren, in Alkalien löslichen Körper. Das Sulfobenzol ist $\text{C}_{14}\text{H}_6\text{S}_2$; es ist Bittermandelöl, in welchem der Sauerstoff durch Schwefel ersetzt ist.

Benzol (C_{12}H_6) fand Mansfield (2) in ansehnlicher Menge in demjenigen Theil des Destillats von Steinkohlentheer, welcher zuerst übergeht und auf Wasser schwimmt. Er unterwarf denselben oft wiederholter fractionirter Destillation; die so zuletzt erhaltene Portion Flüssigkeit, welche zwischen 80 und 90° kochte, erkaltete er auf — 10 bis — 12°, und trennte den hier flüssig bleibenden und den bei Erwärmen bis gegen 0° hin flüssig werdenden Theil durch Auspressen von dem krystallinisch-festen; letzterer ist Benzol, dessen Siedepunkt Mansfield zwischen 80 und 81°, das spec. Gew. zu 0,85, die Dampfdichte zu 2,823 fand. Mansfield

(1) In der S. 363 angeführten Abhandlung. — (2) Chem. Soc. Qu. J. I, 244; Ann. Ch. Pharm. LXIX, 162; Pharm. Centr. 1849, 376.

Benzol. bespricht noch die Anwendbarkeit des Benzols zu praktischen Zwecken und die beste Art, es hierfür aus dem Steinkohlentheer zu gewinnen. Die andern Bestandtheile des flüchtigern und auf Wasser schwimmenden Theils des Steinkohlentheers wird er später untersuchen; wir theilen von seinen vorläufigen Angaben hier nur mit, daß in dem (nach oft wiederholter fractionirter Destillation) bei 100 bis 115° siedenden Theile Toluol ($C_{10}H_8$), in dem bei 140 bis 145° siedenden Cumol ($C_{10}H_{12}$) und in dem zwischen 170 und 175° siedenden wahrscheinlich Cymol ($C_{10}H_{14}$) enthalten ist.

Abel (1) vermochte nicht, das Benzol durch Anwendung oxydirender Mittel in eine Säure überzuführen. Chromsäure und die Mischung von Schwefelsäure mit zweifach-chroms. Kali sind ohne Einwirkung auf dasselbe; Salpetersäure, selbst sehr verdünnte, verwandelt es nur allmählig in Nitrobenzol.

Zimmtöl. Das Zimmtöl zersetzt sich nach Cahours (2) mit Phosphorchlorid nicht so einfach, daß die entstehenden Producte leicht zu untersuchen wären; es entweicht viel Salzsäure, die Masse wird zähe und zuletzt unter Aufblähen schwarz.

Kümmelöl. Bekanntlich besteht das Kümmelöl (Kreuzkümmelöl) aus zwei Oelen, von welchen das eine, Cuminol, sauerstoffhaltig ($C_{20}H_{12}O_2$) ist und durch Behandlung mit Kali in Cuminsäure ($C_{20}H_{12}O_4$) übergeht, aus welcher ihrerseits durch Destillation mit Baryt oder Kalk Cumol ($C_{10}H_{12}$) erhalten wird, und aus einem sauerstofffreien Oel, Cymol ($C_{10}H_{14}$). In den letzten Jahren ist die Einwirkung von Salpetersäure sowohl auf Cumol als auf Cymol untersucht worden.

Einwirkung der Salpetersäure auf Cumol. Abel (3) hat die Oxydationsproducte des Cumols durch Salpetersäure studirt. Er stellte das Cumol dar,

(1) In der unter (3) angeführten Abhandlung. — (2) In der S. 363 angef. Abhandl. — (3) Phil. Mag. [3] XXXII, 63; Chem. Soc. Mem. III, 441; Ann. Ch. Pharm. LXIII, 308; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 182; J. pr. Chem. XLIV, 148.

indem er Cuminsäure mit dem 4fachen Gewicht an Aetzkalk in einer kupfernen Retorte destillirte, wobei die Temperatur zuletzt bis zum Rothglühen gesteigert wurde; das Destillat wurde über Kali rectificirt; ein anhängender unangenehm-empyreumatischer Geruch liefs sich durch Destillation mit einer concentrirten Lösung von Chromsäure entfernen. Das über Chlorcalcium getrocknete Cumol ($C_{10}H_{12}$) zeigte den Siedepunkt 148° . Bei dem Kochen mit concentrirter Salpetersäure wird es schnell zu einem schweren Oel [Nitrocumol, $C_{10}H_{11}(NO_2)$], welches bei längerem Kochen wieder verschwindet und sich in eine gelbliche Krystallmasse verwandelt, die bis auf einen kleinen festen Rückstand [Binitrocumol, $C_{10}H_{10}(NO_2)_2$] in Ammoniak löslich ist. Salzsäure fällt aus der ammoniakalischen Lösung einen weifsen Niederschlag, welcher in kaltem Wasser wenig löslich ist, in heifsem sich ziemlich leicht auflöst, und bei dem Erkalten letzterer Lösung krystallisirt. Dieses Product ist Nitrobenzoësäure, $C_{14}H_9(NO_2)_2O_4$, welche aber nur dann reiner erhalten wird, wenn das Cumol mit rauchender Salpetersäure mehrere Tage lang destillirt wurde. — Bei mehrtägiger Einwirkung so verdünnter Salpetersäure, dafs sich bei dem Sieden der Mischung niemals rothe Dämpfe entwickeln, verwandelt sich das Cumol in Benzoësäure ($C_{14}H_9O_4$).

Einwirkung
von Salpeter-
säure auf
Cumol.

Noad (1) hat die Einwirkung der Salpetersäure auf Cymol ($C_{20}H_{14}$) studirt. Zur Darstellung des Cymols (2) wurden die bei der Destillation des Kümmelöls zuerst übergehenden zwei Drittheile des Destillats wiederholt über geschmolzenes Kali rectificirt, bis durch diese Behandlung keine Aenderung mehr hervorgebracht wurde (eine kupferne Retorte ist zweckmäfsig, da Glasgefäfsse durch das Kali stark

Einwirkung
der Salpeter-
säure auf
Cymol.

(1) Phil. Mag. [3] XXXII, 15; Chem. Soc. Mem. III, 421; Ann. Ch. Pharm. LXIII, 281; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 178; J. pr. Chem. XLIV, 145; J. pharm. [3] XIII, 74. — (2) Noad berichtet, dafs Warrington (welcher ihm das nöthige Kümmelöl mittheilte) von 84 Pfund Kümmelsamen in 4 Destillationen 2 Pfund 12 Unzen Oel erhielt, und dafs diese nach dem beschriebenen Verfahren 18 Unzen reines Cymol gaben.

Einwirkung
der Salpeter-
säure auf
Cymol.

angegriffen werden). Das spec. Gewicht des durch Chlорcalcium getrockneten Cymols fand Noad 0,8576 bei 16°, den Siedepunkt 171°,5. (Die Darstellung von Cymol durch Einwirkung von wasserfreier Phosphorsäure auf Campher gab nur geringe Ausbente). Andauernde Behandlung mit Chromsäure oder mit Manganhyperoxyd und Schwefelsäure lassen das Cymol unverändert. Uebermangansäure wirkt schnell auf Cymol ein, aber es scheint sich keine Säure dabei zu bilden.

Wird $\frac{1}{2}$ Kilogramm verdünnter Salpetersäure (aus gewöhnlicher und dem 6fachen Volum Wasser gemischt) mit etwa 125 Grm. Cymol wiederholt destillirt, so geht die Oxydation ruhig und langsam vor sich; das Oel färbt sich zuerst durch Absorption von Stickoxydgas blau, dann wird es dunkelgelb, und wenn das Uebergegangene 20- bis 30mal in die Retorte zurückgegossen worden ist, so beginnt das Oel schwer und zähe zu werden und auf den Boden der Retorte niederzusinken; die Operation ist (nach 2 bis 3 Tagen) vollendet, wenn auf dem in der Vorlage verdichteten Wasser nicht mehr Oeltröpfchen, sondern weisse Krystalle schwimmen. Die ganze Retorte erfüllt sich dann bei dem Abkühlen mit Krystallen, die um so reiner und weisser sind, um je verdünnter die angewandte Salpetersäure gewesen war. Bei Anwendung concentrirter Salpetersäure tritt bei dem Siedepunkt der Mischung eine stürmischere Reaction ein, und die sich bildende Säure enthält viel von der weiter unten zu beschreibenden Nitrotoluylsäure; letztere bildet sich indefs jedesmal, wenn auch bei Anwendung verdünnterer Säure in geringerer Menge. Zur Reinigung kocht man die mit Wasser gewaschene Säure mit Kalkmilch, filtrirt (wodurch eine gelbe harzige Materie entfernt wird), zersetzt die erkaltete Lösung des Kalksalzes mit Salz- oder Salpetersäure, und wiederholt diese Operation bis die so ausgefüllte Säure vollkommen weiss ist; diese löst man dann in Barytwasser, dampft die Lösung im Wasserbad zur Trockne ein, und behandelt die trockne Salzmasse mit

kaltem Wasser, wo eine kleine Menge nitrotoluyls. Baryts Einwirkung der Salpetersäure auf Cymol. ungelöst bleibt; mit dem so reiner erhaltenen Barytsalz wiederholt man diese Operation, bis es nicht mehr einen Gehalt an unlöslichem Salz zeigt. Wird dann aus dem reinen Barytsalz die Säure gefällt, gewaschen und umkrystallisirt, so hat man reine *Toluylsäure*, $C_{10}H_8O_4$, welche mit dem Anisylwasserstoff und dem benzoës. Methyloxyd isomer ist. Aus der wässerigen Lösung eines ihrer Salze durch Salz- oder Salpetersäure abgeschieden, ist diese Säure eine schwere, weißse, käsige, aus mikroskopischen nadelförmigen Krystallen bestehende Masse; sie löst sich reichlich in siedendem Wasser und krystallisirt daraus bei dem Erkalten in Nadeln; sie löst sich beinahe nach jedem Verhältniß in Holzgeist, Alkohol und Aether; erhitzt schmilzt sie und sublimirt unzersetzt zu schönen Nadeln; ganz rein ist sie geruch- und geschmacklos, aber selbst an sehr reiner Säure haftet ein eigenthümlicher widerlicher Geruch. Quantitativ wurden untersucht das Barytsalz (dessen Darstellung eben angegeben wurde und welches nicht in deutlichen Krystallen erhalten werden konnte), das Silberoxydsalz (aus toluyls. Ammoniak durch salpeters. Silberoxyd als ein weißer käsiger Niederschlag erhalten, welcher aus der heißen wässerigen Lösung in kleinen Nadeln krystallisirt) und das Kupferoxydsalz (aus toluyls. Kali durch schwefels. Kupferoxyd als hellblauer Niederschlag erhalten, welcher sich nur wenig in Wasser, leichter in Ammoniak zu einer tiefblauen Flüssigkeit löst); die Zusammensetzung dieser Salze ist $MeO, C_{10}H_7O_3$. Das toluyls. Aethyloxyd, $C_4H_5O, C_{10}H_7O_3$ (erhalten durch Sättigen der alkoholischen Lösung der Säure mit Chlorwasserstoffgas, Abdestilliren von $\frac{1}{3}$ der Flüssigkeit, Zusatz von Wasser zu dem Rückstand, Digeriren des sich dann ausscheidenden schweren schwarzen Oels mit Ammoniak, Waschen mit Wasser, Digeriren mit Chlorcalcium und Rectificiren) ist eine farblose aromatische Flüssigkeit, welche bei 228° , (19° höher als das benzoës. Aethyloxyd, $C_4H_5O, C_{10}H_7O_3$)

Einwirkung
der Salpeter-
säure auf
Cymol.

siedet. Das Kalisalz ist sehr löslich und krystallisirt nur schwierig in Nadeln; das Natronsalz ist noch löslicher und konnte nicht in Krystallen erhalten werden; das Ammoniaksalz krystallisirt in kleinen Prismen, und das Kalksalz aus der concentrirten wässerigen Lösung in langen glänzenden Nadeln. — Wird die Toluylsäure mit einem grossen Ueberschuss von Aetzbaryt destillirt, so geht Toluol ($C_{10}H_8$) über, dessen Siedepunkt Noad zu 109° bis $110^\circ,5$ fand (1).

Wird Cymol mit rauchender Salpetersäure destillirt (ist diese nicht von der höchsten Concentration, so bildet sich ein indifferenten, krystallinischer, nur schwierig zu Nitrotoluylsäure umzuwandelnder Körper), so tritt heftige Einwirkung ein; wird die Destillation so lange fortgesetzt als sich noch rothe Dämpfe entwickeln, so scheidet sich bei dem Abkühlen der Retorte eine krystallinische Masse ab, und Zusatz von Wasser bringt einen reichlichen Niederschlag hervor. Die ganze Masse wird auf ein Filter gebracht, mit kaltem Wasser und dann mit Ammoniak gewaschen, wo sich der grösste Theil löst und nur wenig ölige Substanz zurückbleibt. Aus der ammoniakalischen Lösung wird die neugebildete Säure durch Salzsäure abgeschieden, mit kaltem Wasser gewaschen, in heissem Alkohol gelöst, mit Thierkohle zum Sieden erhitzt, und freiwilliger Verdunstung überlassen. Es krystallisirt alsdann *Nitrotoluylsäure*, $C_{10}H_7(NO_2)O_4$ [Toluylsäure, worin 1 H durch 1 (NO_2) ersetzt ist] in prachtvollen blafsgelben rhombischen Prismen. Quantitativ untersucht wurden das Barytsalz dieser Säure (aus dem Ammoniaksalz durch Chlorbaryum als weisser käsiger Niederschlag gefällt, welcher sich reichlich in siedendem Wasser löst und daraus bei dem Abkühlen in sternförmig vereinigten Krystallen anschiesst), das Silberoxydsalz (aus dem Ammoniaksalz

(1) A. W. Hofmann hat in einem Zusatz zu Noad's Abhandlung mitgetheilt, dass Glenard und Boudault's Dracyl mit Toluol ($C_{10}H_8$) nicht blos isomer, sondern identisch ist; auch aus ersterem konnte Nitrotoluol und daraus Toluidin dargestellt werden.

durch salpeters. Silberoxyd als käsiger Niederschlag gefällt, ^{Einwirkung der Salpetersäure auf Cymol.} welcher aus der Lösung in siedendem Wasser bei dem Erkalten sich in federartigen Krystallen absetzt, die nur wenig in Alkohol löslich sind; bei zu langem Sieden mit Wasser schwärzt es sich), und das Kalksalz (ebenso mit Chlorcalcium erhalten als ein krystallinischer Niederschlag, welcher aus der wässerigen Lösung als ein Haufwerk schiefer rhombischer Säulen krystallisirt), deren Zusammensetzung $\text{MeO}, \text{C}_{10}\text{H}_6(\text{NO}_4)\text{O}_3$ ist; sodann nitrotoluyls. Aethyloxyd, $\text{C}_4\text{H}_5\text{O}, \text{C}_{10}\text{H}_6(\text{NO}_4)\text{O}_3$ (durch Destilliren der alkoholischen, mit Chlorwasserstoffgas gesättigten, Lösung der Säure bis das Uebergehende mit Wasser sich milchig trübt, Behandeln des schweren gelben ölarartigen, bei dem Erkalten krystallinisch erstarrenden, Rückstandes mit kohlen. Kali, Waschen desselben mit Wasser, Umkrystallisiren aus Alkohol), welches lichtgelbe angenehm riechende, im Wasserbad schmelzende und dann nur langsam wieder erstarrende Krystalle bildet, und das nitrotoluyls. Methyloxyd, $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}, \text{C}_{10}\text{H}_6(\text{NO}_4)\text{O}_3$ (auf entsprechende Weise dargestellt, aber zur Reinigung auch mit kochender starker Salpetersäure behandelt), welches gleichfalls bei gewöhnlicher Temperatur krystallinisch ist. Von dem Kali- und dem Natronsalz gilt das für die entsprechenden toluyls. Salze bemerkt; das Ammoniaksalz krystallisirt aus der wässerigen Lösung in langen Nadeln, und verliert schon bei dem Kochen mit Thierkohle seinen ganzen Ammoniakgehalt; das neutrale Ammoniaksalz giebt mit schwefels. Kupferoxyd ein basisches Kupferoxydsalz. — Eine Mischung rauchender Schwefel- und Salpetersäure wirkt auf die Nitrotoluylsäure nicht ein.

Römisch-Kümmelöl giebt nach Cahours (1) bei der Destillation mit Phosphorchlorid, neben Phosphoroxychlorid, eine bei 255 bis 260° destillirende, farblose, in Wasser unlösliche, in Alkohol und Aether leicht lösliche Flüssigkeit, *Chlorocuminol*, $\text{C}_{20}\text{H}_{12}\text{Cl}_2$, d. i. Römisch-Kümmelöl, in

Römisch-Kümmelöl.

(1) In der S. 363 angeführten Abhandlung.

welchem der Sauerstoff durch Chlor ersetzt ist ($C_{20}H_{12}O_2 + PCl_5 = PCl_3O_2 + C_{20}H_{12}Cl_2$). Mit einer weingeistigen Auflösung von Schwefelwasserstoff - Schwefelkalium bildet das Chlorocuminol Chlorkalium und einen klebrigen unangenehm riechenden Körper.

Römisch-
Kamillenöl.

Untersuchungen über Römisch-Kamillenöl und Rautenöl hat Gerhardt (1) mitgetheilt. — Römisch-Kamillenöl (von *Anthemis nobilis*) ist grünlich und angenehm riechend; bei 160° beginnt es zu destilliren, aber der Siedepunkt steigt allmählig bis 180° und selbst bis 190°, wo er dann längere Zeit stationär bleibt und bei welcher Temperatur etwa $\frac{1}{2}$ des Oels übergehen. Zuletzt steigt der Siedepunkt bis 210°, was durch einen Gehalt des Oels an einem harzigen Bestandtheil verursacht wird. In dem zwischen 200 und 210° Uebergegangenen wurden 75,6 bis 76,0 pC. Kohlenstoff, 10,6 bis 10,8 Wasserstoff und 13,2 bis 13,9 Sauerstoff gefunden. Durch fractionirte Destillation kann dieses Oel nicht in nähere Bestandtheile zerlegt werden. Wässerige Kalilösung wirkt nicht auf es ein; wird es mit gepulvertem Kalihydrat gelind erwärmt, so bildet bald das Ganze eine gallertartige Masse, ohne daß Gasentwicklung dabei stattfindet, und auf Zusatz von Wasser scheidet sich das Oel wieder unverändert ab. Erhitzt man aber die gallertartige Masse stärker, oder erhitzt man Römisch-Kamillenöl mit einer alkoholischen Kalilösung, so zerlegt sich das Oel in einen sich höher oxydirenden sauerstoffhaltigen Bestandtheil und in einen Kohlenwasserstoff. Bei dem Schmelzen von überschüssigem Kali mit dem Oel bläht sich die Masse durch Entwicklung von Wasserstoff stark auf, und zugleich geht ein angenehm riechender Kohlenwasserstoff über; wird die rückständige Masse mit Schwefelsäure übersättigt, so stößt sie saure Dämpfe von Angelikasäure ($C_{10}H_8O_4$) aus, welche sich leicht nadelförmig condensiren. Ein Gehalt

(1) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 96; J. pr. Chem. XLV, 321; Ann. Ch. Pharm. LXVII, 235; Pharm. Centr. 1848, 801; Chem. Gaz. 1848, 483; im Ausz. Compt. rend. XXVI, 225.

an dieser Säure ist die Ursache, weshalb das Römisch-Kamillenöl sauer reagirt. Wird Römisch-Kamillenöl während einiger Minuten mit alkoholischer Kalilösung gekocht, so tritt der sauerstoffhaltige Bestandtheil an das Kali und nur der Kohlenwasserstoff bleibt in Auflösung; wird jetzt destillirt und der getrocknete Rückstand mit Schwefelsäure zersetzt, so scheidet sich Valeriansäure ($C_{10}H_{10}O_4$) ab. Der bei Behandlung des Oels mit festem Kali übergehende oder nach der Behandlung mit alkoholischer Kalilösung aus dem Destillat durch Zusatz von Wasser und Chlorcalcium abscheidbare Kohlenwasserstoff wird durch Rectification über Kalium gereinigt; er riecht angenehm citronenartig und kocht bei 175° ; seine Zusammensetzung ist $C_{10}H_8$; mit rauchender Schwefelsäure giebt er keine gepaarte Verbindung. Gerhardt ist der Ansicht, der sauerstoffhaltige Bestandtheil, welcher zusammen mit diesem Kohlenwasserstoff das Römisch-Kamillenöl bildet, sei $C_{10}H_8O_2$, das Aldehyd der Angelikasäure.

Römisch-Kamillenöl.

Für das Rautenöl (von *Ruta graveolens*) hatte Will (1) die Zusammensetzung $C_{20}H_{20}O_2$ gefunden, und eine solche Dampfdichte, daß diese Formel eine Condensation auf 4 Vol. ausdrückt, aber den Siedepunkt hatte er zwischen 218 und 245° sich ändernd beobachtet. — Gerhardt (2) hatte nach Will's Analysen vermuthet, das Rautenöl möge im reinen Zustand $C_{20}H_{20}O_2$ und isomer mit dem Stearopten aus dem Pfeffermünzöl sein. — Cahours (3) hatte gezeigt, daß das mehrmals rectificirte Rautenöl constant bei 228 bis 230° siedet, bei -1 bis -2° zu glänzenden Blättchen krystallisirt, die Zusammensetzung $C_{20}H_{20}O_2$ hat und eine solche Dampfdichte, daß diese Formel eine Condensation auf 4 Vol. ausdrückt. Er hatte gefunden, daß das Oel durch concentrirte Salpetersäure in eine ölartige flüchtige Säure $C_{20}H_{20}O_4$ verwandelt wird, welche er Rutinsäure

Rautenöl.

(1) Ann. Ch. Pharm. XXXV, 235; Berzelius' Jahresbericht XXI, 351. — (2) Précis de chimie organique II, 153. — (3) Thèse de chimie, présentée à la faculté des sciences de Paris, 1845.

Rautenöl. nannte und als deren Aldehyd das Oel betrachtet werden könne. — Gerhardts fand nun jetzt, daß das Oel bei 218° zu kochen anfängt und der Siedepunkt bis zu 236° steigt, wo er beinahe stationär bleibt; das Destillat kochte bei 233°. In dem zuerst Uebergehenden fand er 77,7 pC. Kohlenstoff, 12,8 Wasserstoff, 9,5 Sauerstoff, welche Zahlen keiner Formel entsprechen; die Zusammensetzung des letzten Drittheils von dem bei der Destillation Uebergehenden entsprach hingegen der Formel $C_{20}H_{20}O_2$. Das Rautenöl vereinigt sich mit einem Gemenge von Kalk und Kali; bei Erhitzung bis zu 290° erfolgt keine Gasentwicklung, die Masse ist dann gelblich und bei dem Auflösen in Salzsäure scheidet sich viel unverändertes Oel ab. Leitet man die Dämpfe des Oels über geschmolzenes Chlorzink, so bildet sich ein Kohlenwasserstoff von unermittelter Zusammensetzung. Durch Auflösen des sauerstoffhaltigen Bestandtheils des Oels ($C_{20}H_{20}O_2$) in dem 3- bis 4fachen Volum gewöhnlichen Weingeists, Durchleiten von Chlorwasserstoffgas bis die Flüssigkeit braun und rauchend war, Abdestilliren der flüchtigeren Bestandtheile und Zusatz von Wasser zu dem Rückstand wurde ein bei 230 bis 235° kochendes Oel erhalten, welches aber angenehm nach Früchten roch und nach einiger Zeit fest wurde, unter Bildung von Krystallen, welche bei 13° schmolzen, gleichfalls die Zusammensetzung $C_{20}H_{20}O_2$ hatten, sich in kalter concentrirter Schwefelsäure leicht und fast ohne Färbung lösten und bei dem Erhitzen damit eine gepaarte Säure gaben, deren Barytsalz in Wasser löslich war (das gewöhnliche Rautenöl zeigt dieses Verhalten nicht). Gerhardts hebt hervor, daß das Rautenöl die Zusammensetzung des Aldehyds der Caprinsäure hat; eine wässrige Lösung von salpeters. Silberoxyd wirkt bei dem Kochen kaum auf es ein, aber bei dem Kochen mit ammoniakalischer Silberlösung wird das Silber reducirt. Wird 1 Theil Oel mit 1 Theil gewöhnlicher Salpetersäure, die mit einem gleichen Volum Wasser verdünnt ist, erwärmt, so tritt eine heftige, längere Zeit andauernde, Reaction ein;

kocht man nach Beendigung derselben die Masse, bis sich Rautenöl.
 keine rothen Dämpfe mehr entwickeln, und setzt dann
 Kalilauge zu, so scheidet sich eine gewisse Menge eines
 nicht sauren, sehr scharf riechenden Oels ab; aus der
 alkalischen Lösung wird durch Schwefelsäure eine ölige
 Säure ausgeschieden, welche durch Rectification gereinigt
 wurde; sie wurde als Pelargonsäure ($C_{15}H_{15}O_4$) erkannt
 (das Barytsalz und das Silbersalz, $MeO, C_{15}H_{17}O_3$, wurden
 analysirt; die alkoholische Lösung des Ammoniaksalzes
 giebt mit wässerigem salpeters. Kupferoxyd einen blau-
 grünen Niederschlag, aus dessen Lösung in kochendem
 Alkohol bei dem Verdampfen des Alkohols grüne ölige
 Tropfen sich abscheiden, welche bei dem Erkalten kry-
 stallisiren und pelargons. Kupferoxyd, bei 100° getrocknet
 $CuO, C_{15}H_{17}O_3 + 2HO$, sind). Bei der Darstellung
 des Barytsalzes aus der Säure wurde mehrmals aufser
 pelargons. Baryt auch ein anderes, in Alkohol weniger
 lösliches und später auskrystallisirendes Salz, caprins. Baryt,
 erhalten. Gerhardt hält die Caprinsäure und Cahours
 Rutinsäure (beide sind $C_{20}H_{20}O_4$) für identisch. —
 Cahours selbst (1) nahm die Priorität mehrerer dieser
 von Gerhardt über das Rautenöl gemachten Angaben in
 Anspruch, welche Gerhardt (2) auch anerkannte; ersterer
 theilte bei dieser Gelegenheit noch weiter mit, auch er habe
 gefunden, dafs je nach der Dauer der Einwirkung der
 Salpetersäure auf Rautenöl sich auch noch andere Säuren,
 $C_{15}H_{15}O_4$ und $C_{16}H_{16}O_4$ z. B., bilden, und dafs die
 Rutinsäure (oder Caprinsäure, $C_{20}H_{20}O_4$) mit Phosphor-
 chlorid behandelt eine flüchtige Flüssigkeit $C_{20}H_{19}ClO_2$,
 Rutylichlorür, gebe, welche mit Kali Chlorkalium und
 rutins. Kali bilde.

Doveri (3) hat Untersuchungen über das Thymianöl Thymianöl.
 (von *Thymus vulgaris*) mitgetheilt. Das untersuchte Oel

(1) Compt. rend. XXVI, 262. — (2) Compt. rend. XXVI, 361. —

(3) Ann. ch. phys. [3] XX, 174; J. pr. Chem. XLI, 318; im Ausz.
 Ann. Ch. Pharm. LXIV, 374; Pharm. Centr. 1847, 589.

Thymianöl. war rothbraun und setzte nach einiger Zeit Stearopten ab, von starkem Geruch, der nur bei sehr verdünnter Verbreitung an Thymian erinnerte, und Lackmus schwach röthend. Rectificirt war es schwach gelb gefärbt. Das rectificirte Thymianöl kommt bei der Destillation bei etwa 150° zum Sieden, der Siedepunkt steigt rasch bis 175°, wo er lange constant ist, dann steigt er langsam bis 180°, dann rasch bis zu 230°, von wo an er sich nur langsam bis 235° erhebt. — Die Zusammensetzung des bei 175 bis 180° Uebergehenden fand Doveri ausdrückbar durch $C_{34}H_{26}O$, aber die Dampfdichte nur = 4,8, während sie sich (unter Voraussetzung einer Condensation auf 4 Vol.) zu 8,3 berechnet; er hält diese Flüssigkeit defshalb für ein Gemenge (vergl. unten). Wurde sie mit Chlorwasserstoffgas gesättigt und der Ueberschufs desselben durch Einleiten von Kohlensäure entfernt, so bildete sich eine leicht bewegliche rothbraune Flüssigkeit, welche einige Grade unter 0° fest und bei gewöhnlicher Temperatur wieder flüssig wurde; nach längerem Stehen setzten sich hierin kleine prismatische Krystalle ab; bei — 17° wurde die ganze Masse fest, und zerfiel dann auf einem porösen Stein in kleine weiße Krystalle und in eine absorbirt werdende Flüssigkeit. Wasserfreie Phosphorsäure wirkt auf den bei 175 bis 180° übergehenden Theil des Thymianöls nicht bemerkbar ein. — Der bei 230 bis 235° übergehende Theil ist dickflüssiger als der eben besprochene, und seine Zusammensetzung ausdrückbar durch $C_{30}H_{18}O_2$, womit die Dampfdichte übereinstimmt (beobachtet wurde sie zu 5,5, sie berechnet sich unter Voraussetzung einer Condensation auf 4 Vol. zu 5,3). Salpetersäure greift diese Flüssigkeit heftig an, unter Entwicklung von Kohlensäure und salpetrigen Dämpfen; der mit vielem Wasser gewaschene Rückstand bildet eine weiche, harzartige, orangegelbe, eigenthümlich unangenehm riechende Masse, welche sich in Alkohol löst und aus dieser Lösung durch Wasser in hellgelben Flocken gefällt wird, und mit wässerigen Alkalien roth-

braune, bei dem Schütteln stark schäumende Lösungen bildet. Mit wasserfreier Phosphorsäure erhitzt sie sich, wird weinroth und syrupartig, und giebt dann ein Destillat, welches noch einigemal über wasserfreie Phosphorsäure und dann mit Wasser rectificirt eine leichte, sehr flüssige, farblose, naphtha-artig riechende, bei 175° siedende Flüssigkeit von der Zusammensetzung $C_{20}H_{14}O$ bildet, die also aus dem bei 230 bis 235° übergehenden Theil des Thymianöls durch Entziehung von 1 HO entstanden ist. Durch wiederholte Destillation dieser Flüssigkeit über wasserfreie Phosphorsäure wurde noch 1 HO entzogen, und eine kleine Menge eines Kohlenwasserstoffs $C_{20}H_{18}$ dargestellt, welcher bei 180° zu sieden scheint. Doveri glaubt, daß dieser Kohlenwasserstoff in freiem Zustand in dem Thymianöl enthalten sei, und mit einem seiner Hydrate gemischt den bei 175 bis 180° übergehenden Theil dieses Oels bilde.

Dessaigues und Chantard (1) haben das flüchtige Oel von *Matricaria parthenium* untersucht, welches durch Destillation der oberen Hälfte der Pflanze (Zweige, Blätter und Blumen) dargestellt war. Es ist grünlich; das im heißen und trocknen Sommer 1846 dargestellte erfüllte sich bis zum andern Tag mit großen krystallinischen Blättern von Stearopten; das im Sommer 1845 dargestellte zeigte dieses nicht. Das bei 4 bis 5° ausgeschiedene und ausgepresste Stearopten riecht stark und rein nach Campher, es schmilzt bei 175° und siedet constant bei 204°. Die Analyse ergab in diesem Stearopten 78,8 pC. Kohlenstoff und 10,7 Wasserstoff; es ist also identisch mit dem Campher der Laurineen, dessen Gegenwart in mehreren flüchtigen Oelen der Labiaten schon Proust nachgewiesen hatte, und der in diesem Fall in einer Pflanze der Syngenesisten vorkommt. Das von dem ausgeschiedenen Stearopten getrennte Oel kam bei 160° ins Kochen, der Siedepunkt stieg rasch bis

(1) J. pharm. [8] XIII, 241; J. pr. Chem. XLV, 45; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 342; Pharm. Centr. 1848, 505.

205°, und von da bis 220° ging der größte Theil des Oels über, unter Zurücklassung eines gefärbten Rückstands. Durch fractionirte Destillation war kein Oel von constantem Siedepunkt zu erhalten; alle Destillate setzten Stearopten ab; in dem bei 160 bis 168° Uebergehenden wurden 86,5 Kohlenstoff und 11,6 Wasserstoff gefunden, in dem bei 210 bis 220° Uebergehenden 77,0 Kohlenstoff und 10,3 Wasserstoff. D. und C. glauben, in dem flüchtigen Oel der *Matricaria parthenium* seien außer dem Stearopten ein Kohlenwasserstoff C_8H_8 und ein Oel mit größerem Sauerstoffgehalt als das Stearopten enthalten.

Imperatoriaöl. Hirzel (1) untersuchte das Imperatoriaöl, welches durch Destillation der gestoßenen Meisterwurzeln (von *Imperatoria ostruthium*) mit Wasser erhalten wird; es scheidet sich dann auf der Oberfläche des Destillats dunkelbraun aus (der unteren Schicht entzieht Aether bei dem Schütteln noch etwas von diesem Oel). Mit Wasser destillirt hinterläßt es einen theerigen Rückstand und giebt es ein farbloses Destillat, in welchem (nach dem Trocknen durch Chlorcalcium) 84,8 bis 85,6 pC. Kohlenstoff, 11,4 Wasserstoff und 3,0 bis 3,8 Sauerstoff gefunden wurden. Dieses kommt bei 170° ins Sieden, aber der Siedepunkt steigt fortwährend; für das bei 170 bis 180° Uebergehende wurde nahe die eben angegebene Zusammensetzung gefunden, in dem bei 200 bis 220° Uebergehenden hingegen 81,1 pC. Kohlenstoff, 11,7 Wasserstoff und 7,2 Sauerstoff. Bei der Destillation des Oels mit wasserfreier Phosphorsäure wurde eine farblose, rosmarin-ähnlich riechende Flüssigkeit erhalten, von der Zusammensetzung $C_{30}H_{24}$, aus welcher durch Einleiten von Chlorwasserstoff, Destilliren der entstehenden rothgelben Flüssigkeit mit Wasser, Trennung vom Wasser und Entwässern mit Chlorcalcium eine Verbindung $C_{30}H_{23}Cl$ erhalten wird. Mit Chlor bildet das Oel, unter Ausscheidung von Chlorwasserstoff, eine gelbe dicke, ölige Flüssigkeit.

(1) Mittheilungen der Zürcher naturforschenden Gesellsch. Nr. 27; J. pr. Chem. XLVI, 292; Pharm. Centr. 1849, 37; Chem. Gaz. 1849, 98.

Nach Hurault (1) scheint das Valerianaöl in den Baldrianwurzeln nicht fertig gebildet enthalten zu sein, sondern sich erst bei Einwirkung des Wassers zu bilden; reiner Aether entziehe den Wurzeln kein flüchtiges Oel. Valerianaöl.

Cloez (2) hat (unbekannt, wie es scheint, mit Bernays' (3) Beobachtungen) darauf aufmerksam gemacht, daß das Oel von *Tropaeolum majus* schwefelhaltig ist; nach ihm ist es dichter als Wasser und kocht bei 120 bis 130°. Oel von
Tropaeolum
majus.

Aus dem Terpenthinöl und mehreren mit ihm isomeren flüchtigen Oelen $C_{20}H_{34}$ kann unter gewissen Umständen ein krystallisirter Körper entstehen, dessen Zusammensetzung Blanchet und Sell (4) durch $C_{20}H_{20}O_4$, Dumas (5) durch $C_{20}H_{22}O_6$ ausdrückbar fanden. Dieser Körper wurde als Terpenhincampher oder Terpenthinölhydrat bezeichnet. Wiggers (6) fand, daß sich dieser Körper leichter bildet, wenn man Terpenthinöl mit Salpetersäure und Alkohol zusammenstehen läßt, und bestimmte seine Zusammensetzung zu $C_{20}H_{20}O_4$; Deville (7) bestätigte diese Art der Bildung, und bestimmte die Zusammensetzung zu $C_{20}H_{22}O_6$. Wiggers (8) fand bei einer späteren Untersuchung dieses Körpers, für welchen Berzelius die Benennung *Terpin* vorschlug, daß er im krystallisirten Zustand $C_{20}H_{22}O_6$, getrocknet $C_{20}H_{20}O_4$ ist. Neue Untersuchungen hierüber hat nun List (9) angestellt. Er bereitete die Verbindung nach Wiggers' Vorschrift, wobei Terpenthinöl.

(1) Aus Recueil etc. (S. 672), Janvier 1847, 38, in J. pharm. [3] XII, 69. — (2) Aus Recueil etc., Janvier 1847, 36, in J. pharm. [3] XII, 69. — (3) Repert. Pharm. [2] XXXVIII, 387; Berzelius' Jahresber. XXVI, 670. — (4) Ann. Ch. Pharm. VI, 267; Berzelius' Jahresber. XIV, 301. — (5) Ann. ch. phys. [2] LVII, 334; Berzelius' Jahresber. XV, 315. — (6) Ann. Ch. Pharm. XXXIII, 358; Berzelius' Jahresber. XXI, 335. — (7) Instit. 1841, 427; Berzelius' Jahresber. XXII, 293 und Instit. 1843, 89; Berzelius' Jahresber. XXIV, 477. — (8) Ann. Ch. Pharm. LVII, 247; Berzelius' Jahresber. XXVII, 440. — (9) Ueber das s. g. Terpenthinölhydrat (Inauguraldissertation), Göttingen 1848; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVII, 362; Pharm. Centr. 1848, 689; J. pr. Chem. XLIII, 499; Instit. 1848, 188; Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 125; J. pharm. [3] XV, 317.

Terpenthinöl er die von diesem gemachte Angabe bestätigt fand, daß die Einwirkung der Sonnenstrahlen die Bildung des Terpins sehr begünstigt; die erhaltenen Krystalle sind, wie schon Rammelsberg (1) gefunden hatte, rhombisch, $\infty P. P. \infty \bar{P} \infty (\infty P : \infty P = 77^\circ 44'; P : \infty P = 127^\circ 2')$; sie sind $C_{20}H_{20}O_4 + 2 HO$ und schmelzen unter 100° , wobei 2 HO entweichen (diese entweichen auch bei gewöhnlicher Temperatur über Schwefelsäure). Die wasserfreie Verbindung $C_{20}H_{20}O_4$ schmilzt bei 103° und erstarrt bei 91° , bei raschem Abkühlen und bei Schutz vor Feuchtigkeit zu einer amorphen Masse, welche durch Anhauchen, Zutritt von Feuchtigkeit überhaupt und von Alkohol- oder Aetherdämpfen, so wie bei Erwärmung auf 36° unter Anziehung der atmosphärischen Feuchtigkeit sofort unter Volumvergrößerung krystallinisch wird. Das entwässerte Terpin sublimirt nur, solange ein Strom von Luft oder von Wasserdampf begünstigend einwirkt. Wird zu einer heißen Lösung von Terpin in Wasser eine geringe Menge einer Säure gemischt, so trübt sich die Flüssigkeit milchig, unter Ausscheidung einer Verbindung $C_{20}H_{17}O$, welche Wiggers bereits bei Erwärmung von Terpin mit concentrirter Jodwasserstoffsäure erhalten hatte, und für welche List den Namen *Terpinol* vorschlägt; dieses riecht, namentlich bei größerer Verdünnung, angenehm; sein spec. Gew. ist 0,852, sein Siedepunkt 168° . List glaubt, die Bildung des Terpinols beruhe darauf, daß sich zunächst eine Verbindung von Terpinol und Säure bilde, welche sofort wieder in ihre Bestandtheile zerfalle. — Leitet man Chlorwasserstoff zu gepulvertem Terpin, so zergeht die Masse unter Temperaturerhöhung zu einer bräunlich gefärbten Flüssigkeit, aus welcher sich bald ein krystallinischer Körper ausscheidet, welcher sich auch bei dem Einleiten von Chlorwasserstoff in Terpinol bildet. Dieser Körper bildet aus kaltem Alkohol umkrystallisirt lange dünne perlmutter-

(1) Pogg. Ann. LXIII, 570; Berzelius' Jahresber. XXV, 606.

glänzende Blätter; seine Zusammensetzung ist $C_{20}H_{18}Cl_2$ ^{Terpenthinöl} (er ist mit der von Blanchet und Sell (1) und von Dumas (2) untersuchten festen Chlorwasserstoffverbindung isomer, unterscheidet sich aber von dieser durch seine Löslichkeit in Alkohol und durch etwas höheren Schmelzpunkt); er schmilzt bei 50° und erstarrt bei 46° . Eine dieser Chlorverbindung entsprechende Jodverbindung scheint zu existiren, konnte jedoch nicht rein dargestellt werden. Bei der Destillation entwickelt die Chlorverbindung Chlorwasserstoff, und durch mehrmals wiederholte Destillation und Befreiung von Chlorwasserstoff durch Aetzkalk erhält man ein leichtbewegliches, das Licht stark brechendes Oel von erfrischendem Rosmaringeruch $C_{20}H_{18}$ (dieses bildet sich auch bei wiederholter Destillation des entwässerten Terpins mit wasserfreier Phosphorsäure). Wird die Chlorverbindung mehrere Tage hindurch mit Wasser so im Sieden erhalten, daß die verdampfende Flüssigkeit zurückfließt, so wird sie zu Terpinol.

Cailliot (3) hat die Producte der Einwirkung der Salpetersäure auf Terpenthinöl untersucht, deren eins — die von Bromeis (4) entdeckte und als Terpenthinsäure, von Roubourdin (5) näher untersuchte und als Terebinsäure bezeichnete Säure ($C_{14}H_{10}O_8$) — schon früher bekannt war. — Läßt man in einem Destillationsapparat zu einem Ueberschusse von Salpetersäure, welche mit ihrem gleichen Gewicht Wasser verdünnt ist, Terpenthinöl in kleinen Mengen zutreten, so kann man die Einwirkung leicht reguliren. Es entwickelt sich salpetrige Säure, Kohlensäure und Blausäure, und unverändertes Terpenthinöl geht über; unterbricht man die Operation, wenn die siedende Flüssigkeit nicht mehr röthliche Dämpfe entwickelt, so findet sich in der Retorte saure Flüssigkeit und eine harzige Substanz.

(1) Ann. Ch. Pharm. VI, 285. — (2) Ann. Ch. Pharm. IX, 56. — (3) Ann. ch. phys. [8] XXI, 27; J. pr. Chem. XLII, 233; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 376; Repert. Pharm. [2] XLVIII, 98. — (4) Ann. Ch. Pharm. XXXVII, 297; Berzelius' Jahresber. XXII, 299. — (5) J. pharm. [8] VI, 285; Berzelius' Jahresber. XXV, 601.

Terpenthinöl.

Dampft man die saure Flüssigkeit ab und behandelt den Rückstand mit Wasser, so bleibt eine orangefarbige pechartige Substanz zurück. Diese enthält eine harzartige Substanz und zwei Säuren. — Die eine Säure ist unlöslich in Wasser und in Alkohol; sie wird von der harzartigen Substanz, welche gleichfalls in Alkohol unlöslich ist, durch Behandlung mit Ammoniak getrennt. Das entstehende Ammoniaksalz wird durch Thierkohle und wiederholtes Umkrystallisiren gereinigt, und die Säure daraus durch eine Mineralsäure abgeschieden. Sie bildet dann ein weißes krystallinisches Pulver, ist geschmacklos, unlöslich in Wasser, Alkohol und Aether. Cailliot nennt sie *Terephtalsäure* und betrachtet als ihre Zusammensetzung $C_8H_4O_4$, als die ihres Silbersalzes $AgO, C_8H_4O_4$; er hält es indeß wegen der Zersetzungserscheinungen dieser Säure für wahrscheinlich, daß sie eine zweibasische Säure und ihre Formel zu verdoppeln sei; dann wäre sie $C_{16}H_8O_8 = C_{16}H_8O_8 + 2HO$ und isomer mit der Phtalsäure, von welcher sie sich durch ihre Löslichkeit unterscheidet und durch welche sie aus ihren Salzen abgeschieden wird. Bei dem Erhitzen dieser Säure sublimirt ein Theil unverändert, während ein anderer Theil sich zersetzt, indem sich Kohlensäure entwickelt, Benzol entsteht, mit welchem die sublimirte Säure getränkt ist, und etwas Kohle zurückbleibt. Die terephtals. Salze sind fast alle krystallisirbar; sie sind außerordentlich entzündlich, so daß sie gut getrocknet schon durch einen Funken entzündet werden, und glimmen dann wie Zunder, indem sie den Geruch des Benzols ausstoßen. — Die Säure, welche mit der Terephtalsäure in der orangefarbenen Substanz enthalten ist, kann durch kochendes Wasser, Alkohol oder Aether leicht davon getrennt werden; aus der heißen wässerigen Lösung scheidet sie sich bei dem Erkalten in glänzenden weißen Nadeln ab. Cailliot nennt diese Säure *Terebenzinsäure*; sie geht bei der Destillation mit Wasser leicht mit diesem über; als ihre Zusammensetzung betrachtet er $C_{14}H_7O_4$ (in Verbindung mit Basen $C_{14}H_8O_4$),

wonach sie 1 At. Wasserstoff mehr enthielte als die Ben- Terpenthinöl.
zoëssäure; sie schmilzt bei 169° (49° höher als die Benzoëssäure); ihr Siedepunkt liegt hoch, aber in offenen Gefäßen sublimirt sie schon unter 100°; ihr Aether riecht nach Anis und siedet bei 130° (der Benzoëäther bei 209°). Die terebenzins. Salze zeigen im Allgemeinen die Löslichkeitsverhältnisse der entsprechenden benzoësauren. — Die saure Flüssigkeit, von welcher die orangefarbene pechartige Substanz getrennt ist, giebt concentrirt und dann sich selbst überlassen nach einiger Zeit eine reichliche Krystallisation von Oxalsäure, und später einen graulichweißen Absatz von Oxalsäure und Terpenthinsäure (Terebinsäure), welchen wenig Terephtalsäure und eine größere Menge Terebenzinsäure beigemengt sind. Die von diesem Absatz getrennte Mutterlauge enthält kleinere Mengen der in diesem enthaltenen Säuren in Salpetersäure und in einer andern Säure gelöst, welche letztere der Lösung eine Orangefarbe mittheilt, und von Cailliot als *Terechrysinsäure* bezeichnet wird. Zu ihrer Darstellung dampft man die Flüssigkeit bis zu teigiger Consistenz ab, wo die Oxalsäure durch die Salpetersäure zerstört wird, scheidet durch Behandlung mit Wasser etwas Terebenzinsäure ab, neutralisirt die Flüssigkeit mit kohlen. Baryt, wodurch Terebenzinsäure und Terephtalsäure ausgefällt werden, und zersetzt die Barytsalzlösung durch Schwefelsäure; die Terechrysinsäurelösung wird zu weiterer Reinigung zu einer kochenden Lösung von essigs. Bleioxyd gesetzt, wo sich bei dem Erkalten terechrysins. Bleioxyd in mikroskopischen Krystallen abscheidet, und dieses durch Schwefelsäure zersetzt. Die wässerige Lösung der Terechrysinsäure läßt bei dem Abdampfen einen orangegelben, teigigen, unkrystallisirbaren Rückstand, welcher zuerst sauer, dann herbe und bitter schmeckt, und sich in jedem Verhältniß in Wasser, Alkohol und Aether löst; für das bei 120° getrocknete Bleioxydsalz derselben nimmt Cailliot die Formel $PbO, C_6H_3O_4$ an. Die Terechrysinsäure zersetzt sich bei dem Erhitzen; ihre

Terpenthinöl. Salze sind gelb oder orangeroth und meistens in Wasser löslich; ihr Aether ist eine schleimige, dunkelorange-rothe Flüssigkeit, welche sich gleichfalls bei dem Erhitzen zersetzt.

Die harzige Substanz (S. 727), welche sich nach der Einwirkung der Salpetersäure auf Terpenthinöl in der Retorte findet, ist rothbraun, bei gewöhnlicher Temperatur weich und in Alkohol fast vollständig löslich, wenn nur schwache Einwirkung stattgefunden hat; hingegen gelb, bei gewöhnlicher Temperatur zerreiblich und in kochendem Alkohol nur theilweise löslich, wenn die Einwirkung längere Zeit andauerte. Der unlösliche Theil ist Terephtalsäure. Aus dem Rückstand der abgedampften alkoholischen Lösung zieht Wasser Terebenzinsäure aus; was dann zurückbleibt, ist ein Gemenge von drei stickstofffreien Harzen. Für das eine, welches unlöslich in kaltem, wenig löslich in kochendem Alkohol ist, und sich aus letzterer Lösung als gelbes unkrystallinisches Pulver niederschlägt, in wässrigem Ammoniak und Kali unlöslich ist und erst über 100° schmilzt, giebt Cailliot die Formel $C_{40}H_{24}O_{20}$; die beiden andern sind löslich in kaltem Alkohol, und dem einen (in Ammoniak und Kalilauge unlöslichen, unter 100° schmelzenden) giebt er die Formel $C_{40}H_{24}O_{10}$, dem andern (in Ammoniak und Kalilauge löslichen, bei 100 halbflüssig werdenden) die Formel $C_{40}H_{24}O_{16}$.

Fermentolea. Becker in Mühlhausen (1) hat die Ansicht aufgestellt, die Fermentolea seien den alten Alchemisten wohl bekannt gewesen, und seien das, was bei diesen als Quintessenz bezeichnet werde. — Nach Artus (2) liegt der Grund des Auftretens der Fermentolea ohne Zweifel in dem höheren organischen Einheitsstreben der Elemente zu Cryptogamen und Infusorien, wozu Stickstoff nothwendig ist, und deshalb auch auf Kosten der Bildung jener Organismen abgeschieden und gebunden wird; daher muß nun nothwendigerweise ein Freiwerden von Kohlenstoff,

(1) Arch. Pharm. [2] LV, 161. — (2) Jahrb. pr. Pharm. XV, 25.

Wasserstoff und Sauerstoff erfolgen, welche in *statu nascenti* Fermentolea. in chemische Einheit treten und so die Fermentolea erzeugen. — Bley (1) erhielt aus 150 Pfund Wiesensalbei (*Sabia pratensis*) durch Gährung mit Wasser, Destilliren und Cohobiren 70 Gran eines dunkelrothbraunen Fermentoleum von ätherisch-süßlichem und widerwärtigem Geruch und aromatischem Geschmack, welches sich in jeder Menge mit Alkohol und Aether mischte, in Wasser wenig löslich war, mit fettem Oel leicht mischte, mit Ammoniak ein Liment bildete, und von welchem Kali nur Spuren aufnahm. — Berzelius (2) hat die bisher bekannten Fermentolea aufgezählt; solche wurden erhalten aus *Gentiana centaurium*, Eichenblättern, Mandelsyrup, *Achillea millefolium*, *Echium vulgare*, *Urtica urens*, *Salix pentandra*, *Plantago*-Arten, *Chelidonium majus*, *Conium maculatum*, gährenden Kartoffeln, Trauben und Getreide. Die Fermentolea zeigen das Gemeinsame, daß sie in Wasser löslicher sind als die gewöhnlichen flüchtigen Oele, und nach der Analogie mit Fuselöl hält es Berzelius für möglich, daß sie alkoholartige Körper seien.

Ueber das flüchtige Oel, welches durch Döbereiner Furfurol. bei der Einwirkung von Braunstein und Schwefelsäure erhalten und als künstliches Ameisenöl bezeichnet, durch Stenhouse (3) bei der Einwirkung von verdünnter Schwefelsäure auf Weizenmehl oder Sägespäne erhalten und als $C_5H_4O_2$ befunden, endlich von Fownes (4) als aus Kleie mit Schwefelsäure dargestellt und unter dem Namen Furfurol untersucht wurde, sind von dem letzteren (5) neuere Angaben gemacht worden. Aus 64 Unzen (Troy-Gewicht) Weizenkleie mit 32 Unzen Schwefelsäure und einem gleichen Volum Wasser erhielt er ungefähr 1 Unze Furfurol; aus

(1) Arch. Pharm. [2] LI, 257; Pharm. Centr. 1847, 767. — (2) Berzelius' Jahresber. XXVII, 541; Pharm. Centr. 1849, 45. — (3) Ann. Ch. Pharm. XXXV, 301; Berzelius' Jahresber. XXI, 328. — (4) Ann. Ch. Pharm. LIV, 52; Berzelius' Jahresber. XXVI, 582. — (5) Pharm. J. Trans. VIII, 113.

Furfurol. 64 Unzen Weizenmehl mit 32 Schwefelsäure und einem gleichen Volum Wasser etwa $1\frac{1}{4}$ Drachmen unreines Furfurol; aus 4 Pfund Stärke mit 2 Pfund Schwefelsäure und einem gleichen Volum Wasser nur unbestimmte Spuren von Furfurol; aus 2 Pfund neuem gewaschenem Leinen mit 1 Pfund Schwefelsäure und einem gleichen Volum Wasser nicht die geringste Spur Furfurol. Um je mehr die Kleie von Stärke, Gluten u. s. w. befreit war, um so größer war die Ausbeute an Furfurol. Fownes ist zu der Annahme geneigt, daß es die von Payen als *matière incrustante* bezeichnete Substanz sei, aus welcher sich das Furfurol bilde. Seine früheren Angaben über diesen Körper berichtigt und vervollständigt er durch folgende. Frisch destillirt ist das Furfurol farblos, aber selbst im Dunkeln färbt es sich bald gelb, an dem Licht in wenigen Stunden braun; ist es mit Wasser zusammen, so tritt diese Färbung langsamer ein. Das spec. Gew. ist $1,1648$ bei $15^{\circ},6$, der Siedepunkt (wenn es von Metall aus siedet) $162^{\circ},8$ bis $163^{\circ},3$ bei $29,9$ Zoll (engl.) Barometerstand; bei jeder Destillation schwärzt und zersetzt es sich etwas. Es löst sich bei $15,6$ in dem 12fachen Gewicht Wasser, und bei höherer Temperatur in weniger. Die Dampfdichte fand er $3,49$; unter Voraussetzung der Condensation von $C_5H_4O_2$ auf 2 oder von $C_{10}H_4O_4$ auf 4 Vol. berechnet sich $3,34$.

Auch Cahours (1) hat Untersuchungen über das Furfurol mitgetheilt. Aus $1,5$ Kilogr. Kleie mit $1,25$ Schwefelsäure, welche vorher mit 3 Liter Wasser verdünnt worden, erhielt er durchschnittlich an Furfurol $2,63$ pC. von dem Gewicht der angewandten Kleie; bei Anwendung von etwas weniger Schwefelsäure $2,5$ bis $2,6$ pC. Die Kleie giebt für sich mit Wasser destillirt dieses Oel nicht, und es muß sich aus einem andern Bestandtheil als Holzfaser, Stärke oder Gluten bilden, da jeder dieser Körper für sich mit

(1) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 277; J. pharm. [3] XV, 170; Ann. Ch. Pharm. LXIX, 82; J. pr. Chem. XLVI, 45; Pharm. Contr. 1849, 52.

Schwefelsäure destillirt nicht die geringste Spur Furfurol bildet. — Für dieses fand er den Siedepunkt 162°, die Dampfdichte 4,34. Chlor und Brom geben mit dem Furfurol schwarze harzartige Producte, Salpetersäure bei jedem Grad der Verdünnung zuletzt Oxalsäure; Schwefelsäure mit Braunstein wie auch Chromsäure verwandeln es in eine braune Substanz. Die Richtigkeit der von Fownes über das Furfuramid und das Furfurin gemachten Angaben fand Cahours bestätigt. Bei raschem Einleiten von Schwefelwasserstoff in eine concentrirte alkoholische Lösung von Furfurol schlägt sich harzartig, bei langsamem Einleiten in eine verdünnte Lösung schlägt sich als krystallinisches weißes Pulver *Thiofurfol* nieder, $C_{10}H_4S_2O_2$, Furfurol in welchem die Hälfte des darin enthaltenen Sauerstoffs durch Schwefel ersetzt ist. Thiofurfol bildet sich auch bei Einwirkung von Schwefelammonium auf eine Lösung von Furfurol; es schmilzt bei dem Erhitzen unter Ausstoßung eines starken und unangenehmen Geruchs, stärker erhitzt brennt es mit bläulicher, wenig rufsender Flamme. Bei der Destillation zersetzt sich das Thiofurfurol unter Bildung einer gelben, krystallisirten, schwefelfreien Substanz, welche aus Alkohol umkrystallisirt lange, farblose oder schwach gelbliche, diamantglänzende, in kaltem Wasser unlösliche, in heißem wenig lösliche, in Alkohol und Aether lösliche Nadeln bildet, deren Zusammensetzung $C_{10}H_4O_4$ ist, und deren alkoholische Lösung sich an der Luft langsam unter Bräunung zersetzt. (Wegen der Bildung dieses Körpers glaubt Cahours, die angegebene Formel für das Thiofurfol sei mindestens zu verdoppeln). In entsprechender Weise wie das Thiofurfol wurde auch *Seleniofurfol*, $C_{10}H_4Se_2O_2$, dargestellt als eine harzige, sich leicht verändernde Substanz.

Ueber Oenanthol vergl. S. 565.

Cahours (1) fand, daß Mesitylen mit rauchender Salpetersäure ein braunrothes, schweres, stark riechendes Oel

(1) In der S. 387 angeführten Abhandlung.

giebt, welches aber keine bestimmte Verbindung ist. Wird hingegen Mesitylen tropfenweise und unter Umrühren in eine Mischung von rauchender Schwefel- und Salpetersäure eingetragen, so scheidet sich bald ein weißer flockiger Körper aus, welcher nach dem Trocknen sich als aus verfilzten feinen Nadeln bestehend ausweist. Man verdünnt die Flüssigkeit mit Wasser, trennt diesen Körper von ihr, wascht und trocknet ihn. Diese Verbindung ist $C_6H_3NO_4$ (also Kane's salpetrigs. Pteleyoxyd); sie läßt sich bei gelinder Erwärmung sublimiren.

Campher.

Bineau(1) hat Beobachtungen über das Verhalten des Camphers zu mehreren Säuren mitgeteilt. — Campher absorbiert die schweflige Säure rasch und giebt eine farblose Flüssigkeit, welche schwerer ist als Wasser, Jod reichlich auflöst, und aus welcher die schweflige Säure an der Luft, unter Zurücklassung von unverändertem Campher, leicht entweicht. Die Verbindungsverhältnisse sind sehr veränderlich, wie man aus folgender Zusammenstellung ersieht, wo A die Temperatur, B den Druck (in Millimetern), C die von 100 Campher aufgenommene Menge Säure bedeutet :

A	24,0	24,0	24,0	21,0	20,0	15,5	15,5	14,0	14,0	12,5	12,5
B	524	650	745	670	730	355	744	611	738	529	703
C	25,5	30,8	35,4	34,7	39,7	28,0	47,6	40,4	48,6	37,3	49,1
A	12,5	10,0	10,0	10,0	8,0	8,0	8,0	4,0	4,0	2,0	2,0
B	727	320	560	720	304	503	682	490	720	469	650
C	50,5	31,7	42,6	55,8	33,0	42,0	57,4	46,0	73,6	48,4	72,0

Hieraus läßt sich ableiten, daß unter einem Druck von 700^{mm} die Verhältnisse annähernd sind :

A	24,0	20,0	15,5	14,0	12,5	10,0	8,0	4,0
C	33,1	37,7	44,8	46,8	48,9	54,0	58,6	70,5

Campher verändert sich nicht in Stickoxydgas, aber bei Zutritt von Sauerstoff bildet sich dieselbe Flüssigkeit, die auch durch directe Behandlung von Campher mit Untersalpetersäure entsteht; sie ist schwach gelblich, stößt an trockner Luft röthliche Dämpfe aus bis sie mit einer Haut

(1) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 326; J. pr. Chem. XLVI, 296.

von Campher überzogen ist, und giebt mit Wasser die Zersetzungsproducte der Untersalpetersäure und einen Niederschlag von Campher; die mit Campher bei 18° gesättigte Verbindung enthält auf 21 Säure 79 Campher. Wird diese Verbindung der Einwirkung schwefliger Säure ausgesetzt, so wird diese letztere absorbirt, rothe Dämpfe entwickeln sich und eine weisse krystallinische Verbindung scheidet sich allmählig ab, welche sich selbst überlassen rothe Dämpfe entwickelt und für deren Zusammensetzung sehr veränderliche Resultate gefunden wurden. — Auch die Verbindung von Campher mit Chlorwasserstoff fand Bineau sehr wechselnd zusammengesetzt, wie aus folgendem hervorgeht, wo A, B und C dasselbe wie oben bedeuten :

A	24,0	20,0	18,5	18,5	13,0	9,0	7,0	7,0	3,0	3,0
B	747	740	735	744	320	288	270	740	232	738
C	19,0	20,0	20,4	20,5	15,3	15,8	16,3	24,0	17,0	26,0

Der Campher hört auf, Chlorwasserstoff zu absorbiren :

unter	22	34	39	42	Centimeter Druck
bei	12	15	20	24°	

Fluorkieselgas und Schwefelwasserstoffgas sind bei gewöhnlicher Temperatur ohne Einwirkung auf den Campher. Der Dampf von wasserfreier Schwefelsäure verwandelt bei langsamer Einwirkung auf stark erkalteten Campher ihn (fast ohne Gasentwicklung) in eine weisse, schwach bräunliche Masse, aus welcher Wasser den grössten Theil des Camphers unverändert abscheidet.

Ricker (1) beschrieb eine Substanz, welche sich aus frischem Bergamottöl nach längerem Stehen abgesondert hatte, als Hesperidin, mit welchem Namen, wie Berzelius (2) schon früher bemerkte, man verschiedene Substanzen bezeichnet zu haben scheint. Ohme (3) erklärte die von Ricker beschriebene Substanz und die als Hesperidin überhaupt bezeichneten Körper für gewöhnliche Stearoptene (4).

(1) Jahrb. pr. Pharm. XIV, 326. — (2) Berzelius' Jahresber. XXII, 452. — (3) Arch. Pharm. [2] LIII, 287; Pharm. Centr. 1848, 384. — (4) Für das aus der wässrigen Lösung krystallisirende Hesperidin kann dies nicht angenommen werden.

Fester
Kohlenwas-
serstoff aus
Bernstein.

Nach Reich (1) entwickelt sich, wenn präpariertes Bernsteinpulver mit höchst concentrirter Kalilauge zum Sieden erhitzt und bis zur Trockne destillirt wird, ein sehr starker Camphergeruch, und in der Vorlage sammelt sich neben wässriger Flüssigkeit eine weiße Substanz von den Eigenschaften des Camphers, welche von Vogel's (2) (durch trockne Destillation des Bernsteins erhaltenen) Bernsteincampher verschieden ist. — Einen von letzterem verschiedenen Körper erhielten auch Bley und Diesel (3), als bei der Destillation von Bernstein schnell und stark gefeuert wurde. Dieser Körper setzte sich im Retortenhals neben der Bernsteinsäure gelb und wachsförmig ab, liefs sich durch Umschmelzen mit Wasser und Auflösen in absolutem Alkohol reinigen, war leichter als Wasser, weich, geschmack- und geruchlos, bei 85 bis 86° schmelzend, etwas über 300° siedend, unlöslich in Wasser, leicht löslich in Weingeist, Aether, fetten und flüchtigen Oelen; es wurden in ihm 86,1 pC. Kohlenstoff und 13,7 Wasserstoff gefunden, nahe entsprechend der Formel CH und der Zusammensetzung des Ozokerits, mit welchem er überhaupt viele Uebereinstimmung zeigte.

Tolubalsam.

Der Tolubalsam, über welchen aus neuerer Zeit Untersuchungen von Fremy (4) und von Deville (5) vorliegen, ist neuerdings von E. Kopp (6) untersucht worden. Dieser fand in dem Balsam sehr wenig Tolen ($C_{10}H_8$), freie Zimmtsäure ($C_{11}H_8O_4$), ein in Alkohol leicht lösliches Harz ($C_{36}H_{19}O_8$) und ein in Alkohol schwer lösliches Harz ($C_{36}H_{20}O_{10}$); das erstere Harz betrachtet

(1) Arch. Pharm. [2] LI, 26. — (2) Gehlen's neues allgemeines Journal der Chemie (1805) V, 272. — (3) Arch. Pharm. [2] LV, 171; Pharm. Centr. 1849, 138. — (4) Ann. ch. phys. [2] LX, 180; Berzelius' Jahresber. XX, 396. — (5) Ann. ch. phys. [3] III, 151; Berzelius' Jahresbericht XXII, 349. — (6) Ann. ch. phys. [3] XX, 379; Compt. rend. XXIV, 614; J. pharm. [3] XI, 425; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 872; J. pr. Chem. XLI, 326; Pharm. Centr. 1847, 433; ausführlicher Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 145.

er als den eigentlichen Grundbestandtheil des Tolubalsams, ^{Tolubalsam.} aus welchem durch Einwirkung der Luft das andere Harz und Zimmtsäure sich bilden. — Für das nach Deville's Methode dargestellte Tolen fand er den Siedepunkt zwischen 154 und 160°, das spec. Gew. 0,858 bei 10°; für die Zusammensetzung desselben hält er die Formel $C_{10}H_8$ für wahrscheinlicher als die von Deville angenommene $C_{12}H_8$; es verharzt sich in offenen Gefäßen. — Kopp bestätigte, daß Zimmtsäure, und keine Benzoësäure, in dem Tolubalsam enthalten ist; daß Deville und Andere Benzoësäure darin gefunden hatten, erklärt er aus einer Veränderung, welche die Harze in dem Balsam bei der Destillation oder bei Behandlung mit concentrirter alkalischer Lauge erleiden. Er beobachtete, daß Zimmtsäure, mit concentrirter caustischer Natronlauge gemischt und mit Chlor behandelt, zu Chlorzimmtsäure, $C_{10}H_7ClO_4$, wird, und daß sie mit concentrirter Salpetersäure behandelt zuerst zu Nitrozimmtsäure, dann zu Benzoësäure, dann zu Nitrobenzoësäure wird. Er stellte nitrobenzoës. Aethyloxyd, C_4H_5O , $C_{14}H_4(NO_4)O_3$, dar (durch Einwirkung von Chlorwasserstoff auf eine alkoholische Lösung der Säure), und fand es weiß, farblos, aromatisch riechend und schmeckend, in blätterigen Krystallen des rhombischen Systems krystallisirend, bei 47° schmelzend und bei 296° siedend. Bei dem Erwärmen einer alkoholischen Lösung von Nitrozimmtsäure mit Schwefelammonium scheidet sich Schwefel ab, und es entsteht ein krappgelbes Harz und eine organische Basis, welche letztere fest, farblos, warzenförmig krystallisirend, in Alkohol und in Aether löslich ist, und schwierig krystallisirende Salze bildet. — Das in Alkohol (auch in Aether) leicht lösliche Harz, $C_{36}H_{10}O_8$, ist braun, durchscheinend, in der Kälte brüchig, glänzend; sein Pulver backt schon bei 15° zusammen und schmilzt bei 60°; concentrirte Schwefelsäure färbt es purpurroth; in caustischem Kali gelöst oxydirt es sich leicht an der Luft und geht dann in das folgende Harz über. Bei

Tolubalsam. der trocknen Destillation giebt es unter Gasentwicklung eine ölige Flüssigkeit, welche durch concentrirte Kalilauge in Benzoën und Benzoësäure zerlegt wird, und noch ein anderes klares, nicht saures, über 250° siedendes Oel. — Das in Alkohol (und in Aether) unlösliche Harz, $C_{30}H_{20}O_{10}$, ist bräunlich-gelb, geruch- und geschmacklos, schmilzt erst über 100°, wird durch Schwefelsäure mit rothbrauner Farbe (die Lösung färbt sich an feuchter Luft violettroth) und durch caustisches Kali mit brauner Farbe gelöst. — Wird 1 Theil der harzartigen Bestandtheile des Tolubalsams, wie sie nach dem Behandeln desselben mit Sodalösung zurückbleiben, mit 4 Thln. gewöhnlicher Salpetersäure erhitzt, so findet heftige Einwirkung statt, Bittermandelöl, Blausäure und etwas Benzoësäure gehen über, und in der Retorte bleibt außer einem Harz und rothgelber Flüssigkeit eine gelbe flockige Masse (Benzoësäure, welcher ein gelber Farbstoff hartnäckig anhängt, und sie an dem Krystallisiren hindert, aber bei dem Erhitzen und dem Verflüchtigen der Benzoësäure zurückbleibt).

Harze im Allgemeinen.

Betrachtungen über die Entstehung der Harze im Allgemeinen (welchen er auch mehrere sonst gewöhnlich von ihnen unterschiedene Substanzen, wie Santonin, Asaron, Helenin, Cubebin, Athamantin u. a., zurechnet) hat Heldt(1) mitgetheilt. Er leitet ihre Entstehung aus den ätherischen Oelen ab, welche nach ihm entweder $C_{10}H_8$, oder Hydrate dieses Kohlenwasserstoffs, oder Oxyde desselben sind. Für mehrere Harze oder von ihm als solche betrachtete Körper zeigt er, dafs, wenn man ihre atomistische Zusammensetzung auf gleichen Gehalt an Kohlenstoff und zwar an 120 C berechnet, sie als $C_{120}H_{88}$, worin mehr oder weniger Wasserstoff durch Sauerstoff vertreten ist, betrachtet werden können; die ätherischen Oele selbst, deren Zusammensetzung durch $C_{10}H_8$ oder ein Multiplum dieser Formel ausdrückbar sei, können eine verschiedene rationelle Zu-

(1) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 48.

sammensetzung haben, je nach derjenigen in ihnen enthaltenen Menge Wasserstoff, welche durch Sauerstoff ersetzt werden kann. Für eine große Anzahl von Harzen erörtert er ausführlich, aus was und wie die Bildung derselben vor sich gehen möge. Wir können hier auf die Einzelheiten dieser Erörterungen nicht eingehen, und geben nur die allgemeineren Resultate derselben, wie sie Heldt aufstellt. — 1) Eine Reihe von Harzen entsteht, indem aus der Zusammensetzung der zugehörigen Oele eine gewisse Anzahl von Wasserstoffäquivalenten in Form von Wasser abgeschieden und durch eine äquivalente Menge von Sauerstoff ersetzt wird; sie sind Substitutionsproducte. (Epsilon-copalharz, Harz von *Ceradia furcata*, Helenin, Alphaharz von *Styrax Benzoin*, Santonin, Eugenin, Gummiguthharz, Cubebin, Phlobaphen, Anemonin, Asaron, Weichharz der Myrrhe, Chrysophansäure.) Einige der so gebildeten Harze verbinden sich mit Basen, andere nicht; alle lösen sich in Wasser. — 2) Eine zweite Klasse von Harzen entsteht nach dem 1.) Gesetz unter gleichzeitiger Aufnahme der Elemente des Wassers; sie können als Hydrate von Substitutionsproducten betrachtet werden. (Styracin, leicht lösliches Euphorbiumharz, Anime, Erythretin [Rothharz des Rhabarbers], Mastix, Bernstein, Pastoharz, Cerin, Lactucon, Caryophyllin, Elemiharz, Kuhbaumharz, Aloëtin.) Diese Harze sind meist indifferent und löslich in Alkohol und Aether. — 3) Eine dritte Klasse entsteht aus den ätherischen Oelen nach dem 1.) Gesetz unter Aufnahme von noch mehr Sauerstoff; sie können als Oxyde von Substitutionsproducten betrachtet werden. (Copaivabalsam, Sylbinsäure, Pimarsäure, die durch Johnston untersuchten Harze von *Pinus abies*, Oxysylbinsäure, Betulin, Birkenrindenharz, Plantanenharz, Parietin, Athamantin, schwer lösliches Euphorbiumharz, Myrrhin, Alpha-, Beta- und Gammaharz des Copals, Dammaraharz.) Sie verbinden sich meistens mit Basen ohne Abscheidung von Wasser aus ihrer Zusammensetzung; ihre Löslichkeit in Alkohol

Harze im
Allgemeinen.

Guajakharz. Ueber die Eigenschaft des Guajakharzes und der damit bereiteten weingeistigen Tinktur, sich unter gewissen Umständen zu bläuen, hat Schönbein (1) Untersuchungen angestellt. Gewöhnlicher freier Sauerstoff bewirkt die Bläuung nicht, wohl aber Chlor, Brom, Jod, Ozon, die Hyperoxyde von Mangan, Blei und Silber, Goldoxyd, Silberoxyd, Quecksilberoxyd, Uebermangansäure, Chromsäure, Untersalpetersäure, unterchlorigs. Alkalien, fein zertheiltes Platin, Eisen- und Kupferchlorid, Ferridcyankalium, frische Kartoffeln (namentlich an den Augen oder Keimen) u. a. Die blaue Färbung wird aufgehoben durch Phosphor, fein zertheiltes Zinn, Eisen, Zink u. a., Schwefel- und Selenwasserstoff, schweflige Säure, Eisen- und Zinnoxidulsalze, Ferrocyankalium, Phosphorsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure, Salzsäure und Alkalien; und endlich verschwindet sie auch von selbst, aber ungleich schnell je nach dem die Bläuung auf die eine oder eine andere Art hervorgerufen war. Durch öfteres Bläuen und Entbläuen, wie auch durch die Einwirkung der atmosphärischen Luft kann dem Guajakharz und der Guajak tinktur die Eigenschaft, sich bläuen zu lassen, entzogen werden. — Ueber die Bläuung des Guajakharzes hat auch Riegel (2) Beobachtungen mitgetheilt.

Eine Verfälschung von Jalappen- und Scammoniumharz mit Guajakharz entdeckt man, nach Smedt und Boudet (3), durch Zusatz von etwas unterchlorigs. Natron zu der alkoholischen Lösung des Harzes, wo eine grüne, zu Boden sinkende Verbindung entsteht; eine Verfälschung von Jalappenharz mit Guajakharz nach Pasquier-Nalinne (4) auch durch Zusammenbringen mit Quecksilberchlorid und Mandelseife, wo im Fall der Verfälschung eine tiefblaue Färbung entsteht.

Caoutchouc. In den letzten Jahren ist man durch verschiedene Methoden dahin gelangt, dem Caoutchouc die Eigenschaft zu

(1) Pogg. Ann. LXXIII, 489; LXXV, 351. 357; Pharm. Centr. 1848, 283; 1849, 173. — (2) Jahrb. pr. Pharm. XIV, 252. — (3) J. chim. méd. [3] III, 65. — (4) J. chim. méd. [3] III, 551.

urtheilen, daß es bei allen Temperaturen, also auch in der Kälte, elastisch und biegsam bleibt. Bekanntlich verdankt man diese Erfindung ursprünglich Hancock, welcher fand, daß Caoutchouc, bei gewissen Temperaturen in ein Bad von schmelzendem Schwefel getaucht, diesen stark absorbirt, sich schwärzlich färbt und zuletzt die Consistenz von Horn erlangt. Denselben Zustand in beliebigen Graden erlangt man auch, wenn Caoutchouc mit Schwefel getrocknet und dann einer Temperatur von 85° ausgesetzt wird, oder, wenn man es in Terpenthinöl löst, welches mit Schwefel gesättigt ist, u. a. Das Product, in England „vulcanized rubber“ genannt, bleibt in allen Temperaturen biegsam und weich, während gewöhnliches Caoutchouc bei einigen Graden über 0° starr wird; es wird durch die bekannten Lösungsmittel (Schwefelkohlenstoff, Steinöl, Terpenthinöl) nicht angegriffen, und widersteht der Compression in höherem Grade.

Die Methode von Parkes (1) besteht darin, daß man das Caoutchouc in Blättern in ein Gemisch von 40 Th. Schwefelkohlenstoff und 1 Th. Chlorschwefel taucht. Dickere Massen werden davon nicht durchdrungen.

Moulton (2) vermischt das Caoutchouc mit unterschwefligs. Blei (durch Zersetzung eines Bleisalzes mit unterschwefligs. Kalk) oder künstlichem Schwefelblei, und erwärmt auf 106° bis 150°.

Für die Anwendung von schwefligs. Gas (?) zu gleichem Zwecke hat Westhead (3) ein Patent genommen.

Die unter dem Namen *Gutta-Percha* bekannt gewordene Substanz ist von Soubeiran und von Kent näher studirt worden. — Soubeiran (4) that dies an Proben, welche ihm vom Handelsministerium (in Paris) zugegangen und von

(1) Rept. of p. Inv. 1847, 46; Dingl. pol. J. CIV, 455. — (2) Lond. J. of Arts 1847, 123; Dingl. pol. J. CVII, 169. — (3) Lond. J. of Arts 1848, 347; Dingl. pol. J. CIX, 47. — (4) J. pharm. [3] XI, 17; Dingl. pol. J. CIII, 415. — Ueber den Ursprung und die Gewinnung der Gutta-Percha vergl. daselbst, auch J. pharm. [3] XIII, 35; über die mechanische Verarbeitung derselben vergl. Dingl. pol. J. CVII, 25. 458; CIX, 118.

Gutta-Percha. China gebracht worden waren. Es waren runde, etwas abgeplattete Brode; diese sind aus übereinander liegenden zähen, hautartigen Blätterschichten, von dem Geruche des alten Käses und zugleich des Leders, zusammengesetzt. Sie bestehen aus reiner Gutta-Percha, einer Pflanzensäure, Casëin, in Aether und Terpenthinöl auflöslichem und einem in Alkohol löslichem Harze, sowie Extractivstoff. Die mit Alkohol und Aether behandelte, in Terpenthinöl gelöste, mit Alkohol gefüllte und gewaschene, und bei 100° getrocknete Gutta-Percha gab bei der Analyse 83,5 pC. Kohlenstoff und 11,5 Wasserstoff; als die Zusammensetzung der ganz reinen betrachtet Soubeiran $C_{11}H_{10}$, entsprechend 87,8 Kohlenstoff und 12,2 Wasserstoff. Faraday fand in dem Caoutchouc 87,2 Kohlenstoff und 12,8 Wasserstoff. Gutta-Percha wäre also gleich zusammengesetzt mit Caoutchouc, unterscheidet sich aber in den physikalischen Eigenschaften wesentlich, insbesondere durch die Abwesenheit der großen Elasticität und durch die Eigenthümlichkeit, bei 100° plastisch aber bei gewöhnlicher Temperatur wieder fest zu werden.

Nach E. N. Kent (1) löst sich die Gutta-Percha in Terpenthinöl, Harz-, Gutta-Percha-, Theeröl, Tereben und Chlorwasserstoff-Tereben; aus diesen Lösungen bleibt nach dem Füllen oder Abdampfen bei der Gutta-Percha stets eine gewisse Menge des Kohlenwasserstoffs zurück, die sich nicht abscheiden läßt. Die Gutta-Percha löst sich ferner in reinem Chloroform und Schwefelkohlenstoff, woraus sie unverändert mit Alkohol gefällt werden kann, — und in reinem Aether, aber in diesem nur sehr schwach. — Sämmtliche Lösungen sind braun und klären sich selbst nach Monaten nicht; Lösungen der Gutta-Percha in 16 Th. des Lösungsmittels können klar, aber nur sehr langsam filtrirt werden. Das unlösliche, suspendirte, besteht aus einem rothen, in Wasser löslichen, durch Alkohol fällbaren Farbstoffe, aus Erden, Spähnen und Fasern von Holz etc. —

(1) Sill. Am. J. [3] VI, 246. — Ueber eine neue Art Gutta-Percha aus holländ. Ostindien vergl. die Anzeige in J. pr. Chem. XLV, 460.

Wird eine Chloroformlösung mit 3 Th. Aether gemengt ^{Gutta-Percha.} und einige Zeit unter 15° erhalten, so fällt die Gutta-Percha als ein weißes Pulver nieder, welches gewaschen und getrocknet eine zarte, weisse, markähnliche Masse bildet. Streicht man diese auf eine Glasplatte, so entsteht eine dem Glacéhandschuhleder ähnliche Haut, die aber in der Wärme durchsichtig wird.

Die rohe Gutta-Percha enthält ein, in Alkohol, Aether und Terpenthinöl lösliches, gelbes Harz. Sie ist sehr electrisch (1).

Preisser (2) hatte 1843 Angaben veröffentlicht, wo- ^{Farbstoffe.} nach er aus einer grossen Anzahl von organischen Substanzen die Farbstoffe rein, farblos und krystallinisch dadurch wollte dargestellt haben, dafs er den weingeistigen oder ätherischen Auszug der Farbsubstanz mit einem von ihm für Bleioxydhydrat gehaltenen Körper fällte, die entstehende Bleioxydverbindung mit Schwefelwasserstoff zersetzte, und die entstehende Auflösung vor Luftzutritt geschützt verdunstete. Er stellte die Ansicht auf, die verschiedenen Farben, welche man in einer organischen Farbsubstanz treffe, seien nur verschiedene Oxydationsstufen eines und desselben farblosen Körpers. — Von seinen Angaben hat sich bei späteren Versuchen Nichts bestätigt. Arppe (3) hat darauf aufmerksam gemacht, dafs, was Preisser für Bleioxydhydrat gehalten und durch Fällung von salpeters. Bleioxyd mit Ammoniak dargestellt hatte, basisch salpeters. Bleioxyd sei, dessen Säuregehalt die Thatsachen, bei dem Farbstoff der Cochenille z. B., jedenfalls anders ausfallen lassen mufs, als Preisser sie beobachtet zu haben angab. Elsner (4) beob-

(1) Eine Beobachtung, welche besonders Marchand (J. pr. Chem. XLIII, 301) bestätigte (vergl. auch S. 266). — (2) Dissertation sur l'origine et la nature des matières colorantes organiques etc. Rouen 1843; Berzelius' Jahresber. XXIV, 508. — (3) Ann. Ch. Pharm. LV, 101; Berzelius' Jahresber. XXVI, 684. — (4) J. pr. Chem. XXXV, 377; Berzelius' Jahresber. XXVI, 685.

achtete gleichfalls für verschiedene rothe und gelbe Pflanzenfarbstoffe ein anderes Verhalten, als das von Preisser ihnen beigelegte; Schlieper (1) fand Preisser's Angaben in Beziehung auf den rothen Farbstoff des Saflors (Carthamin) und Schiel (2) in Beziehung auf den Krappfarbstoff in keiner Weise bestätigt. Bolley (3) hat nun bei der Untersuchung des Farbstoffs vom Rothholz, vom Sandelholz, von der Alkanna, vom Drachenblut, von der Quercitronrinde ebenfalls Preisser's Behauptungen ganz unrichtig gefunden, und diese sammt den von Preisser aufgestellten Schlusfolgerungen widerlegt.

Farbstoff
von *Anchusa*
tinctoria.

Der Farbstoff der *Anchusa tinctoria* (der falschen Alkannawurzel), welcher früher nur von Pelletier (4) und von John (5) untersucht worden war und von welchem man wufste, dafs seine Lösungen durch Kochen verändert werden, ist durch Bolley und R. Wydler (6) einer neuen Untersuchung unterworfen worden. Die zerschnittenen Wurzeln wurden zuerst mit Wasser ausgezogen, welches im Anfang braun, dann längere Zeit gelb gefärbt ablief; dieser wässerige Auszug schmeckte kratzend und bitter, reagirte etwas sauer, zeigte undeutlich die Reactionen der Gerbsäure, und hinterliefs bei dem Verdampfen eine braune Materie von ähnlichem Geschmack (vergl. unten). Die wieder getrockneten Wurzeln wurden dann mit gewöhnlichem Weingeist ausgezogen; bei dem Erhitzen desselben bis zum Kochen geht die rothe Farbe in trübes Violett und dann in Graugrün über; aber wenn etwas Salzsäure zugesetzt worden, findet dieser Farbenwechsel nicht statt. Mit diesem Zusatz wurde der Weingeist gröfstentheils abdestillirt, aus der rückständigen concentrirten Flüssigkeit und dem, was

(1) Ann. Ch. Pharm. LVIII, 369; Berzelius Jahresber. XXVII, 471. — (2) Ann. Ch. Pharm. LX, 76. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXII, 129; im Ausz. J. pr. Chem. XLIII, 507. — (4) Journ. de physique LXXIX, 278. — (5) Chemische Schriften IV, 81. — (6) Ann. Ch. Pharm. LXII, 141; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 657, J. pr. Chem. XLIII, 509; J. pharm. [8] XIII, 452, an welchem letzteren Ort statt *Angustura* immer *Alkanna* zu lesen ist.

sie abgesetzt hatte, der Farbstoff mit Aether ausgezogen, und der ätherische Auszug mit Wasser gewaschen; nach dem Verdampfen blieb eine dunkelrothe, harzähnliche, spröde Masse. Die weingeistige Lösung derselben wird durch Alkalien blau gefärbt, durch Säuren in rothen Flocken, durch weingeistige Lösung von Zinnchlorid violett, durch weingeistige Lösung von einfach-essigs. Bleioxyd gar nicht, durch solche von basisch essigs. Bleioxyd graublau gefällt. Saure Eigenschaften fanden B. und W. an diesem Farbstoff nicht, und schlagen deshalb statt der von Pelletier gewählten Bezeichnung Anchusasäure die Benennung *Anchusin* oder *Alkannaroth* vor; die von ihnen dafür gefundene Zusammensetzung entspricht der Formel $C_{11}H_{20}O_8$ (welche fast dieselbe procentische Zusammensetzung wie die von Pelletier vorgeschlagene $C_{11}H_{10}O_4$ verlangt); in den Bleioxydniederschlägen schwankte der Bleioxydgehalt zwischen 50 und 77 pC. — Bei dem Abdampfen des weingeistigen Auszugs unter Kochen bleibt ein schwarzgrüner Rückstand, welchen Wasser theilweise löst, indem es sich intensiv braun färbt; aus dem ungelöst Zurückbleibenden nimmt Aether viel mit grüner Farbe auf, und hinterläßt bei dem Abdampfen *Alkannagrün* als eine in Weingeist nicht sehr lösliche Substanz, deren Zusammensetzung durch $C_{34}H_{22}O_8$ ausgedrückt ist, so daß also das Alkannaroth durch Aufnahme von 2 HO und Austreten von CO_2 (von diesem Austreten von Kohlensäure überzeugten sich B. und W.) in Alkannagrün übergeht. — Das salzsäurehaltige Auswaschwasser von der Darstellung der ätherischen Lösung des Alkannaroths gab bei dem Abdampfen einen rothbraunen, Chlorammonium enthaltenden Rückstand (Ammoniak war auch enthalten in dem braunen, aus der Wurzel mit kaltem Wasser bereiteten Extract; den hierin enthaltenen braunen Stoff betrachteten B. und W. als mit dem eben erwähnten Rückstand identisch). Diese braune Substanz, welche leicht in Wasser, nicht in Aether oder starkem Weingeist löslich ist, wurde der Formel $NH_4O, C_{21}H_{11}O_{11}$ entsprechend

Farbstoff
 von Anchusa
 tinctoria.

zusammengesetzt gefunden. — Die weingeistige Lösung des reinen rothen Farbstoffs ändert bei dem Kochen die Farbe nicht, aber bald, wenn etwas von dem wässerigen, braunen, ammoniakhaltigen Extract oder etwas freies Ammoniak zugesetzt wird.

Farbstoff
der *Morinda*
citrifolia.

Anderson (1) hat den Farbstoff von *Morinda citrifolia* (*Sooranjee*) untersucht, welchen er als *Morindin* bezeichnet. — Wird die Rinde der Wurzel mit dem sechsfachen Gewicht rectificirten Weingeists gekocht und heiß filtrirt, so scheidet sich bei dem Abkühlen der tief braunrothen Flüssigkeit ein brauner, flockiger Niederschlag ab, welcher aus *Morindin* und etwas rothem Farbstoff besteht; bei wiederholter Behandlung der Wurzelrinde in derselben Weise scheidet sich das *Morindin* immer reiner, zuletzt in kleinen gelben Krystallnadeln ab. Es wird durch Umkrystallisiren aus 50procentigem Weingeist und dann (um es frei von unorganischer Substanz zu erhalten) durch Umkrystallisiren aus schwach mit Salzsäure angesäuertem Weingeist rein erhalten. Das *Morindin* krystallisirt aus der alkoholischen Lösung in kleinen, concentrisch gruppirten Nadeln, welche vereinigt und getrocknet eine schwefelgelbe, seidenglänzende Masse bilden; es ist wenig löslich in kaltem, löslicher in kochendem (namentlich verdünntem) Weingeist, unlöslich in Aether; in Wasser löst es sich in der Kälte wenig, in der Hitze mehr, und scheidet sich bei dem Erkalten als eine gallertartige Masse aus; in Alkalien löst es sich mit orangerother Farbe, in concentrirter Schwefelsäure mit tiefer Purpurfarbe (die Lösung enthält nach einiger Zeit den Farbstoff in zersetztem Zustand, so daß er durch Wasser ausgefällt sich in Ammoniak mit Purpurfarbe löst). Die Zusammensetzung des bei 100° getrockneten *Morindins* ist ausgedrückt durch $C_{28}H_{15}O_{15}$. *Morindin*lösung giebt mit basisch-essigs. Bleioxyd einen leicht zersetzbaren carmoisinrothen, mit Baryt, Strontian oder Kalk einen rothen Nieder-

(1) Trans. of the royal soc. of Edinb. XVI, 435; Chem. Gaz. 1848, 313; Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 85.

schlag; auf Zusatz von Ammoniak mit Eisenchlorid einen braunen, mit Alaun einen röthlichen Niederschlag. — In verschlossenen Gefäßen erhitzt schmilzt das Morindin, und kommt dann in Kochen, wobei sich orangefarbene Dämpfe eines zu rothen Nadeln sublimirenden Körpers entwickeln und eine kohlige Masse zurückbleibt. Den sublimirten Körper nennt Anderson *Morindon*. Dieses löst sich nicht in Wasser, aber leicht in Alkohol und in Aether; in Alkalien und in concentrirter Schwefelsäure löst es sich mit violetter Farbe; seine ammoniakalische Lösung giebt mit Alaunlösung einen rothen und mit Barytwasser einen kobaltblauen Niederschlag; die Zusammensetzung des Morindons fand Anderson in Einer Analyse entsprechend der Formel $C_{18}H_{10}O_{10}$, welche er indeß noch nicht als festgestellt betrachtet.

Farbstoff
der Morinda
citrifolia.

Die als *Roccella tinctoria* bezeichnete Flechte, aus welcher die beste Orseille bereitet wird, war vor 1847 hauptsächlich durch Heeren (1), Kane (2) und Schunck (3) untersucht worden. Heeren fand darin eine besondere Substanz, aus welcher bei gemeinschaftlicher Einwirkung von Luft und Ammoniak sich erst der Farbstoff bilde, und welche er *Erythrin* nannte. Das Erythrin gehe durch Kochen mit Alkohol in einen als *Pseuderythrin* bezeichneten Körper über; in der Flechte sei eine fette Säure, *Roccellsäure*, enthalten. Kane erhielt aus der Pflanze eine Substanz, welche er *Erythrilin* nannte und deren Eigenschaften denen von Heeren's Erythrin ähnlich sind, und einen andern als *Erythrin* bezeichneten, welcher die Eigenschaften von Heeren's Pseuderythrin besitzt. Schunck erhielt (aus der Flechte von Angola und Madagaskar) einen Körper, welcher Heeren's Erythrin und Kane's Erythrilin ähnlich war und von ihm als *Erythrinsäure* bezeichnet wurde, und dessen Verbindung mit Aethyloxyd Heeren's Pseud-

Farbstoffe
der Flechten.

(1) Jahrb. d. Ch. u. Ph. 1830, II, 313; Berzelius' Jahresber. XI, 275. — (2) Ann. Ch. Pharm. XXXIX, 25; Berzelius' Jahresber. XXII, 364. — (3) J. pr. Chem. XXXVIII, 449; Ann. Ch. Pharm. LXI, 64; Berzelius' Jahresber. XXVII, 299.

Farbstoffe
der Flechten.

erythrin und Kane's Erythrin entsprach; Heeren's Angaben über die Roccellsäure fand er bestätigt. Neue Untersuchungen über die näheren Bestandtheile der *Roccella tinctoria* und anderer Flechten sind nun von Stenhouse (1) veröffentlicht worden; von den seinigen abweichende Deutungen der von ihm mitgetheilten Thatsachen sind durch Strecker und Schunck gegeben worden, und auch Laurent und Gerhardt haben ihre Ansichten über die Zusammensetzung und die Zersetzungen mehrerer hierher gehörigen Substanzen mitgetheilt. Wir berichten hier zuerst über Stenhouse's Angaben, und lassen dann die verschiedenen anderen Ansichten folgen.

Untersuchung
von *Roccella*
tinctoria.

Hinsichtlich der südamerikanischen Varietät von *Roccella tinctoria* fand Stenhouse Folgendes. Die Flechte wurde zerschnitten einige Stunden lang mit Wasser macerirt und dann mit Kalkhydrat versetzt, nach dem Umrühren und Absetzenlassen die gelblich gefärbte Flüssigkeit weggenommen, der Rückstand wieder mit Wasser angerührt und später ausgepresst. Auf Zusatz von Salzsäure zu der wässerigen Flüssigkeit scheidet sich das färbende Princip als weißer gelatinöser Niederschlag aus, welcher gewaschen und auf einer Gypsplatte getrocknet in warmem Weingeist (ohne zu kochen) gelöst wird, wo das färbende Princip bei dem Erkalten sich in kleinen, weißen, sternförmig vereinigten Krystallen absetzt. Diese Substanz nennt Stenhouse *Alpha-Orsellsäure*; sie löst sich nicht in kaltem, wenig in kochendem Wasser, leicht in Alkohol und Aether, und die alkoholische Lösung röthet deutlich Lackmus. Characteristisch ist für diese Säure, dafs sie mit einer Lösung von Chlorkalk sich sogleich tief roth färbt, welche Farbe in

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 55; im Ausz. J. pharm. [3] XV, 229; Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 127. Eine kurze Aufzählung der Resultate findet sich Phil. Mag. [3] XXXII, 300; J. pr. Chem. XLV, 180; Pharm. Centr. 1848, 816, mit Abweichungen in einzelnen Angaben, welche in dem Folgenden in den Anmerkungen angegeben sind.

Braun und Gelb übergeht und endlich (bei überschüssigem Chlorkalk) gänzlich verschwindet; die Alpha-Orsellsäure wird durch den Chlorkalk schnell oxydirt und in eine dunkelgrüne unkrystallisirbare Materie verwandelt. Die Lösung der Alpha-Orsellsäure in Ammoniak färbt sich an der Luft allmählig prächtig roth. Diese Säure hat (bei 100° getrocknet) die Zusammensetzung $\text{HO}, \text{C}_{32}\text{H}_{15}\text{O}_{13}$; sie neutralisirt die Alkalien und alkalischen Erden und bildet mit ihnen lösliche, krystallisirbare Salze. Das Barytsalz wurde durch Lösung der Säure in wenig überschüssigem Barytwasser, Durchleiten von Kohlensäure durch die Lösung, und Ausziehen des orsells. Baryts aus dem Niederschlag mittelst Weingeist in kleinen sternförmigen Krystallen, $\text{BaO}, \text{C}_{32}\text{H}_{15}\text{O}_{13}$, erhalten. — Wenn der gelatinöse Niederschlag von unreiner Orsellsäure, welcher aus dem Auszug der Flechte mit Kalk und Wasser durch Salzsäure erhalten wird, mit wenig Wasser gemischt, vorsichtig mit Kalk oder Baryt neutralisirt und bis zu vollständiger Lösung gekocht wird, so entweicht etwas Kohlensäure und eine neue Säure, *Alpha-Orsellinsäure* (*alpha-orsellesic acid*), bildet sich, welche bei länger fortdauerndem Kochen sich wiederum zersetzen würde. Die so erhaltene Flüssigkeit wird filtrirt, nach dem Erkalten mit Salzsäure die Alpha-Orsellinsäure ausgefällt, und diese aus schwachem Weingeist oder Wasser, das man jedoch nicht bis zum Kochen erhitzen darf (wenn nöthig unter Zusatz von Thierkohle) krystallisirt. Die Krystalle schmecken schwach sauer und bitterlich und röthen deutlich Lackmus; die Lösung in Wasser entwickelt bei dem Kochen Kohlensäure und enthält dann Orcin. Alpha-Orsellinsäure giebt mit Chlorkalk eine vorübergehende blauröthliche oder violette Färbung; die Lösung der Säure in kaustischem Ammoniak färbt sich an der Luft roth. Für die bei 100° getrocknete Alpha-Orsellinsäure wurde die Zusammensetzung $\text{HO}, \text{C}_{16}\text{H}_7\text{O}$, gefunden (1). Das Kalk- und das Barytsalz.

(1) In der oben (S. 750) angeführten kürzeren, in *Phil. Mag.* ver-

Untersuchung
von *Rocella*
tinctoria.

dieser Säure sind bedeutend löslicher in Wasser als die entsprechenden orsells. Salze. Das Barytsalz wurde erhalten durch vorsichtiges Zusetzen kleiner Quantitäten trocknen kaustischen Baryts zu einer Lösung der Säure in gelinde erwärmtem Weingeist, Abdampfen (bei Ueberschufs an Basis tritt hier Zersetzung unter Bildung von kohlen. Baryt ein; war die Säure überschüssig, so muß die Lösung des Rückstands neutralisirt werden) und Krystallisiren lassen; das Salz ist sehr löslich in Wasser und schwachem Weingeist; es zersetzt sich bei 100°; im luftleeren Raum getrocknet hat es die Zusammensetzung $\text{BaO}, \text{C}_{16} \text{H}_7 \text{O}_7$. Bei mehrstündigem Kochen der Alpha-Orsellsäure mit starkem Alkohol bildet sich eine Aethyloxydverbindung; die im Wasserbad stark concentrirte Flüssigkeit wird wiederholt mit Wasser gekocht und filtrirt, wo diese Verbindung bei dem Erkalten sich in flachen nadelförmigen oder blättrigen Krystallen absetzt, welche durch Umkrystallisiren gereinigt werden; bei der trocknen Destillation derselben entwickeln sich Alkoholdämpfe und im Rückstand bleibt Orcin; diese Verbindung ist nicht alpha-orsells. Aethyloxyd, sondern alpha-orsellins., $\text{C}_4 \text{H}_5 \text{O}, \text{C}_{16} \text{H}_7 \text{O}_7$; die Orsellsäure scheint sich hier ebenso zersetzt zu haben, wie sie es auch bei Kochen mit einer Basis und selbst mit reinem Wasser thut.

Die *Rocella tinctoria* vom Cap der guten Hoffnung giebt durch Ausziehen mit Kalk und Wasser und Fällen dieser Flüssigkeit mit Salzsäure einen gelatinösen Niederschlag, welcher *Beta-Orsellsäure* und *Roccellinin* enthält; beide Substanzen lassen sich dadurch von einander trennen, dafs die Beta-Orsellsäure in heifsem Wasser ziemlich löslich ist, das Roccellinin hingegen nicht. — Die *Beta-Orsellsäure* scheidet sich aus der wässerigen Lösung in kleinen Krystallen ab, welche zur weitem Reinigung von einer harzartigen Materie und einer fetten Säure durch Auflösen in Kalk- oder Baryt-

öfentlichten, Abhandlung wird als die Formel der Alpha-Orsellinsäure $\text{HO}, \text{C}_{16} \text{H}_7 \text{O}$, angegeben.

wasser, Fälln durch Salzsäure u. s. w. gereinigt werden. Diese Säure verhält sich der Alpha-Orsellsäure sehr ähnlich, ist aber (bei 100° getrocknet) $\text{HO}, \text{C}_{34}\text{H}_{16}\text{O}_{14}$; das (ganz entsprechend wie das alpha-orsells. Salz dargestellte) Barytsalz derselben ist $\text{BaO}, \text{C}_{34}\text{H}_{16}\text{O}_{14}$. — Wird die Beta-Orsellsäure mit Kalk oder Baryt neutralisirt und kurze Zeit gekocht, so geht sie (ganz so wie die Alpha-Orsellsäure, S. 751) in *Beta-Orsellinsäure* (*Beta-orsellesic acid*) über, welche sich ähnlich wie die Alpha-Orsellinsäure verhält. Wird die Beta-Orsellsäure mit Alkohol gekocht, so entsteht eine Aethylverbindung, welche nicht beta-orsells. Aethyloxyd ist. — Das *Roccellinin* stellt man dar durch langes Kochen des getrockneten oben erwähnten gelatinösen Niederschlags mit starkem Alkohol, Abdampfen zur Trockne und Ausziehen der aus der Beta-Roccellsäure gebildeten Aethylverbindung durch kochendes Wasser, wo das Roccellinin ungelöst zurückbleibt, welches durch Kochen mit vielem starkem Weingeist gelöst wird und bei dem Erkalten sich in weissen haarförmigen Krystallen abscheidet. Reines Roccellinin wird durch Chlorkalk gelbgrün gefärbt; es löst sich leicht in fixen Alkalien und in Ammoniak, ohne dass die Lösung an der Luft roth wird. Bei dem Kochen desselben mit Barytwasser erzeugt sich kein kohlens. Baryt. Seine Zusammensetzung lässt sich ausdrücken durch $\text{C}_{38}\text{H}_{17}\text{O}_{18}$; Versuche, Verbindungen desselben zum Zweck der Atomgewichtsbestimmung hervorzubringen, gelangen nicht.

Untersuchung
von Roccella
tinctoria.

Roccella Montagnei (Angola-Flechte, welche Schunck unter dem Namen *Roccella tinctoria* var. *fuciformis* untersuchte) wurde gleichfalls von Stenhouse untersucht. Durch Ausziehen mit Kalk und Wasser und Fälln des Auszugs mit Salzsäure erhielt Stenhouse die *Erythrinsäure*, und zwar reichlicher als nach der von Schunck befolgten Methode, die Flechte mit Wasser auszukochen und den sich bei dem Erkalten absetzenden Niederschlag wiederholt aus schwachem Weingeist umzukrystallisiren. Die Erythrinsäure verhält sich gegen Chlorkalk und in der ammoniakalischen Lösung

Untersuchung
von Roccella
Montagnei.

Untersuchung
von Roccella
Montagnei.

wie die Alpha- und die Beta-Orsellensäure; die Zusammensetzung der bei 100° getrockneten Erythrinsäure fand Stenhouse $\text{HO}, \text{C}_{20}\text{H}_{10}\text{O}_9$ (Schunck hatte dafür die Formel $\text{C}_{34}\text{H}_{10}\text{O}_{15}$ gegeben); es gelang ihm nicht, Verbindungen von constanter Zusammensetzung mit Baryt oder Bleioxyd hervorzubringen. Erythrins. Aethyloxyd, $\text{C}_4\text{H}_5\text{O}$, $\text{C}_{20}\text{H}_{10}\text{O}_9$, und die entsprechende Methyloxydverbindung wurden durch Kochen der Säure mit Alkohol oder Holzgeist dargestellt und aus Wasser krystallisirt erhalten; die wässrige Lösung der Aethyloxydverbindung giebt in der Hitze mit basisch-essigs. Bleioxyd einen weissen voluminösen Niederschlag, in welchem (bei 100° getrocknet) 70,8 bis 71,0 pC. Bleioxyd, 18,6 bis 18,9 Kohlenstoff, 1,7 Wasserstoff und 8,4 bis 8,7 Sauerstoff gefunden wurden. — Wird die Erythrinsäure mit Kalk oder Baryt gesättigt und die neutrale Lösung kurze Zeit gekocht, so entstehen zwei neue Körper, eine der Alpha- und der Beta-Orsellensäure ähnliche Säure, welche Stenhouse als *Erythrelinsäure* (*erythrelesic acid*) bezeichnet (sie bildet sich auf diese Art in geringerer Menge als die eben genannten ähnlichen Säuren; sie ist etwas weniger löslich in Wasser und krystallisirt in kleinen glimmerartigen Blättchen; bei dem Kochen derselben mit Wasser entwickelt sich Kohlensäure und bildet sich farbloses Orcin, bei dem Kochen mit überschüssigem Kalk oder Baryt ausserdem ein rother Farbstoff), und ein schon von Schunck als *Pikro-Erythrin* bezeichneter Körper. Letzterer wird erhalten, wenn man die Erythrinsäure mit Kalk oder Baryt neutralisirt, kocht, die mit Salzsäure abgeschiedene Erythrelinsäure abfiltrirt und die Flüssigkeit ziemlich concentrirt während einiger Tage an einem kalten Orte stehen läßt, wo sich das Pikro-Erythrin in gelblichen Krystallen ausscheidet, die durch Waschen mit kaltem Wasser und Umkrystallisiren aus kochendem Wasser mit Zusatz von Thierkohle gereinigt werden. Das Pikro-Erythrin krystallisirt in kleinen, farblosen, haufenförmig vereinigten Nadeln, schmeckt bitter, zeigt mit Chlorkalklösung die-

selbe blutrothe Färbung wie Erythrinsäure, und färbt sich in der ammoniakalischen Lösung an der Luft roth; die Zusammensetzung (des bei 100° getrockneten) fand Stenhouse entsprechend der Formel $C_{34}H_{13}O_{10}$ (Schunck hatte dafür $C_{34}H_{14}O_{10}$ gegeben); eine Bleioxydverbindung von constanter Zusammensetzung oder eine Barytverbindung konnte er nicht hervorbringen. Stenhouse theilt nicht Schunck's Ansicht, daß das Pikro-Erythrin aus Erythrinsäure durch Aufnahme von Wasser entstehe, und überzeugte sich, daß bei dieser Umwandlung immer eine bedeutende Menge Kohlensäure entwickelt wird. — Schunck hatte angegeben, daß das Pikro-Erythrin bei dem Kochen mit einem Ueberschuß von Kalk oder Baryt ganz zu Orcin werde; Stenhouse fand, daß sich hierbei zugleich noch ein anderer Körper von süßem Geschmack bilde, welchen er *Erythroglucin* nennt (1). Zu der Darstellung des letztern kocht man den mit Kalk und Wasser bereiteten Auszug der *Rocella Montagnei* einige Stunden lang, und verdampft ihn dann bis auf ein Drittheil oder Viertheil; nach dem Erkalten wird der Kalk durch Kohlensäure ausgefällt, und die filtrirte Flüssigkeit im Wasserbad zu Syrupdicke verdampft. Dieser Syrup besteht hauptsächlich aus Orcin und Erythroglucin, gemischt mit einem rothen Farbstoff und einer harzartigen Substanz. Man läßt während einiger Tage Aether oder starken Weingeist auf ihn einwirken, wo sich das Orcin und ein Theil der färbenden Materie auflösen und das Erythroglucin sich in kleinen glänzenden Krystallen ausscheidet, die mit kaltem Alkohol gewaschen und aus kochendem umkrystallisirt werden. Es bildet große diamantglänzende Krystalle des quadratischen Systems, nach Miller's Bestimmung $P.\infty P.\infty$ mit einer quadratischen Pyramide dritter Ordnung $\frac{3P3}{2}$, welche die Hälfte der Combinationskanten zwischen P und $\infty P.\infty$ abstumpft ($P:P$ in den Endkanten = $141^{\circ}2'$, in den Seitenkanten = $123^{\circ}43'$;

Untersuchung
von Roccella
Montagnei.

(1) Im Ausz. der Abhandlung, welcher sich im Phil. Mag. am 8. 750 angef. Orte findet, wird diese Substanz als *Pseudo-Orcin* bezeichnet.

Untersuchung von *Roccella Montagnei*. $P : \infty P \infty = 109^{\circ}29'$; $3P3 : \infty P \infty = 138^{\circ}42'$). Es reagirt neutral, und löst sich in Wasser und in Weingeist; Ammoniak, Chlorkalk, reine und kohlens. Alkalien wirken nicht auf es ein; es ist nicht gährungsfähig; seine Lösung wird durch Blei-, Silber- und Kupferoxydsalze nicht gefällt. Bei dem Trocknen im luftleeren Raum und bei 100° verliert es kein Wasser; seine Zusammensetzung entspricht der Formel $C_{10}H_{13}O_{10}$.

Stenhouse bestimmte den Gehalt an Farbstoff in der *Roccella Montagnei* von Angola zu 12, in der *Roccella tinctoria* von Südamerika zu 7, in der vom Cap der guten Hoffnung und in der *Lecanora tartarea* zu $1\frac{1}{2}$ bis 2 pC. etwa vom Gewicht der Flechte. Zur approximativen Bestimmung des Gehalts an Farbstoff empfiehlt er die Ermittlung, wieviel Chlorkalklösung zur Zerstörung des Farbstoffs in einem mit Kalkmilch bereiteten Auszug einer gewissen Quantität Flechte nothwendig ist.

Evernia prunastri.

Eine andere Flechte, *Evernia Prunastri*, war durch Rochleder und Heldt(1) untersucht worden, welche darin eine Substanz fanden, die sie als identisch mit Lecanorsäure betrachteten. Stenhouse vermuthet, daß dieses wahrscheinlich nicht die ächte *Evernia Prunastri* gewesen sei, oder daß die Bestandtheile der an verschiedenen Orten wachsenden Flechte verschieden seien, sofern er in der in Schottland vorkommenden ganz andere Bestandtheile fand. Der mit Kalk und Wasser bereitete, hellgelbe Auszug gab bei der Neutralisation mit Salzsäure einen reichlichen, flockigen, hellgelben Niederschlag, welcher wiederholt mit sehr schwachem Weingeist erwärmt wurde, bis etwa zwei Drittheile des Niederschlags gelöst waren (der Rückstand enthielt Usninsäure); die Lösungen erstarrten bei dem Erkalten zu einer Masse kleiner gelblicher Krystalle, welche durch Behandeln mit Thierkohle und Umkrystallisiren rein erhalten werden. Sie bestehen aus einer neuen Säure, *Evernsäure*.

(1) *Ann. Ch. Pharm.* XLVIII, 1; *Berzelius' Jahresber.* XXIV, 332.

Diese ist unlöslich in kaltem, sehr wenig löslich in kochendem Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether; die Lösungen röthen Lackmuspapier. Bei der trocknen Destillation giebt die Säure etwas empyreumatisches Oel und ein Sublimat von den Eigenschaften des Orcins. In einem Ueberschusse von Ammoniak gelöst nimmt die Säure an der Luft langsam eine dunkelrothe Farbe an; mit Chlorkalklösung färbt sie sich gelblich. Sie verliert bei 100° kein Wasser; ihre Zusammensetzung ist $\text{HO}, \text{C}_{34}\text{H}_{18}\text{O}_{13}$. Durch Lösen der Säure in überschüssigem Kali und Einleiten von Kohlensäure erhält man eine Masse kleiner Krystalle von everns. Kali, welche durch Umkrystallisiren aus schwachem Alkohol mit Zusatz von Thierkohle gereinigt werden; sie sind dann weiss und seidenglänzend, verlieren bei 100° kein Wasser, und haben die Zusammensetzung $\text{KO}, \text{C}_{34}\text{H}_{18}\text{O}_{13}$. Das Barytsalz, in entsprechender Weise dargestellt, ist nur wenig löslich in Wasser, leicht löslich in schwachem Weingeist, und krystallisirt in kleinen prismatischen Krystallen, bei 100° getrocknet $\text{BaO}, \text{C}_{34}\text{H}_{18}\text{O}_{13}$. — Wird Evernsäure in einem geringen Ueberschusse von kaustischem Kali gelöst und während einiger Minuten gekocht, sodann in die dunkelbraun gefärbte Flüssigkeit Kohlensäure bis zur Neutralisation eingeleitet, und die Flüssigkeit abgedampft, so setzen sich nach einiger Zeit blätterige Krystalle des Kalisalzes einer neuen Säure, der *Everninsäure*, ab, welche mit kaltem Weingeist gewaschen, in Wasser und heissem Weingeist gelöst und durch Behandeln mit Thierkohle gereinigt werden können; aus der wässerigen Lösung dieses Salzes fällt Salzsäure die Everninsäure als einen weissen flockigen Niederschlag, dessen heisse wässrige Lösung bei dem Erkalten lange haarförmige seidenglänzende Krystalle von Everninsäure absetzt. Besser noch bereitet man die Everninsäure so, dass man Evernsäure kurze Zeit mit einem leichten Ueberschusse von Barytwasser kocht, wobei viel kohlen. Baryt niederfällt, die filtrirte Flüssigkeit mit Salzsäure sättigt, und den hierbei

Untersuchung
von Evernia
Prunastri.

Untersuchung
von Evernia
Prüfungsschl.

entstehenden Niederschlag durch Wiederauflösen in rein mit Kohle reinigt (die Mutterlauge enthält Orcin von der Zersetzung der Evernsäure herrührt; Evernia giebt mit Barytwasser oder Kalilauge gekocht keine Lösung. Die Everninsäure ist wenig löslich in kaltem, ziemlich in kochendem Wasser, leicht löslich in Alkohol und in verdünnter Salpetersäure. Ihre Lösungen röthen Lackmuspapier. Bei dem Erhitzen entwickelt sie einen angenehmen Geruch und giebt ein krystallinisches Sublimat. Die Everninsäure wird in Chloralkalilösung nur gelblich gefärbt und ihre alkoholische Lösung färbt sich an der Luft nicht roth. Im luftleeren Raum und bei 100° verliert sie kein Wasser. Die Zusammensetzung ist $\text{HO}, \text{C}_{11}\text{H}_8\text{O}_7$. Durch Kochen in Lösung von Evernsäure in einem leichten Ueberschuss von Barytwasser, Einleiten von Kohlensäure bis zur Sättigung, Abdampfen der filtrirten Flüssigkeit, Reinigen des Niederschlags durch Ausziehen mit Aether oder Alkohol (welche Orcin und eine färbende Materie enthalten) und Umkrystallisiren des Rückstands in warmen Lösung in schwachem Weingeist erhält man Everninsäure. Baryt in langen, harten, fächerförmig gewinkelten vierseitigen Prismen, welche bei 100° getrocknet $\text{C}_{11}\text{H}_8\text{O}_7$ sind, nur im luftleeren Raum getrocknet gegen je nach der Dauer des Trocknens 1 bis 2 Wasser enthalten. Das Silbersalz, $\text{AgO}, \text{C}_{11}\text{H}_7$, wird durch Fällen des evernins. Ammoniaks mit salpetersäurem oxyd als ein weißer Niederschlag erhalten. Wird Evernia in starkem Alkohol, welchem einige Stücke kaliumcarbonat zugesetzt sind, bis zu vollständiger Lösung in die dunkelbraune Flüssigkeit bis zur Sättigung mit Kohlensäure eingeleitet, und die Flüssigkeit concentrirt, so setzen sich nach einiger Zeit lange, braungefärbte prismatische Krystalle ab (die Mutterlauge enthält Orcin, welche durch Waschen mit Wasser und Umkrystallisiren aus Alkohol rein erhalten werden können; dieselbe Verbindung bildet sich auch durch Kochen von Evernia mit

in absolutem Alkohol während 8 oder 10 Stunden, und kann nach dem Abdampfen aus dem Rückstand durch Behandlung mit kaltem Wasser (welches Orcin aufnimmt) und öfteres InkrySTALLISIREN aus verdünntem Weingeist (aber schwieriger rein als auf die vorhergehende Weise) erhalten werden; diese Verbindung ist geschmack- und geruchlos, löslich in Alkohol und Aether, unlöslich in Wasser, bei 56° schmelzend; aus der Lösung in kaustischem Kali scheidet sie sich auf den Zusatz von Salzsäure unverändert ab; ihre Zusammensetzung ist die des evernins. Aethyloxyds, C_4H_5O , $3,1, H_5O$, (es gelang nicht, das evernins. Aethyloxyd durch Kochen der Everninsäure selbst mit Alkohol, welcher mit Salzsäuregas gesättigt worden war, darzustellen).

Untersuchung
der Evernia
Prunastri.

Für die Uminsäure, welche Knop 1843 entdeckte und mit welcher sich Rochleder und Heldt etwa zu derselben Zeit beschäftigten, hat Stenhouse die Formel $C_{10}H_{11}O_{14}$ (für die bei 100° getrocknete Säure) bestätigt. Für ihre Darstellung giebt er unter den Flechten der *Cladonia ramifera* und der *Usnea florida* den Vorzug; er empfiehlt die Bereitungsmethode, diese Flechten mit Kalk und Wasser anzuziehen, den Auszug mit Salzsäure zu fällen und den Niederschlag wiederholt aus starkem Alkohol mit Zusatz von Kohle umzukrySTALLISIREN. (Ueber die Zersetzung der Uminsäure bei trockner Destillation vergl. S. 762.)

Stenhouse hat auch das Orcin von neuem untersucht, welches sowohl aus den Farbstoffen der Varietäten von *Rocella tinctoria*, als aus denen von *Lecanora* als aus der durch *Evernia prunastri* gelieferten Substanz bei der trocknen Destillation oder bei dem Kochen mit Alkalien oder auch nur mit Wasser oder Alkohol gebildet wird. Stenhouse theilt nicht die zuerst von Schunck ausgesprochene und auch von Rochleder und Heldt angenommene Ansicht, daß bei dem Kochen von Lecanorsäure oder Erythrinsäure mit überschüssigem Alkali Orcin und Kohlensäure die einzigen Zersetzungsproducte seien; er hält die Zersetzung für complicirter, sofern sich zuerst intermediäre Säuren

Orcin.

Orcin. bilden, und bei der Zersetzung der Erythrin- und Everninsäure Orcin nicht das einzige Endproduct ist, sondern zugleich Erythroglucin und Everninsäure gebildet werden. Als die vorzüglichste Methode, farbloses Orcin darzustellen, empfiehlt Stenhouse, reine Alpha- oder Beta-Orsellinsäure oder Erythrelinsäure $\frac{1}{4}$ bis 1 Stunde lang mit Wasser zu kochen, und die Flüssigkeit schnell zu verdampfen, wo bei dem Erkalten farblose Krystalle von Orcin anschießen. Zur Darstellung größerer Mengen von Orcin, wenn dieses nicht ganz farblos zu sein brauche, empfiehlt er, den mit Kalk und Wasser bereiteten Auszug irgend einer der Varietäten von *Roccella tinctoria* oder *Lecanora* einige Stunden in einer offenen Schale zu kochen und bis etwa auf $\frac{1}{4}$ zu verdampfen, den Kalk durch eingeleitete Kohlensäure auszufällen, das Filtrat zu verdampfen, wo ein dicker Syrup von geschmolzenem Orcin zurückbleibt, diesen mit starkem Weingeist zu kochen, das Filtrat zur Krystallisation zu bringen, und die Krystalle aus wasserfreiem Aether wiederholt umzukrystallisiren. Das Orcin giebt mit Chlorkalklösung dunkelviolettrothe Färbung, welche sich schnell in Braun und Gelb umwandelt; die Reaction ist ganz verschieden von derjenigen, welche die Orsellensäuren, aber wenig verschieden von derjenigen, welche die intermediären Säuren unter denselben Umständen zeigen. — Brom wirkt auf eine wässrige Lösung von Orcin energisch ein und eine rothbraune krystallinische Masse scheidet sich ab. Wird Brom zugesetzt, so lange noch Einwirkung stattfindet, die krystallinische Masse von der Flüssigkeit (welche Bromwasserstoff enthält) getrennt, mit kaltem Wasser gewaschen, und aus verdünntem Weingeist unter Zusatz von Kohle umkrystallisirt, so erhält man lange, seidenartige, farblose Krystalle einer Verbindung $C_{14}H_3Br_3O_4$ (d. h. Orcin, in welchem 3 H durch 3 Br ersetzt sind, wenn man nämlich für das wasserfreie Orcin die von Gerhardt (1) vorgeschlagene Formel $C_{14}H_3O_4$ annimmt);

(1) Compt. rend. des trav. chim. 1845, 286.

diese Verbindung ist leicht löslich in Alkohol und Aether, unlöslich in Wasser, in siedendem Wasser schmelzend und bei dem Erkalten wieder krystallisirend (1). Eine ähnliche Verbindung bildet sich bei der Einwirkung des Chlors auf Orcin, welche indefs nicht rein erhalten werden konnte. Orcin.

In einer spätern Abhandlung (2) hat Stenhouse durch neue Analysen die Formeln $C_{14}H_{10}O_6$ für das wasserhaltige und $C_{14}H_8O_4$ für das wasserfreie Orcin bestätigt; unter den verschiedenen Methoden, wie man das Orcin wasserfrei erhalten kann — Destillation, Erhitzen auf 100° , öfteres Umkrystallisiren aus Aether und Trocknen im luft-leeren Raum über Schwefelsäure — giebt er der letzten den Vorzug (wenn gleich sie die zeitraubendste ist), weil das Orcin sich dabei vollkommen farblos erhält. Die von Dumas und Schunck beschriebene Bleioxydverbindung konnte er nicht von constanter Zusammensetzung erhalten. Für das krystallisirte Orcin theilt er eine Bestimmung der Krystallform von Miller mit; hiernach gehört dieselbe in das monoklinometrische System, und die vorkommende Combination ist $\infty P.\infty P.\infty OP. - P\infty$; ($\infty P : \infty P$ im orthodiagonalen Hauptschnitt $= 102^\circ 24'$, $\infty P \infty : OP = 83^\circ 57'$, $\infty P \infty : - P \infty = 136^\circ 16'$; Spaltbarkeit findet statt parallel

(1) Laurent und Gerhardt haben dieselbe Verbindung erhalten und mit denselben Resultaten untersucht; sie geben noch weiter von ihr an, daß bei Erhitzung derselben Bromwasserstoff entwickelt wird, ein bei dem Erkalten erstarrendes Oel überdestillirt, und viel Kohle im Rückstand bleibt (Ann. ch. phys. [3] XXIV, 315; Compt. rend. XXVII, 164; J. pr. Chem. XLV, 304; Pharm. Centr. 1848, 716). Auf den übrigen Inhalt dieser Abhandlung werden wir in dem Folgenden zurückkommen. — Stenhouse gab früher (in der S. 750 angeführten Abhandlung in dem Phil. Mag.) als Formel der bromhaltigen Verbindung $C_{14}H_{11}BrO_{11}$, und nahm für das wasserhaltige Orcin die Formel $C_{14}H_{11}O_6$ an. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 99; im Ausz. J. pharm. [3] XV, 308; Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 137. In einer großentheils mit dieser Abhandlung übereinstimmenden, aber wohl früheren Mittheilung in Phil. Mag. [3] XXXIII, 1; J. pr. Chem. XLV, 185; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 583 nahm Stenhouse als Formel des wasserhaltigen Orcins $C_{14}H_{11}O_6$, des wasserfreien Orcins $C_{14}H_8O_4$ an.

Betrach-
tungen über die
färbenden
Principien
der Flechten
überhaupt.

Für die Evernsäure und die Everninsäure behält Strecker die Formeln $C_{34}H_{16}O_{14}$ und $C_{18}H_{10}O_8$ bei, wonach die Zersetzung der ersteren bei dem Kochen mit Barytwasser ausgedrückt ist durch :




Strecker bespricht noch das Gemeinsame der Alpha-Orsellsäure, Beta-Orsellsäure, Erythrinsäure und Evernsäure, bei dem Kochen mit Wasser, Barytwasser oder Alkohol eine Säure ($C_{16}H_8O_8$ oder die davon um C_2H_2 differirende $C_{18}H_{10}O_8$) und einen zweiten Körper zu geben, welcher entweder selbst eine Säure oder indifferent ist. In Beziehung auf die aus der *Lecanora Parella* erhaltene Säure glaubt er, daß sie aus einer ähnlichen Säure entstehe, welche bei dem Kochen mit Baryt oder Alkohol sich zu Lecanorsäure ($C_{16}H_8O_8$) und Parellsäure zersetze, welcher letzteren wahrscheinlich die Formel $C_{18}H_{10}O_8$ zukomme. — Was die Beziehung des Beta-Orcins zur Usninsäure angeht, so glaubt Strecker, daß man die Formel der Usninsäure $= C_{38}H_{18}O_{14}$, die des krystallisirten Beta - Orcins $= C_{34}H_{16}O_{14} + 3HO$ annehmen könne, wonach sich die Entstehung des letzteren durch $C_{38}H_{18}O_{14} = C_{34}H_{16}O_{14} + 4CO_2$ ausdrücken liefse.

Auch Schunck (1) ist der Ansicht, bei dem Kochen der als Erythrin, Erythrilin, Erythrinsäure, Alpha-Orsellsäure und Beta-Orsellsäure bezeichneten Körper mit Alkohol entstehe immer ein und dasselbe Product, das nämliche, welches auch aus der Lecanorsäure bei Kochen mit Alkohol sich bilde, und welches er als Lecanorsäureäther bezeichnet und als nach der Formel C_4H_8O , $C_{18}H_8O_8$ zusammengesetzt betrachtet; auch der als Pseuderythrin bezeichnete Körper sei damit identisch. Er ist der Ansicht, in den verschiedenen hier zur Sprache kommenden Flechten seien zwar verschiedene Säuren enthalten, aber diese seien unter sich verwandt dadurch, daß sie alle gepaarte Säuren, bestehend

(1) Phil. Mag. [3] XXXIII, 249; J. pr. Chem. XLVI, 18.

aus Lecanorsäure und verschiedenen Paarlingen, seien. — Betrachtungen über die färbenden Principien der Flechten überhaupt.
 Erythrinsäure, für welche Schunck die Formel $C_{42}H_{28}O_{21}$ annimmt, sei Lecanorsäure ($C_{18}H_8O_8$) + Pikro-Erythrin (welchem Schunck jetzt wie Strecker die Formel $C_{24}H_{16}O_{14}$ beilegt, und für welches er jetzt die Bezeichnung *Erypikrin* vorschlägt) — HO; aus dem Pikro-Erythrin entstehe durch Austreten von 2 CO_2 und Eintreten von 12 HO Erythroglycin (welches von Stenhouse auch Pseudo-Orcin genannt wurde, und für welches Schunck die Bezeichnung Eryglucin und die Formel $C_{22}H_{28}O_{22}$ vorschlägt); mittelst dieser Annahmen sucht er die Zersetzungen, welche die Erythrinsäure unter verschiedenen Umständen erleidet, zu erklären. — Die Alpha-Orsellensäure und die Beta-Orsellensäure hält er für gleich zusammengesetzt, und giebt beiden die Formel $C_{34}H_{18}O_{14} = C_{18}H_8O_8$ (Lecanorsäure) + $C_{16}H_{11}O_7$ (welche Formel Schunck für das krystallisirte Orcin annimmt) — HO. — Alpha- und Beta-Orsellinsäure wie auch Erythrelinsäure seien identisch, und ihre Zusammensetzung ausgedrückt durch $C_{18}H_9O_9$ (Lecanorsäure + HO). Schunck giebt hierbei noch an, daß in Aetzbaryt aufgelöste und wieder gefällte Lecanorsäure Ein Aeq. Wasser mehr enthalte als vorher, und zu $C_{18}H_9O_9$ geworden sei. — Der Evernsäure giebt Schunck die Formel $C_{36}H_{17}O_{15} = C_{18}H_8O_8$ (Lecanorsäure) + $C_{18}H_{10}O_8$ (Everninsäure) — HO.

Laurent und Gerhardt (1) geben dem wasserfreien Lecanorin (Heldt u. Rochleder und Schunck hatten diesen Namen gegen die Bezeichnung Lecanorsäure vertauscht) die Formel $C_{32}H_{14}O_{14}$, dem krystallisirten Lecanorin $C_{32}H_{16}O_{16}$, dem Pseuderythrin $C_{20}H_{12}O_8$, dem Orcein $C_{14}H_7NO_6$. Die Zersetzung des Lecanorins bei dem Kochen mit Barytwasser sei ausgedrückt durch :



(1) In der S. 761 angeführten Abhandlung.

Farbstoffe
der Krapp-
wurzel.

Niederschlag wird durch Kochen mit verdünnter Salpetersäure (unter Entwicklung salpetriger Säure) hell- oder orange gelb, wobei Alizarin, Rubian und die dunkelbraune Substanz zerstört werden, und Rubiacin, die zwei Harze und Pektinsäure unverändert bleiben; der so behandelte Niederschlag zeigt keine färbende Kraft mehr, während diese dem ursprünglichen (dunkelbraunen) in hohem Grade zukommt.

Zur Trennung der in dem dunkelbraunen Niederschlag enthaltenen Substanzen erkannte Schunck folgende Methode als die beste. Der Niederschlag wird gerade so lang mit kaltem Wasser gewaschen, bis die zu seiner Darstellung angewandte Säure ausgewaschen ist, dann noch feucht mit siedendem Alkohol behandelt und die (dunkelgelbbraune) Flüssigkeit siedend abfiltrirt; der (bräunlich-purpurne, flockige) Rückstand wird wiederholt ebenso behandelt, bis die abfließende Flüssigkeit nur noch schwach gelb gefärbt ist.

Aus der heißen alkoholischen Lösung scheidet sich bei dem Erkalten häufig ein dunkelbraunes Harz in Pulverform ab. Die Flüssigkeit wird wieder zum Sieden erhitzt und mit frisch gefälltem Thonerdehydrat versetzt, wobei sie selbst fast vollständig entfärbt wird, und die Thonerde sich roth färbt, indem Alizarin, Rubian, Rubiacin und ein Theil der Harze durch sie gebunden werden. Die gefärbte Thonerde wird mit Alkohol ausgewaschen und in eine kochende concentrirte Lösung von kohlen. Kali eingetragen, wobei alle mit ihr verbundenen Substanzen mit Ausnahme des Alizarins gelöst werden; die Flüssigkeit färbt sich tief roth, und es bleibt die Alizarinverbindung der Thonerde und ein Ueberschuss der letztern zurück, welche beide mit kohlen. Kali ausgekocht werden bis die Flüssigkeit dabei nur noch schwach purpurfarbig wird. Die zurückbleibende (tief braunrothe) Alizarin-Thonerde wird durch kochende Salzsäure zersetzt, wobei *Alizarin* als hellrothes, etwas krystallinisches Pulver zurückbleibt. Dieses wird ausgewaschen, aus kochendem Alkohol umkrystallisirt, und

von einem etwa sich zugleich mit absetzenden (braunen und pulverförmigen) Harz durch Schütteln mit Alkohol gereinigt, da letzteres hierbei länger suspendirt bleibt. — Aus der (tief-rothen) Lösung von kohlen. Kali, welche mit dem Thonerdeniederschlag gekocht war, fällt Salzsäure Rubiacin, Rubian und die zwei Harze in braunen Flocken. Dieser Niederschlag wird mit kaltem Wasser gewaschen, wobei, sobald die Salzsäure ausgewaschen ist, das Rubian sich zu lösen beginnt; die dann ablaufende gelbe Flüssigkeit wird aufgesammelt, so lange sie noch gefärbt und bitterschmeckend ist, und giebt bei dem Abdampfen *Rubian* als einen durchsichtigen, gelben oder rothbraunen Extract. Was das Wasser nicht löste, besteht aus Rubiacin und den beiden Harzen; es wird, zusammen mit dem (gleichfalls Harz enthaltenden) Rückstand der alkoholischen Lösung, welche mit Thonerdehydrat behandelt worden war, mit einer Lösung von Eisenchlorid oder salpeters. Eisenoxyd gekocht, wo sich Rubiacin auflöst, aber zum großen Theil zu *Rubiäcinsäure* umgeändert wird, welche mit Eisenoxyd verbunden gleichfalls in die Lösung übergeht; außerdem löst sich das Alphaharz, während das Betaharz in Verbindung mit Eisenoxyd als schwarzbraune, flockige Substanz ungelöst bleibt, welche letztere von der Flüssigkeit getrennt und mit Salzsäure zerlegt wird, wo sich das *Betaharz* ausscheidet und nach dem Auflösen in kochendem Alkohol bei dem Erkalten als braunes Pulver absetzt. Die von der Verbindung des Betaharzes mit Eisenoxyd abfiltrirte (tief-rothbraune) Flüssigkeit giebt mit Salzsäure einen hellgelben Niederschlag von Rubiacin, Rubiäcinsäure und Alphaharz, welcher während des Auswaschens mit Wasser braun wird; dieser wird dann, noch feucht, mit kochendem Alkohol behandelt. Es bleibt hierbei *Rubiäcinsäure* ungelöst zurück, welche mit kochendem Alkohol ausgewaschen, und dann mit kohlen. Kali gekocht wird, wo sie eine blutrothe Lösung bildet, die (von etwa zurückgebliebenem Eisenoxyd abfiltrirt) bei dem Erkalten hellrothe, durch Umkrystallisiren

Farbstoffe
der Krapp-
wurzel.

Farbstoffe
der Krapp-
wurzel.

zu reinigende, Krystalle von rubiacins. Kali absetzt. In tief-braungelbe alkoholische Lösung gehen hingegen über Rubiacin und Alphaharz, und aus dieser (heiß filtrirten) Lösung scheidet sich bei dem Erkalten *Rubiacin* pulverförmig in kleinen citrongelben Krystallen ab (das Rubiacin läßt sich kaum durch Umkrystallisiren reinigen; besser behandelt man es wiederholt mit Eisenchlorid u. s. w. wie oben angegeben; ganz rein erhält man es nur durch die unten anzugebende Darstellung aus rubiacins. Kali); es bleiben gelöst Rubiacin und *Alphaharz*, welches letztere rein (als dunkel-rothbraune Masse) erhalten wird, wenn man diese Lösung abdampft, den Rückstand in kochendes Wasser bringt, wo das Alphaharz geschmolzen in dunkelbraunen Tropfen niedersinkt, während das Rubiacin pulverförmig suspendirt bleibt und abgegossen werden kann, und dieses Verfahren wiederholt.

Der Rückstand, welcher bei der Behandlung des dunkelbraunen Niederschlags (S. 768) mit kochendem Alkohol zurückbleibt, ist dunkelpurpurbraun. Kochendes Wasser entzieht ihm (braungefärbte) *Pektinsäure*; es läßt einen dunkelbraunen Rückstand, welcher sich nur in Alkalien (mit dunkelbrauner Farbe) löst, und aus dieser Lösung durch Säuren in dunkelbraunen, bei dem Verbrennen viele Asche zurücklassenden Flocken gefällt wird. Letztere Substanz betrachtet Schunck als die Ursache der braunen Farbe des durch Säuren in dem Krappdecoct entstehenden Niederschlags, als hervorgebracht durch Einwirkung der Luft auf irgend einen in diesem Decoct enthaltenen Bestandtheil, und als identisch mit einem, später zu beschreibenden, durch Einwirkung der Luft auf den Extractivstoff des Krapps entstehenden Körper.

Die Flüssigkeit, von welcher der durch Säure (Oxalsäure) hervorgebrachte dunkelbraune Niederschlag (S. 767) getrennt ist, zeigt (nachdem die Oxalsäure mit Kalk weggenommen ist) eine hellgelbe Farbe; bei dem Abdampfen auf dem Sandbade bräunt sie sich und giebt einen dicken,

nicht trocknenden, dunkelbraunen Syrup, welchen Wasser theilweise mit Hinterlassung eines dunkelbraunen Pulvers löst (die wässrige Lösung verhält sich bei wiederholtem Abdampfen immer gerade so, so daß Schunck die Bildung dieses Pulvers der Einwirkung der Luft auf irgend einen gelösten Stoff zuschreibt). Der Syrup giebt verbrannt eine Asche, deren löslicher Theil neben Spuren von Kalk und Magnesia hauptsächlich Kali mit Kohlensäure, Schwefelsäure und Salzsäure, der unlösliche kohlenst. Kalk, Magnesia, etwas Thonerde, phosphors. Kalk und phosphors. Magnesia enthält. Die wässrige Lösung des braunen Syrups enthält weder Gerbstoff noch Gummi; sie reagirt sauer (wahrscheinlich durch Phosphorsäure). Mit essigs. Bleioxyd giebt sie einen schmutzigen, flockigen Niederschlag; der Niederschlag giebt nach dem Zersetzen mit Schwefelwasserstoff und Verdampfen einen sauren dunkelbraunen Syrup unter Bildung von braunem Pulver; die überstehende Flüssigkeit giebt, mit Schwefelwasserstoff von Bleioxyd befreit und über Schwefelsäure abgedunstet, einen nicht trocknenden, gelben, honigartigen Rückstand, wahrscheinlich Kuhlmann's Xanthin oder Runge's Krappgelb (Zucker konnte aus dieser Flüssigkeit nicht dargestellt werden, aber das Decoct von einer größeren Menge Krapp bildete concentrirt und mit Hefe versetzt doch Alkohol).

Den mit siedendem Wasser vollständig erschöpften Krappwurzeln entzieht siedende Kalilauge braungefärbte Pektinsäure, siedende Salzsäure oxals. Kalk. Bei Behandlung der mit Salzsäure ausgezogenen und mit Wasser ausgewaschenen Krappwurzeln mit Kalilösung erhält man eine dunkelrothe Lösung, welche Alizarin, Pektinsäure, Betaharz und wahrscheinlich auch Rubiacinsäure enthält; Schunck glaubt, daß diese erst durch Behandeln der Wurzel mit Salzsäure und dann mit Kalilauge auszuziehenden Substanzen darin ursprünglich an Kalk und Magnesia gebunden seien. — Was nach der Behandlung der Wurzel mit Wasser,

Farbstoffe
der Krapp-
wurzel.

Salzsäure und Kali zurückbleibt, ist nach Schunck nur noch Holzfaser.

Schunck hat weiter einzelne von ihm in der Krappwurzel gefundene Bestandtheile genauer untersucht.

Alizarin krystallisirt aus der alkoholischen Lösung in langen, durchsichtigen, glänzenden, bräunlichgelben Prismen, $C_{14}H_5O_4 + 3HO$ (vergl. S. 782 bei Lizarinsäure); auf Platinblech erhitzt schmilzt es und brennt dann mit heller Flamme. Schon unter 100° verlieren die Krystalle Wasser (bei 100° $3HO$), und werden undurchsichtig und dunkler roth. Bei 215° beginnt das Alizarin zu sublimiren, aber so vorsichtig man auch die Sublimation leiten mag, bleibt doch immer ein beträchtlicher kohligter Rückstand; das sublimirte Alizarin, $C_{14}H_5O_4$, ist hell orangegelb, durchsichtig und glänzend. Alizarin ist wenig löslich in Wasser (die Lösung in reinem Wasser ist gelb, in Wasser, welches geringe Menge von Alkalien oder Erden enthält, röthlich), löslicher in Alkohol (zu gelber Lösung, aus welcher Wasser kleine Krystalle, Säuren gelbe Flocken fällen), und auch in Aether (mit gelber Farbe). Es löst sich in kaustischen und kohlen. Alkalien mit prächtiger Purpurfarbe, und wird aus diesen Lösungen durch Säuren in tief-orangefarbenen Flocken gefällt. Aus der Lösung des Alizarins in Ammoniak entweicht bei dem Verdunsten alles Ammoniak; diese Lösung giebt mit Chlorbaryum oder Chlorcalcium purpurfarbige, nach dem Trocknen fast schwarze Niederschläge $BaO, HO, C_{14}H_4O_3$ oder $CaO, HO, C_{14}H_4O_3$, welche noch bei 100° das nach diesen Formeln darin enthaltene Wasser nicht verlieren. Thonerde entfärbt die Lösung des Alizarins in Kali unter Bildung einer röthlich-purpurfarbigen, Eisenoxyd unter Bildung einer dunkel-purpurfarbigen Verbindung. Eine alkoholische Lösung von Alizarin giebt mit einer alkoholischen Bleizuckerlösung einen purpurfarbigen, später tief-rothen Niederschlag $PbO, C_{14}H_4O_3$. Schunck ist der Ansicht, nur das Alizarin bewirke bei dem Krappfärben die Färbung (vergl. die Anmerkung S. 777), und Runge's

Krapppurpur und Krapproth seien Gemenge von Alizarin mit wechselnden Mengen der beiden Harze. — Alizarin in Wasser suspendirt wird durch Chlorkalk gelb gefärbt, und giebt dann bei dem Erhitzen ein farbloses Sublimat. Salzsäure verändert es nicht; Schwefelsäure löst es mit dunkelgelbbrauner Farbe und verändert es selbst bei dem Erhitzen nicht (Zusatz von Wasser fällt es aus dieser Lösung in tief-orangefarbenen Flocken). Verdünnte Salpetersäure, salpeters. Eisenoxyd oder Eisenchlorid verwandelt das Alizarin in *Alizarinsäure* (1). Zu ihrer Darstellung erwärmt man Salpetersäure von 1,20 spec. Gew. mit Alizarin oder Garancin (mit heißer Schwefelsäure behandelter und wieder ausgewaschener Krappwurzel) so lange sich rothe Dämpfe entwickeln, und bringt die rothgelbe Flüssigkeit zur Krystallisation, wo Oxalsäure und Alizarinsäure krystallisiren, welche man auswascht, in kochendem Wasser löst, mit Kalk neutralisirt, filtrirt, das Filtrat mit Salzsäure versetzt und zur Krystallisation bringt, aus der entstehenden gelben Masse das Chlorcalcium auswascht, wieder in heißem Wasser löst, die gelbe Lösung mit Thierkohle entfärbt und zur Krystallisation bringt. So erhält man die Alizarinsäure, $C_{14}H_8O_7$, in durchsichtigen, farblosen (sollten sie nicht ganz farblos sein, so kann man sie auch durch Auflösen in siedendem Wasser und Einleiten von Chlorgas reinigen), platten rhombischen Tafeln, deren Lösung sauer reagirt. Die Alizarinsäure löst sich leicht in Alkohol; sie wird durch Chlor nicht zersetzt. Ihre wässerige Lösung giebt mit Eisenchlorid einen gelblichen Niederschlag; mit essigs. Bleioxyd einen weissen in Essigsäure nicht löslichen; mit

(1) Wir geben oben Schunck's Angaben über die Alizarinsäure. Inzwischen hat Gerhardt (in seinen und Laurent's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 220. 222) die Vermuthung ausgesprochen, die Alizarinsäure möge mit Laurent's Phtalsäure ($C_{14}H_8O_4$) identisch sein, und diese Vermuthung durch qualitative Versuche unterstützt. In dem Laboratorium zu Gießen von Strecker ausgeführte Analysen haben gleichfalls die Identität der Alizarinsäure mit der Phtalsäure bewiesen.

Farbstoffe
der Krapp-
wurzel.

salpeters. Silberoxyd keinen Niederschlag, wohl aber auf Zusatz von wenig Ammoniak einen weissen, flockigen, nach einiger Zeit krystallinisch werdenden. Die alizarins. Salze sind meist löslich; das Kalisalz giebt bei dem Abdampfen eine krystallinische Masse; das Kalksalz giebt bei dem Abdampfen glänzende Prismen; das Barytsalz (bei 100° getrocknet wahrscheinlich $2 \text{ BaO}, \text{HO}, \text{C}_{14}\text{H}_4\text{O}_6$) krystallisirt in seidenglänzenden Nadeln; das Silberoxydsalz (enthält wahrscheinlich 2 AgO auf 1 Aeq. Säure) krystallisirt bei dem Erkalten der heiss gesättigten wässerigen Lösung; das Bleioxydsalz ($2 \text{ PbO}, \text{C}_{14}\text{H}_4\text{O}_6$) ist ein weisses unlösliches Pulver. — Bei dem Erhitzen von Alizarinsäure mit Aetzkalk entweicht ein gelbes, dem Benzol ähnlich riechendes Oel, welches nach einiger Zeit krystallinisch erstarrt. — Die Alizarinsäure schmilzt bei dem Erhitzen in einer Glasröhre, und verflüchtigt sich dann vollständig; die sublimirende *Pyro-Alizarinsäure* hat nach Schunck die Zusammensetzung $\text{C}_{28}\text{H}_7\text{O}_{11}$ und ihre Bildung erklärt er durch das Schema $2 \text{ C}_{14}\text{H}_5\text{O}_7 = \text{C}_{28}\text{H}_7\text{O}_{11} + 3 \text{ HO}$ (1); die Reactionen der Pyro-Alizarinsäure stimmen mit denen der Alizarinsäure überein, und durch Auflösen in Wasser und Krystallisiren scheint erstere in letztere übergehen zu können.

Rubiacin, dessen Darstellung schon S. 770 besprochen wurde, wird nur auf die Art ganz rein erhalten, dass man rubiacins. Kali in siedendem Wasser löst, einen kleinen Ueberschuss von Kali zusetzt, längere Zeit Schwefelwasserstoff durch die Lösung leitet, mit Chlorbaryum fällt, und den entstehenden purpurfarbigen Niederschlag (eine Verbindung von Rubiacin mit Baryt) mit Salzsäure zersetzt, wo Rubiacin zurückbleibt. (Runge's Krapporange ist nach Schunck unreines Rubiacin.) Aus kochendem Alkohol umkrystallisirt bildet das Rubiacin schöne glänzende Tafeln und Nadeln, deren Farbe gelb mit mehr grünlichem als

(1) In Phil. Mag. [3] XXXIII (vergl. S. 767), giebt Schunck für die Zusammensetzung der Pyro-Alizarinsäure die Formel $\text{C}_{14}\text{H}_5\text{O}_7$.

rothem Scheine ist. Dem bei 100° getrockneten Rubiacin legt Schunck die Formel $C_{31}H_8O_{10}$ bei. Bei dem Erhitzen schmilzt es; vorsichtig zwischen zwei Uhrgläsern erhitzt sublimirt es vollständig zu gelben Schuppen. Es löst sich wenig in kochendem Wasser; aus der hellgelben alkoholischen Lösung und aus der gelben Lösung in concentrirter Schwefelsäure (selbst bei dem Sieden derselben tritt keine Schwärzung oder Gasentwicklung ein) scheidet Wasser gelbe Flocken. Es löst sich in kochendem kohlens. Kali mit blutrother, in Aetzkali mit Purpurfarbe; die ammoniakalische Lösung giebt mit Chlorbaryum und Chlorcalcium schmutzigrothe Niederschläge. Thonerdehydrat entfärbt eine siedende Lösung von Rubiacin in Alkohol, unter Bildung einer orangefarbenen Verbindung; diese letztere wird von kaustischem Kali leicht mit Purpurfarbe aufgelöst. Auf gebeiztes Zeug wirkt Rubiacin nur in äußerst schwachem Grade färbend (1). In einer kochenden Lösung von Eisenchlorid oder salpeters. Eisenoxyd löst sich das Rubiacin vollständig auf, und es entsteht eine dunkelbraunrothe Flüssigkeit, welche auf Zusatz starker Säuren gelb wird und gelbe Flocken von *Rubiacinsäure* absetzt. Gereinigt wird diese durch Verbindung mit Kali, Lösen des reinen Kalisalzes in siedendem Wasser und Zusatz von Salzsäure, wo die Rubiacinsäure als citrongelbes Pulver niederfällt; sie ist bei 100° getrocknet $C_{31}H_8O_{10}$ (2); sie ist in Wasser und Alkohol nur wenig löslich, und geht durch Auflösen in Alkalien und Behandeln mit Schwefelwasserstoff in Rubiacin über. Rubiacins. Kali ($KO, C_{31}H_7O_{10}$) krystallisirt aus der wässerigen Lösung in hellziegelrothen, auch in Alkohol löslichen Nadeln und Prismen; die wässrige Lösung wird durch Chlorcalcium orangefarben, durch Chlorbaryum, Alaun, salpeters. Silber-

(1) Vergl. die Anmerkung S. 777. — (2) In Phil. Mag. [3] XXXIII, 142 giebt Schunck als die Formel der Rubiacinsäure $C_{31}H_8O_{10}$, ohne zu sagen, bei welcher Temperatur getrocknet ihr diese Zusammensetzung zukomme.

Farbstoffe
der Krapp-
wurzel.

oxyd, Quecksilberoxydul oder Quecksilberoxyd, Zinnchlorür und Zinnchlorid gelb gefällt, durch essigs. Bleioxyd und schwefels. Kupferoxyd roth.

Rubian nennt Schunck den Bitterstoff des Krapps, welcher der einzige von ihm darin gefundene stickstoffhaltige Bestandtheil ist. Die Darstellung wurde S. 769 angegeben; von etwa beigemischter Pektinsäure wird das Rubian gereinigt durch Behandlung mit Alkohol worin es sich auflöst. In dünnen Schichten ist es durchsichtig und gelb, in dickeren Massen dunkelbraun. Seine concentrirte siedende wässerige Lösung gelatinirt bei dem Erkalten. Bei dem Erhitzen schmilzt es und entwickelt gelbe Dämpfe, welche zu Krystallen sich verdichten, die dem Rubiacin ähnlich sind. Die wässerige Lösung wird durch Säuren gelb gefällt, durch Alkalien geröthet, durch Kalk- und Barytwasser roth, durch Eisenchlorid rothbraun, durch essigs. Bleioxyd braun, durch Quecksilberchlorid, Gallustinktur und Leimlösung gar nicht gefällt. Bei dem Kochen mit Kalilauge entwickelt sich Ammoniak. Die wässerige Lösung des Rubians theilt gebeiztem Zeug eine so schwache Färbung mit, daß es nicht als Farbestoff betrachtet werden kann. Bei dem Abdampfen der wässerigen Lösung an der Luft in der Wärme scheidet sich eine dunkelbraune harzartige Substanz ab, welche Aehnlichkeit mit dem Alphaharz hat und bei dem Erhitzen in einer Glasröhre einen reichlichen krystallinischen, gelben, dem Rubiacin ähnlichen Sublimat giebt.

Das *Alphaharz* (S. 770) ist dunkelbraun oder röthlichbraun, in der Kälte spröde, bei 65° weich, gegen 100° zu dunkelbraunen Tropfen schmelzend. Es löst sich wenig in kochendem Wasser; die Lösung in Alkohol ist orangefarben, die in kaustischen und kohlens. Alkalien purpurroth. Die ammoniakalische Lösung wird durch Chlorbaryum und Chlorcalcium purpurfarbig, durch Alaun und salpeters. Silberoxyd schmutziggroth gefällt. Chlorgas entfärbt die alkalische Lösung, und Säuren bringen dann keinen Niederschlag

mehr hervor. Dieses Harz scheint bei dem Färben eher schädlich als nützlich zu wirken, indem es den ungebeizten Stellen des Zeugs, welche weiß bleiben sollen, eine unangenehme gelbe Färbung giebt. Das hellbraune *Betaharz* (S. 769) wird bei 100° nur weich und zusammenhängend, löst sich in siedendem Wasser wenig mit gelber Farbe, in Alkohol mit dunkelgelber, in kaustischen und kohlen-s. Alkalien mit schmutzigrother Farbe, welche durch Chlor zerstört wird; die ammoniakalische Lösung wird durch Chlorbaryum oder Chlorcalcium schmutziggelb gefällt. Auf gebeizte Zeuge wirkt dieses Harz wie das vorhergehende. — Auch das *Xanthin* (S. 771), welches Schunck nicht rein erhielt, wirkt nach ihm schädlich bei dem Färben, so fern seine an der Luft braun gewordene Lösung dem zu färbenden Zeug einen Stich ins Braune mittheilt.

Farbstoffe
der Krapp-
wurzel.

Hinsichtlich des Processes des Krappfärbens und der Nützlichkeit der Anwesenheit einer gewissen Menge Kalk bei demselben glaubt Schunck, daß nur das Alizarin die eigentliche Färbung hervorbringt, und daß der Zusatz einer gewissen Menge Kalk zur Bindung von Pektinsäure, Rubiacin und den Harzen dient, welche sonst sich mit der Thonerde oder dem Eisenoxyd in den Beizmitteln vorzugsweise vereinigen (1). Die größere färbende Kraft des Garancins (S. 773) leitet Schunck davon ab, daß durch die Einwirkung der heißen Schwefelsäure der in der Krappwurzel an Kalk und Magnesia gebundene Theil des Farbstoffs in Freiheit gesetzt und das schädliche Xanthin bei dem Auswaschen entfernt wird.

(1) In Phil. Mag. [3] XXXIII, 143 giebt Schunck im Gegentheil an, es sei nicht das Alizarin allein, welches bei dem Krappfärben wirksam sei, sondern auch das Rubiacin; letzteres färbe gebeizte Zeuge zwar nicht im freien Zustand, wohl aber, wenn ihm zuvor etwas Kalk oder eine alkalische Basis zugesetzt worden sei; bei dem Färben werde zuerst das freie Alizarin, dann die Verbindung von Rubiacin mit Kalk aufgenommen, und letztere erhöhe die Farbe und mache sie dauerhafter gegen die Wirkung von Seife und Säuren.

Farbstoffe
der Krapp-
wurzel.

Higgin (1) theilt nicht die von Schunck ausgesprochene Ansicht, daß unter den in dem Krapp enthaltenen Bestandtheilen nur das Alizarin bei dem Färben wirksam sei; auch dem Rubiacin und dem Xanthin schreibt er eine wesentliche Mitwirkung dabei zu. Higgin verwirft die Methode, zur Untersuchung der im Krapp enthaltenen Bestandtheile denselben mit Wasser zu kochen, da man auf diese Art Zersetzungsproducte erhalte. Er selbst zieht den Krapp in einem Spitzbeutel mit heißem Wasser aus bis dieses nur noch schwach gefärbt abläuft; zu dem erkalteten Auszug setzt er Schwefelsäure, wo ein flockiger Niederschlag entsteht und die überstehende Flüssigkeit gelb gefärbt ist.

Der flockige Niederschlag enthält Rubiacin, Alizarin und etwas Pektin. Higgin mischt ihn mit Kreide und kocht ihn so lange mit Wasser aus, bis dieses nicht mehr dunkel sondern nur noch hellroth gefärbt wird. In dieser wässrigen Lösung ist *Rubiadin* enthalten, welches durch Schwefelsäure grünlichgelb niedergeschlagen und aus Alkohol umkrystallisirt wird. Higgin giebt von dem Rubiacin im Wesentlichen die von Schunck beschriebenen Eigenschaften an; außerdem, daß es sich in kochender Alaunlösung mit Orangefarbe löse und (wenn nicht zugleich viel Alizarin zugegen sei) in der Kälte sich daraus nicht ausscheide, und daß es mit Kalk eine ziemlich lösliche Verbindung gebe. — In Verbindung mit Kalk bleibt ungelöst das *Alizarin*, welches durch verdünnte Salzsäure daraus abgeschieden wird. Auch hinsichtlich dieses Körpers stimmen Higgin's Angaben mit denen Schunck's im Wesentlichen überein; ersterer bemerkt noch, daß das Alizarin sich in heißer Alaunlösung sehr leicht löst, und sich nur wenig daraus bei dem Erkalten ausscheidet.

In der gelben, von dem flockigen Niederschlag getrennten, Flüssigkeit sind Xanthin, wenig Alizarin und

(1) Phil. Mag. [3] XXXIII, 282; J. pr. Chem. XLVI, 1.

Rubiacin, etwas Zucker und Salze organischer und unorganischer Säuren enthalten. Higgin neutralisirt sie mit kohlen. Natron und scheidet durch halbstündige Digestion mit sehr wenig Thonerdehydrat bei etwa 54° das darin noch enthaltene Rubiacin und Alizarin, sodann aus dem Filtrat durch Barytwasser die Phosphor- und Schwefelsäure ab; aus der Flüssigkeit fällt er sodann durch basisch-essigs. Bleioxyd das *Xanthin* als rothen Niederschlag, befreit diesen durch Waschen mit Wasser von gleichfalls gebildeten andern Bleioxydverbindungen und zersetzt ihn durch Schwefelwasserstoff; das Xanthin bleibt dem Schwefelblei adhärirend; nach Auswaschen mit kaltem Wasser wird das Xanthin durch Kochen mit Wasser gelöst, und die Flüssigkeit abgedampft (wenn es nöthig ist mit Baryt neutralisirt), wo dann aus dem Rückstand das Xanthin durch absoluten Alkohol ausgezogen wird. Das so dargestellte Xanthin ist eine dunkelbraune, gummiartige, deliquescirende, rein bitter schmeckende Masse; es löst sich in Wasser mit gelber Farbe, reichlich in Alkohol und wenig in Aether, in Alkalien mit rother Farbe. Charakteristisch für es ist die Eigenschaft, bei dem Kochen seiner wässerigen Lösung mit etwas Schwefel- oder Salzsäure einen grünen pulverförmigen Absatz zu geben; die concentrirte wässerige Lösung färbt sich, wenn stark mit diesen Säuren versetzt, auch in der Kälte langsam grün. Trocknes Xanthin giebt mit concentrirter Schwefelsäure eine orangefarbene Lösung, welche bei dem Erhitzen mehr carmoisinroth wird; Wasser fällt aus dieser Lösung gelbe Flocken, welche Rubiacin zu sein scheinen. Wird die Lösung in Schwefelsäure etwa eine Stunde lang erhitzt, so wird sie braun und Wasser fällt dann ein braunes Pulver, welches sich nicht in Ammoniak löst. Mit Thonerde gebeizte Stoffe färbt das Xanthin gelb.

Der frisch bereitete Auszug aus Krapp mit kaltem Wasser schmeckt zuerst süß und dann bitter, und färbt

Farbstoffe
des Krapp-
wurzel.

weisses Baumwollenzeug tief gelb wie eine Lösung von Xanthin; während wenigen Stunden setzt sich aus dieser Flüssigkeit ein flockiger, orangerother, intensiv färbender Niederschlag ab, und die Flüssigkeit schmeckt nun rein süß und färbt weisses Baumwollenzeug röthlich. Nach Higgin enthält der Auszug des Krapps mit kaltem Wasser Xanthin, welches durch freiwillige Zersetzung zunächst in Rubiacin und dann in Alizarin übergeht. Dieser Uebergang beruht nach ihm nicht auf einer Oxydation, sondern wahrscheinlich auf einer Art Gährung, welche durch einen stickstoffhaltigen Bestandtheil des Krapps eingeleitet werde; bei 49 bis 54° gehe diese Umwandlung schneller vor sich. Werde der Krapp mit siedendem Wasser ausgezogen, so verliere der Auszug selbst nach langer Zeit den bitteren Geschmack und die tiefgelbe Färbung nicht. Bei dem Krappfärbeprocess, wo die Temperatur nur sehr allmählig gesteigert werde, gehe auch diese Bildung von Alizarin aus dem Xanthin vor sich.

Unkrystallisirbaren Zucker konnte Higgin aus dem Krapp auf die Art erhalten, daß er aus der Flüssigkeit, aus welcher das Xanthin gefällt war (S. 799), das Bleioxyd mit verdünnter Schwefelsäure ausschied, die Flüssigkeit abdampfte, und aus dem Rückstand den Zucker durch Alkohol auszog. Die von Schunck gefundenen Harze hält er für Zersetzungsproducte, die sich bei dem Kochen des Krapps mit Wasser gebildet haben. Er glaubt nicht, daß die Farbstoffe im Krapp zum Theil an Kalk gebunden seien, weil man sie durch wiederholtes Kochen mit Alkohol vollständig ausziehen könne. In dem Garancin (S. 773) fand er nur Alizarin, und Nichts von Xanthin, Rubiacin, Pektin oder stickstoffhaltigen Substanzen. Auf der Abwesenheit der letztern Körper beruhen nach ihm die Vorzüge des Garancins bei dem Färben; die größere färbende Kraft dieses Präparats schreibt er mit Schunck der Entfernung der Kalksalze zu.

Debus (1) untersuchte seeländischen Krapp mit folgenden Resultaten. Die durch 3- bis 4maliges Auskochen der Wurzel mit der 15- bis 20fachen Menge Wasser erhaltene Flüssigkeit wurde mit überschüssigem Bleioxydhydrat gekocht, wobei sich ein Theil des Bleioxyds auflöst, ein anderer mit den Farbstoffen in unlösliche Verbindungen geht, und die Flüssigkeit selbst rein gelb gefärbt wird.

Farbstoffe
der Krapp-
wursel.

Der erhaltene Bleioxydniederschlag wurde durch Erwärmen mit verdünnter Schwefelsäure zersetzt; das mit Wasser ausgewaschene Gemenge von schwefels. Bleioxyd und Farbstoffen wurde mit siedendem Alkohol ausgezogen, wo schwefels. Bleioxyd (durch einen dunkelbraunen Körper gefärbt) zurückblieb und Farbstoffe sich lösten. Von letzteren beschreibt Debus nur diejenigen genauer, welche aus dieser Lösung durch geglühtes Zinkoxyd fällbar sind; über die, welche dieses Verhalten nicht zeigen, will er später berichten.

Die alkoholische Lösung wurde mit kleinen Mengen Zinkoxyd so lange geschüttelt, bis dieses sich nicht mehr roth färbte, und die (in der Siedehitze sich besser absetzende) Zinkoxydverbindung mit verdünnter Schwefelsäure zerlegt. Die sich abscheidenden Farbstoffe lösen sich zum Theil in Aether, unter Zurücklassung eines braunen harzartigen Körpers. (Kochender Alkohol entzog diesem letzteren eine braune Substanz, deren Zusammensetzung durch $C_{60}H_{33}O_{10}$ ausdrückbar war.) Die ätherische Lösung wurde durch Zinkoxyd gefällt, wobei ein fettartiger, aber noch verunreinigter, Körper aufgelöst blieb. Diese Zinkoxydverbindung wurde wieder mit Schwefelsäure zerlegt, und die ausgewaschenen Farbstoffe so oft mit starker Alaunlösung ausgekocht, als sich aus dieser bei längerem Stehen noch etwas abschied. Aus den ersten Auskochungen setzte sich eine braunrothe, aus den letzten eine rein gelbe Substanz ab. Aus der gelben Substanz wurde die Thonerde durch Kochen mit verdünnter

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 351.

Farbstoffe
der Krapp-
wurzel.

Salzsäure ausgezogen, und der zurückbleibende Farbstoff durch wiederholtes Umkrystallisiren aus Weingeist dargestellt; Debus nennt ihn *Lizarinsäure*. Die Alaunlösungen, aus welchen sich die rothbraunen oder gelben Niederschläge abgesetzt haben, sind dunkelroth gefärbt durch einen Farbstoff, welcher sich auf Zusatz von etwas Schwefelsäure sehr langsam abscheidet; er wurde mit verdünnter Salzsäure ausgekocht, mit Wasser gewaschen und aus Alkohol umkrystallisirt; Debus nennt ihn *Oxylizarinsäure*.

Die gelbe Flüssigkeit, welche nach dem Behandeln des wässerigen Decocts mit Bleioxydhydrat blieb, gab bis zu Saftconsistenz verdunstet und mit Alkohol vermischt einen reichlichen grauen Niederschlag, welcher vielen Farbstoff und das Bleisalz einer (von Farbstoff hartnäckig begleiteten, essigs. Bleioxyd fallenden) Säure enthält. Von dem Alkohol wurden aufgenommen Zucker und ein gelber Körper (seine Zusammensetzung, so weit er rein erhalten werden konnte, war ausdrückbar durch $C_{30}H_{14}O_{11}$), dessen Auflösung in Salzsäure sich bei dem Kochen grün färbte und dunkelgrüne, in Wasser und Weingeist unlösliche Flocken absetzte, die durch Kali roth und durch Säuren wieder grün gefärbt wurden. — In dem wässerigen Auszug der Wurzel wurde viel schwefels. Kalk, sodann schwefels. Kali, phosphors. Kalk, Chlorkalium, Kieselerde und Thonerde gefunden.

Lizarinsäure (1) krystallisirt aus der langsam verdunstenden alkoholischen Lösung in grossen morgenrothen Nadeln, welche leicht in Aether und Alkohol, leichter in heissem Wasser als in kaltem, schwer in siedender Alaunlösung löslich sind; sie löst sich in concentrirter Schwefelsäure mit blutrother Farbe und wird durch Wasser wieder unverändert gefällt. Bei dem Erhitzen schmilzt sie und sublimirt zu rothgelben Nadeln. Bei 120° getrocknet ist

(1) Die Redaction der Ann. Ch. Pharm. hält (in einem Zusatz zu dieser Abhandlung) Debus' Lizarinsäure und Schunck's Alizarin (S. 772) für identisch.

sie $C_{30}H_{10}O_6$. Ihre Salze sind roth oder violett, und bis auf das Kali-, Natron- und Ammoniaksalz in Wasser und Weingeist unlöslich. Etwas überschüssige alkoholische, mit Essigsäure schwach angesäuerte Lösung von Lizarinsäure giebt mit alkoholischer Lösung von essigs. Bleioxyd einen reichlichen schön violetten, in Wasser unlöslichen, in einem Ueberschuß von Essigsäure oder Kali löslichen Niederschlag (bei 120° getrocknet $2 PbO, C_{30}H_{10}O_7$).

Farbstoffe
der Krapp-
wurzel.

Oxylizarinsäure unterscheidet sich von der vorhergehenden durch ihre Leichtlöslichkeit in Alaunlösung; sie löst sich schwer in kaltem Wasser, leichter in siedendem, leicht in Aether, Alkohol und Alkalien; ohne Veränderung in rauchender, selbst erwärmter, Schwefelsäure. Die Oxylizarinsäure (bei 120° getrocknet) ist $C_{15}H_5O_3$. Ihre Salze verhalten sich wie die der Lizarinsäure; das oxylizarins. Bleioxyd, wie das lizarins. dargestellt und bei 120° getrocknet, ist $PbO, C_{15}H_4O_4$. — Künstliche Umwandlung von Lizarinsäure in Oxylizarinsäure gelang nicht.

Auch Debus erklärt die gröfsere färbende Kraft der mit Schwefelsäure behandelten Krappwurzel, dafs dadurch ein Theil des Farbstoffs löslich gemacht werde. — Kuhlmann's Angabe, dafs im wässerigen Krappextract Aepfelsäure enthalten sei, fand Debus nicht bestätigt.

Den in dem Sandelholz enthaltenen rothen harzartigen Farbstoff, Santalin, hatte Pelletier (1) untersucht und für ihn die Formel $C_{16}H_8O_3$ aufgestellt. Preisser (vgl. S. 745) hatte auch für ihn angegeben, dafs er sich farblos erhalten lasse, was Bolley (2) widerlegt hat. Dieser fand in dem aus dem weingeistigen Extract einer helleren Sorte Sandelholz durch Wasser gefällten Körper 67,2 pC. Kohlenstoff und 5,7 bis 6,0 Wasserstoff; in dem aus dunklerem Sandelholz ebenso bereiteten 65,3 bis 66,2 Kohlenstoff und 5,4 bis 5,6 Wasserstoff; in dem aus dem helleren Holz durch Ausziehen des Holzes mit verdünnter Kalilauge, Füllen mit

Farbstoffe
im
Sandelholz.

(1) Ann. ch. phys. [2] LI, 193. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXII, 150; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 650; J. pr. Chem. XLIII, 510.

Farbstoffe
im
Sandelholz.

Salzsäure, Lösen des Niederschlags in Weingeist und Fällern mit Wasser erhaltenen Körper 64,3 bis 64,7 Kohlenstoff und 4,9 bis 5,3 Wasserstoff. Er ist der Ansicht, in der dunklen Sorte sei ein höher oxydierter Farbstoff enthalten, und bei der Behandlung mit Kali sei gleichfalls Oxydation eingetreten. Die weingeistige Lösung des Farbstoffs gab mit weingeistiger Lösung von einfach-essigs. Bleioxyd Niederschläge von wechselndem Bleioxydgehalt; in einer solchen Verbindung, welche 31,8 pC. Bleioxyd enthielt, wurden für den damit verbundenen Farbstoff 62,8 pC. Kohlenstoff und 4,7 Wasserstoff gefunden. Die verschiedenen zusammengesetzten Körper scheinen in der Beziehung zu einander zu stehen, daß in denjenigen, welche ärmer an Kohlenstoff sind, an die Stelle von Wasserstoff eine äquivalente Menge Sauerstoff getreten ist. Pelletier's Angabe, daß der Farbstoff in seiner Lösung in Aether auf letztern verändernd einzuwirken scheine, fand Bolley nicht bestätigt.

L. Meier (1) hat eine Untersuchung des Sandelholzes veröffentlicht, in welcher er Folgendes als die von ihm gefundenen Resultate angiebt. Der hauptsächlichste rothe Farbstoff im Sandelholz sei eine harzartige Säure, *Santal-säure*; außerdem sei noch darin enthalten *Santaloxyd*, und weiter *Santalid*, *Santaloid*, *Santalidid* und *Santaloidid*, welche letztere alle indifferente Stoffe seien. — *Santalsäure* werde erhalten durch Ausziehen von Sandelholz mit Aether oder Weingeist, Verdampfen, Auskochen des Rückstandes mit Wasser, Auflösen in Weingeist, Fällern mittelst einer weingeistigen Lösung von einfach-essigs. Bleioxyd, Auskochen des Niederschlags mit Weingeist, Zersetzen desselben durch Uebergießen mit etwas Weingeist, Zusatz von verdünnter Schwefelsäure und Erwärmen, und Abdampfen der entstehenden blutrothen Lösung. Die Santalsäure besitze eine schöne rothe Farbe, löse sich in jedem Verhältniß in wasserfreiem Alkohol, weniger in wasserhaltigem, zu blutrother,

(1) Arch. Pharm. [2] LV, 285; LVI, 41; im Ausz. Pharm. Centr. 1849, 97; Chem. Gaz. 1849, 130.

Lackmus deutlich röthender Lösung, in Aether zu gelber, das Lackmus nicht röthender Lösung; aus den Lösungen krystallisire sie in mikroskopischen Prismen; die alkoholische Lösung werde durch Wasser getrübt, durch Alkalien violett gefärbt. In Wasser sei die Säure unlöslich, in warmer Essigsäure leicht löslich; sie schmelze bei 104° und hinterlasse nach dem Verbrennen kohlen- und schwefels. Kalk als Asche. In kalter concentrirter Schwefelsäure löse sich die Santalsäure, und werde durch Wasser unverändert wieder abgeschieden; nach dem Erhitzen der schwefels. Lösung fälle Wasser eine schwarze amorphe Masse, welche neben unveränderter Santalsäure eine schwarze, in Alkohol und Aether unlösliche Substanz enthalte. Die Santalsäure neutralisire die Alkalien vollständig. Das Kali- und das Natronsalz seien amorphe violette, in Wasser lösliche Substanzen; das Ammoniaksalz verliere bei dem Abdampfen allen Ammoniakgehalt; die Salze der Erden und schweren Metalloxyde seien meistens violette pulverförmige Niederschläge, unter welchen nur das Baryt- und das Kalksalz in Wasser löslich seien; das Silberoxydsalz sei braun. — Zur Bereitung des *Santaloxys* soll die weingeistige Flüssigkeit, aus welcher (wie oben angegeben) die Santalsäure durch essigs. Bleioxyd gefällt worden, abgedampft, der violette Rückstand mit siedendem Weingeist ausgezogen (wo santals. Bleioxyd zurückbleibe), die gelbe Lösung durch Schwefelwasserstoff von Blei befreit und abgedampft, der entstehende rothgelbe Rückstand mit Wasser ausgekocht, in Weingeist gelöst, mit etwas Kali versetzt (wo die gelbe Farbe in die braune übergehe), abgedampft und mit Wasser ausgekocht werden. So erhalte man das Santaloxyd als eine braune amorphe Masse, welche in Alkohol leicht mit brauner Farbe, in siedendem Aether nur wenig, in Wasser gar nicht löslich sei. Alkalien und Salze verändern die Lösung nicht. Säuren verändern die braune Farbe sogleich zu rothgelb, und durch Abdampfen erhalte man dann rothgelbe Rückstände, in welchen, nachdem die freie Säure durch

Farbstoffe
im
Sandelholz.

Farbstoffe
im
Sandelholz.

Wasser ausgewaschen sei, chemisch gebundene Säure sich nachweisen lasse; die Verbindung mit Salpetersäure schiefse in kleinen körnigen Krystallen an, die mit Wein-, Oxal- oder Salzsäure krystallisire nicht; diese Verbindungen seien alle in Aether und Alkohol löslich, in Wasser unlöslich; aus ihnen fälle Kali oder Natron braunes Santaloxyd. *Santalid* werde aus dem wässerigen Decoct des Sandelholzes durch Fällen mit essigs. Bleioxyd, Auswaschen des rothbraunen Niederschlags mit kaltem Wasser, Anrühren desselben mit Weingeist und Zersetzen mit Schwefelwasserstoff, Abdampfen der rothbraunen Flüssigkeit, Ausziehen des Rückstands mit Aether und Auswaschen mit Wasser (welches Santalidid aufnehme) erhalten, wo es als dunkelrothe amorphe Masse zurückbleibe; es löse sich nicht in Wasser, aber in Aether und Alkohol mit rother Farbe, und seine Lösung gebe mit einfach-essigs. Bleioxyd einen chocoladefarbenen Niederschlag; die Farbe der Lösung werde nicht durch Säuren, durch ätzende Alkalien hingegen von roth zu braun verändert. — Die, wie eben angegeben zu erhaltende, wässrige Lösung des *Santalidids* sei zur Reinigung mit einfach-essigs. Bleioxyd zu fällen und der Niederschlag mit Schwefelwasserstoff zu zersetzen; durch Abdampfen erhalte man das Santalidid als eine braune amorphe Masse, die in Aether und Weingeist unlöslich, in Wasser leicht mit brauner Farbe löslich sei. — Werde das wässrige Decoct des Sandelholzes mit kohlen. Bleioxyd gekocht, die gelbe Flüssigkeit abgedampft und mit Weingeist behandelt, die entstehende gelbe Lösung abgedampft und der Rückstand mit absolutem Alkohol ausgezogen, die letztere Lösung wiederum abgedampft und der gelbe Rückstand mit kaltem Wasser behandelt, so löse dieses *Santaloid* und lasse *Santaloidid* zurück; das Santaloid sei eine in Aether unlösliche gelbe, das Santaloidid eine weiche dunkelbraune amorphe Masse; letzteres sei schmelzbar, ersteres nicht. — Außer den genannten Substanzen sei in dem Sandelholz auch Gummi und Gallussäure enthalten; in der Asche Chlor-

calcium, schwefels. Kalk, Chlorkalium, kohlen. Kali, phosphors. Magnesia, Thonerde, Eisenoxyd und Kieselerde.

Fritzsche (1) hat Mittheilungen gemacht über die Harmalaroth. Umwandlung der Samen von *Peganum Harmala* in einen rothen Farbstoff. Werden die gepulverten Samen in einem verschlossenen Gefäß mit Alkohol stark angefeuchtet sich selbst überlassen, so nehmen sie in Zeit von 8 Tagen eine dunkelrothe Farbe an, welche durch weiteren Zusatz neuer Mengen von Alkohol noch schöner, lebhafter und reiner wird; der Geruch nach Alkohol verschwindet in dem Maße, als der rothe Farbstoff sich bildet, aber eine Absorption von Sauerstoff findet dabei nicht statt. Der Farbstoff wird aus seinen Auflösungen in Säuren als ein purpurrother, flockiger, fast gallertartiger, in Wasser wenig löslicher Niederschlag ausgeschieden; getrocknet ist er undurchsichtig, dunkelfarbig und grünlich schillernd, und nochmals aufgelöst wird er jetzt gelbroth niedergeschlagen.

Versuche über den Farbstoff in den rothen Blättern Farbstoffe
verschiedener
Pflanzen. von *Vitis hederacea* (*Hedera quinquefolia*), in den grünen Blättern von *Vitis vinifera* und in den Dahliablumen hat, als Vorläufer einer ausführlicheren Untersuchung, Legrip (2) veröffentlicht. — Ueber die rothe Färbung der Blätter im Herbst im Allgemeinen und den Farbstoff in den rothen Blättern von *Vitis hederacea* insbesondere hat auch Wittstein (3) den Anfang einer Untersuchung mitgetheilt, welche er fortzusetzen gedenkt. Wir werden über diese Untersuchungen, wenn sie abgeschlossen sind, berichten.

Die Reactionen des Farbstoffs in einer neuen Kartoffelart (4) und des in den Beeren von *Ligustrum vulgare* (5) enthaltenen hat Reinsch untersucht; in der Rinde dieses Strauchs fand er auch einen krystallinischen Bitterstoff.

(1) Petersb. Acad. Bull. VI, 300; J. pr. Chem. XLIII, 155; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 74. — (2) J. chim. méd. [3] III, 188. Malapert's Reclamationen, auf Grund einer gleichfalls noch unvollendeten Untersuchung, J. chim. méd. [3] III, 237. — (3) Repert. Pharm. [2] XLVI, 317; Pharm. Centr. 1847, 791. — (4) Jahrb. pr. Pharm. XIV, 100; Pharm. Centr. 1847, 718. — (5) Jahrb. pr. Pharm. XVI, 389.

Farbstoffe
verschiedener
Pflanzen.

Braconnot (1) ist der Ansicht, daß der in den Kürbis, den Spargelbeeren, dem Bitterstüß und den Mören enthaltene Farbstoff mit dem Orlean (welches bisher nur in *Bixa Orellana* gefunden wurde) identisch oder doch ihm sehr ähnlich sei.

Ueber vegetabilische Farbstoffe vergl. auch bei Pflanzenchemie.

Farbstoff
der
Cochenille.

Mit der chemischen Untersuchung der Cochenille (*Coccus Cacti*) haben sich zuerst John, dann 1818 Pelletier und Caventou, 1832 Pelletier allein, in neuerer Zeit Preisser und Arppe beschäftigt. Von den durch diese Chemiker gewonnenen Resultaten ist hier nur hervorzuheben, daß Pelletier und Caventou den darin enthaltenen und von ihnen als *Carmin* bezeichneten Farbstoff am genauesten characterisirten, obwohl sie ihn weder völlig rein erhielten, noch seine Zusammensetzung richtig ermittelten. Preisser's Angaben, wonach der Cochenillefarbstoff ein Analogon des Indigo's sein sollte, sind von Arppe (2) wiederholt und eben so wenig bestätigt gefunden worden, als die Mittheilungen desselben Chemikers über eine Reihe anderer Farbstoffe (vergl. S. 745). Auch Arppe erfreute sich bei der Darstellung des reinen Cochenillefarbstoffs keines günstigen Erfolgs.

Warren de la Rue (3) hat diesen schwierigen Gegenstand mit größerem Glück wieder aufgenommen; seiner Abhandlung, dem Resultate zahlreicher und mit Aufwand von bedeutenden Mengen von Material angestellten Versuchen, entnehmen wir die nachstehenden Angaben.

Warren de la Rue hatte Gelegenheit, das lebende Insect mikroskopisch zu untersuchen. Es ist in der Regel mit einem weißen Staube bedeckt, der auch auf den nächstliegenden Theilen des Cactusblattes, auf dem es sich

(1) Ann. ch. phys. [8] XX, 357; J. pr. Chem. XLI, 471; Pharm. Centr. 1847, 612. — (2) Ann. Ch. Pharm. LV, 101. — (3) Chem. Soc. Mem. III, 454; Phil. Mag. [8] XXXI, 471; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 1; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 81; J. pharm. [8] XIII, 386.

det, bemerkbar ist Dieser Staub, den Warren de la Rue das Excrement des Thieres hält, erscheint unter dem Microscope als weisse, gekrümmte Cylinder, von sehr ungleichmässigem Durchmesser. Entfernt man ihn mittelst Aether und macht nun einen Einschnitt in das Insect, so lässt eine purpurrothe Flüssigkeit aus, welche den Farbstoff höchst kleinen Kernchen enthält, die um einen gröfseren farblosen Kern herumliegen. Diese Gruppen schwimmen in farbloser Flüssigkeit, was zu beweisen scheint, dafs der Farbstoff, welches auch seine Function sein mag, eine bestimmte und wahrnehmbare Form hat und keineswegs nur die Farbe den flüssigen Theil des Insects durchzieht.

Farbstoff
der
Cochenille.

Den Farbstoff der Cochenille, welchen Warren de la Rue *Carminsäure* nennt, gewinnt man am besten in folgender Weise rein. Die zerriebene Cochenille wird mit dem gleichen Gewicht Wasser etwa 20 Minuten lang gekocht, die colirte Decoct nach viertelstündigem Stehen decantirt und mit einer Bleizuckerlösung gefällt, die mit Essigsäure (auf 6 Salz 1 Säure) angesäuert ist. Den ausgewaschenen Niederschlag zerlegt man mit Schwefelwasserstoff, fällt von neuem mit angesäuerter Bleizuckerlösung, und wiederholt die Zersetzung des Niederschlags. Die so erhaltene Carminsäurelösung wird zur Trockne verdampft, in siedendem absolutem Alkohol gelöst, mit einer Portion zurückbehaltenen carmins. Bleioxyds (zur Entfernung von Phosphorsäure) digerirt, und endlich mit Aether vermischt, um eine kleine Menge stickstoffhaltiger Substanz zu fällen. Das Filtrat liefert beim Abdampfen reine Carminsäure. — Sie bildet eine purpurbraune, unter dem Mikroskop durchscheinende, nach dem Zerreiben schön rothe Masse dar, die sich in Wasser und Alkohol nach allen Verhältnissen, in Aether nur wenig löst. Ueber 136° zersetzt sie sich. Die wässrige Lösung reagirt schwach sauer und verändert sich nicht an der Luft; Alkalien ändern ihre Farbe in purpuroth, in der alkoholischen Lösung erzeugen sie purpurrothe Niederschläge; alkalische Erden werden ebenfalls


Farbstoff
der
Cochonille.

purpurfarbig gefärbt. Alaun giebt erst auf Zusatz von etwas Ammoniak einen prachtvoll carminrothen Lack. Essigs. Blei-, Kupfer-, Zink- und Silberoxyd geben purpurrothe Niederschläge; der mit letzterem Salz zersetzt sich sehr leicht unter Reduction von Silber. Zinnchlorid und Zinnchlorür erzeugen eine tief carminrothe Färbung. Die Analyse der Carminsäure führte zu der Formel $C_{28}H_{14}O_{16}$; zur Atomgewichtsbestimmung war nur die Kupferoxydverbindung mit einiger Sicherheit verwendbar, da die übrigen Salze kein befriedigendes Ergebniss lieferten. Das Kupferoxydsalz wurde durch Fällung einer wässrigen essigsäurehaltigen Carminsäurelösung mit essigs. Kupferoxyd mit der Vorsicht dargestellt, dass viel Carminsäure in Lösung blieb. Es ist getrocknet eine bronzefarbige harte Masse; die Analyse führte zu der Formel $C_{28}H_{14}O_{16}, CuO$.

Trägt man nach und nach 1 Th. Carminsäure in 6 bis 7 Th. Salpetersäure von 1,4 spec. Gew. ein und erhitzt, wenn sich keine salpetrige Säure mehr entwickelt, die Flüssigkeit einige Stunden lang, so erstarrt sie nach dem Verdampfen des Säureüberschusses zu einer Krystallmasse, die, neben Oxalsäure, eine neue, von Warren de la Rue *Nitrococcussäure* genannte Säure enthält. Man trennt sie von der Oxalsäure, indem man die heisse Lösung mit salpeters. Bleioxyd füllt und die vom oxals. Bleioxyd abfiltrirte Flüssigkeit verdampft, wo die Nitrococcussäure zuletzt in gelben rhombischen Prismen anschießt. Durch Umkrystallisiren wird sie rein. Sie ist löslich in Wasser, Alkohol und Aether; die Lösungen färben die Haut gelb. Sie löst Eisen und Zink auf und zersetzt sich mit Schwefelammonium unter Bildung einer nicht weiter untersuchten Säure. Die Salze der Nitrococcussäure sind sämmtlich löslich in Wasser und detoniren beim Erhitzen. Die Analyse der bei 100° getrockneten Säure führte zu der Formel $C_{16}H_8N_2O_{11}$. Aus Wasser krystallisirt enthält sie 2 At. Krystallwasser. — Die Nitrococcussäure ist zweibasisch; Salze mit 1 At. Metall-

oxyd konnten nicht hervorgebracht werden. Warren de la Rue hat folgende untersucht :

Farbstoff
der
Cochenille.



Behandelt man Silberoxyd mit heißer wässriger Nitrococcussäure, so tritt unter Kohlensäureentwicklung Zersetzung ein, und die Flüssigkeit enthält eine neue, in Nadeln krystallisirbare, nicht weiter untersuchte Säure. — Die Nitrococcussäure steht der Styphnin- und Pikrinsäure in ihrem Verhalten sehr nahe.

Aus der durch Schwefelwasserstoff von dem Bleioxyd-überschuß befreiten Mutterlauge der Carminsäure setzte sich beim Concentriren ein krystallinischer Körper ab, der nach dem Waschen mit kaltem und wiederholtem Umkrystallisiren aus heißem Wasser, unter Zusatz von Thierkohle, in seidenglänzenden Krystallen erhalten wurde. Dieser Körper hat nach Warren de la Rue so große Aehnlichkeit mit dem von Liebig durch Schmelzen von Kali mit Casein erhaltenen Tyrosin, daß er beide für identisch zu halten geneigt ist. Liebig giebt für das Tyrosin die Formel $\text{C}_{16}\text{H}_9\text{NO}_6$; sie verlangt 60,4 pC. Kohlenstoff und 5,6 pC. Wasserstoff. Warren de la Rue fand dagegen für den erwähnten Körper die (durch keine Atomgewichtsbestimmung unterstützte) Formel $\text{C}_{16}\text{H}_{11}\text{NO}_6$; diese verlangt 59,7 pC. Kohlenstoff, 6,1 Wasserstoff, 7,7 Stickstoff, gefunden wurden im Mittel 59,4, 6,3, 7,7. Es muß weiteren Untersuchungen über beide Körper anheimgestellt werden, ob sie in der That identisch sind; vorläufig erlaubt die Differenz von 1 pC. im Kohlenstoff- und 0,6 pC. im Wasserstoffgehalte noch nicht diese Annahme. Die Cochenille enthält, wie sich Warren de la Rue überzeugte, diesen Körper fertig gebildet. Er löst sich in Alkalien und Säuren, ohne sich damit zu verbinden; Salpetersäure zerlegt ihn leicht unter Bildung neuer Producte.

Vergleichende Versuche über das Färbevermögen von in Algier gezogener Cochenille mit der mexikanischen hat Chevreul (1) angestellt.

Zucker,
Stärke,
Holsäure,
Pektin und
Ähnliches:
Zucker.

Dubrunfaut (2) hat über die Umwandlung, welche der Rohrzucker bei der Gährung erleidet und durch welche er vor der Bildung von Alkohol und Kohlensäure zu einer dem Traubenzucker ähnlichen Zuckerart umgeändert wird, Versuche angestellt, als deren Resultate er selbst folgende Sätze hervorhebt. Der umgewandelte Zucker, so wie auch der analoge Trauben- oder Fruchtsyrup, sei nicht eine chemisch-einfache Zuckerart; er werde nicht durch Krystallisation zu Traubenzucker (*Glucose*), sondern hierbei scheide sich nur eine gewisse Menge Traubenzucker aus, und das Vermögen der rückständigen Flüssigkeit, die Polarisationssebene nach links zu drehen, werde dabei um ebensoviel vermehrt, als das in entgegengesetztem Sinn wirkende Drehungsvermögen des Traubenzuckers betrage. Man könne auf verschiedene Art aus dem umgewandelten Zucker eine unkrystallisirbare Zuckerart erhalten, welcher unter andern Eigenschaften auch die zukomme, daß ihr Drehungsvermögen nach links bei 14° das Dreifache von dem des umgewandelten Zuckers bei derselben Temperatur sei. Auch die Erscheinungen bei der Alkoholgährung des umgewandelten Zuckers beweisen, daß derselbe keine chemisch-einfache Zuckerart sei, sofern der dabei zuerst verschwindende Zucker optisch-neutral, der zuletzt verschwindende hingegen der eben hervorgehobene unkrystallisirbare, das starke Drehungsvermögen nach links besitzende, Zucker sei. Auch bei der Milchgährung zeige sich dies, nur werde hier zuerst der in dem umgewandelten

(1) Compt. rend. XXVI, 375; Pharm. Centr. 1848, 361. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXI, 169; J pr. Chem. XLII, 418; im Auss. Pharm. Centr. 1847, 889.

Zucker enthaltene Traubenzucker zersetzt. Bei der Gäh- Zucker.
rung bloßer Gemenge verschiedener Zuckerarten werde
aber zu keiner Zeit eine Zuckerart vorzugsweise vor der
andern zersetzt.

Dubrunfaut (1) hat ferner angegeben, daß die aus
Stärkmehl durch die Einwirkung von Malz entstehende
Zuckerart keineswegs mit dem Traubenzucker identisch
sei. Der krystallinische Habitus sei zwar bei beiden der-
selbe, aber erstere sei etwas weniger löslich in Alkohol
als letzterer, und weniger veränderlich bei dem Kochen
mit Wasser und der Einwirkung der Alkalien; das optische
Drehungsvermögen der ersteren sei dreimal so groß als
das des letzteren, und verändere sich nicht bei längerem
Stehen der Lösung. Die erstere Zuckerart verwandle sich
bei hinlänglichem Kochen mit verdünnter Schwefelsäure
in Traubenzucker; sie bilde sich zuerst bei der Einwirkung
der Säuren auf Stärkmehl und zuletzt bei der Einwirkung
stickstoffhaltiger Substanzen auf dasselbe. Die optischen
Drehungsvermögen solcher Quantitäten von längere Zeit in
Auflösung erhaltenem Traubenzucker, von frisch aufgelöstem
Traubenzucker, von der eben besprochenen Zuckerart und
von Dextrin, welche bei der Gährung gleich viel Alkohol
geben, verhalten sich wie 1 : 2 : 3 : 4.

Ruspini (2) giebt für die Darstellung des Mannits Mannit.
folgende Vorschrift. Man löst Manna (vortheilhaft eine
der geringeren Sorten) in ihrem halben Gewicht Regen-
wasser, klärt mit Eiweiß, colirt siedendheiß durch einen
wollenen Spitzbeutel, verwandelt die bei dem Erkalten
entstehende krystallinische Masse in einen Brei, läßt
abtropfen, und presst aus; die ablaufende Flüssigkeit wird
eingedampft und eben so behandelt. Die erhaltenen Press-
kuchen von Mannit reinigt man durch Anrühren mit kaltem

(1) Ann. ch. phys. [3] XXI, 178; J. pr. Chem. XLII, 425; im
Ausz. Compt. rend. XXV, 308; Pharm. Centr. 1848, 10. — (2) Aus
dessen Manuale eclettico dei rimedi nuovi, Bergamo 1846, in Ann. Ch.
Pharm. LXV, 203.

Mannit. Regenwasser zum dicken Brei, Ablaufenlassen der Flüssigkeit und Auspressen, Lösen des rückständigen Mannits in der 6- bis 7fachen Menge heißen Wassers, Behandeln mit Thierkohle und heiß Filtriren, Eindampfen und Krystallisirenlassen des Filtrats.

Reinsch (1) fand Mannit in reichlicher Menge in s. g. Honigthau auf Lindenblättern, in 100 Theilen dieser Flüssigkeit 53,5 Mannit, 16,0 Traubenzucker, 9,2 Gummi, 3,4 kleberartige Substanz, 0,6 gelblichen Extractivstoff, 15,0 Wasser, 1,0 unlösliche Bestandtheile (Verlust 1,3).

Stärkmehl. Den Stärkmehlgehalt mehrerer in Britisch - Guiana wachsenden Pflanzen hat Shier (2) bestimmt; Beobachtungen über die Einwirkung von Aetzkali auf verschiedene Stärkmehlsorten (um durch die Consistenz, Farbe, Durchsichtigkeit u. s. w. der entstehenden Masse die Stärkmehlsorte unterscheiden zu lassen) hat Mayet (3) mitgetheilt.

Ueber Flechtenstärke vergl. bei *Cetraria islandica*.

Amidulin. Als Amidulin bezeichnet F. Schulze (4) eine Modification des Stärkmehls, welche den Uebergang von dem eigentlichen Stärkmehl zu dem Inulin oder dem Dextrin vermittele; es zeichne sich dadurch aus, daß es in heißem Wasser leicht und vollständig löslich sei, und werde dadurch dargestellt, daß man eine Mischung von Schwefelsäure, Wasser und Stärkmehl koche, aber das Kochen sogleich nach erfolgter Auflösung des Stärkmehls unterbreche und die Säure noch heiß mit kohlens. Kalk neutralisire, wo sich das Amidulin nach einiger Zeit in Flocken abscheide. Seine Zusammensetzung wurde übereinstimmend mit der des Stärkmehls gefunden.

Inulin. Bouchardat (5) hat über das Inulin Folgendes mitgetheilt. Es drehe die Polarisationssebene nach links; unter dem Einfluß verdünnter Säuren werde die Drehung in

(1) Jahrb. pr. Pharm. XIV, 153. — (2) J. Pharm. Trans. VII, 590; Pharm. Centr. 1848, 495. — (3) J. pharm. [8] XI, 81; Pharm. Centr. 1847, 893. — (4) J. pr. Chem. XLIV, 178; Pharm. Centr. 1849, 29. — (5) Compt. rend. XXV, 274; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 789.

demselben Sinne stärker. Verdünnte Säuren verwandeln sowohl in der Kälte als in der Wärme das Inulin (ohne Entwicklung oder Absorption eines Gases) in eine neue Zuckerart, welche die Polarisationssebene wenigstens dreimal so stark nach links drehe als der (durch Fermente?) umgewandelte Rohrzucker; das Rotationsvermögen dieser Zuckerart nehme bei zunehmender Temperatur ab, aber nach einem andern Gesetz, als bei dem Rohrzucker. Ungewaschene Bierhefe versetze das Inulin in Gährung, gewaschene nicht, weil letzterer die Säure fehle, die zur Umwandlung des Inulins in Zucker nothwendig sei. Diastase verändere das Rotationsvermögen des Inulins nicht. Der Saft der Dahliaknollen enthalte nahe 12 pC. Inulin, welches auch bei Luftabschlufs sich in unlöslicheres Inulin verwandle; reines Wasser löse in der Kälte kaum 2 pC. Inulin.

Inulin.

Riegel (1) fand in dem Niederschlag, welchen die Lösung des arabischen Gummis mit basischem essig. Bleioxyd giebt, 37,9 bis 38,1 pC. Bleioxyd, Mulder's Angabe über die Zusammensetzung dieser Verbindung (PbO , $\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{O}_{10}$) ziemlich entsprechend, aber nicht dem von Péligot dafür gefundenen Resultate (2PbO , $\text{C}_{12}\text{H}_9\text{O}_9$).

Gummi.

Poumarède und Figuier (2) haben die Holzfaser verschiedener Pflanzen untersucht. Sie zertheilten das Holz mittelst einer Korkfeile in dünne Fasern, liefsen diese während 24 Stunden mit Seifensiederlauge in Berührung, wuschen sie mit Wasser, dann mit verdünnter Salzsäure und dann wieder mit Wasser, brachten sie dann mit vieler Kochsalzlösung während einiger Tage zusammen, und wuschen sie dann mit schwacher Kalilauge, mit verdünnter Salzsäure, mit Wasser, und nach dem Trocknen mit Alkohol und Aether. Als ein Kennzeichen der Reinheit der Holzfaser betrachten sie, dafs sie durch concentrirte Schwefelsäure nicht geschwärzt wird. Die so dargestellte,

Holzfaser.

Holzfaser. bei 120° getrocknete, Holzfaser verschiedenen Ursprungs fanden sie zusammengesetzt:

	Pappel.			Buche.		Filtrirpapier.		Bambus- rinde.	Baumwolle.		Flachs.	
Kohlenst.	43,53	45,79	44,32	43,85	43,87	43,84	43,61	43,46	43,10	43,92	43,33	
Wasserst.	6,25	6,36	6,08	6,22	6,12	6,22	6,11	6,38	6,43	6,01	6,41	
Sauerst.	50,22	49,85	49,60	49,93	50,01	49,94	50,28	50,16	50,45	50,07	50,26	

Wird die Holzfaser während höchstens $\frac{1}{4}$ Minute in concentrirte Schwefelsäure getaucht, dann mit vielem Wasser gewaschen, dann während einiger Augenblicke in Wasser getaucht, dem einige Tropfen Ammoniak zugesetzt sind, so entsteht eine membranartige Substanz, welche Poumarède und Figuier als *Papyrin* bezeichnen, und für welche sie gleiche Zusammensetzung wie für die Holzfaser fanden (43,3 bis 44,4 Kohlenstoff, 6,2 bis 6,3 Wasserstoff und 49,3 bis 50,4 Sauerstoff).

Ueber die Veränderung, welche Baumwollenfaser, Zucker, Mannit u. a. durch Salpetersäure oder Salpeter-Schwefelsäure erleiden, vergl. bei der technischen Chemie.

Ueber das Pektin und die damit zusammenhängenden Substanzen hat Fremy (1) eine umfassende Untersuchung veröffentlicht; als Theil einer gröfseren Arbeit über das Reifen der Früchte überhaupt.

(1) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 5; Ann. Ch. Pharm. LXVII, 257; J. pr. Chem. XLV, 385; im Ausz. Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 57; Pharm. Centr. 1849, 136. Frühere kürzere Angaben der Resultate finden sich Compt. rend. XXIV, 1046; J. pharm. [3] XII, 13; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 383; J. pr. Chem. XLII, 18; Pharm. Centr. 1847, 597. — Die der vollständigen Abhandlung Fremy's vorausgehenden Arbeiten über das Pektin mögen hier nur kurz und dem wesentlichsten Inhalt nach berührt werden. — Soubeiran (J. pharm. [3] XI, 417; J. pr. Chem. XLI, 309; Pharm. Centr. 1847, 513) schlofs aus seinen Versuchen, weil der Saft der Früchte vor der Reife kein Pektin in Auflösung enthalte, aber man aus dem Fleisch derselben durch Kochen mit angesäuertem Wasser Pektin ausziehen könne, und weil der Saft der reifen Frucht Pektin enthalte, und in dem Fleisch gleichfalls viel desselben enthalten sei, von welchem ein Theil durch angesäuertes Wasser schon in der Kälte, ein anderer erst bei dem Kochen sich aussiehen lasse, müsse man entweder annehmen, ein Theil des Pektins sei nicht ganz entwickelt

Als fast ständige Begleiterin der Cellulose findet sich Pektose. in dem Pflanzengewebe und vorzugsweise in dem Mark unreifer Früchte und gewisser Wurzeln, wie Möhren, Rüben u. a., eine in Wasser, Alkohol und Aether unlösliche Substanz, die Fremy *Pektose* nennt. Sie läßt sich ihrer Unlöslichkeit wegen nicht von der Cellulose unverändert abscheiden, auch zeigt die mikroskopische Untersuchung, in Folge der völligen Durchsichtigkeit beider, keine bestimmte Verschiedenheit. Die Pektose ist dadurch chemisch characterisirt und von der Cellulose wesentlich verschieden, daß sie durch gleichzeitige Einwirkung von verdünnten Säuren (mit Ausnahme der Essigsäure) und einer höheren Tem-

und löslich in der Frucht enthalten, oder, das Pektin sei darin in Verbindungen enthalten, welche durch Säuren zersetzt werden. Nach der ersteren Annahme finde ein allmäliger Uebergang von unlöslichem Zellgewebe zu löslichem Pektin statt, welcher entweder langsam durch die Reife, oder schnell und unvollkommen durch Kochen mit Wasser, oder vollständiger durch Mitwirkung von Säuren bewirkt werde. Nach der zweiten Annahme sei das Pektin in der Frucht an Kalk gebunden; man begreife nicht, weshalb die Säuren in den unreifen Früchten es aus dieser Verbindung nicht abscheiden, weshalb kochendes Wasser daraus Pektin aufnehme, und weshalb Säuren nur in der Hitze die Auflösung vollständig machen. — Baudrimont (J. pharm. [3] XII, 24; Pharm. Centr. 1847, 596) ist dagegen der Ansicht, das Pektin schlage in den Früchten den Kalk nur durch Flächenanziehung auf sich nieder, ohne mit ihm eine wirkliche chemische Verbindung einzugehen, welche Ansicht die so eben angegebenen Bedenken Soubeiran's gegen die oben als zweite bezeichnete Annahme hinwegräume. — Poumarède und Figuier (Compt. rend. XXIII, 918; XXV, 17; J. pharm. [3] XI, 458; XII, 81; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 387; J. pr. Chem. XLII, 25; Repert. Pharm. [2] XLVII, 344) sind gleichfalls der Ansicht, das Pektin wirke in den Pflanzen weniger durch chemische Verwandtschaft, als vielmehr absorbirend auf unorganische Substanzen ein; es könne im „normalen“ Zustand über 8 pC. unorganische Substanzen enthalten, welche in einem eigenthümlichen „physiologischen“ Zustand darin enthalten seien; es sei nichts anderes, als ein sehr fein vertheiltes Zellgewebe, und habe dieselbe Zusammensetzung wie die Holzfaser (welcher Behauptung indessen ihre eignen Versuche widersprechen); eine Pektinsäure existire nicht, sondern was man dafür halte, sei Pektin mit anhängender Salzsäure. — Fremy (J. pharm. [3] XII, 174; J. pr. Chem. XLII, 428) hat diese Ansichten beleuchtet.

Metapektin. Behandelt man Parapektin mit verdünnten Säuren in der Siedehitze, so verwandelt es sich ziemlich schnell in *Metapektin*, das entschiedene saure Eigenschaften besitzt. Es röthet Lackmus, ist löslich in Wasser, unkrystallisirbar, unlöslich in Alkohol, und liefert in Berührung mit Basen pektins. Salze. Es fällt Chlorbarium, wodurch es von dem Pektin und Parapektin sich unterscheidet. Es ist isomer mit denselben und verliert wie das letztere bei 140° 2 At. Wasser, welche in seiner Blei- und Barytverbindung durch 2 At. dieser Oxyde ersetzt sind. Die Zusammensetzung des Metapektins ist :

	berechnet	bei 140° getr.	gefunden in der Bleiverbindung	
			^I	^{II}
C ₄₄	41,48	41,85	41,42	42,17
H ₄₄	4,97	5,58	5,60	5,44
O ₆₂	53,55	52,57	52,98	52,44
	100,00	100,00	100,00	100,00

Die Formel $C_{44}H_{44}O_{62}, 2PbO$ verlangt 19,4 pC. Bleioxyd; gefunden wurden 19,6 und 20,9 pC. — Die Barytverbindung gab 14,0 und 15,0 pC. Baryt; die Rechnung nach der Formel $C_{44}H_{44}O_{62}, 2BaO$ verlangt 14,1 pC. — Das Metapektin geht auch mit Säuren in Wasser lösliche, durch Alkohol fällbare Verbindungen ein.

Sowie in den Trauben das Ferment neben Zucker, in den bittern Mandeln die Synaptase neben Amygdalin, in der gekeimten Gerste die Diastase neben der Stärke sich vorfindet, so ist auch in allen pektosehaltigen Pflanzengewebe ein Körper vorhanden, der eine specielle Wirkung auf Pektose ausübt und in jeder Hinsicht mit der Diastase oder Synaptase vergleichbar ist; Fremy hat denselben deshalb *Pektase* genannt. Er ist das Ferment der Gallertsubstanzen, er bedingt die Umwandlung der Pektose in zwei in kaltem Wasser unlösliche gallertartige Säuren, in Pektosin- und in Pektinsäure. Diese Umwandlung, die Pektin-gährung, findet wie die Milchsäuregährung bei Luftabschlufs ohne Gasentwicklung und bei 30° statt. Die Pektase kommt im

Pflanzenorganismus im löslichen und im unlöslichen Zustande vor. Möhren und Runkelrüben enthalten sie in löslicher Form; ihr Saft ruft die Pektingährung hervor. Der Saft von Aepfeln und andern säuerlichen Früchten wirkt dagegen nicht auf Pektin; die Pektase ist in diesen Früchten unlöslich und bleibt bei dem unlöslichen Theil des Marks, denn bringt man das Mark unreifer Aepfel in eine Auflösung von Pektin, so wird sie in kurzer Zeit gallertartig, in Folge der Bildung obiger Säuren. Man kann die Pektase durch Fällung des Saftes frischer Möhren mit Alkohol darstellen. Sie wird dadurch unlöslich in Wasser, ohne ihre Wirksamkeit einzubüßen, zersetzt sich aber im Wasser nach einigen Tagen unter Schimmelbildung und Verlust ihrer Eigenschaft als Pektinferment; dasselbe geschieht bei längerem Kochen.

Bringt man Pektase in eine Auflösung von Pektin, so entsteht, unter Gallertbildung, zuerst Pektosinsäure. Läßt man verdünnte Auflösungen von Kali, Natron, Ammoniak oder kohlen. Alkalien in der Kälte auf Pektin einwirken, so bilden sich pektosins. Salze. Diese Säure ist gallertartig, kaum löslich in kaltem, unlöslich in angesäuertem Wasser; die Auflösung in kochendem Wasser gelatinirt beim Erkalten. Kochendes Wasser, Pektase sowie überschüssige Alkalien verwandeln sie rasch in Pektinsäure. Ihre Zusammensetzung ist in 100 Th.:

Pektosinsäure.

im freien Zustand				im Bleisalz			
		berechnet	gefunden			berechnet	gefunden
C _{3,2}	192	41,48	41,08	C _{3,2}	192	43,14	42,91
H _{2,1}	23	4,97	5,25	H _{2,1}	21	4,71	5,18
O _{1,1}	248	53,55	53,67	O _{1,1}	232	52,15	51,91
	<u>463</u>				<u>445</u>		

Die Formel des Bleisalzes C_{3,2}H_{2,1}O_{2,9}, 2 PbO verlangt 33,4 pC. Oxyd, gefunden wurden 32,7 pC. — Der pektosins. Baryt ist = C_{3,2}H_{2,1}O_{2,9}, HO, 2 BaO; gefunden wurden 24,1 bis 24,7 pC. Baryt, die Formel verlangt 25,3 pC.

Die *Pektinsäure* entsteht nach Fremy, wenn man eine Auflösung von Pektin, in welcher Pektase suspendirt ist, einige

Pektinsäure.

Pektinsäure. Zeit bei 30° sich selbst überläßt; das Pektin verwandelt sich zuerst in Pektosin- und dann in Pektinsäure. Verdünnte Lösungen von ätzenden und kohlen. Alkalien, Kalk-, Baryt- und Strontianwasser verwandeln das Pektin sogleich in pektins. Salze, aus welchen sich die Pektinsäure durch Säuren abscheiden läßt. — Die Pektinsäure ist unlöslich in kaltem, kaum löslich in kochendem Wasser; bei längerem Kochen geht sie in eine neue, in Wasser lösliche und zerfließliche Säure über. Nach der gewöhnlichen Methode bereitet ist die Pektinsäure, wie schon Mulder (1) vor Fremy beobachtet hat, stets mit einem stickstoffhaltigen Körper gemengt, welcher die Resultate der früheren Analysen unzuverlässig machte. Völlig rein und weiß erhält man sie nach Fremy, indem man gut gewaschenes Mark von Möhren mit schwach salzsäurehaltigem Wasser kocht, und die filtrirte Pektinauflösung mit einer genau getroffenen Menge von kohlen. Natron in der Siedhitze behandelt, wobei pektins. Natron entsteht, aus welchem mittelst Salzsäure die Pektinsäure abgeschieden und mit destillirtem Wasser gewaschen wird. Ueberschüssiges kohlen. Natron liefert Metapektinsäure, eine nicht zureichende Menge dagegen Pektosinsäure, welche beide in Wasser löslich sind.

Pektins. Salze von bestimmtem Oxydgehalt sind nur mit großer Schwierigkeit darzustellen, da viele Salze, fast alle Ammoniaksalze mit organischen Säuren und namentlich die löslichen pektins. Salze, die Fähigkeit haben, beträchtliche Quantitäten von Pektinsäure aufzulösen. Pektins. Ammoniak mit überschüssiger Basis giebt mit Bleizuckerlösung Niederschläge, deren Oxydgehalt zwischen 34 und 60 pC. wechselt, je nach dem Ammoniakgehalt des pektins. Salzes. Ein Barytsalz von constanter Zusammensetzung erhielt Fremy durch Behandlung einer Pektinauflösung mit einem großen Ueberschuß von Barytwasser in der Kälte und bei Luftabschluß. Es entsteht zuerst ein Niederschlag von pektosins. Baryt,

(1) Scheik. Onderzoek. III, 17; Berzelius' Jahresber. XXVI, 611.

welcher bald in pektins. übergeht; er wird schnell gewaschen und zuerst im leeren Raum, dann bei 120° getrocknet. Die Zusammensetzung der Pektinsäure wurde gefunden:

Wasserhaltig					im Blei- und Barytsalz		
		berechnet	gefunden			berechn.	gefunden
C _{3,1}	192	42,29	41,35	41,55	41,30	C _{3,1}	192 44,03 43,91
H _{2,1}	22	4,84	4,56	4,75	5,02	H _{2,0}	20 4,58 4,87
O _{1,0}	240	52,87	54,09	53,70	53,68	O _{1,0}	224 51,39 51,22
		454	100,00	100,00	100,00		436 100,00 100,00

Für das Blei- und Barytsalz nimmt Fremy die Formel C_{3,1}H_{2,0}O_{1,0}, 2 MeO an. Die Analyse der Bleiverbindung gab 35,0, 33,1 und 32,7 (berechnet 33,8) pC. Bleioxyd; die der Barytverbindung 26,8, 26,4, 25,7 und 25,3 (berechnet 26,0) pC. Baryt. — Fremy giebt an, mit nach verschiedenen Methoden und aus Möhren, Rüben, Äpfeln, Birnen und Stachelbeeren bereiteter Pektinsäure stets gleiche Resultate erhalten zu haben.

Das schon oben erwähnte Verhalten der Pektinsäure gegen Salze erklärt Fremy in folgender Weise. — Bringt man in eine Flüssigkeit, in welcher Pektinsäure suspendirt ist, eine kleine Menge eines alkalischen Salzes und namentlich eines Ammoniaksalzes von Citronen-, Äpfel- oder Oxalsäure, so löst sich die Pektinsäure beim Erwärmen sogleich auf, indem mit dem Pektin leicht zu wechselnde wirkliche Doppelsalze sich bilden, die bei einem Ueberschuß des Salzes in Wasser löslich sind, ihre Löslichkeit aber durch wiederholte Fällung mittelst Alkohol verlieren. Diese reagiren sauer, lösen sich in siedendem Wasser, und gelatiniren beim Erkalten. Sie können sich bei der Bereitung des Pektins bilden und ihm dann die Fähigkeit zu gelatiniren geben. Das gut ausgewaschene Mark von Möhren enthält nämlich Cellulose, Pektose, pektins. Kalk und andere Kalksalze, namentlich aber phosphors. Kalk und phosphors. Magnesia-Ammoniak. Die zur Darstellung des Pektins angewendete Säure zerlegt den pektins. Kalk, scheidet Pektinsäure ab, und bildet außerdem bei der Zersetzung der Kalk- und Magnesiasalze Ammoniak-

verbindungen, welche die Auflösung der Pektinsäure bedingen, wodurch also, neben dem Pektin, gelatinirende Substanzen in die Flüssigkeit übergehen. Man vermeidet die Bildung dieser Doppelsalze, wenn man das Mark 24 Stunden mit kaltem Wasser digerirt, das stark mit Salzsäure angesäuert ist; die Kalk- und Magnesiasalze lösen sich dabei auf, während die Pektose keine merkliche Veränderung erleidet. Wascht man dann das Mark mit reinem Wasser und kocht es mit schwach angesäuertem, so erhält man reines Pektin.

Parapektin-
säure.

Durch längeres Kochen von Pektinsäure mit Wasser entsteht *Parapektinsäure*; auch die pektins. Salze gehen langsam bei 150°, oder wenn man sie mehrere Stunden mit Wasser kocht, in parapektins. Salze über. Die Parapektinsäure ist nicht krystallisirbar, reagirt entschieden sauer und bildet mit Alkalien lösliche Salze; von überschüssigem Barytwasser wird sie gefällt. Sie wurde nur im Bleisalz analysirt (wir theilen nur je Eine von den Analysen mit).

I. Im Bleisalz bei 110° getr.				II. Im Bleisalz bei 150° getr.			
		berechnet	gefunden			berechnet	gefunden
C ₂₄	144	41,76	41,79	C ₂₄	144	44,04	44,40
H ₁₇	17	4,93	4,93	H ₁₅	15	4,58	4,88
O ₁₁	184	53,31	53,28	O ₁₁	168	51,38	50,72
	345	100,00	100,00		327	100,00	100,00

Das parapektins. Beioxyd ist bei 110° = C₂₄H₁₇O₁₁, 2 PbO, 2 HO, bei 150° = C₂₄H₁₅O₁₁, 2 PbO; gefunden wurden in letzterem 40,0, 40,7 und 41,3 (berechnet 40,5) pC. Bleioxyd. — Das bei 150° getrocknete Kalisalz, durch Neutralisiren der Säure mit Kali und Fällen mit Alkohol erhalten, gab 23 pC. Kali; die Formel C₂₄H₁₅O₁₁, 2 KO verlangt 22,3 pC.

Metapektin-
säure.

Die *Metapektinsäure* entsteht bei mehrtägigem Stehen einer Pektinlösung, bei Einwirkung starker Säuren auf Pektin oder überschüssiger Alkalien auf Pektin, Pektose- und Pektinsäure. Letztere löst sich bei 2- bis 3monatlichem Stehen in Wasser auf, unter Verwandlung in Metapektinsäure (bleibt ein Rückstand, so ist dies eiweißartige

Substanz, die fast stets beigemengt ist); verdünnte Säuren oder Wärme bewirken die Umsetzung schon in 36 Stunden. Parapektinsäure verwandelt sich in wässriger Lösung schnell in Metapektinsäure. Metapektinsäure.

Die Metapektinsäure ist löslich in Wasser, unkrystallisirbar, und bildet mit allen Basen lösliche Salze; sie wird nur von basisch-essigs. Bleioxyd gefällt. Ihre Auflösung schimmelt leicht; bei langem Kochen liefert sie Essigsäure unter Absatz einer schwarzen, ulminsäureähnlichen Substanz. Para- und Metapektinsäure zerlegen in der Siedehitze (wie Zucker) weins. Kupferoxydkali, ohne dafs sie auf das polarisirte Licht eine Wirkung äufsern, mit Hefe in Gährung gerathen oder überhaupt Zucker enthalten. Die Metapektinsäure hat in dem bei 160° getrockneten Bleisalz die Zusammensetzung:

		berechnet		gefunden	
C ₈	48	44,04	43,77	43,00	43,77
H ₈	5	4,58	4,88	4,98	4,88
O ₇	56	51,38	51,85	52,02	51,85

Sie hat demnach dieselbe procentische Zusammensetzung wie die Parapektinsäure, aber ein dreimal kleineres Atomgewicht. Durch Fällung mit Bleiessig entstehen Verbindungen von der Formel C₈H₈O₇, 2 PbO (67,2 pC. Bleioxyd) oder C₈H₈O₇, 3 PbO (75,4 pC.); Fremy erhielt 67,5 bis 68,8 und 73,4 bis 74,2 pC. Bleioxyd.


Die Metapektinsäure zeigt, in ihrer Zusammensetzung, zur Aepfelsäure eine ähnliche Beziehung, wie wir sie schon für mehrere andere Säuren, z. B. Chelidon- und Meconsäure, kennen.

Metapektinsäure	C ₈ H ₈ O ₇	Chelidonsäure	C ₁₄ H ₁₄ O ₁₁
wasserfreie Aepfels.	C ₈ H ₈ O ₄	Meconsäure	C ₁₄ H ₁₄ O ₁₄

Erhitzt man Pektin oder einen seiner Abkömmlinge auf 200°, so entwickelt sich Wasser und Kohlensäure, während eine schwarze, in Wasser unlösliche Säure zurückbleibt, die Fremy *Pyropektinsäure* nennt. Pyropektinsäure. Sie löst sich in alkalischen Flüssigkeiten und bildet braune, unkrystallisbare Salze. Für ihre Zusammensetzung wurde gefunden:

Pyropektin- säure.			berechnet	gefunden
	C ₁₄	84	50,96	51,82
	H ₈	9	5,46	5,33
	O ₈	72	43,58	43,85
		165	100,00	100,00

Das Atomgewicht der Säure wurde nicht bestimmt; ihre Bildung erklärt sich aus der Gleichung :



Allgemeines
über die
Pektinkörper.

Fremy giebt folgende Zusammenstellung der von ihm untersuchten Pektinkörper und ihrer Bleiverbindungen :

	Formel	Bleiverbindung	PbO in 100 Th.
Pektose	—	—	—
Pektin	$\text{C}_{44}\text{H}_{40}\text{O}_{33}, 8 \text{HO}$	—	—
Parapektin	$\text{C}_{44}\text{H}_{40}\text{O}_{33}, 8 \text{HO}$	$\text{C}_{44}\text{H}_{40}\text{O}_{33}, 7\text{HO}, \text{PbO}$	10,6
Metapektin	$\text{C}_{44}\text{H}_{40}\text{O}_{33}, 8 \text{HO}$	$\text{C}_{44}\text{H}_{40}\text{O}_{33}, 6\text{HO}, 2\text{PbO}$	19,4
Pektosinsäure	$\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{O}_{21}, 3 \text{HO}$	$\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{O}_{21}, \text{HO}, 2\text{PbO}$	33,4
Pektinsäure	$\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{O}_{21}, 2 \text{HO}$	$\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{O}_{21}, 2 \text{PbO}$	38,8
Parapektinsäure	$\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{O}_{21}, 2 \text{HO}$	$\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{O}_{21}, 2 \text{PbO}$	40,5
Metapektinsäure	$\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{O}_{21}, 2 \text{HO}$	$\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{O}_{21}, 2 \text{PbO}$	67,2

Alle von dem Pektin abstammenden Körper besitzen saure Eigenschaften, die in dem Maße mehr hervortreten, als das Atomgewicht abnimmt; die Reihe beginnt mit dem neutralen Pektin und endigt mit einer starken Säure. Alle Glieder der Reihe sind isomer oder nur durch die Elemente des Wassers von einander unterschieden; sie gehen in dieser Hinsicht parallel mit der Stärke und der Holzfaser, die bei ihren Umsetzungen, durch Fermente namentlich, eine Reihe isomerer Zustände durchlaufen und endlich die mit der Stärke ebenfalls isomere Milchsäure erzeugen.

Man sieht leicht bei näherer Prüfung von Fremy's schöner Arbeit, daß ihn die Vorstellung von den obigen, der Wahrheit gewiß sehr nahe stehenden, Beziehungen der Pektinkörper unter sich bei der Interpretation seiner analytischen Resultate mehr geleitet hat, als es bei chemischen Untersuchungen anderer Art zulässig erscheinen mag; er bemerkt aber mit Recht, daß die Analyse unkrystallisirbarer, durch Einwirkung von Basen, Säuren und selbst von Wasser so leicht in einander übergehender Körper

Schwierigkeiten darbietet, welche die erhaltenen Differenzen der Versuchsergebnisse und der Theorie wohl entschuldigen. Allgemeines
über die
Pektinkörper.

Fremy spricht sich entschieden gegen die Ansicht aus, daß das Pektin mit der Holzfaser isomer sei; die Fähigkeit des Pektins, bei Gegenwart von Pektose in verschlossenen Gefäßen alle Phasen der Pektinkörper bis zur Metapektinsäure und ohne Bildung anderer Producte zu durchlaufen, zeigt mit Bestimmtheit, daß nur und allein das Wasser oder seine Elemente, und nicht auch Sauerstoff, bei diesen Umsetzungen thätig ist, wie dies nach Chodnew's Untersuchung stattfinden müßte. Eine Zuckerbildung aus Pektin konnte Fremy auf keine Weise beobachten; er schreibt sie, wenn sie in der That stattfand, der Gegenwart von Stärkmehl zu, das sich öfters in unreinem Pektin finde.

Die Umsetzungen, welche die Pektinkörper beim Reifen der Früchte erleiden, sind nach Fremy genau dieselben, welche nach seiner Untersuchung durch Säuren, Wasser, Alkalien oder Pektase hervorgebracht werden. Die unreifen Früchte enthalten kein Pektin, wohl aber Pektose; letztere geht, indem die Frucht nach und nach ihre Härte verliert, in Folge der Einwirkung der vorhandenen Säuren in Pektin und Parapektin über; ist die Frucht überreif, so sind auch diese beiden verschwunden, sie haben sich unter Mitwirkung der Pektase umgesetzt in Metapektinsäure, die sich mit Kali oder Kalk verbindet. Auch die Rüben- und Rohrzucker-Melassen enthalten Metapektinsäure. Die Metapektinsäure bewirkt endlich, wie andere organische Säuren, die Umwandlung der Stärke in Zucker. — Beim Kochen der Früchte geht die Pektinbildung vor sich wie beim Reifen; die Gegenwart von Säuren ist dazu eine Bedingung; die Gallertbildung, die nach einiger Zeit stattfindet, beruht auf dem Uebergang des Pektins in Pektin- oder Pektosinsäure vermittelt der Pektase, oder auch auf der Auflösung der Pektinsäure in den Salzen mit organischer Säure, die Reifen
der Früchte.

in den Früchten enthalten sind. Der Saft der Stachelbeeren gelatinirt öfters rasch, wenn man ihn mit dem Saft von Himbeeren mischt; letzterer ist reich an Pektase, welche das Pektin des ersteren in gallertartige Pektosinsäure verwandelt.

Humusartige
Substanz.

In einer schwarzen humusartigen Substanz, welche nach einem Erdstofs auf dem Wasser des schottischen Sees Loch Dochart schwamm, und wahrscheinlich vermoderter Torf war, fand Gregory (1) 76,7 pC. Kohlenstoff, 4,7 Wasserstoff und 18,6 Sauerstoff, eine ganz unbedeutende Menge Asche und nur Spuren von Stickstoff.

Eigenthüm-
liche
Pflanzen-
stoffe.

Lebourdais (2) schlägt in einer Abhandlung über die eigenthümlichen Bestandtheile (*principes immédiats*) der Pflanzen vor, die schon von anderen Chemikern (Warrington, Weppen u. A.) beobachtete Eigenschaft der thierischen Kohle, Bitterstoffe u. a. ihren Lösungen zu entziehen, zur Gewinnung derselben zu benützen. Man soll den wässerigen Auszug der Pflanze geradezu mit Beinschwarz, dem man durch Behandlung mit Salzsäure alle Salze entzogen hat, so lange kochen, bis die Flüssigkeit farblos und nicht mehr bitter ist, dasselbe dann mit Wasser auswaschen und nach dem Trocknen mit kochendem Alkohol ausziehen. Der Alkohol entzieht der Kohle den Bitterstoff oder die organische Base wieder; nach seiner Verdunstung hinterbleiben sie im reinen Zustande. Man kann den wässerigen Pflanzenauszug vor der Behandlung mit Kohle auch durch Fällung mit Bleisalzen von den dadurch fällbaren Materien befreien.

Lebourdais giebt an, in dieser Weise farbloses, syrupartiges Ilicin, Scillitin, Arnicin und Colocynthin, einige andere wie Digitalin, Columbin u. a. im krystallisirten Zu-

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 865. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 58; J. chim. méd. [3] V, 4; J. pr. Chem. XLV, 363; Ann. Ch. Pharm. LXVII, 251; Pharm. Centr. 1848, 762.

stande erhalten zu haben. — Wenn auch seine Versuche, wie aus ihrer Beschreibung hervorzugehen scheint, nicht mit der Umsicht angestellt sind, daß sie völliges Vertrauen verdienen, so zeigen sie doch, daß man diesem Verhalten der Thierkohle bei ihrer Anwendung als Entfärbungsmittel mehr Rechnung zu tragen hat, als dies bis jetzt geschehen ist.

Baumert (1) hat das Gentianin einer neuen Unter- Gentianin.suchung unterworfen. Für die Reindarstellung desselben suchte er seine Eigenschaft, nicht durch einfach-essigs., sondern nur durch basisch-essigs. Bleioxyd gefällt zu werden, zu benutzen, aber ohne genügenden Erfolg, so daß er zu dem von Leconte (2) angegebenen Verfahren zurückkehrte. 20 Pfund trockner Enzianwurzel gaben kaum Eine Drachme reinen Gentianins. Das von allem Bitterstoff befreite (in feinen hellgelben Nadeln krystallisirende) Gentianin fand er geschmacklos; es löst sich bei 16° in dem 3630fachen Gewicht Wasser, leichter in Aether, am leichtesten in kochendem Alkohol; in Alkalien löst es sich leicht mit goldgelber Färbung. Auf 200° erhitzt wird es glanzlos und bräunlich, ohne daß es indeß Wasser verliere; zwischen 300 und 400° sublimirt es theilweise, während das Meiste verkohlt zurückbleibt. Die Zusammensetzung wurde der Formel $C_{14}H_8O_5$ entsprechend gefunden. — Seine Verbindungen mit Natron krystallisiren in goldgelben Nadeln mit oder ohne Krystallwasser (im ersteren Falle verwittern sie an der Luft; das Krystallwasser entweicht bei 100°); sie reagiren alkalisch und werden leicht durch Säuren, selbst durch Kohlensäure, und auch durch vieles Wasser oder andauernde Einwirkung von Alkohol zerlegt. $NaO, 3 C_{14}H_8O_5$ krystallisirte aus einer Lösung, welche durch Kochen von Gentianin mit kohlen. Natron in 90procentigem Alkohol, bis sich nichts mehr löste, bereitet war.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXII, 106; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 549; Repert. Pharm. [2] XLVII, 225; J. pharm. [3] XIII, 51. — (2) Ann. Ch. Pharm. XXIII, 370; Berzelius' Jahresber. XVIII, 392.

Santonin.

Das Santonin (1), welches früher namentlich von Trommsdorff d. j. (2) untersucht worden war, ist aufs Neue von Heldt (3) untersucht worden. — Es krystallisirt aus der alkoholischen Lösung in perlmutterglänzenden Prismen des rhombischen Systems, aus der ätherischen Lösung in rhombischen Tafeln. Für das krystallisirte Santonin wurde die Zusammensetzung der Formel $C_{20}H_{12}O_4$ entsprechend gefunden, d. h. demselben atomistischen Verhältniss, welches Liebig, Ettling und Laubenheimer für das geschmolzene Santonin gefunden hatten (C_5H_3O); dieselbe Zusammensetzung hatte auch das durch Kochen mit wässerigem Kali gelöste und auf Zusatz von Essigsäure wieder langsam ausgeschiedene Santonin. Das letztere zeigt die Eigenthümlichkeit, dafs es nach dem Schmelzen eine amorphe, gummiartige Masse giebt, welche auf 40 bis 50° erwärmt, oder sogleich unter dem Einflufs von Alkohol- oder Aetherdämpfen, in den krystallinischen Zustand übergeht. Unter dem Einflufs des Lichts färben sich die Santoninkrystalle gelb und zerspringen; Heldt hat die Lage der Flächen, nach welchen dies Zerspringen stattfindet (sie sind keine Ebenen) untersucht, übrigens aber die Zusammensetzung des so veränderten Santonins mit der des krystallisirten übereinstimmend gefunden.

Die Verbindungen des Santonins mit Basen werden schon bei dem Kochen ihrer Auflösungen, unter Abscheidung von Santonin, zersetzt; sie werden weder durch das Sonnenlicht noch durch die Kohlensäure der Luft verändert. Die löslichen Verbindungen werden dargestellt durch Digestion der Basen oder ihrer kohlens. Salze mit

(1) Cerutti erhielt aus 2 Pfund (Med. Gew.) Wurmseeden $\frac{1}{2}$ Unze Santonin (Arch. Pharm. [2] LII, 148). — Eine Verunreinigung von käuflichem Santonin mit Strychnin hat Walz beobachtet (Jahrb. pr. Pharm. XV, 96). — (2) Ann. Ch. Pharm. XI, 190; Berzelius' Jahresber. XV, 329. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 10; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 855; J. pr. Chem. XLIII, 186; Chem. Gaz. 1848, 53; J. pharm. [3] XIII, 65.

einer Lösung von Santonin in Weingeist, die schwer löslichen durch Fällung des Santonin-Kalis oder Santonin-Natrons mit einem Salz der Basis. Bei der Digestion der Basen mit Weingeist und Santonin nimmt die Flüssigkeit eine carminrothe Farbe an, welche nach einiger Zeit wieder verschwindet; ohne Gegenwart von Weingeist zeigt sich diese Färbung nicht. Bei dem Erhitzen der trocknen Basen mit Santonin bis zum Schmelzpunkt des letztern zeigt sich gleichfalls die carminrothe Färbung; die auf trockenem Weg dargestellte (rothe) Verbindung des Santonins mit Kali oder Natron wird auf Wasserzusatz nach einiger Zeit weifs; Helldt glaubt, dafs die rothe Färbung immer auf Bildung einer wasserfreien Santoninverbindung beruhe. — Santonin-Natron wird dargestellt durch Digestion von kohlens. Natron mit einer weingeistigen Lösung von Santonin bis die Flüssigkeit farblos geworden ist, Abdampfen der Flüssigkeit bei 30°, Ausziehen des Rückstands mit absolutem Alkohol und Abdampfen des Filtrats; so erhalten bildet es feine verfilzte Nadeln, deren Lösung in möglichst wenig Wasser bei freiwilliger Verdunstung ziemlich grofse wasserhelle rhombische Krystalle giebt ($\infty P : \infty \check{P} \infty : \check{P} \infty$; $\infty P : \infty P = 141^\circ$ etwa; $\check{P} \infty : \check{P} \infty$ im brachydiagonalen Hauptschnitt = 102° etwa), mit der Zusammensetzung $\text{NaO}, \text{C}_{30}\text{H}_{18}\text{O}_6 + 8 \text{HO}$ (7 HO entweichen bei 100°; bei höherer Temperatur entweicht auch das letzte Atom Wasser, und es bildet sich eine carminrothe Verbindung, welche mit Begierde Feuchtigkeit anzieht und durch Wasseraufnahme wieder weifs wird). — Santonin-Kali, in derselben Weise dargestellt, konnte nur als gummiartige Masse, nicht krystallisirt, erhalten werden. — Mit Ammoniak läfst sich das Santonin weder auf trockenem noch auf nassem Wege vereinigen. — Durch Digestion von Kalkhydrat mit einer alkoholischen Santoninlösung bis zum Verschwinden der rothen Farbe der Flüssigkeit, Filtriren, Abdampfen des Filtrats bei 30°, Ausziehen des Rückstands mit Wasser von 30°, und Verdampfen der Lösung bei derselben Tem-

Mittheilungen über eine eigenthümliche Substanz in der Buchenrinde (von *Fagus sylvatica*) hat Lepage (1) gemacht; über eine solche in dem frischen Kraut der *Oenanthe fistulosa* Gerding (2). . Beider Angaben bieten über die chemische Natur der von ihnen untersuchten Stoffe zu wenig Aufschluß, als daß sich ein bestimmter Bericht darüber geben ließe.

Asparagin.

Piria hat seine Untersuchungen über Asparagin, von welchen früher bereits (3) Einzelnes bekannt geworden war, vollständiger mitgetheilt (4). — Er liefs 10 Kilogr. Wicken an einem dunklen Orte keimen, schnitt die Pflanzen ab, als sie eine Höhe von 60 Centim. erreicht hatten, dampfte den ausgepressten Saft ein, filtrirte die Flüssigkeit von dem sich ausscheidenden Albumin ab, reinigte das aus dem concentrirten Filtrat krystallisirende Asparagin durch Umkrystallisiren und Behandeln mit Thierkohle, und erhielt so 150 Grm. reines Asparagin. Aus grünen Wickenpflanzen, welche am Licht wuchsen, erhielt er eine eben so große Menge Asparagin. In den Wickensamen selbst konnte er keine Spur davon auffinden; bei der Untersuchung von Wicken im Beginn der Blüthe und während der Fruchtbildung erhielt er einmal eine unwägbare Menge Asparagin, ein andermal nichts von demselben. — Für das krystallisirte Asparagin fand er die Zusammensetzung $C_8H_{10}N_2O_8$ bestätigt, aber er entdeckte auch noch, daß ausser den 2 At. Wasser, welche durch Trocknen bei 120° daraus entfernt werden können, ein drittes At. Wasser darin enthalten ist, welches durch Basen ersetzt werden kann. Das Asparagin ist nach ihm eine hinlänglich starke Säure, um Lackmus zu röthen und Essigsäure aus ihrer

(1) J. chim. méd. [8] III, 513; J. pharm. [3] XII, 181; Pharm. Centr. 1847, 846. — (2) J. pr. Chem. XLIV, 175; Pharm. Centr. 1848, 48. — (3) Compt. rend. 16. Septbr. 1844; Berzelius' Jahresber. XXV, 714; XXVI, 708. — (4) Ann. ch. phys. [3] XXII, 160; J. pr. Chem. XLIV, 71; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 343; Pharm. Centr. 1848, 160.

Verbindung mit Kupferoxyd auszutreiben. Eine Verbindung von Asparagin mit Kupferoxyd wird erhalten, wenn man beide Körper mit einer geringen Menge Wasser erhitzt, oder wenn man eine warm gesättigte Lösung von Asparagin in eine ebenfalls warme und concentrirte Lösung von essigs. Bleioxyd gießt. In beiden Fällen setzt sich ein schön ultramarinblauer Niederschlag, CuO , $\text{C}_4\text{H}_4\text{N}_2\text{O}_8$, ab, welcher in kaltem Wasser fast unlöslich, in heißem wenig löslich, in Säuren und in Ammoniak leicht löslich ist, bei 120° kein Wasser verliert und bei stärkerer Erhitzung unter Ammoniakentwicklung zersetzt wird; durch Zersetzung dieser Verbindung mit Schwefelwasserstoff kann aus ihr wieder Asparagin im krystallisirten Zustande erhalten werden. — Eine Lösung von reinem Asparagin verändert sich bei längerem Stehen nicht; eine Lösung unreiner und gefärbter Krystalle kommt dagegen in eine Art Gährung, wird schwach alkalisch und nach faulenden Thierstoffen riechend, wobei das Asparagin nach und nach verschwindet, und an seiner Stelle in der Flüssigkeit Ammoniak und Bernsteinsäure auftreten; bei dieser Umwandlung nimmt das krystallisirte Asparagin 2 At. Wasserstoff auf ($2[\text{NH}_4\text{O}, \text{C}_4\text{H}_4\text{O}_8] = \text{C}_4\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_8 + 2\text{H}$); eine Auflösung von reinem Asparagin erleidet nach Zusatz von Wickensaft dieselbe Veränderung (1). — Piria wiederholte die schon früher gemachten Beobachtungen, daß sich das Asparagin bei dem Kochen mit reiner Salzsäure oder mit Salpetersäure, die frei von Untersalpetersäure ist, zu Ammoniak und Asparaginsäure zersetzt, für welche letztere er die Formel $\text{C}_4\text{H}_4\text{NO}_8$ bestätigte (2), aber er fand die

(1) Eine Fixirung von Wasserstoff ist noch bei keiner Gährung beobachtet worden; wohin der Sauerstoff des Wassers gehe, ist nicht angegeben. Es mag hier daran erinnert werden, daß das Asparagin ($\text{C}_4\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_8$) die Elemente von Bernsteinsäure ($\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_8$), Weinsäure ($\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_8$) und Ammoniak (2NH_3) in sich enthält; die Gährung der Weinsäure ist bekannt. —

(2) Laurent (Ann. ch. phys. [8] XXIII, 118; J. pr. Chem. XLV, 170) ist geneigt, die Asparaginsäure $\text{C}_4\text{H}_4\text{NO}_8$ nicht als zweibasische Säure ($2\text{HO}, \text{C}_4\text{H}_4\text{NO}_8$), sondern als einbasische ($\text{HO}, \text{C}_4\text{H}_4\text{NO}_8$) zu betrachten.

Asparagin. Angabe nicht bestätigt, daß die Asparaginsäure bei anhaltendem Sieden mit concentrirter Salzsäure eine neue in Wasser sehr lösliche Säure gebe; er beobachtete, daß die Salzsäure der Asparaginsäure hartnäckig anhängt und sie deliquescirend macht. Durch Fällung einer salpetersäurehaltigen Lösung von Asparaginsäure mit essigs. Bleioxyd erhielt er Einmal weißse, glänzende, nadelförmige Prismen eines Doppelsalzes von asparagins. und salpeters. Bleioxyd, $\text{PbO}, \text{HO}, \text{C}_8\text{H}_8\text{NO}_6 + \text{PbO}, \text{NO}_3$, welches in kaltem Wasser wenig löslich war, und in heißem sich zersetzte; später gelang es ihm nicht mehr, diese Verbindung darzustellen. — Salpetersäure, welche Untersalpetersäure enthält, entwickelt mit Asparagin und mit Asparaginsäure Stickgas, und verwandelt sie in Aepfelsäure. Das Asparagin und die Asparaginsäure lassen sich als Amidverbindungen der Aepfelsäure betrachten: das Asparagin als neutrales äpfels. Ammoniak — Wasser ($\text{C}_8\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_6 = 2\text{NH}_4\text{O}, \text{C}_8\text{H}_4\text{O}_6 - 4\text{HO}$), die Asparaginsäure als saures äpfels. Ammoniak — Wasser ($\text{C}_8\text{H}_8\text{NO}_6 = \text{NH}_4\text{O}, \text{HO}, \text{C}_8\text{H}_4\text{O}_6 - 2\text{HO}$). Piria hat gefunden, daß auch andere Amide bei Einwirkung von Untersalpetersäure Stickgas entwickeln und diejenige Säure gebildet wird, als aus deren Ammoniaksalz entstanden das Amid betrachtet werden kann. — Wird Asparagin mit Kalihydrat geschmolzen, so entwickelt sich Ammoniak und dann Wasserstoff, und es bilden sich Essigsäure und Oxalsäure.

Dessaigues und Chautard (1) fanden Asparagin auch in den Schößlingen von Erbsen, Bohnen, Linsen und Schminkbohnen, welche in einem Keller gewachsen waren; aus 9 Liter Saft von Erbsenschößlingen erhielten sie 83 Grm., aus 2,35 Liter Saft von Bohnenschößlingen 33 Grm., aus 1,35 Liter Saft von Schminkbohenschößlingen 7,4 Grm. reines Asparagin, für welches (im krystallisirten Zustand) auch sie die Zusammensetzung $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_6$ bestätigten. 7,25 Liter Saft von Wicken, welche in Erde gepflanzt

(1) J. pharm. [8] XIII, 245; J. pr. Chem. XLV, 50; im Ausg. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 349; Pharm. Centr. 1848, 538.

waren, gaben 67 Grm., 3 Liter Saft von Wicken, welche Asparagin.
 in feuchtem Hanfe wurzelten, 27 Grm. Asparagin; der
 Saft der Wurzeln der letztern war ebenso reich an Aspa-
 ragin, aber in den Cotyledonen war dieses nicht aufzu-
 finden. In den Schöfslingen, welche Dahliaknollen in einem
 Keller getrieben hatten, und in diesen Knollen selbst wurde
 gleichfalls Asparagin gefunden, auch in den Schöfslingen von
 Eibischpflanzen, welche im Dunkeln gewachsen waren, aber
 nicht in solchen von Kartoffeln. — Eine kochende Lösung
 von Asparagin löst Silberoxyd auf; bei dem freiwilligen
 Verdampfen der Lösung über Schwefelsäure und im Dunkeln
 bildeten sich pilzförmige krystallinische Aggregate, welche
 im reflectirten Licht fast schwarz, im durchgelassenen Licht
 braungelb waren, und im luftleeren Raum getrocknet die
 Zusammensetzung $\text{AgO}, \text{C}_8\text{H}_7\text{N}_2\text{O}_8$ ergaben. — Asparagin
 treibt bei dem Kochen mit wässrigem essigs. Bleioxyd die
 Essigsäure langsam aus; bei dem Verdunsten über Schwefel-
 säure hinterläßt die Flüssigkeit eine gummiartige, bei 100°
 schwer zu trocknende Masse. — Quecksilberoxyd löst sich
 in heißer Asparaginlösung leicht auf. Die concentrirte
 Flüssigkeit wird durch Wasser weiß gefällt; sie trocknet
 zu einer gummiartigen Masse ein, welche bei 100° sich zu
 zersetzen scheint. — Aus einer Lösung von Zinkoxyd in
 einer kochenden Asparaginlösung setzen sich bei dem Er-
 kalten weißse blätterige Krystalle ab, welche bei 100° kein
 Wasser abgeben und $\text{ZnO}, \text{C}_8\text{H}_7\text{N}_2\text{O}_8$ sind. — Asparagin
 und salpeters. Silberoxyd, in den Gewichtsverhältnissen
 $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_8$ und $2(\text{AgO}, \text{NO}_3)$ in Wasser gelöst, geben
 bei dem Abkühlen der Lösung an einander gelagerte kleine
 Krystalle, deren Silbergehalt der Formel $\text{C}_8\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_8$
 $+ 2(\text{AgO}, \text{NO}_3)$ entsprach. Durch entsprechendes Ver-
 fahren mit Anwendung von salpeters. Bleioxyd wurde nur
 eine gummiartige Masse erhalten. — Bestimmte Verbind-
 ungen von Asparagin mit Schwefel- oder Salzsäure zu
 erhalten, gelang nicht. Mit Oxalsäure erhalte man eine
 krystallinische Verbindung, wenn man krystallisirte Oxal-

Asparagin. säure und Asparagin, in dem Gewichtsverhältnifs 2 (C_2O_3 , 3 HO) und $C_8H_{10}N_2O_8$, auflöse und langsam abdampfe; es entstehe ein Aggregat kleiner Krystalle, welche $C_8H_8N_2O_8 + 2 (HO, C_2O_3)$ seien. Dessaignes und Chautard ziehen für letztere Verbindung die Formel $C_4H_4NO_3 + HO, C_2O_3$ vor, und sind überhaupt der Ansicht, das Aequivalentgewicht des (getrockneten) Asparagins sei durch $C_4H_4NO_3$ auszudrücken. Sie geben noch an, Chlor zersetze auch im zerstreuten Lichte das Asparagin mit Leichtigkeit, und Bleihyperoxyd zersetze es bei dem Kochen unter Entwicklung von Ammoniak aber ohne Asparaginsäure zu bilden.

Amygdalin. Wöhler (1) hat die Einwirkung von Säuren, namentlich der Salzsäure, auf das Amygdalin untersucht. Der letztere Körper ($C_{40}H_{27}NO_{22}$) läßt sich, mit Rücksicht auf seine Zersetzung durch Emulsin, betrachten als eine gepaarte Verbindung von Bittermandelöl, Blausäure und Zucker ($C_{40}H_{27}NO_{22} = C_{14}H_6O_2 + C_2NH + 2 C_{13}H_{10}O_{10}$), aber auch als bestehend aus einer Cyanverbindung $C_{14}H_5C_2N$ und 2 At. Gummi ($2 C_{13}H_{11}O_{11}$), in welchem letzteren Fall durch Uebertreten von 2 At. Wasser von dem Gummi zu der ersteren Verbindung Zucker, Blausäure und Bittermandelöl zum Vorschein kommen könnten. Mit beiden Betrachtungsweisen steht die Wirkungsweise der Säuren auf das Amygdalin in Einklang; es wird dadurch in Mandelsäure und einen Huminkörper verwandelt, während der ganze Stickstoff in Form eines Ammoniaksalzes ausgeschieden wird; man kann annehmen, daß der Zucker oder das Gummi den Huminkörper bilden, während die aus der Blausäure entstehende Ameisensäure mit dem Bittermandelöl zu Mandelsäure zusammentritt. — Wöhler hat zunächst nur die Einwirkung von Salzsäure untersucht, zweifelt aber nicht, daß alle stärkeren Säuren sich auf ähnliche Weise verhalten. Eine Auflösung von Amygdalin in rauchender

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 238; J. pr. Chem. XLIV, 382; Pharm. Centr. 1848, 840; Instit. 1848, 298.

Salzsäure färbt sich bei dem Erwärmen bald gelb und braun; bei stärkerem Erhitzen scheidet sich eine große Menge eines schwarzbraunen, pulverigen Huminkörpers ab; die hiervon abfiltrirte Flüssigkeit giebt einen schwarzbraunen, syrupförmigen Rückstand, welcher (durch Aether ausziehbare) Mandelsäure, Huminsäure und Chlorammonium enthält. Steigt bei dem Abdampfen dieser sauren Flüssigkeit die Temperatur über 100°, so erleidet ein Theil der Mandelsäure eine eigenthümliche Veränderung; sie wird amorph, und löst sich dann zwar in einer kleinen Menge Wasser, wird aber aus dieser Lösung durch mehr Wasser als ein schweres, gelbes, geruchloses Oel gefällt. — Bei dem Einleiten von Salzsäuregas in ein breiförmiges Gemenge von Amygdalin und Alkohol löste sich das Amygdalin allmählig ohne sich bei dem Erkalten wieder abzuscheiden; der Huminkörper bildete sich dabei nicht und die Flüssigkeit färbte sich nur schwach bräunlich. Nach einigen Tagen schied sich Chlorammonium ab, und nach Zusatz von vielem Aether eine saure wässrige Flüssigkeit, welche alles Chlorammonium aber keinen Zucker enthielt; die ätherische Flüssigkeit hinterließ nach dem Abdampfen einen braunen Syrup, von welchem Wöhler glaubt, daß er wahrscheinlich Amygdalinsäureäther sei, dadurch entstanden, daß der Zucker oder das Gummi im Amygdalin nicht in Humin verwandelt wurde, sondern mit der entstehenden Mandelsäure in Verbindung trat (die Amygdalinsäure läßt sich als aus Bittermandelöl, Ameisensäure und Zucker zusammengesetzt betrachten; $\text{HO}, \text{C}_{40}\text{H}_{26}\text{O}_{24} = \text{C}_{14}\text{H}_6\text{O}_2 + \text{C}_2\text{HO}_3 + 2\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{O}_{10}$); der Amygdalinsäureäther ist schwerer als Wasser, löst sich in ansehnlicher Menge in demselben, besonders in der Wärme, wobei er sich aber zersetzt, schmeckt bitter und etwas zusammenziehend, und ist nicht oder nur wenig ohne Zersetzung flüchtig.

Pflanzen-
chemie.
Absorption
unorganischer
Substanzen.

Verschiedene Beobachtungen über die Absorption unorganischer Substanzen durch Pflanzen hat Chevallier(1) mitgetheilt. Kresse (*Lepidium sativum*) wurde in Erde gesäet, welche mit brechweinstein-, kupfervitriol- oder bleizuckerhaltigem Wasser begossen wurde; in den Stengeln der Pflanzen fand man Antimon, Kupfer oder Blei, in den Samen nur Kupfer oder Blei. Er fand Blei in Gewächsen, welche in einer Bleiweißfabrik gewachsen waren; die Absorption von Chlornatrium durch Pflanzen fand er gleichfalls bestätigt.

Lassaigne (2) hat Versuche mitgetheilt, wonach Weizen in Quarzsand gesäet üppiger wuchs, wenn er mit Wasser begossen wurde, welches Kohlensäure und phosphor. Kalk gelöst enthielt (vergl. S. 341), als wenn er mit reinem Wasser begossen wurde.

Chatin (3) hat die Wirkung der arsenigen Säure auf Pflanzen untersucht. Er constatirte, daß diese Säure durch die Pflanzen bis zu einem gewissen Grade aufgenommen wird, und daß, wenn die Pflanze nicht durch den Einfluß des Giftes abstirbt, die arsenige Säure später wieder durch die Wurzeln ausgeschieden wird. Er hat untersucht, welche Umstände die Wirkung des Giftes und welche die Secretion desselben befördern; wir führen hiervon nur an, daß in ersterer Beziehung bei den verschiedenen Pflanzenarten sich die größte Verschiedenheit zeigt (Phanerogamen starben früher als Kryptogamen; Dicotyledonen früher als Monocotyledonen). — Filhol (4) hat Chatin's Angaben bestätigt, und namentlich die ungleiche Vertheilung des absorbirten Arsens auf die verschiedenen Theile einer Pflanze untersucht; er fand, daß die Arsensäure in gleicher Menge und gleicher Verdünnung giftiger auf Pflanzen einwirkt, als die arsenige Säure.

(1) J. chim. méd. [3] IV, 602. — (2) J. chim. méd. [3] IV, 534. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 105; J. pr. Chem. XLV, 122; Pharm. Centr. 1848, 449. — (4) J. pharm. [3] XIV, 401.

E. Gris (1) beobachtete, daß an Chlorose kränkelnde Pflanzen (*Quercus coccinea*, *Quercus phellos*, *Castanea americana* u. a.) sich durch Begießen oder Eintauchen in Eisenvitriollösung (1 bis 8 Grm. im Liter) lebhaft erhalten.

Gaudichaud (2) hat angegeben, an allen Pflanzen-Reaction von Pflanzen-säften. säften nur saure Reaction gefunden zu haben. — Payen (3) hat hingegen hervorgehoben, daß eine genauere Einsicht in diesen Gegenstand nur dadurch erlangt werden könne, wenn man die in den verschiedenen Gebilden oder Organen, oder selbst in den verschiedenen einzelnen Zellen, enthaltenen Flüssigkeiten untersuche; in besonderen Organen enthalten die Pflanzen sauer, alkalisch und neutral reagirende Säfte. Er macht auf eine von ihm anderwärts (4) mitgetheilte Thatsache aufmerksam, daß die Blätter der Pflanzen mehrerer Gruppen aus der Familie der Urticeen in einzelnen Zellen, deren Räumlichkeit 10- bis 20mal größer ist als die der benachbarten Zellen, Concretionen von kohlen. Kalk und neutralen oder schwach alkalischen Saft enthalten, während der Saft der benachbarten Zellen sauer reagirt. Die Bläschen, welche die Blätter und Stengel des *Mesembrianthemum crystallinum* bedecken, enthalten alkalisch reagirende Flüssigkeit; das ganze innere Gebilde hingegen enthält sauren Saft. — Gaudichaud (5) hat hierauf die saure Reaction nur als die vorherrschende der wesentlichen Pflanzensäfte betrachtet, und er vermuthet auch, daß gewisse Milchsäfte neutral sind, obgleich die sie liefernden Pflanzen sonst sauer reagiren.

Aus dem Lactucarium (dem eingetrockneten Milchsaft Milchsaft von Lactuca virosa. von *Lactuca virosa*) hatte Lenoir (6) durch Ausziehen mit siedendem Alkohol eine krystallinische Substanz erhalten, welche er als *Lactucon* bezeichnete und nach der Formel

(1) Compt. rend. XXV, 276; Pharm. Centr. 1847, 782. — (2) Compt. rend. XXVI, 657. — (3) Compt. rend. XXVII, 1; Pharm. Centr. 1848, 700. — (4) Recueil des Mémoires des savants étrangers, IX, 77. — (5) Compt. rend. XXVII, 3; Pharm. Centr. 1848, 700. — (6) Ann. Ch. Pharm. LIX, 83; Berzelius' Jahresber. XXVII, 463.

Milchsaft
von *Lactuca*
virosa.

$C_{40}H_{72}O_8$ zusammengesetzt fand. — Walz (1) sprach die Ansicht aus, daß das Lactucon nichts anders sei als der von ihm früher unter dem Namen »Lattigfett« beschriebene Körper. — Unter Wackenroder's Leitung haben Thieme, Ruickoldt und namentlich H. Ludwig sich mit der Untersuchung des Lactucariums beschäftigt, und der letztere hat umfassende Angaben über dasselbe veröffentlicht (2). — Der erstere fand darin eine eigenthümliche, von ihm als *Lactucerin* bezeichnete Substanz, welche Ludwig bei genauerer Untersuchung als identisch mit dem Lactucon erkannte. — Den Bitterstoff des Lactucariums hält Ludwig für eine Säure, und schlägt dafür die Bezeichnung *Lactucasäure* vor. Zu der Darstellung derselben werden gleiche Gewichttheile zerriebenes Lactucarium und verdünnte Schwefelsäure zusammengerieben, das 5fache Gewicht an 84procentigem Weingeist zugesetzt, filtrirt, das Filtrat mit zerfallenem Aetzkalk geschüttelt, das Filtrat mit Thierkohle entfärbt und abgedampft, der Rückstand mit vielem Wasser zum Sieden erhitzt, die wässrige Lösung mit Thierkohle entfärbt und abgedampft, wo ein Gemenge von Lactucasäure und dem von Auberger (3) als *Lactucin* bezeichneten krystallinischen Körper zurückbleibt; aus der Auflösung in siedendem Wasser scheidet sich bei dem Erkalten Lactucin ab, und durch Verdunsten der Flüssigkeit wird unreine Lactucasäure erhalten. Diese bildet eine hellgelbe amorphe, bei langem Stehen krystallinisch werdende Masse, deren farblose wässrige Lösung durch Alkalien weinroth gefärbt wird, und bei dem Kochen mit schwefels. Kupferoxyd und überschüssigem Natron Reduction des Kupferoxydhydrats zu Kupferoxydul bewirkt. — Als Bestandtheile des deutschen Lactucariums betrachtet Ludwig: 44,4 bis 53,5 pC. Lactucon; ein weiches Harz; etwa 4 pC. eines leicht schmelz-

(1) Jahrb. pr. Pharm. XIV, 25. — (2) Arch. Pharm. [3] L, 1. 129; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 438. — (3) Quesneville's revue scientifique XI, 98; Berzelius' Jahresber. XXIV, 522.

baren wachsartigen Körpers; hauptsächlich wirksames Lactucin (welches bei dem Kochen mit schwefels. Kupferoxyd und Natronlauge gleichfalls Reduction zu Kupferoxydul bewirkt); Lactucasäure; etwa 1 pC. Oxalsäure; eine nicht flüchtige, Silberoxyd reducirende, nicht bittere Säure und eine flüchtige, baldrianähnlich riechende Säure, beide in untergeordneter Menge; gegen 7 pC. Eiweiß; wenigstens 2 pC. Mannit; eine in rhombischen Pyramiden krystallisirende, nicht bittere, neutrale, nicht gährungsfähige Substanz in geringer Menge; 3 bis 6 pC. Asche, welche Kali, Natron, Manganoxyd, Eisenoxyd und wenig Kalk enthält. — In bei 100° getrocknetem Lactucarium, welches aus bei Jena cultivirter *Lactuca virosa* frisch bereitet war, fand Ludwig:

Lactucon	42,64	} 48,63 pC. in Wasser unlösliche Bestandtheile.
Leicht schmelzbarer, wachsartiger Körper . . .	8,99	
Pflanzenfaser mit einer in Ammoniak aufquellenden, in Wasser, Weingeist und Aether unlöslichen Substanz	2,00	
Eiweiß, schwach grau gefärbt	6,98	} 51,37 pC. in Wasser lösliche Bestandtheile.
In Wasser und Weingeist von 0,830 spec. Gew. (bei 23°) lösliches, sehr bitteres Extract. .	27,68	
Wässriges, in Weingeist von 0,830 spec. Gew. unlösliches Extract	14,96	
Lactucon, durch Vermittlung der übrigen Substanzen in die wässrige Lösung übergegangen	1,75	

Eine Zusammenstellung des über die *Lactuca* in chemischer und pharmacologischer Beziehung Bekannten hat Buchner d. ä. (1) gegeben.

Cap (2) hat seine Ansichten über den Einfluss des Wassers bei dem Keimungsprocess mitgetheilt; sie enthalten nichts Neues, was einen specielleren Bericht über sie nöthig machte.

Reinsch, welcher schon früher (3) die *Radix Men.* untersucht hatte, hat jetzt (4) auch Mannit darin gefunden;

(1) Repert. Pharm. [2] XLVII, 19. — (2) Compt. rend. XXVI, 635; J. pharm. [3] XIV, 107; J. pr. Chem. XLV, 250. — (3) Jahrb. pr. Pharm. II, 388. — (4) Jahrb. pr. Pharm. XIV, 888; Pharm. Centr. 1847, 719.

von dem darin enthaltenen Harz giebt er an, daß es Kali eine krystallinische, bei Behandlung mit absolutem Alkohol und salzs. Gas eine ätherartige Verbindung, bei der Destillation ein sehr flüchtiges gelbliches Oel giebt.

Reinigswurzel.

Th. J. Herapath (1) fand die Wurzel des R. (*Raphanus sativus*) in 100 Theilen zusammengesetzt:

Wasser	95,974	Rother Farbstoff
Holzfasern	1,702	Fettes Oel
Stickstoffhaltige Substanz		Sinapin ?
mit etwas Stärkmehl	0,204	Phosphors. u. kohlenst. Erden
Albumin	0,091	mit etw. schwefels. Kalk
Extractivstoff	0,226	Essigs. Kali und Natron .
Gummi	0,430	Salpeters. Kali und Natron
Zucker	0,114	Chlorkalium u. Chlornatrium

Vertheilung
von Stärk-
mehl u. Zucker
in verschiede-
nen Wurzeln.

Payen (2) hat die Vertheilung des Stärkmehls in verschiedenen Theilen der Wurzel der *Dioscorea alata* untersucht; er bestimmte weiter die Zusammensetzung 1) Wurzel im frischen Zustand, 2) eines Stücks aus der Mitte derselben und 3) eines vom unteren Ende im trockenen Zustand:

	1)	2)	
Wasser	79,64	—	
Stickstofffreie organische Bestandtheile	17,33	85,01	74
Stickstoffhaltige „ „	1,93	9,49	11
Unorganische Bestandtheile	1,10	5,50	1

Auch über den Sitz der Secretion des Stärkmehls von Pflanzenschleim in den Wurzelknollen von *Orchis mata* und *latifolia* hat er Untersuchungen angestellt ferner über die Vertheilung des Zuckers und einiger näheren Bestandtheile in den Runkelrüben (4); glauben hierauf, als dem eigentlichen Gegenstand des Berichts zu fern liegend, nicht eingehen zu dürfen. — Ueber den Zuckergehalt der Runkelrüben haben auch Barre und Michelot Untersuchungen angestellt, von wel-

(1) Chem. Gaz. 1847, 279; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 66

(2) Compt. rend. XXV, 147. 182; Pharm. Centr. 1847, 797. — (3) Compt. rend. XXV, 380. — (4) Compt. rend. XXIV, 909. 985.

jetzt nur eine kurze Anzeige (1), ohne genauere der einzelnen Resultate, bekannt geworden ist.

Meier (2) hat eine Untersuchung der rothen Rübe Rothe Rübe.

(*lyris*) mitgetheilt, und findet als ihre Bestandtheile rätzendes Harz, Rohrzucker, unkrystallisirbaren Dextrin, Milchsäure, Erythrobetinsäure, Gummi, Pektinsäure, Buttersäure (?), Holzfaser, stickstoff- in Weingeist lösliche Substanz, Chlorcalcium, s. Magnesia, schwefels. Kalk, kohlens. Natron,

Kalk, phosphors. Kalk, phosphors. Magnesia, rd und Kieselerde. — Als *Erythrobetinsäure* bezeichnet eine leicht veränderliche Säure, welche durch Fäll- wässrigen Auszugs der getrockneten Wurzel mit essigs. Bleioxyd, Auskochen des Niederschlags mit und Zersetzen desselben mittelst Oxalsäure und st bei nicht mehr als 60°, Verdunsten der Flüssig- 40 bis 50° und Behandeln des rothgefärbten Rück- mit Alkohol (wo sich Xanthobetinsäure löse und etinsäure zurückbleibe) erhalten werde, in Wasser ei und bei langsamem Verdampfen der Lösung in chen, an der Luft unter brauner Färbung zerfließ- spiefsigen Krystallen anschiefse, und mit essigs. l einen rothen Niederschlag gebe, bei dessen Zer- durch Schwefelwasserstoff die Erythrobetinsäure rersetzt werde. — *Xanthobetinsäure* nennt Meier eine welche man in gröfserer Menge erhalte, wenn man er Hitze getrocknete Wurzeln mit kaltem Wasser , den Auszug mit einfach-essigs. Bleioxyd fälle,

schwer in Aether, leichter in Alkohol und Wasser; die Lösung werde durch Alkalien rosenroth gefärbt und bilde mit ihnen krystallisirbare Salze, mit essigs. Bleioxyd einen gelblich-braunen Niederschlag. — Buchner d. ä. (1) hat mehrere Reactionen des Rübensaftes beschrieben; er fand darin auch Aepfelsäure, salpeters. Kali und ein Ammoniaksalz.

Guajakholz. Eigene und fremde Beobachtungen über das Guajakholz und Guajakharz hat Riegel (2) zusammengestellt; als Bestandtheile des erstern betrachtet er Harz, Guajacin, schleimigen Extractivstoff (Gummi?), eine eigenthümliche Säure (Guajaksäure), Kali, Natron, Kalk, Chlor, Schwefelsäure.

Chinarinden. Chemische Untersuchungen von Chinarinden sind veröffentlicht worden: von Winckler (3) über die rothe oder dunkle Para-China; von Reichel (4) über eine fälschlich als Königschina bezeichnete Rinde; von Guilliermond (5) über gelbe China.

Sennesblätter. Bei einer Untersuchung der Sennesblätter fanden Bley und Diesel (6) kein ätherisches Oel in denselben; die Blätter (verschiedener Arten) geben 11 bis 12 pC. Asche (phosphors. und kohlen. Kalk, Chlorkalium, Spuren von Natron und Kieselerde); in ihnen ist außer Faserstoff noch ein gelber harziger Stoff (welchen Bley und Diesel als *Chrysoretin* bezeichnen), ein braunes Harz, ein brauner Extractivstoff (Lassaigne' und Feneulle's Cathartin), Pektin, gummiger Extractivstoff, Chlorophyll und etwas Fett enthalten.

Pollen. Aus dem Pollen der rothen und der weissen Lilie (*Lilium bulbiferum* und *candidum*) stellte Th. J. Herapath (7) durch Ausziehen mit Wasser, Alkohol und Aether das

(1) Repert. Pharm. [2] XLV, 175. — (2) Jahrb. pr. Pharm. XIV, 243. — (3) Repert. Pharm. [2] XLVI, 341; Pharm. Centr. 1847, 764. — (4) Arch. Pharm. [2] LIII, 288; Pharm. Centr. 1848, 346. — (5) J. pharm. [3] XI, 437; Pharm. Centr. 1847, 508. — (6) Arch. Pharm. [2] LV, 257. — (7) Chem. Soc. Qu. J. I, 1; Pharm. Centr. 1848, 764.

Pollenin als citrongelben Rückstand dar, welcher sich in kalter Salpetersäure unverändert löste und durch Wasser wieder abgeschieden werden konnte, bei dem Kochen der Lösung sich aber (ohne Bildung von Oxal- oder Pikrinsäure) zersetzte. In dem Pollen der Lilie war kein Stärkmehl zu finden; eine eigenthümliche färbende Substanz wurde in dem der rothen Lilie, nicht in dem der weissen, gefunden. In dem Pollen von *Cactus speciosissimus* schien Stärkmehl das Innere der Pollenkörner zu bilden. Der Gehalt an Pollenin in 100 Th. Pollen war bei *Lilium bulbiferum* 43,0, *Lilium candidum* 36,9, *Cactus speciosissimus* 46,6.

Pollen.

Ducom (1) fand in dem Lycopodium 62,27 bis 64,80 pC. Kohlenstoff, 8,73 bis 8,80 Wasserstoff, 6,18 Stickstoff, 20,22 bis 22,78 Sauerstoff. Aether entzieht ihm eine fette Säure, in welcher 67,54 bis 68,45 pC. Kohlenstoff und 9,43 bis 9,99 Wasserstoff gefunden wurden.

Lycopodium.

In den Beeren der wilden Rebe (*Vitis sylvestris*) fand Riegel (2) Chlorophyll, Harz, rothen Farbstoff, Pektin, Gummi, Traubenzucker, Aepfelsäure, Weinsäure, Citronensäure und geringe Mengen von Kalk und Kali.

Beeren von
*Vitis
sylvestris*.

In den Samenkapseln der Früchte von *Evonymus Europaeus* fand Grundner (3) gummösen Extractivstoff, Traubenzucker, Harz, Weichharz, Cerin, Gerbsäure, extractartigen Farbstoff nebst Salzen aus Kali, Kalk und Magnesia mit Citronensäure, Salzsäure und Schwefelsäure; in der orange-farbigen Samenhülle sehr viel gleichfarbiges fettes Oel; in der rosenrothen Samenschale viele Gerbsäure, sodann Gummi, und Kali, Kalk und Magnesia mit Salzsäure und Schwefelsäure; in den Samenkernen 28,1 pC. fettes Oel und 3,9 Harz, sodann bitteren Extractivstoff, Emulsin, Zucker, Gummi, und Kali, Kalk und Magnesia mit Weinsäure, Salzsäure und Schwefelsäure.

Früchte von
*Evonymus
Europaeus*.

(1) Aus Recueil etc. (vgl. S. 672) Avril 1847, 65 in J. pharm. [3] XII, 132. — (2) Arch. Pharm. [2] LV, 150. — (3) Repert. Pharm. [2] XLVII, 315; Pharm. Centr. 1847, 871.

Kürbis. Braconnot (1) hat vergleichungsweise mit dem gewöhnlichen Kürbis (A) eine Kürbisart von der Insel Corfa (B) untersucht, welche unter dem Namen *ami des pauvres* empfohlen wurde. Auch Zenneck (2) hat die gewöhnliche Kürbisfrucht untersucht; wir geben seine Resultate unter C.

	A	B	C
Wasser	93,48	95,40	89,50
Albumin	0,39	0,26	0,16
Orangeroths Fett	0,06	0,04	1,32
Thierische Substanz mit Schleimzucker	1,10	0,77	4,83
Schleim. Stoff, in Alkohol unlöslich.	2,90	2,04	0,00
Holzfasern	1,32	0,93	1,59
Phosphors. Kalk	0,12	0,09	0,91
„ Kali	0,06	0,04	0,67
Aepfels. Kali	0,57	0,43	0,93
Ammoniaksalze, Chlorkalium, schwefelsaures Kali	Spur	—	100,00
	100,00	100,00	

Röstkastanie;
Entbittern
derselben.

Schon vor dem Anfang dieses Jahrhunderts hat man sich damit beschäftigt, die Röstkastanien durch Entfernung des Bitterstoffs, welcher dem Stärkemehl sehr innig anhängt, genießbar zu machen. Der damals von Bon und Parmentier angezeigte Weg, das Bittere mit einer alkalischen Flüssigkeit auszuziehen, fand mehrfach Nachahmung (3). In Frankreich wendete man Kalk an; Bachmann in seiner Schrift »Ueber die Benutzung der Röstkastanien und Eichen» empfahl Potasche und Aetzlauge, Hedenus in einer ähnlichen Schrift, welche die Resultate der von der königl. sächs. Regierung veranlaßten Versuche enthält, Salmiakgeist. — Neuerdings ist dieses alte Verfahren von Flandin in Frankreich unter großem Aufsehen wieder entdeckt worden; er wendet nur statt der genannten alkalischen Stoffe Soda an. Die geschälten und zerriebenen Kastanienkerne sollen mit $\frac{1}{10}$ bis $\frac{1}{100}$ geknetet und dann ausgewaschen werden; aus dem grün gefärbten Waschwasser

(1) Ann. ch. phys. [3] XX, 357; J. pr. Chem. XLI, 468; Pharm. Centr. 1847, 612. — (2) Jahrb. pr. Pharm. XIV, 316; Pharm. Centr. 1847, 767. — (3) Schloßberger in Dingl. pol. J. CXI, 77.

setzt sich blendend weißes Stärkemehl von reinem Geschmack ab, welches als Zusatz zum Brodmehl ($\frac{1}{2}$) gebraucht werden kann (1). Belloc erklärte später, daß bloßes Wasser eben so wirksam sei als sodahaltiges; wogegen Flandin erwiederte, daß nicht nur der bittere, sondern auch der scharfe, von einem sauren Harz herührende Geschmack beseitigt werden müsse, wozu allein Soda taue (2).

Ueber Bestandtheile der *Mercurialis annua* hat, gelegentlich einer andern Untersuchung, Buchner d. ä. (3) Mittheilungen gemacht.

*Mercurialis
annua.*

Knop und Schnedermann haben ihre früheren Untersuchungen über Flechten und namentlich die *Cetraria islandica* (4) fortgesetzt, und jetzt die Bestandtheile der letztern Flechte überhaupt untersucht (5). In der ganzen, bei 120° getrockneten Flechte fanden sie 43,6 pC. Kohlenstoff, 5,8 Wasserstoff, 0,5 Stickstoff, 49,1 Sauerstoff und 1,0 Asche (in 100 Theilen der letzteren 40,0 bis 43,7 Kieselsäure, 20,3 Kali, 2,3 Natron, 5,8 Kalk, 8,3 Magnesia, 6,9 Eisenoxyd, 7,2 Manganoxyd, 6,5 phosphors. Eisenoxyd). In 100 Flechte sind enthalten etwa 70,0 Flechtenstärke, 16,7 Flechtenzellensubstanz, 2,0 Cetrarsäure, 0,9 eines Fetts, Lichesterinsäure und eines andern Körpers, 8,0 Zucker, Gummi, Extract (?) und Fumarsäure, ein stickstoffhaltiger Körper, weniger als 0,001 Lichulminsäure und Thallochlor. — Die Zellensubstanz (durch abwechselndes Ausziehen der Flechte mit Salzsäure und einer Mischung von Ammoniak und Weingeist schwierig rein und niemals farblos erhalten) fanden sie der Formel $C_{24}H_{21}O_{21}$ entsprechend zusammengesetzt. Die Flechtenstärke färbt sich

*Cetraria
islandica.*

(1) Compt. rend. XXVII, 349. 391; Pharm. Centr. 1848, 861. 893; Dingl. pol. J. CX, 319; Monit. industr. 1848, Nr. 1282 u. 1285. — (2) Compt. rend. XXVIII, 83. 138; Pharm. Centr. 1849, 252; Dingl. pol. J. CXI, 466. — (3) Repert. Pharm. [2] XLVI, 183. — (4) Ann. Ch. Pharm. LV, 144; Berzelius' Jahresber. XXVI, 585. — (5) J. pr. Chem. XL, 385; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 402.

in Jodwasser blau, aber nicht mehr wenn sie durch Kochen mit Wasser gelöst ist; ihre Zusammensetzung ist durch $C_6H_5O_5$ gegeben. Die Lichulminsäure, $C_{30}H_{18}O_{12}$, bildet sich bei der Oxydation cetrars. Salze. Knop und Schnerdmann haben die verschiedenen Bestandtheile in Beziehung darauf untersucht, durch welche Lösungsmittel sie aus der Pflanze erhalten werden können, und inwiefern sie sich durch atmosphärische Einflüsse verändern.

Conferven.

Mitscherlich (1) hat die Entwicklung und Zusammensetzung der *Conferva glomerata* untersucht; von seinen Resultaten heben wir hier die chemischen hervor. Die Pflanze besteht aus Zellen, welche alle von einer zusammenhängenden Haut (der Oberhaut) überzogen und mit einer Gallertmasse gefüllt sind. Die Wand der Zellen selbst wird durch Cellulose gebildet; sie färbt sich auf Zusatz von Jod (einer Lösung von Jod in Jodkalium oder Jodnatrium) braun und dann mit Schwefelsäure (ehe sie sich in dieser auflöst) blau. Die Substanz der Oberhaut ist von Cellulose verschieden; sie stimmt am meisten mit der Zellensubstanz der Hefe überein. Der gallertartige Inhalt der Zellen ist durch wenig Chlorophyll grün gefärbt; Jod färbt ihn braun. — In solchen Conferven, welche vor Staub geschützt sich entwickelt hatten und bei 130° getrocknet worden waren, wurden 45,70 pC. Kohlenstoff, 5,83 Wasserstoff, 5,60 Stickstoff, 30,60 Sauerstoff und 12,27 Asche (0,16 schwefels. Kalü, 0,05 Chlorkalium, 1,53 phosphors. Kalk, 2,14 kohlen. Kalk, 0,62 kohlen. Magnesia, 0,42 Thon und 7,35 Sand und Kieselsäure) gefunden.

Ueber die Zusammensetzung und Entwicklung von Pflanzen, sowie über die Zusammensetzung von Pflanzaschen, vergl. auch den Bericht über Agriculturchemie; über das Reifen der Früchte S. 807.

Schwefel- und Phosphorgehalt der Pflanzen.

Ueber den Gehalt der Feldfrüchte an Schwefel und Phosphor (welche Elemente bekanntlich durchaus nicht

(1) Berl. Acad. Ber. 1847, Novbr., 430; J. pr. Chem. XLIII, 156; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 337; Instit. 1848, 186.

mit Sicherheit aus den entsprechenden Säuren in der Asche berechnet werden können) hat H. C. Sorby (1) eine Reihe von Versuchen unternommen. Er kochte die Vegetabilien bis zur völligen Zerstörung mit Salpetersäure (ob unter Zusatz von chlores. Kali, wie Erdmann vorschreibt, ist nicht angegeben), und filtrirte. Nach der Fällung des Filtrats mit Chlorbaryum und Abscheidung des schwefels. Baryts wurde die Flüssigkeit mit wenig essigs. Bleioxyd und dann mit schwach überschüssigem Aetzammoniak versetzt, der Niederschlag gewaschen und getrocknet vorsichtig durch Erhitzen zu einem Gemenge von Blei, Bleioxyd und phosphors. Bleioxyd zersetzt, dieses Gemenge in Salpetersäure gelöst, Ammoniak bis zur Fällung von basisch-salpeters. Bleioxyd zugesetzt, und dann Essigsäure zugefügt, welche das phosphors. Bleioxyd ungelöst liefs. Die nachstehenden Zahlen geben den Schwefel- und Phosphorgehalt in 100 Th. bei 100° getrockneter Substanz (2).

	Gehalt an			Gehalt an	
	Schwe- fel	Phos- phor		Schwe- fel	Phos- phor
<i>Poa palustris</i> und <i>trivialis</i> ;			<i>Brassica rapa</i> , Rüben . .	0,351	0,352
<i>Festuca pratensis</i> , <i>Cyno-</i>			Dieselben . .	0,421	0,346
<i>surus cristatus</i>	0,165	0,164	" Kraut . .	0,758	0,360
<i>Lolium perenne</i>	0,310	0,183	Desgleichen . .	0,615	0,380
Italienisches Ryegrass . .	0,329	0,145	<i>Brassica oleracea</i> , schwed.		
<i>Trifolium pratense</i>	0,107	0,149	Turnips . .	0,435	0,172
Dasselbe	0,087	0,131	" Kraut . .	0,458	0,250
<i>Trifolium repens</i> (sehr gute Art)	0,099	0,183	<i>Brassica oleifera</i> , Raps . .	0,448	0,233
" " (gewöhnl. Art)	0,151	0,139	Weißer Kohl	0,431	0,267
<i>Medicago lupulina</i> (sehr gut)	0,136	0,052	Weizen, ganze Pflanze, kurz		
<i>Medicago sativa</i>	0,274	0,046	vor der Blüthe	0,151	0,248
Dasselbe	0,452	0,215	Desgleichen	0,170	0,140
Dasselbe	0,293	0,353	Weizenähre (Körner noch		
<i>Vicia sativa</i>	0,178	0,183	milchig)	0,075	0,271
Nierenkartoffeln	0,094	0,213	Weizenstroh (ebenso) . .	0,240	0,132
Kraut derselben	0,389	0,357	Reife Weizenähren . . .	0,090	0,336
Früchte derselben	0,071	0,597	Stroh derselben	0,213	0,043
Amerikanische Kartoffeln .	0,082	0,212	Rother Weizen	0,070	0,363
Kraut derselben	0,206	0,483	Stroh desselben	0,293	0,079
<i>Daucus carota</i> , Rüben . . .	0,092	0,255	Weißer Weizen (von dems.		
" Kraut	0,745	0,382	Felde)	0,054	0,366
<i>Beta altissima</i> , Wurzel . . .	0,058	0,190	Stroh desselben	0,207	0,112
" Kraut	0,502	0,293	Andre Probe von Weizen .	0,051	0,410

(1) Phil. Mag. [3] XXX, 330; Chem. Soc. Mem. III, 281; Dingl. pol. J. CV, 227; J. pr. Chem. XLI, 141; Pharm. Centr. 1847, 567. —
(2) Vgl. Erdmann üb. d. Schwefelgehalt d. Samen (J. pr. Chem. XXXIX, 281).

	Gehalt an			Gehalt an	
	Schwefel	Phosphor		Schwefel	Phosphor
Spreu von Weitzen	0,091	0,252	Stroh desselben	0,401	0,153
Sehr gute Gerste	0,066	0,498	Weißer Hafer	0,074	0,382
Stroh davon	0,390	0,087	Stroh desselben	0,195	0,057
Geringere Sorte Gerste . . .	0,040	0,367	Roggenähren, junge	0,073	0,076
Stroh davon	0,191	0,065	Stroh davon	0,099	0,153
Blühende Gerste	0,313	0,236	Roggen	0,051	0,160
Haferpflanze, in Blüthe tretend	0,226	0,194	Bohnenpflanzen	0,045	0,256
" blühend	0,189	0,189	Bohnen	0,071	0,600
Grüner Hafer	0,125	0,317	Bohnenstroh	0,148	0,233
Stroh desselben	0,829	0,128	Erbsen, <i>Pisum sativum</i>	0,158	0,206
Schwarzer tartar. Hafer . . .	0,080	0,381	Stroh davon	0,214	0,076
Stroh desselben	0,271	0,110	Guter Hopfen	0,127	0,574
Weißer Hafer	0,090	0,334	Ranken desselben	0,091	0,136

Einfachere
Bestand-
theile des
Thierkör-
pers und
Aehnliches.
S. g. Protei-
nverbindungen
im
Allgemeinen.

Bekanntlich ist in der neuern Zeit gefunden worden, daß nach Mulder's Vorschriften zur Darstellung eines schwefelfreien Körpers, des s. g. Proteins, aus Albumin u. a. mittelst Kalilauge ein solcher keineswegs erhalten wird. Fleitmann (1) zeigte, daß auch nach der von Mulder zuletzt dafür angegebenen Methode ein solcher nicht darzustellen ist, auch nicht wenn Wismuthoxydhydrat um die Entschweflung zu befördern angewandt wurde, sondern daß in dem so erhaltenen Präparat noch 1,35 bis 1,48 pC. Schwefel enthalten waren, welcher Schwefelgehalt weder einer Verunreinigung durch beigemengtes unzersetztes Albumin, noch einer Beimengung von freiem Schwefel, noch einer Verbindung von s. g. Protein mit Schwefelsäure zugeschrieben werden konnte (in dem aus gereinigtem Albumin durch längere Digestion mit Kalilauge und Wismuthoxydhydrat, Eindampfen im Wasserbad zur Trockne, Lösen in Wasser, Filtriren und Fällung des Filtrats durch Essigsäure erhaltenen Präparat fand Fleitmann außerdem 53,8 bis 54,1 pC. Kohlenstoff, 7,1 bis 7,3 Wasserstoff, 15,9

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 121; Pharm. Centr. 1847, 72.

bis 16,2 Stickstoff). — Mulder selbst (1) hat nun die Ansicht ausgesprochen, daß die Frage, ob ein schwefelfreies Protein existire (— die Annahme und angebliche Darstellung eines solchen war der Ausgangspunkt der ganzen Theorie der Proteinverbindungen —), gar nicht mehr zu discutiren sei; Schwefel und Phosphor seien in den Proteinverbindungen, dem Eiweiß, den Haaren u. s. w., in Form von (hypothetischem) Sulfamid SNH_2 und (hypothetischem) Phosphamid PNH_2 enthalten (2); ein Oxyd des (hypothetischen) Proteins könne sich gleichfalls mit diesen (hypothetischen) Amiden vereinigen, und ähnliche Verbindungen bilden. Unter Entschwefeln des Eiweißes dürfe man nicht eine Entfernung des Schwefels verstehen, sondern Zersetzung des darin enthaltenen Sulfamids; diese gehe vor sich unter Bindung der Elemente des Wassers, Entwicklung von Ammoniak und Bildung von S_2O_2 , welcher letztere Körper bei Zusatz einer Säure sich in veränderlicher Menge mit dem Protein verbinde (so daß sich also nach Mulder Eiweiß entschwefeln läßt, ohne daß es schwefelfrei wird); nur in ähnlicher Weise könne von Entphosphoren des Eiweißes die Rede sein. Er findet jetzt in dem Fibrin 1,2 pC. Schwefel, in dem durch Kali daraus dargestellten s. g. entschwefelten Protein 0,72 pC. Schwefel; in dem aus Eiweiß durch Kali dargestellten Protein 1,6 pC. Schwefel, in einer Form, wo der Schwefel nicht auf Silber oder Blei reagirt. Er beschreibt verschiedene Versuche, nach welchen der Schwefelgehalt in s. g. proteinartigen Verbindungen vergrößert wird, wenn man auf ihre alkalische Lösung

s. g. Protein-
verbindungen
im
Allgemein.

(1) Scheik. Ond. IV, 195; Repert. Pharm. [2] XLVII, 1. 145. 289; XLVIII, 1. 145; J. pr. Chem. XLIV, 488; Chem. Gaz. 1849, 12. 29. —

(2) Diese Ansicht ist durch keine Bestimmung unterstützt, in welchem Verhältniß Ammoniak und eine Säure des Schwefels bei der Zersetzung durch Kali sich bilden, und der Umstand, daß ein Theil des Schwefels in Schwefelkalium übergeht, spricht dagegen; es ist in keiner Art nachgewiesen, daß bei der Zersetzung durch Kali bei Abschlufs der Luft sich solche Säuren bilden, wie sie bei der Zersetzung eines solchen Sulfamids und eines solchen Phosphamids auftreten müßten.

s. g. Protein-
verbindungen
im
Allgemeinen.

schweflige Säure oder unterschweflige Säure einwirken läßt. Er bestimmt die Zusammensetzung des hypothetischen Proteins, indem er von der Zusammensetzung des s. g. entschweiften die dem Gehalt an Schwefel entsprechende Menge von S_2O_2 abzieht, und kommt zu dem Schluss, das Protein sei nach der Formel $C_{36}H_{25}N_4O_{10} + 2HO$ zusammengesetzt. Weiter sucht er aus seinen Ansichten über den Zustand des Schwefels im Eiweiß die Einwirkung von Kali und von Chlor auf dasselbe zu erklären, und theilt seine Ansichten über die Verbindungen des Proteins und des Eiweißes, über Prot-oxyprotein, Tri-oxyprotein u. s. w. mit; deren speciellere Mittheilung bei der Unsicherheit ihrer Grundlage unterlassen werden kann. — In einer Abhandlung über die Proteinverbindungen des Pflanzenreichs (1) giebt Mulder für den Schwefelgehalt des Albumins aus Weizen 1,04, aus Roggen 0,77 pC. Schwefel. Im übrigen verweisen wir auf diese Abhandlungen selbst, so wie auch auf eine über das Protein des Fleisches (2) und auf eine Uebersicht, wieviel Sulfamid und Phosphamid Mulder in verschiedenen s. g. Proteinverbindungen annimmt (3).

De Vry (4) hat angegeben, daß bei der Einwirkung von chloriger Säure auf Protein und Leim sich in Wasser lösliche Producte bilden, und nichts von dem, was Mulder durch die Einwirkung von Chlor auf Protein- oder Leimlösung erhielt und als chlorigs. Protein und chlorigs. Leim bezeichnete.

Schwefel-
gehalt
thierischer
Substanzen.

Beim Erhitzen von Fibrin, Albumin, Casein u. s. w. mit Kalilauge tritt ein Theil des Schwefels an das Alkali unter Bildung von Schwefelkalium, ein anderer Theil bleibt mit der organischen Substanz verbunden, und verhält sich in dieser Hinsicht wie der Schwefel des Taurins. Th. Fleitmann (5) hat die Menge des austretenden Schwefels in

(1) Scheik. Ond. IV, 404; Arch. Pharm. [2] LV, 187; J. pr. Chem. XLIV, 503. — (2) Scheik. Ond. IV, 402; J. pr. Chem. XLIV, 505. — (3) Scheik. Ond. IV, 421; J. pr. Chem. XLV, 376. — (4) Ann. Ch. Pharm. LXI, 248. — (5) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 380.

der Weise bestimmt, daß er den Körper in verdünnter Kalilauge löste, mit frisch gefälltem Wismuthoxydhydrat 6 bis 8 Stunden digerirte, alsdann mit Essigsäure übersättigte und in dem abfiltrirten Schwefelwismuth durch Schmelzen mit Kali und Salpeter den Schwefel oxydirte. Er erhielt so für 100 Th. folgende Zahlen im Mittel :

	Eierklotzen	Fibrin	Krystalle	Albumin (aus Blut)	Casein
Totalgehalt an Schwefel	4,14	—	—	—	—
Anstretender Schwefel	2,61	0,52	0,37	1,03	0,07

Schwefel-
gehalt
thierischer
Substanzen.

C. Schmidt (1) hat das specifische Gewicht mehrerer thierischer Substanzen bestimmt. Die untersuchten Substanzen hinterließen bei der Verbrennung Asche; die an ihnen unmittelbar gefundenen spec. Gew. sind unter A angegeben; er bestimmte die Zusammensetzung der Asche und das spec. Gewicht ihrer Bestandtheile und corrigirte das spec. Gew. der Substanzen für diesen Aschengehalt (die von ihm gefundenen Resultate stehen unter B), aber nach irrigen Formeln für den Zusammenhang zwischen dem spec. Gew. einer Mischung und dem ihrer Bestandtheile. Ein Ungenannter (2) hat darauf aufmerksam gemacht, und die Rechnung berichtigt (mit den unter C angegebenen Resultaten). Es wurde gefunden :

Spec. Gew.
thierischer
Substanzen.

	A	B	C
für Blutkörperchen	1,2507	1,2090	1,239
„ Muskelfibrin	1,2833	1,2678	1,276
„ Albumin aus Hühnereiern	1,3144	1,2617	1,286
„ Sehnen	1,3011	1,2960	1,299

Auf unrichtige Formeln gestützt ist auch der Vorschlag von Schmidt (3), aus dem spec. Gew. des Serums und des defibrinirten Bluts den Gehalt an Albumin und Blutkörperchen zu berechnen.

Baumhauer (1) hat das Muskelgewebe verschiedener Fische untersucht. Die Muskelmasse wurde fein gehackt,

Muskel-
gewebe der
Fische.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 156; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 456. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 129; Schmidt's Zustimmung zu der Berichtigung daselbst LXXII, 175. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXI, 165. — (4) Scheik. Ond. IV, 293; Jahrb. pr. Pharm. XVIII, 51. 129; J. pr. Chem. XLIV, 506; Pharm. Centr. 1849, 90.

Muskel-
gewebe der
Fische.

mit kaltem Wasser geknetet, so lange dieses etwas aufnahm, mit einer größeren Menge Wasser auf 80 bis 90° erhitzt, mit Essigsäure übergossen, dann mit siedendem Wasser ausgewaschen, getrocknet, mit Alkohol und mit Aether ausgezogen und bei 120° getrocknet. Im Mittel gaben 100 Muskelgewebe vom Thunfisch (*Solea vulgaris* N., *Pleuronectes solca* L.) 1 pC. Asche, und, nach Abzug der Asche, 53,4 pC. Kohlenstoff, 7,15 Wasserstoff, 15,3 Stickstoff; von der Scholle (*Rhombus barbatus* N., *Pleuronectes rhombus* L.) 0,40 pC. Asche, und 53,4 pC. Kohlenstoff, 7,1 Wasserstoff, 15,3 Stickstoff. — Das wie oben angegeben behandelte, aber nicht mit Essigsäure ausgezogene Muskelgewebe des Schellfisches (*Merlangus vulgaris*; *Gadus merlangus* L.) ergab 1,25 pC., das mit Essigsäure ausgezogene 1,20 pC. Schwefel; das mit Essigsäure ausgezogene Muskelgewebe des Thunfisches 0,84 pC. Schwefel. — Nach der Lösung des Muskelgewebes in verdünnter Kalilauge und Fällung mit Essigsäure, Waschen des Niederschlags mit siedendem Wasser, Alkohol und Aether und Trocknen bei 120° wurden in einem solchen Präparat von dem Thunfisch 54,8 pC. Kohlenstoff und 7,0 Wasserstoff; von der Scholle 54,7 pC. Kohlenstoff, 7,1 Wasserstoff und 14,7 Stickstoff gefunden; vom Schellfisch 0,88 bis 1,06 pC. Schwefel. Baumhauer hat noch weitere Analysen der Niederschläge ausgeführt, welche durch Ammoniak in warm oder kochend bereiteten Lösungen von Muskelgewebe in Essigsäure hervorgebracht werden; bezüglich der specielleren Resultate wie auch der Reactionen der verschiedenen Lösungen müssen wir auf die Abhandlung verweisen.

Schleimhaut-
epithelium.

Die freien Oberflächen des Thierkörpers sind mit einer mehr oder minder mächtigen Schicht kernhaltiger Zellen überzogen, deren Gesamtheit ein organisirtes Gewebe darstellt, welches je nach den Oertlichkeiten seines Vorkommens verschiedene Namen erhalten hat und als gefäß- und nervenlos bekannt ist. An der äußeren Hautoberfläche wird es als *Epidermis*, an den inneren freien Ober-

flächen und Höhlenwandungen aber als *Epithelium* bezeichnet. — Scherer (1) hatte schon früher die Elementarzusammensetzung der Epidermis ausgemittelt; Gorup-Besanez (2) hat nun auch die des Epitheliums, und zwar des Schleimhautepitheliums eines Wallfisches, wie es durch Schaben aus den Barten dieses Thieres erhalten wird, bestimmt. Unter dem Mikroscope zeigte es sich aus ausgebildeten Pflasterepithelien bestehend, die in ihrer Structur wie in ihrem chemischen Verhalten von denen des Menschen nicht abweichen. Nach wiederholter Behandlung mit Wasser, Alkohol und Aether, Trocknen und Zerreiben bildete es ein gelbweißes, electrisches, in Kalilauge schwer lösliches Pulver. Die alkalische Lösung gab mit Essigsäure eine im Ueberschuss der Säure lösliche Fällung; die letztere Lösung gab mit Ferrocyankalium einen Niederschlag. Kochende Salzsäure löste es mit blauer Farbe, ähnlich den eiweißartigen Körpern. Die Analyse gab :

	Epithelium	Epidermis
	Gorup-Besanez	Scherer
Kohlenstoff	51,53	50,34
Wasserstoff	7,08	6,81
Stickstoff	16,64	17,22
Sauerstoff	22,32	25,63
Schwefel	2,48	nicht bestimmt.

Gorup-Besanez hält den Unterschied nicht für so groß, daß er einer Verschiedenheit beider Substanzen zugeschrieben werden könnte.

P. Iljenko (3) hat die Fäulnisproducte des reinen aus Milch bereiteten Caseins studirt. Es wurde mit Wasser übergossen an der Luft mehrere Sommermonate hindurch sich selbst überlassen. Die flüchtigen Producte seiner Zersetzung waren Kohlensäure, Schwefelwasserstoff, Ammoniak, Buttersäure, Valeriansäure, und ein eigenthümlich riechender, nicht saurer, ölartiger, an der Luft sowie durch Säuren leicht veränder-

Schleimhaut-
epithelium.Casein.
Fäulnispro-
ducte
desselben.

(1) Ann. Ch. Pharm. XL, 46. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXI, 49; Pharm. Centr. 1847, 318. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 264; Pharm. Centr. 1848, 3.

licher Körper. Seine Menge reichte zu einer näheren Untersuchung nicht hin. Auch in dem Limburger Käse bemerkten Iljenko und Laskowsky einen ähnlichen Stoff. Die nicht flüchtigen Fäulnisproducte sind Leucin und Casein in löslichem Zustande. Die Löslichkeit des letzteren ist durch das Ammoniak vermittelt; Leucin und Valeriansäure sind von Liebig auch als Zersetzungsproducte des Caseins durch schmelzendes Kali nachgewiesen worden.

Casein.
Umwandlung
in Fett.

Blondeau (1) hat die Veränderungen untersucht, welche der Roquefort-Käse in den Kellern erleidet, in welchen man ihn aufbewahrt bis er die im Handel an ihm gewünschten Eigenschaften hat. Er fand in ihm vor der Aufbewahrung nur etwa $\frac{1}{10}$ seines Gewichts an fetter Substanz; aber nach zweimonatlicher Aufbewahrung war fast alles Casein in ein butterähnliches, leicht verseifbares Fett übergegangen, welches bei 40° schmilzt, bei 80° siedet und gegen 150° hin zersetzt wird. Diese Umwandlung war mit der Entwicklung von Pilzen verbunden (Blondeau unterschied *Penicillium glaucum*, *Penicillium globulosum*, *Torula viridis* und *Torula aurantiaca*), welche alle stickstoffhaltig sind. Fibrin erlitt unter denselben Umständen eine ähnliche Umwandlung.

Albumin aus
Fisch- und
Hühnerfleisch.

H. Weidenbusch (2) hat das Albumin des Hecht- und Hühnerfleisches untersucht. Es wurde durch Ausziehen von zerhacktem Hecht- und Hühnerfleisch mit Wasser, Erhitzen des Auszugs zum Sieden und Behandeln des abgepressten und mit Wasser gewaschenen Albumins mit Alkohol und Aether rein erhalten. Nahe übereinstimmende Analysen gaben im Mittel :

	Kohlenstoff	Wasserstoff	Stickstoff	Schwefel	Sauerstoff	Asche
Albumin v. Hecht:	52,6	7,3	16,5	1,6	21,8	0,2
„ „ Huhn:	53,2	7,0	15,7	1,6	22,3	0,2

(1) Compt. rend. XXV, 360; im Ausz. J. chim. méd. [3] IV, 80; Pharm. Centr. 1848, 378. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXI, 370; Pharm. Centr. 1847, 428.

Baumhauer (1) hat das lösliche Eiweiß der Fische untersucht. Der kalte wässerige Auszug aus dem gehackten Fischfleisch wurde bei 50° zum Coaguliren gebracht, das Coagulum mit kochendem Wasser, Alkohol und Aether ausgezogen und bei 120° getrocknet; das so dargestellte Präparat von der Scholle (*Rhombus barbatus* N.; *Pleuronectes rhombus* L.) enthielt 1,00 pC. Asche, 1,03 Schwefel und 0,72 Phosphor; das von dem Schellfisch (*Merlangus vulgaris*; *Gadus merlangus* L.) 0,50 pC. Asche, 1,31 Schwefel und keinen Phosphor. — Das Coagulum wurde in kochender Essigsäure gelöst und sodann Ammoniak zugesetzt, so daß die Flüssigkeit noch sauer reagirte, der Niederschlag (A) mit siedendem Wasser, Alkohol und Aether ausgewaschen und bei 120° getrocknet; er enthielt dann (von der Scholle) 0,37 pC. Asche, 54,4 Kohlenstoff, 7,0 Wasserstoff, 15,8 Stickstoff und (von dem Schellfisch) 1,5 Schwefel. — Das Coagulum wurde in verdünnter Kalilauge gelöst, einige Zeit bei 90° erhalten, anhaltend Luft hindurch geleitet, filtrirt, das Filtrat mit Essigsäure gefällt und der Niederschlag (B) weiter wie der vorhergehende behandelt; er enthielt (von der Scholle) 0,5 pC. Asche, 54,7 Kohlenstoff, 7,0 Wasserstoff, 14,6 Stickstoff und (von dem Schellfisch) 1,1 Schwefel. Baumhauer betrachtet, Mulder's Ansichten folgend, den Niederschlag A als $10 (C_{36} H_{12} N_4 O_{10}) + 4 (SNH_2 + HO)$ (2), den Niederschlag B aber als $20 (C_{36} H_{12} N_4 O_{10} + HO) + 3 S_2 O_2$.

Lösliches
Albumin der
Fische.

Die Analysen des Vitellins durch Jones (3), Dumas und Cahours (4), Goble (5) und Baumhauer (6) hatten nicht übereinstimmende Resultate ergeben; Noad (7) hat die Analyse dieses Körpers aufs Neue unternommen.

Vitellin.

(1) Scheik. Onderzoek. IV, 322; J. pr. Chem. XLV, 120; Pharm. Centr. 1848, 858. — (2) Da das hypothetische Sulfamid durch Hinzutreten von Wasser gerade auf Ammoniak und unterschweflige Säure liefern kann, ($2 NH_2 + S_2 O_2$); so ist das Hindurchleiten von Luft nicht verständlich. — (3) Ann. Ch. Pharm. XL, 65. — (4) Ann. ch. phys. [3] VI, 385; Berzelius' Jahresber. XXIII, 590. — (5) Berzelius' Jahresber. XXVI, 914. — (6) Scheik. Ond. III, 272; Berzelius' Jahresber. XXVII, 674. — (7) Chem. Gaz. 1847, 409.

Vitellin. Zu der Darstellung desselben wurde das Gelbe hartgekochter Eier sorgfältig von dem Weißen gesondert, zweimal mit kochendem Alkohol und dann wiederholt mit Aether behandelt, bis der letztere sich nicht mehr färbte und das Vitellin ganz weiß war. Bei Wiederholung von Baumhauer's Methode der Reindarstellung, das Vitellin in Essigsäure zu lösen und mit kohlens. Ammoniak zu fällen, erhielt er auf Zusatz des letztern so wenig Niederschlag, daß er von dieser Methode abstand. In 100 Theilen des bei 100° getrockneten (durch Trocknen bei 130 bis 150° färbt es sich) Vitellins wurden gefunden :

Kohlenstoff	53,95	53,85	54,08
Wasserstoff	7,84	7,71	7,83
Stickstoff	13,02	12,60	—
Schwefel	1,85	1,50	—

Ueber den Schwefelgehalt von Pflanzenalbumin vgl. S. 336.

Legumin. Das Legumin hatten Scherer (1), Jones (2), Dumas und Cahours (3), Rochleder (4) und Rüling (5) analysirt, mit Resultaten, welche um mehr als 4 pC. Kohlenstoff und mehr als 3 pC. Stickstoff differirten. Noad (6) hat neue Analysen des Legumins veröffentlicht; seine Resultate stimmen mit denen von Jones am nächsten überein. Das Legumin war zum Theil aus Erbsen, zum Theil aus Bohnen dargestellt; beide Früchte wurden 24 Stunden lang mit Wasser zusammen stehen lassen, die Flüssigkeit nach dem Absetzen des Stärkmehls durch Leinwand filtrirt, das Legumin mit Schwefelsäure niedergeschlagen, auf einem Filter mit destillirtem Wasser gewaschen, in Ammoniak gelöst, filtrirt, durch Essigsäure niedergeschlagen und ausgewaschen, mit Alkohol und mit Aether digerirt und getrocknet. Es wurden in 100 Theilen gefunden (der

(1) Ann. Ch. Pharm. XL, 1; Berzelius' Jahresber. XXII, 276. — (2) Ann. Ch. Pharm. XL, 65; Berzelius' Jahresber. XXII, 276. — (3) Ann. ch. phys. [3] VI, 885; Berzelius' Jahresber. XXIII, 591. — (4) Ann. Ch. Pharm. XLVI, 155; Berzelius' Jahresber. XXIV, 459. — (5) Ann. Ch. Pharm. LVII, 801. — (6) Chem. Gaz. 1847, 857; Pharm. Centr. 1847, 862.

Kohlenstoff und Wasserstoff wurden durch Verbrennen mit chroms. Bleioxyd, der Stickstoff durch Glühen mit Natron-Kalk, der Schwefel gar nicht bestimmt) :

	Aus Erbsen				Aus Bohnen		
	b. 100° getr.	b. 100° getr.	b. 150° getr.	?	b. 100° getr.	b. 150° getr.	?
Kohlenstoff	52,76	52,79	54,40	—	53,57	55,06	—
Wasserstoff	7,88	7,89	7,53	—	7,79	7,59	—
Stickstoff	—	—	—	15,94	—	—	15,26

Andere Resultate fand Norton (1) für die Zusammensetzung des Legumins. Er bereitete dieses aus dem Mehl von gewöhnlichen grünen Erbsen und aus dem Mehl von stark ausgepressten süßen Mandeln. Diese Substanzen wurden mit Wasser zusammengerieben, vieles Wasser zugesetzt, nach 12 bis 16 Stunden durch Leinwand und dann wiederholt durch Papier filtrirt, das Filtrat durch Essigsäure gefällt, der Niederschlag gewaschen, bei gelinder Wärme in verdünntem Ammoniak gelöst (um je stärkere Wärme und concentrirtere Ammoniakflüssigkeit angewandt wurden, um so dunklere Färbung trat ein), filtrirt, das Filtrat wiederum durch Essigsäure niedergeschlagen, und der Niederschlag wiederholt mit Alkohol und mit Aether ausgezogen. Wir geben unten die Mittel der unter sich wohl übereinstimmenden Analysen, nach Abzug der Asche auf 100 berechnet. 1) ist (bei 130° getrocknetes) Legumin aus Mandeln, welches vor dem Kochen mit Aether und Wasser in starkem Ammoniak gelöst war (es war fast weiß und enthielt 0,17 pC. Asche); 2) Legumin aus Mandeln, welches vor dem Auflösen in starker Ammoniakflüssigkeit mit Alkohol und mit Aether gekocht war (es war dunkel gefärbt und enthielt 0,35 pC. Asche); 3) Legumin aus Mandeln, welches nach dem Niederschlagen mit Essigsäure nur mit Alkohol und mit Aether gekocht und nicht in Ammoniak gelöst worden war (es war weiß und enthielt 0,55 Asche); 4) Legumin aus Erbsen, welches vor dem Kochen mit Alkohol und mit Aether in Ammoniak gelöst

(1) Sill. Am. J. [2] V, 22; Pharm. Centr. 1848, 241.

Legumin. worden war (es war fast weiß und enthielt 0,77 pC. Asche); 5) Legumin aus Erbsen, welches nach dem Kochen mit Alkohol und mit Aether in Ammoniak gelöst worden war (es enthielt 1,23 pC. Asche). — Legumin aus Mandeln und aus Erbsen löst sich leicht in kaltem Wasser, und auf Zusatz von wenig Salz- oder Essigsäure bildet sich sogleich ein reichlicher Niederschlag; bei dem Kochen der Lösung des ersteren bildet sich sogleich ein reichlicher Niederschlag, während bei dem Kochen der Lösung des letztern sich kein solcher bildet; in Ammoniak sind beide löslich; die Lösung des ersteren wird durch essigs. Bleioxyd gefällt, die des letztern nur getrübt. — In dem Hafer ist in geringer Menge eine ähnliche, durch Wasser ausziehbare Substanz enthalten, welche aber durch verdünnte Salz- oder Essigsäure nicht sogleich, sondern nur allmählig gefällt wird, und nicht sogleich bei dem Kochen, sondern erst bei dem Abkühlen einen Niederschlag giebt, sich in Ammoniak löst, und durch essigs. Bleioxyd gefällt wird; dieser Körper, für welchen Johnston die Bezeichnung *Avenin* vorschlug, zeigte die unter 6) angegebene Zusammensetzung (nach Abzug der Asche, von welcher er 0,75 pC. enthielt). Nach Ausziehung des Avenins aus dem Hafer gab dieser mit verdünntem Ammoniak eine braune Lösung, welche filtrirt und mit Essigsäure gefällt wurde. Der hellbraune Niederschlag, in verdünntem Ammoniak gelöst, mit Essigsäure wieder niedergeschlagen, und mit Alkohol und Aether gekocht, ergab nach Abzug der Asche die Zusammensetzung 7) (er war dann bräunlich-weiß und enthielt 0,86 pC. Asche); war die Lösung in Ammoniak mit Alkohol und mit Aether gekocht hingegen die Zusammensetzung 8) (er enthielt dann gleichfalls 0,86 pC. Asche, war aber heller gefärbt als der vorhergehende). Die Stickstoffbestimmungen geschahen nach Dumas', die Phosphorbestimmungen nach Berthier's Methode, die Schwefelbestimmung durch Oxydation mittelst Erhitzen der Substanz mit kaustischem Natron.

	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	Legumin.
Kohlenstoff	50,50	50,97	49,16	50,72	50,57	52,36	53,27	51,82	
Wasserstoff	6,56	6,64	6,51	6,56	6,90	6,85	6,94	6,86	
Stickstoff	17,33	17,15	17,43	15,77	16,84	14,76	16,81	16,39	
Sauerstoff	24,24	24,40	24,27	23,87	23,70	24,16	21,56	22,82	
Schwefel	0,32	0,27	0,41	0,77	0,33	1,06	0,59	1,11	
Phosphor	1,05	0,57	2,21	2,31	1,66	0,81	0,83	1,00	

Norton schließt sich Mulder's Ansicht (S. 835) an, daß der Schwefel und der Phosphor in Form von Amidn von der Zusammensetzung der vorhergehenden Substanzen in Abzug zu bringen seien, und daß das Legumin der Erbsen und das Avenin als Proteinoxyde zu betrachten seien.

Hunt (1) hat vorgeschlagen, für die Zusammensetzung des Leins die Formel $C_{24}H_{20}N_4O_8$ anzunehmen; derselbe sei eine amidartige Verbindung der Cellulose oder des Stärkmehls, $2(C_{12}H_{10}O_{10}) + 4NH_3 - 12HO = C_{24}H_{20}N_4O_8$. — — — Leim.

Laurent (2) hat die Ansicht ausgesprochen, das Glycocol (Leimzucker; $C_4H_5NO_4$) lasse sich als eine Amidsäure betrachten, und zwar der Säure, welche Horsford durch Einwirkung oxydirender Mittel aus dem Glycocol erhalten und (mit Baryt verbunden) als nach der Formel $C_4H_5O_6$ zusammengesetzt betrachtet hatte, für welche aber Gerhard die Formel $C_4H_5O_6$ vorgeschlagen hatte ($NH_4O, C_4H_5O_6 - 2HO = C_4H_5NO_4$). Laurent schlägt für letztere Säure die Bezeichnung Glycolsäure vor, wo dann das Glycocol nach seinen Ansichten als Glycolamsäure zu benennen wäre. Glycocol.

Glycocol, in concentrirter Salpetersäure gelöst und mit Stickoxydgas behandelt, giebt nach Strecker (3) eine stickstofffreie Säure, deren Zusammensetzung nach ihm wahrscheinlich $C_4H_4O_6$ (als s. g. Hydrat) ist. Sie wäre also die im Vorstehenden als Glycolsäure bezeichnete Säure.

(1) Sill. Am. J. [2] V, 74; VI, 259. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 110; J. pr. Chem. XLV, 168. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 55.

Zersetzungs-
producte von
Casein, Albumin,
Fibrin
und Leim.

Dieses, die *nicht sauren Producte* enthaltende, Destillat war neutral, säuerte sich jedoch bald an der Luft; bei wiederholter Rectification wurde zuletzt eine milchige Flüssigkeit erhalten, auf welcher eine Schicht eines leichteren gelben Oels von scharfem Geruche schwamm; aus der von diesem leichteren Oel getrennten milchigen Flüssigkeit schieden sich nach einiger Zeit einige Tropfen eines schwereren Oels, welche sich an der Luft in eine weiße krystallinische Masse verwandelten. Vorsichtige Rectification des leichteren gelben Oels im Wasserbad ergab folgende Substanzen. Bei 40 bis 50° ging ein Destillat über, aus welchem das *Aldehyd der Essigsäure* ($C_4H_4O_2$; beobachteter Siedepunkt 23 bis 28°, spec. Gew. 0,796 bei 15°) und seine Ammoniakverbindung dargestellt werden konnten. — Bei 65 bis 70° gieng ein Destillat über, welches mit Chlorcalcium entwässert einen zwischen 40 und über 70° veränderlichen Siedepunkt hatte; das hierbei zwischen 50 und 70° Uebergehende hatte noch keinen constanten Siedepunkt; das bei der letzten Rectification zwischen 55 und 60° Uebergegangene war eine farblose, angenehm ätherartig riechende Flüssigkeit von 0,79 spec. Gew. bei 15°, mit Wasser, Alkohol und Aether in allen Verhältnissen mischbar, neutral, aber an der Luft langsam, mit Platinschwarz ziemlich rasch sauer werdend, durch Kali nicht verändert werdend und mit salpeters. Silberoxyd keinen Metallspiegel gebend, deren Zusammensetzung mit der des *Aldehyds der Metacetonsäure*, $C_4H_4O_2$, übereinstimmte und deren Dampfdichte (2,17 gefunden, 2,01 berechnet) dieser Formel unter Voraussetzung einer Condensation auf 4 Vol. entsprach; die mit Platinschwarz gebildete Säure ging verloren, das oben angegebene Verhalten zu Kali und Silberlösung entspricht nicht dem der Aldehyde im Allgemeinen, und es konnte auch eine Verbindung mit Ammoniak nicht erhalten werden. — Die in dem Destillationsgefäße rückständige Flüssigkeit zeigte sich nun in zwei Schichten, eine untere wässrige und eine obere gelbe öartige, getheilt; bei 100° destillirte ein farb-

loses, in Wasser wenig lösliches Oel über, das *Aldehyd* Zersetzungs-
producte von
Casein, Albu-
min, Fibrin
und Leim. *der Buttersäure*, $C_4H_8O_2$, vom Siedepunkt 68 bis 73°, spec. Gew. 0,8 bei 15°, ätherartigem, etwas stechendem Geruch und brennendem Geschmack. Diese Flüssigkeit mischt sich mit Alkohol und Aether nach allen Verhältnissen, färbt sich mit Aetzkali braun, und mit concentrirter Schwefelsäure blutroth. Sie bildet mit wässerigem Ammoniak eine in Wasser fast unlösliche weiße krystallinische (unter dem Mikroskop als spitze rhombische Oktaëder erscheinende) Verbindung, welche bei langsamem Verdunsten der alkoholischen oder ätherischen Lösung in Form ziemlich großer tafelförmiger Krystalle erhalten werden kann, von der Zusammensetzung $NH_3, C_4H_8O_2 + 10 HO$. Diese hält sich an trockner Luft unverändert, an feuchter aber wird sie braun; langsam erhitzt schmilzt sie ohne Ammoniakentwicklung, etwas stärker erhitzt siedet sie und beschlägt die kälteren Theile des Gefäßes mit Tröpfchen, die in der Kälte fest werden (bei rascher Erhitzung findet sogleich Ammoniakentwicklung statt); Kalilauge bewirkt in der Kälte keine Entwicklung von Ammoniak; wird sie mit Silberlösung erwärmt so bildet sich ein Metallspiegel; durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf die alkoholische Lösung entsteht wahrscheinlich eine dem Thialdin analoge Basis; in Wasser vertheilt, mit gesättigter kalter Alaunlösung bis zu saurer Reaction vermischt und destillirt giebt diese Ammoniakverbindung eine Flüssigkeit, auf welcher der Körper $C_4H_8O_2$ wieder isolirt und rein schwimmt. Dieser letztere Körper bildet an der Luft und sogleich bei dem Kochen mit Silberoxyd Buttersäure; er unterscheidet sich von dem durch Chancel (1) als *Butyral* beschriebenen (bei trockener Destillation von butters. Kalk erhaltenen) und damit isomeren Körper durch das Verhalten zu Ammoniak und durch den Siedepunkt. — Der Rückstand der zu rectificirenden Flüssigkeit gab endlich noch stärker (über

(1) J. pharm. [3] VII, 113; Berzelius' Jahresber. XXV, 803.

freiem Feuer) erhitzt zuerst noch etwas von der vorhergehenden Substanz, zuletzt aber im Wasser untersinkende Tropfen, deren Identität mit Bittermandelöl (Siedepunkt 180 bis 183°; spec. Gew. 1,038 bei 15°; das Bittermandelöl sowohl als die aus ihm sich bildende Benzoëssäure wurden analysirt) aufser Zweifel gestellt wurde.

Zersetzungs-
producte von
Casein, Albumin,
Fibrin
und Leim.

Zur Auffindung der Säuren wurde die Flüssigkeit, welche nach Abdestilliren der nicht sauren Producte rückständig war und die Kalksalze dieser Säuren enthielt (vgl. S. 847), durch Abdampfen auf ein kleineres Volum gebracht, durch kohlen. Natron gefällt, und das Filtrat (eine Lösung der Natronsalze) im Wasserbad bis zu dünner Syrupconsistenz eingedampft. Bei dem Erkalten trat eine reichliche Krystallisation von *essigs.* Natron ein; die Mutterlauge gab bei weiterem Verdunsten in gelinder Wärme noch eine Krystallisation, welche zum größten Theil aus *essigs.* Natron bestand, untermischt mit tafelfartigen Krystallen eines andern, in Weingeist unlöslichen, Natronsalzes, als dessen Säure *Ameisensäure* nachgewiesen wurde. Die Mutterlauge der letzteren Krystallisation wurde mit verdünnter Schwefelsäure (1 concentrirter Säure auf 2 Wasser) versetzt und einen Tag ruhig stehen gelassen, wo sich über der wässerigen Lösung von schwefels. Natron ein bräunliches Oel ausschied, welches einige Male mit einem gleichen Volum Wasser geschüttelt wurde um die darin enthaltene leichter lösliche Buttersäure von der Valeriansäure, die sich dem Geruch nach deutlich erkennen liefs, zu trennen; das Waschwasser und die wässerige Lösung von schwefels. Natron wurden vereinigt, mit kohlen. Natron gesättigt, im Wasserbad zur Trockne eingedampft, mit verdünnter Schwefelsäure zersetzt, und so ein fast farbloses Oel abgeschieden. Das letztere begann etwas über 100° zu sieden; die zwischen 100 und 130° übergegangene Flüssigkeit gab mit Ammoniak gesättigt und kochend mit salpeters. Silberoxyd versetzt (metallisches Silber schied sich hier ab) bei dem Erkalten das Doppelsalz von *essigs.* und *metaceton.*

Silberoxyd; bei 130° zeigte der Siedepunkt einige Beständigkeit, und was zwischen 130 und 140° übergang, wurde als *Metacetonsäure* nachgewiesen; zwischen 160 und 165° endlich ging *Buttersäure* über. Mit dem Rückstand wurde das Destillat der vorher erwähnten bräunlichen Säure vermischt (gegen das Ende der Destillation der letztern zeigte sich im Hals der Retorte ein weißer krystallinischer Sublimat, welcher als *Benzoësäure* erkannt wurde), das Ganze mit Barytwasser gesättigt und über Schwefelsäure der Verdunstung überlassen; zuerst krystallisirte *caprons*. Baryt in halbkuglichen Drusen, dann *valerians*. Baryt in perlmutterglänzenden Blättchen, und endlich *butters*. Baryt in concentrisch gruppirten durchsichtigen Säulchen.

Zersetzungs-
producte von
Casein, Albumin,
Fibrin
und Leim.

Casein mit zweifach-chroms. Kali und Schwefelsäure. Zweckmäfsig löst man 1 Casein in 3 Schwefelsäure, die mit 6 Wasser verdünnt ist, setzt diese Flüssigkeit zu einer Lösung von 2 chroms. Kali in 20 Wasser, und mäfsigt die sogleich lebhaft eintretende Reaction durch Zusatz von noch 4 Wasser; die Destillation geht sodann ruhig, und ohne dafs Uebersteigen erfolgt, vor sich. Das Destillat besitzt einen betäubenden blausäureähnlichen Geruch und einen kirschlorbeerwasserähnlichen Geschmack, reagirt sauer und ist getrübt durch eine Menge feiner weißer Flocken. Es enthält reichlich Blausäure, kein Aldehyd; zur Entfernung der Blausäure wurde es mit Quecksilberoxyd geschüttelt und rectificirt (wodurch aber der blausäureähnliche Geruch nicht ganz verschwand); das jetzt erhaltene Destillat wurde mit kohlen. Kalk neutralisirt und rectificirt, wobei ein trübes wässeriges Destillat mit einer oben aufschwimmenden Schicht eines farblosen Oels erhalten wurde. Die Rectification der trüben wässerigen Schicht gab noch mehr von dem letztern Oel, mit dessen Abscheidung auch der blausäureähnliche Geruch verschwunden war; der Rückstand in der Retorte war fast milchweiß und besafs einen zimmtölartigen Geruch, welcher einem in der Kälte als schweres farbloses Oel sich absetzenden Körper zugehörte. Letzterer wurde in zu

Zersetzungs-
producte von
Casein, Albu-
min, Fibrin
und Leim. geringer Menge für eine genauere Untersuchung erhalten;
er färbt sich mit concentrirter Salpetersäure gelb, und
Kalilauge dieser Mischung zugesetzt färbt sie dunkelpur-
purroth.

Bei der Destillation des leichteren, farblosen, mit Chlorcalcium entwässerten, Oels kam es schon unter 70° ins Sieden, aber erst zwischen 120 und 130° blieb der Siedepunkt etwas beständiger. Aus dem unterhalb 90° Ueberdestillirenden konnte durch wiederholte Rectification und abgesondertes Auffangen des zuerst Uebergehenden eine zwischen 55 und 60° siedende Substanz erhalten werden, welche mit der S. 848 besprochenen $C_6H_6O_2$ identisch befunden wurde. — Den größern Theil des zwischen 120 und 140° Ueberdestillirenden bildet eine stickstoffhaltige Substanz, welche durch wiederholte Rectification (unter jedesmaliger Entfernung des zuerst und zuletzt Uebergehenden) farblos und rein erhalten wurde. Sie zeigt dann den Siedepunkt 125 bis 128° , das spec. Gew. $0,813$ bei 15° , die Zusammensetzung $C_{10}H_8N$; die Dampfdichte wurde $= 2,892$ gefunden, die Rechnung giebt unter Voraussetzung einer Condensation auf 4 Volume $2,877$; sie hat einen bittermandelölartigen Geruch, einen aromatisch-bitteren und brennenden Geschmack; sie löst sich etwa in dem vierfachen Volum Wasser, in Alkohol und in Aether nach allen Verhältnissen; sie brennt mit weißer Flamme ohne zu rufen; mit Kalilauge entwickelt sie Ammoniak, und wenn dann die alkalische Flüssigkeit mit Schwefelsäure übersättigt wird, so scheiden sich Oeltröpfchen aus, welche abdestillirt stark sauer sind und nach Valeriansäure riechen; Valeriansäure bildet sich auch, wenn diese Substanz sogleich mit Schwefelsäure destillirt wird. Diese stickstoffhaltige Verbindung ist also identisch mit dem durch Schlieper (1) bei der Zersetzung des Leims mit Chromsäure erhaltenen Valeronitryl. — In dem Theil der Flüssigkeit von der Dar-

(1) Ann. Ch. Pharm. LIX, 15; Berzelius' Jahresber. XXVII, 649.

stellung des Valeronitryls, welcher über 128° siedet, wurde die Anwesenheit einer geringen Menge von *Bittermandelöl* wahrscheinlich gemacht. Zersetzungs-
producte von
Casein, Albu-
min, Fibrin
und Leim.

Die außer der *Blausäure* noch gebildeten Säuren wurden wie vorher (S. 850) angegeben von einander getrennt; bei der Entfernung der Blausäure durch Quecksilberoxyd gab sich durch Reduction des letztern eine geringe Menge von *Ameisensäure* zu erkennen. Vor dem Eindampfen der Natronsalze zur Syrupconsistenz wurde durch verdünnte Schwefelsäure eine reichliche Quantität *Benzoësäure* ausgefällt; aus der mit kohlens. Natron wieder gesättigten und dann zur Syrupconsistenz abgedampften Flüssigkeit krystallisirte zuerst eine reichliche Menge von *essigs.* Natron, aus der Mutterlauge wurde *Valeriansäure* und *Buttersäure* abgeschieden.

Guckelberger vergleicht die Producte der Einwirkung von Manganhyperoxyd und Schwefelsäure und von Chromsäure auf Casein. Er zeigt, daß die Einwirkung in beiden Fällen gleichartiger ist als sie auf den ersten Blick erscheint, und daß die Verschiedenartigkeit hauptsächlich darauf beruht, daß bei Anwendung von Manganhyperoxyd die *Säuren*, Ameisensäure und Valeriansäure z. B., zum Vorschein kommen (der Rückstand von der Destillation mit Manganhyperoxyd entwickelt bei der Sättigung mit Kalk eine bedeutende Menge Ammoniak), bei der Anwendung von zweifach-chroms. Kali und Schwefelsäure hingegen die *Nitryle dieser Säuren* (Blausäure läßt sich als Formylnitryl, $\text{NH}_4\text{O}, \text{C}_2\text{HO}_3 - 4\text{HO} = \text{NC}_2\text{H}$, betrachten; der Rückstand von der Destillation mit zweifach-chroms. Kali und Schwefelsäure entwickelt mit Kalk kaum eine Spur von Ammoniak).

Albumin, Fibrin und Leim mit Manganhyperoxyd und Schwefelsäure. Das Fibrin, durch Schlagen von frischem Blut erhalten, wurde mit kaltem Wasser ausgewaschen bis dieses farblos abfloß, dann noch einigemal mit heißem Wasser übergossen und stark ausgepreßt;

Zersetzungs-
producte von
Casein, Albumin,
Fibrin
und Leim.

mageres Pferdefleisch, welches wiederholt mit Wasser ausgezogen und zuletzt ausgekocht worden war, gab dieselben Producte. — Das Albumin war aus Blut dargestellt, das durch Schlagen von Fibrin befreit worden war; die Blutkörperchen wurden durch eine gesättigte Lösung von schwefels. Natron abgeschieden, und das kaum noch röthliche Filtrat durch Erhitzen coagulirt; das Coagulum wurde ausgepresst, und wiederholt mit heißem Wasser übergossen und ausgepresst. — Der Leim war eine von den besseren Sorten des Handels. — Die Mischungsverhältnisse und das Verfahren überhaupt waren wie bei dem Casein angegeben.

Die Destillate dieser Substanzen mit Manganhyperoxyd und Schwefelsäure ließen sich dem Geruch nach weder unter sich noch von dem mit Casein erhaltenen unterscheiden. Sie reagirten sämmtlich sauer und enthielten keine Blausäure. Nachgewiesen wurden darin *Aldehyd der Essigsäure* in geringer Menge (mit Leim gar nicht), der oben (S. 848) besprochene Körper $C_6H_8O_2$, *Aldehyd der Buttersäure* (am reichlichsten mit Fibrin), *Bittermandelöl*; von Säuren *Ameisensäure* und *Essigsäure* (im Vergleich zu den übrigen in vorherrschender Menge), *Buttersäure* (vorzugsweise mit Fibrin), *Valeriansäure* (vorzugsweise mit Leim), und *Benzoësäure* in geringer Menge.

Albumin, Fibrin und Leim mit zweifach-chroms. Kali und Schwefelsäure gaben völlig gleiche Producte wie Casein. Die Destillate waren reich an Blausäure; Benzoësäure und Essigsäure fanden sich am reichlichsten; das Fibrin ergab mehr Buttersäure als das Albumin und selbst das Casein.

Harnstoff.

Millon (1) hat gefunden, daß der Rückstand bei dem Eintrocknen des *Humor vitreus* von Ochsenaugen (welcher 1,63 pC. der Flüssigkeit beträgt) 20 bis 35 pC. Harnstoff enthält, und außerdem nur Chlornatrium zu enthalten scheint. Der *Humor vitreus* des Menschen- und des Hundeauges hat dieselbe Zusammensetzung. Auch in dem *Humor aqueus* ist Harnstoff und Chlornatrium enthalten. —

(1) Compt. rend. XXVI, 121; Pharm. Centr. 1848, 192,

Wöhler (1) konnte in dem *Humor vitreus* von 50 Kalbs- Harnstoff.
augen den Harnstoff mit Sicherheit nachweisen.

Ueber die Darstellung von Harnstoff vergl. S. 476, über seine Bildung aus knalls. Kupferoxyd-Ammoniak bei Einwirkung von Schwefelwasserstoff S. 488.

Pelouze (2) hatte gefunden, daß der salpeters. Harnstoff bei dem Erhitzen auf 140° ein Gasgemenge von 1 Vol. Stickstoff auf 2 Vol. Kohlensäure entwickelt, unter Zurücklassung von salpeters. Ammoniak und Harnstoff; bei stärkerem Erhitzen zerfalle das salpeters. Ammoniak in Stickoxydul und Wasser, der Harnstoff bilde kohlen. Ammoniak, aber keine Cyanursäure, sondern eine geringe Menge einer andern schwerlöslichen Säure, deren Zusammensetzung wahrscheinlich $C_2H_3N_3O_4$ sei. Wiedemann (3) fand, daß bei Erhitzung des geschmolzenen salpeters. Harnstoffs auf 152° sich plötzlich viel Kohlensäure und Stickoxydul mit Dämpfen von kohlen. Ammoniak entwickelt, wobei die Temperatur auch nach Entfernung der Wärmequelle auf fast 200° steigt, und daß in dem Rückstand außer salpeters. Ammoniak eine Säure (im Gewicht von etwa $\frac{1}{3}$ des angewandten salpeters. Harnstoffs) enthalten ist, welche er nach der Zusammensetzung und nach den Reactionen für Cyanursäure erkannte (er untersuchte auch das Salz derselben, welches durch Fällen einer ammoniakalischen Kupferoxydlösung mit einer Lösung von Cyanursäure in überschüssigem Ammoniak als violetter Niederschlag erhalten wird, und fand die Zusammensetzung desselben = CuO , NH_4O , $HO + C_6N_3O_3$ nach der bisherigen Ansicht über die Constitution der Cyanursäure, CuO , NH_4O , $C_6HN_3O_4$ nach Wöhler's S. 489 angeführter Ansicht). Wird der

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 128. — (2) Ann. ch. phys. [3] VI, 65; Berzelius' Jahresber. XXIII, 642. — (3) Dissertatio de novo quodam corpore ex urea producto, Berol. 1847; Pogg. Ann. LXXIV, 67; J. pr. Chem. XLIII, 271; Pharm. Centr. 1848, 278; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 324. Frühere Anzeige der Resultate: Berl. Acad. Ber. 1847, 228; J. pr. Chem. XLII, 255; Pharm. Centr. 1848, 80.

Harnstoff. Rückstand in heißem salpetersäurehaltigem Wasser gelöst, so krystallisirt bei dem Erkalten ein Theil der Cyanursäure heraus; wird der andere Theil aus der Mutterlauge durch basisch-essigs. Bleioxyd gefällt, die Flüssigkeit durch Schwefelwasserstoff vom überschüssig zugesetzten Bleioxyd befreit und das Filtrat eingedampft, so bildet sich bei einer Concentration, wobei das salpeters. Ammoniak noch nicht auskrystallisirt, eine geringe Menge kleiner weißer Krystalle eines Körpers, welcher von Wiedemann als *Biuret* bezeichnet wird. Leichter und in größerer Menge kann man dieses so darstellen, daß man Harnstoff längere Zeit auf 150 bis 170° erwärmt, die breiig gewordene Masse mit wenig Wasser auskocht, filtrirt, das Filtrat mit basisch-essigs. Bleioxyd fällt, wieder filtrirt, die Flüssigkeit durch Schwefelwasserstoff von Bleioxyd befreit, aufkocht und zur Krystallisation eindampft. Das Biuret ist leicht löslich in Wasser und Alkohol; aus ersterem krystallisirt es mit der Zusammensetzung $C_4H_5N_3O_4 + 2HO$ (das Wasser entweicht in trockner Luft oder bei 100°), aus letzterem wasserfrei. Es löst sich ohne Zersetzung in concentrirter Schwefelsäure und nicht zu starker Salpetersäure. Seine Lösung wird durch Metallsalze, Gerbsäure oder Gallussäure nicht gefällt. Mit Kupferoxyd und Kali giebt es eine rothe Lösung, aus welcher eine noch nicht näher untersuchte Verbindung krystallisirt erhalten werden kann. Bei dem Erhitzen schmilzt es, entwickelt Ammoniak, und erstarrt dann zu Cyanursäure. Seine Entstehung aus Harnstoff läßt sich so deuten, daß 2 Aequiv. Harnstoff die Elemente von 1 Aequiv. Ammoniak verlieren. Als Biuret bezeichnete es Wiedemann in Beziehung auf Berzelius' Ansicht, der Harnstoff sei eine Verbindung von 1 Aequiv. Urenoxyd (C_2HNO_2) mit 1 Aequiv. Ammoniak, wo denn das Biuret sich als eine Verbindung von 2 Aequiv. Urenoxyd mit 1 Aequiv. Ammoniak betrachten liefse. Daß das Biuret nicht cyanurs. Harnstoff ist, zeigte Wiedemann noch dadurch, daß er letztere Verbindung nach Kod-

weifs' (1) Angabe durch Kochen von Harnstofflösung mit Cyanursäure bereitete, und dafür die Zusammensetzung $C_4H_7N_3O_8$ fand. Harnstoff.

Als dem Harnstoff ($C_2H_4N_2O_2$) homologe Substanzen betrachtet Wurtz (2) die oben besprochenen Verbindungen $C_4H_6N_2O_2$ (S. 679), $C_6H_8N_2O_2$ (S. 679 und 691) und $C_{10}H_{12}N_2O_2$ (S. 692), deren Zusammensetzung sich von der des erstern um C_2H_2 oder ein Multiplum davon unterscheidet. Laurent (3) spricht sich dagegen aus, sofern zur Homologie auch Analogie der Zersetzungsproducte gehöre.

Gobley hat seine Untersuchungen über das Hühnerelb, Thier-
chemie.
Zusammen-
setzung des
Hühnerel's. deren frühere Resultate er bereits 1845 veröffentlichte (4), weiter fortgesetzt (5), mit Berücksichtigung der von Sacc (6) dagegen erhobenen Einwürfe und mit Vergleichung des Eigelbs mit der Gehirnsubstanz. Wir theilen von dieser ausführlichen Untersuchung hier die Folgerungen mit, welche Gobley selbst aus ihr zieht. Das Fett des Eigelbs bestehe, Gobley's früherer Angabe entsprechend, aus zwei verschiedenen Substanzen, einem fetten Oele oder Eieröl und einem weichen unschmelzbaren Körper, welchen er als viscöse Substanz bezeichnet; der Phosphorgehalt komme ausschliesslich der letzteren zu. Oelsäure, Margarinsäure, Phosphoglycerinsäure, Milchsäure und s. g. Fleischextract seien Bestandtheile des Eigelbs, und nicht Oxydationsproducte, die sich während der Untersuchung bilden. Die viscöse Substanz sei nicht (wie Gobley früher annahm) eine Verbindung von Oelsäure, Margarinsäure und Phosphoglycerinsäure mit Ammoniak, sondern ein zusam-

(1) Pogg. Ann. XIX, 1. — (2) In der S. 691 unter (2) angeführten Abhandlung. — (3) Compt. rend. XXVII, 257. — (4) Instit. 1845, 387; Berzelius' Jahresber. XXVI, 912. — (5) J. pharm. [3] XI, 409; XII, 5; Pharm. Centr. 1847, 584. — (6) Compt. rend. XXII, 649.

Zusammen-
setzung des
Hühnerei's.

mengesetzter Körper, aus welchem zwei Stoffe abgeschieden werden können, deren einen Gobley vorläufig als phosphorhaltige Substanz, den andern als Cerebrinsubstanz bezeichnet. Die phosphorhaltige Substanz, welche bei der Entwicklung des Thieres den von Fremy (1) bei der Untersuchung des Gehirnfetts gefundenen und als Phosphorölsäure bezeichneten Körper bilde, zersetze sich mit Säuren und Alkalien, unter dem Einfluß von Wasser oder von Alkohol und ohne Mitwirkung von Sauerstoff, zu Oelsäure, Margarinsäure und Phosphoglycerinsäure. Die Phosphorölsäure zeige die größte Analogie mit dieser phosphorhaltigen Substanz, und gebe unter den eben angeführten Umständen, aber schwieriger, die eben genannten Säuren als Zersetzungsproducte. Die Cerebrinsubstanz sei ähnlich, wenn nicht identisch, mit dem von Fremy (2) als Cerebrinsäure bezeichneten Körper. — Für das Eigelb giebt Gobley jetzt als Resultate seiner früheren und neueren Untersuchungen folgende Zahlen als die procentische Zusammensetzung ausdrückend:

Wasser	51,486	Cerebrinsubstanz	0,300
Vitellin	15,760	Chlorammonium	0,034
Margarin u. Olein	21,304	Chlornatrium, Chlorkalium	
Cholesterin	0,438	u. schwefels. Kali . . .	0,377
Phosphorhaltige Substanz	8,426	Phosphors. Kalk u. Magnesia	1,077
(nämlich 7,226 Oel- und		Alkoholextract o. Fleisch-	
Margarinsäure und 1,200		extract	0,400
Phosphoglycerinsäure)		Farbstoff, Spuren v. Eisen	
		u. Milchsäure	0,558

Winckler (3) hatte aus dem Weissen von Eiern, welches nach dem Kochen ungewöhnlich dünn war, Milchsucker erhalten. Budge (4) giebt an, daß das Weisse der Hühnereier überhaupt nach Zusatz von Alkohol und

(1) Ann. ch. phys. [3] II, 463; Berzelius' Jahresber. XXII, 551. — (2) In der eben angef. Abhandl. — (3) Repert. Pharm. [2] XLII, 46; Berzelius' Jahresber. XXVII, 677. — (4) Ann. Ch. Pharm. LXIV, 127; die Redaction dieser Zeitschrift macht darauf aufmerksam, daß diese Probe für sich allein nicht die Gegenwart von Milchsucker beweist.

Filtriren bei der Trommer'schen Zuckerprobe einen Gehalt an Zucker zeige.

Von einer umfassenden Untersuchung Baudrimont Chemische Vorgänge bei der Entwicklung der Thiere im Ei. und Martin-Saint-Ange's (1) über die chemischen Vorgänge bei der Embryonalentwicklung der Vögel und der Batrachier können wir hier nur den rein chemischen Theil der Schlußfolgerungen der Verfasser mittheilen. — Das Gewicht der in der Luft auskommenden Eier vermindert sich während der Bebrütung. Athembare Luft, welche eine gewisse Menge Feuchtigkeit enthält, und angemessene Wärme sind für die Entwicklung derselben nothwendig. Die in der Luft auskommenden Eier absorbiren Sauerstoff und entwickeln zugleich Wasser, Kohlensäure, Stickstoff und eine nicht näher untersuchte Schwefelverbindung. Der Gewichtsverlust der Eier ist geringer als das Gewicht des aus ihnen entwickelten Wassers, der Kohlensäure und des Stickstoffs, ja selbst geringer als das Gewicht des Wassers, des Stickstoffs und des Kohlenstoffs in der Kohlensäure, so daß man annehmen kann, der Sauerstoff der letzteren werde aus der Luft entnommen, und Sauerstoff aus der Luft werde außerdem noch im Ei absorbirt. Der bei der Bebrütung nöthige Sauerstoff wird in zweifacher Weise verbraucht; ein Theil dient zur Bildung von Kohlensäure, ein anderer wird absorbirt oder dient zur Bildung von Wasser. Das Volum des absorbirt werdenden Sauerstoffs ist nahe eben so groß als das des zu Kohlensäure werdenden; das Volum des Stickgases ist etwa halb so groß als das der Kohlensäure. Der Fettgehalt des Eies vermindert sich während der Bebrütung; zugleich erleidet die stickstoffhaltige Substanz desselben eine Zersetzung, wie die Entwicklung von Stickstoff anzeigt. Das bebrütete Ei ist reicher an Sauerstoff als das nicht bebrütete. Die unorganischen Bestandtheile der Thiere können zu verschiedenen Perioden ihrer Existenz hinsichtlich der Art und hinsichtlich ihrer relativen Menge sehr verschieden sein.

(1) Ann. ch. phys. [3] XXI, 195.

Versuche zur Widerlegung der Ansicht, daß bei der Entwicklung des Thieres im Ei chemische Elemente, welche nicht in dem Ei enthalten wären, neu erzeugt würden, hat A. S. Taylor (1) mitgetheilt.

Athmen.

Regnault, Reiset und Millon (2) haben sich vereinigt, um das Athmen und die Ernährung der Thiere genauer zu untersuchen. Regnault und Reiset haben das Studium des Athmungsprocesses übernommen, eine genauere Methode zur Analyse der gasförmigen Körper erdacht, und (3) über den Athmungsproceß speciell Folgendes mitgetheilt. Sie wandten einen sinnreich construirten Apparat an, in welchem ein Thier längere Zeit sich aufhalten konnte, und wo die von ihm durch das Athmen hervorgebrachte Kohlensäure sogleich absorhirt und der hierbei verschwindende Sauerstoff stetig durch neu zutretenden ersetzt wurde. So mußte die Menge des ausgeathmet werdenden Stickstoffs, und welche Veränderungen sonst die das Thier umgebende Luft mit Ausnahme der Verwandlung von Sauerstoff in Kohlensäure erlitt, sich anhäufen und genauer bestimmen lassen. Sie fanden bestätigt, daß bei dem Athmungsproceß eine kleine (bei weitem kleinere, als frühere Beobachter angegeben hatten) und veränderliche Menge Stickstoff mehr ausgeathmet wird (es ist diese im Folgenden als entwickelte bezeichnet), als in der eingeathmeten Luft enthalten war. In der Luft, welche nach Beendigung des Versuchs analysirt wurde, fanden sich Wasserstoff und Kohlenwasserstoffe nur in sehr unbedeutender Menge. Nur in Einem Versuch betrug die Menge des ersteren, welche sich entwickelt hatte, mehr als 2 Liter; es war hier mit einem Hund experimentirt worden, der vor dem Versuch eine doppelte Ration Fleisch erhalten

(1) Aus Guy's Hosp. Rep. VI, 1 (1848) in Schmidt's Jahrb. der ges. Medicin LXI, 149. — (2) Compt. rend. XXVI, 4; J. pr. Chem. XLIII, 166. — (3) Compt. rend. XXVI, 17; J. pr. Chem. XLIV, 50; Instit. 1848, 19; im Ausz. J. pharm. [3] XIII, 81; Pharm. Centr. 1848, 185. Die vollständige Abhandlung erschien erst 1849 (Ann. ch. phys. [3] XXVI, 299).

hatte, und bei welchem im Anfang des Versuchs Erbrechen eintrat. — Folgende Resultate theilen Regnault und Reiset mit :

Athmen.

	Junger ausgewachsener Hund			Älterer Hund
Gewicht des Thiers (wie alle Gewichte in Grammen)	6390	6390	6390	6213
Dauer des Versuchs in Stunden	24½	22½	21½	27
Verzehrt Sauerstoff	182,288	182,381	146,479	170,520
Gebildete Kohlensäure	185,961	188,050	150,406	173,472
In der Kohlens. enthaltener Sauerstoff	135,244	136,763	109,386	126,161
Entwickelter Stickstoff	1,182	0,624	1,015	0,530
Das Gewicht des verzehrten Sauerstoffs = 100 gesetzt :				
Sauerstoff in der gebildeten Kohlensäure	74,191	74,987	74,677	73,986
Anderswie verschwundener Sauerstoff .	25,809	25,013	25,323	26,014
Entwickelter Stickstoff	0,055	0,342	0,693	0,311
Durchschnittlich in 1 Stunde verzehrter Sauerstoff	7,44	8,196	6,893	6,315

	Kaninchen	Huhn	Jung. ausgew. Hund)	Hund)
Gewicht des Thiers (wie alle Gewichte in Grammen)	2755	1280	6390	6390
Dauer des Versuchs in Stunden	42½	63	21	22½
Verzehrt Sauerstoff	116,291	85,423	168,350	147,454
Gebildete Kohlensäure	146,490	107,232	178,425	152,359
In der Kohlens. enthaltener Sauerstoff	106,538	77,987	129,763	110,806
Entwickelter Stickstoff	0,577	1,251	0,328	0,436
Das Gewicht des verzehrten Sauerstoffs = 100 gesetzt :				
Sauerstoff in der gebildeten Kohlensäure	91,613	91,295	77,079	75,146
Anderswie verschwundener Sauerstoff .	8,387	8,705	22,921	24,854
Entwickelter Stickstoff	0,495	1,464	0,195	0,296
Durchschnittlich in 1 Stunde verzehrter Sauerstoff	2,720	1,356	8,012	6,507

*) Die Luft, worin das Thier athmete, enthielt 47 pC. Sauerstoff. — **) Die Luft enthielt 60 pC. Sauerstoff.

In der sauerstoffreicheren Luft schienen die Thiere ohne Beschwerde zu leben; bei dem Athmen kleiner Thiere, Vögel z. B., in reinem Sauerstoff schienen die Resultate von den bei normaler Respiration sich ergebenden nicht merklich abzuweichen, ebenso bei dem Athmen in einer aus 79 Wasserstoff auf 21 Sauerstoff bestehenden Luft.

Auch R. F. Marchand (1) hat Versuche beschrieben, aus welchen eine geringe Stickstoffausscheidung bei dem

(1) J. pr. Chem. XLIV, 1.

Athmen. Athmen hervorgeht; auch bei diesen Versuchen athmeten die Thiere in einem Behälter, wo die sich bildende Kohlensäure sogleich absorbiert und durch neu zutretenden Sauerstoff ersetzt wurde. Ueberhaupt fand Marchand, daß ein etwa 570 Grm. wiegendes Meerschweinchen in 1 Stunde durchschnittlich 0,77 Grm. Kohlensäure ausathmet, und daß bei diesem Thier durchschnittlich auf 100 Gewichtstheile als Kohlensäure ausgeathmeten Kohlenstoff 290 Gewichtstheile eingeathmeter Sauerstoff, auf 100 Volumtheile ausgeathmete Kohlensäure 109 Vol. eingeathmeter Sauerstoff und 0,94 Vol. entwickelter Stickstoff, auf 100 Gewichtstheile Sauerstoff 0,75 Gewichtstheile Stickstoff kommen; daß bei einer Haustaube von 340 Cub. Cent. Volum durchschnittlich in 1 Stunde 0,7 Grm. Kohlensäure ausgeathmet und 0,666 Grm. Sauerstoff eingeathmet, und auf 100 Vol. ausgeathmete Kohlensäure 0,85 Vol. Stickstoff und auf 100 Vol. eingeathmeten Sauerstoff 0,66 Vol. Stickstoff entwickelt werden. Die specielleren Resultate seiner Untersuchung finden sich in folgender Zusammenstellung; die Gasvolumen sind in Cub. Cent. angegeben und auf 0° und 760^{mm} Barometerstand reducirt.

	Eins Meerschweinchen (wog etwa 570 Grm.)						Zwei Meerschweinchen			Haustaube		
Volum d. Thiers	715	715	715	715	715	715	1225	1225	1225	340	340	340
Dauer des Versuchs (Stunden)	9	10	8	15	18	12	10	12	10	10	15	10
Entwickelter Stickstoff (Vol.)	23,2	34,8	34,4	40,5	54,4	64,2	54,8	66,3	70	62,7	37	41,8
Auf 100 Vol. ausgeathmete Kohlensäure kommt entwickelter												
Stickstoff (Vol.)	0,65	0,89	1,11	0,69	0,88	1,38	0,88	1,03	0,91	0,98	1,05	0,78

Poumarède (1) hat unter dem Namen *Aërophor* einen Apparat beschrieben, die Quantität von ausgeathmetem Wasser und Kohlensäure zu bestimmen. Derselbe besteht aus zwei mit Ventilen versehenen, in einem Mundstück sich vereinigenden Röhren, deren eine die einzuathmende Luft

(1) Compt. rend. XXV, 254.

zuführt, die andere die ausgeathmete Luft über Chlor- Aathmen.
calcium und durch Kalilösung leitet.

R. F. Marchand (1) hatte auf die Gegenwart von Ammoniak in der ausgeathmeten Luft aufmerksam gemacht; nach L. Thompson (2) wird es als zweifach - kohlen- ausgeathmet, und beträgt die Menge desselben bei einem Menschen während 24 Stunden etwa 0,19 Grm. (3 Grains englisch).

Hinsichtlich R. A. Smith's Angaben über eine mit der ausgeathmeten Luft austretende albuminartige Substanz vergl. S. 390.

In Beziehung auf die Frage, ob im Magensaft freie Verdauung.
Salzsäure enthalten sei, ist Lehmann (3) zu folgenden Resultaten gekommen. Frischer Magensaft von Hunden, welche nach 12- bis 16stündigem Fasten möglichst entfettete und enthäutete Knochen genossen hatten und 10 bis 25 Minuten später getödtet worden waren, entwickelte bei dem Verdunsten im luftleeren Raum erst dann salzsäurehaltige Dämpfe, als er bis zu anfangender Syrupdicke concentrirt war; in solchem Magensaft fand Lehmann 1,808 pC. festen Rückstand, 0,125 Chlorwasserstoff, 98,067 Wasser. Er fand weiter, daß Milchsäure bei größerer Concentration Chlormagnesium und Chlorcalcium (aber nicht Chlorkalium oder Chlornatrium) zersetzt, und daß diese Zersetzung jene Entwicklung von Salzsäure verursachen konnte. Für die Anwesenheit von Milchsäure führt er die Darstellung eines Magnesiumsalzes aus dem Magensaft an, dessen Wasser- und Magnesiumgehalt mit dem der milchs. Magnesia (MgO , $C_6H_8O_8 + 3HO$) übereinstimmten. Dasselbe Salz erhielt er aus dem Magensaft von Hunden, welche 20 bis 45 Minuten vor ihrem Tode mit möglichst fettfreiem Fleisch gefüttert worden waren; dieser Magensaft gab bei dem Verdunsten im luftleeren Raum keine Dämpfe von Salz-

(1) J. pr. Chem. XXXIII, 135. — (2) Phil. Mag. [3] XXX, 124; Pharm. Centr. 1847, 384. — (3) Aus d. Ber. d. Gesellsch. d. Wissensch. in Leipzig III, 100, in J. pr. Chem. XL, 187; Pharm. Centr. 1847, 71.

Verdaunung. säure, und hinterließ 5,602 pC. festen Rückstand. — C. Schmidt (1) hat die Ansicht entwickelt, die Säure im Magen könne eine gepaarte Chlorwasserstoffsäure, der Holzschwefelsäure z. B. analoge, Säure sein.

Nach Mulder (2) wird das Albumin bei der Verdauung zuerst nur aufgelöst, das Casein vielleicht dabei auch oxydirt; er schließt dieses aus der Vergleichung der Zusammensetzung des in künstlicher Verdauungsflüssigkeit gelösten und wieder niedergeschlagenen Albumins und Caseins mit der Zusammensetzung derselben im gewöhnlichen Zustand. — Auf eine Abhandlung von Bouchardat und Sandras (3) über die Verdauung alkoholischer Getränke hinzuweisen, müssen wir uns begnügen.

Magensteine. Wetherill und Boyé (4) fanden eine Concretion aus dem Magen eines Pferdes zusammengesetzt aus 32,40 pC. Phosphorsäure, 14,45 Magnesia, 50,35 Wasser, 0,71 Ammoniak, 0,45 in verdünnter Salzsäure unlöslicher unorganischer Substanz, 0,64 ebenso unlöslicher organischer Substanz, 1,00 hygroscopischer (im Vacuum über Schwefelsäure entweichender) Feuchtigkeit.

Ernährung. Sacc hat seine früheren (5) Untersuchungen über die Ernährung von Hühnern weiter fortgesetzt (6); seine fast nur numerischen Mittheilungen lassen nicht wohl einen Auszug zu; wir heben daraus nur hervor, daß nach ihnen das Gewicht des Thieres kleiner wird, sobald das Gewicht der täglich verzehrten Gerste unter 5 pC. von dem Gewicht des Thieres beträgt.

Kuhlmann (7) hat Versuche mitgetheilt, welche den Einfluß des Ammoniaks auf die Thierernährung klarer machen sollen. Ein Schwein, dessen Nahrung täglich die

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 311. — (2) Scheik. Ond. IV, 396; Sill. Am. J. [2] IV, 402. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXI, 448; J. pr. Chem. XLIII, 175; Pharm. Centr. 1848, 7. — (4) Aus Proc. Amer. Phil. Soc. IV, 330 in Sill. Am. J. [2] IV, 274; Chem. Gaz. 1847, 277. — (5) Ann. Ch. Pharm. LII, 77. — (6) Compt. rend. XXVI, 124; J. pr. Chem. XLV, 252; Pharm. Centr. 1848, 219. — (7) Compt. rend. XXIV, 263.

Lösung von 100 Grm. kohlen. Ammoniak zugesetzt wurde, zeigte in Beziehung auf Befinden und Gewichtszunahme während zweier Monate keinen Unterschied im Vergleich zu einem andern, welches dasselbe Futter ohne diesen Zusatz erhielt; der Harn des ersteren Schweins reagirte meistens sauer, und schien reicher an Harnstoff zu sein, als der des andern.

Ueber Thierernährung vergl. auch bei Nahrungsmitteln in dem Bericht über technische Chemie.

Wahrnehmungen, daß ein größerer Gehalt des Futters ^{Fettbildung.} an Fett die Mästung pflanzenfressender Thiere beschleunige, hat Payen (1) berichtet. Kritische Bemerkungen über Persoz' Versuche (2) über die Fettbildung im Thierkörper hat Jacquelin (3) mitgetheilt. — Ueber die Umwandlung von Casein in Fett vergl. S. 840.

Béclard (4) hat Untersuchungen über das Blut mitgetheilt, aus welchen er schließt: 1) das aus der Milz ^{Blut im normalen Zustand.} durch die Milzvene kommende Blut enthalte eine bei weitem geringere Menge von Blutkörperchen, als nicht nur das arterielle, sondern auch das venöse Blut im Allgemeinen; 2) die Quantität Albumin, welche in dem Blut der Milzvene enthalten sei, nehme zu, während die Menge der Blutkörperchen abnehme; 3) das arterielle Blut habe an verschiedenen Punkten des Circulationsweges gleiche Zusammensetzung, das venöse Blut hingegen eine verschiedene. Bei Untersuchung des Bluts eines und desselben Hundes fand er:

	Jugularvene	Sitzenerterie	Milzvene	Pfortader
Wasser	778,9	750,6	746,3	702,3
Albumin	79,4	89,5	124,8	70,6
Blutkörperchen und Fibrin	141,7	159,9	128,9	227,1

Owen Rees (5) hat zu beweisen gesucht, daß der Uebergang des venösen Bluts in arterielles auf der Oxydation

(1) Compt. rend. XXIV, 1065; J. pr. Chem. XLII, 22. — (2) Instit. 1844, 422; Berzelius' Jahresber. XXV, 887. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXI, 470. — (4) Ann. ch. phys. [3] XXI, 506; J. pr. Chem. XLIII, 188. — (5) Phil. Mag. [8] XXXIII, 28; J. pr. Chem. XLVI, 129.

Blut
im normalen
Zustand.

des Phosphors in dem Fette des Bluts beruhe. Im Venenblut seien Blutkörperchen, welche phosphorhaltiges Fett enthalten, und Blutserum, welches frei von phosphors. Alkali sei; im arteriellen Blut seien die Blutkörperchen frei von phosphorhaltigem Fett, und das Serum enthalte eine große Menge phosphors. Alkali. Die Respiration beruht nach ihm auf Verbrennung des phosphorhaltigen Fetts in den Blutkörperchen.

Nach Bonnet (1) bewirkt der Zusatz von Zuckerlösung zum Blut, daß die Blutkörperchen sich unverändert ab scheiden und von dem aufgelöst bleibenden Fibrin und dem Serum leicht getrennt werden können. Nach der Wirkung auf das Fibrin und die Blutkörperchen unterscheidet Bonnet überhaupt 4 Klassen von Substanzen: solche, welche weder die Structur der Blutkörperchen noch die Plasticität des Fibrins verändern (Serum und Zuckerlösung); solche, welche die Blutkörperchen lösen und dann die Coagulation des Fibrins aufheben (Alkalien, schwache Säuren, Ammoniaksalze); solche, welche die Blutkörperchen lösen und das Fibrin coagulirbar lassen (Wasser); und solche, welche die Blutkörperchen erhalten und das Fibrin lösen (Chlornatrium, Jodkalium, salpeters. Kali).

Nach Poggiale (2) bewirkt der Zusatz von schwefel. Natron zwar die Trennung der Blutkörperchen aus dem Blut der Säugethiere, aber nicht aus dem der Vögel, welches damit eine zähe Flüssigkeit bildet; für die Trennung der Blutkörperchen aus Vogelblut sei Zuckerlösung anwendbar.

Roucher und Coulier (3) haben die Wirkung auflöslicher Stoffe auf das Blut untersucht; sie kommen zu den Schlüssen, eine im Blut lösliche Substanz, namentlich Salze, wirke auf die Blutkörperchen in der Art ein, daß der in der Flüssigkeit absorbirte Sauerstoff frei werde und

(1) Ann. ch. phys. [3] XXI, 189; J. chim. méd. [8] III, 631; J. pr. Chem. XLII, 413. — (2) Compt. rend. XXV, 110; J. pr. Chem. XLII, 292. — (3) Ann. ch. phys. [8] XXIII, 377; Pharm. Centr. 1848, 656.

an die Blutkörperchen trete; und daß die Blutkörperchen nicht durch Mangel der Einwirkung von Sauerstoff zergehen, sondern durch das Aneinanderhaften derselben, welches letztere durch Zusatz von Substanzen (wie Zucker) vermieden werden könne, welche die Blutkörperchen besser suspendirt erhalten.

Casanti (1) hat versucht, das eingetrocknete Blut des Menschen und verschiedener Thiere durch das verschiedene äußere Ansehen, Zusammenhaften u. s. w. zu unterscheiden, welches die Mischung des eingetrockneten Rückstands mit Phosphorsäure zeige.

Poggiale (2) hat die Zusammensetzung des Bluts neugeborener Thiere untersucht. Bei dem Menschen fand er in dem Blut der Placenta und in dem des Fötus gleich großen Gehalt an festen Bestandtheilen, und die Zusammensetzung des ersteren :

Wasser	744,2	Albumin	69,3
Blutkörperchen	172,2	Fette Substanzen	2,1
Fibrin	1,9	Extractivstoff und Salze	10,3

Letztere enthalten :

Chlornatrium	5,1	Schwefels. Natron	0,5
Chlorkalium	0,3	Phosphors. Kalk	0,4
Chlorcalcium	0,1	Eisenoxyd	2,0
Phosphors. Natron	1,1	Kohlens. u. schwefels. Kalk	0,2
Kohlens. Kali	0,2	Verlust	0,3
Kohlens. Natron	0,2		

Er schließt, das Blut des Neugeborenen sei reich an Blutkörperchen und arm an Fibrin, der Gehalt an Albumin und fetten Substanzen etwa eben so groß, der an Eisenoxyd größer als in dem Blut des Erwachsenen. — Den Gehalt an festen Bestandtheilen fand er (für 1000 Blut) bei:

Hund, 1 St. alt	231,5	Katze, 6 St. alt	136,2	Kaninch., 24 St. alt	162,9
" 24 " "	228,3	" 48 " "	155,9	" 48 " "	166,1
" 48 " "	324,5	" 8 Tg. alt	167,3	Taube, 3 " "	179,8
Katze, 2 " "	134,8	Kaninch., 3 St. alt	155,9	" 24 " "	180,4
				" 70 " "	189,9

(1) J. chim. méd. [3] IV, 673. — (2) Compt. rend. XXV, 198; J. pr. Chem. XLIII, 295; Pharm. Centr. 1847, 795.

Blut
im normalen
Zustand.

Die Zusammensetzung bei

	Alter	Wasser	Blutkörperchen	Albumin	Fibrin	Extractivstoffe u. Salze
Katze	3 Stund.	864,8	82,9	40,2	1,7	9,3
"	24 "	862,5	84,2	42,8	1,7	9,3
Kaninchen	3 "	842,2	90,2	56,9	2,2	8,6
"	24 "	839,6	91,3	58,1	2,2	8,7
Taube	3 "	822,8	180,1	35,9	3,1	8,6
"	24 "	816,3	184,2	37,8	3,4	8,3
Hund	1 "	768,5	165,1	56,7	1,7	8,0
"	24 "	771,7	168,3	55,8	1,7	8,1
"	48 "	775,5	158,5	56,2	2,0	7,8

Poggiale (1) hat ferner das Blut des Menschen (bei gewöhnlicher Diät und während täglich 10 Grm. Kochsalz genossen wurden; letztere Analyse ist mit * bezeichnet) und mehrerer Thiere mit folgenden Resultaten untersucht.

	Mensch	Mensch *	Ochse	Kuh	Kalb	Hamstel	Kanarienvogel	Hund	Katze	Feldhase	Fuchs
Wasser . . .	779,9	767,6	796,1	788,2	835,6	798,0	831,0	798,0	812,0	785,0	795,0
Blutkörperchen	180,1	143,0	123,2	126,2	92,5	102,0	91,5	126,0	109,2	150,3	143,3
Albumin . .	77,4	74,0	65,5	67,2	55,3	85,0	63,8	63,0	64,1	47,2	48,1
Fibrin . . .	2,1	2,3	5,4	6,3	4,1	3,2	3,2	2,2	2,2	5,1	5,1
Fette Substanzen	1,1	1,3	2,2	2,2	1,3	1,8	1,6	2,3	2,1	2,3	1,7
Extractivstoffe u. Salze . .	9,3	11,8	8,7	10,0	11,2	10,0	8,9	8,5	10,3	9,1	8,9
letztere enthält:											
Chlorkalium u. Chlornatrium . .	4,7	6,4	4,7	4,8	6,1	5,7	4,6	4,4	5,6	5,0	5,4
Chlorcalcium . .	—	—	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2
Phosphorsaures Natron . . .	1,4	1,7	0,8	0,8	1,1	1,0	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8
Schwefelsaures Natron . .	0,4	0,4	0,6	0,3	0,8	0,6	0,6	0,5	0,7	0,4	0,3
Kohlens. Kali u. Natron . .	0,5	0,6	0,4	0,9	0,4	0,3	0,4	0,3	0,5	0,4	0,2
Phosphors. Kalk	0,7	0,7	0,5	1,0	0,8	0,7	0,5	0,5	0,7	1,2	1,1
Eisenoxyd . .	1,3	1,5	1,3	1,4	1,1	1,1	1,0	1,5	1,2	0,8	0,6
Kohlens. und schwefels. Kalk	0,3	0,4	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2
Verlust . . .	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2

(1) Compt. rend. XXV, 110; J. pharm. [8] XIII, 150; J. pr. Chem. XLIII, 292; Pharm. Centr. 1847, 680. Die Analysen von Menschenblut hat Plouviez, welcher dazu Veranlassung gab, auch publicirt Compt. rend. XXV, 113; J. pharm. [3] XII, 206.

Die Untersuchungen von Strahl und Lieberkühn (1) ^{Blut im normalen Zustand.} über Harnsäure im Blut können wohl mit Stillschweigen übergangen werden; Unkenntniss der aufzusuchenden Stoffe, Unkenntniss der Reactionen, durch welche diese Stoffe erkannt werden sollen (hinsichtlich des Nachweises der Harnsäure durch Bildung von Murexid scheinen die Genannten die Ansicht zu haben, Murexidbildung bestehe in einer rothen Färbung bei Behandlung einer harnsäurehaltigen Flüssigkeit durch Salpetersäure; von einem Zusatz von Ammoniak zu dem Verdampfungsrückstand der mit Salpetersäure versetzten Flüssigkeit wird in ihrer an unnöthigem Detail sonst so reichen Schrift nichts gesagt), minutiöse Angabe von Unwesentlichem und auffallendes Stillschweigen über Punkte, welche bei solchen Forschungen die wesentlichsten sind, characterisiren diese Untersuchungen, welche leider in der physiologisch-chemischen Thätigkeit unserer Zeit ihres Gleichen viel haben.

Boussingault (2) hat Untersuchungen angestellt über den Einfluß der Nahrungsmittel auf den Gehalt des Blutes an fetter Substanz. Er fand, wie schon Sandras und Bouchardat vor ihm, daß ein solcher Einfluß nicht mit Bestimmtheit nachzuweisen ist. Boussingault fand bei der Untersuchung des Blutes von Vögeln, die verschiedenes (unten angegebenes) Futter oder (während der letzten 36 Stunden) Nichts genossen hatten, folgende Mengen Fett in 1 Gewichtsth. Blut.

Tauben 0,0021 (Stärkmehl)	Tauben 0,0046 (Stärkmehl)	Enten 0,0042 (Stärkmehl)
(3 Wch. 0,0056 (Eiweifs)	(1 Mon. 0,0055 (Eiweifs)	0,0044 (Eiw. u. Leim)
alt.) 0,0043 (Nichts)	alt.) 0,0065 (Speck)	0,0049 (Nüsse)
	0,0036 (Nichts)	0,0034 (Nichts)
	0,0070 (Nichts)	

Poggiale und Marchal (3) haben das arterielle (A) ^{Blut unter abnormen Umständen.} und das venöse (B) Blut eines an (auf Erisipelas folgender)

(1) Harnsäure im Blut und einige neue constante Bestandtheile des Urins, Berlin 1848. — (2) Ann. ch. phys. [8] XXIV, 460; Pharm. Centr. 1849, 109. — (3) J. chim. méd. [8] IV, 235; Compt. rend. XXVI, 143; J. pharm. [3] XIV, 368; Pharm. Centr. 1848, 191.

Blut unter
abnormen
Umfständen.

Gehirnentzündung Leidenden untersucht; Grassi (1) das Blut (C) eines an Hydrocele Leidenden wobei sich ein größerer Gehalt an Albumin und Salzen ergab als der normale ist. Chatin und Bouvier (2) untersuchten das Blut eines an Scorbut Leidenden (D), wobei sich ein größerer Gehalt an Fibrin, ein kleinerer an Blutkörperchen und auch an Albumin ergab; Favre (3) das eines eben solchen (E), wobei sich ein größerer Gehalt an Wasser, eine bedeutende Verminderung der Blutkörperchen und eine Vermehrung des Fibrins ergab; Becquerel und Rodier (4) gaben als allgemeine Resultate von wiederholten Analysen solchen Blutes an, es zeige eine geringere Dichtigkeit, mehr Wasser, weniger Blutkörperchen und lösliches Albumin, ebenso viel oder mehr Fibrin, als normales Blut. Léonard und Foley (5) haben eine Reihe Analysen über die Zusammensetzung des Blutes bei den in Algier endemischen Krankheiten mitgetheilt; Michéa (6) Analysen des Blutes von Wahnsinnigen.

	A	B	C	D	E
Feste Stoffe überhaupt	177,5	181,6	269,7	—	—
Lösliche, nicht coagulirbare Substanzen .	—	—	—	16,3	—
Fibrin	6,2	6,1	2,9	4,0	4,4
Albumin	66,0	61,4	—	62,5	—
Blutkörperchen	97,5	106,0	116,7	86,3	44,4
Fette Stoffe	1,1	1,2	—	—	—
Chlornatrium	3,1	3,8	—	—	—
Lösliche Salze	2,1	2,2	—	—	—
Phosphors. Kalk	0,8	0,8	—	—	—
Eisenoxyd	0,6	0,6	—	—	—
Albumin und Salze	—	—	149,9	—	—
Feste Stoffe im Serum	—	—	—	—	76,6
Wasser	822,5	818,4	730,3	831,1	874,6
Verlust	0,1	0,9	0,2	—	—

Lassaigue (7) hat die Zusammensetzung des Blutes von Hunden vor und nach der Aetherisation untersucht;

(1) J. pharm. [3] XIV, 364. — (2) J. chim. méd. [3] IV, 141. — (3) Compt. rend. XXIV, 1136; Pharm. Centr. 1847, 816. — (4) Compt. rend. XXIV, 1090; J. pr. Chem. XLI, 350. — (5) J. chim. méd. [3] III, 365. — (6) Aus Gas. méd. de Paris, 9, 10 u. 11, 1848, in Schmidt's Jahrb. der ges. Med. LXI, 145. — (7) J. chim. méd. [3] III, 182. 28.

bei 15° mit Aetherdampf gesättigte Luft enthält nach ihm etwa 35,4 Vol. Aetherdampf auf 13,5 Sauerstoff und 51,1 Stickstoff; die Quantität des nach der Aetherisation im venösen Blut enthaltenen Aethers schätzt er auf 0,081 Proc.

Blut unter
abnormen
Umständen.

	In 100		In 1000			
	Blut- kuchen	Serum	Wasser	Fibrin	Blutkör- perchen	Albumin u. alk. Salze
Arterielles Blut (vor)	57,7	42,3	797,0	3,8	144,7	54,5
" " (nach)	46,4	53,6	809,2	3,9	131,7	55,3
Venöses Blut (vor)	53,5	46,5	798,7	3,6	145,3	52,4
" " (nach)	48,3	51,7	813,3	3,4	122,1	61,2
" " (vor)	65,6	34,5	723,6	2,4	183,1	90,9
" " (nach)	59,7	40,3	778,9	1,7	147,4	72,0

Harlefs (1) hat Beobachtungen über das Blut der Blut niederer
Thiere. Ascidien und der Cephalopoden überhaupt mitgetheilt. Das Blut dieser Thiere ist in den Gefäßen farblos, und färbt sich an der Luft, durch den Kohlensäuregehalt derselben, tief blau; durch Sauerstoff wird es wieder, jedoch nicht gänzlich, entfärbt. Bibra fand in dem Blut von *Eledone* 7,33 feste Bestandtheile auf 92,67 Wasser; 100 trocknes Blut gaben 35,88 Asche; 100 Asche enthielten 73,1 Chlor-natrium, 2,0 schwefels. Natron, eine zweifelhafte Spur phosphors. Natron, und 24,9 phosphors. Kalk und Kupfer. Eisen fehlte, ebenso in der Leber; in der Asche der letzteren waren 1,12 pC. Kupfer enthalten. Kupfer wurde auch gefunden in *Cancer pagurus*, *Acanthias zeus* und *Conger vulgaris*; die Menge desselben stand im umgekehrten Verhältniß zu der des vorhandenen Eisens. Auch das Blut von *Hélix pomatia* enthält viel Kupfer, der in Wasser unlösliche Theil der Asche desselben 2,57 pC.; auch dieses Blut wurde (im Winter) blau an der Luft, aber die blaue Färbung durch Kohlensäure zerstört und durch Sauerstoff wieder hergestellt. Der Farbstoff wird durch Alaun gefällt, durch einen Ueberschuß wieder aufgelöst, aber auf Zusatz von Ammoniak wieder gefällt; die Verbindung von Farbstoff und Thonerde gab 29,53 pC. einer grünen, kupferreichen Asche.

(1) Müller's Archiv 1847, Nr. 2, 148; Pharm. Centr. 1847, 489; Edinburgh Monthly Journal, Mai 1848; Chem. Gaz. 1848, 214.

Gehalt des
Blutes an
Kohlensäure
oder kohlens.
Alkali.

Lehmann (1) hat zur Unterstützung der Ansicht, daß das Blut kohlens. Alkali enthalte, die Resultate von Versuchen mitgetheilt, wobei zuerst die freie Kohlensäure im Blut durch eingeleitetes Wasserstoffgas, dann die gebundene im luftverdünnten Raum durch Essigsäure ausgetrieben wurde; nach seinen Bestimmungen enthalten 1000 Grm. frisches Rindsblut im Mittel 0,132 Grm. (70 Cb. Cent.) freie und 0,676 Grm. (360 Cb. Cent.) gebundene Kohlensäure. — Er mischte Blut mit der Hälfte seines Volums Wasser, coagulirte die eiweißartigen Bestandtheile durch Erhitzen, und dampfte die vom Coagulum getrennte Flüssigkeit ein; der Rückstand wurde bei möglichst gelinder Wärme eingeäschert; in 100 Asche wurden 4,1 bis 4,4 schwefels. Natron, 3,7 phosphors. Natron ($3 \text{ NaO}, \text{PO}_5$), 15,8 bis 18,1 kohlens. Natron, 74,0 bis 75,0 Chloralkalimetalle gefunden (2).

Liebig (3) hat über das Vermögen des Blutserums, mehr Kohlensäure als ein gleiches Volum Wasser zu absorbiren, und über die Gegenwart von kohlens. Natron in dem Blut (als auf dessen Umwandlung in zweifach-kohlens. beruhend mehrere jenes Vermögen betrachteten) Folgendes hervorgehoben. 1 Vol. Wasser absorbirt 1, 1 Vol. Blutserum 2 Vol. Kohlensäure; beruhte die um 1 Vol. reichlichere Absorption auf Bildung von zweifach-kohlens. Natron, so müßte 1 Vol. Blutserum ursprünglich 1 Vol. Kohlensäure in Form von einfach-kohlens. Natron enthalten, und es müßten bei dem Mischen von 1 Vol. mit Kohlensäure gesättigten Serums mit Säuren 2 Vol. Kohlensäure gasförmig entwickelt werden (vorausgesetzt, daß das 3. Vol. in der sauren Flüssigkeit absorbirt bleibt). In Wirklichkeit wird aber in diesem Fall viel weniger Kohlensäure gasförmig

(1) Ber. d. kgl. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig, III, 96; J. pr. Chem. XL, 133; Pharm. Centr. 1847, 69. — (2) Diese Angaben beziehen sich nicht auf Blut im Allgemeinen, sondern nur auf Rindsblut; sie stellen den Gehalt der Blutasche an kohlens. Natron außer Zweifel, aber ob kohlens. Alkali als solches in der Blutflüssigkeit gelöst ist, wird damit nicht entschieden. — (3) In der S. 876 angef. Abhandl.

entwickelt, selbst weniger als sich entwickeln sollte; falls man annimmt, auch die zugesetzte Säure halte ein gleiches Volum Kohlensäure absorbiert. Durch Abdampfen stark concentrirtes Blutserum entwickelt mit Säuren keine meßbare Spur kohlenst. Gas. Es beruht das gröfsere Absorptionsvermögen des Blutserums für Kohlensäure, so wie die alkalische Beschaffenheit desselben, auf einem Gehalt an phosphors. Natron (1). Eine Lösung von 1 trockenem phosphors. Natron ($2\text{NaO}, \text{HO}, \text{PO}_3$) in 100 Wasser absorbiert gleichfalls ihr doppeltes Vol. Kohlensäure; durch Schütteln mit Luft oder bei Verminderung des Luftdrucks werden bei gewöhnlicher Temperatur $\frac{1}{3}$ der aufgenommenen Kohlensäure wieder abgeschieden, sämtliche Kohlensäure durch einfache Verdunstung der Lösung an der Luft. Bei der Aufnahme von Kohlensäure in das Blut theilen sich die Kohlensäure und die Phosphorsäure in das Natron desselben, aber die verdrängte Phosphorsäure bleibt stets vorhanden und strebt sich wieder mit allem Natron zu verbinden, weshalb die Erscheinungen andere sind, als wenn das Blut wirklich einfach-kohlenst. Natron als solches enthielte.

Gehalt des
Blutes an
Kohlensäure
oder kohlenst.
Alkali.

Henneberg (2) hat die Asche des Hühnerbluts (A) und eines Gemisches von Truthahn- und Hühnerblut (B; das erstere war überwiegend) analysirt. Die Asche war weifs und brauste nicht mit Säuren; der wässerige Auszug gab mit Silberlösung einen rein weissen Niederschlag. Die Resultate waren (nach Abzug von Kohle):

Blutasche.

	A	B		A	B
Phosphorsäure, an			Chlorkalium . . .	29,14	36,81
Alkali gebunden .	19,63	20,24	Chlornatrium . . .	16,87	3,31
Phosphorsäure, an			Natron	21,04	24,02
Erden und Metall-			Eisenoxyd	3,89	4,77
oxyde gebunden .	6,99	8,49	Kalk	1,03	0,93
Schwefelsäure . .	1,19	0,97	Magnesia	0,22	0,46

Enderlin (3) hat die Asche des Bluts verschiedener Thiere untersucht, und folgende Resultate mitgetheilt (die

(1) Oder einem alkalisch reagirenden Salz mit alkalischer Basis, welches die absorbirte Kohlensäure in der Wärme abgibt. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXI, 255; berichtigt LXVI, 112. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 304.

Blutasche. dem Namen des Thiers in Klammern beigesetzten Zahlen geben die von 100 Blut erhaltene Menge Asche an):

	Gans [1,22]	Gans (1) [1,28]	Junger Hahn [1,23]	Junger Hahn [1,13]	Junger Hahn (2)	Junger Hahn (3)	Junger Hahn (4)	Junger Hahn (5)
2 Fe ₂ O ₃ , 3 PO ₃	9,61	11,07	8,15	7,95	8,45	8,70	7,5	7,6
2 CaO, PO ₃	9,34	12,54	9,63	13,26	14,79	14,50	15,0	15,2
2 MgO, PO ₃	6,04	8,47						
2 KO, PO ₃	26,24	18,57	36,38	18,36	52,34	50,48	25,0	24,4
2 NaO, PO ₃	6,18	20,68	3,17	7,19	—	—	—	—
KO, SO ₃	2,34	0,65	—	3,30	—	—	—	—
3 NaO, PO ₃	—	—	—	—	—	—	—	—
NaCl	39,84	27,20	40,18	46,56	20,89	23,57	37,9	38,4
3 NaO, 2 SiO ₃	—	—	2,98	—	—	—	—	—
3 KO, 2 SiO ₃	—	—	—	—	8,53	2,75	14,6	14,4

(1) Die Gans war längere Zeit mit Weiskorn gestopft; das Blut chocolatefarbig und trank sich nicht in Kuchen und Serum. — (2) Längere Zeit mit Weizen gefüttert. — (3) Desgl. — (4) Mit Gerste gefüttert. — (5) Desgl.

	Taube [1,20]	Taube [1,29]	Taube [1,55]	Ente [1,05]	Frosch [0,84]	Frosch	Baruch [1,11]
2 Fe ₂ O ₃ , 3 PO ₃	9,4	10,0	9,8	10,0	9,61	10,5	9,5
2 CaO, PO ₃	13,2	12,1	13,4	17,3	13,5	7,9	9,5
2 MgO, PO ₃							
2 KO, PO ₃	20,4	39,5	34,9	28,0	—	—	36,0
2 NaO, PO ₃	26,4	37,9	31,3	17,1	—	—	—
KO, SO ₃	1,9	—	—	4,0	1,6	1,7	—
3 NaO, PO ₃	—	—	—	—	38,5	40,4	—
NaCl	28,6	—	7,5	21,6	31,8	39,3	43,4

Die Asche von Vogelblut und von Fischblut war weiß, die von Froschblut gelbroth wie die der Omnivoren. Die Vogelblutaschen lösten sich ohne Gasentwicklung in Salzsäure. Enderlin hat auch einige analytische Data gegeben bezüglich der Asche des Blutkuchens von Hahnen- und Entenblut, und des Serums des letztern.

Metalle im
Thierkörper
und nament-
lich im Blut.

Die Frage, ob aufser dem Eisen (und dem Mangan) noch andere schwere Metalle, Kupfer, Blei u. s. w., in dem gesunden Thierkörper enthalten sind, ist mehrfach discutirt worden. Sarzeau hatte 1832 angegeben, im Fleisch sei Kupfer enthalten; Devergie und Hervy 1838, in der Asche der innern Organe verschiedener Individuen, welche eines natürlichen Todes verstorben waren, wechselnde Mengen Kupfer und Blei gefunden zu haben. Danger und Flandin läugneten später die Gegenwart von Kupfer

in dem normalen menschlichen Körper; Barse behauptete sie und auch die des Bleis. In den Zeitraum, über welchen hier specieller zu berichten ist, fallen folgende Publicationen. Legrip (1) betrachtete das von ihm in menschlicher Leber und Milz gefundene Kupfer und Blei als normal darin enthaltenes (in 3300 Asche von menschlicher Leber und Milz fand er 2,7 Blei und 4,5 Kupfer; in 8700 Asche von Magen, Rectum, Knochen, Mark und Sehnen einer Kuh 3,2 Blei und 8,2 Kupfer). Orfila (2) behauptete, in der Leber sei stets Kupfer enthalten und wahrscheinlich auch in andern Organen. Chevallier (3) gab an, meistens sei in dem normalen Organismus Blei und Kupfer enthalten, manchmal aber auch nicht. Deschamps (4) kam zu der Folgerung, daß alle Sedimentformationen neben Eisen Kupfer enthalten, daß es die Pflanzen aufnehmen, daß es in Thieren und Menschen im normalen Zustand enthalten sei (5).

Metalle im
Thierkörper
und nament-
lich im Blut.

Speciell in Beziehung auf den Metallgehalt des Bluts gab Millon (6) Folgendes an. Fange man das Blut aus der Ader in dem etwa dreifachen Volum Wasser auf, und bringe dann diese Flüssigkeit in einen mit Chlor gefüllten Ballon, so coagulire sie, färbe sich braun, und es bilde sich bald eine graue Masse aus welcher sich der flüssige Theil gut ausdrücken und auswaschen lasse; in dem coagulirten Theile befinden sich fast alle organischen Bestandtheile, in dem flüssigen alle Salze des Bluts; dampfe man diesen flüssigen Theil zur Trockne ab und calcinire ihn, so seien in 100 des unlöslichen Theils dieses Rückstands 1 bis 3 Kieselerde, 1 bis 5 Blei, 0,5 bis 2,5 Kupfer und 10 bis

(1) J. chim. méd. [3] III, 251. — (2) J. chim. méd. [3] III, 370. 433; Pharm. Centr. 1847, 687 (wo Leber statt Galle zu setzen ist). — (3) J. chim. méd. [3] III, 375. — (4) J. pharm. [3] XIII, 88; Compt. rend. XXVI, 102. — (5) Das früher (Compt. rend. XXI, 637) von Millon und Laveran gefundene Resultat, daß in dem Körper von Thieren, welche Brechweinstein erhalten hatten, das Antimon längere Zeit zurückbleibt, ist von Millon (Ann. ch. phys. [3] XIX, 138; Pharm. Centr. 1847, 397) durch neuere Versuche bestätigt worden. — (6) Compt. rend. XXVI, 41; Ann. ch. phys. [3] XXIII, 372; Instit. 1848, 10; J. pharm. [3] XIII, 86; J. pr. Chem. XLIII, 388; Pharm. Centr. 1848, 232.

Metalle im
Thierkörper
und nament-
lich im Blut.

24 Mangan enthalten; das Kupfer und das Blei seien Bestandtheile der Blutkügelchen, denn 1000 Grm. Blutkuchen (von Menschenblut) gaben 0,083 dieser Metalle, während 1000 Grm. Serum nur 0,003 gaben. — Melsens (1) konnte bei der sorgfältigsten Untersuchung weder im Pferde-, im Hunde-, noch im Menschenblut Kupfer oder Blei auffinden. — Millon (2) beharrte dabei, daß die von ihm gefundenen Metalle im Blut wirklich enthalten gewesen seien, gab aber zu, daß zufällige Umstände die Gegenwart derselben bedingt haben könnten, und bestimmte diese später (3) dahin, daß er das Blut von Soldaten untersucht habe, deren Kochgeschirre aus Metall bestanden. — Deschamps (4) giebt gleichfalls an, in der Asche von Menschenblut Kupfer gefunden zu haben; Harlefs (vergl. Seite 871) dasselbe für das Blut niederer Thiere.

Untersuchung
der Fleisch-
flüssigkeit.

Liebig (5) hat Untersuchungen über die Bestandtheile der Flüssigkeiten des Fleisches veröffentlicht. Er schickt Betrachtungen voraus über die Richtung, welche in den letzten Jahren viele der Thierchemie angehörige Forschungen beherrschte, und eine geschichtliche Darlegung der Angaben über den Gehalt der Fleischflüssigkeit an mehreren Bestandtheilen, namentlich über Milchsäure und Kreatin.

Zur Darstellung der löslichen Bestandtheile des Muskelfleisches (6) aus, z. B. 10 Pfunden, feingehacktem, möglichst

(1) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 358; J. chim. méd. [3] IV, 486; J. pr. Chem. XLV, 440; Pharm. Centr. 1848, 605. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 508; J. pr. Chem. XLV, 452. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 255. — (4) J. pharm. [3] XIV, 410; Compt. rend. XXVII, 389; J. chim. méd. [3] V, 20; J. pr. Chem. XLVI, 115. — (5) Ann. Ch. Pharm. LXII, 257; Ann. ch. phys. [3] XXIII, 129; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 785. 801. 817. 833; J. pr. Chem. XLIII, 281; J. pharm. [3] XII, 227. 386; theilweise Compt. rend. XXIV, 69. 195. — (6) Das Fleisch von Fischen muß anders behandelt werden, weil es feingehackt mit Wasser zu einer schleimigen Masse aufquillt, welche die Porositäten verstopft. Man mischt es mit dem doppelten Volum Wasser, giebt es auf einen Trichter, und verdrängt die Fleischflüssigkeit durch allmähliges Aufgießen kleiner Mengen Wasser. Der Auszug ist farblos, schwach opalsirend, sauer, hervorstechend nach Fischen schmeckend und riechend.

fettfreiem Fleisch, r  th Liebig, 5 Pfund mit 5 Pfund kaltem Wasser sorgf  ltig zu kneten und in einem Sack von grober Leinwand m  glichst auszupressen, und den R  ckstand mit 5 Pfund Wasser zum zweiten Mal ebenso zu behandeln; mit der bei letzterer Operation erhaltenen Fl  ssigkeit behandelt man die andern 5 Pfund Fleisch zum ersten Mal, mit der bei einer dritten Ausziehung der ersteren Portion Fleisch erhaltenen Fl  ssigkeit die andere Portion zum zweiten Mal, und letztere l  sst man dann noch einmal mit reinem Wasser aufquellen und prefst sie aus. Die Fl  ssigkeiten werden vereinigt, durch ein Tuch geseiht, und in einem Glaskolben in Wasser bis zum Sieden des letztern erhitzt (wo zuerst das Albumin, dann der Farbstoff coagulirt), und bei dieser Temperatur erhalten bis die Fl  ssigkeit farblos geworden ist und Albumin und Farbstoff coagulirt abgeschieden sind. (Bei manchen Fleischsorten ist es zur Abscheidung des letzten Restes von Farbstoff nothwendig, nach dem Gerinnen des Albumins die Fl  ssigkeit von dem Coagulum zu trennen und in einem andern Gef  ss bis zum Aufwallen zu erhitzen.) Die Fl  ssigkeit (sammt der aus dem Coagulum auszupressenden) wird durch ein Tuch geseiht; aus sehr blutreichem Fleisch, wie vom Ochsen, Reh, Hasen, Fuchs, bereitere ist r  thlich, w  hrend die von Kalb-, H  hner- und Fischfleisch kaum gef  rbt ist. Die auf diese Art aus Pferde- und Fischfleisch dargestellte Fl  ssigkeit ist immer tr  be, die aus den andern genannten Fleischarten hingegen klar. Der Geschmack ist bei allen ziemlich gleich; die Fl  ssigkeit aus dem Fleisch des Marders besitzt einen deutlichen Moschusgeruch. Die Fl  ssigkeit reagirt immer sauer. Auf freiem Feuer (auch ohne daf   sie zum Sieden kommt) concentrirt f  rbt sie sich braun,

Untersuchung
der Fleisch-
fl  ssigkeit.

Bei dem Erhitzen setzt sich ein weisses weiches Coagulum ab, und die Fl  ssigkeit giebt nach dem Zusatz von Barytwasser, Abdampfen und Erkalten eine farblose Gallerte, in welcher sich nach 24 Stunden deutliche und regelm  ssige Kreatinkrystalle absetzen. (Vergl. Gregory's Angaben S. 879.)

Untersuchung
der Fleisch-
flüssigkeit.

und zuletzt bleibt ein dunkelbrauner, bratenartig riechender Syrup, in dem sich erst nach langem Stehen Spuren von Kreatinkrystallen zeigen. Das Braunwerden beruht zum Theil darauf, daß sich am Boden des Gefäßes ein Absatz bildet und höhere Temperatur annimmt, aber auch bei dem Abdampfen im Wasserbade tritt das Gefärbtwerden unausbleiblich ein; die Hauptursache ist neben der Temperatur die in der Flüssigkeit enthaltene freie Säure, welche deshalb vor dem Abdampfen weggenommen werden muß. Zu dem Ende setzt man zu der Flüssigkeit eine concentrirte Lösung von kaustischem Baryt, so lange dadurch ein weißer Niederschlag bewirkt wird (dies tritt manchmal noch ein, wenn auch schon die Flüssigkeit neutral oder alkalisch geworden ist). Der sich bildende Niederschlag enthält alle Phosphorsäure der Fleischflüssigkeit als phosphors. Baryt und phosphors. Magnesia, aber kein phosphors. Magnesia-Ammoniak (nur ein einziges Mal wurde bei dem Zusatz des Barytwassers eine deutliche Ammoniakentwicklung wahrgenommen); ein etwaiger Gehalt an schwefels. Baryt ist so gering, daß man ihn auf Rechnung von Blutflüssigkeit, die noch beigemischt war, setzen kann. Die von diesem Niederschlag getrennte Flüssigkeit wird in flachen Porcellanschalen eingedampft, so daß sie niemals zum Sieden kommt; wird der obere Rand der Schale heißer als die Flüssigkeit, so trocknet sie an ihm zu einem dunkelbraunen Ring ein, der sich beim Zugießen frischer Flüssigkeit ohne sie bemerklich zu färben löst, aber im concentrirten Zustand kommt die Farbe wieder zum Vorschein. Die mit Barytwasser versetzte Flüssigkeit vom Hühnerfleisch bleibt bei dem Abdampfen klar, wenn nicht durch einen Ueberschuß von zugesetztem Baryt an der Oberfläche eine Haut von kohlen. Baryt entsteht; wenn die Flüssigkeit vom Ochsenfleisch zu schwacher Syrupconsistenz verdampft ist, bildet sich an der Oberfläche eine schleimige Haut, welche sich in Wasser zertheilt und aufquillt aber nicht löst; beim Kalbfleisch und namentlich beim Pferde-

fleisch folgen sich diese Häute unausgesetzt, wenn man sie jedesmal wegnimmt, was geschehen muß. Wenn die Flüssigkeit auf etwa $\frac{1}{10}$ ihres Volums eingeengt ist, stellt man sie an einen mäßig warmen Ort und überläßt sie dem weiteren Verdampfen; bald krystallisirt an den Wänden Kreatin heraus.

Untersuchung
der Fleisch-
flüssigkeit.

Kreatin ist ein Bestandtheil der Muskeln aller höheren Thierklassen; Liebig fand es in dem Fleisch des Ochsen, Schafs, Schweins, Kalbs, Rehs, Hasen, Marders, Fuchses, Hirsches, Huhnes und Hechts; Schloßberger (1) hatte es aus dem Fleisch eines Alligators erhalten. Das Fleisch des Huhns und des Marders enthält am meisten, das der übrigen genannten Thiere weniger, das Fischfleisch am wenigsten. Das Fleisch eines während zweihundert Tage in Gefangenschaft mit Fleisch gefütterten Fuchses gab noch nicht den zehnten Theil derjenigen Menge Kreatin, welche ein gleiches Gewicht Fleisch von auf der Jagd erlegten Füchsen gab. Fettes Fleisch giebt bei gleichem Fleischfasergehalt weniger Kreatin als mageres. 100 Pfund Fleisch von einem magern alten Pferd gaben nahe 36 Grm. Kreatin; 116 magere Hühner (das Fleisch eines Huhnes wog durchschnittlich 203 Grm.) ungefähr 72 Grm.; 86 Pfund Ochsenfleisch 30 Grm. In dem Herzen des Ochsen ist es in reichlicher Menge enthalten (2). Aus Gehirnsubstanz, Leber und Nieren konnte kein Kreatin erhalten werden.

(1) Ann. Ch. Pharm. XLIX, 343. — (2) Gregory (Chem. Soc. Qu. J. I, 25; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 100; Pharm. Centr. 1847, 935) fand, daß sich das Fleisch vom Rochen (*Raja batia*) und vom Kabeljau (*Gadus morrhua*) leicht extrahiren und pressen läßt, und sich überhaupt zur Gewinnung des Kreatins gut eignet. Er erhielt aus 1000 Theilen Fleisch an Kreatin :

Huhn	Ochsenherz	Kabeljau	Taube	Rochen
2,9 bis 3,21	1,38 bis 1,42	0,94 bis 1,7	0,88	0 bis 0,61

Schloßberger (Ann. Ch. Pharm. LXVI, 80) erhielt aus 6 Pfd. menschlicher Muskeln nahezu 2 Grm. Kreatin; bei seiner Darstellung bildeten (ohne daß Barytwasser zugesetzt war) sich fortwährend die oben (S. 878) erwähnten schleimigen Häute; letztere zeigten sich unter dem Mikroskop als vollständig amorph.

Untersuchung
der Fleisch-
flüssigkeit.

und mit Wasser aufgeschlämmtes Bleioxydhydrat in kleinen Portionen zusetzt, wo allmählig die Flüssigkeit neutral oder schwach alkalisch wird, und bei weiterem Zufügen der dreifachen Menge des bereits verbrauchten Bleioxydhydrats und andauerndem Sieden zu einem dicken hellgelben Brei zu gerinnen scheint; die Flüssigkeit wird dann abfiltrirt und der Rückstand ausgewaschen; im Fall das Filtrat eine Spur Blei aufgeschlämmt oder gelöst enthält, wird diese durch Behandlung mit etwas Blutkohle weggenommen. (Diese Darstellung beruht auf der Ueberführung des Chlorbleis in eine überbasische, in Wasser unlösliche Verbindung.) Aus der im Wasserbad concentrirten wässerigen Lösung des Kreatinins krystallisirt es bei dem Erkalten in monoklinometrischen Krystallen, nach H. Kopp's Bestimmung in der Combination $\infty P . 0 P . \infty P \infty$; $0 P : \infty P \infty = 69^{\circ} 24'$; $\infty P : \infty P$ im orthod. Hauptschnitt $= 98^{\circ} 20'(1)$. Die Krystalle, $C_5 N_3 H_7 O_2$, lösen sich in dem 11,5fachen Gewicht Wasser von 16° , in weniger heißem, in dem 102fachen Gewicht Alkohol von 16° , leichter in siedendem. Die wässerige Lösung bläut geröthetes Lackmuspapier, und schmeckt in concentrirtem Zustande kaustisch; ein Kreatininkrystall bringt auf nassem Curcumapapier einen braunen Fleck hervor. Kreatininlösung zu einer mäßig concentrirten Lösung von salpeters. Silberoxyd gesetzt, bewirkt ein Gerinnen zu einer Masse von feinen weißen Nadeln, die in heißem Wasser leicht löslich sind, beim Erkalten unverändert daraus krystallisiren, und eine basische Verbindung von Kreatinin mit salpeters. Silberoxyd sind. Kreatininlösung giebt mit einer Auflösung von Quecksilber-

(1) Heintz (am S. 880 angef. Ort) fand $\infty P : \infty P$ im orthod. Hauptschnitt gleichfalls $= 98^{\circ} 20'$, $0 P : \infty P = 102^{\circ} 36'$, und daraus $0 P : \infty P \infty = 70^{\circ} 30'$; letzteren Winkel direct $= 69^{\circ} 57'$. Er hebt hervor, daß das Kreatin und das Kreatinin nahezu gleichen Neigungswinkel zwischen der Hauptaxe und der Klinodiagonale besitzen, und daß für gleiche Länge der Orthodiagonale die Klinodiagonale bei ersterem sich zu der bei letzterem nahezu wie 2 : 1 verhält.

chlorid sogleich einen weissen käsigen Niederschlag, der sich in einigen Minuten in ein Haufwerk feiner, durchsichtiger, farbloser Nadeln verwandelt; mit einer wässerigen neutralen Lösung von Zinkchlorid sogleich einen körnig krystallinischen Niederschlag (1). Das Kreatinin treibt das Ammoniak aus Ammoniaksalzen aus, und bildet mit Kupferoxydsalzen schön blaue krystallisirbare Doppelsalze. — Salzs. Kreatinin entsteht aus krystallisirtem Kreatin, wenn man über letzteres in einem Liebig'schen Trockenapparat bei 100° einen Strom trocknen Salzsäuregases leitet; das Gewicht des Products ist hier zuletzt fast genau das des angewandten krystallisirten Kreatins, indem 4 HO aus diesem austreten, ClH hingegen eintritt, und beide fast genau gleich schwer wiegen. Dieses Salz bildet sich auch bei dem Uebergiessen von Kreatin mit concentrirter Salzsäure, Abdampfen der Lösung und Erhitzen der trocknen Masse im Wasserbad bis zur Entfernung aller freien Salzsäure. Es löst sich ziemlich leicht in siedendem Alkohol, und krystallisirt daraus in kurzen, durchsichtigen, farblosen Prismen, welche in Wasser schwer löslich sind. Beim Abdampfen wird es in breiten durchsichtigen Blättern von sehr saurer Reaction erhalten. Seine Zusammensetzung ist $C_4N_4H_8O_2$, ClH; eine kochend gesättigte alkoholische Lösung dieses Salzes, welcher bis zum Verschwinden der sauren Reaction Ammoniak zugesetzt wird, liefert bei dem Erkalten kleine, durchsichtige, körnige Krystalle von Kreatinin. — Platinchlorid giebt mit einer verdünnten Lösung von salzs. Kreatinin keinen Niederschlag, aber bei dem Abdampfen in gelinder Wärme bilden sich dunkelgelbe oder morgenrothe, durchsichtige, ziemlich grofse Krystalle, die sich ziemlich leicht in Wasser, schwieriger in Alkohol lösen; dieselbe Verbindung bildet sich bei dem Abdampfen einer

Untersuchung
der Fleisch-
flüssigkeit.

(1) Aus Heintz' Versuchen (Pogg. Ann. LXX, 475) geht hervor, dafs dieser Niederschlag (welchen er für eine Kreatinverbindung hielt; vergl. bei Harn) bei 120° getrocknet nur Spuren hygroskopischen Wassers abgiebt, und $C_4N_4H_8O_2 + ZnCl$ ist.

Untersuchung
der Fleisch-
flüssigkeit.

Kreatinlösung, welcher man etwas Salzsäure und Platinchlorid zugesetzt hat; ihre Zusammensetzung ist $C_4N_4H_8O_2$, $ClH + PtCl_2$. — Schwefels. Kreatinin bleibt bei dem Abdampfen von 1 Kreatin mit einem gleichen Gewicht einer Mischung aus 27 concentrirter Schwefelsäure auf 73 Wasser, oder bei dem Abdampfen einer kochend gesättigten Lösung von Kreatinin, welcher man verdünnte Schwefelsäure bis zum Erscheinen stark saurer Reaction zugesetzt hat, als weiße Salzmasse; diese löst sich leicht in warmem Alkohol, die Lösung trübt sich beim Erkalten und setzt durchsichtige, concentrisch - gruppirte, quadratische Tafeln, $C_4N_4H_8O_2$, HO , SO_3 , ab, welche bei 100° klar und durchsichtig bleiben.

Ueber das Vorkommen des Kreatinins in der Fleischflüssigkeit vergl. S. 890, über das im Harn und über die Umwandlung des Kreatinins in Kreatin vergl. bei Harn.

Wird zu einer kochend gesättigten Lösung von Kreatin das zehnfache Gewicht des Kreatins an Barythydrat zugesetzt, so bleibt die Auflösung anfänglich klar, aber bei fortgesetztem Sieden entwickelt sich reichlich Ammoniak und ein weißes krystallinisches Pulver setzt sich an den Wänden des Gefäßes ab. Wird unter Zusatz von Barythydrat und Erneuerung des verdampfenden Wassers mit dem Kochen fortgefahren, bis sich kein Ammoniak mehr entwickelt, so erhält man beim Filtriren eine klare farblose Flüssigkeit, welche freien Aetzbaryt und eine neue organische Basis, *Sarkosin*, enthält. Man leitet einen Strom von Kohlensäure durch die Flüssigkeit und erhitzt zum Sieden, wo der Baryt abgeschieden wird; die zur Syrupdichte abgedampfte Flüssigkeit erstarrt bei ruhigem Stehen zu einem Haufwerk breiter, farbloser, durchsichtiger Blätter. (Der Aetzbaryt muß vollkommen rein sein, weil jede Verunreinigung bei dem Sarkosin bleiben würde.) Zur Darstellung des reinen Sarkosins ist es zweckmäßiger, dasselbe mit Schwefelsäure zu verbinden und davon wieder abzuscheiden. Zu diesem Ende setzt man dem durch Abdampfen

des Filtrats erhaltenen Sarkosin verdünnte Schwefelsäure bis zu stark saurer Reaction zu, dampft im Wasserbad ab, setzt dem syrupartigen Rückstand Alkohol zu, und sucht durch Reiben mit einem Glasstab beide zu mischen; das syrupartige schwefels. Salz erstarrt zu einem weissen krystallinischen Pulver, welches kalt mit Alkohol ausgewaschen, dann in Wasser gelöst und mit reinem kohlenst. Baryt erwärmt wird, bis kein Aufbrausen mehr wahrnehmbar und die saure Reaction der Lösung verschwunden ist; das Filtrat wird im Wasserbad zu Syrupdicke abgedampft, und bei ruhigem Stehen krystallisirt (nach 24 bis 36 Stunden) das Sarkosin heraus. Die Krystalle gehören dem rhombischen System an; sie zeigen ∞P , $\bar{P} \infty$, selten und schwach P und $0 P$ ($\infty P : \infty P = 77^\circ$); sie sind farblos, durchsichtig, äusserst löslich in Wasser, sehr schwer löslich in Alkohol, unlöslich in Aether. Bei 100° getrocknet behalten sie ihr Ansehen; bei einer etwähöheren Temperatur schmelzen sie und verflüchtigen sich ohne Rückstand; einige Krystalle zwischen zwei Uhrgläsern einige Zeit auf 100° erwärmt, sublimiren zu einem Netzwerk von Krystallen. Die Zusammensetzung des Sarkosins ist $C_8H_{11}NO_4$; es enthält dieselben Elemente und in dem nämlichen relativen Verhältniss wie Pelouze's Lactamid und wie Dumas' Urethan, unterscheidet sich aber hinlänglich von beiden durch seine Unlöslichkeit in Aether und Alkohol. Es entsteht aus dem krystallisirten Kreatin ($C_8H_{11}NO_3$) durch Austreten der Elemente des Harnstoffs ($C_2H_4N_2O_2$), welcher auch in der Flüssigkeit vor der beendigten Zersetzung des Kreatins durch Baryt enthalten ist; die bei dieser Zersetzung auftretende Kohlensäure und das Ammoniak sind secundäre, aus dem Harnstoff entstehende, Producte (1). Die wässerige Lösung des Sarkosins reagirt

Untersuchung
der Fleisch-
flüssigkeit.

(1) Sarkosin und Harnstoff sind übrigens nicht die einzigen Producte bei der Zersetzung des Kreatins durch Baryt; wenn man dem Alkohol, aus welchem das schwefels. Sarkosin krystallisirt ist, Wasser zusetzt, mit kohlenst. Baryt neutralisirt und die neutrale Flüssigkeit zu schwacher

Untersuchung
des Fleisch-
säuregehalts.

nicht auf Pflanzenfarben; sie schmeckt süßlich scharf, etwas metallisch; in einer verdünnten Lösung von salpeters. Silberoxyd oder Quecksilberchlorid bewirkt sie keine Veränderung. Bringt man hingegen einen Krystall von Sarkosin in eine kalt gesättigte Lösung von Quecksilberchlorid, so löst er sich sogleich auf, und bald entstehen viele feine durchsichtige Nadeln einer Doppelverbindung, zu welchen bei hinreichender Menge des Sarkosins die ganze Flüssigkeit erstarrt. Eine Lösung von essigs. Kupferoxyd nimmt auf Zusatz von Sarkosin eine tief dunkelblaue Farbe an, und bei gelindem Verdampfen erhält man ebenso gefärbte Blätter eines Doppelsalzes. — Bei dem Abdampfen des Sarkosins mit Salzsäure erhält man salzs. Sarkosin als eine weiße Salzmasse, welche aus heißem Alkohol in kleinen durchsichtigen Körnern und Nadeln krystallisirt. Bei dem Vermischen einer Auflösung von salzs. Sarkosin mit überschüssigem Platinchlorid entsteht kein Niederschlag; bei dem freiwilligen Verdunsten dieser Lösung krystallisiren große honiggelbe Octaëder (von überschüssigem Platinchlorid lassen sich die Krystalle durch eine Mischung von Alkohol und Aether befreien) eines Doppelsalzes $\text{Pt Cl}_2 + \text{C}_6\text{NH}_4\text{O}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ (das Wasser entweicht bei 100°). — Schwefels. Sarkosin, in der oben (S. 884) angegebenen Weise dargestellt, löst sich mit der 10- bis 12fachen Menge Alkohol gekocht darin auf, und bei dem Erkalten der Lösung setzen sich farblose, durchsichtige, sehr glänzende, vierseitige Tafeln ab, welche in ihrem Ansehen von chlores. Kali kaum

Syrupconsistenz abdampft, so setzen sich daraus (lange vor dem Punkte, wo das Sarkosin krystallisiren würde) farblose lange Säulen oder Blätter ab, welche eine schwach saure Reaction besitzen, und schmelzen und sich verflüchtigen ohne Baryt zu hinterlassen; sie lösen sich leicht in Wasser und Alkohol und in etwa 80 Theilen Aether; die wässrige Lösung bringt mit Silbersalzen, Quecksilberchlorid, essigs. Bleioxyd und Kalk- und Barytsalzen keinen Niederschlag hervor; die erhaltene Menge war zu gering, als daß durch die Analyse hätte entschieden werden können, ob dieser Körper seiner Zusammensetzung nach dem Urethan entspricht, mit welchem er viele Aehnlichkeit besitzt.

zu unterscheiden sind; sie sind in kaltem Alkohol schwierig, in Wasser hingegen leicht löslich, und krystallisiren aus letzterer Lösung in grossen gefiederten Blättern. Die wässerige sowohl als die alkoholische Lösung dieses Salzes reagirt sauer, so dafs sich nicht genau ermitteln läfst, wann bei dem Auswaschen die freie Schwefelsäure vollständig entfernt ist. Das krystallisirte schwefels. Sarkosin ist $C_6H_{11}NO_4$, $HO, SO_3 + HO$ (das 1 At. Krystallwasser entweicht bei 100°).

Untersuchung
der Fleisch-
flüssigkeit.

Wenn man die Mutterlauge der Fleischflüssigkeit, nachdem alles Kreatin auskrystallisirt ist, etwas weiter abdampft und mit kleinen Portionen Alkohol bis zu milchiger Trübung versetzt, so setzen sich aus dieser Mischung, wenn sie einige Tage ruhig stehen bleibt, gelbe oder weisse, körnige, blätterige oder nadelförmige Krystalle ab, die sich, wiewohl langsam, von der dicklich gewordenen Mutterlauge abfiltriren und mit Alkohol auswaschen lassen. Diese Krystalle sind ein Gemenge verschiedener Substanzen. Kreatin fehlt niemals darin; war durch den Zusatz von Baryt nicht alle Phosphorsäure aus der Fleischflüssigkeit ausgefällt, so enthält der Absatz auch phosphors. Magnesia; der Hauptbestandtheil aber ist das Kali- und das Barytsalz einer neuen Säure, der *Inosinsäure* (1). War genau hinreichend Baryt zugesetzt worden, um die Phosphorsäure auszufällen, so enthalten die Krystalle inosins. Kali; war Baryt überschüssig, so enthalten sie inosins. Baryt oder ein Gemenge beider

(1) Auf die Gewinnung der inosins. Salze aus der Fleischflüssigkeit hat die Temperatur, bei welcher die Fleischflüssigkeit abgedampft wird, einen grossen Einflufs. In einigen Fällen, wo die Abdampftemperatur nie 100° überstieg, wurde keine Spur derselben erhalten, während Fleischflüssigkeit von demselben Thier ziemlich reichliche Mengen davon lieferte, wenn während des Abdampfens die Flüssigkeit durch einen über ihre Oberfläche geleiteten Luftstrom auf 50 bis 60° erhalten wurde. — Gregory (am S. 879. angef. Ort) erhielt aus 7 Pfund Hühnerfleisch etwas über 4 Grm. reinen inosins. Baryt, aber gar keinen aus Ochsenherzen, Tauben-, Rochen- und Kabeljaufleisch; Schlofsberger (am S. 879 angef. Ort) gar keine Inosinsäure aus menschlichen Muskeln.

Untersuchung
der Fleisch-
flüssigkeit.

Salze. Man löst den Absatz in heißem Wasser, und setzt Chlorbaryum zu; bei dem Erkalten krystallisirt inosins. Baryt, welcher noch einmal umkrystallisirt wird. Aus dem Barytsalz läßt sich die Inosinsäure durch verdünnte Schwefelsäure, aus dem Kupferoxydsalz durch Schwefelwasserstoff leicht abscheiden; die in beiden Fällen erhaltene wässrige Inosinsäure reagirt stark sauer und besitzt einen angenehmen, fleischbrühartigen Geschmack; abgedampft hinterläßt sie einen Syrup, der nach wochenlangem Stehen keine Spur von Krystallisation zeigt; wird derselbe mit Alkohol behandelt, so verwandelt sich die dicke Flüssigkeit in eine pulverige, feste, harte Masse, von der sich nur Spuren in Alkohol lösen; aus einer concentrirten wässrigen Lösung wird die Säure durch Alkohol in weißen, nicht krystallinischen Flocken niedergeschlagen; sie ist nicht in Aether löslich. Die Säure, im s. g. Hydratzustand $C_{10}N_2H_4O_{11}$, enthält die Elemente der wasserfreien Essigsäure ($C_4H_2O_2$), der Oxalsäure (C_2O_4) und des Harnstoffs ($C_2N_2H_4O_2$). Wird sie mit etwas Bleihyperoxyd unter Zusatz von verdünnter Schwefelsäure erwärmt, so wird das Bleihyperoxyd weiß, und die abfiltrirte Flüssigkeit, von der überschüssigen Schwefelsäure befreit, setzt beim Verdampfen nadelförmige Krystalle ab; wird sie im concentrirten Zustand mit Salpetersäure vermischt, so entsteht keine Fällung, aber man erhält beim Verdampfen kleine, farblose, körnige Krystalle, welche in zu geringer Menge dargestellt wurden, als daß sie hätten näher untersucht werden können. — Die freie Inosinsäure bringt in Kalk- oder Barytwasser keinen Niederschlag hervor, aber bei ruhigem Stehen und Verdampfen an der Luft bilden sich durchsichtige, perlmutterglänzende Blättchen von inosins. Kalk oder Baryt. Die freie Säure und ihre löslichen Salze geben mit essigs. Kupferoxyd einen schön grünblauen Niederschlag von inosins. Kupferoxyd, welcher getrocknet ein hellblaues nicht krystallinisches Pulver und fast unlöslich in Wasser, nicht löslich in Essigsäure, leicht löslich (mit blauer Farbe) in Ammoniak ist. Silbersalze

werden durch inosins. Salze weiß gefällt; der Niederschlag ist gelatinös wie Thonerdehydrat, schwärzt sich nicht oder nur unbedeutend am Licht, löst sich etwas in reinem Wasser, weniger in solchem, welches salpeters. Silberoxyd enthält, löst sich in Salpetersäure und Ammoniak. In Bleisalzen bringt die Inosinsäure einen weißen Niederschlag hervor. Die Alkalisalze der Inosinsäure werden beim Erhitzen auf Platinblech zersetzt, und verbreiten dabei einen starken und angenehmen Geruch nach gebratnem Fleisch. — Das Kalisalz wird direct aus der Fleischflüssigkeit (vgl. S. 887) oder aus dem Barytsalz durch vorsichtige Zersetzung mit kohlen. Kali erhalten; es ist in Wasser sehr löslich und krystallisirt daraus in dünnen, vierseitigen, langen Prismen; es ist unlöslich in Alkohol und wird durch ihn schon aus verdünnten Lösungen gefällt (eine concentrirte Lösung gerinnt auf Zusatz von Alkohol zu einem Brei feiner, perlmutterglänzender Blättchen); die Krystalle sind $\text{KO}, \text{C}_{10}\text{N}_2\text{H}_6\text{O}_{10} + 7\text{HO}$, das Wasser entweicht bei 100° . Inosins. Natron krystallisirt in feinen seidenglänzenden Nadeln, ist in Wasser sehr leicht, in Alkohol nicht löslich. Inosins. Baryt, wie oben (S. 888) dargestellt, ist unlöslich in Alkohol, löslich in 400 Wasser von 16° , leichter in heißem Wasser (wird eine bei 70° gesättigte wässrige Lösung zum Sieden erhitzt, so schlägt sich ein Theil des Salzes als harzähnliche Masse nieder; siedendes Wasser löst nicht so viel Salz als Wasser von 60 bis 70° , und der Rückstand bei dem Kochen mit Wasser erleidet bei längerem Sieden eine Veränderung, wodurch er seine Löslichkeit in minder heißem Wasser verliert). Die Krystalle des Barytsalzes sind längliche, vierseitige, perlmutterglänzende Blättchen, $\text{BaO}, \text{C}_{10}\text{N}_2\text{H}_6\text{O}_{10} + 7\text{HO}$; in trockner Luft verwittern sie, bei 100° verlieren sie alles Wasser und werden matt und undurchsichtig. — Liebig hebt hervor, daß die Untersuchung der Inosinsäure und ihrer Salze noch nicht als abgeschlossen zu betrachten sei, da das Fleisch nur eine sehr kleine Menge derselben liefere.

Untersuchung
der Fleisch-
flüssigkeit.

Untersuchung
der Fleisch-
flüssigkeit.

Versetzt man die Fleischflüssigkeit, aus welcher durch Alkohol die inosins. Salze abgeschieden wurden, mit einer neuen Portion Alkohol, so trennt sie sich nach dem Zusatz von etwa dem 5fachen Volum in zwei Schichten, eine mattere, dicke, syrupartige, bräunlichgelbe, und eine etwa das 20fache Volum der vorigen betragende leichtere. Aus der schwereren scheiden sich bei -5° bald viele Krystalle von Chlorkalium aus. Wird die schwerere Flüssigkeit von der leichteren getrennt und mit einem gleichen Volum gewöhnlichen Aethers versetzt, so entsteht eine milchige Trübung, und in der Ruhe sammelt sich am Boden des Gefäßes eine bernsteingelbe, syrupdicke Flüssigkeit, welche fast ganz aus milchs. Kali besteht; die überstehende Flüssigkeit enthält gleichfalls etwas von diesem Salz, aber der Hauptbestandtheil derselben ist das oben (S. 881) besprochene Kreatinin. Wird diese überstehende, äther- und alkoholhaltige Flüssigkeit der Destillation unterworfen und der Rückstand zu schwacher Syrupconsistenz abgedampft, so erstarrt derselbe nach dem Erkalten zu einer Masse feiner blättriger Krystalle, von welchen sich die Mutterlauge bei Verdünnen mit etwas Alkohol abfiltriren läßt. Werden diese Krystalle mit etwas Alkohol gewaschen, getrocknet, und in siedendem Alkohol gelöst, so scheiden sich sogleich nach dem Erkalten dieser Lösung Krystalle von Kreatin ab; die Mutterlauge giebt bei gelindem Verdampfen gelblich gefärbte, vierseitige Tafeln von Kreatinin, welche durch Behandlung mit etwas Bleioxydhydrat und Blutkohle vollkommen farblos erhalten werden können.

Wird die Flüssigkeit, aus welcher sich die inosins. Salze abgesetzt haben, im Wasserbade eingedampft und der Rückstand mit Alkohol behandelt, so gehen alle milchs. Salze in die Lösung über. Wird die Alkohollösung von dem darin unlöslichen Syrup getrennt und der Alkohol durch Verdampfen entfernt, so bleibt ein gelber Syrup, welcher nach 8 bis 10 Tagen zu einer weichen krystallinischen Masse erstarrt; die Krystalle, die sich hier bilden,

bestehen aus Kreatinin, Kreatin, dem Kalisalz einer stickstoffhaltigen, von der Inosinsäure verschiedenen, Säure; die Mutterlauge enthält milchs. Kali. Zur Darstellung der Milchsäure mischt man die ganze Masse mit einem gleichen Volum verdünnter Schwefelsäure (aus 2 Vol. concentrirter auf 2 Vol. Wasser bereitet) oder mit einer Lösung von Oxalsäure von gleicher Stärke (von letzterer mit so viel, daß ein krystallinischer Absatz entsteht), und versetzt diese Mischung sogleich mit dem 3- bis 4fachen Volum Alkohol. Schwefels. oder saures oxals. Kali werden gefällt, die Milchsäure bleibt in Auflösung; man vermischt diese Flüssigkeit mit Aether, bis neuer Zusatz keine Trübung mehr hervorbringt, filtrirt, destillirt aus dem Filtrat den Alkohol und den Aether ab, und concentrirt den Rückstand im Wasserbad bis zu Syrupconsistenz. Zu diesem Syrup setzt man das ½fache Volum Alkohol und dann das 5fache Volum Aether, und erhält so eine beinahe reine ätherische Lösung von Milchsäure; nach Verdunstung des Aethers wird der Rückstand mit Kalkmilch bis zu stark alkalischer Reaction gemischt, filtrirt, und die Lösung an einem warmen Orte stehen gelassen, wo sie bald zu farblosen Krystallen erstarrt, die nur durch anhängende Mutterlauge gelb gefärbt erscheinen; die Mutterlauge wird durch Waschen mit Alkohol entfernt. Zur Scheidung von beigemengtem schwefels. Kalk löst man die Krystalle in Weingeist von 60 pC., filtrirt, behandelt die Flüssigkeit (wenn sie gefärbt ist) mit etwas Blutkohle und dampft ab, wo man durch Krystallisation vollkommen reinen milchs. Kalk erhält. — Aus allen Fleischsorten läßt sich auf diese Art milchs. Kalk erhalten; nur das Fischfleisch macht eine andere Behandlung nöthig. Die Fleischflüssigkeit aus diesem dampft man zu Syrupconsistenz ab und vermischt sie mit wässriger Lösung von Gerbsäure, wo ein dicker, gelblich weißer, in der Wärme pechartig zusammenfließender Niederschlag gebildet wird; die davon getrennte Flüssigkeit wird wie oben angegeben mit Schwefelsäure oder Oxalsäure be-

Untersuchung
der Fleisch-
flüssigkeit.

Untersuchung
der Fleisch-
flüssigkeit.

handelt, und man behält zuletzt in ätherischer Lösung ein Gemenge von Gallussäure (die sich aus der Gerbsäure gebildet hat) und Milchsäure, aus welcher die Gallussäure nach Entfernung des Aethers zum Theil auskrystallisirt. Ohne diese Krystalle zu trennen, sättigt man das Säuregemenge mit Kalkmilch, filtrirt von dem sich dunkelbraun oder schwarz färbenden Rückstand ab, behandelt das Filtrat (wenn es gefärbt ist) mit Blutkohle, und dampft ab; nach einiger Zeit krystallisirt vollkommen weißer milchs. Kalk heraus. Die Identität der Zusammensetzung mit der der Milchsäure wurde durch Analysen des Kalksalzes und des Zinkoxydsalzes außer Zweifel gesetzt; über Eigenthümlichkeiten, welche die aus Fleischflüssigkeit erhaltene Milchsäure im Vergleich mit der gewöhnlichen zeigt, vergl. S. 517.

Liebig hat endlich noch *die unorganischen Bestandtheile der Fleischflüssigkeit* untersucht. Wird diese ohne Zusatz von Baryt abgedampft und eingeäschert, so erhält man eine schwierig weiß zu brennende Asche, welche nur aus phosphors. Alkalien und Chlormetallen besteht. Die aus dieser Asche erhaltenen löslichen Salze enthalten die verschiedenen Modificationen der Phosphorsäure. Die Asche der Fleischflüssigkeit vom Ochsen, Pferd, Fuchs und Reh giebt mit Wasser eine stark alkalische Auflösung, welche durch neutrales salpeters. Silberoxyd zuerst weiß, dann gelb gefällt wird, und die Mischung zeigt sich nach der Fällung vollkommen neutral; die Asche enthält also Salze der Phosphorsäure mit 2 und mit 3 At. Alkali; dasselbe ist noch, wenn auch in abgeändertem Verhältniß, der Fall, wenn die Asche mit Salpetersäure eingedampft und zum Glühen erhitzt, also das Alkali der Chlormetalle den phosphors. Alkalien zugefügt wurde. Die Asche der Fleischflüssigkeit vom Huhn giebt eine wässrige Lösung, welche durch salpeters. Silberoxyd rein weiß gefällt wird und also pyrophosphors. Alkali enthält; auch nach dem Befeuchten der Asche mit Salpetersäure und Glühen wird die wässrige Lösung noch weiß gefällt, wonach auch etwas phos-

phors. Alkali mit 1 At. Basis in der Fleischflüssigkeit enthalten sein mußte. Da die Fleischflüssigkeit noch vor dem Punkte, wo die Phosphorsäure durch Baryt ausgefällt ist (wo erstere also noch keinen Baryt enthält), alkalische Reaction annimmt, so muß in ihr saures milchs. Alkali und saures phosphors. Alkali enthalten sein (der Gehalt an Inosinsäure ist zu gering, als daß er mit zu berücksichtigen wäre). Liebig knüpft hieran Betrachtungen über den Gleichgewichtszustand zwischen diesen beiden Säuren und die Erhaltung des Gleichgewichtszustandes in der Beschaffenheit des Bluts im Organismus; er konnte im Harn keine Milchsäure auffinden, und kommt zu dem Schluss, daß die Milchsäure zu der Unterhaltung des Respirationsprocesses verwendet wird.

Die Fleischflüssigkeit aller Thiere ist besonders reich an Kali; sie enthält Chlorkalium und nur wenig Chlornatrium; in dem Blut ist das Verhältniß umgekehrt. Liebig fand, daß auf 100 Theile Natron annähernd an Kali enthalten sind:

	Huhn	Ochs	Pferd	Fuchs	Recht
im Blut	40,8	5,9	9,5	—	—
im Fleisch	381	279	285	214	497

Er bespricht die Bildung des für den Organismus nöthigen phosphors. Natrons bei Thieren, welche nur Kali enthaltende Pflanzen verzehren, und die Nothwendigkeit des Genusses von Kochsalz in solchen Fällen. Er erörtert weiter den Gehalt des Bluts an Kohlensäure und an kohlen. Alkali (vergl. S. 872). — Die Menge des in der Fleischflüssigkeit enthaltenen Kalks fand er im Allgemeinen sehr gering; nur für die Fleischflüssigkeit vom Huhn liefs sich genauer ermitteln, daß sie 3,92mal so viel Magnesia als Kalk enthält. Für die Fleischflüssigkeit vom Ochsen fand er, daß darin 3,5- bis 3,2mal so viel Phosphorsäure an Alkalien als an Magnesia gebunden ist.

Hinsichtlich der Resultate, welche Liebig's Untersuchungen für die Chemie der Nahrungsmittel ergeben haben, vergl. den Bericht über technische Chemie.

Untersuchung
der Fleisch-
flüssigkeit.

Fleischasche. Enderlin (1) hat einige analytische Data mitgetheilt hinsichtlich der Asche vom Fleisch des Hahns, des Frosches und des Barsches, und die Asche der Stubenfliege untersucht.

Thierische Säfte im Allgemeinen. Andral (2) hat Beobachtungen über die saure oder alkalische Reaction verschiedener Flüssigkeiten des menschlichen Körpers mitgetheilt, und hervorgehoben, daß die eigenthümliche Reaction jeder Flüssigkeit bei normalem Zustande des Körpers constanter ist, als man es vermuthen möchte. — Das Blutserum fand er stets alkalisch. Die Haut sondert zwei verschiedenartig reagirende Flüssigkeiten ab: sauren Schweiß und alkalische Fettmaterie. Die klare, von Kügelchen freie Flüssigkeit, welche auf gesunden Schleimhäuten abgesondert wird, reagirt sauer; sobald derselben aber eine trübe, mit Kügelchen versehene Flüssigkeit beigemischt ist, so reagirt sie alkalisch. Als die normale Reaction der von der Schleimhaut des Mundes abgesonderten Flüssigkeit betrachtet Andral die saure; durch die Zumischung von Speichel kann aber diese in die alkalische übergehen. Den Speichel und die Thränenflüssigkeit fand er immer alkalisch. Der gesunde Harn ist nach ihm immer sauer, oder neutral, wenn die saure Reaction durch ungewöhnlich großen Gehalt an Wasser unmerklich geworden ist; Andral erörtert die zufälligen Einflüsse, welche alkalische Reaction des Harns hervorbringen können. Wir müssen bezüglich dieser Erörterung und der specielleren Angaben Andral's überhaupt auf die Abhandlung selbst verweisen.

Bezüglich einer Untersuchung C. Schmidt's (3) über Transsudation im Thierkörper und die Zusammensetzung darauf beruhender Secrete müssen wir auf die Abhandlung verweisen.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 304. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 116; Compt. rend. XXVI, 649; Pharm. Centr. 1848, 641. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 342.

Scherer (1) fand die reine Amniosflüssigkeit a) von einem 5monatlichen Fötus, b) von einer ausgetragenen Frucht in 1000 Theilen zusammengesetzt :

	Albumin mit Schleimstoff	Extractive Stoffe.	Salze (größtenth. m. alkal. Basis)	Wasser
a)	7,67	7,24	9,25	975,84
b)	0,82	0,60	7,06	991,47

Harnstoff fand er darin nicht, aber Kreatinin scheint ihm darin enthalten zu sein.

Ueber die Reaction von Flüssigkeiten aus dem Körper an Cholera Leidender hat Burguières (2) Mittheilungen gemacht. Er fand die normale saure Reaction der Hautoberfläche aufgehoben, und die des Magens durch alkalische Reaction ersetzt.

Die Flüssigkeit aus dem Hodensack eines an Hydrocele Leidenden hat Grassi (3) untersucht; die Flüssigkeit eines bei Exstirpation eines Auges in Fundo Orbitae gefundenen Hygroma Landerer (4).

Bei der Destillation von *Castoreum canadense* mit Wasser erhielt Wöhler (5) ein Destillat, welches stark nach Castoreum roch und mit Eisenchlorid, schwach aber entschieden, die Reaction der Carbonsäure zeigte; die Flüssigkeit im Destillationsgefäß, von der Castoreummasse siedend heiß abfiltrirt, setzte bei dem Erkalten eine kleine Menge einer pulverigen, gelben, in Kali leicht löslichen, nicht näher ermittelten Substanz ab; die davon abfiltrirte Flüssigkeit enthielt ein benzoës. Salz und Salicin.

Bernard und Barreswil (6) haben Zucker in der Leber gefunden, selbst bei Thieren, welche ausschließlich mit Fleisch gefüttert wurden; die Leber ist nach ihnen das einzige Organ des Thierkörpers, welches im normalen Zustande Zucker enthält (7). Den Zucker selbst erhielten sie

(1) Aus Siebold und Kölliker's Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie I, 88 in Pharm. Centr. 1849, 29. — (2) Compt. rend. XXVII, 348; Pharm. Centr. 1848, 908. — (3) J. pharm. [3] XIV, 364. — (4) Repert. Pharm. [2] XLV, 61. — (5) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 360; Repert. Pharm. [3] II, 90. — (6) Compt. rend. XXVII, 514. — (7) Richtiger vielleicht : Zucker bei dem Auskochen mit Wasser liefert ?

nicht im krystallisirten oder festen Zustande, aber sie wiesen ihn nach durch Gährenlassen und Darstellung des dabei sich bildenden Alkohols (1).

Galle.

Die Galle verschiedener Thiere war der Gegenstand der Untersuchung mehrerer Chemiker; besonders wurden die Ochsen- und die Schweinegalle mit großer Sorgfalt studirt. Wir berichten hier zuerst über die Resultate, zu welchen die Untersuchung der Ochsen- und Schweinegalle geführt hat; die Angabe der Resultate, welche bei der Untersuchung der Galle von andern Thieren erhalten wurden, läßt sich dann leichter daran anlehnen.

Untersuchung
der
Ochsen- und Schweinegalle.

Ueber die Ochsen- und Schweinegalle sind zwei Abhandlungen von Strecker (2) und eine von Mulder (3) veröffentlicht worden.

Man wird sich erinnern, daß über die Constitution des Hauptbestandtheils der Ochsen- und Schweinegalle, welcher neben geringen Mengen von Gallenblasenschleim, Fetten, Cholesterin und mehreren anorganischen Salzen beim Abdampfen des Inhalts der Gallenblase zurückbleibt, hauptsächlich zwei verschiedene Ansichten aufgestellt waren. Nach Berzelius besteht derselbe nämlich aus einem einzigen Mutterstoffe, dem *Bilin*, nebst verschiedenen Zersetzungsproducten desselben, welche zum Theil stickstofffreie Säuren sind, wie *Fellinsäure* und *Cholinsäure*, denen die Eigenschaft zukommt, mit Bilin gepaarte Verbindungen von saurer Natur einzugehen. Diese Verbindungen — *Bilifellinsäure* und *Bilicholinsäure* — sind indessen so locker, daß schon durch Behandlung mit Aether eine theilweise Trennung eintritt, indem die Säuren sich in Aether lösen, während

(1) Versuche, welche im Laboratorium zu Gießen angestellt wurden, haben diese Angaben für die Leber sowohl gras- als fleischfressender Thiere bestätigt. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 1; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 13; J. pr. Chem. XLVI, 137; J. pharm. [3] XIII, 215; Chem. Gaz. 1848, 149. Sodann Ann. Ch. Pharm. LXVII, 1; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 881, 897; J. pr. Chem. XLVI, 143; J. pharm. [3] XV, 158; Lenz und Gerh. Compt. rend. des trav. chim. 1849, 48; Chem. Gaz. 1849, 49. 74. — (3) Scheik. Onderz. V, 1. Mulder hat außerdem eine Kritik der Untersuchung Strecker's publicirt (Scheik. Onderz. IV, 605).

Bilin, als darin unlöslich, zurückbleibt. Diese Ansicht Untersuchung
der
Ochsengalle. suchte später Mulder (1) in einer ausführlichen Untersuchung zu vertheidigen. — Eine andere Ansicht über die Constitution des Hauptbestandtheils der Ochsengalle ist von Demarçay zuerst aufgestellt, und von der Liebig'schen Schule hauptsächlich vertheidigt worden, daß nämlich derselbe das Natronsalz einer stickstoffhaltigen Säure — *Gallensäure* oder *Choleinsäure* — sei, welche sich nach der Auffindung des Schwefelgehalts des Taurins durch Redtenbacher als schwefelhaltig erwies.

Durch eine ausführliche Untersuchung ist nun Strecker zu dem Schlusse gelangt, daß der organische Bestandtheil der Ochsengalle zwar einen sauren Character besitzt, aber aus zwei verschiedenen Substanzen besteht, die indessen bei der Zersetzung einerseits dieselben *stickstofffreien* Producte, andererseits verschiedene *stickstoffhaltige* Körper, nämlich *Glycocoll* und *Taurin* liefern, so daß man die zwei Säuren als gepaarte Verbindungen derselben Säure mit Glycocoll und Taurin betrachten kann. Wir theilen die Resultate der Untersuchung in der Reihenfolge mit, daß wir zuerst die mit Glycocoll gepaarte Säure (*Cholsäure*) und ihre Zersetzungsproducte durch Alkalien und Säuren beschreiben, worauf wir die mit Taurin gepaarte Säure (*Choleinsäure*) abhandeln werden.

Die eine dieser Säuren ist die schon vor längerer Zeit von L. Gmelin entdeckte *Cholsäure*, für welche Strecker folgende Bereitungsweise empfiehlt. Frische Ochsengalle wird im Wasserbade zur Trockne verdampft, der Rückstand gepulvert, in absolutem Alkohol gelöst, und die gefärbte Flüssigkeit mit Aether versetzt. Es entsteht hierdurch ein stark gefärbter, mehr oder weniger syrupartiger Absatz, welcher bei längerem Verweilen in der Flüssigkeit zuweilen der ganzen Masse nach, in der Regel aber nur theilweise sich in ein Haufwerk nadelförmiger Krystalle

(1) Scheik. Onderz. IV, 1.

Masse von strahlenförmig gruppirten Krystallen wandelt (1). Nach 24stündigem Stehen gießt Flüssigkeit von ihm ab, wascht ihn mit einer von Alkohol und Aether ab, und löst ihn noch in Wasser auf. Diese wässerige Lösung giebt auf verdünnter Schwefelsäure eine milchige Flüssigkeit, nach einigen Stunden eine Menge von weissen Krystallen, so daß häufig die ganze Flüssigkeit in Masse erstarrt. Zwischen den Krystallen beobachtet man in der Regel einige öartige, gefärbte Tropfen. Man bringt die Masse auf ein Filter, wäscht sie mit kaltem Wasser aus, worin die öartigen Tropfen sich lösen, und endlich den Rückstand mit kochendem Wasser aus. Man löst sich zum größten Theile mit Hinterlassung von einem glänzenden Schüppchen, worauf die hebräische Flüssigkeit beim Erkalten wieder zu einer Masse von Krystallnadeln erstarrt, welche reine Cholsäure ist. Der auf dem Filter gebliebene Rückstand ist eine in Wasser unlösliche Modification der Cholsäure, welche durch Auflösen in Alkohol und Fällen durch Wasser wieder in Cholsäure verwandelt; Strecker nennt dieselbe *Paracholsäure*. — Eine andere Darstellung der Cholsäure ist der von L. Gmelin angegebenen ähnlich, besteht nämlich aus dem durch Zersetzen von Bismut-

in Wasser (Mulder) oder in Essigsäure vertheilt (L. Gmelin), Untersuchung
der
Ochsengalle. oder endlich trocknet, in Alkohol löst (Strecker), und durch Schwefelwasserstoff zersetzt. In den zwei ersten Fällen wäscht man das Schwefelblei zuerst mit kaltem Wasser aus, hierauf mit kochendem Wasser; im letzteren Falle dagegen wird die alkoholische Flüssigkeit filtrirt, und das Schwefelblei mit Wasser ausgewaschen, welches man in die alkoholische Flüssigkeit fließen läßt, worauf die milchig gewordene Lösung beim Stehen Krystalle von Cholsäure absetzt. Die hierdurch erhaltene Cholsäure ist indessen nach Mulder ammoniakhaltig, und muß durch Auflösen in Barytwasser davon befreit werden.

Die Cholsäure bildet feine weiße Nadeln, welche selbst bei 300facher Vergrößerung kaum einen Durchmesser zeigen; auf dem Filter gesammelt sind sie anfangs sehr voluminös, ziehen sich aber nach und nach zu einem seidenglänzenden Blatt zusammen. 1000 Th. kaltes Wasser lösen 3,3 Th. Säure, 1000 kochendes 8,3 Th. Die wässrige Lösung schmeckt süß und etwas bitter, besitzt saure Reaction, und giebt nur mit basisch-essigs. Bleioxyd eine Fällung. In Alkohol ist die Säure sehr leicht löslich, und hinterbleibt beim Verdampfen in der Wärme als harzartige Masse. Die alkoholische Lösung wird durch Wasser zu einer milchigen, filtrirbaren Flüssigkeit, welche nach mehreren Stunden unter Abscheidung von Krystallnadeln klar wird. In Aether ist die Säure wenig löslich, wird aber davon nur schwierig aus der alkoholischen Lösung gefällt. In kalter Schwefelsäure, Salzsäure und Essigsäure löst sie sich reichlich auf; beim Kochen der Lösung mit Mineralsäuren bildet sich ein harzartiger Niederschlag. In kautistischen Alkalien, Ammoniak und Barytwasser löst sich die Säure leicht auf, und auf Zusatz von Essigsäure wird sie wieder in amorphem Zustand gefällt. Die Cholsäure kann in 3 Modificationen erhalten werden; die eine derselben ist die beschriebene, eine zweite der so eben erwähnte amorphe Niederschlag, der beim Verweilen in der Flüs-

Untersuchung der Ochsengalle. sigkeit und schneller auf Zusatz von Aether krystallirt; eine dritte ist die *Paracholsäure* (S. 898), perlmutterglänzende Blättchen, die unter dem Mikroskop als sechseckige Tafeln erscheinen, an welchen zwei gegenüberstehende Seiten beträchtlich gröfser sind als die andern. Die *Paracholsäure* ist in Wasser unlöslich; sie geht durch Auflösen in Alkohol oder in Alkalien in gewöhnliche Cholsäure über, welche beim Kochen mit Wasser wieder theilweise *Paracholsäure* liefert.

In Betreff der chemischen Formel der Cholsäure und ihrer Zersetzungsproducte sind Strecker und Mulder verschiedener Ansicht; Mulder nimmt nämlich in der Cholsäure 54 Aequiv., Strecker 52 Aequiv. Kohlenstoff an, welche Differenz von 2 C sich in allen Zersetzungsproducten wieder findet. Zur Vergleichung führen wir beide Formeln nebst den analytischen Resultaten (1) an; die analytischen Resultate beider Chemiker weichen indessen nicht bedeutend von einander ab.

Zusammensetzung der Cholsäure:

	Kohlenstoff	Wasserstoff	Stickstoff	Sauerstoff
$C_{54}H_{104}NO_{12}$ (Mulder)	66,6	9,0	2,9	21,5
$C_{52}H_{102}NO_{12}$ (Strecker)	67,1	9,3	3,0	20,6
3 Versuche (Mulder)	66,5—66,8 (66,6)	9,2—9,3 (9,3)	3,2—3,3 (3,3)	—
9 Versuche (Strecker)	66,8—67,4 (67,1)	9,2—9,4 (9,3)	2,7—3,2 (3,0)	—


Die Cholsäure bildet mit den Alkalien und den alkalischen Erden in Wasser leichtlösliche Salze, mit den schweren Metalloxyden in Wasser unlösliche oder schwerlösliche Salze; sämmtliche Salze lösen sich in Alkohol auf. Die Salze lassen sich zum gröfsten Theil sowohl in krystallisirtem als in amorphem Zustande darstellen, in ersterem am besten durch Fällen aus der alkoholischen Lösung mittelst Aether, in letzterem durch Abdampfen der Lösung oder beim Niederschlagen aus der wässerigen Lösung. — *Chols. Natron* wird durch Auflösen von Cholsäure in kohlen-

(1) Die eingeklammerten Zahlen stellen das berechnete Mittel der Analysen dar.

Natron bis zur Neutralisation und Abdampfen der Lösung dargestellt. Es wird aus der wässerigen Lösung durch Natronlauge oder concentrirtes kohlens. Natron als amorphe Masse gefällt. Aus der alkoholischen Lösung wird das Salz durch Aether in sternförmig gruppirten weissen Nadeln abgeschieden. Es schmilzt beim Erhitzen und brennt mit rufsender Flamme unter Hinterlassung einer leicht schmelzbaren Asche von alkalischer Reaction, welche cyans. Natron enthält. Nach Mulder wird das Salz erst bei 130° wasserfrei, wogegen Strecker's Analysen des bei 100° getrockneten Salzes sprechen. Die Zusammensetzung des chols. Natrons ist 1) nach Mulder, 2) nach Strecker :

	Kohlenstoff	Wasserstoff	Stickstoff	Sauerstoff	Natron
1) $C_{14}H_{11}NO_{11}, NaO$	63,7	8,5	2,8	18,9	6,1
2) $C_{14}H_{11}NO_{11}, NaO$	64,1	8,6	2,9	18,0	6,4
3 Versuche (Strecker)	63,8—63,9	8,7—8,8	—	—	6,1—6,2 (6,2)
1 Versuch (Mulder)	64,1	8,7	—	—	6,3

Das *Kalisalz* der Cholsäure gleicht in jeder Beziehung dem Natronsalz. — Das neutrale *chols. Ammoniak* stellt Strecker durch Einleiten von trockenem Ammoniakgas in eine alkoholische Lösung der Säure dar; nach einiger Zeit oder bei Zusatz von Aether augenblicklich entstehen nadelförmige Krystalle. Dieselben verlieren schon beim Trocknen im leeren Raum Ammoniak und nehmen eine saure Reaction an; dasselbe geschieht beim Kochen der wässerigen Lösung. Mulder fand, indem er zuerst trocknes Ammoniakgas über Cholsäure leitete und hierauf bei 100° eine Stunde lang trockne Luft, eine Gewichtszunahme von 1,6 pC., woraus er auf die Existenz eines sauren Ammoniaksalzes schließt. — *Chols. Baryt* wird durch Auflösen von Cholsäure in Barytwasser, Einleiten von Kohlensäure und Verdampfen zur Trockne als weisse, amorphe Masse erhalten. Zur Analyse wurde er nochmals in absolutem Alkohol gelöst, worin er indessen weit weniger löslich ist als in Wasser; 1000 Th. Wasser von 15° lösen 162 Th. Barytsalz.



trocknete bei 100°.

Mulder hat außerdem noch durch Auflösen von Cholsäure in über Natron und Fällen mit Bleizucker dargestellt, hierauf in Alkohol gelöst und durch Was geschlagen. Mulder stellt dafür die Formel PbO auf; der gefundene Gehalt an Fett weicht von dem berechneten (18,9 pC.) der Analyse Gewicht geben zu können.

Zersetzungsproducte der Cholsäure da man Cholsäure längere Zeit mit einer Lösung von Barythydrat, so erleidet diese eine Zersetzung, indem sie sich in eine Masse, welche *Cholalsäure* genannt wurde, und Man muß, um der vollständigen Zersetzung das Kochen 12 Stunden oder länger an Lösung bleibt hierbei ganz klar, und erst zu einer krystallinischen Masse. Nimmt in einer Retorte mit Vorlage vor, so bewährend eine geringe Ammoniakentwird destillierte Wasser enthält einen unang Körper in geringer Menge gelöst. Bei sekundäre Producte des Glycogells sein

Einleiten von Kohlensäure von dem Barytüberschufs befreit; Untersuchung
der
Ochsengalle. die filtrirte Lösung wird mit Salzsäure versetzt, wodurch noch eine Portion Cholsäure abgeschieden wird; aus der Lösung endlich wird der Baryt durch Schwefelsäure gefällt. Durch Kochen mit Bleioxydhydrat werden Salzsäure und Schwefelsäure entfernt, das gelöste Bleioxyd endlich durch Schwefelwasserstoff niedergeschlagen, worauf die Lösung beim Verdampfen prismatische Krystalle von Glycocoll absetzt. Strecker hat durch Vergleichung der Eigenschaften und durch die Analyse die Identität des aus der Cholsäure erhaltenen Stoffes mit Glycocoll erwiesen.

Die neben dem Glycocoll bei dieser Zersetzung auftretende stickstofffreie Säure, welche Strecker *Cholsäure* nennt, ist mit der Cholsäure Demarçay's, welche dieser Chemiker aus Ochsengalle durch Kochen mit Kali erhielt, identisch. Es ist oben angegeben, wie sie von dem Baryt getrennt wurde; man läßt die harzartig gefüllte Masse in der Flüssigkeit so lange liegen, bis sie hart und zerreiblich geworden ist, worauf man sie mit kaltem Wasser auswascht und hierauf in kochendem Alkohol löst, woraus sie beim Erkalten krystallisirt.

Die aus Alkohol krystallisirte Cholsäure zeigt quadratische Pyramiden mit abgestumpften Seitenecken oder Tetraëder des quadratischen Systems mit abgestumpften Seitenkanten, in welchen nach H. Kopp das Verhältniß der Hauptaxe zu einer Nebenaxe = 0,7946 : 1 ist. Die Krystalle sind farblos, glasglänzend, leicht zerbrechlich; an trockner Luft werden sie unter Wasserverlust undurchsichtig, weiß. Sie erfordern 750 Thl. kochendes, 4000 Thl. kaltes Wasser zur Lösung. Ihr Geschmack ist bitter, mit wenig süßem Nachgeschmack. In kochendem Alkohol lösen sie sich reichlich auf; kalter 70procentiger Alkohol hält 4,8 pC. Säure gelöst. Auf Zusatz von Wasser wird die alkoholische Lösung milchig getrübt und scheidet beim ruhigen Stehen nadelförmige, starkglänzende Krystalle, in der Regel vermengt mit Tetraëdern, aus. Die Säure bedarf

Untersuchung
der
Ochsen-galle.

27 Thl. Aether zur Lösung. Die aus der ätherischen Lösung sich ausscheidenden Krystalle sind rhombische Tafeln des gerade-rhombischen Systems; H. Kopp hat dieselben beschrieben. Die verschiedenen Krystallformen sind durch verschiedenen Gehalt an Krystallwasser bedingt; die im quadratischen System krystallisirte Säure besitzt die Formel $C_{44}H_{40}O_{10} + 5HO$, die Krystalle des rhombischen Systems $C_{44}H_{40}O_{10} + 2HO$; erstere verliert bei 100° sämmtliches Krystallwasser, letztere bei dieser Temperatur nur 1 Aeq. Wasser.

Die Zusammensetzung der Cholalsäure muß nach Strecker durch die Formel $C_{44}H_{40}O_{10}$ dargestellt werden. Mulder giebt, ohne jedoch selbst Versuche angestellt zu haben, der Säure die Formel $C_{100}H_{81}O_{11}$. Für die Salze dieser Säure hat Mulder keine Formeln aufgestellt; wir theilen die Zusammensetzung derselben zur Vergleichung mit, wie sie sich nach Mulder's Annahme für die Säure berechnet :

	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff
$C_{100}H_{81}O_{11}$ (Mulder)	70,6	9,5	19,9
$C_{44}H_{40}O_{10}$ (Strecker)	70,6	9,8	19,6
4 Versuche (Strecker)	69,9—70,8 (70,4)	9,7—10,0 (9,9)	—

Die Cholalsäure löst sich in verdünnten Lösungen der Alkalien oder kohlens. Alkalien leicht auf, und beim Verdampfen der Lösungen bleiben die Salze krystallinisch zurück. Die wässrige Lösung von cholals. Kali, welche 3 pC. Cholalsäure enthält, giebt mit Chlorbaryum keinen Niederschlag, mit Chlorcalcium eine kleisterartig dicke Fällung, mit Kupferlösung einen bläulich weissen, mit Manganoxydullösung einen weissen, halbkrySTALLINISCHEN Niederschlag; mit Quecksilberchlorid, Quecksilberoxydlösung und Silberlösung weisse Niederschläge, welche beim Kochen sich theilweise lösen. In Alkohol sind sämmtliche cholals. Salze löslich. Die Salze besitzen einen stark bitteren, zugleich wenig süßen Geschmack. Mit Zuckerlösung und concentrirter Schwefelsäure erwärmt zeigen sie

die violettrothe Färbung wie Cholsäure. — Das *Kalisalz* ^{Untersuchung der Ochsen-galle.} wird aus der alkoholischen Lösung durch Aether in nadel-förmigen Krystallen gefällt; es krystallisirt auch beim Abdampfen der alkoholischen Lösung. Die wässerige Lösung desselben wird durch starke Kalilauge gefällt.

Zusammensetzung des cholals. Kalis :

	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	Kali
$C_{100}H_{70}O_{11}, 2KO$ (M.)	64,9	8,5	16,4	10,2
$C_{44}H_{30}O_{11}, KO$ (Str.)	64,6	8,7	16,1	10,6
Versuch (Strecker)	63,9; 64,0	8,7; 8,8	—	10,5; 11,2

Das *Natronsaltz* ist dem Kalisaltze sehr ähnlich. — Das *Ammoniaksaltz* wurde wie das chols. Ammoniak dargestellt; es verliert beim Kochen, sowie an der Luft, allmähig Ammoniak. — Zur Darstellung des *Barytsalzes* löst man Cholsäure in Barytwasser auf, fällt den überschüssigen Baryt durch Kohlensäure, und dampft die Lösung ein, wobei sie sich mit einer, auf der unteren Seite seidenglänzenden, oben warzenförmigen krystallinischen Haut von cholals. Baryt bedeckt. Das Salz bedarf 30 Thl. kaltes und 23 Thl. kochendes Wasser zur Lösung; in Alkohol ist es leichter löslich. Sowohl die wässerige als die alkoholische Lösung dieses Salzes wird durch längeres Durchleiten eines Kohlensäurestroms zersetzt.


Zusammensetzung des bei 100° oder 150° getrockneten Barytsalzes :

	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	Baryt
$C_{100}H_{70}O_{11}, 2BaO$ (M.)	61,0	8,0	15,5	15,5
$C_{44}H_{30}O_{11}, BaO$ (Str.)	60,6	8,2	15,1	16,1
4 Versuche (Strecker)	59,9—60,3(60,1)	8,2—8,3(8,2)	—	15,9—16,2(16,1)

Das *Kalksaltz* wird durch Fällung als dicker molkiger Niederschlag erhalten, der auf Zusatz von Aether krystallisirt. Eine Kalkbestimmung führte zu der Formel $C_{44}H_{30}O_{11}, CaO$. — Das *Silbersaltz* ist in Wasser wenig löslich; es krystallisirt beim Abkühlen der kochenden Lösung und wird bei 100° nach und nach schwarz.

Die bei der Zersetzung der Cholsäure durch Alkalien

Untersuchung oder alkalische Erden stattfindende Reaction lässt sich der Ochsengalle. durch folgende Gleichungen ausdrücken :



Auch diese Gleichungen sprechen zu Gunsten der Formel Strecker's, indem nach dieser die Spaltungsweise der Cholsäure derjenigen der Hippursäure in Benzoësäure und Glycocoll entsprechend ist, bei welcher gleichfalls 2 Aeq. Wasser aufgenommen werden.

Zersetzung der Cholsäure durch Säuren. Die Lösung der Cholsäure in concentrirter Salzsäure oder Schwefelsäure trübt sich, wenn man sie erhitzt, sehr bald unter Abscheidung ölartiger Tropfen, die beim Erkalten fest und harzartig werden. Die abgeschiedene Masse stellt eine neue Säure dar, welche mit den Alkalien lösliche Salze, mit den alkalischen Erden dagegen unlösliche Salze bildet. Die Lösungen der neuen Säure in Kali oder Ammoniak unterscheiden sich ferner noch von denjenigen der Cholsäure dadurch, daß sie durch Salmiak sowie durch viele Salzlösungen gefällt werden. Strecker glaubt, daß je nach der Dauer des Kochens zwei verschiedene Säuren entstehen; es wäre aber auch möglich, daß die durch die Analyse gefundenen Differenzen von einer Verschiedenheit der zum Trocknen angewendeten Temperatur herrührten. Strecker giebt der einen dieser Säuren die Formel $\text{C}_{12}\text{H}_{11}\text{NO}_{10} = \text{C}_{12}\text{H}_{13}\text{NO}_{12} - 2\text{HO}$, der anderen $\text{C}_{12}\text{H}_{13}\text{NO}_8 = \text{C}_{12}\text{H}_{13}\text{NO}_{12} - 4\text{HO}$. Erstere Säure scheint später auch von Mulder erhalten worden zu sein, indem er den Bleiniederschlag aus Ochsengalle in Wasser vertheilt mit Schwefelwasserstoff zersetzte, das Schwefelblei zuerst mit kochendem Wasser auszog und hierauf den Rückstand mit Alkohol behandelte. Die alkoholische Lösung wurde durch Wasser gefällt, der krystallinische Theil des Niederschlags durch Aufrühren in Wasser von dem harzartigen getrennt, und endlich die Krystalle durch Auflösen in Alkohol und Fällen mit Wasser gereinigt. Zur Befreiung von bei

gemengter Paracholsäure muß die Säure noch mit Baryt-^{Untersuchung} wasser behandelt werden, womit sie einen in Wasser^{der} unlöslichen Niederschlag bildet, der mit Salzsäure zerlegt wird, worauf die abgeschiedene Säure aus Alkohol in durchscheinenden, stark glänzenden Nadeln krystallisirt. Mulder giebt dieser Säure den Namen *Cholonsäure*; er scheint nicht bemerkt zu haben, daß dieselbe Säure früher von Strecker, wenn gleich nur im amorphen Zustande, erhalten wurde. Die Zusammensetzung dieser Säure ist :

	Kohlenstoff	Wasserstoff	Stickstoff	Sauerstoff
$C_{14}H_{11}NO_{11}$ (Mulder)	69,2	9,0	3,0	18,8
$C_{12}H_{11}NO_{10}$ (Strecker)	69,8	9,2	3,1	17,9
2 Versuche (Strecker)	70,5; 70,6	9,4; 9,5	—	—
4 Versuche (Mulder)	69,1—69,5 (69,4)	9,3—9,6 (9,4)	3,2; 3,4	—

Cholons. Natron ist das einzige Salz dieser Säure, welches untersucht wurde. Es wurde von Mulder auf dieselbe Weise wie das chols. Natron dargestellt, und in Krystallen erhalten. Seine Zusammensetzung ist :

	Kohlenstoff	Wasserstoff	Stickstoff	Sauerstoff	Natron
$C_{14}H_{11}NO_{10}, NaO$ (M.)	66,1	8,4	2,8	16,4	6,3
$C_{12}H_{11}NO_{10}, NaO$ (Str.)	66,5	8,5	2,9	15,5	6,6
Gefunden (Mulder)	66,2; 65,9	8,9; 9,0	2,6	—	6,7; 6,6

Choloïdinsäure. Diese Säure entsteht nach den Versuchen Strecker's aus Cholsäure, wenn man, nachdem die vorhergehende Säure beim Kochen mit Salzsäure sich abgeschieden hat, mit dem Kochen fortfährt. Der anfangs fast flüssige Niederschlag wird bei fortgesetztem Kochen mit concentrirter Salzsäure allmählig fester und bleibt endlich in der kochenden Flüssigkeit ungeschmolzen. Man löst denselben nach dem Auswaschen mit Wasser in Alkohol, und fällt die Lösung durch Wasser; der Niederschlag wird hierauf nochmals in Alkohol gelöst und durch Aether wieder gefällt. Die so erhaltene Choloïdinsäure ist fest, weiß, gewöhnlich etwas gelb gefärbt, pulverisirbar; sie schmilzt in kochendem Wasser ohne gelöst zu werden. Getrocknet schmilzt sie erst über 150°. In Alkohol löst sie sich leicht auf, Zusatz von Wasser macht die Lösung

Untersuchung der Ochsaengalle. milchig und scheidet die Säure als harzartige Masse ab. In Aether löst sich die Säure nur wenig auf. Die Choloïdinsäure reagirt sauer; sie verbindet sich mit Basen und treibt Kohlensäure aus kohlens. Alkalien beim Erwärmen aus. Die schwächsten Säuren, selbst Kohlensäure, scheiden aus den wässerigen Lösungen der Salze Choloïdinsäure ab. Die Salze schmecken rein bitter; sie lassen sich nicht in krystallinischer Form darstellen. Die Alkalisalze sind in Wasser und Alkohol löslich, in Aether unlöslich; mit den Erden und schweren Metalloxyden bildet die Säure in Wasser unlösliche Salze, welche sich sämmtlich in Alkohol lösen.

Zusammensetzung der Choloïdinsäure (1) :

	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff
$C_{100}H_{70}O_{10}$ (Mulder)	72,1	9,5	18,4
$C_{44}H_{30}O_4$ (Strecker)	72,2	9,8	18,0
Gefunden (Strecker)	71,9; 72,0	9,8; 9,8	—

Das *Barytsalz* der Säure wurde durch Fällen der alkoholischen Lösung der Säure mit Barytwasser dargestellt und durch Auflösen in Alkohol gereinigt.

Zusammensetzung des bei 120° getrockneten Salzes :

	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	Baryt
$C_{44}H_{30}O_4 \cdot BaO$ (Str.)	60,6	8,2	15,1	16,1
Versuch (Strecker)	60,4	8,3	—	16,1

Die salzsäurehaltige Flüssigkeit, aus welcher sich die Choloïdinsäure abgeschieden hat, giebt beim Verdampfen zur Trockne einen krystallinischen Rückstand von saurem Glycocoll. Die Zersetzung der Cholsäure in Choloïdinsäure und Glycocoll läßt sich, wenn man auf die Zwischenproducte keine Rücksicht nimmt, durch die Gleichung $C_{24}H_{42}NO_{12} + HO = C_{44}H_{30}O_4 + C_4H_8NO_4$ darstellen. Dieselbe Säure erhält man auch aus Cholalsäure, wenn man sie mit starker Salzsäure kocht, oder auf 200° erhitzt, wobei 1 Aeq. Wasser (gefunden 2,2 und 2,4 pC., berechnet 2,2 pC.) austritt.

(1) Gerhardt (in seinen und Laurent's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 48) schreibt die Formel dieser Säure $C_{44}H_{30}O_4 + HO$ und die ihrer Salze $C_{44}H_{30}O_4 \cdot MO + 2 HO$.

Dyslysin. Kocht man die Choloïdinsäure längere Zeit mit rauchender Salzsäure, so erleidet sie eine weitere Zersetzung. Die durch 12stündiges Kochen erhaltene harzartige Masse schmilzt in kochendem Wasser nicht mehr; sie löst sich nicht mehr in kaltem Alkohol auf, sehr wenig in kochendem, leicht dagegen in Aether. Durch Kochen mit einer alkoholischen Kalilösung oder durch Schmelzen mit Kalihydrat wird das hierbei erhaltene *Dyslysin* wieder zurück in Choloïdinsäure verwandelt. Es ist stets mehr oder weniger braun gefärbt; am reinsten erhält man es durch Auflösen in Aether und Fällen durch Zusatz von absolutem Alkohol. Die Zusammensetzung dieses Körpers ist :

	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff
$C_{100}H_{73}O_{18}$ (Mulder)	77,2	9,4	13,5
$C_{41}H_{31}O_6$ (Strecker)	77,4	9,7	12,9
2 Versuche (Strecker)	77,6; 77,3	9,7; 9,6	—
2 Versuche (Mulder)	76,9; 77,0	9,6; 9,5	—

Dyslysin läßt sich nach Strecker auch durch Erhitzen von Choloïdinsäure auf 300 bis 310° darstellen; auch hierbei tritt eine Bräunung ein.

Die Entstehung des *Dyslysins* aus Choloïdinsäure erklärt sich durch Austreten von 3 Aeq. Wasser. Wie man sieht, nehmen die sauren Eigenschaften von der Cholsäure an immer mehr ab, je mehr Wasser austritt; das *Dyslysin* ist endlich unfähig, sich mit Basen zu vereinigen.

Wir kommen nun zu der zweiten in der Ochsengalle enthaltenen Säure (S. 897), welche Strecker *Choleinsäure* nennt. — Neben der Cholsäure ist in der Ochsengalle noch eine beträchtliche Menge einer organischen Substanz enthalten, welche weder durch Säuren, noch durch neutrales essigs. Bleioxyd gefällt wird. Es ist dies derjenige Körper, welcher von Berzelius mit dem Namen *Bilin* bezeichnet wurde. Nach der Untersuchung Strecker's besitzt derselbe indessen die Eigenschaften einer Säure, insofern er im Stande ist, sowohl mit den Alkalien Verbindungen einzugehen, welche ohne Reaction auf Pflanzenfarben sind,

Untersuchung als auch sich mit Metalloxyden zu vereinigen. Diese Ver-
 der bindungen sind indessen in Wasser größtentheils löslich,
 Ochsengalle. so daß die Lösung dieses Stoffes mit den meisten Metall-
 lösungen (basisch-essigs. Bleioxyd z. B. ausgenommen)
 keinen Niederschlag giebt; die Säure selbst ist in Wasser
 sowie in Alkohol löslich; sie besitzt die Eigenschaft, Chol-
 säure aufzulösen, so daß es Strecker nicht gelang, die-
 selbe aus Ochsengalle im reinen Zustande darzustellen.
 Strecker bezeichnet diese Säure mit dem Namen *Choleinsäure*,
 und sie ist nach ihm neben Cholsäure der einzige
 organische Stoff des durch Aether aus der alkoholischen
 Lösung der Galle gefällten Niederschlags. Strecker hat
 die Ansicht aufgestellt, daß diese Säure eine gepaarte Ver-
 bindung von Cholsäure und Taurin sei; er stützt sich
 hierbei besonders auf die von ihm beobachtete Thatsache,
 daß der durch basisch-essigs. Bleioxyd in der Ochsengalle
 erzeugte Niederschlag, welcher neben Cholsäure noch eine
 schwefelhaltige Säure enthält, bei der Zersetzung mit con-
 centrirtem kochendem Barytwasser neben Glycocoll und
 Taurin nur Cholsäure liefert. Ein Theil der hierbei er-
 haltenen Cholsäure ist mit Glycocoll, ein anderer mit
 Taurin verbunden gewesen. Die Identität der auf diese
 Weise dargestellten Säure mit der aus Cholsäure dar-
 gestellten Cholsäure wurde durch die Analyse der Säure
 sowie des Barytsalzes dargethan. Strecker stellt hiernach
 für die Choleinsäure folgende Formel auf: $C_{52}H_{48}NO_{14}S_2$
 $= C_{48}H_{40}O_{10} + C_4H_8NO_4S_2 - 2HO$; zur Begründung
 derselben führt er die Analogie mit Cholsäure, die Un-
 fähigkeit des Taurins, als solches salzartige Verbindungen
 einzugehen, und endlich die Analyse verschiedener Gemenge
 von chols. und choleins. Salzen an. — Die Choleinsäure
 besitzt nach der Angabe Strecker's folgende Eigenschaften.
 Die Säure ist in Wasser und Alkohol löslich, unlöslich in
 Aether; ihre Lösungen können nicht zur Trockne verdampft
 werden ohne Zersetzung zu erleiden, deren Anfang sich
 durch Fällbarkeit durch verdünnte Mineralsäuren bemerk-

lich macht. In Verbindung mit Basen besitzt die Säure Untersuchung
der
Ochsengalle. dagegen größere Beständigkeit. Die Salze derselben mit alkalischer Basis sind in Wasser und Alkohol löslich, unlöslich in Aether, ohne Wirkung auf Pflanzenfarben; an feuchter Luft nehmen sie Wasser auf, ohne jedoch zu zerfließen; in Berührung mit Aether verwandeln sie sich nach längerer Zeit in eine Masse strahlenförmiger Krystallnadeln. Die Salze blähen sich beim Erhitzen auf, verbrennen mit rufsender Flamme und hinterlassen eine leicht schmelzbare Asche. Sie besitzen einen süßen Geschmack, der hintennach wenig bitter ist. Die wässrige Lösung wird auf Zusatz von Säuren nicht gefällt, selbst nicht von concentrirter Schwefelsäure. Beim Kochen trübt sich die mit Säure versetzte Lösung unter Abscheidung von Choleinsäure; die Flüssigkeit enthält hierauf Taurin gelöst. Concentrirte Lösungen von Kalihydrat oder kohlens. Kali scheiden aus der wässrigen Lösung der choleins. Salze das Kalisalz der Säure vollständig aus. Die neutralen Lösungen der choleins. Salze geben mit den Lösungen der alkalischen Erden, sowie mit den meisten Lösungen der schweren Metalloxyde keinen Niederschlag. Basisch-essigs. Bleioxyd erzeugt darin weiße Flocken, die sich zu einer pflasterartigen Masse vereinigen; in vielem kochendem Wasser löst sich der Niederschlag vollständig auf, was leichter noch bei einem Ueberschuss von essigs. Bleioxyd geschieht. Nach der Fällung durch basisch-essigs. Bleioxyd entsteht auf Zusatz von Ammoniak ein neuer Niederschlag, doch bleibt stets ein nicht unbeträchtlicher Theil der Choleinsäure in Lösung.

Die Lösungen der choleins. Salze geben weder mit Kupfer- oder Silberoxydlösungen, noch mit Quecksilberchloridlösung Niederschläge; wenig Eisenchlorid giebt eine im Ueberschusse lösliche Fällung, salpeters. Quecksilberoxydul oder Zinnchlorür giebt weiße Flocken. — Die Choleinsäure giebt, wie die Cholsäure, die von Pettenkofer entdeckte Reaction mit Zucker und Schwefel-

ungen der Cholsäure betrachten, einerseits (Cholsäure), andererseits mit Taurin (Cho

Alle hier angegebene Eigenschaften der wurden an der in der Fischgalle enthalten gestellt; diese Galle enthält, wie Strecker (fast nur choleïns. Salze. Die in der Ochsen Choleïnsäure läßt sich nicht frei von Chol beide Säuren, wenn einmal vermischt, las mehr von einander vollständig trennen; we die Choleïnsäure durch Metalllösungen ni ohne gleichzeitig Cholsäure mitzufällen, noch vollständig in Verbindung mit Metalloxyden gen, so daß nichts mehr von ihr bei der ne Choleïnsäure bliebe. Ziemlich vollständig k die Choleïnsäure von Cholsäure befreien, in alkoholische Lösung der Ochsen-galle theilwe fällt, den zuerst entstehenden Niederschlag, zugsweise choleïns. Salze enthält, wieder in und diese Operation wiederholt. Eine gering von Cholsäure ändert die Reactionen der Chol

Strecker hat zu zeigen gesucht, da bestandtheil der Ochsen-galle, welcher in Alk und durch Aether gefällt wird, außer chols

und 42 bis 44 Aeq. Wasserstoff enthalten sind (oder in den basischen Bleisalzen auf $2\frac{1}{2}$ Aeq. Bleioxyd 52 Aeq. Kohlenstoff). Verschiedene Salze, in welchen der Schwefelgehalt bestimmt wurde, berechnet er als Gemenge von choleins. und chols. Salzen, in ziemlicher Uebereinstimmung mit den analytischen Resultaten. Hinsichtlich der Einzelheiten müssen wir auf die Abhandlung verweisen.

Außer der Ochsen-galle sind die Gallen verschiedener anderen Thiere Gegenstand der Untersuchung gewesen.

Gundelach und Strecker (1) haben die Schweine-
 galle untersucht, und dieselbe von der Ochsen-galle in vielen Beziehungen abweichend gefunden. Es ist schon lange durch Thenard's Untersuchung bekannt, daß die Schweine-
 galle von Essigsäure gefällt wird, und in neuester Zeit war Gorup-Besanez (2) zu dem Schlusse gelangt, daß die in der Schweinegalle enthaltene Säure Choloïdinsäure, also frei von Schwefel und Stickstoff, sei. Gundelach und Strecker haben als Hauptbestandtheil dieser Galle das Alkalisalz (hauptsächlich Natronsalz) einer eigenthümlichen stickstoffhaltigen Säure erkannt, welcher sie den Namen *Hyo-cholinsäure* (von *ύς*, *ύος* und *χολή*) gaben. — Frische Schweinegalle hinterläßt beim Abdampfen bei 100° im Mittel 11,2 pC. Rückstand, wobei geringe Mengen von Ammoniak und einer flüchtigen unangenehm riechenden Substanz weggehen. Bei der Behandlung mit absolutem Alkohol löst sich dieser Rückstand größtentheils auf, und es hinterbleiben nur etwa 5,3 pC. desselben (hauptsächlich Gallenblasenschleim). Die alkoholische, gelblichbraun gefärbte Lösung giebt auf Zusatz von Aether einen gefärbten, harzartigen Niederschlag, dessen Menge etwa 75 pC. des trocknen Gallenrückstandes ausmacht und welcher hauptsächlich aus hyocholins. Natron besteht. In der Mischung von Alkohol und Aether bleiben neben einem Theile desselben Stoffes Cholesterin und Fette gelöst.

Untersuchung
der Schweine-
galle.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXII, 205; Ann. ch. phys. [3] XXII, 38; im Auss. Pharm. Centr. 1847, 881; J. pharm. [3] XIII, 145. — (2) Ann. Ch. Pharm. LIX, 156.

Untersuchung
der Schweine-
galle.

Durch Behandlung der alkoholischen Lösung mit Thierkohle läßt sich der Farbstoff zwar größtentheils, aber nicht vollständig entziehen.

Zur Darstellung des *hyocholins. Natrons* in reinem Zustande digerirt man frische Schweinegalle mit schwefels. Natron, wobei, in dem Masse als sich letzteres löst, das in concentrirten Salzlösungen unlösliche *hyocholins. Natron*, vermengt mit etwas gelbem Farbstoff und Schleim, sich abscheidet. Der Niederschlag wird mit concentrirter Lösung von schwefels. Natron ausgewaschen, getrocknet und in absolutem Alkohol gelöst. Die wenig gefärbte Lösung läßt sich durch Blutkohle vollständig entfärben, und giebt auf Zusatz von Aether einen ganz weißen Niederschlag von *hyocholins. Natron*. Dasselbe ist amorph, leicht löslich in Wasser und Alkohol, von äußerst bitterem Geschmack. Beim Erhitzen schmilzt es unter Aufblähen und brennt mit rufsender Flamme. Die wässerige Lösung giebt mit den Lösungen der meisten Metallsalze Niederschläge; die mit Kalk- und Barytsalzen erhaltenen Fällungen lösen sich beim Kochen mit viel Wasser auf. Der durch neutrales essig. Bleioxyd erzeugte Niederschlag backt beim Kochen nicht zusammen; nach Abscheidung desselben entsteht auf Zusatz von Ammoniak ein neuer Niederschlag. Bemerkenswerth ist die Fällbarkeit des *hyocholins. Natrons* durch viele Salzlösungen. So giebt eine concentrirte Lösung von *hyocholins. Natron* mit Kali- oder Natronlauge, oder den Lösungen von kohlens. oder schwefels. Kali, Natron oder Ammoniak, mit Chlornatrium, Salmiak u. a. farblose, flockige Niederschläge, welche *Hyocholinsäure* in Verbindung mit der zugesetzten Basis enthalten. Als besonders charakteristisch wird der mit Salmiaklösung erhaltene Niederschlag angeführt, insofern er unter dem Mikroskop abweichend von den übrigen krystallinisch erscheinen soll. Mit Schwefelsäure und Zucker erwärmt geben die *hyocholins. Salze* eine purpurroth gefärbte Flüssigkeit.

Das *Kalialz* wurde durch Auflösen der Säure in

schwacher Kalilauge, auf Zusatz von schwefels. Kali, in Untersuchung
der Schweine-
galle. Flocken erhalten, welche mit schwefels. Kali ausgewaschen, in absolutem Alkohol gelöst und durch Aether gefällt wurden. Es ist eine amorphe, weisse Masse, die dem Natronsalz ähnlich sich verhält und analoge Zusammensetzung besitzt.

— Das *Ammoniahsalz* läßt sich wie das vorhergehende Salz darstellen; es verliert leicht einen Theil seines Ammoniaks und nimmt saure Reaction an. — Das *Barytsalz* wird durch Fällern des Natronsalzes oder der entfärbten Schweinegalle mit Chlorbaryum als weisser, etwas gelatinöser Niederschlag erhalten, welcher in Wasser schwer, in Alkohol aber leichtlöslich ist. — Das *Kalksalz* läßt sich auch aus gefärbter Schweinegalle durch Fällern mit Chlorcalcium farblos darstellen, wenn man die Vorsicht gebraucht, nicht alles auszufällern, indem der Farbstoff zuletzt niederfällt. Es löst sich etwas leichter in Wasser als das Barytsalz; seine alkoholische Lösung wird durch Kohlensäure gefällt. — Durch Fällern des Natronsalzes mit neutralem essigs. Bleioxyd erhält man ein basisches Salz, während die Flüssigkeit eine saure Reaction annimmt und auf Zusatz von Ammoniak einen neuen Niederschlag giebt. — Das *Silbersalz* wird durch doppelte Zersetzung als gallertartiger Niederschlag erhalten, welcher beim Kochen flockig wird, ohne sich dabei zu schwärzen, im Falle die Flüssigkeit keinen Ueberschuß von salpeters. Silberoxyd enthält. Es löst sich schwer in Wasser, ziemlich leicht in Alkohol.

Die Hyocholinsäure wird aus dem Natronsalz durch verdünnte Schwefelsäure abgeschieden, wobei die Flüssigkeit milchig wird und nach kurzer Zeit die Säure in Tropfen absetzt. Diese bildet eine weisse, harzartige Masse, schmilzt in heissem Wasser und läßt sich in Fäden ziehen. Getrocknet ist sie bei 120° noch fest und schmilzt erst in höherer Temperatur. In Wasser wenig löslich, wird sie von Alkohol leicht aufgenommen; in Aether ist die Säure nicht ganz unlöslich. Sie reagirt sauer, löst sich in Ammoniak und verdünnten Lösungen von kaustischen und kohlens. Alkalien

Untersuchung leicht auf; mit starker Kalilauge übergossen wird sie nicht
 der Schweine- gelöst, sie nimmt aber selbst Kali auf und löst sich hierauf
 gallo. in reinem Wasser.

Die Analyse führte für die bei 100 bis 120° getrockneten Salze zu der Formel $C_{54}H_{48}NO_{10}$, MO, und die Verbrennung der Hyocholinsäure ergab die Formel $C_{54}H_{48}NO_{10}$; Gundelach und Strecker halten hiernach die Säure für wasserfrei, Gerhardt (1) dagegen nimmt in allen Salzen ein Aequiv. Krystallwasser an, und schreibt ihre Formel $C_{54}H_{48}NO_{10} \cdot MO + HO$.

Die Hyocholinsäure ist eine durch Reagentien nur schwierig anzugreifende Substanz; von rauchender Salpetersäure wird sie unter Erwärmung und Entwicklung rother Dämpfe gelöst. Es entstehen hierbei die nämlichen flüchtigen Producte, welche Redtenbacher durch Einwirkung von Salpetersäure auf Choloïdinsäure erhielt, nämlich eine schwere, ölartige Flüssigkeit von angreifendem Geruch, welche mit Kali gelbe Krystalle (nitrochols. Kal) liefert, und flüchtige fette Säuren der Reihe $C_nH_{2n}O_2$. Die nicht flüchtigen Producte dieser Oxydation sind Oxalsäure und Cholesterinsäure, also gleichfalls dieselben, welche die Choloïdinsäure liefert. Es ergibt sich hieraus, daß die Hyocholinsäure zu den Bestandtheilen der Ochsen-galle in naher Beziehung steht; Strecker (2) hat später darauf aufmerksam gemacht, daß die aus Cholsäure durch kurze Behandlung mit Salzsäure erhaltene Säure (S. 906), welche Mulder *Cholonsäure* nennt, die Formel $C_{52}H_{44}NO_{10}$ besitzt, welche von der Formel der Hyocholinsäure um C_2H_4 verschieden ist. Die Analogie letzterer Säure und der Cholsäure ergibt sich ferner daraus, daß, wie Strecker (3) mittheilt, erstere bei der Behandlung mit concentrirter Salzsäure sowie mit Alkalien in Glycocoll und stickstofffreie Körper sich spaltet; durch Kochen mit Kalilauge entsteht hierbei eine in Aether lösliche und daraus in wasser-

(1) J. Pharm. [3] XIII, 145. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 24. —

(3) Liebig, Poggendorff und Wöhler's Handwörterbuch der Chemie III, 254

förmigen Körnern krystallisirende Säure, welche von der Cholalsäure verschieden ist. — Durch Oxydation der Hyocholinsäure mit chroms. Kali und Schwefelsäure erhielten Gundelach und Strecker neben flüchtigen und fetten Säuren im Destillate Blausäure.

Untersuchung
der Schweine-
galle.

Der in Alkohol lösliche und durch Aether fällbare Theil der Schweinegalle enthält neben Hyocholinsäure noch eine schwefelhaltige Substanz; Gundelach und Strecker fanden in dem so fällbaren Theile 0,47 pC., Bensch (1) 0,3 pC. Schwefel. Erstere Chemiker konnten durch Zersetzung der Schweinegalle mit Säuren kein Taurin gewinnen; Strecker führte indessen später an, daß nach Behandlung der Schweinegalle mit Salzsäure die Mutterlange, woraus das Glycocoll grösstentheils auskrystallisirt war, nach dem Verbrennen mit Salpeter und Kali eine geringe Reaction auf Schwefelsäure gab, und er vermuthet daher, daß dieselbe ein wenig Taurin enthalten habe. Mulder (2) giebt an, daß nach noch nicht veröffentlichten Versuchen von van Heijningen und Scharlée Taurin aus Schweinegalle ebenso leicht, wie aus Ochsen-galle dargestellt werden könne.

Strecker hat die Ansicht ausgesprochen, daß die Verschiedenheit der Gallen bei verschiedenen Thierklassen in dem verschiedenen Verhältniß von gepaarter Taurin- und gepaarter Glycocollverbindung (Choleinsäure und Cholsäure), welches dieselben in Verbindung mit Basen enthalten, begründet sei, daß aber bei einer und derselben Thiergattung das Verhältniß der beiden Hauptbestandtheile der Galle wenig wechsele. Er hat in dieser Hinsicht durch Versuche gezeigt, daß die Schafgalle grösstentheils Choleinsäure nebst wenig Cholsäure enthält. Dieselbe lieferte beim Zersetzen durch Barythydrat Cholalsäure und Taurin, welchem eine geringe Menge von Glycocoll beigemischt war. Die mit Alkohol und Aether gereinigte Galle verschiedener Seefische, z. B. von dem Kabeljau (*Gadus Morrhua*)

(1) In der unten (S. 918) angef. Abhandl. — (2) Scheik. Onderz. V, 84.

Gallensteine. von Gallensteinen von dem an und spec. Gew. wurden ermi Aschengehalt, die Menge d die Menge der hierauf dur ziehenden Substanzen (Chole und die Menge des Rückst kochender Ammoniakflüssigl lich war.

	1
Absolutes Gewicht	11,7
Specifisches Gewicht	1,0
Zusammensetzung in 100 Theilen :	
Trockenverlust	4,8
Asche	0,2
In Wasser lösliche Stoffe und Verlust	8,2
In Alkohol lös- { Cholesterin	82,8
liche Stoffe { Verseifbares Fett	1,2
Rückstand { in Ammoniak löslich	0,4
" " unlöslich	1,2

Die Asche enthielt Chl Spuren von Eisen; in einzeln und Spuren von Mangan; ni stand, welchen die Gallenst Alkohol und mit Wasser liefs farbstoff; Ammoniak löste ein gab auf Zusatz von Salzsäure schlag von Berzelius' Bili braune Theil wurde als de betrachtet. Hein fand für beiden Gallenfarbstoffe Resu Untersuchung von den Pro lungen) und mit Scherer's R wir müssen bezüglich der I gaben über diese Körper au

Cholesterin. Den Schmelzpunkt des C bis 170°; das spec. Gew. de Untersuchungen über d

Cholesterins hat Zwenger (1) angestellt. Wird zu einer Cholesterin. 50 bis 70° warmen Mischung von concentrirter Schwefelsäure mit ihrem halben Volum Wasser Cholesterin zugesetzt und dann unter Umrühren Schwefelsäure tropfenweise zugefügt, bis das Cholesterin seine krystallinische Beschaffenheit verloren hat und weich, zusammenhängend und dunkelroth geworden ist, so bilden sich ohne Gasentwicklung drei Kohlenwasserstoffe. Bei Auskochen der mit Wasser ausgewaschenen und dann weissen oder gelblichen Masse mit Aether bleibt ein unlöslicher Rückstand, *a Cholesterilin*; aus der ätherischen Lösung fällt Alkohol eine gelbe harzartige Masse (unzersetztes Cholesterin bleibt in der Lösung), welche wiederum in Aether gelöst wird (*a Cholesterilin* bleibt ungelöst zurück), wo dann bei langsamem Verdunsten dieser Lösung zuerst *b Cholesterilin* auskrystallisirt und später *c Cholesterilin* als eine harzartige Masse sich abscheidet. *a Cholesterilin* krystallisirt aus Terpenthinöl in kleinen, feinen, schwach glänzenden, weissen Nadeln, und läßt sich kaum (bei etwa 240°) ohne Zersetzung schmelzen. *b Cholesterilin* krystallisirt aus der heissen ätherischen Lösung in weissen glänzenden Blättchen, und schmilzt bei etwa 255°. *c Cholesterilin* kann nicht krystallisirt erhalten werden, und schmilzt bei 127°. Für diese drei Körper fand Zwenger sehr nahe dieselbe Zusammensetzung; doch hält er es für möglich, daß ihnen verschiedene Formeln zukommen. Wir geben hier die Mittel der Analysen und die Berechnung nach den von ihm vorgeschlagenen Formeln (es ist nicht angegeben, welche Formel der einen oder andern Art von Cholesterilin zukomme) :

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	$C_{21}H_{34}$	$C_{21}H_{32}$	$C_{21}H_{30}$
Kohlenstoff	88,05	88,29	87,92	88,07	88,00	88,04
Wasserstoff	12,09	12,18	11,99	11,98	12,00	11,96

Zwenger betrachtet als die Zusammensetzung des Cholesterins $C_{21}H_{34}O_2$, wonach sich die Einwirkung der Schwefelsäure und die Bildung dieser Kohlenwasserstoffe

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 5; Pharm. Centr. 1848, 569.

deuten lasse durch das Schema $C_{11}H_{16}O_2 = C_{11}H_{14} + C_{11}H_{12} + C_{11}H_{10} + 3HO$.

Milch.

Die Zusammensetzung von Menschenmilch hat Griffith (1) untersucht. A giebt an, zu welcher Zeit nach der Geburt die Milch zur Untersuchung genommen wurde, B das spec. Gew. derselben, C die Menge festen Rückstandes (bei 100° getrocknet, in pC. der Milch), D die Elementarzusammensetzung, E die näheren Bestandtheile des Rückstandes. (Die Nahrung war gemischte Kost, nur in dem zweiten Fall ausschließlich vegetabilische Kost; die letzte Untersuchung ist die von bläulicher Milch eines scrophulösen und pthisischen Weibes) :

A	B	C	D				E		
			Kohlenst.	Wasserst.	Stickst.	Sauerst.	Asche	Butter	Zucker u. Gäh- Extractivstoff
14 Tage	—	12,5	50,57	7,86	1,90	38,12	1,55	25,56	61,76 12,68
1 Monat	1,030	13,62	50,13	7,73	40,63		1,51	34,32	52,41 13,77
1 M. 14 T.	—	12,87	51,61	7,90	1,96	36,74	1,80	—	— —
9 M. 6 T.	1,028	—	46,97	7,39	1,97	41,90	1,77	16,90	76,60 6,42
10 Monate	1,034	—	50,36	8,10	1,75	37,94	1,85	—	— —
10½ M.	—	—	43,31	7,80	46,98		1,91	—	— —

Milch eines mit starken Gaben Indigo behandelten Weibes, welche sich an der Luft blau färbte, hat Landerer (2) untersucht, und glaubt, daß dieselbe reducirten Indigo enthalten habe. Rosenrothe Kuhmilch hat Lepage (3) untersucht, und schreibt ihre Färbung zugemischtem Blute zu.

Dumas (4) hatte angegeben, daß die Milch fleischfressender Thiere bei ausschließlicher Fleischnahrung keinen Milchzucker enthalte, während dieser bei vegetabilischer Nahrung sich stets darin findet; Bensch (5) hat hingegen gezeigt, daß er stets darin enthalten ist und daß er wohl deshalb sich nicht auffinden liefs, weil er mit saurem phosphors. Kalk längere Zeit in höherer Temperatur in

(1) Chem. Gaz. 1848, 192. — (2) Rept. Pharm. [2] XLV, 53; Pharm. Centr. 1847, 560. — (3) J. chim. méd. [3] III, 76. — (4) Istit. 1845, 341; Berzelius' Jahresber. XXVI, 909. — (5) Ann. Ch. Pharm. LXI, 221; Pharm. Centr. 1847, 346.

Berührung zu Traubenzucker wird und dann syrupartig bei den extractiven Stoffen bleibt. Folgendes fand Bensch für die Zusammensetzung der (stets sauer reagirenden) Milch zweier Hündinnen A und B, welche während der angegebenen Anzahl Tage nur mit Fleisch gefüttert worden waren :

	Tage	sp. Gew.	Wasser	Butter	Milchzucker u. Mel. Salze	Klee u. unSal. Salze
A	8	1,036 bei 20°	75,54	10,75	3,47	10,24
	12	1,037 „ „	70,39	—	—	—
B	5	—	77,52	10,95	3,19	8,84

Milch der Hündin A nach 26tägiger Fütterung mit Fleisch (spec. Gew. 1,056 bei 16,°5) gab 1,252 pC. Asche; siedendes Wasser zog hieraus 6,045 pC. der Asche, der wässrige Auszug reagirte alkalisch und enthielt Kali, Spuren von Natron, Kalk und Magnesia neben Phosphorsäure und Chlor; der Rückstand enthielt hauptsächlich phosphors. Kalk und phosphors. Magnesia.

Einer Untersuchung von Jacobowitsch (1) entnehmen wir folgende Analysen des Speichels vom Menschen (A) und vom Hund (B) :

	A	B
Spec. Gew.	1,0028	1,0071
Wasser	995,16	989,63
Organische Materie	1,34	3,58
Epithelium	1,62	—
Phosphorsäure	0,51	—
Phosphors. Natron	0,43	0,82
Kalk	0,03	—
Magnesia	0,01	—
Phosphors. Kalk u. Magnesia mit organischer Materie	—	0,15
Chlorkalium und Chlornatrium	0,84	} 5,82
Schwefelcyankalium	0,06	

Auf eine Untersuchung Krahrer's (2) »über die physiologische Bedeutung der Harnbereitung und die Wirkung der Diuretica«, worin eine Anzahl Analysen von Harn mitgetheilt sind, der zum Theil unter dem Einfluß harntrei-

(1) *Dissertatio de saliva*. Dorpati 1848. — (2) *J. pr. Chem.* XLI, 1; *Pharm. Centr.* 1847, 582 (ohne die zugehörigen Tabellen).

bender Mittel gelassen wurde, müssen wir uns begnügen hinzuweisen.

Kohlensäure
im Harn.

Die früheren Angaben von Proust, A. Vogel, Wöhler u. a. über die Gegenwart von Kohlensäure im Menschenharn sind durch R. F. Marchand (1) bestätigt worden; er fand durchschnittlich in 100 Grm. Harn von 1,012 bis 1,017 spec. Gew. 10 Cub. C. Kohlensäure. Genuß von kohlensäurehaltigem Wasser vermehrt, wie schon Wöhler fand, den Kohlensäuregehalt nicht merklich. Frische Milch zeigt constant einen solchen Gehalt; frische Rindsgalle schwach, aber deutlich; frische Bauchwassersuchtflüssigkeit hingegen nicht.

Schwefel und
Phosphor im
Harn.

Ronalds (2) hat Untersuchungen über den Zustand des Schwefels und Phosphors im Harn angestellt, und ist zu dem Resultat gekommen, daß nicht die ganze Quantität dieser Körper zu Säure oxydirt darin enthalten sei. Er bestimmte den Gehalt an Schwefel- und Phosphorsäure im Harn für sich, und in demselben Harn, nachdem er eingedampft und mit Salpeter erhitzt worden war, und erhielt auf letztere Art eine größere Menge beider Säuren. Er fand den Gehalt an Schwefel, der nicht als Schwefelsäure in dem Harn enthalten ist, für 100 Gew.-Theile Harn zu 0,015 bis 0,018, bei einem an *Diabetes mellitus* Leidenden 0,024. Die Menge solchen Schwefels, welche in 24 Stunden mit dem Harn aus dem Körper geht, schätzt er auf 1,9 bis 3,2 Grm.; die Menge Phosphor, welche nicht als Phosphorsäure in dem Harn enthalten ist, für dieselbe Zeit auf 3,8 Grm. oder weniger (dieses will er später genauer ermitteln). Welcher Verbindung der nicht als Schwefelsäure im Harn enthaltene Schwefel angehört, vermochte er nicht zu entscheiden; der (nach Abscheidung der Schwefelsäure) mit neutralem oder basisch-essigs. Bleioxyd entstehende Nieder-

(1) J. pr. Chem. XLIV, 250; Chem. Gaz. 1848, 480. — (2) Phil. Mag. [8] XXX, 258; J. pr. Chem. XLI, 185; im Ann. Pharm. Contr. 1847, 480.

schlag enthält nur Spuren von Schwefel, und ebenso der nach Scherer's Vorschrift dargestellte Farbstoff des Harns.

Millon (1) giebt an, dafs bei dem Harn des gesunden Menschen ein einfacher Zusammenhang (wenn man eine zufällige Coincidenz so nennen kann) zwischen dem spec. Gew. und dem Gehalt an Harnstoff existire, sofern die zweite und dritte Ziffer nach dem Komma in der Zahl für das spec. Gewicht (A) annähernd die in 1000 Th. Harn enthaltene Menge Harnstoff (B) angeben (2). Er führt zum Beleg folgende Bestimmungen an (das spec. Gew. A gilt für 15°):

A	1,0116	1,0046	1,0092	1,0277	1,0143	1,0110	1,0260	1,0290
B	11,89	4,89	9,88	29,72	11,99	10,80	25,80	31,77

Dieses treffe nicht zu bei dem Harn von Thieren; er fand hier :

	Kaninchen			Hund		
A	1,0092	1,0149	1,0160	1,052	1,054	1,050
B	3,01	5,23	6,14	111,07	92,08	111,09

Es zeige sich auch nicht mehr bei dem Harn des Menschen, wenn die Lebensweise etwas gestört oder eine Krankheit vorhanden sei; er fand :

	A	B
bei rechter Pneumonie im 2. Grad	1,015	39,75
bei rechter Pneumonie im 2. Grad	1,025	45,94
bei Gliederrheumatismus	1,028	43,11
bei doppelter Pneumonie	1,017	42,90
bei doppelter Pneumonie	1,024	39,40
bei Phtisis im 3. Stadium	1,043	24,25
bei Diabetes	1,087	8,25
bei Diabetes mit Fieberanfällen	1,089	21,50
bei Diabetes	1,035	5,51

Liebig (3) konnte im Harn keine Milchsäure auffinden, weder im frischen, noch im gefaulten, noch in dem nach Genuss von milchs. Kali gelassenen (vor dem Genuss desselben reagirte der Harn sauer, nachher stark alkalisch, und es liefs sich in letzterem ein gröfserer Gehalt an Kali nachweisen, als gewöhnlich darin enthalten ist).

(1) Compt. rend. XXVI, 120; Pharm. Centr. 1848, 189. — (2) Es wäre hierbei von Wichtigkeit gewesen, die Beziehungen zwischen spec. Gew. und Zusammensetzung bei reiner Harnstofflösung festzustellen. —

(3) In der S. 876 angef. Abhandl.

Abwesenheit
der Milchsäure
im Harn.

Kreatin und
Kreatinin im
Harn.

Heintz (1) beschrieb 1844 eine weitläufige Methode, wie man das Zinksalz einer im Harn enthaltenen neuen Säure darstellen könne; von der durch Schwefelwasserstoff aus dieser Zinkverbindung in wässriger Lösung abgeschiedenen Substanz gab er an, sie sei eine krystallisirbare, in Wasser leicht lösliche Säure, deren Verhalten zu mehreren Substanzen er beschrieb. — Gleichzeitig fand Pettenkofer (2), daß nach Zusatz von concentrirter weingeistiger Chlorzinklösung zu dem weingeistigen Auszug des Rückstands von Harn, der mit etwas kohlen. Natron neutralisirt und vorsichtig abgedampft war, sich eine krystallinische Verbindung abscheidet, welche neben Chlorzink eine organische Substanz enthält; für die letztere entsprach seine Analyse der Formel $C_4N_3H_5O_3$.

Liebig (3) zeigte, daß diese Chlorzinkverbindung einfacher erhalten wird, wenn man den Harn mit etwas Kalkmilch neutralisirt und so lange mit einer Lösung von Chlorcalcium versetzt, als sich noch phosphors. Kalk abscheidet, dann filtrirt, bis zum Auskrystallisiren der Salz abdampft, und die Mutterlauge mit einer syrupdicken Auflösung von Chlorzink versetzt, wo die Chlorzinkverbindung nach einigen Tagen sich krystallinisch ausscheidet. Wird die Chlorzinkverbindung mit Wasser abgewaschen, in siedendem Wasser gelöst und mit Bleioxydhydrat bis zum Erscheinen einer stark alkalischen Reaction gekocht, so bleibt die in jener Verbindung enthaltene organische Substanz in Lösung und kann (nach Reinigung durch etwas Blutkohle) durch Abdampfen krystallisirt erhalten werden. Nach Liebig ist die so erhaltene Substanz ein Gemenge; der in siedendem Alkohol weniger lösliche Theil ist Kreatin (getrocknet $C_4N_3H_5O_4$), der darin löslichere Kreatinin ($C_4N_3H_5O_3$); Pettenkofer untersuchte ein Gemenge

(1) Pogg. Ann. LXII, 602; Berzelius' Jahresber. XXV, 899. —

(2) Ann. Ch. Pharm. LII, 97; Berzelius' Jahresber. XXV, 900. —

(3) In der S. 876 angef. Abhandl. (Ann. Ch. Pharm. LXII, 803); auch J. pr. Chem. XL, 288; Pharm. Centr. 1847, 289.

beider, was die von ihm erhaltenen analytischen Resultate ^{Kreatin und Kreatinin im Harn.} vollkommen erklärt. Aus faulem Harn wird nur Kreatinin erhalten, welches sich nach dem Kochen des Harns mit Kalkmilch bis sich kein Ammoniak mehr entwickelt, Eindampfen des Filtrats bis zu Syrupconsistenz und Zusatz von Chlorzink in der Verbindung mit letzterem, frei von Kreatin, abscheidet. Liebig hält das Kreatin für einen zufälligen und wechselnden Gemengtheil der Chlorzinkverbindung.

Heintz gab an (1), daß die von ihm als eine neue Säure betrachtete Substanz (S. 926) ihren sauren Charakter nur einem Gehalt an Salzsäure verdankt habe, und daß das vermeintliche Zinkoxydsalz derselben mit Pettenkofer's Chlorzinkverbindung identisch sei (2). Er erwähnt nicht, daß das von Pettenkofer gefundene Verhältniß 8 C zu 3 N in der Chlorzinkverbindung auf Kreatin hinweist. Die Zusammensetzung der daraus durch Ammoniak und Schwefelammonium abgetrennten organischen Substanz fand er mit der des Kreatins übereinstimmend; seine Analyse der Chlorzinkverbindung (vergl. S. 883) zeigt aber, daß hierin Kreatinin enthalten ist. — Er theilte später (3) Untersuchungen mit, welche dieses Auftreten von Kreatin erklären. Hiernach kann das Kreatinin zu Kreatin umgewandelt werden. Die Umwandlung geschieht am besten, aber dennoch immer unvollständig, wenn man das Kreatinin an Chlorzink bindet,

(1) Pogg. Ann. LXX, 466; Pharm. Centr. 1847, 235. — (2) Es ist möglich und sogar wahrscheinlich, daß sich Heintz zu sehr beeilt hat, seine früheren Angaben zurückzunehmen und aus der Entdeckung einer Säure die einer alkalisch reagirenden Basis (Kreatinin) oder eines indifferenten Körpers (Kreatin) zu machen. Nach der Beschreibung von Heintz ist die von ihm entdeckte Säure leicht in Wasser löslich (das Kreatin ist schwer löslich), die Lösung röthet stark Lackmus (das Kreatinin reagirt alkalisch) und schmeckt sauer; auch Alkohol löst sie auf (Kreatin ist unlöslich in Alkohol). Durch salpeters. Silberoxyd erhielt Heintz keine Fällung. Er glaubt, daß bei Abdampfen der salzs. Lösung des Kreatinins alle Salzsäure verflüchtigt worden sei, und daß er deshalb mit salpeters. Silberoxyd keinen Niederschlag in der Lösung des Rückstands erhalten habe (salzs. Kreatinin verliert die Salzsäure bei dem Abdampfen nicht). — (3) Pogg. Ann. LXXIV, 125; Ann. Pharm. LXVIII, 361.

Kreatin und
Kreatinin im
Harn.

und die organische Substanz aus der Lösung auf irgend eine Weise wieder abscheidet. Wird das Kreatinin aus seinen Verbindungen mit Salzsäure oder Schwefelsäure abgeschieden, so entsteht zwar auch Kreatin, aber nur in sehr geringer Menge. Es scheint, als wenn sich um so mehr Kreatin aus der Chlorzinkverbindung erzeugt, um je mehr die Lösung derselben verdünnt ist, ehe man die organische Substanz daraus frei macht. Der aus dem Harn erhaltene Chlorzinkniederschlag enthält ursprünglich kein Kreatin, es läßt sich jedoch daraus darstellen. Die einfachste Methode, aus dem Harn Kreatin in reichlichster Menge zu erhalten, ist die, daß man die verdünnte Lösung der aus demselben gefällten Chlorzinkverbindung mit Ammoniak und Schwefelammonium zersetzt, und aus der filtrirten Flüssigkeit durch Abdampfen und Zusatz von Alkohol das Kreatin abscheidet; daß man den aus der rückständigen Mutterlauge gefällten Chlorzinkniederschlag von Neuem auf dieselbe Weise mittelst Ammoniak und Schwefelammonium in Kreatin und eine alkoholische Mutterlauge scheidet, welche wieder ebenso behandelt wird, bis es nicht mehr der Mühe werth ist, die Operation mit dem zuletzt gefällten Chlorzinkniederschlag zu erneuern. Zur Gewinnung des Kreatinins ist dagegen nur die von Liebig gegebene Vorschrift (S. 926) brauchbar. Im normalen Harn darf das Kreatin nicht als präexistirend angenommen werden, da es bei den Versuchen, nach welchen man es darin nachzuweisen glaubte, erst aus dem darin vorhandenen Kreatinin gebildet worden war, und da Heintz' Versuche, es direct im Harn nachzuweisen, ein negatives Resultat ergeben haben. Die Umwandlung des Kreatinins in Kreatin, wenn es aus seinen Verbindungen abgeschieden wird, macht die Methode der quantitativen Bestimmung desselben, welche auf die Unlöslichkeit seiner Chlorverbindung gegründet ist, wenn es an eine Säure gebunden ist, so unsicher, daß bis jetzt der Beweis nicht geführt werden

kann, daß die Muskelcontraction Ursache der Bildung dieser Körper sei.

Wöhler und Frerichs (1) haben, grösstentheils an Ueber den Uebergang verschiedener Stoffe in den Harn. Hunden, umfassende Untersuchungen angestellt über die Veränderungen, welche verschiedene, namentlich organische, Stoffe bei ihrem Uebergang in den Harn erleiden. *Salicylige Säure* wirkte nicht giftig; im Harn war unveränderte salicylige Säure, aber weder Hippur- noch Salicylsäure. Blausäurefreies *Bittermandelöl* wirkte nicht giftig; im Harn war Hippursäure. *Amygdalin* wirkte (bei nicht bedeutenden Dosen) nicht giftig; im Harn war weder Amygdalin noch Hippursäure nachzuweisen. *Benzoëäther* wirkte berauschend; im Harn war kein Benzoëäther, aber Hippursäure. *Peruvianischer Balsam* veranlafte durch den Gehalt an Zimmtsäure gleichfalls die Bildung von Hippursäure; beim Erhitzen mit Salzsäure färbte sich der Harn blutroth. *Gerbsäure* gab im Harn Gallussäure und Pyrogallussäure. *Harns. Salze* gaben Oxalsäure und Harnstoff. *Allantoin* gab im Harn weder Oxalsäure, noch war es darin für sich nachzuweisen. *Schwefelcyankalium* (nicht giftig), selbst in geringer Menge gegeben, liefs sich constant als solches im Harn wiederfinden. *Senfölammoniak* (nicht giftig) gab im Harn constant Schwefelcyanammonium. Die Veränderungsproducte von *Chinin* (nicht giftig) waren nicht zu ermitteln; ebenso nicht die von *Anilin*. *Carbolsäure* wirkte sehr giftig. *Alloxantin* fand sich als solches im Harn nicht wieder, aber er war reich an Harnstoff; *Alloxan* konnte darin nicht nachgewiesen werden. *Harnstoff* verwandelte sich nicht in kohlen. Ammoniak; der Harn blieb sauer. Auch die Wirkung von *Arsensäure*, arsens. Kalk (3CaO , AsO_3) und phosphoriger Säure wurden untersucht; die Resultate gehören nicht hierher.

Schlofsberger (2) ist der Ansicht, daß bezüglich der besonderen Färbung des Harns nach innerlichem Ge-

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 335; J. pr. Chem. XLIV, 60; Repert. Pharm. [3] I, 219; Pharm. Centr. 1848, 353; Instit. 1848, 145; Chem. Gaz. 1848, 229. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 83; Pharm. Centr. 1848, 876.

(spec. Gew. 1,032) durch Reich in Königsberg (1) siehe unter B in der folgenden Tabelle.

Kalb- und
Hammelharn.

Braconnot (2) hat den Harn eines 8 Tage alten Kalbes (C) und den vom Hammel (D) untersucht; in ersterem sind auch Spuren von phosphors. Eisen und Kali und eines Kalisalzes mit organischer Säure enthalten, in letzterem unbestimmte Mengen von hippurs. und zweifach-kohlens. Kali, kohlens. Kalk und Eisenoxyd.

	A (S. 980 f.)	B	C	D (im 1 Liter)
Harnsäure	0,96	1,31	—	—
Neuer Körper	66,97	—	—	—
Zucker	—	43,30	—	—
Harnstoff	29,90	9,70	2,36	unbest.
Extractivstoff	—	20,58	—	unbest.
Schleim	—	0,28	Spur	unbest.
Chlornatrium	3,83	0,82	?	—
Chlorkalium	—	0,27	3,22	6,13
Phosphors. Natron	4,45	1,75	—	—
— Kalk	—	0,33	Spur	—
— Magnesia	1,20	0,02	—	—
— Magnesia-Amm.	—	—	0,18	—
Schwefels. Kali	2,10	0,25	0,44	3,74
Kieselerde	—	0,03	Spur	—
Kohlens. Magnesia	—	—	—	1,40
Wasser	890,72	921,86	993,80	—

Harnsteine.

Es wurden untersucht : Harnsteine vom Menschen (A der folgenden Tabelle) durch Bley (3) und (B und C) durch Reich (4) in Königsberg; ein Harnleiterstein von einem Ochsen (D) durch Lassaigne (5); ein Harnstein einer Hündin durch Wittstein (6) (welcher darin fand 27,82 pC. Kalk, 5,22 Magnesia, 3,90 Ammoniak, 24,21 Phosphorsäure, 10,64 Kohlensäure, 8,93 Natronsalze, 5,15 stickstoffhaltige Materie, 14,13 Wasser); ein Harnstein eines Affen (E) durch Landerer (7); Harnsteine von Schafen,

(1) Arch. Pharm. [2] LI, 20; Pharm. Centr. 1847, 704. — (2) Ann. h. phys. [3] XX, 238; J. pr. Chem. XLI, 301; Pharm. Centr. 1847, 541. — (3) Arch. Pharm. [2] XLIX, 257. — (4) Arch. Pharm. [2] LIII, 297; Pharm. Centr. 1848, 335. — (5) Ann. ch. phys. [8] XIX, 382; J. chim. méd. [3] III, 10; Pharm. Centr. 1847, 384. — (6) Repert. Pharm. [3] I, 307. — (7) Repert. Pharm. [2] XLV, 60.

deren Futter Hafer beigemischt worden war, (F) durch *Harnsteine*. Lassaigue (1); ein Harnstein einer Schildkröte (*Testudo polyphemus*) durch denselben (2) (wobei er fand 72,4 pC. Harnsäure, 13,0 Ammoniak, 1,0 Kalk, 13,6 in Wasser lösliche Harnbestandtheile und alkalische Salze).

	A	B	C	D	E	F
Extractiv- o. Farbstoff	—	8,93	0,12	—	—	—
Eiweiß	7,50	—	—	—	—	—
Fett	5,00	0,83	0,34	—	16	—
Schleim	Spur	0,46	0,28	10,7	—	53,0
Wasser	—	—	—	—	—	12,0
Oxals. Kalk	12,50	—	11,82	—	—	—
Phosphors. Kalk	22,21	—	1,58	Spur	73	—
„ Magnesia	12,27	—	—	—	5	—
„ Magnesia-Amm.	—	—	0,64	—	—	34,2
Harnsäure	—	58,45	—	—	—	—
Harns. Ammoniak	—	31,83	3,45	—	—	—
„ Natron	—	—	1,14	—	—	—
Kohlens. Kalk	35,52	—	80,63	87,8	6	0,8
„ Magnesia	—	—	—	1,5	—	—
Verlust	5,00	—	—	—	—	—

In Gichtknoten aus den Fingergelenken eines Menschen *Gichtknoten*. fand Th. J. Herapath (3) 1,12 pC. Fett, 43,97 harns. Natron mit etwas harns. Kali, 14,77 harns. Kalk, 34,14 phosphors. Kalk, 5,99 Wasser (und Verlust), Spuren von phosphors. Eisenoxyd und Natron, Chlornatrium, Extractivstoff und Albumin.

Landerer (4) fand eine Concretion aus der Aorta eines in Folge arthritischer Metastase an einer Herzbeutelwassersucht Gestorbenen zusammengesetzt aus 14 Harnsäure, 6 thierischer Materie, 6,2 phosphors. Kalk, 16 kohlens. Kalk und 2 kohlens. Magnesia.

Venghaufs (5) hat Mittheilungen über einen Nierenstein eines Menschen gemacht, welchen er als aus Cystin mit kaum bemerkbaren Spuren von Eiweiß und einem harzartigen Körper bestehend betrachtet; er fand indeß

(1) J. chim. méd. [3] III, 322; Pharm. Centr. 1847, 703. — (2) J. chim. méd. [3] IV, 480; Pharm. Centr. 1848, 733. — (3) Chem. Gaz. 1848, 383; Pharm. Centr. 1848, 941. — (4) Repert. Pharm. [2] XLV, 60; Pharm. Centr. 1847, 560. — (5) Arch. Pharm. [2] XLIX, 88.

darin nur 15,2 pC. Schwefel, während nach Baudrimont's und Thaulow's Analysen das Cystin 26 pC. desselben enthält.

Excremente. J. R. Rogers (1) hat die Zusammensetzung der Excremente von Schweinen (A), Kühen (B), Schafen (C) und Pferden (D), Vohl (2) die der Excremente von Hunden (*Album graecum*) untersucht (E); 100 Theile der letztern bei 100° getrockneten Substanz gaben an Wasser 4,86 eines braunen extractähnlichen Körpers ab, dessen Lösung sich mit Jodtinktur rothbraun färbte. Vohl (und auch Rogers) hat auch den in Wasser (oder in Wasser und Salzsäure) löslichen Theil der Excremente (oder der Asche) und den unlöslichen besonders untersucht; wir geben hier nur die Zusammensetzung der Asche (bei E der Excremente) im Ganzen.

	A	B	C	D	E
100 Excr. (frisch) enth. Wasser . . .	77,13	82,45	56,47	77,25	
100 (bei 100° getr.) geben Asche . . .	37,17	15,23	13,49	13,36	
100 Asche enth. in Wasser lösliches . .	9,66	5,64	17,39	8,16	
" " " " Salzs. " . . .	18,70	32,21	—	22,59	
" " " " Salpeters. " . . .	—	—	34,54	—	
" " " unlösliches	71,65	61,95	48,17	74,25	
Zusammensetzung der ganzen Asche :					
Kali	3,60	2,91	8,32	11,30	0,30
Natron	3,44	0,98	8,28	1,98	0,44
Kalk	2,08	5,71	18,15	4,68	43,05
Magnesia	2,24	11,47	5,45	3,84	0,09
Manganoxydhyd.	—	—	Spur	2,13	—
Chlornatrium	0,89	0,23	0,14	0,03	—
Phosphors. Eisenoxyd	10,55	8,93	8,98	2,73	—
Phosphorsäure	0,41	4,76	7,53	3,98	34,46
Schwefelsäure	0,90	1,77	2,69	1,83	—
Kohlensäure	0,60	—	Spur	—	7,46
Chlor	—	—	—	—	0,04
Kieselerde	13,19	68,54	50,11	62,40	Spur
Sand	61,87	—	—	—	—
Eisen und Verlust	—	—	—	—	0,01
Organische Bestandtheile	—	—	—	—	14,15

J. Davy (3) hatte angegeben, dafs in dem Koth der

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 85; Pharm. Centr. 1848, 323. —

(2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 266. — (3) Edinb. New Phil. Journ. XL, 231. 335; Berzelius' Jahresber. XXVII, 681.

Spinnen ein Körper mit allen Eigenschaften des s. g. Xanthicoxyds enthalten sei, welches letztere bekanntlich von Unger früher als identisch mit der von ihm im Guano gefundenen und später als Guanin bezeichneten Substanz betrachtet worden war. Fr. Will und Gorup-Besanez (1) haben nun gefunden, daß die Excremente der Kreuzspinne (*Epeira diadema*) Guanin enthält; sie halten es für wahrscheinlich, daß auch in dem s. g. grünen Organ des Flußkrebses (*Astacus fluviatilis*) und im Bojanus'schen Organ der Teichmuschel (*Anodonta*) Guanin enthalten sei.

Roux (2) fand ein Osteosarcom von dem oberen Theile des Humerus zusammengesetzt aus 87,86 pC. Wasser, 9,85 chondrinähnlichem Knorpel, 0,30 Albumin, 0,28 Fett, 0,67 kohlen. Kalk, 0,59 phosphors. Kalk, 0,21 schwefels. Natron und Kali, 0,14 kohlen. Natron, 0,10 Chlornatrium und Chlorkalium, Spuren von Kieselerde, phosphors. Magnesia, Thonerde und Eisenoxyd.

Gorup-Besanez (3) hat zahlreiche Versuche über den Kieselerdegehalt der Federn verschiedener Vögel angestellt, aus denen sich unzweideutig ergibt, daß solche Vögel, deren Nahrung reicher ist an Kieselerde, die also von Körnern und Getreide leben, in ihren Federn mehr Kieselerde und überhaupt mehr unorganische Bestandtheile assimiliren, als andere von Fleisch, Insecten oder Beeren lebende Vögel. Die Mittelwerthe einer großen Zahl von Bestimmungen sind :

Vögel lebend von :	Ihre Federn enth. in 100 Th.		
	Asche	Kieselerde	100 Asche enth. an Kieselerde
Körnern	4,84	1,98	40
Fischen	2,41	0,23	10,5
Fleisch	2,16	0,64	27
Insecten, Beeren	2,62	0,75	27

(1) Anz. d. bair. Akad. d. Wissensch. (No. 233) 1848, 825; Ann. Ch. Pharm. LXIX, 117; J. pr. Chem. XLVI, 158; Pharm. Centr. 1849, 92. — (2) J. pharm. [8] XI, 429; Pharm. Centr. 1847, 511. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXI, 46; LXVI, 321; Pharm. Centr. 1847, 265; 1848, 333.

Das Alter des Thiers, so wie der Federn selbst und auch die Gattung der letzteren sind von Einfluss auf den Kieselerdegehalt; die Federn älterer Thiere sind reicher daran, als die jüngerer Thiere, ebenso enthalten Schwungfedern mehr als Schwanz- und Bauchfedern.

Im Ei liefs sich keine Kieselerde nachweisen.

Haare verschiedener Thiere sowie des Menschen liefen im Durchschnitt 2,6 pC. Asche, worin 10,8 pC. Kieselerde enthalten sind.

Nach Henneberg (1) ist der Kieselerdegehalt der ungefähr 80 Grm. wiegenden Federn eines Huhns etwa 0,200 Grm., die Flügel- und Schwanzfedern enthalten 0,14 pC. (17,1 der Asche), die Federn von der Brust und dem Bauch 0,29 (29,0) Kieselerde.

Schildpatt.

Aus einer Untersuchung A. Völcker's (2) über das Schildpatt (von *Testudo tabulata*) heben wir Folgendes hervor. Die weifsen Theile desselben, zerschnitten nach einander mit kaltem Wasser, Weingeist und Aether ausgezogen und bei 100° getrocknet, gaben 0,23 bis 0,27 Asche; die dunklen, ebenso behandelt, 0,34 bis 0,35 pC. einer eisenreicheren und dunkleren Asche, welche Chlornatrium, schwefels. Magnesia, kohlens. Kalk, kohlens. Magnesia, phosphors. Kalk, Eisenoxyd und Kieselerde enthält. In so gereinigtem Land- und Seeschildpatt wurden gefunden (für aschenfreie Substanz berechnet) 53,8 bis 54,2 pC. Kohlenstoff, 6,4 bis 6,5 pC. Wasserstoff, 14,8 Stickstoff, 21,5 bis 22,9 Sauerstoff, 1,9 bis 3,2 Schwefel, wonach die Zusammensetzung desselben von der des Horns verschieden ist. Bezüglich der Producte der Einwirkung verschiedener Reagentien und der zahlreichen Elementaranalysen derselben verweisen wir auf die Abhandlung, da die Kenntnifs bestimmter chemischer Verbindungen daraus nicht hervorgeht.

Seidensaft.

H. Ludwig (3) hat den Seidensaft untersucht, welchen

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 261. — (2) Aus des Verf. Inauguraldissertation in Pharm. Centr. 1847, 577. — (3) Arch. Pharm. [2] LV, 142; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 481; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 366.

die Seidenraupe bei dem Einspinnen austreten läßt und Seidensaft. der dann an der Luft sogleich zu Seide erhärtet. Der bernstein- bis goldgelbe, durchsichtige, zähe Saft färbt Wasser goldgelb und löst sich darin; die Lösung schäumt bei dem Erhitzen bis zum Sieden, ohne indeß dabei im Mindesten zu gerinnen; sie reagirt neutral. Nach 36 Stunden erstarrt die wässerige Seidensaftlösung zu einer zitternden Gallerte, welche in mehr Wasser sich selbst bei dem Sieden nicht mehr vollständig löst. Ein Tropfen der heißen Lösung, mittelst eines Glasstabs herausgenommen, erstarrt während des Herabfallens theilweise zu einem Seidenfaden, an welchem der Rest des Tropfens hängen bleibt. Auf Zusatz von 1 Tropfen einer verdünnten Säure zu frischer wässriger Seidensaftlösung scheidet sich die Seide als ein flockiges Gerinnsel ab, welches sich in der Kälte in mehr Säure nicht wieder löst; auf Zusatz von viel Säure bleibt die Lösung klar, erstarrt aber nach einigen Stunden zu einer Gallerte. Die Seidensaftlösung färbt sich bei dem Kochen mit concentrirter Salzsäure schmutzig-violett; sie wird durch Ferrocyankalium, Quecksilberchlorid, Kalkwasser und salpeters. Silberoxyd nicht gefällt; Gerbsäure bringt darin einen flockig-zähen Niederschlag, einfachessigs. Bleioxyd und schwefels. Kupferoxyd gallertartige Gerinnung hervor. Aetznatron verändert die Lösung nicht; auf Zusatz von etwas schwefels. Kupferoxyd bleibt etwas Kupfer gelöst und tritt violette Färbung ein. Die mit Aetznatron gekochte Seidensaftlösung entwickelt auf Zusatz von Salzsäure keinen Schwefelwasserstoff.

Vogel d. j. (1) hat angegeben, daß der Meerschwamm *Spongia marina*. (*Spongia marina*) das Jod größtentheils in einer unlöslichen Verbindung enthalte, sofern Wasser aus ihm nur eine Spur Jodnatrium ausziehe; durch das Ausziehen mit Wasser verliere der Schwamm 12 pC. an Gewicht (Chlornatrium, schwefels. Magnesia, kohlens. Magnesia und organische

(1) Repert. Pharm. [8] II, 118.

Anwendung
des Salmiaks
in der chem.
Analyse.

Mit schwefels. Ammoniak liefert letzterer indessen einen arsenfreien Rückstand.

Die *Titansäure* erleidet beim Glühen mit Salmiak keinen Gewichtsverlust; ist sie mit Alkalien verbunden, so verwandeln sich diese dabei in Chlormetalle; aus der Gewichtszunahme läßt sich daher die Zusammensetzung des wasserfreien Salzes berechnen. Zur Controle zieht man die mit Salmiak geglühte Masse mit Wasser aus, filtrirt von der ungelösten Titansäure ab und bestimmt die Menge des Chlormetalls durch Verdampfen. In wasserhaltigen Salzen wird der Wassergehalt vorher durch Glühen bestimmt. H. Rose theilt mit, dafs nach Weber's Analyse das bei 100° getrocknete *saure titans. Kali* $\text{KO}, 6 \text{TiO}_2 + 3 \text{HO}$ und das *saure titans. Natron* $2 \text{NaO}, 9 \text{TiO}_2 + 5 \text{HO}$ ist. Ersteres ist ein zartes krystallinisches Pulver, letzteres bildet unkrystallinische, glasartige Stücke.

Schwefels. Alkalien verwandeln sich beim Glühen mit Salmiak vollständig in Chlormetalle; *schwefels. Baryt* wird nur unvollständig, *schwefels. Magnesia* gar nicht zersetzt. *Selens. Baryt* liefert ein von freiem Selen braunes Gemenge von selenigs. Baryt mit Chlorbarium.

Thonerde wird, mit Salmiak geglüht, größtentheils, schwefels. Thonerde vollständig verflüchtigt; *Kalialum* hinterläßt schwerflüchtiges Chloraluminium - Chlorkalium. *Beryllerde* verhält sich ähnlich. — *Eisenoxyd* wird zum Theil als Chlorid verflüchtigt, das an die Tiegelwände krystallinisches Oxyd absetzt. *Manganoxyde* verwandeln sich in oxydoxydulhaltiges Manganchlorür; *Nickel-* und *Kobaltoxyd* gehen in regulinische Metalle über, ebenso *Wismutoxyd*; *Arsennickel* hinterläßt Chlornickel. *Chlorsilber* verändert sich nicht, *Silberoxyd* liefert Chlorsilber und Metall, *Antimonsilber*, Ag_2Sb , wird nur unvollständig zerlegt. — *Zinkoxyd* und *Bleioxyd*, wie auch *schwefels. Zinkoxyd* und *Schwefelblei* verflüchtigen sich schwierig aber vollständig bei Luftzutritt als Chlormetalle. *Chromoxyd* erleidet keine Veränderung; *chroms. Alkalien* hinterlassen Chromoxyd und

Chlormetall; *salpeters. Uranoxyd* Uranoxydoxydul; *Kieselsäure* erleidet keinen Gewichtsverlust, wenn sie durch längeres Glühen dichter geworden ist; *phosphors. Natron* wird unter Bildung von Chlornatrium und etwas Phosphorchlorid theilweise zersetzt, *phosphors. Kalk* gar nicht. *Salpeter* wird leicht und vollständig in Chlorkalium verwandelt; *Borax* wird nicht verändert; *Fluornatrium* und *Fluorcalcium* werden schwierig, *Bromnatrium* und *Jodkalium* unvollständig unter Bildung von Chlormetall zerlegt.

Vorschläge für einen Apparat zu genaueren Gasana- Gasanalysen. lysen haben gemacht Doyère (1) und Regnault und Reiset (2), letztere mit Reklamirung der Priorität (3) bezüglich des Principes, auf welches die neuen Methoden gegründet sind: die chemischen Einwirkungen und die Messungen in verschiedenen Räumen vorzunehmen. Bunsen's Apparate und Methoden, Gasgemenge zu analysiren, sind durch Kolbe (4) zusammengestellt und beschrieben worden.

Brunner (5) empfiehlt zur Bestimmung des Sauerstoff- Sauerstoff.

- (1) Compt. rend. XXV, 928. — (2) Compt. rend. XXVI, 6; J. pr. Chem. XLIII, 168. Eine genauere Beschreibung des Apparats und der Methoden bei der Analyse verschiedener Gasgemenge wurde erst 1849 veröffentlicht (Ann. ch. phys. [3] XXVI, 329). — (3) Compt. rend. XXV, 960. Vergl. Compt. rend. XXVI, 2. — (4) Liebig, Poggendorff und Wöhler's Handwörterbuch der Chemie II, 1051. — Wir wollen hier noch einige Angaben über Apparate nachtragen, welche im Vorhergehenden keinen Platz gefunden haben. Hare (Sill. Am. J. [2] IV, 87; Phil. Mag. [3] XXXI, 355) hat ein Knallgasgebläse beschrieben, um Rhodium, Iridium, Osmium und Platin in größeren Mengen zu schmelzen; Schulze (J. pr. Chem. XLIII, 368) einen Gebläseapparat. Verbesserungsvorschläge sind weiter gemacht worden von Maumené (Ann. ch. phys. [3] XXI, 127) für die Destillirblase; von Taupenot (Ann. ch. phys. [3] XXI, 503) für einen Heber, der zum Ueberfüllen schädlicher Flüssigkeiten dienen soll, und für die Zusammenstellung Woulfe'scher Flaschen; von Wallmark (Pogg. Ann. LXXII, 485) für ein Gasometer; von Th. Taylor (Phil. Mag. [3] XXXI, 393; Chem. Soc. Mem. III, 815) für Verschliefung von Glasgefäßen mit weiter Oeffnung, und für eine leicht herzustellende Einrichtung zum Cupelliren; von Evans (Pharm. J. Trans. VIII, 38) für die Construction eines Bades für verschiedene Temperaturen. — (5) Pogg. Ann. Ergänzungs. II, 509, Pharm. Centr. 1847, 892.

Sauerstoff. gehalts der Atmosphäre, ein Eisenoxydsalz und Thonerde in dem Verhältniß zu mischen, daß der durch Ammoniak zu bewirkende Niederschlag etwa 96 Eisenoxyd auf 4 Thonerde enthält, den Niederschlag auszuwaschen, gut zu trocknen und bei einer etwas unter der Glühhitze liegenden Temperatur der reducirenden Einwirkung von getrocknetem Wasserstoff auszusetzen; sodann ein bekanntes Volum getrockneter Luft mittelst eines Aspirators über das so erhaltene Präparat (pyrophorisches, durch die Thonerde fein zertheiltes Eisen) streichen zu lassen und die Gewichtszunahme (den Sauerstoffgehalt der bei dem Versuch angewandten Menge Luft) zu bestimmen. Weniger genau, aber den älteren eudiometrischen Methoden doch an die Seite zu stellen, ist nach ihm das Verfahren, in eine unten geschlossene, graduirte Glasröhre eine zweckmäßige Menge concentrirter Eisenvitriollösung und auf diese eine Schicht verdünnte Kalilauge zu bringen, den mit Luft gefüllten Raum zu messen, die Röhre zu verschließen und einige Minuten lang stark zu schütteln, unter Wasser zu öffnen und das Volum des übrig gebliebenen Stickgases zu messen; dieses Verfahren eigne sich auch zur Darstellung größerer Mengen von Stickgas.

Wasserstoff. Laurent (1) hat, bei Gelegenheit der Analyse mehrerer organischen Basen, folgendes Verfahren befolgt, das nach seiner Angabe den Wasserstoff auf 1000 genau zu bestimmen erlaubt. — Die Substanz wird, ohne sie zu pulvern, in der Verbrennungsröhre gröblich mit etwas heißem Kupferoxyd gemengt, alsdann das Ganze mit Oxyd bedeckt, das 200 bis 250° heiß ist, und die Verbrennung der Kohle mit Sauerstoff vollendet. Dieser wird aus einer 30 bis 40 Centim. langen, 3 bis 4 Grm. geschmolzenes chloresaures Kali enthaltenden Röhre entwickelt, die mit einem Uförmigen, im ersten Schenkel Stücke von Aetzkali, im zweiten Choralcium enthaltenden Rohr in Verbindung steht. Der erste

(1) Ann. ch. phys. [3] XIX, 260; Ann. Ch. Pharm. LXII, 96; J. pr. Chem. XL, 400.

Schenkel dieser Röhre ist mit einer zu einer Spitze ausgezogenen Sicherheitaröhre versehen, die nach vollendeter Verbrennung, wenn das reducirte Kupfer keinen Sauerstoff mehr aufnimmt, abgebrochen wird, worauf man wie gewöhnlich Luft durchsaugt. Der Sauerstoffapparat wird mit der Verbrennungsröhre erst nach der Verbrennung durch eine Kautschuckröhre verbunden, indem man etwas ansaugt, um einen verminderten Druck in der Röhre hervorzubringen, alsdann die Spitze abbricht und nun dieselbe in die Kautschuckröhre bringt.

Städeler (1) fand, daß vollkommen trocknes und Kohlenstoff. kohlenstofffreies Sauerstoffgas, wie es zur vollkommenen Verbrennung kohlenstoffreicher organischer Substanzen verwendet wird, selbst bei sehr langem Durchleiten von einer Kalilauge von 1,3 spec. Gew. nicht absorbiert wird, was der auf H. Rose's Versuche gestützten Ansicht über die dadurch herbeigeführte Fehlerquelle der Kohlenstoffbestimmung widerspricht.

R. E. Rogers und W. M. Rogers (2) behandeln, seine Bestimmung im Graphit. zur quantitativen Bestimmung des Kohlenstoffs im Graphit, die mit etwa dem 30fachen Gewicht Quarzsand zum unfehlbaren Pulver zerriebene Substanz in einer tubulirten Retorte mit einer Mischung von chroms. Kali und Schwefelsäure (1 Vol. Wasser und 5 Vol. concentrirte Säure). Die sich beim Erwärmen entwickelnde Kohlensäure wird zuerst in einer verticalen Röhre abgekühlt (um mit fortgerissene Schwefelsäure zu condensiren), dann durch Chlorcalcium getrocknet und endlich in einem gewogenen Kaliapparat aufgefangen. Die Oxydation ist nur dann vollständig und in 30 bis 40 Minuten vollendet, wenn der Graphit so fein vertheilt ist, daß man keine Schüppchen mehr bemerkt.

Kudernatsch (3) giebt der Anwendung des Kupfer- im Rohleisen.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 118. — (2) Sill. Am. J. [2] V, 352; Pharm. Centr. 1848, 781. — (3) Aus den Berichten der Freunde der Naturwissenschaft. in Wien II, 102 in J. pr. Chem. XL, 499.

oxyds vor der des chroms. Bleioxyds zur Ermittlung des Kohlenstoffs im Roheisen den Vorzug.

Kohlensäure.

H. Vohl (1) hat eine Modification des von Will und Fresenius zur Kohlensäurebestimmung vorgeschlagenen Apparats beschrieben; entwickelt eine Substanz, deren Kohlensäuregehalt mit Hülfe dieses Apparats bestimmt werden soll, gleichzeitig salzs. Gas oder Schwefelwasserstoff, wie dies bei Aschen bisweilen stattfindet, so verhindert er das Entweichen der letzteren durch den zweckmäßigen Zusatz von Quecksilberoxyd. In den Fällen, wo das Volum der sich entwickelnden Kohlensäure ausgemittelt werden soll, bringt Vohl die gepulverte Substanz in eine Röhre, die an einem Ende zu einer Spitze ausgezogen und an dem andern etwas verengert ist, füllt sie mit Wasser und läßt sie nun unter Quecksilber in die graduirte Glocke treten. Beim Hinzubringen der Säure wird die Kohlensäure ausgetrieben, ohne daß durch mithinzugebrachte Luft ihr Volum vermehrt würde.

**Bestimmung
im Harn, der
Milch u. s. w.**

R. F. Marchand (2) bestimmt die Kohlensäure im Harn in nachstehender einfachen Weise. Man bringt den Harn in einen Glaskolben, der luftdicht mit einem doppelt durchbohrten Kork verschlossen ist. Durch die eine Oeffnung geht eine Steigröhre, welche in den Harn eintaucht und auf der andern Seite in eine feine, leicht zuschmelzbare Spitze ausgezogen ist. Durch die zweite Oeffnung geht eine doppelt gebogene Röhre, welche in eine leere Flasche durch einen luftdicht schließenden Kork reicht; aus dieser geht durch denselben Kork eine zweite Röhre, die in eine ähnlich vorgerichtete, mit Barytwasser (das hierzu geeigneter als Kalkwasser ist) gefüllte Flasche reicht, welche noch mit einer zweiten und dritten Barytwasserflasche verbunden ist. Die letzte steht mit einer Luftpumpe in Verbindung. Ist der Apparat luftdicht, so wird der Harn im Wasserbad auf 50 bis 60° C. erwärmt und nun die Luft-

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 247. 377. — (2) J. pr. Chem. XLIV, 263.

pumpe langsam in Bewegung gesetzt. Die Flüssigkeit kommt bald ins Sieden, destillirt in die leere Flasche über und die Barytlösungen trüben sich; nach $\frac{1}{2}$ bis $\frac{3}{4}$ Stunden bricht man die Spitze der ersten Steigröhre ab und saugt Luft durch den Apparat. Der Baryt wird als schwefels. Salz bestimmt, und aus seinem Gewicht die Kohlensäure berechnet.

Nach Svanberg und Struve's (1) Versuchen ist die Molybdänsäure eins der empfindlichsten Reagentien auf Phosphorsäure. Man vermischt die zu prüfende Flüssigkeit mit molybdäns. Ammoniak und dann mit überschüssiger Salzsäure oder besser Salpetersäure; bei Gegenwart von Phosphorsäure färbt sich die Lösung gelb, und es entsteht sogleich oder nach einiger Zeit eine gelbe Fällung von phosphorsäurehaltigem molybdäns. Ammoniak. Da das natürliche Schwefelmolybdän häufig phosphorsäurehaltig ist, so hat man stets zu prüfen, ob das daraus bereitete molybdäns. Ammoniak beim Uebersättigen mit einer Säure nicht für sich schon den gelben Niederschlag giebt. H. Rose (2) bestätigt die außerordentliche Empfindlichkeit dieser Reaction, die indessen nur mit der gewöhnlichen, nicht mit den anderen Modificationen der Phosphorsäure eintritt. Der gelbe, in der Wärme schneller sich bildende Niederschlag ist in Ammoniak sowie in einem Ueberschufs des phosphors. Salzes auflöslich; er eignet sich deshalb vorzugsweise zum Erkennen kleiner Mengen von Phosphorsäure. Bei in Wasser unlöslichen phosphors. Verbindungen wendet H. Rose die salpeters. Auflösung derselben an.

Raewsky (3) hat ein Verfahren zur Bestimmung der Phosphorsäure beschrieben, welchem einerseits die constante Zusammensetzung des phosphors. Eisenoxyds und seine Unlöslichkeit in Essigsäure, andererseits die Methode von

(1) J. pr. Chem. XLIV, 291; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 801; Pharm. Centr. 1848, 756. — (2) Pogg. Ann. LXXVI, 26. — (3) Compt. rend. XXIV, 681; Instit. 1848, 125. J. pr. Chem. XLI, 365; Pharm. Centr. 1847, 751; Repert. Pharm. [2] XLVIII, 51.

Phosphor-
säure.
Bestimmung.

Marguerite (1) zu Grunde liegt, den Gehalt einer Lösung an Eisen, wenn es als Oxydul zugegen ist, mittelst übermangans. Kalis zu ermitteln. Er versetzt die, in der Regel saure, phosphorsäurehaltige Flüssigkeit mit überschüssigem essigs. Eisenoxyd (eine mit essigs. Natron vermischte Lösung von 1 Eisenalaun in 10 Wasser leistet dasselbe), wascht das ausgeschiedene weißliche phosphors. Eisenoxyd auf einem Filter gut aus, löst es in Salzsäure, und behandelt die Lösung zur Reduction des Oxyds in Oxydul mit schwefl. Natron. Mittelst einer vorher titrirten Lösung von übermangans. Kali ermittelt er nun den Gehalt an Eisen, und berechnet dann, nach der Formel $\text{Fe}_2\text{O}_3, \text{PO}_3$, den Gehalt an Phosphor oder Phosphorsäure; 56 (Fe_2) Eisen entsprechen 32 Phosphor oder 72 Phosphorsäure. Raewsky controlirte zwar dieses Verfahren mit einem phosphors. Salz von bekannter Zusammensetzung und glaubt, daß es auf 6 bis 8 Tausendtel genaue Resultate ergebe, immerhin bleibt aber zu beachten, daß — wie Mitscherlich zeigte — das phosphors. Eisenoxyd in essigs. Eisenoxyd löslich und seine constante Zusammensetzung überhaupt noch streitig ist.

Die *Pyrophosphorsäure* bestimmt Raewsky (2) in gleicher Weise wie die dreibasische Säure, nur wendet er statt des essigs. Eisenoxyds Ammoniakalaun an. Nach Schwarzenberg (S. 349) enthält das pyrophosphors. Eisenoxyd auf 2 At. Oxyd 3 At. Säure.

Bestimmung
durch Eisen
und Baryt.

Mulder (3) hält, nach von ihm angestellten Versuchen, zur Bestimmung des Phosphors und der Phosphorsäure in organischen Verbindungen die Berthier'sche Methode (mittelst einer Eisenoxydlösung von bekanntem Gehalt) für die, welche die sichersten Resultate gebe. Die Lösung der Substanz, von Fibrin z. B., in Salzsäure liefert die als

(1) Compt. rend. XXII, 857; Ann. Ch. Pharm. LX, 369. — (2) Compt. rend. XXVI, 205; Instit. 1848, 125; Pharm. Centr. 1848, 285. — (3) Scheik. Onderz. IV, 383; J. pr. Chem. XLV, 262; Repert. Pharm. [2] XLVIII, 86.

solche vorhandene, die Lösung in Salpetersäure die fertig gebildete und die aus dem Phosphor entstandene Phosphorsäure; aus der Differenz berechnet er den Gehalt an Phosphor. Mulder hält das phosphors. Eisenoxyd für löslich in Essigsäure, allein seine Versuche beweisen dies nicht, sie zeigen nur, daß es löslich in essigs. Eisenoxyd ist. — Die Wägung als phosphors. Baryt ($2 \text{ BaO}, \text{PO}_5$) betrachtet Mulder ebenfalls als genau, wenn man der salzs. oder salpeters. Lösung der organischen Substanz Chlorbaryum zusetzt, filtrirt und nun vorsichtig mit Ammoniak fälle; Wackenroder und Ludwig (1) haben aber neuerdings nachgewiesen, daß dieser Niederschlag Chlorbaryum enthält und daß er zu genauen Phosphorsäurebestimmungen sich nicht eignet.

Phosphor-
säure.

R. Weber (2) hat gefunden, daß geglühte phosphors. Magnesia oder auch phosphors. Magnesia-Ammoniak nach dem Auflösen in Säuren durch Ammoniak nicht mehr vollständig gefällt wird, sofern die pyrophosphors. Magnesia löslicher ist, als die dreibasische Verbindung. Der Verlust kann je nach den Umständen 2 bis 8 pC. betragen; Gegenwart von Ammoniaksalzen verringert ihn. Erhitzt man die pyrophosphors. Magnesia einige Zeit mit concentrirter Schwefelsäure, so wird sie durch Ammoniak wieder völlig fällbar. Dieses Verhalten ist bei Bestimmungen der Phosphorsäure oder der Magnesia zu beachten.

Bestimmung
durch
Magnesia.

H. Rose (3) hat gezeigt, daß man die gewöhnliche Phosphorsäure von der Pyrophosphorsäure durch schwefels. Magnesia und Ammoniak bei Gegenwart einer sehr großen Menge Salmiak nicht quantitativ trennen kann, obwohl letztere Säure unter diesen Verhältnissen nur sehr langsam gefällt wird.

Trennung der
gewöhnlichen
Phosphor-
säure von Py-
rophosphor-
säure.

(1) Arch. Pharm. [2] LVI, 265. 283. — (2) Pogg. Ann. LXXIII, 137; J. pr. Chem. XLII, 206; Pharm. Centr. 1848, 12; Berl. Acad. Ber. 1848, 239; Instit. 1848, 106. — (3) Pogg. Ann. LXXVI, 28.

Trennung der
Phosphor-
säure von
Eisenoxyd bei
Gegenwart al-
kalischer
Erden.

Fresenius (1) erhitzt zur Trennung der Phosphorsäure von Eisenoxyd und alkalischen Erden die diese Körper enthaltende Lösung zum Sieden, vermischt mit schwefliger Natron, bis die Farbe hellgrün geworden ist und kohlen. Natron einen weissen Niederschlag erzeugt, verjagt die überschüssige schweflige Säure durch Kochen, neutralisirt beinahe mit kohlen. Natron und setzt nun einige Tropfen Chlorwasser und essigs. Natron im Ueberschufs zu. Die kleinste Menge Phosphorsäure giebt sich durch Fällung von weissem phosphors. Eisenoxyd zu erkennen (auch Kieselensäure und Arsensäure bewirken einen Niederschlag, daher sie vorher abgeschieden werden müssen). Man fügt tropfenweise mehr Chlorwasser zu, bis die Flüssigkeit röthlich erscheint, kocht bis sie klar ist, und filtrirt heifs. Das Filtrat enthält den gröfseren Theil des Eisens und den Kalk; beide werden mittelst Schwefelammonium, getrennt. Der Niederschlag enthält alle Phosphorsäure und den Rest des Eisens; man zerlegt seine salzs. Auflösung entweder mit Ammoniak und Schwefelammonium oder, nach der Reduction mit schwefliger Natron, mit überschüssiger Natronlauge in der Siedhitze. Das niederfallende Eisenoxyduloxyd wird mit dem übrigen Eisen vereinigt, und in dem Filtrat die Phosphorsäure als phosphors. Magnesia-Ammoniak bestimmt.

Trennung der
Phosphor-
säure von
Thonerde.

Bei der Analyse einer Thonerde, Eisenoxyd, Kalk, Magnesia und Phosphorsäure enthaltenden Verbindung fällt Fresenius (2) zuerst die mit schwefliger Natron zur Reduction des Eisenoxyds behandelte Lösung mit kohlen. Natron aus, und kocht dann mit überschüssiger Natronlauge, von welcher man eine neue Quantität zusetzt, wenn der Niederschlag schon schwarz und körnig geworden ist. Die Lösung enthält alle Thonerde und einen Theil der Phosphorsäure (war nur Thonerde und Eisenoxyd zugegen, so ist alle Phosphorsäure im Filtrat). Sie wird angesäuert, mit chlors. Kali gekocht, mit Ammoniak und Chlorbaryum

(1) J. pr. Chem. XLV, 258. — (2) J. pr. Chem. XLV, 263.

ausgefällt, und nach einigem Digeriren filtrirt. Der alle Thonerde und Phosphorsäure enthaltende Niederschlag wird etwas ausgewaschen, in wenig Salzsäure gelöst, mit kohlen. Baryt in der Wärme gesättigt und mit überschüssiger Natronlauge erwärmt, der man etwas kohlen. Natron zusetzt, um etwa gelösten Baryt zu entfernen. Das Filtrat enthält alle Thonerde, der Niederschlag alle Phosphorsäure. Aus der salzs. Lösung des letzteren entfernt man den Baryt mit Schwefelsäure, und bestimmt im Filtrat die Phosphorsäure als phosphors. Magnesia-Ammoniak. Fresenius hat außerdem den Gang der Analyse beschrieben, der bei eisenreichen, Manganoxydul, Thonerde, Kalk, Magnesia, Phosphorsäure, Schwefelsäure, Arsensäure und Kieselsäure enthaltenden Verbindungen zu befolgen ist und in welchem, aufser schon bekannten, die eben erwähnten Trennungsmethoden in Anwendung gebracht werden. — Die von Wackenroder angegebene Methode siehe bei der Analyse von Aschen.

Trennung der
Phosphor-
säure von
Thonerde.

J. C. Nesbitt (1) hat gezeigt, dafs das phosphors. Magnesia-Ammoniak, welches mittelst eines Gemisches von schwefels. Magnesia, Salmiak und Ammoniak aus den Lösungen von phosphors. Eisenoxyd und phosphors. Thonerde in Salzsäure, Ammoniak und Weinsäure gefällt wird, leicht thonerde- und eisenoxydhaltig wird, wenn die Flüssigkeit nicht stark verdünnt und mit einem grofsen Ueberschufs an Weinsäure und Ammoniak versetzt wird. Auch Fresenius (2) bemerkt, dafs dieses Verfahren zu Irrthümern führen könne, da eine Mischung von Weinsäure, schwefels. Magnesia, Salmiak und Ammoniak bei einer gewissen Concentration nach einiger Zeit für sich schon einen Niederschlag giebt.

H. Weidenbusch (3) schlägt zur Bestimmung des Schwefels in organischen Verbindungen folgendes Verfahren vor. Man digerirt die schwefelhaltige Verbindung, mit einem

Schwefel.
Bestimmung
in org. Mate-
rien.

(1) Chem. Soc. Qu. J. I, 44; Pharm. Centr. 1848, 717. — (2) J. pr. Chem. XLV, 259. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXI, 372.

Schwefel.
Bestimmung
in org. Mate-
rien.

Ueberschuß von salpeters. Baryt gemengt, mit der stärksten rauchenden Salpetersäure, bis alle organische Substanz zerstört ist, was man daran erkennt, daß die Masse bei dem Verdampfen der Salpetersäure nicht mehr in großen Blasen in die Höhe steigt, sondern ohne Aufschäumen eintrocknet. Sie wird nun in einer Platinschale vorsichtig zum Schmelzen erhitzt, und dann mit verdünnter Essigsäure behandelt, welche den mit den bekannten Cautelen zu bestimmenden schwefels. Baryt zurückläßt.

Heintz (1) verbrennt die in einem Schiffchen liegende Substanz mit Kupferoxyd und Sauerstoffgas, fängt die Gase in schwefelsäurefreier Kalilauge auf, behandelt dann diese Lösung sowohl als den Inhalt der Verbrennungsröhre mit einer warmen Lösung von chlórsaurem Kali in verdünnter Salzsäure, und fällt aus dem Filtrat die Schwefelsäure mittelst Chlorbaryum. Hinterläßt die schwefelhaltige Substanz beim Einäschern ein schwefels. Salz, so hat man auch den im Schiffchen bleibenden Rückstand der schwefelsäurehaltigen Lösung zuzufügen.

Sauerstoff-
säuren des
Schwefels.

Unterchlorigs. Salze verwandeln alle Polythionsäuren (mit Ausnahme der Unterschwefelsäure) schon in der Kälte, und ohne daß ein Ueberschuß davon erforderlich wäre, sogleich in Schwefelsäure. Fordos und Gélis (2) benutzen dieses Verhalten zur Bestimmung des Sauerstoff- und Schwefelgehalts dieser Säuren, welche wie ein chlorometrischer Versuch ausgeführt wird. Man stellt sich zuerst eine Probenflüssigkeit dar, durch Sättigen einer verdünnten Natronlauge mit Chlor und Verdünnen mit so viel Wasser, daß etwa 25 C. C. derselben 0,1 Grm. unterschweflgs. Natron in schwefels. verwandeln ($\text{NaO}, \text{S}_2\text{O}_3, 5 \text{HO} + 4 \text{Cl} = \text{NaO}, \text{S}_2\text{O}_6, \text{HO} + 4 \text{HCl}$; 100 Salz entsprechen 114 Chlor). Man löst nun 0,1 Grm. der Substanz in etwa 100 Grm.

(1) Pogg. Ann. LXXI, 145; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 403; Pharm. Centr. 1847, 429. — (2) Ann. ch. phys. [8] XXII, 60; Compt. rend. XXV, 625; J. pr. Chem. XLIII, 449; Pharm. Centr. 1848, 858.

Wasser, säuert mit Salzsäure an, und fügt von der Probe-
 flüssigkeit zu, bis der Geruch von Chlor bemerkbar ist,
 oder bis Indigolösung entfärbt wird. Die Anzahl der ver-
 brauchten Chloräquivalente entspricht den Sauerstoffäqui-
 valenten, die zur Bildung von Schwefelsäure nöthig waren.
 — Will man den Schwefel bestimmen, so fällt man die
 oxydirte Lösung mit Chlorbaryum.

Sauerstoff-
 säuren des
 Schwefels.

F. Kessler (1) kocht, um die Zusammensetzung dieser
 Säuren zu ermitteln, ihre Lösungen oder die ihrer Salze
 mit hinreichendem Cyanquecksilber, bis der anfangs gelbe
 Niederschlag schwarz und die darüber stehende Flüssigkeit
 klar geworden ist. Letztere enthält einen Theil des Schwefels
 in der Form von Schwefelsäure, die man als schwefels.
 Baryt bestimmt. Der Niederschlag enthält den anderen
 Theil des Schwefels nebst einer Menge Metall, die dem
 Sauerstoff äquivalent ist, der zur Schwefelsäurebildung er-
 forderlich war; er wird auf einem gewogenen Filter ge-
 sammelt, nach dem Trocknen im leeren Raum über Schwe-
 felsäure gewogen, mit concentrirter Salpetersäure digerirt,
 bis das Filter zerstört ist, dann mit Salzsäure bis zur Lö-
 sung des Schwefelquecksilbers und endlich mit chlores.
 Kali erwärmt, bis zur völligen Oxydation des Schwefels.
 In der Lösung bestimmt man die Schwefelsäure auf die ge-
 wöhnliche Weise, und zieht die daraus berechnete Schwefel-
 menge von dem Gesamtgewicht des schwarzen Nieder-
 schlags ab. Zieht man die dem so gefundenen Metall äqui-
 valente Menge Sauerstoff von dem Sauerstoff der in der
 Lösung gefundenen Schwefelsäure ab, so erhält man den
 Sauerstoffgehalt der Polythionsäure. Mit unterschweflgs.
 Salzen erhält man nur dann zuverlässige Resultate, wenn
 man ihrer mit Cyanquecksilber vermischten Lösung Salpeter-
 säure tropfenweise zusetzt und jedesmal kocht, bis der
 entstehende gelbe Niederschlag schwarz geworden ist. Bei
 Salzen von Baryt, Strontian oder Bleioxyd findet diese
 Methode keine Anwendung.

(1) Pogg. Ann. LXXIV, 265 (vergl. die S. 875 angef. Citate).

Trennung
schwefliger
Säure von
Kohlensäure.

Persoz (1) bedient sich zur Trennung der schwefligen Säure von Kohlensäure des gepulverten jods. Kalis oder Natrons, mit dem man einen mit Stärkekleister bestrichenen Glasstab überstreut hat. Den Glasstab läßt man in dem Gasgemenge bis die Absorption vollendet ist, was man mittelst Stärkekleister erkennt, der mit einer verdünnten Lösung von jods. Kali befeuchtet und mit Hülfe eines Glasstabes in die Röhre eingeführt wird. Der Kleister färbt sich sogleich blau, wenn noch eine Spur schwefliger Säure vorhanden ist. — Früher schon schlug Persoz zu demselben Zweck eine concentrirte Lösung des jods. Salzes vor, welche aber durch Absorption von Kohlensäure die Genauigkeit des Versuchs beeinträchtigte.

Schweflige
u. salpetrige
Säure.

Schönbein (2) benutzt zur Nachweisung von schwefliger oder salpetrig. Gas Streifen von weißem, ungeleimtem Druckpapier, welche mit einer verdünnten Lösung von schwefels. Manganoxydul getränkt und nach dem Trocknen in einer Atmosphäre von Ozon (einer lufthaltigen Flasche in welcher sich ein Stückchen Phosphor befindet) so lange aufgehängt waren, bis sie von gebildetem Mangansuperoxyd gebräunt sind. Die Farbe dieser Streifen verschwindet sogleich in Luft, die nur Spuren von schwefliger oder salpetriger Säure enthält, langsamer in Stickoxydgas. — Die an dem Braunwerden des mit Manganoxydulsalz getränkten Papiers zu erkennende Bildung von Mangansuperoxyd hält Schönbein (3) für ein empfindliches Reagens auf Mangan und umgekehrt auf Ozon, da nach seinen Versuchen Ozon (den Bleiessig ausgenommen) kein anderes Metalloxydsalz unter Abscheidung von Superoxyd zerlegt.

Brom.
Bestimmung.

Fehling (4) hat die von Heine (5) in Anwendung

(1) Ann. ch. phys. [3] XX, 254; J. pr. Chem. XLI, 287; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 408; Pharm. Centr. 1847, 560. — (2) Pogg. Ann. LXXII, 457. — (3) Pogg. Ann. LXXII, 466. — (4) Aus den würtemb. wissensch. Jahreshften 1848, I, 18 in J. pr. Chem. XLV, 269. — (5) Aus Karsten u. Dechen's Arch. für Mineralog. XIX, 1 in J. pr. Chem. XXXVI, 184.

gebrachte Methode zur Bestimmung des Broms in Salzsöolen und Mutterlaugen geprüft und brauchbar befunden. Sie beruht auf der Vergleichung der Färbung der ätherischen Lösung des, durch Chlor abgeschiedenen, Broms mit einer Probeflüssigkeit von bekanntem Bromgehalt. Fehling bereitete sich 10 Probeflüssigkeiten, aus je 60 Grm. einer gesättigten reinen Kochsalzlösung bestehend, die um je 0,002 Grm. steigend von 0,002 bis 0,020 Grm. Brom in der Form von Bromkalium enthielt. Zu diesen Flüssigkeiten bringt man das gleiche Vol. Aether und dann Chlorwasser, bis zum Punkt der tiefsten Färbung; zu wenig oder zu viel Chlor ist gleich schädlich, da in beiden Fällen die Farbe schwächer erscheint. Man hat so eine Farbenscala von gleichmäfsig steigender Schattirung, die zur Vergleichung dient. Mit je 60 Grm. der zu untersuchenden Mutterlaugen verfährt man nun in gleicher Weise, und findet so, durch die Vergleichung der Farbe des Aethers bei der Mutterlauge mit dem der Probeflüssigkeit, auf 1 bis 2 Milligramm. (also auf $\frac{1}{10000}$ bis $\frac{2}{10000}$) genau die Menge des vorhandenen Broms. Die Versuche werden zur Controle einigemal wiederholt, dabei directes Sonnenlicht vermieden und dieselben überhaupt nach dem Zusatz des Chlors zu der bromhaltenden Flüssigkeit schnell beendet.

Fehling hat ferner gefunden, dafs bei fractionirter Fällung des Chlors aus einer bromhaltigen gesättigten Kochsalzlösung durch salpeters. Silberoxyd das Bromsilber mit den ersten Antheilen Chlorsilber niederfällt; als er bei einem Bromgehalt von 0,001 mit $\frac{1}{10}$ bis $\frac{1}{100}$, von 0,0001 mit $\frac{1}{1000}$, von 0,00002 mit $\frac{1}{5000}$ und von 0,00001 mit $\frac{1}{10000}$ der zur vollständigen Fällung nöthigen Silberlösung versetzte, erhielt er durch Wägung des in Chlorgas geschmolzenen Niederschlags Resultate, die hinreichend genau und in Uebereinstimmung waren mit der Schätzung des Broms nach der Farbe der ätherischen Lösung. Die Fällung geschieht am besten kalt, und der Niederschlag bedarf in der Regel eines mehrtägigen Auswaschens.

Brom-
Bestimmung.

Jod und Brom.

G. L. Cantu (1) verfährt zur gleichzeitigen Nachweisung von Jod und Brom in Mineralwassern in folgender Weise. Das Wasser wird zur Hälfte verdampft, dann mit reinem kohlen. Alkali bis zur alkalischen Reaction versetzt, gekocht, filtrirt und zur Trockne verdampft. Der Rückstand wird mit Alkohol behandelt, der Auszug eingetrocknet, schwach geglüht, mit Essigsäure angesäuert, die wieder eingetrocknete Masse in wenig Wasser gelöst und mit einigen Tropfen eines dünnen Stärkeklisters versetzt. Wird diese Auflösung nun über eine Mischung von 10 Th. Schwefelsäure und 1 Th. Salpetersäure vorsichtig geschichtet, so entstehen bei Gegenwart von Jod- und Bromverbindungen zwei Zonen in der Salzlösung, von denen die eine topasgelb (bisweilen grünlich) und die obere blau ist. — Chevallier und Gobley (2) befeuchten mit der nach obiger Weise erhaltenen wässerigen Lösung Stärkmehlpapier, und setzen dasselbe dem aus Chlorwasser abdunstenden Chlorgas aus.

Stickstoff.

Für die Ausführung der Stickstoffbestimmung nach der von Varrentrapp und Will (3) beschriebenen Methode sind von Péligot, Bineau, Mitchel, Nöllner und Schmidt Modificationen in Vorschlag gebracht worden, von denen die des ersteren Chemikers die meiste Beachtung verdient, da sie das Verfahren wesentlich abkürzt, ohne der Genauigkeit Abbruch zu thun.

Péligot (4) verbrennt die stickstoffhaltige Materie wie gewöhnlich mittelst Natronkalk, anstatt aber das sich entwickelnde Ammoniak in Salzsäure aufzufangen und in der Form von Platinsalmiak zu wägen, leitet er es in ein bekanntes Volum oder Gewicht titrirter Schwefelsäure. (Péligot nimmt zu jedem Versuch 10 C. C. einer Säure,

(1) Aus Raccolta fisico-chimica ital. 1848, Nro. 27 in Chem. Gaz. 1848, 396; Repert. Pharm. [2] XLIX, 374. — (2) J. chim. méd. [3] IV, 73; Pharm. Centr. 1848, 415. — (3) Ann. Ch. Pharm. XXXIX, 257. — (4) Compt. rend. XXIV, 550; J. pharm. [3] XI, 334; J. pr. Chem. XLI, 122; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 402; Pharm. Centr. 1847, 353.

die in einem Liter 61,250 Grm. erstes Hydrat (SO_3, HO) ^{Stickstoff.} enthält; 100 C. C. derselben entsprechen demnach 2,12 Grm. Ammoniak oder 1,75 Grm. Stickstoff.) Die das Ammoniak-salz enthaltende Säure wird in ein Becherglas gebracht, mit einigen Tropfen Lackmustinctur gefärbt, und nun mit einer titrirten Auflösung von Kalk in Zuckerwasser neutralisirt, was man an der plötzlich auftretenden blauen Farbe erkennt. Da man durch einen vorläufigen Versuch das Volum Zuckerkalklösung ausgemittelt hat, welches 10 C. C. der obigen titrirten Säure sättigt, so erhält man das Volum der an Ammoniak gebundenen Säure (also das Gewicht des Stickstoffs), indem man das nach der Aufnahme des Ammoniaks dem Zuckerkalk entsprechende Volum Säure von dem genommenen (10 C. C.) der reinen Säure abzieht. — Nach einer späteren Mittheilung ersetzt Pélilot (1) die Glasröhren, worin die Verbrennung mit Natronkalk geschieht, durch Röhren von Eisenblech, die etwa 2 Centimeter im Durchmesser haben und 80 Centimeter lang sind. Um das Durchsaugen von Luft nach der Verbrennung zu vermeiden, legt er an das hintere, durch einen eisernen Pfropf verschlossene Ende der Röhre etwa 1 Grm. Oxalsäure, die bei ihrem Erhitzen in Gegenwart von Natronkalk Wasserstoff entwickelt und so das in der Röhre enthaltene Ammoniak vor sich her treibt. Pélilot bestätigt ferner die Angabe von Varrentrapp und Will, dafs, mit Ausnahme salpeters. Verbindungen, alle stickstoffhaltigen Materien (einfache und Doppelcyanüre mit inbegriffen) nach dieser Methode mit einer Genauigkeit analysirt werden können, die nichts zu wünschen übrig läfst. Der Versuch ist, bei Anwendung seiner Modification, in einer halben Stunde beendet.

Bineau (2) hat schon früher (1846) in ähnlicher Weise das Verfahren modificirt, und sein Prioritätsrecht geltend ge-

(1) Compt. rend. XXIV, 1155. — (2) Aus den Ann. de la soc. d'agricult. de Lyon, T. IX, in J. pharm. [3] XI, 462.

Stickstoff. macht (1). Er hält die Anwendung von titrirter Salzsäure, statt der Schwefelsäure, und von ätzender Natronlauge, statt der Zuckerkalklösung, für zweckmäßiger. Auch Mitchel (2) substituirt der Zuckerkalklösung eine Natronlauge von 1,018 spec. Gew., und der Lackmustinctur einen Absud von Campecheholz, von welchem wenige Tropfen der sauren Flüssigkeit eine gelblichbraune Farbe ertheilen, welche bei dem geringsten Ueberschuß von Alkali sogleich in schwarzblau übergeht.

C. Nöllner (3) fängt das Ammoniak unmittelbar in einer Auflösung von reiner Weinsäure in absolutem Alkohol auf, und berechnet aus dem Gewicht des entstehenden krystallinischen Niederschlags von saurem weins. Ammoniak (welches 10,2 pC. NH_3 oder 8,4 pC. N enthält) nach dem Trocknen bei 100° den Stickstoffgehalt. Die Anwendbarkeit dieser Modification in der Gewichtsbestimmung ist noch durch directe Versuche mit Substanzen von bekannter Zusammensetzung zu erweisen.

E. Schmidt (4) leitet das Ammoniak gleichzeitig mit einem Kohlensäurestrom in eine Auflösung von 1 Th. Chlorbaryum in 8 Th. Wasser, erhitzt zum Sieden, filtrirt, und berechnet aus dem Gewicht des geglühten kohlens. Baryts die Menge des Stickstoffs.

Änderungen in der Form des bei diesen Bestimmungen zur Absorption des Ammoniaks gebräuchlichen Kugelapparats haben vorgeschlagen Kemp (5), Warren de la Rue (6), Th. Taylor (7) und Horsford (8).

Delbrück (9) hat eine von Marchand vorgeschlagene Methode der relativen Stickstoff- und Kohlenstoffbe-

(1) Comp. rend. XXIV, 686; XXV, 254. — (2) Chem. Soc. Qu. J. I, 19; Pharm. Centr. 1848, 685. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 314; Pharm. Centr. 1849, 29. — (4) Aus dem polyt. Centralbl. in Arch. Pharm. [2] L, 317. — (5) Chem. Gaz. 1847, 144. — (6) Phil. Mag. [3] XXXI, 156; Chem. Soc. Mem. III, 347. — (7) Phil. Mag. [3] XXXI, 396; Chem. Soc. Mem. III, 318. — (8) Sill. Am. J. [2] IV, 266. — (9) J. pr. Chem. XLI, 177.

stimmung beschrieben, bei welcher — wie es auch von Bunsen geschieht — die Luft aus der Verbrennungsröhre durch Wasserstoff ausgetrieben wird. Delbrück zieht eine Verbrennungsröhre an der einen Seite zu einer dünnen Röhre aus, bringt zuerst einen Asbestpfropf hinein, dann die mit Kupferoxyd gemischte Substanz (von der 20 Milligr. ausreichen), vor diese wieder Asbest, dann eine lange Lage reines Kupferoxyd und zuletzt eine solche von reducirtem Kupfer. Das vordere Ende der Röhre wird nun ebenfalls und so, daß es einen rechten Winkel bildet, bis zur Länge einer Barometerröhre ausgezogen, und nun der Apparat mit Wasserstoff gefüllt. Wenn alle Luft verdrängt ist, schmilzt man zuerst das Gasentbindungsrohr, alsdann das Ende zu, durch welches der Wasserstoff eintritt, legt das Rohr in den Verbrennungsofen, bricht die vordere Spitze unter Quecksilber ab, und erhitzt nun den vorderen Röhrentheil mit der Vorsicht, daß jede Erwärmung der Mischung vermieden wird. Wenn aller Wasserstoff absorbiert ist, was man daran erkennt, daß das Steigen des Quecksilbers aufhört, erhitzt man die Mischung und fängt das sich nun entwickelnde Gas in einer graduirten Röhre auf. Man mißt das Gasvolum, läßt die Kohlensäure durch eine Kalkkugel absorbiren, und bestimmt das Volum des rückständigen Stickgases. Die von Delbrück in dieser Art mit Caffeïn, Harnsäure und Indigblau ausgeführten Stickstoffbestimmungen genügen allen Anforderungen der Genauigkeit.

Stickstoff.

W. Crum (1) beschreibt eine Methode der Analyse salpeters. Verbindungen, die im Wesentlichen darin besteht, daß man die über Quecksilber in einer graduirten Röhre befindliche Substanz mittelst eines großen Ueberschusses concentrirter Schwefelsäure zerlegt, und das durch Einwirkung der frei gewordenen Salpetersäure auf das Quecksilber entwickelte Stickoxydgas mißt. Wenn sich nach

Salpetersäure.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXII, 283; J. pr. Chem. XLI, 201; Phil. Mag. [3] XXX, 426; Pharm. Centr. 1847, 684; Repert. Pharm. [2] XLVII, 81.

Salpetersäure.

mehreren Stunden, bei öfterem Schütteln der Röhre, keine Volumzunahme mehr zu erkennen giebt, bringt man eine concentrirte Lösung von Eisenvitriol in dieselbe und zieht das nicht absorbirte Gasvolum (Stickstoff mithineingebrachter Luft) von dem ganzen ab. W. Crum bestimmte mittelst dieser Methode den Salpetersäuregehalt der Schießbaumwolle, nachdem er sich überzeugt hatte, daß sie für reinen Salpeter genaue Resultate gab.

Gossart (1) hat zur Ausmittlung der Reinheit des zur Schießpulverfabrikation bestimmten Salpeters das Gay-Lussac'sche Princip der Chlorometrie in Anwendung gebracht. Eine Auflösung des rohen Salpeters von bekanntem Gehalt wird zuerst mit Schwefelsäure und dann mit einer (mittelst reinen Salpeters) titrirten sauren Auflösung von schwefels. Eisenoxydul vermischt, bis nach dem Erhitzen eine Probe mit Ferridcyankalium kein Eisenoxydul mehr anzeigt. — Pelouze (2) hat dieses Verfahren in folgender Weise modificirt. Durch Versuche stellte er fest, daß 2 Grm. reines Eisen (Clavierdraht), in 80 bis 100 Grm. Salzsäure gelöst, 1,212 bis 1,220 Grm. (im Mittel also 1,216 Grm.) reinen Salpeter erfordern, um vollständig in Eisenoxydsalz übergeführt zu werden, wobei sich nur Stickoxydgas entwickelt. Die Gleichung $6 \text{ Fe Cl} + \text{KO, NO}_2 + 4 \text{ HCl} = 4 \text{ HO} + \text{KCl} + \text{NO}_2 + 3 \text{ Fe}_2 \text{ Cl}_3$ drückt den Vorgang genau aus. 168 (6 Aeq.) Eisen verlangen darnach 102 (1 Aequiv.) Salpeter. Chlorverbindungen oder schwefels. Salze sind ohne Einfluß auf das Resultat, nur wird von einem damit verunreinigten Salpeter eine verhältnismäßig geringere Menge von Eisen in Oxyd verwandelt; Pelouze bestimmt nun die Menge von Eisen, die nach der Behandlung mit einer gewogenen Menge des zu prüfenden Salpeters noch als Oxydul zugegen ist, und berechnet daraus die vorhandene Salpetersäure oder den

(1) Compt. rend. XXIV, 21; Pharm. Centr. 1847, 371. — (2) Ann. ch. phys. [3] XX, 129; Compt. rend. XXIV, 209; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 399; J. pr. Chem. XL, 324; Pharm. Centr. 1847, 372.

Salpeter. Die Methode ist folgende. In einem etwa 150 C. C. fassenden und mit einem Kork, durch den eine ausgezogene Röhre geht, verschlossenen Kolben erwärmt man 2 Grm. Clavierdraht mit 80 bis 100 Grm. concentrirter Salzsäure bis zur Auflösung, bringt dann 1,200 Grm. des zu prüfenden Salpeters hinzu und erhitzt, nach wieder aufgesetztem Kork, zum Sieden. Nach 5 bis 6 Minuten gießt man die wieder durchsichtig gewordene Flüssigkeit nebst dem Auswaschwasser in einen Kolben, und verdünnt mit Wasser bis zum Vol. von einem Liter. Das darin noch vorhandene Eisenoxydul wird nun nach dem von Marguerite (1) beschriebenen Verfahren mittelst einer titrirten Auflösung von übermangans. Kali bestimmt, die man zusetzt, bis die Lösung eine schwach rosenrothe Färbung angenommen hat. Sind z. B. von der Auflösung des übermangans. Kalis 50 C. C. zur Oxydation von 1,000 Grm. Eisen erforderlich und bedurfte man in dem vorstehenden Versuch noch 10 C. C. davon, so waren noch $\frac{1000 \cdot 10}{50} = 0,200$ Eisen als Oxydul zugegen, die demnach von den angewendeten 2 Grm. Eisen abgezogen werden müssen. 1,200 Salpeter haben hiernach 1,800 Eisen in Oxyd verwandelt; 1,000 Eisen verlangen aber 0,608 reinen Salpeter, es waren mithin nur $1,8 \times 0,608 = 1,094$ Grm. oder, da 1,200 Grm. roher Salpeter genommen wurden, 91,2 pC. reiner Salpeter vorhanden. Pelouze giebt an, daß man mittelst dieser Methode den Salpetersäuregehalt bis auf 0,002 bis 0,003 genau ausmitteln könne.

Zur Nachweisung kleiner Mengen von Ammoniak bringt Wackenroder (2) die zu prüfende, mit ätzendem Alkali versetzte Flüssigkeit in ein Uhrglas, bedeckt dasselbe mit weißem Fließpapier, das man mit etwas Kupfer- oder Manganvitriollösung befeuchtet hat, und dann mit einer Glasplatte. Das frei werdende Ammoniak erzeugt in dem einen Fall einen lasurblauen, in dem andern einen braunen

(1) Ann. ch. phys. [3] XVIII, 244; Ann. Ch. Pharm. LX, 369; Berzelius' Jahresber. XXVII, 215. — (2) Arch. Pharm. [2] XLVIII, 80; Pharm. Centr. 1847, 143.

Fleck. J. Müller (1) verwendet zu demselben Zweck, und auch zu sympathetischer Tinte, eine concentrirte Lösung von salpeters. Quecksilberoxydul, wo das Papier sogleich schwarz wird.

Kali und Natron.
Erkennung
mittels des
Löthrohrs.

E. J. Chapman (2) giebt an, daß Kali oder Natron bei Gegenwart von Magnesia in folgender Weise zu erkennen sei. Man schmilzt an dem Oehr des Platindrahts eine Perle von reiner Borsäure an, setzt nach und nach die mit etwas Kupferoxyd gemengte Salzmasse hinzu und behandelt in der Oxydationsflamme. Ist Magnesia allein zugegen, so bleibt die größte Portion ungelöst und die Perle farblos; Kali oder Natron lösen sich dagegen mit dem Kupferoxyd sogleich zu einer in der Hitze grünen, nach dem Erkalten blauen Perle auf. Ist das Alkalisalz im Ueberschuß, so löst sich die Magnesia ebenfalls; im umgekehrten Fall bleibt sie ungelöst, aber die Färbung vom Kupferoxyd tritt doch ein. Baryt und Strontian verhalten sich wie die Alkalien gegen Borsäure und Kupferoxyd.

Erkennung
und Bestimmung
der Soda
in der Potasche.

In der Potasche läßt sich, nach Fremy (3), mittelst des meta-antimons. Kalis (seine Bereitung siehe S. 430) noch $\frac{1}{4}$ pC. Soda nachweisen. Man löst etwa 1 Grm. der Potasche in Wasser auf, übersättigt mit Salzsäure, verdampft zur Trockne, und versetzt die völlig neutrale Auflösung des gebildeten Chlorkaliums in wenig Wasser mit meta-antimons. Kali. Bei einem Gehalt von 2 bis 3 pC. Natron entsteht fast augenblicklich, bei einer geringeren Menge erst nach einiger Zeit ein Niederschlag, dessen Bildung durch Schütteln beschleunigt wird.

Pagenstecher (4) hat zur Bestimmung des Sodagehalts der Potasche ein Verfahren angegeben, das auf der Fähigkeit einer gesättigten Lösung von schwefels. Kali,

(1) Arch. Pharm. [2] XLIX, 28; Repert. Pharm. [2] XLV, 64. —

(2) Chem. Gaz. 1847, 372. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 410. —

(4) J. pr. Chem. XLII, 137.

schwefels. Natron aufzulösen, beruht. Er verwandelt eine gewogene Menge der Potasche durch Behandeln mit überschüssiger Schwefelsäure und Glühen in neutrales schwefels. Salz, das wieder gewogen und zweimal mit der sechsfachen Menge einer gesättigten Lösung von schwefels. Kali geschüttelt wird. Der Rückstand wird nach dem Abtropfen zuerst feucht, dann bei 100° getrocknet gewogen. Die Differenz ist das verdunstete Wasser der Lösung des schwefels. Kalis, deren Concentration bekannt war; zieht man die ihr entsprechende Salzmenge von dem Gewicht des Salzurückstandes ab, so erhält man, wenn die Potasche frei von Soda war, die ursprüngliche Menge des schwefels. Kalis, im andern Fall wird aus dem Gewichtsverlust, welcher schwefels. Natron ist, die Menge der vorhandenen Soda berechnet.

Zur Trennung der Magnesia von den Alkalien verdampft man, nach Sonnenschein (1), die in Chloride verwandelten Verbindungen zur Trockne, glüht schwach, löst in Wasser auf und kocht mit aufgeschlammtem kohlen. Silberoxyd (durch Fällung mit kohlen. Ammoniak und Auswaschen erhalten), bis die überstehende Flüssigkeit stark alkalisch reagirt. Aus dem heißen Filtrat entfernt man eine Spur Silbersalz mit Salzsäure, und bestimmt darin die Alkalien wie gewöhnlich. Aus dem Rückstand auf dem Filter wird die Magnesia mit Salzsäure ausgezogen, und mit phosphors. Natron und Ammoniak ausgefällt.

Magnesia.
Trennung von
Alkalien.

Heintz (2) setzt zu der Lösung, welche Magnesia, Kali und Natron enthält, überschüssiges Ammoniak und, wenn nicht schon Chlorverbindungen vorhanden sind, etwas Salmiak, und fällt die Magnesia mit phosphors. Ammoniak. Aus dem durch Verdampfen von freiem Ammoniak befreiten Filtrat schlägt er die Phosphorsäure mit überschüssigem salpeters. oder essigs. Bleioxyd nieder, entfernt dann letzteres mit

(1) Pogg. Ann. LXXIV, 318; Pharm. Centr. 1848, 511. — (2) Pogg. Ann. LXXIII, 119; Pharm. Centr. 1848, 127.

Ammoniak und kohlens. Ammoniak aus der noch heißen Flüssigkeit, und bestimmt im Filtrat Kali und Natron nach bekannten Methoden. Das phosphors. Ammoniak darf hierzu nicht mit der stets natronhaltigen Säure aus Knochen bereitet werden. Die Gegenwart von Chlorverbindungen bedingt die Bildung von dreibasischem phosphors. Bleioxyd mit Chlorblei, welche Verbindung an Ammoniak keine Säure abgibt. — Auch Erdmann (1) hat diese bequeme Trennungsmethode bei der Analyse von Pflanzenaschen in Anwendung gebracht.

Unterscheidung von Lithion u. Strontian v. d. Löthrohre.

Nach Plattner's Angabe (2) verhindert Chlorbaryum die rothe Färbung der äusseren Löthrohrflamme, welche mit Chlorstrontium allein eintritt. E. J. Chapman (3) benutzt dieses Verhalten zur Unterscheidung des Lithions vom Strontian, soferne ersteres die Flamme auch bei Gegenwart von Chlorbaryum röthet. — Nach Reinsch (4) tritt die rothe Färbung durch Strontian sehr schön ein, wenn man das strontianhaltige Mineral mit etwas Salzsäure befeuchtet und damit den unteren blauen Rand der Flamme berührt; ein Zusatz von Chlorbaryum hebt dieselbe in diesem Falle nie ganz auf, sondern vermindert nur ihre Intensität.

Schwefels. Kalk.

Im Kochsalz vorhandenen Gyps bestimmt Lassaigue (5) durch Behandeln desselben mit einer bei 20° gesättigten Gypslösung und Wägung des mit der nämlichen Flüssigkeit gewaschenen Rückstandes.

Kohlens. Kalk.

Bineau (6) hat ein Verfahren angegeben, um in Kalksteinen, Mergeln, Dammerde und im Wasser den Gehalt an kohlens. Kalk rasch zu bestimmen. Man erhitzt die fein zerriebene Substanz in einer tubulirten Retorte mit einem Ueberschuss von titrirter verdünnter Salzsäure, deren Gewicht man vorher bestimmt hat. Wenn sich einige

(1) J. pr. Chem. XLI, 89. — (2) Plattner's Probirkunst (1835) 102. — (3) Chem. Gaz. 1848, 188; Pharm. Centr. 1848, 479. — (4) Jahrb. pr. Pharm. XVII, 214. — (5) J. chim. méd. [3] III, 425; Pharm. Centr. 1847, 671. — (6) Aus den Mém. de la soc. royale d'agric. etc. de Lyon, Avril 1847, in J. pharm. [3] XII, 301.

Tropfen im Retortenhalse condensiren, legt man eine Vor- Kohlens. Kalk. lage vor und kocht, bis keine Einwirkung mehr stattfindet. Der Inhalt der Vorlage wird nun mit dem der Retorte vereinigt, mit neutraler Lackmustinctur gefärbt, und mittelst einer graduirten Burette eine titrirte Auflösung von ätzendem Alkali zugesetzt, bis die Farbe in Blau übergeht. Enthält der Kalkstein Magnesia, so bestimmt man ihre Menge, indem man nun Zuckerwasser und dann von Neuem ätzendes Alkali zusetzt, so lange ein Niederschlag erscheint, der nur aus Magnesia besteht, da die Fällung des Kalks durch den Zucker verhindert wird. Hat man zuviel Alkali zugesetzt, so filtrirt man die Magnesia ab, und bestimmt den Ueberschuß durch Zutropfen von titrirter Säure. Immer muß man, wenn die Magnesia bestimmt ist, zur Berechnung des vorhandenen Kalks von der anfänglich genommenen Säurequantität nicht nur diejenige abziehen, welche überschüssig war, sondern auch die dem Alkali entsprechende, das zur Fällung der Magnesia diente. Vorhandene Thonerde oder Eisenoxyd sind ohne Einfluß auf das Resultat; Mangan- oder Eisenoxydul schadet der Bestimmung der Magnesia, aber nicht der des Kalks. Ist der kohlens. Kalk in Wasser gelöst, so setzt man unmittelbar die titrirte Säure zu, und verjagt die Kohlensäure durch Erwärmen. Sind kohlens. Alkalien oder andere alkalisch reagirende Salze zugegen, so fällt man den kohlens. Kalk durch Sieden aus und verfährt mit dem Niederschlag wie angegeben. Bineau nimmt dabei an, daß in jedem Deciliter Wasser 4 Milligr. kohlens. Kalk gelöst bleiben.

A. Dupasquier (1) hat zur Erkennung von zweifach- Kohlens. Kalk im Wasser. kohlens. Kalk im Wasser eine alkoholische Tinctur des Campecheholzes vorgeschlagen, die dadurch violett gefärbt wird. Um sicher zu sein, daß diese Färbung nicht von anwesenden kohlens. Alkalien veranlaßt ist, vermischt er

(1) Compt. rend. XXIV, 628; J. pharm. [8] XI, 340; J. pr. Chem. XLI, 94; Pharm. Centr. 1847, 458.

Kohlens. Kalk im Wasser. einen Theil des Wassers mit schwefels. Kupferoxyd, einen andern mit Chlorcalcium. Ist nur zweifach-kohlens. Kalk zugegen, so bringt letzteres keine Trübung hervor, ersteres fällt dagegen kohlens. Kupferoxyd, aus dessen Menge Dupasquier auf die des zweifach-kohlens. Kalks schließt. Ist das Wasser sehr arm an kohlens. Alkali und reich an freier Kohlensäure, so tritt die Fällung durch Chlorcalcium erst dann ein, wenn das Wasser durch vorsichtiges, nicht zum Sieden gehendes Erhitzen vom Kohlensäureüberschuß befreit wurde. Der vorhandene zweifach-kohlens. Kalk schlägt sich nur bei längerem Sieden nieder und setzt sich an den Gefäßwänden ab, während der durch das kohlens. Alkali hervorgebrachte kohlens. Kalk die Flüssigkeit durch die ganze Masse trübt.

Molybdän. Nach H. Rose (1) bestimmt man das Molybdän am besten in der Form von Oxyd (MoO_3), in welches sich die Säure, ihr Ammoniaksalz, oder das aus neutralen Lösungen gefällte molybdäns. Quecksilberoxydul beim Erhitzen über der Spirituslampe in einer Atmosphäre von Wasserstoff verwandelt. Das letztere Salz wird mit sehr verdünnter Lösung von salpeters. Quecksilberoxydul ausgewaschen, auf einem bei 100° getrockneten Filter gewogen, und dann ein Theil mit Wasserstoff reducirt. Weniger genau fällt die Bestimmung aus, wenn man molybdäns. Alkali wiederholt mit Salmiak glüht, und das nach dem Waschen mit Wasser zurückbleibende Oxyd auf einem bei 100° getrockneten Filter wiegt.

Chrom. H. Vohl (2) benutzt das den Superoxyden analoge Verhalten der Chromsäure zu Oxalsäure zur quantitativen Bestimmung des Chroms. Der Versuch wird, wenn das Chrom als Säure zugegen ist, genau so ausgeführt und in demselben Apparat, wie die Bestimmung des Braunsteins

(1) Pogg. Ann. LXXV, 319; J. pr. Chem. XLV, 239; Pharm. Centr. 1848, 760; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 374; Berl. Acad. Ber. 1848, Juli; Instit. 1849, 13. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 398; J. pr. Chem. XLIII, 398.

nach der Methode von Will und Fresenius. 2 Aeq. Chrom. (100,62 Th.) Chromsäure liefern mit 3 Aeq. Oxalsäure 6 Aeq. (132 Th.) Kohlensäure ($2 \text{CrO}_3 + 3 \text{C}_2\text{O}_3 = \text{Cr}_2\text{O}_3 + 6 \text{CO}_2$). — Bei der Analyse eines chlorchroms. Salzes fügt man, um das Chlor zurückzuhalten, vorher Quecksilberoxyd zu; ist das Chrom als Oxyd vorhanden, so schlägt Vohl vor, dasselbe in wässriger Lösung mit Kali im Ueberschufs, bis zur Wiederauflösung des Oxyds, zu versetzen, und dann in die kaltgehaltene Flüssigkeit Chlor zu leiten, bis die Farbe derselben gelbroth geworden ist. Sie wird nun mit freiem Kali versetzt, zur Trockne verdampft, geglüht, und das entstandene chroms. Salz und Chorkalium unter Zufügung von Quecksilberoxyd wie oben behandelt.

De Vry (1) macht darauf aufmerksam, dafs der wechselnde, bisweilen 15 pC. betragende Wassergehalt des Braunsteinprobe. Braunsteins bei der Bestimmung seines Werths eine Verschiedenheit im Resultat bedingt, die es wünschenswerth macht, diesen Wassergehalt stets zu ermitteln und den getrockneten Braunstein zu untersuchen.

R. D. Thomson (2) empfiehlt zur Prüfung von Mine- Arsen, Molybdän u. s. w. in Mineralien. ralien auf Arsen-, Molybdän-, Vanadinsäure u. s. w., dieselben im fein gepulverten Zustande mit Schwefelammonium zu digeriren und das Filtrat zu verdampfen, wo das gelöst gewesene Schwefelmetall zurückbleibt.

Kobell (3) schlägt zur quantitativen Bestimmung des Arsen. Bestimmung. Arsens vor, die Menge des Kupfers zu ermitteln, welche sich auflöst, wenn man nach dem Verfahren von Reinsch (4) die mit freier Salzsäure vermischte arsenhaltige Flüssigkeit bei Luftabschlufs mit metallischem Kupfer kocht. Das Arsen mufs als Arsensäure zugegen und die Auflösung

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 249; Pharm. Centr. 1847, 479. — (2) Phil. Mag. [3] XXXI, 258; J. pr. Chem. XLII, 484. — (3) Aus den gelehrt. Anz. d. baier. Acad. in J. pr. Chem. XLI, 156; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 410; Pharm. Centr. 1847, 678. — (4) J. pr. Chem. XXIV, 244; Berzelius' Jahresber. XXII, 174.

Arsen.
Bestimmung.

frei von Salpetersäure oder jedem anderen das Kupfer oxydirenden Körper sein. In der von dem ungelösten Metall abgegossenen Lösung von Kupferchlorür bestimmt man, nach der Oxydation mit chlors. Kali, das Kupfer entweder nach der Methode von Fuchs, durch Kochen mit gewogenen Kupferstreifen, oder indem man, nach Levol, den Gewichtsverlust ermittelt, den dieselben in der mit Ammoniak übersättigten Kupferchloridlösung erleiden.

Werther (1) hält das nach seinen Versuchen in Wasser, Essigsäure und Salmiak unlösliche arsens. Uranoxyd, $2\text{U}_2\text{O}_3, \text{HO}, \text{AsO}_3$, für eine in manchen Fällen geeignete Bestimmungsform des Arsens. Die leichte Reducirbarkeit des Niederschlags, unter Verlust von Arsen, die grofse Neigung des Uranoxyds zur Bildung von Doppelverbindungen werden der Anwendung dieser Bestimmungsform, gegenüber der als arsens. Magnesia, stets beschränkend im Wege stehen.

Nachweisung
in gerichtl.
Fällen.

G. Reich (2) hat die von ihm zur Nachweisung des Arsens in einem gerichtlichen Falle befolgte Methode und die dabei in Anwendung gebrachten Apparate beschrieben. Wir verweisen die Leser auf die Abhandlung, da die Methode bekannt ist und die von Reich an dem Marsh'schen Apparate angebrachten Aenderungen ohne Zeichnung nicht verständlich beschrieben werden können.

Gerichtl.
chem. Ana-
lyse.

Abreu (3), ein brasilianischer Arzt, hat der Academie der Wissenschaften zu Paris die Beschreibung seiner Methode der Ausmittelung giftiger Metalle (Arsen, Antimon, Quecksilber, Kupfer, Blei, Zinn, Zink und Silber) in festen oder flüssigen organischen Materien vorgelegt. Auch dieses Verfahren bietet nichts Neues dar. Er zerstört die organischen Materien — nachdem sie vorher mittelst der Loupe auf Metallgifte in Substanz untersucht sind — in der Siedhitze durch rauchende Salzsäure und allmäligen Zusatz

(1) J. pr. Chem. XLIII, 346. — (2) Arch. Pharm. [2] LV, 1. — (3) Compt. rend. XXVII, 218; Pharm. Centr. 1848, 792.

von chlors. Kali in einem Kolben mit der Vorsicht, daß die entweichenden Gase durch Wasser streichen müssen, und fällt das vom Chlortüberschufs befreite und mit dem Waschwasser vereinigte Filtrat mit Schwefelwasserstoff. Die gefällten Schwefelmetalle (das Zink bleibt natürlich in Lösung und das Silber als Chlormetall im Rückstand) werden wieder mit Salzsäure und chlors. Kali in Lösung gebracht, und diese nun nach den bekannten genauen Methoden auf die einzelnen Metalle geprüft.

Lassaigne (1) empfiehlt zur Ausziehung des Arsens aus festen thierischen Stoffen die successive Behandlung dieser Materien zuerst mit concentrirter Schwefelsäure und dann mit Salpetersäure. Nach dem Verjagen der letzteren durch Kochen verdünnt er mit dem 5- bis 6fachen Vol. Wasser, filtrirt, und bringt die Flüssigkeit in den Marsh'schen Apparat. Sie erzeugt darin keinen Schaum, auch wenn sie noch gefärbt ist. — Filhol (2) zieht es vor, die organische Materie mit Salpetersäure, welcher man auf 100 Grm. 12 bis 15 Tropfen concentrirte Schwefelsäure zusetzt, zu zerstören, da in diesem Fall die Operation nicht in verschlossenen Gefäßen vorgenommen werden müsse, sofern weder eine Verflüchtigung von Chlorarsen noch, wie sie Boisgiraud beobachtet haben will, von Schwefelarsen zu befürchten sei.

Um nachzuweisen, ob die auf einer Porcellanplatte nach der Methode von Marsh erzeugten Flecke von Arsen herrühren, deckt Filhol die Platte über eine Schale, in der sich eine mit verdünnter Schwefelsäure vermischte Bleichkalklösung befindet; sowie die Flecken (nach 1 oder 2 Minuten) verschwunden sind, tröpfelt er eine concentrirte Lösung von neutralem salpeters. Silberoxyd darauf, wo sogleich eine ziegelrothe Färbung oder auch Fällung von arsens. Silberoxyd entsteht.

Arsen.

Unterscheidung von Arsen- und Antimonflecken.

(1) J. chim. méd. [3] IV, 667. — (2) J. pharm. [3] XIV, 404; J. chim. méd. [3] IV, 548.

Unterscheidung von Arsen- und Antimonflecken.

Bei Erwähnung der Methode von Cottereau (1), Arsen von Antimonflecken mittelst Phosphor zu unterscheiden, der in atmosphärischer Luft verdampft, stellte Berzelius (2) die Frage auf, ob dabei das Arsen nicht von gebildetem Ozon früher als das Antimon höher oxydirt würde. Schönbein (3) hat nun nachgewiesen, daß das Arsen dabei allerdings in Arsensäure übergeführt wird, und zwar nur unter den Verhältnissen, wo er die Bildung von Ozon beobachtet hat. Verdampft der Phosphor in völlig trockner Luft oder in feuchter, mit Aetherdampf oder ölbildendem Gas beladener, so verschwinden die Arsenflecke nicht; sie werden dagegen, und zwar ebenfalls rascher als Antimonspiegel von gleicher Dicke, oxydirt, wenn man sie nahe vor eine stumpfe Metallspitze hält, aus welcher man lebhaft Electricität ausströmen läßt. Auch durch Wasserstoffsuperoxyd werden Arsen und arsenige Säure in Arsensäure verwandelt.

Als Gaisney (4) eine Flüssigkeit auf Arsen prüfen wollte, welche zum Einbalsamiren einer Leiche bestimmt war, bemerkte er, daß die Wasserstoffentwicklung aufhörte, als die zu untersuchende Flüssigkeit in den Apparat von Marsh gebracht wurde. Sie enthielt ein Quecksilbersalz gelöst, welches das Zink in der Art amalgamirte, daß die Säure nicht mehr darauf einwirken konnte.

Trennung des Arsens von Zinn.

Nach Gay-Lussac's Versuchen (5) löst sich käufliches Zinn in einem Gemenge von 1 Aequiv. Salpetersäure und 9 Aequiv. Salzsäure in gelinder Wärme ohne Gasentwicklung zu Zinnchlorür auf, während der stetige Begleiter des Zinns, das Arsen, als leicht zu sammelndes Pulver zurückbleibt. Das Zinn wird hierzu laminirt oder durch Eingießen in Wasser im geschmolzenen Zustande

(1) J. chim. méd. [3] II, 330. — (2) Berz. Jahresber. XXVII, 223; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 420. — (3) Pogg. Ann. LXXV, 361. — (4) J. chim. méd. [3] III, 638; Pharm. Centr. 1848, 80. — (5) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 228 (vergl. S. 387).

gekörnt. Auch darf, wie aus dem Schema $\text{NO}_3 + 9\text{HCl} + 8\text{Sn} = 8\text{SnCl} + \text{NH}_3, \text{HCl} + 5\text{HO}$ ersichtlich, das Königswasser in nicht viel größerem Verhältniß angewendet werden, als auf 8 Aeq. Metall 1 Aeq. Salpetersäure und 9 Aeq. Salzsäure.

H. Rose (1) hat eine Methode zur Trennung des Trennung von Zinn und Antimon. Zinns und Antimons angegeben, die auf der Unlöslichkeit des antimons. und der Löslichkeit des zinns. Natrons beruht. — Man oxydirt die Metalle mit starker Salpetersäure, schmilzt die trocknen Oxyde mit überschüssigem Natronhydrat im Silbertiegel zusammen, und behandelt mit warmem Wasser. Die *klare* und *erhaltete* Lösung des zinns. Natrons wird abfiltrirt, und das antimons. Natron durch nicht zu lange fortgesetztes Decantiren ausgewaschen, wobei man Sorge trägt, das Waschwasser nur nach dem völligen Erkalten und wenn es ganz klar ist durch das Filtrum zu gießen. Auf Zusatz von etwas kohlen. Natron wird es leicht klar. Das antimons. Natron wird noch feucht in einem Gemisch von Salzsäure und Weinsäure gelöst, mit Schwefelwasserstoff gefällt, und das Schwefelantimon in einem Porzellantiegel, dessen Deckel mit einem dünnen Porzellanrohr versehen ist, in gelinder Hitze mittelst Wasserstoff reducirt. Aus der mit Salzsäure angesäuerten Lösung des zinns. Natrons fällt man das Zinn als Schwefelmetall, und verwandelt dieses durch Rösten in Oxyd, welches man wägt. — Die Methode liefert das Antimon etwas zu hoch, da ein wenig Zinnoxid beim antimons. Natron bleibt.

Der Rose'schen Trennungsmethode des Zinns von Trennung von Arsen und Antimon. Antimon schließt sich die des Arsens von demselben Metall an, welche C. Meyer (2) beschrieben hat. Er verpufft das arsenhaltige Antimon mit dem dreifachen Gewicht eines Gemenges von salpeters. und kohlen. Natron, laugt mit

(1) Pogg. Ann. LXXI, 301; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 404; J. pr. Chem. XLI, 221; Pharm. Centr. 1847, 492; Berl. Acad. Ber. 1847, Mai, 151. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 286.

Trennung von
Arsen und
Antimon.

kaltem Wasser aus, glüht, und bestimmt das Gewicht des zurückbleibenden antimons. Natrons' (NaO , SbO_3). In dem ganz antimonfreien Filtrat bestimmt man das Arsen nach einer der bekannten Methoden, wohl am zweckmäßigsten als arsens. Magnesia durch Ausfällung mittelst schwefels. Magnesia, Salmiak und Ammoniak. Hat man beide Metalle als Schwefelverbindungen, so löst man sie, nach Meyer, sammt dem Filtrum in heißer Salpetersäure, sättigt mit kohlens. Natron, fügt noch etwas salpeters. Natron zu, verdampft im Porzellantiegel, und schmilzt bis zur völligen Oxydation. Nach dem Auslaugen mit Wasser bleibt NaO , SbO_3 . — Vermischt man eine Lösung von antimons. Kali mit schwefels. Natron, so fällt alles Antimon als wasserhaltiges, in kaltem Wasser unlösliches, in heißem etwas lösliches antimons. Natron, NaO , SbO_3 , 6HO nieder. Auch zur Darstellung von arsenfreiem Antimon empfiehlt Meyer, nach dem Vorgange Wöhler's, dieses Verhalten (siehe Seite 425).

Unterscheidung von Wismuth und Blei.

Um kleine Mengen von Blei in Wismuth oder in einer Wismuthverbindung zu entdecken, bringt Chapman (1) das vor dem Löthrohr reducirte, etwas ausgeplattete Metallkorn in Berührung mit etwas feuchtem basisch-salpeters. Wismuthoxyd, wo in kurzer Zeit, in Folge der Reduction des Wismuthoxyds durch das Blei, baumförmige Auswüchse von metallischem Wismuth um die Probe herum sich bilden. Da Zink und Eisen dieselbe Wirkung hervorrufen, so müssen diese vorher, ersteres durch Schmelzen mit Soda, letzteres mit Soda und Borax im Reductionsfeuer entfernt werden.

Eisen.
Fällbarkeit
durch Schwefelammonium.

Blumenau (2) hat gefunden, daß ein bedeutender Ueberschuß von kohlens. Alkali die Fällung des Eisens durch Schwefelwasserstoff-Schwefelkalium oder Schwefelwasserstoff-Schwefelammonium aus seiner Lösung in weins.

(1) Chem. Gaz. 1848, 873; Phil. Mag. [3] XXXIII, 319; Pharm. Centr. 1848, 826. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 125.

Alkali verhindert. Bei vorsichtiger Neutralisation mit einer Säure wird alles Eisen als Schwefelmetall abgeschieden.

Um mittelst des Löthrohrs Eisenoxyd von Eisenoxydul zu unterscheiden, behandelt man, nach Chapman (1), die zu prüfende Substanz in einer durch Kupferoxyd blaufarben gefärbten Boraxperle auf dem Platindraht kurze Zeit im Reductionsfeuer. Vorhandenes Eisenoxyd erzeugt in diesem Falle rothe Streifen oder Flecke, sofern es das Kupferoxyd zu Oxydul reducirt. Da diese Reduction bei etwas zu langem Blasen auch eintritt, wenn das Eisen als Oxyd zugegen ist, so löst man in einer zweiten Boraxperle so viel Kupferoxyd auf, dafs sie nach dem Erkalten deutlich blau aber klar und durchsichtig bleibt, und behandelt mit dieser die fein gepulverte Probe nur so lange im Oxydationsfeuer, bis sie anfängt sich zu lösen. Ist nur Eisenoxyd vorhanden, so ist die erkaltete Perle blaugrün und klar, Eisenoxydul erzeugt undurchsichtige rothe Flecke. Aber auch hier macht zu langes Blasen die Probe unsicher.

Unterscheidung von Eisenoxyd und Eisenoxydul.

Zur Trennung des Eisenoxyds von der Thonerde wird die beide Oxyde enthaltende saure Lösung, nach Fresenius (2), zur Reduction des Eisenoxyds in der Siedhitze mit schwefl. Natron behandelt, mit kohlen. Natron vermischt, und nun mit überschüssiger Natronlauge gekocht, bis der Niederschlag schwarz und körnig geworden ist. Das alle Thonerde enthaltende Filtrat wird mit Salzsäure und etwas chlors. Kali gekocht und mit Ammoniak gefällt. Durch die Behandlung mit chlors. Kali wird die vom Kali aus dem Papier aufgenommene und die völlige Fällung der Thonerde verhindernde organische Substanz zerstört.

Trennung des Eisenoxyds von der Thonerde.

Für die quantitative Trennung des Nickels vom Kobalt sind von Liebig und von H. Rose Methoden beschrieben worden, welche beide in der Leichtigkeit der Ausführung und Sicherheit der Resultate nichts zu wünschen übrig lassen. — Liebig hatte früher eine Methode der Scheidung

Trennung von Nickel und Kobalt.

(1) Phil. Mag. [8] XXXII, 309; Chem. Gaz. 1848, 106; Pharm. Centr. 1848, 286. — (2) J. pr. Chem. XLV, 261.

Trennung von
Nickel und
Kobalt.

beider Körper mittelst Cyankalium und Salzsäure beschrieben, welche in ihrer Ausführung Schwierigkeiten hatte; er hat dieselbe jetzt (1) in folgender Weise verbessert. Er versetzt das zur quantitativen Scheidung bestimmte eisen- und manganfreie Gemenge beider Oxyde mit Blausäure und dann mit Kali, und erwärmt, bis alles gelöst ist (auch cyansäurefreies Cyankalium läßt sich anwenden). Die rothgelbe Auflösung wird zur Entfernung der freien Blausäure zum Sieden erhitzt; hierbei geht das Kobaltcyanürkalium (CoCy , KCy) unter Wasserstoffentwicklung in Kobaltcyanidkalium (Co_2Cy_6 , 3K) über; das Nickel ist in der Lösung als Nickelcyankalium (NiCy , KCy) enthalten. Man setzt nun der warmen Auflösung feingeriebenes und aufgeschlämmtes Quecksilberoxyd zu, wobei alles Nickel theils als Oxyd, theils als Cyanür gefällt wird, indem das Quecksilber an seine Stelle tritt. War die Flüssigkeit vor dem Zusatz des Quecksilberoxyds neutral, so wird sie nach dem Kochen mit diesem Oxyd alkalisch. Der anfangs grünliche, bei Quecksilberoxydüberschuß gelbgraue Niederschlag wird nach dem Auswaschen gegläht; er ist reines Nickeloxyd. Das Filtrat wird mit Essigsäure übersättigt, mit Kupfervitriol in der Siedhitze gefällt, und der Niederschlag einige Zeit mit der Flüssigkeit im Sieden erhalten, bis er seine schleimige Beschaffenheit verloren hat. Er ist Kobaltidcyankupfer, $\text{Co}_2\text{Cy}_6 + 3\text{Cu} + 7\text{HO}$. Die Menge des darin enthaltenen Kobalts läßt sich entweder direct, oder indirect, durch Abscheidung seines Kupfergehalts in der Form von Oxyd mit Kali und Wägung desselben, ermitteln. Will man das Kobalt direct bestimmen, so wird der Niederschlag nach dem Auswaschen und Trocknen gegläht, dann in Salzsäure unter Zusatz von etwas Salpetersäure gelöst, das Kupfer durch Schwefelwasserstoff gefällt, und das Kobaltoxydul aus der durch Erhitzen vom Schwefelwasserstoff befreiten Flüssigkeit mittelst Kalilauge in der Siedhitze niedergeschlagen und wie gewöhnlich mittelst Wasserstoff reducirt.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 244; Pharm. Centr. 1848, 205.

Die Methode ist, wie sich von selbst versteht, einfacher in der Ausführung, wenn man vorher das Gewicht beider Oxyde oder der durch Wasserstoff reducirten Metalle zusammengekommen ermittelt hat und nur das Nickel bestimmt. — Liebig giebt noch einige Andeutungen für einen anderen Weg zur Trennung beider Metalle, welcher näher geprüft zu werden verdient. Versetzt man nämlich das Gemenge von Nickel- und Kobaltoxydul mit Blausäure und dann mit Ammoniak, so erhält man Kobaltidcyanammonium und Nickelcyanammonium. Bringt man zu dieser Lösung Schwefelammonium und Schwefel, so entsteht eine dunkelschwarze Flüssigkeit, die beim Kochen, unter Abscheidung von kobaltfreiem Schwefelnickel, klar wird. Die Lösung enthält, neben Kobaltidcyanammonium, Schwefelcyanammonium.

Trennung von
Nickel und
Kobalt.

Eine mit freier Salzsäure vermischte Auflösung von Chlorkobalt wird von Chlor vollständig in Superchlorid verwandelt, während Chlornickel davon nicht verändert wird. Auf diesem Verhalten beruht die nachstehende von H. Rose (1) beschriebene Trennungsmethode beider Metalle. Ihre salzsaure, mit einer hinreichenden Menge freier Säure versetzte Auflösung wird mit vielem Wasser verdünnt (auf 2 Grm. der Metalloxyde etwa mit 1 Liter) und mehrere Stunden mit Chlorgas behandelt, bis sie ganz damit gesättigt und der leere Raum der Flasche mit Chlorgas angefüllt ist. Man setzt nun kohlens. Baryt im Ueberschuß zu, läßt unter öfterem Umschütteln 12 bis 18 Stunden in der Kälte stehen, und sammelt das gefällte Kobaltsuperoxyd nebst dem überschüssigen kohlens. Baryt auf einem Filter. Nach dem Auswaschen mit kaltem Wasser löst man in heißer Salzsäure, entfernt den Baryt mit Schwefelsäure, fällt das Kobaltoxydul mit Kalilauge, und reducirt es nach dem Auswaschen und Trocknen im Platin- oder Porcellan-

(1) Pogg. Ann. LXXI, 545; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 411; J. pr. Chem. XLII, 186; Berl. Acad. Ber. 1847, 184; Pharm. Centr. 1847, 535; Chem. Gaz. 1847, 362.

Trennung von
Nickel und
Kobalt.

tiegel mit Wasserstoff. Aus der vom Kobaltoxyd abfiltrirten Flüssigkeit schlägt man zuerst den Baryt durch Schwefelsäure und dann das Nickeloxydul durch ein Alkali nieder. — T. H. Henry (1) wendete mit gutem Erfolg statt des Chlors eine Auflösung von Brom an; er giebt außerdem, mit Bezug auf die von Liebig früher vorgeschlagene Trennungsmethode dieser beiden Metalle, an, daß eine Auflösung von Kobaltidcyankalium längere Zeit mit Salzsäure gekocht oder mit Schwefelsäure beinahe zur Trockne verdampft in der Art unter Blausäureentwicklung zersetzt wird, daß Alkalien alsdann einen Niederschlag von Kobaltoxyd hervorbringen. Er schreibt diesem Verhalten den Ueberschuß an Nickel zu, den sowohl er selbst als H. Rose bei Befolgung dieser Methode erhielten (2). Nach der von Plattner (3) beschriebenen Methode, wonach die gefällten Oxyde mit Arsen zuerst in einer Glasröhre erhitzt, dann auf der Kohle in der inneren Flamme bis zur Verflüchtigung des Arsenüberschusses geschmolzen, und nun, nach dem Wägen, mit Borax in der äußern Flamme behandelt werden, bis alles Kobalt oxydirt und aufgelöst ist, worauf das bleibende Arsennickel gewogen wird, erhielt Henry ebenfalls zuviel Kobalt.

Trennung des
Nickels und
Kobalts und
Mangan.

Die Angabe von Barreswil (4), daß sich Kobalt von Mangan durch Einleiten von Schwefelwasserstoff in die mit überschüssigem kohlen. Baryt versetzte Lösung trennen lasse, ist von Strecker (5) und von H. Rose (6) geprüft und — wie vorausszusehen war — nicht anwendbar befunden worden, da auch das Mangan ausgefällt wird. Die Scheidung des Nickels von Mangan geschieht nach H. Rose am besten so wie die des Nickels vom Kobalt, mittelst Chlorgas und kohlen. Baryt; zur Trennung des

(1) Chem. Gaz. 1847, 370. — (2) In Liebig's neuer Methode (S. 972) ist diese Quelle von Ungenauigkeit beseitigt. — (3) Die Probirkunst mit dem Löthrohre, 2. Aufl. — (4) Ann. ch. phys. [3] XVII, 53; J. pr. Chem. XXXVIII, 171; Berzelius' Jahresber. XXVII, 214. — (5) Ann. Ch. Pharm. LXI, 219; Pharm. Centr. 1847, 867. — (6) Pogg. Ann. LXXI, 545; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 416.

Nickels und Kobalts von Mangan empfiehlt er die Fällung der salpetersäurefreien, mit Ammoniak übersättigten Lösung mit Schwefelammonium, und Ansäuren mit Salzsäure, wodurch das Mangan wieder gelöst wird; ein Verfahren, das im Wesentlichen mit dem von Wackenroder (1) vorgeschlagenen übereinstimmt.

Das Nickeloxydul läßt sich, nach H. Rose, von der Thonerde durch Kochen mit Kalilauge nicht trennen, wohl aber durch Schmelzen mit Kalihydrat im Silbertiegel; da in diesem Falle das Nickeloxydul kalihaltig zurückbleibt und noch einmal aufgelöst werden müßte, so zieht er die Trennung beider mittelst kohlen. Baryt vor.

In Bezug auf die von Pelouze (2) 1846 beschriebene Methode zur quantitativen Bestimmung des Kupfers mittelst einer titrirten Auflösung von Schwefelnatrium hat Casa-seca (3) der Pariser Academie mitgetheilt, daß er schon ein Jahr früher in einem Briefe an Pelouze ein Verfahren beschrieben habe, das Kupfer quantitativ zu ermitteln durch Vergleichung der Farbe der ammoniakalischen Auflösung des Oxyds mit einer solchen von bekanntem Gehalt. Auf dasselbe Princip stützt sich die von Jacquelin (4) veröffentlichte Methode; Pelouze (5) hält dieselbe nicht für hinreichend genau; Huber (6) weist jedoch nach, daß sie an Einfachheit und Genauigkeit keiner der bekannten Verfahrensweisen nachstehe.

C. Riegel (7) theilt eine Zusammenstellung der zur Nachweisung und zur Bestimmung des Kupfers bis jetzt angewendeten Methoden mit; nach seinen vergleichenden Versuchen giebt die oben erwähnte Pelouze'sche Bestimmungsweise sehr genaue Resultate.

- (1) Arch. Pharm. [2] XVI, 126; L. Gmelin's Handb. III, 338. — (2) Ann. ch. phys. [3] XVI, 417; XVII, 398; Berzelius' Jahresber. XXVII, 217. — (3) Compt. rend. XXVI, 273. — (4) Compt. rend., 8. Juin 1846. — (5) Compt. rend. XXVI, 275. — (6) Aus den Ber. der Freunde der Naturwissensch. zu Wien, IV, in J. pr. Chem. XLVI, 174. — (7) Arch. Pharm. [2] LVI, 21.

Silber.
Cupelliren
mittels des
Löthrohrs.

W. Mather (1) giebt der Anwendung des Glimmers vor der von Knochenasche als Unterlage beim Abtreiben des Bleis vom Silber den Vorzug, da derselbe weniger Silber einsauge. Er beschreibt auch seine Methode der Gewichtsbestimmung der Silberkugeln durch mikroskopische Messung, hinsichtlich deren wir auf die Abhandlung verweisen.

Gold.

O. Henry (2) hat ein Verfahren zur indirecten Bestimmung des Goldes auf nassem Wege vorgeschlagen, welches auf der Ausmittlung der Kupfermenge beruht, die an der Stelle des Goldes in Auflösung übergeht, wenn man eine neutrale, mit einem Ueberschuß von zweifachkohlen. Kali vermischte Goldlösung in gelinder Wärme mit metallischem, durch Wasserstoff völlig reducirtem Kupfer digerirt, bis alles Gold ausgefällt ist. Die Bestimmung des Kupfers in der mit Schwefelsäure schwach angesäuerten Flüssigkeit geschieht mittelst einer titrirten Lösung von Ferrocyankalium. Die von Henry zur Stütze seiner Methode mitgetheilten Zahlenresultate lassen insofern noch gegründete Zweifel über ihre Schärfe und Genauigkeit, als sie sich selbst widersprechen in der Menge des dem Golde entsprechenden Kupfers.

Analyse von
Aschen.

Ueber die Ausführung der Analysen von Aschen, sowohl pflanzlichen wie thierischen Ursprungs, sind von H. Rose, von Heintz und von Wackenroder wichtige Beiträge geliefert worden, welche die Mängel der bisher eingeschlagenen, von Knop (3) übersichtlich zusammengestellten Untersuchungsmethoden von Will und Fresenius, von Erdmann und von Mitscherlich hervorheben und zu umgehen suchen. Erdmann (4) zeigte zuerst durch Versuche, daß bei der Darstellung von Pflanzenaschen in sehr hoher Temperatur die Chlorverbindungen der Alkalimetalle

(1) Sill. Am. J. [2] III, 409. — (2) J. pharm. [3] XI, 5; Pharm. Centr. 1847, 328. — (3) J. pr. Chem. XXXVIII, 14. — (4) Ann. Ch. Pharm. LIV, 353.

theilweise verflüchtigt, die schwefels. Salze zersetzt und zweibasische phosphors. Salze in dreibasische verwandelt werden. Um diesen Nachtheilen so viel wie möglich zu entgehen, schlägt H. Rose (1) folgenden Weg ein. Man verkohlt die organische Substanz in gelinder Rothglühhitze in einem geräumigen Tiegel von Platin oder Thon bis man keinen bedeutenden empyreumatischen Geruch mehr bemerkt und bis die verkohlte Masse an Wasser keine gelb- oder braunfärbenden Materien mehr abgiebt. Man zieht nun den Rückstand mit heissem Wasser so lange aus, bis einige Tropfen des Waschwassers nur noch einen geringen Rückstand lassen. Die wässerige Lösung enthält die alkalischen Salze (Chlormetalle, schwefels. und phosphors. Salze), die als solche in der organischen Substanz vorhanden waren, und häufig auch kohlen. Alkali, das entweder ebenfalls schon präexistirte oder durch den Verkohlungsproceß erzeugt wurde. Sie wird fast zur Trockne verdampft, mit Wasser verdünnt und, nach längerem Stehen, die dadurch abgeschiedenen, in den Salzen der Alkalien gelöst gewesenen Erdsalze (kohlen. und phosphors. Kalk und Magnesia) abfiltrirt, das Filtrat eingetrocknet, gewogen, und nach bekannten Methoden die darin enthaltenen Säuren und Basen bestimmt. — Die mit Wasser erschöpfte verkohlte Masse wird nun längere Zeit mit Salzsäure digerirt, und dann mit heissem Wasser nur so lange ausgewaschen, bis eine gröfsere Menge des Waschwassers nicht mehr durch Ammoniak gefällt wird. Der saure Auszug enthält die phosphors. Erdsalze, die als solche vorhanden waren, und Eisenoxyd; sie werden durch Ammoniak ausgefällt, gemeinschaftlich mit den aus dem wässerigen Auszuge abgeschiedenen Erdsalzen gewogen, und nach einer von Rose später zu beschreibenden Methode die Basen von der Phosphorsäure getrennt. Die von den phosphors. Erden abfiltrirte Flüssigkeit enthält noch etwas Kalk und Magnesia, welche nach

Analyse von
Aschen.

(1) Pogg. Ann. LXX, 449; Pharm. Centr. 1847, 805.

Analyse von
Aschen.

einander als oxals. und als phosphors. Salz ausgefällt werden. — Die mit Wasser und Salzsäure erschöpfte verkohlte Masse ist noch reich an Asche; sie wird in einem dünnen Porzellantiegel, durch dessen durchlöchernten Platindeckel Sauerstoffgas zugeleitet wird, nach und nach vollkommen eingeäschert, und das Gewicht der Asche dem der durch Wasser und Salzsäure ausgezogenen Bestandtheile hinzugeaddirt. Diese zuletzt erhaltene Asche enthält dieselben Salze wie der wässrige oder saure Auszug der verkohlten organischen Substanz, hauptsächlich aber phosphors. Erden und um so mehr Eisen, je sorgfältiger bei der Verkohlung die Luft abgehalten wurde. — Ueber die Ansichten, welche H. Rose in Betreff der Form hat, in welcher diese Aschenbestandtheile von der Kohle so hartnäckig zurückgehalten werden, daß sie ihr durch Säuren nicht entzogen werden können, werden wir erst im nächsten Jahre zu berichten haben.

Heintz (1) gelangte zu derselben Methode der Bestimmung der Aschenbestandtheile wie H. Rose. Er zeigte außerdem, daß in den Fällen, in welchen die Asche kohlens. und phosphors. Alkali enthält, in Folge der Bildung von dreibasisch-phosphors. Salz auch bei der zur Verkohlung angewandten niedrigen Temperatur etwas Kohlensäure verloren geht. Da, nach den Versuchen von Heintz, pyrophosphors. Natron durch Kohlensäure in saures pyrophosphors. und in kohlens. Natron zerlegt wird, so läßt sich auf diesem Wege die aus der Asche verflüchtigte Kohlensäure nicht wieder ersetzen. Heintz versuchte deshalb die Quantität der Kohlensäure in der Art zu ermitteln, daß er eine Portion der organischen Substanz verkohlte und in dem wässrigen Auszug dieser Kohle das Chlor bestimmte; eine andere Portion derselben wurde nun nach der Verkohlung mit Salzsäure ausgezogen, die

(1) Pogg. Ann. LXXII, 113; Berl. Acad. Ber. 1847, 225; J. r. Chem. XLII, 139.

salzs. Lösung mit der Asche der Kohle vermischt, zur Analyse von Aschen. Trockne verdampft, auf die Verkohlungs-temperatur erhitzt und im Rückstand das Chlor bestimmt. Die Differenz der auf Procente der organischen Substanz berechneten Chlormengen sollte derjenigen Menge von Kohlensäure äquivalent sein, aus welcher der Procentgehalt an Salzen fixer Basen mit organischen Säuren erschlossen werden könne. Substituirt man der Chlordifferenz das Aequivalent an Sauerstoff, so erhält man die Quantität der fixen Bestandtheile einer organischen Substanz. Spätere Erfahrungen (1) von Heintz lehrten aber, daß der Kohlensäuregehalt, nach dieser Weise berechnet, stets ungenau ausfallen muß, einerseits weil eine Auflösung von phosphors. Kalk in Salzsäure beim Eindampfen und Erhitzen eine beträchtliche Menge Chlor zurückhält, andererseits weil das aus der kohlen. Magnesia der Asche entstandene Chlormagnesium beim Erhitzen unter Verlust an Chlor zerlegt wird. Man könnte nun die Kohlensäure aus derjenigen Quantität Basis berechnen, welche, nachdem man die gefundenen Basen an die gefundenen Säuren nach ihrer Sättigungscapacität vertheilt hat, unverbunden übrig bleibt; allein hierzu wäre erforderlich, wie auch Heintz erwähnt, daß uns diese Sättigungscapacität oder die Form in welcher die Aschenbestandtheile in den organischen Substanzen enthalten sind, bekannt wäre, eine Kenntniß, der wir durch die vorhandenen Untersuchungen zwar näher gerückt sind, die wir aber noch keineswegs erreicht haben. — Zur Bestimmung der Phosphorsäure fällt Heintz die essigs. Lösung der Asche mit salpeters. Bleioxyd; das niedergefallene phosphors. Bleioxyd-Chlorblei wird dann mit Schwefelsäure und Alkohol zerlegt, und aus dem Filtrat die Phosphorsäure mittelst Ammoniak und schwefels. Magnesia abgeschieden. Sein Verfahren zur Bestimmung der Alkalien wurde S. 961 beschrieben.

Wackenroder (2) zieht die völlige Einäscherung in Tiegel (welche bei schmelzbaren Aschen mit Kartoffel-

(1) Pogg. Ann. LXXIII, 455. — (2) Arch. Pharm. [2] LIII, 1.

Analyse von
Aschen.

stärke ausgefüllt sind) oder auch in Cylindern von Eisenblech, die mit einem Rohr versehen sind, vor, und macht auf sorgfältige Reinigung der Pflanzentheile von erdigen, oft im Innern derselben eingeschlossenen Substanzen aufmerksam. Er hält, nach vorläufigen Versuchen, einen Zusatz von essigs. (kohlens. oder ätzendem) Kalk für ein geeignetes Mittel, die Veraschung schmelzbarer, an Kieselsäure oder Phosphorsäure reicher Substanzen (des Bluts z. B.) zu erleichtern und die Bildung von Cyan- und Schwefelverbindungen zu verhindern. Die von ihm befolgte Methode der quantitativen Analyse ist nur anwendbar bei Aschen, die an und für sich reich sind an Kalk, kohlens. Kali und Chlorkalium, oder die durch obigen Zusatz in Kalkaschen verwandelt wurden. Die Untersuchung der Asche zerfällt in die Analyse des in Wasser löslichen und des darin unlöslichen Theils.

1. *In Wasser löslicher Theil.* — Enthält die Kalkasche kohlens. Kali, so findet sich im wässerigen Auszug (W. verwendet dazu 10 bis 20 Grm. Asche und das 4- bis 6fache Gewicht Wasser) alle Schwefelsäure und ein Theil der Phosphorsäure, dagegen nur Spuren von Kieselerde, Kalk und Magnesia. Der erdige Rückstand besteht aus dem Rest der Phosphorsäure, aus Kieselerde und Kohlensäure in Verbindung mit Kalk, Magnesia, Eisenoxyd, Thonerde, und aus Manganoxhydroxydul. Ist die Asche frei von kohlens. Kali, so enthält der wässerige Auszug meist nur Chlorverbindungen und schwefels. Salze, aber keine phosphorsauren. Trübt sich der wässerige Auszug nach einiger Zeit, so filtrirt man den aus kohlens., phosphors. und kiesels. Kalk bestehenden Niederschlag ab, und fügt ihn dem erdigen Rückstand zu (1). Glüht man den Rückstand gelinde im verschlossenen Platintiegel und zieht sein Gewicht von dem der Asche ab, so erhält man eine

(1) Aus manchen Aschen (auch aus verkohltem Weinstein) nimmt Weingeist von 0,835 sp. Gew. etwas Aetzkali auf.

Controle für die Gesamtmenge der löslichen Aschensalze. — Analyse von Aschen.
 Der wässrige Auszug wird in 5, nach Erforderniß ungleich große, Theile getheilt. In dem einen Theil bestimmt man die Kieselerde durch Ansäuern mit Salzsäure, Erwärmen, Versetzen mit Ammoniak und 24stündiges Stehenlassen. Die stets geringe Fällung von Kieselerde kann auch Spuren von phosphors. Erden enthalten. In dem zweiten ermittelt man Kalk und Magnesia, in dem dritten das Chlor (und Cyan) nach bekannten Methoden. Der vierte, etwas größere Theil dient zur Bestimmung der Schwefelsäure, Phosphorsäure und Kohlensäure. Er wird erhitzt, nach dem Erkalten mit Chlorbaryum völlig niedergeschlagen, der ausgewaschene schwefels., phosphors. und kohlen. Baryt nach gelindem Glühen gewogen. Nach seiner Behandlung mit Salzsäure bleibt schwefels. Baryt; aus dem Filtrat fällt Zusatz von Ammoniak phosphors. Baryt ($3\text{BaO}, \text{PO}_5$) (1). Die Menge des kohlen. Baryts (und somit der Kohlensäure) ergibt sich aus der Differenz. Den Kaligehalt ermittelt Wackenroder (Natron war nur einmal in Runkelrübenasche in äußerst geringer Menge, noch nicht $\frac{1}{100}$ des Kalis, nachzuweisen) entweder als saures weins. Kali, durch Fällung der hinreichend verdampften Lösung mit Weinsäure und Trocknen des niedergefallenen, mit wenig kaltem Wasser gewaschenen, 25 pC. Kali enthaltenden Weinstein bei 100° , oder wie gewöhnlich als Platinchlorid-Chlorkalium, oder endlich, wenn Natron zugegen ist, durch indirecte Analyse als schwefels. Salz.

2. *In Wasser unlöslicher Theil.* — Der in Wasser unlösliche Antheil der Asche wird mit Salzsäure behandelt, die Kieselerde (nebst Kohle und Sand) abgeschieden, in dem Filtrat, wenn Schwefelsäure vorhanden ist, diese zuerst bestimmt, alsdann dasselbe (nach vorgängiger Abscheidung des überschüssigen Baryts mittelst Schwefelsäure) mit kohlen. Natron beinahe gesättigt und, nach Zusatz

(1) Vergl. jedoch S. 839.

Analyse von
Aschen.

von essigs. Natron, gekocht, wo alles Eisenoxyd und alle Thonerde in der Form von phosphors. Salzen gefällt werden (1). Sie werden, nach dem Glühen und Wägen als Fe_2O_3 , PO_3 und Al_2O_3 , PO_3 , in Salzsäure gelöst, mit überschüssiger concentrirter Natronlauge erwärmt und das abgeschiedene Eisenoxyd bestimmt; die alkalische Flüssigkeit liefert, mit Essigsäure angesäuert und gekocht, die phosphors. Thonerde, die mit wässrigem Weingeist gewaschen und als Al_2O_3 , PO_3 gewogen wird (2). — Zur Bestimmung des Rests der Phosphorsäure versetzt Wackenroder die vom Niederschlag abfiltrirte Flüssigkeit mit Eisenchlorid von bekanntem, etwa $\frac{1}{10}$ bis $\frac{1}{5}$ der Asche betragendem Eisengehalt, dann mit einer hinreichenden Menge von essigs. Natron und kocht, wo alle Phosphorsäure in Verbindung mit dem Eisenoxyd niederfällt. Zieht man von dem Gewicht dieses Niederschlags das Eisenoxyd ab, dessen Menge bekannt ist, so erhält man das der Phosphorsäure (3). — Der Kalk und die Magnesia, die neben Mangan in der vom phosphors. Eisenoxyd abfiltrirten Flüssigkeit

(1) Nach der Angabe von Wackenroder und Ludwig ist das unter diesen Umständen niederfallende phosphors. Eisenoxyd stets nach der Formel Fe_2O_3 , $\text{PO}_3 + 4\text{HO}$, und die phosphors. Thonerde (geglüht) nach der entsprechenden Formel Al_2O_3 , PO_3 zusammengesetzt. — (2) Zur Abscheidung der Phosphorsäure aus ihrer Verbindung mit Eisenoxyd und Thonerde zerlegt Wackenroder die salzs. Lösung des Niederschlags mit concentrirter Natronlauge in der Wärme, und vermischt das alkalische (alle Phosphorsäure und Thonerde enthaltende) Filtrat zuerst mit Chlorbaryum oder Barytwasser, so lange ein Niederschlag (von phosphors., kohlen- und schwefels. Baryt) entsteht, dann noch mit etwas Natronlauge, erhitzt zum Sieden und filtrirt. Aus dem Filtrat erhält man die Thonerde durch Fällung mit Salmiak oder durch Neutralisiren mit Schwefelsäure und Zusatz von kohlen. Ammoniak. Behandelt man den Barytniederschlag mit Salzsäure und versetzt das Filtrat mit Ammoniak, so fällt phosphors. Baryt (3BaO , PO_3) nieder (vergl. S. 339). Wackenroder bemerkt, daß etwa $\frac{1}{10}$ der phosphors. Thonerde dem phosphors. Baryt beigemischt blieb, wenn Actznatronlauge angewendet wurde, die nicht hinreichend concentrirt war. Hermann (J. pr. Chem. XL, 32) und Fresenius (S. 948) haben ähnliche Trennungsmethoden angegeben. — (3) In derselben Weise bestimmt Wackenroder auch die Arsensäure.

sigkeit enthalten sind, werden nach bekannten Methoden bestimmt; zur Ermittlung des Mangans fällt Wackendorfer zuerst die heiße Flüssigkeit mit überschüssigem kohlen. Natron, glüht den Niederschlag gelinde, und behandelt ihn dann mit nur wenig überschüssiger, sehr verdünnter Salpetersäure, wo alles Mangan als Oxydoxydul ungelöst bleibt; das Filtrat enthält den Kalk und die Magnesia.

H. Reinsch (1) hat eine vereinfachte Methode um Analyse von Ackerboden. Ackererden und Bodenarten zu analysiren mitgetheilt. Es möge genügen, wenn wir von diesem Verfahren erwähnen, daß der Kaligehalt nach der Menge des Niederschlags geschätzt wird, welchen Weinsäure in der verdampften salzs. Lösung der Ackererde hervorbringt, nachdem vorher in derselben (eisenoxyd-, thonerde-, kalk- und magnesiahaltigen) Flüssigkeit durch metallisches Kupfer, nach dem Verfahren von Fuchs, das Eisenoxyd betimmt war.

Um in Fluß- oder Quellwasser einen Gehalt an aufgelösten organischen Organ. Materie im Wasser. Materialien nachzuweisen, erhitzt Dupasquier (2) etwa 25 bis 30 Grm. desselben mit soviel Goldchlorid, daß die Flüssigkeit gelblich ist, zum Sieden. Enthält das Wasser nur die gewöhnliche Menge organischer Materie, so bleibt es auch bei längerem Kochen gelblich, ist aber eine abnorme Quantität derselben vorhanden, so wird es, durch Reduction des Golds, zuerst braun, dann violettblau.

Guibourt (3) hat die bis jetzt gebräuchlichen chemischen Methoden zur Unterscheidung des Rohrzuckers vom Unterscheidung von Rohr- und Stärkezucker. Stärkezucker zusammengestellt. Diese Methoden haben in neuerer Zeit eine um so größere Wichtigkeit erlangt, je häufiger Verfälschungen von Rohrzucker oder der daraus bereiteten Syrupe mit Stärkezucker oder Stärkezucker-

(1) Jahrb. pr. Pharm. XVII, 152. — (2) Compt. rend. XXIV, 626; J. pharm. [3] XIII, 164; Pharm. Centr. 1847, 447; 1848, 314. — (3) J. pharm. [3] XIII, 263.

Unterschei-
dung von
Rohr- und
Stärkezucker.

syryp geworden sind. Es sind im Wesentlichen nur zwei; sie beruhen auf dem Verhalten der Zuckerarten gegen Kupferoxyd bei Gegenwart eines Alkalis, oder gegen ätzendes Alkali allein.

1. Rohrzucker bewirkt — bei gewöhnlicher Temperatur oder auch in der Siedhitze — die Reduction des Kupferoxyds bei Gegenwart von freiem Alkali gar nicht oder nur langsam, während Traubenzucker, nach einigen Stunden in der Kälte, sogleich in der Siedhitze eine Fällung von Kupferoxydul erzeugt (Trommer). Barreswil (1) hat darauf, mit Anwendung einer titrirten Probeflüssigkeit von weins. Kupferoxyd-Kali, die quantitative Ermittlung des Stärkezuckers gegründet.

2. Rohrzucker verbindet sich mit ätzenden Alkalien ohne merkliche Färbung, während Traubenzucker sich damit unter starker brauner Färbung zerlegt. Périer, Kuhlmann, Chevallier und Mialhe haben dieses Verhalten zur Nachweisung, Péligot (2) auch zur quantitativen Ermittlung des Trauben- oder Fruchtzuckers in Anwendung gebracht. Dem Honig beigemischten Stärkezucker erkennt man, nach Guibourt, außer an der physikalischen Beschaffenheit, an dem Gehalt an schwefels. Kalk, der den mittelst Schwefelsäure bereiteten Stärkezucker stets begleitet. Unverfälschter Honig ist frei von Kalksalzen, wird er aber durch Papier filtrirt, das nicht mit Salzsäure ausgewaschen war, so nimmt er daraus Spuren von Kalk auf; man muß sich deshalb an die Reaction auf Schwefelsäure halten. Honig, welchem $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{2}$ Stärkezucker beigemischt ist, giebt eine starke Trübung mit Barytsalzen. Dem Stärkezucker noch beigemengtes Dextrin wird, neben dem Gyps, durch einen Zusatz von starkem Alkohol ausgefällt.

(1) J. pharm. [8] VI, 801; Berzelius' Jahresber. XXV, 556. —

(2) Compt. rend. XXII, 936; Berzelius' Jahresber. XXVII, 388.

Reich (1) hat in dem Verhalten des Rohr- und des Traubenzuckers gegen concentrirte Schwefelsäure, gegen Chromsäure und gegen salpeters. Kobaltoxydul und Kali einige weitere chemische Unterscheidungsmittel dieser Zuckerarten gefunden. Traubenzucker bildet mit concentrirter Schwefelsäure die Péligot'sche Zuckerschweifelsäure, welche Barytsalze nicht fällt, während Rohrzucker, Rohrzuckersyrup oder unkrySTALLISIRBARER Zucker von concentrirter Schwefelsäure ohne Bildung von Zuckerschweifelsäure zerstört werden. Zur Nachweisung von Traubenzucker im Rohrzucker vermischt man den im Wasserbade soviel als möglich eingedickten Syrup nach und nach, unter Vermeidung zu starker Erhitzung, mit concentrirter Schwefelsäure in geringem Ueberschufs, verdünnt nach einer halben Stunde mit 20 Th. Wasser, und sättigt mit kohlen. Baryt. Erzeugt die nun filtrirte Flüssigkeit mit verdünnter Schwefelsäure eine Fällung von schwefels. Baryt, so war aus Traubenzucker entstandener zuckerschweifels. Baryt vorhanden. Herzog (2) fand, auch bei Anwendung von reinstem Rohrzucker, stets einen Barytgehalt in der vom schwefels. und überschüssigen kohlen. Baryt abfiltrirten Flüssigkeit, in Folge der Bildung von ameis. und essigs. Baryt, was also diese Methode so unzuverlässig als die bis jetzt üblichen macht. — Die Anwendung des zweifach-chroms. Kalis bietet dagegen — auch nach Herzog's Versuchen — mehr Sicherheit. Erhitzt man Rohrzuckersyrup mit einer heifs gesättigten Lösung dieses Salzes bis zum Sieden, so entsteht eine grüne Flüssigkeit unter energischer Oxydation des Zuckers. Traubenzucker oder Traubenzuckersyrup werden unter denselben Verhältnissen nicht verändert. Ist Rohrzuckersyrup mit $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ oder nur $\frac{1}{8}$ Traubenzuckersyrup gemischt, so verhindert letzterer die Reaction und die Farbenänderung tritt nicht ein; auch bei noch geringerem

Unterscheidung von
Rohr- u. Traubenzucker.

(1) Arch. Pharm. [2] L, 298; J. pr. Chem. XLIII, 70; Repert. Pharm. [3] XLVIII, 122; Pharm. Centr. 1847, 670; J. pharm. [3] XIV, 79. — (2) Arch. Pharm. [2] L, 299.

Gehalt tritt niemals die schön-dunkelgrüne, sondern eine bräunlich-gelbe oder bräunlich-grüne Färbung ein. Erhitzt man, nach Reich, eine concentrirte Lösung von reinem Rohrzucker mit etwas geschmolzenem Aetzkali zu Sieden und setzt salpeters. Kobaltoxydul zu, so erhält man einen blauen Niederschlag, während Traubenzucker unter denselben Verhältnissen, auch wenn er dem Rohrzucker beigemischt ist, die Fällung des Kobaltsalzes im verdünnten Zustande verhindert oder bei concentrirten Lösungen die Bildung eines schmutzigbraunen Niederschlags bedingt. Reich hält dies für ein sicheres Mittel, dem Rohrzucker beigemischten Traubenzucker zu erkennen. Herzog beobachtet, daß Harnzucker und Milhzucker sich wie Traubenzucker Mannit dagegen wie Rohrzucker gegen ätzendes Kali und salpeters. Kobaltoxydul verhalten.

Essigsäure.

Riegel (1) glaubt an die Stelle der bekannten Methoden zur Bestimmung des Säuregehalts des Essigs eine genauere zu setzen, wenn er die Gewichtszunahme ermittelt, welche der Essig nach der Neutralisation mit Barythydrat und Abfiltriren der dabei sich bildenden unlöslichen Barytverbindungen, erfährt. Das Mehrgewicht des auf das ursprüngliche Volum gebrachten Essigs betrachtet er als Baryt und berechnet daraus die demselben entsprechende Essigsäure, ohne Rücksicht auf die in unlöslicher Verbindung mit dem Baryt abfiltrirten Materien, die in dem ursprünglichen Essig ebenfalls mitgewogen waren.

Milchsäure.

Strecker (2) hat nachgewiesen, daß das von Pelouze (3) beschriebene und von ihm sowie von Boussingault (4) und Goble (5) als charakteristisches Kennzeichen der Milchsäure benutzte Verhalten des milchs. Kupferoxyds gegen überschüssigen Kalk auf einer Täuschung beruht und demnach nicht zur sicheren Erkennung dieser Säure

(1) Arch. Pharm. [2] LV, 167. — (2) Ann. Ch. Pharm. LX 316; Pharm. Centr. 1847, 350. — (3) Ann. ch. phys. [3] XII, 267; Ann. Ch. Pharm. LIII, 124. — (4) Ann. ch. phys. [3] XV, 97. — (5) Bezelius' Jahresber. XXVI, 917.

angewendet werden könne. Er zeigte, daß Milchsäure die vollständige Fällung des Kupferoxyds durch Kalkmilch wohl erschwert, aber nicht hindert, daß auch bei Gegenwart von essigsauren, citronsauren, äpfelsauren und weinsauren Salzen dieses Oxyd durch Kalkmilch völlig abgeschieden wird, und daß andererseits etwas Kupfer in Auflösung bleibt, wenn Leim, Glycocoll, unreiner milchs. Kalk, Salmiak, Rohrzucker, Traubenzucker, mit Kali gekochter Leim, Fibrin, Albumin oder Casein vorhanden sind.

Das Verhalten der höheren Schwefelungsstufen des Ammoniums zu Blausäure giebt, nach Liebig (1), ein empfindliches Reagens für diese Säure ab. Ein paar Tropfen einer Blausäure, die mit soviel Wasser verdünnt ist, daß sie mit Eisensalzen keine sichere Reaction durch Berlinerblaubildung mehr giebt, mit einem Tropfen Schwefelammonium auf einem Uhrglase so lange erwärmt, bis die Mischung farblos ist, liefert eine schwefelcyanammoniumhaltige Flüssigkeit, die mit Eisenoxysalzen eine sehr starke blutrothe Färbung und mit Kupferoxysalzen bei Gegenwart von schwefliger Säure einen weißen Niederschlag von Schwefelkupfercyanür giebt. Blausäure.

A. Taylor (2) hat diese Methode auf ihre Empfindlichkeit geprüft und gefunden, daß man damit in einer sehr verdünnten Flüssigkeit noch $\frac{1}{100}$ Gran wasserfreie Blausäure deutlich nachweisen könne, während $\frac{1}{10}$ Gran durch Berlinerblaubildung nicht mehr entdeckbar ist. Er schlägt vor, die blausäurehaltige Flüssigkeit in ein Uhrglas zu bringen und ein anderes darüber zu decken, das mit einem Tropfen Schwefelammonium befeuchtet ist. Nach einigen Minuten erwärmt man das obere Uhrglas gelinde, bis das Schwefelammonium eingetrocknet ist, und setzt Eisenchlorid zum trocknen Rückstand. Taylor wies so noch $\frac{1}{10}$ Gran wasserfreier Blausäure in einem in Fäulniß

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 127; Phil. Mag. [3] XXXI, 140. —

(2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 263.

übergegangenen Mageninhalt nach, bei welchem des Schwefelwasserstoffgehalts wegen die von ihm früher beschriebene, in ähnlicher Weise anzustellende Reaction mit salpeters. Silberoxyd nicht anwendbar war (1).

Schwefels.
Cinchonin in
schwefels.
Chinin.

Das zur Verfälschung des schwefels. Chinins dienende Cinchoninsalz wird in der Regel in die Mitte der Flaschen, die das erstere enthalten, gebracht. Henry (2) schreibt zu seiner Nachweisung vor, 20 bis 30 Grm. des verdächtigen Salzes in schwach angesäuertem Wasser zu lösen, die Auflösung in überschüssige Natronlauge zu gießen und den gewaschenen Niederschlag in Essigsäure zu lösen. Man läßt durch wiederholtes Verdampfen das essigs. Chinin auskrystallisiren, zersetzt die Mutterlauge von Neuem mit ätzendem Natron, behandelt den Niederschlag zuerst mit Aether, dann wiederholt mit heißem Alkohol, welcher nach dem Verdampfen das Cinchonin krystallisirt zurückläßt. — Ist dem Chininsalz krystallisirtes Cinchonin beigemischt, so ist das Gemenge nicht in 10 Th. heißem Wasser löslich.

Strychnin.

E. Marchand (3) hält die von ihm 1843 angegebene Methode zur Erkennung des Strychnins (4) — wonach dasselbe beim Zusammenreiben mit Bleihyperoxyd und concentrirter, 1 pC. Salpetersäure enthaltender Schwefelsäure zuerst blau, dann violett, roth und endlich zeisiggelb wird — stets noch für die zuverlässigste, da beim Weg-

(1) Reinach hat unter Will's Leitung einige Versuche angestellt, welche die Empfindlichkeit obiger Reaction ebenfalls darthun. Ein Kaninchen wurde in der Art durch Blausäure getödtet, daß es den Dampf derselben einathmen mußte. In dem Blut, dem Gehirn und dem Harn war, nach der Destillation dieser Materien mit etwas Weinsäure, mittelst Schwefelammonium und Eisenchlorid die Gegenwart von Blausäure leicht nachzuweisen, während die gewöhnliche Reaction durch Berlinerblaubildung kein Resultat gab. Der Mageninhalt war frei von Blausäure. — (2) J. chim. méd. [3] IV, 258; J. pharm. [3] XIII, 107; J. pr. Chem. XLIV, 249. — (3) J. pharm. [3] XIII, 251; J. pr. Chem. XLIV, 185; Pharm. Centr. 1849, 29; Chem. Gaz. 1848, 187. — (4) J. pharm. [3] IV, 200; Berzelius' Jahresber. XXIV, 400.

lassen der Salpetersäure oder bei Anwendung von Braunstein oder saurem chroms. Kali statt des Bleihyperoxyds die charakteristische Aufeinanderfolge des Farbenwechsels nicht stattfinden.

Ueber quantitative Bestimmung des Nicotins im Tabak vergl. S. 612, und über mikroskopische Unterscheidung mehrerer organischen Basen S. 667.

Harnstoff zerfällt, in wässriger Lösung, sehr leicht in kohlens. Ammoniak, wenn man ihn in hermetisch verschlossenen Gefäßen über 100° erhitzt. Bei 120° geschieht die Umwandlung nur langsam, bei 220 bis 240° ist sie aber schon in 3 bis 4 Stunden vollständig. Geschieht das Erhitzen solcher Flüssigkeiten bei Gegenwart einer ammoniakalischen Chlorbaryumlösung, so erhält man eine dem Harnstoffgehalt entsprechende Menge von kohlens. Baryt. Auf dieses Verhalten gründet Bunsen (1) folgende sehr einfache, genaue und expeditiv Methode zur quantitativen Bestimmung des Harnstoffs im Harn. — Man wägt in einer trocknen oder mit der zu wägenden Flüssigkeit ausgespülten Digerirflasche, deren Rand mit etwas Fett bestrichen ist, gegen 50 bis 60 Grm. Harn ab, gießt den größten Theil davon in eine andere trockne Digerirflasche, und bestimmt das Gewicht der abgegossenen Menge A durch Zurückwiegen des theilweise entleerten Gefäßes. Der auf diese Art abgewogene Harn wird mit einer möglichst concentrirten Chlorbaryumlösung, welche etwas freies Ammoniak enthält, gefällt, und das Gewicht der zugesetzten Barytlösung B in derselben Weise bestimmt. Sobald sich der Niederschlag nach dem Schütteln der verkorkten Flasche abgesetzt hat, bringt man die darüber stehende Flüssigkeit auf ein gewogenes, nicht benetztes Filter, und läßt durch einen langhalsigen, unten zu einer Spitze ausgezogenen Glastrichter 25 bis 30 Grm. davon in eine starke, unten

Bestimmung
des
Harnstoffs.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 875; Pharm. Centr. 1848, 417; J. pharm. [3] XVI, 151.

Bestimmung
des
Harnstoffs.

zugeschmolzene tarirte Glasröhre fließen, welche gegen 3 Grm. festes, chemisch reines Chlorbaryum enthält und deren Wände oberhalb des Niveau's der eingefüllten Flüssigkeit man mittelst des langhalsigen Trichters sorgfältig vor einer Benetzung bewahrt. Ist das Gewicht der eingefüllten Flüssigkeit C durch eine abermalige Wägung der Röhre bestimmt, so schmilzt man dieselbe 1 bis 1½ Zoll oberhalb der Flüssigkeit zu, indem man Sorge trägt, das Glas während des Ausziehens gehörig zu verdicken. Der Barytniederschlag wird inzwischen vollständig auf das gewogene Filtrum gebracht, ausgewaschen und dessen Gewicht b bestimmt. Die zur Metamorphose des Harnstoffs erforderliche Erhitzung dieser hermetisch verschlossenen Röhren geschieht am besten in einem kupfernen, durch eine Lampe erhitzten Oelbade, durch welches, zur Aufnahme der zugeschmolzenen Glasröhren, an einem Ende verschlossene Kupferröhren laufen. Wendet man Glasröhren von 2,5 Mm. dickem Glase an, deren innerer Durchmesser 15 Mm. nicht übersteigt, so hat man bei einer Temperatur von 220 bis 240° keine Explosion zu befürchten, welche ohnehin völlig gefahrlos sein würde, wenn man die Röhrenmündungen oder die Thüre des Oelbades von dem Beobachter abkehrt. Nach 3- bis 4stündigem Erhitzen läßt man das Oelbad erkalten, schneidet die Glasröhren durch einen Feilstrich ein und sprengt sie mittelst einer Sprengkohle ab, um die ausgeschiedenen Krystalle des kohlens. Baryts auf ein kleines Filter zu sammeln und nach dem Auswaschen mit kohlensäurefreiem Wasser deren Gewicht K zu bestimmen. Substituirt man die Werthe der gefundenen Gewichte A, B, C, b, K in die Formel $H = \frac{30,41 K (A + B - b)}{AC}$, so giebt H den Harnstoffgehalt des Harns in Procenten.

Bunsen hat sich durch zahlreiche und mit aller Umsicht angestellte Versuche überzeugt, daß alle normalen Harnbestandtheile, die sogenannten Extractivstoffe des Harns

Hippursäure, Benzoësäure und Harnsäure auf das Resultat der Harnstoffbestimmung ohne allen Einfluss sind. Harnsäure erleidet zwar, unter ähnlichen Verhältnissen wie der Harnstoff, eine Metamorphose, unter deren Producten kohlens. Ammoniak auftritt, dieselbe wird aber durch Chlorbaryum bei Gegenwart von Ammoniak so vollständig niedergeschlagen, dass ihre Gegenwart das Resultat nicht trübt. Bunsen überzeugte sich ferner, dass auch andere leicht zersetzbare thierische Stoffe, wie Milch, Eiweiss, Blutkuchen, Muskelfaser, Sehnen, Fett, Speichel, Nasenschleim, sowie Harnzucker, Kochsalz, schwefels. Natron und phosphors. Ammoniak keinen störenden Einfluss auf die Bestimmung des Harnstoffs ausüben. Die einzige unvermeidliche Fehlerquelle liegt in dem Gehalt des Harns an Kreatin. Dasselbe zerfällt, wie sich Bunsen ebenfalls durch einen Versuch überzeugte, in Sarkosinsalmiak und in kohlens. Baryt. Allein der Kreatingehalt des Harns ist so unbedeutend, dass der dadurch veranlasste Fehler um so mehr jedes Gewicht verliert, als derselbe den durch die Löslichkeit des kohlens. Baryts bedingten Fehlern entgegenwirkt.

Heintz hat nachgewiesen (1), dass der Kreatingehalt des Harns, bei der Bestimmung des Harnstoffs nach der von ihm früher (2) beschriebenen Methode — die mit der von Ragsky (3) angegebenen im Wesentlichen übereinstimmt — keinen beachtenswerthen Fehler bedingt; seine Versuche ergaben höchstens $\frac{1}{1000}$ Harnstoff mehr.

Nach einer vorläufigen Mittheilung von Millon (4) lässt sich der Harnstoff mit grosser Genauigkeit durch Wägung der in einem Kaliapparate aufzufangenden Kohlensäure bestimmen, welche sich entwickelt, wenn in Salpetersäure gelöstes salpetrigs. Quecksilberoxydul auf den Harn einwirkt, wodurch der Harnstoff in Kohlensäure und

(1) J. pr. Chem. XLII, 401. — (2) Pogg. Ann. LXVI, 114. —

(3) Ann. Ch. Pharm. LVI, 29; Berzelius' Jahresber. XXVI, 856. —

(4) Compt. rend. XXVI, 119; Pharm. Centr. 1848, 189.

Stickstoff zerfällt, während die etwaigen anderen Bestandtheile des Harns dadurch nicht zersetzt werden. Multiplirt man das Gewicht der Kohlensäure mit 1,371, so erhält man das des Harnstoffs. Millon verspricht die ausführlichere Beschreibung seines Verfahrens. (Ueber von Millon ausgeführte Bestimmungen des Harnstoffs vergl. S. 925).

Harnsäure.

Heintz (1) hat durch Versuche ermittelt, daß sowohl im normalen Harn als bei Anwesenheit von Traubenzucker, Eiweiß oder löslichen Blutbestandtheilen im Harn die Harnsäure einfach durch Ausfällung mittelst einer Säure bestimmt werden kann. Ist Eiweiß zugegen, so nimmt man Essig- oder Phosphorsäure, in allen übrigen Fällen erfüllt Salzsäure vollkommen diesen Zweck. Der Verlust, der durch die nicht vollkommene Unlöslichkeit der Harnsäure bedingt ist, beträgt etwa 0,09 pM. des angewendeten Harns; er wird durch Anwesenheit von Traubenzucker, Eiweiß oder löslichen Blutbestandtheilen nicht vergrößert, wohl aber in allen diesen Fällen durch einen mit niederfallenden färbenden Stoff compensirt. Im Harn vorhandene Galle kann einen größeren, jedoch nie 0,25 pM. des Harns übersteigenden Harnsäureverlust bedingen.

abg.

Heintz (2) macht ferner darauf aufmerksam, daß die durch Salpetersäure hervorgerufene (bisweilen aber ausbleibende) Farbenänderung gallehaltiger Flüssigkeiten (zuerst grün, dann blau, violett, roth und endlich gelb) nur durch den von Berzelius (3) Cholepyrrhin genannten Farbstoff und nicht von den wesentlichen Gallenbestandtheilen veranlaßt werde, also auch nur als Kennzeichen der Gegenwart dieses Körpers benützt werden könne.

Chloroform.
Seine
Ausmittelung
im Blut.

Das Chloroform zerfällt in der Glühhitze in Kohle, Chlorwasserstoff und Chlor. Auf diesem Verhalten beruht eine von Ragsky (4) beschriebene Methode der Nach-

(1) Pogg. Ann. LXX, 122; J. pr. Chem. XL, 319. — (2) Pogg. Ann. LXX, 136. — (3) Berzelius' Jahresber. XXII, 562. — (4) Aus den Ber. über Mitth. von Freunden der Naturwissensch. in Wien III, 482 in J. pr. Chem. XLVI, 170; Arch. Pharm. [2] LVI, 74; Pharm. Centr. 1849, 220.

weisung dieses Körpers im Blut. Man bringt, sogleich nach seiner Entleerung aus dem Organismus, mindestens eine Unze des Bluts in eine Flasche, die durch einen Kork mit einer knieförmig gebogenen, am horizontalen Arme etwas dünner ausgezogenen Röhre verbunden ist. In das Ende des Rohrs bringt man einen mit Jodkaliumkleister bestrichenen Papierstreifen, erhitzt dasselbe am ausgezogenen Theile zum Glühen, und erwärmt die Flasche im Wasserbade. Das verdampfende Chloroform wird an der glühenden Stelle zersetzt, und das freigewordene Chlor bläut den Papierstreifen. Ragsky hat in dieser Art noch 1888 Chloroform im Blute deutlich nachgewiesen.

Nach Piria (1) löst sich das Gewebe von Flachs oder Hanf in concentrirter Schwefelsäure auf, während das Fibrin eines darauf haftenden Blutfleckens nicht verändert wird, sondern nur eine Art Netz erzeugt, an welchem man die Eindrücke des Gewebes, auf dem der Blutfleck war, erkennt.

Erkennung
von
Blutflecken.

Chatin und Bouvier (2) schlagen vor, da das Fibrin in dem menschlichen Blute öfters nur schwierig abzuscheiden ist, demselben eine gewisse Portion Blut eines größeren Säugethiers, in welchem man den Fibringehalt durch einen zweiten Versuch ermittelt, zuzusetzen, wo alsdann die Fibrinabsonderung durch Schlagen vollständiger gelinge.

Fibrin.

Anhang zur analytischen Chemie.

Nach R. A. Smith (3) enthält das in Städten fallende Regenwasser organische Materie, gewöhnlich (in Manchester?) über 0,001 Procent. Regenwasser, nach 30stündigem Regen aufgefangen, gab ihm 0,0027 Procent Chlor und 0,00343 Schwefelsäure. Er fand das Regenwasser oft alkalisch, wie er glaubt von kohlen. Ammoniak; die Luft oft sauer. —

Regen-
wasser.

(1) J. chim. méd. [8] IV, 168. — (2) J. chim. méd. [8] IV, 145. —
(3) Phil. Mag. [8] XXX, 478; Chem. Soc. Mem. III, 311.

Wasser von Torfboden enthalte eine Substanz, welche bei dem Verbrennen nach Torf rieche; der Fluß Dee bei Chester enthalte in der Gallone 25 Grains solcher organischen Materie. Flußwasser in der Nähe einer Sta- hingegen gebe einen Rückstand, welcher bei dem Verbrennen den Geruch sich zersetzender Proteinverbindungen hervorbringe. In Brunnenwasser zu Manchester fand er bis zu 14 Grains organische Materie und Ammoniaksalze, und bis zu 70 Grains salpeters. Salze auf die Gallone Wasser.

Brunnen-
und Fluß-
wasser.
Deutsche und
dänische.

Ragsky hat das Wasser zweier artesischer Brunnen in Wien untersucht, A (1) eines nächst der Mariahilf Linie und B (2) des auf dem Bahnhof der Wien-Raab Eisenbahn. Unter C geben wir einen Auszug aus Joh. strug's (3) Untersuchung *Kopenhagener Brunnenwasser*. Bei A ist der Gehalt in Wiener Granen für 16 Unzen Wasser angegeben, bei B und C ist er auf 10000 Theile Wasser bezogen.

	A	B	C
Kohlens. Kalk	2,800	0,0078	2,68 bis 5,
„ Magnesia	0,694	0,0043	0,19 „ 0,
„ Natron	—	0,6887	—
„ Eisenoxydul	0,010	0,0010	—
Chlorkalium	—	—	—
Chlornatrium	—	0,2893	0,51 „ 7,
Chlorcalcium	0,099	—	—
Chlormagnesium	1,553	—	0,26 „ 0,
Schwefels. Kali	—	—	0 „ 0,
„ Kalk	1,979	—	0,09 „ 0,
„ Magnesia	—	—	0 „ 0,
Salpeters. Natron mit etwas Kali	0,977	—	—
„ Magnesia	1,155	—	—
Phosphorsaurer Kalk	—	—	0,07 „ 0,
Kieselerde	0,132	0,0122	0,18 „ 0,
Verlust und organische Substanzen	0,146	0,0237	—
Flüchtige Verbindungen	—	—	0 „ 0,
Freie Kohlensäure	2,18	—	—

(1) Berichte von Freunden der Naturwissensch. in Wien III, 90; pr. Chem. XLVI, 220. — (2) Berichte von Freunden der Naturwissensch. in Wien II, 121. — (3) Aus Arch. for Ph. og techn. Ch. in Jahrb. f. Pharm. XVII, 286.

Müller (1) hat das Wasser der *Maas* und verschiedener Brunnen in *Rotterdam*, auch das *Nordseewasser* bei Scheveningen und das Wasser des *Rheins* bei Emmerich untersucht. Er giebt den Gehalt an festen Bestandtheilen für 2 Civilpfund Wasser, ohne zu sagen, welches Civilpfund gemeint ist und in welcher Gewichtseinheit jener Gehalt ausgedrückt ist. Wir übergehen deshalb die specielleren Resultate. — Kane's Analysen des *Lys-u. a. Wassers* sind im Bericht über technische Chemie (bei Flachscultur) mitgetheilt.

Brunnen- und
Flußwasser.
Niederländische.

Boutron-Charlard und O. Henry (2) haben untersucht die Zusammensetzung der Wasser, welche die öffentlichen Springbrunnen zu Paris speisen: des Wassers der *Seine*, und zwar Proben geschöpft am Pont d'Ivry (A), am Pont Notre-Dame (B), an der Pompe du Gros-Cailou (C) und an der Pompe de Chaillot (D), des Wassers der *Marne* (E), des von *Arcueil* zugeleiteten Wassers (F; über die Zusammensetzung des Absatzes daraus vergl. S. 1012), das Wasser des artesischen Brunnen zu *Grenelle* (G), und das Wasser des Canal de l'Ourcq (H). Folgende Zusammenstellung giebt an, wie viel Gramme fester Bestandtheile und wieviel Liter Gas in 1 Liter Wasser enthalten sind.

Französische.

	A	B	C	D	E	F	G	H
2fach-kohlens. Kalk	0,132	0,174	0,229	0,230	0,301	0,158	0,0292	0,158
„ „ Magnesia	0,060	0,062	0,075	0,076	0,120	0,060	0,0092	0,075
„ „ Kali	—	—	—	—	—	Spur	0,0100	—
Schwefels. Kalk	0,020	0,039	0,040	0,040	0,022	0,138	—	0,080
„ Magnesia	0,010	0,017	0,027	0,030	0,018	0,072	—	0,095
„ Natron	—	—	—	—	—	—	0,0320	—
„ Kali	—	—	—	—	—	—	—	—
Chlorcalcium	—	—	—	—	—	—	—	—
Chlormagnesium	0,010	0,025	0,032	0,032	0,020	0,081	—	0,113
Chlornatrium	—	—	—	—	—	—	0,0570	—
Chlorkalium	—	—	—	—	—	—	—	—
Kalisalze	Spur	Spur	Spur	Spur	—	—	—	—
Salpeters. Alkali	Spur	Spur	Spur	Spur	Spur	Spur	—	Spur
Kieselerde	—	—	—	—	—	—	0,0100	—
Thonerde	0,008	0,014	0,023	0,024	0,030	0,018	0,0020	0,069
Eisenoxyd	—	—	—	—	—	—	—	—
Organische Materie	Spur	Spur	Spur	Spur	Spur	Spur	Spur	Spur
Gesammtgewicht d. fest. Bestandtheile	0,240	0,331	0,426	0,432	0,511	0,527	0,1494	0,590
Atmosphär. Luft	0,003	0,003	0,004	0,003	Spur	0,004	—	—
Freie Kohlensäure	0,018	0,014	0,014	0,013	0,013	0,070	—	—

(1) Arch. Pharm. [2] XLIX, 10. — (2) J. pharm. [8] XIV, 161.

Brunnen- und
Flusswasser.
Französische.

Deville (1) hat die Zusammensetzung folgender Wasser untersucht: der *Garonne* bei Toulouse (A), der *Seine* bei Bercy (B), des *Rheins* bei Straßburg (C), der *Loire* bei Orleans (D), der *Rhone* bei Genf (E), des *Doubs* bei Rivotte (F), der Quellwasser von Mouillère (G), Billecul (H), Arcier (I) und Bregille (K) bei *Besançon*, von Suzon (L) bei *Dijon* und von *Arcueil* (M) bei *Paris*; der Brunnen in der Grand' Rue (N), der Rue de la Préfecture (O) und an der Faculté des Sciences (P) zu *Besançon*. Er bestimmte außer der Zusammensetzung jedes Wassers im Ganzen auch das des Niederschlags nach einstündigem Kochen, des unlöslichen und des löslichen Theils des Verdampfungsrückstands. Wir geben hier seine Resultate über die Zusammensetzung jedes Wassers im Ganzen; die Zahlen der folgenden Zusammenstellung geben den Gehalt von 10 Liter Wasser an festen Bestandtheilen in Milligrammen, an freien Gasen (diese trocken, bei 0° und unter 760^{mm} Druck gedacht) in Cubikcentimetern. Dasselbe gilt für Grange's Analyse des Wassers der *Isère* bei Grenoble (Q) (2). Grange (3) hat außerdem das Wasser mehrerer Bäche des Isère-Thals, welche über verschiedenen zusammengesetzten Boden fließen, an mehreren Stellen ihres Laufs untersucht, und Folgerungen gezogen in Hinsicht auf die Abhängigkeit des Gehalts an festen Bestandtheilen von der geologischen Beschaffenheit des Bodens, und in Hinsicht auf den Gehalt des Trinkwassers an Magnesiasalzen als Ursachen des Vorkommens von Kropf, Rhachitismus u. s. w.; bezüglich der Einzelheiten müssen wir auf die Abhandlung selbst verweisen.

(1) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 82; im Ausz. Arch. Pharm. [2] LV, 301. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 496. — (3) Vollständig Ann. ch. phys. [3] XXIV, 464. Die Folgerungen auch Compt. rend. XXVII, 358; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 903.

	A	B	C	D	E	F	G	H	Brunnen- und Flußwasser. Iranselache.
Kieselerde	401	244	488	406	238	159	250	246	
Thonerde	—	5	25	71	39	21	43	43	
Eisenoxyd	81	25	58	55	—	30	—	—	
Kohlens. Kalk	645	1655	1356	481	789	1910	2573	2561	
„ Magnesia	34	27	50	61	49	23	—	46	
„ Manganoxydul	30	—	—	—	—	—	—	—	
Schwefels. Kalk	—	269	147	—	466	—	51	100	
„ Magnesia	—	—	—	—	63	—	—	—	
Chlorcalcium	—	—	—	—	—	—	7	71	
Chlormagnesium	—	—	—	—	—	5	20	40	
Chlornatrium	32	123	20	48	17	23	—	—	
1½fach kohlens. Natron	65	—	—	—	—	—	—	—	
1fach kohlens. Natron	—	—	—	146	—	—	—	—	
Schwefels. Natron	53	—	135	34	74	51	—	—	
„ Kali	76	50	—	—	—	—	—	—	
Salpeters. Kali	—	—	38	—	40	41	23	44	
„ Natron	—	94	—	—	45	39	118	156	
„ Magnesia	—	52	—	—	—	—	—	—	
Kiesels. Kali	—	—	—	44	—	—	—	—	
Gesammtgewicht der festen Bestandtheile	1367	2544	2317	1346	1820	2302	3085	3307	
Freie Kohlensäure	170	162	76	18	79	178	390	267	
„ Stickstoff	79	120	159	202	184	182	154	101	
„ Sauerstoff	157	39	74	—	84	96	64	49	

	I	K	L	M	N	O	P	Q
Kieselerde	390	348	152	306	314	297	551	37
Thonerde	90	65	10	53	94	62	39	35
Kohlens. Kalk	2139	2079	2300	1990	2156	2017	2331	1037
„ Magnesia	78	43	38	82	85	207	76	25
Schwefels. Kalk	—	74	—	1638	802	663	2660	208
„ Magnesia	—	—	—	—	—	—	—	302
Chlorcalcium	—	11	—	—	—	238	199	—
Chlormagnesium	—	27	—	166	72	255	615	7
Chlornatrium	20	—	32	376	557	15	—	36
1fach kohlens. Natron	69	—	21	—	—	—	—	—
Schwefels. Natron	45	—	27	54	—	—	—	90
„ Kali	—	—	—	201	57	—	—	—
Salpeters. Kali	Spur	23	27	—	899	786	535	—
„ Natron	—	48	—	—	304	870	1229	—
„ Magnesia	—	—	—	570	—	—	—	—
„ Kalk	—	81	—	—	—	—	381	—
Gesammtgewicht der festen Bestandtheile	2831	2799	2607	5436	5340	5410	8616	1876
Freie Kohlensäure	208	226	237	256	202	263	350	110
„ Stickstoff	153	142	167	127	171	157	202	30
„ Sauerstoff	59	72	75	50	43	41	44	—

Brunnen- und
Flußwasser.
Englische.

Clark (1) hat das Wasser der *Themse* bei Twickenham (A) untersucht; Abel und Rowney (2) das in einem artesischen Brunnen, Trafalgar Square zu London, aus 400 Fufs Tiefe aufsteigende, sehr weiche Wasser (B). In der folgenden Zusammenstellung ist für diese Arten Wasser angegeben, wie viele Gramme fester Bestandtheile und wie viele Cubikcentimeter freier Kohlensäure in 10000 Grammen Wasser enthalten sind; für Giles' (3) Analyse eines Brunnenwassers von *Wolverton* (C), und Th. J. Herapath's (4) Analyse des Wassers des Flusses *Exe*, bei Exeter geschöpft, (D) hingegen, wie viel Grains in 1 Gallone (dem Raume von 70000 Grains Wasser) enthalten sind. (Bezüglich einer Angabe von Smith über die *Manchester*-Brunnenwasser vergl. S. 994).

	A	B	C	D
Spec. Gewicht	1,0003	1,00009	1,00067	—
• Schwefels. Magnesia	—	—	—	0,160
" Kali	0,09542	1,95300	—	—
" Natron	0,28573	1,24990	14,324	0,080
" Kalk	0,06439	—	—	3,040
Chlormagnesium	—	—	—	0,640
Chlorcalcium	0,25003	—	—	Spur
Chlornatrium	—	2,86550	6,003	4,240
Kohlens. Kalk	1,82278	0,46500	10,960	0,896
" Magnesia	0,14673	0,32200	2,319	0,064
" Natron	—	2,57840	6,576	—
Salpeters. Kalk	—	—	—	0,160
Phosphorsäure	Spur	—	—	—
Phosphors. Natron	—	0,04160	—	—
" Kalk	—	0,00486	—	Spur
" Eisen	—	—	0,540	—
Quellsaure Magnesia	—	—	—	Spur
Quellsäure	—	0,01960	—	—
Quellsatzsäure	—	0,01410	—	—
Organische Materie	0,49717	0,09600	2,850	1,600
Eisenoxyd	Spur	—	—	—
Thonerde	Spur	—	0,260	—
Kieselerde	0,03902	0,13100	0,200	Spur
Verlust	0,01158	0,17404	—	—
Summe der festen Bestandtheile	3,21285	9,91500	44,032	10,880
Freie Kohlensäure	51,34	803,9	—	—

(1) Chem. Soc. Qu. J. I, 155; Pharm. Centr. 1848, 650. — (2) Chem. Soc. Qu. J. I, 97. — (3) Pharm. J. Trans. VIII, 75. — (4) Chem. Gaz. 1848, 429.

Bull (1) untersuchte das sehr harte Wasser verschiedener Brunnen (A bis E) zu *Hartford* in Connecticut in Nordamerika, und fand in 10000 Gewichtstheilen Wasser :

	A	B	C	D	E
Spec. Gewicht	1,0008	1,0004	1,0001	1,0008	1,0011
Schwefelsauren Kalk	0,69	0,61	0,30	0,79	0,89
Chlormagnesium	0,41	0,23	0,22	0,81	0,41
Chlorcalcium	1,12	0,70	0,39	—	1,79
Chlornatrium	1,91	—	—	—	2,67
Kohlensaur. Kalk	2,25	1,31	0,21	1,48	—
„ Magnesia	0,19	—	—	—	1,51
Quellsaure Magnesia	—	0,13	0,76	0,44	—
Kohlens. Natron, quellsaurem äquivalent	0,22	1,09	1,19	2,35	2,67
Eisenoxyd	0,04	0,38	—	0,04	Spur
Thonerde	—	—	0,14	—	
Kalk	—	—	—	0,23	—
Kieselerde	0,18	0,60	0,14	0,04	0,10
Verlust	0,10	0,46	—	0,18	1,78
Summe der festen Bestandtheile	7,11	5,51	3,31	6,36	11,82

Calamai (2) hat das Wasser der Lagunen von Venedig (A; spec. Gewicht 1,0184) und das aus dem Hafen von Livorno (B; spec. Gewicht 1,0231) untersucht; Usiglio (3) das Wasser aus dem mittelländischen Meere in der Nähe von Cette (in 3000 bis 5000 Meter Abstand vom Ufer und in 1 Meter Tiefe geschöpft; C; spec. Gewicht 1,0258). Für diese Arten Meerwasser giebt die folgende Zusammenstellung den Gehalt in 10000 Gewichtstheilen; in einer Analyse des Meerwassers, welches einige Lieues von der Küste bei Havre geschöpft war (D; es enthält auch Spuren von Eisen- und Manganoxyd, von kohlens. und phosphors. Magnesia), von Figuier und Mialhe (4), ist der Gehalt in 10 Liter nach Grammen angegeben.

Meerwasser.

(1) Sill. Am. J. [2] IV, 385; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 319.
 — (2) Aus Gazzetta Toscana delle scienze medico-fisiche, 1847, 113 in J. pr. Chem. XLV, 235. — (3) Compt. rend. XXVII, 429; J. pr. Chem. XLVI, 106. — (4) J. pharm. [3] XIII, 406.

Meerwasser.	A	B	C	D
Eisenoxyd	—	—	0,03	Spur
Kohlens. Kalk	—	—	1,14	1,32
Schwefels. Kalk	6,020	8,940	13,57	12,10
„ Magnesia	27,500	30,900	24,77	24,62
„ Kali	—	—	—	0,94
Brommagnesium	—	—	—	0,30
Chlormagnesium	25,910	30,260	32,19	29,05
Chlorkalium	8,330	11,111	5,05	—
Bromnatrium	—	—	5,56	1,03
Chlornatrium	223,459	261,908	294,24	257,04
Kiesels. Natron	—	—	—	0,17
Im Ganzen	291,219	343,119	376,55	326,57

J. Davy (1) hat das spec. Gewicht von Meerwasser bestimmt, welches in verschiedenen Entfernungen von der Küste von Guiana im Juni 1847 geschöpft war; die erste Zeile giebt die Entfernung von George-Town (an der Mündung des Demerara) in englischen Meilen, die zweite das zugehörige spec. Gewicht :

0	$\frac{1}{2}$	11	19	27	35	43	51	80
1,0036	1,0991	1,0210	1,0236	1,0249	1,0236	1,0249	1,0258	1,0266

Jackson (2) hat Meerwasser analysirt, welches Wilkes in verschiedenen Tiefen geschöpft hatte. A ist Meerwasser, geschöpft am 4. März 1839 in 100 Fathoms Tiefe unter 63° 18' S. B. und 55° W. L.; Temperatur in dieser Tiefe = - 1°,1, am Meeresspiegel - 0°,6; spec. Gewicht 1,026. B ist geschöpft am 29. Juli 1839 in 450 Fathoms Tiefe unter 17° 54' S. B. und 112° 53' W. L.; Temperatur in dieser Tiefe + 6°,9, am Meeresspiegel 23°,3; spec. Gewicht 1,0275. — In so viel Seewasser, als das Volum von 1000 Grains destillirtem Wasser erfüllt, ist enthalten nach Grains :

	Cl	SO ₂	CO ₂	PO ₄	NaO u. Na	MgO	CaO	Fe ₂ O ₃	im Ganzen
A	20,73	1,29	1,29	0,06	10,12	1,64	0,83	Spur	36,00
B	20,40	2,43	0,68	0,09	10,76	2,48	1,06	Spur	37,90

(1) Aus Edinb. new phil. Journ. XLIV, 43 in Pharm. Centr. 1848, 271. — (2) Aus den Proceedings of the 9. Annual Meeting of the Americ. Assoc. of Geol. and Nat. at Boston 1847, in Sill. Am. J. [2] V, 41; J. pr. Chem. XLVI, 110; Pharm. Centr. 1848, 287.

Hinsichtlich Müller's Analyse des Nordseewassers bei Scheveningen vergl. S. 995.

Fehling (1) hat die Soolen der Württembergischen Salinen untersucht: A von *Friedrichshall*, B von *Clemenshall*, C von *Hall*, D von *Sulz*, E von *Wilhelmshall bei Rottenmünster*, F und G (aus zwei Bohrlöchern) von *Wilhelmshall bei Schwenningen*; Deneke (2) die von *Werl* in Westphalen (H; sie enthält auch Spuren von Jod- und Brommagnesium und Thonerde); C. Bromeis (3) die des großen Sool-sprudels zu *Nauheim* (I; sie enthält auch Spuren organischen Substanzen).

Salssoolen
u. Mineral-
wasser.
Deutsche und
schweizerische.

Die folgende Zusammenstellung giebt den Gehalt in 100 Theilen Soole:

	A	B	C	D	E
Spec. Gewicht	1,2028	1,2051	1,1990	1,1845	1,2026
Chlornatrium	25,5625	25,9021	25,7180	23,4733	25,6251
Chlormagnesium	0,0059	Spur	—	—	Spur
Schwefels. Kalk	0,4374	0,4445	0,1705	0,5080	0,4613
„ Magnesia	0,0221	—	—	—	—
„ Natron	—	0,0197	0,0289	—	0,0051
Kohlens. Kalk	0,0100	0,0195	0,0037	0,0162	0,0297
Summe der festen Bestandth.	26,0379	26,3859	25,9211	23,9975	26,1212

	F	G	H	I
Spec. Gewicht	1,1987	1,2004	1,0567	1,0213
Chlornatrium	25,1570	25,2794	6,5183	2,3600
Chlormagnesium	—	—	0,1345	0,0339
Chlorcalcium	0,0134	0,0276	0,2527	0,1935
Chlorkalium	—	—	0,0022	0,0524
Schwefels. Kalk	0,4652	0,4553	0,2030	0,0052
Brommagnesium	—	—	—	0,0010
2fach kohlens. Kalk	—	—	—	0,2133
„ „ Eisenoxydul	—	—	—	0,0066
„ „ Manganoxydul	—	—	—	0,0020
Kohlens. Kalk	0,0290	0,0278	0,1010	—
„ Magnesia	—	—	0,0155	—
„ Eisenoxydul	—	—	0,0186	—
Kieselerde	—	—	0,0355	0,0021
Summe der festen Bestandth.	25,6646	25,7901	7,2813	2,8700
Freie Kohlensäure	—	—	0,0672	0,0928

(1) Chemische Untersuchung der Soolen, des Stein- und Kochsalzes sowie der Mutterlaugen der württembergischen Salinen, Stuttgart 1847; Würt-

Salzsoolen
und Mineral-
wasser.
Deutsche und
schweizerische.

Will (4) untersuchte das Wasser der Josephsquelle (A), Wenzelsquelle (B) und Leopoldsquelle (C) zu *Ripoldsau*; Liebig (5) das Bitterwasser von *Friedrichshall* bei Hildburghausen (D), in welchem auch unwägbare Mengen von Eisenoxyd, Thonerde, Kieselerde und Ammoniaksalzen enthalten sind, und (6) das Mineralwässer zu *Liebenstein* in Sachsen-Meiningen (E), in welchem auch unwägbare Mengen von phosphors. Thonerde, arsenigs. Eisenoxyd, Quellsäure, Quellsatzsäure und organischer Materie enthalten sind. Graeger (7) untersuchte das Wasser der Mineralquelle zu *Popperode bei Mühlhausen* (F), welches auch Spuren von Chlorkalium enthält; van Kerckhoff (8) das Mineralwasser von *Mondorff* bei Luxemburg (G), welches auch Spuren von Mangan, Kupfer, Zinn und organischen Stoffen, und 0,000027 pC. arsenige Säure und 0,000013 antimonige Säure enthält; Hruschauer (9) das von

temberg. naturwissenschaftl. Jahreshfte IV, 36; im Ausz. J. pr. Chem. XLV, 276; Pharm. Centr. 1848, 293. Bezüglich der zahlreichen Analysen von verschiedenem Kochsalz, den Mutterlaugen, Pfannensteinen u. s. w. müssen wir auf die Abhandlung selbst verweisen. Die Mutterlaugen von Kreuznach, Friedrichshall, Offenau, Hall, Ludwigshall und Rappénau hat auch Rieckher untersucht (Chemische Unters. einiger Soolmutterlaugen, Marbach 1846; Jahrb. pr. Pharm. XV, 217. 289. 361; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 733). — Die Mutterlange der Saline Pyrmont wurde von Hugi untersucht (Arch. Pharm. [2] L, 143; J. pr. Chem. XLII, 464; Pharm. Centr. 1847, 702); die von Sassendorf bei Soest durch Müller (Arch. Pharm. [2] L, 148; J. pr. Chem. XLII, 464; Pharm. Centr. 1847, 752); durch denselben die von Salzkotten und von Westernkotten in Westphalen (Arch. Pharm. [2] LI, 40; Pharm. Centr. 1847, 719); durch Deneke die von Werl daselbst (Ann. Ch. Pharm. LXV, 100; Pharm. Centr. 1848, 208). — (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 100; Pharm. Centr. 1848, 208. — (3) Jahresbericht der Wetterauischen Gesellschaft für 1844, 47. — (4) Ann. Ch. Pharm. LXI, 181; Pharm. Centr. 1847, 507. — (5) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 127; J. pr. Chem. XLII, 463; Pharm. Centr. 1847, 828; J. pharm. [3] XIII, 65. — (6) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 221; J. pr. Chem. XLII, 462; Pharm. Centr. 1847, 828; J. pharm. [3] XIII, 49. — (7) Arch. Pharm. [2] XLIX, 1; J. pr. Chem. XLII, 466; Pharm. Centr. 1847, 461. — (8) J. pr. Chem. XLIII, 350; Pharm. Centr. 1848, 454. — (9) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 229; J. pr. Chem. XLII, 466; Pharm. Centr. 1847, 829; J. pharm. [3] XIII, 49.

Kostreinz in Steyermark (H); **Fellenberg** (I) das von **Salzsäuren** und **Mineral-**
Weissenburg im Canton Bern (I), welches auch Spuren von **wasser.**
ithion und **Jod** enthält. **Deutsche und**
schweizer-
riechen.

Die folgende Zusammenstellung giebt den Gehalt für
 10000 Gewichtstheile

	A	B	C	D	E
pec. Gewicht	1,00385	1,00359	1,00371	1,0223	1,0025
schwefels. Natron . . .	12,4776	9,8039	5,9411	60,560	2,2056
" Kali	0,5114	0,2265	0,2440	1,982	0,2757
" Magnesia	2,3801	1,8273	3,6423	51,502	—
" Kalk	0,8463	0,8335	0,2203	13,465	0,2650
chlormagnesium	0,7957	0,7498	0,4421	39,390	1,2814
chlornatrium	—	—	—	79,560	2,7680
kohlens. Kalk	11,1835	9,5400	13,3300	0,147	5,5196
" Magnesia	0,2416	0,2500	1,4312	5,198	1,4161
" Eisenoxydul . . .	0,4037	0,2650	0,6250	—	0,7761
strontmagnesium	—	—	—	1,140	—
thonerde	0,0953	0,0840	0,0822	Spur	—
kieselerde	0,5180	0,4340	0,6790	Spur	0,0909
Summe d. festen Bestandth.	29,4632	24,0140	26,6372	252,944	14,5984
freie Kohlensäure . . .	28,8095	25,6037	29,8420	4,020	23,4292

	F	G	H	I
pec. Gewicht	1,00307	1,01131	1,00858	—
schwefels. Natron . . .	—	—	0,075	0,375
" Kali	—	—	0,284	0,179
" Magnesia	—	—	—	3,463
" Kalk	8,466	16,415	—	10,488
" Strontian	—	—	—	0,142
chlorcalcium	—	31,660	—	—
chlormagnesium	—	4,240	—	—
chlornatrium	15,900	87,212	3,126	0,069
chlorkalium	—	2,059	—	—
kohlens. Kalk	0,811	0,855	1,369	0,524
" Magnesia	1,950	0,064	3,092	0,398
" Eisenoxydul . . .	—	0,225	0,225	—
" Natron	—	—	61,013	—
strontmagnesium	—	0,989	—	—
strontmagnesium	—	0,001	—	—
phosphors. Kalk	—	—	—	0,092
eisensch-phosph. Thonerde	—	—	0,163	—
kiesels. Natron	—	—	—	0,140
kieselerde	Spur	0,072	0,335	0,209
eisenoxyd	—	—	—	0,018
Summe d. festen Bestandth.	27,127	143,796	69,632	16,097
freie Kohlensäure . . .	—	0,806	35,801	—
stickgas	—	0,228	—	—

(1) J. pharm. [3] XI, 259; J. pr. Chem. XLII, 467; Pharm. Centr.
 1847, 415.

Salzsäuren
und Mineral-
wasser.
Deutsche und
schweize-
rische.

In den folgenden Analysen ist angegeben, wie viel Gran fester Bestandtheile und wie viel Cubikzoll Kohlensäure u. a. in 7680 Gran (16 Unzen) Mineralwasser enthalten sind; und zwar nach Witting (1) für die Friedrich-Wilhelms- und die Seraphinenquelle (A) und die St. Annaquelle (B) zu *Levern* im preufs. Reg. Bez. Minden, welche alle auch Spuren von Jod und Brom enthalten; nach demselben (2) für die Schwefelquelle zu *Lipp Springs* (C), welche auch noch Spuren von Jod, Kali und Thonerde enthält; nach Pettenkofer (3) für das Mineralwasser von *Kochel* im bairischen Oberland (D), nach Lade (4) für das Wasser des Kochbrunnens zu *Wiesbaden* (E), in welchem auch Spuren von Ammoniak, Lithion, Mangan, Thonerde, Phosphorsäure und organischer Materie nachgewiesen wurden.

	A	B	C	D	E
Spec. Gewicht	—	—	—	1,001	1,0062
Schwefels. Kalk	4,41	3,25	13,28	—	0,7219
„ Natron	2,19	2,25	—	2,688	—
„ Magnesia	0,53	1,25	1,30	—	—
2fach kohlens. Natron . .	—	—	—	8,456	—
Kohlens. Natron	—	—	0,44	—	—
„ Kalk	4,41	5,25	1,43	0,168	3,2141
„ Magnesia	—	—	0,36	Spur	0,0507
„ Eisenoxydul	1,10	0,28	—	—	0,0668
Chlorkalium	—	—	—	Spur	1,3816
Chlornatrium	—	—	0,06	0,050	53,2209
Chlorcalcium	0,66	0,75	0,46	—	3,6088
Chlormagnesium	0,26	0,50	0,14	—	1,2096
Brommagnesium	—	—	—	—	0,1290
Phosphors. Eisenoxydul .	—	—	—	0,560	—
„ Manganoxydul	—	—	—		—
Kieselerde	Spur	Spur	Spur	Spur	0,4785
Organische Substanzen . .	—	—	Spur	0,853	—
Summe d. festen Bestandth.	13,56	13,53	17,47	12,775	64,0819
Freie Kohlensäure	5,25	7,50	1,120	5,183	10,00
Atmosphär. Luft	0,25	1,00	1,060	—	—
Stickgas		0,50	—	—	—
Schwefelwasserstoffgas . .	0,12	Spur	2,015	Spur	—

(1) Arch. Pharm. [2] L, 31. — (2) Arch. Pharm. [2] LI, 280. —
(3) Repert. Pharm. [2] XLVII, 375; Arch. Pharm. [2] LV, 180; Pharm.
Centr. 1847, 911. — (4) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 170; Pharm. Centr.
1848, 875.

Das Wasser des Kochbrunnens zu *Wiesbaden* (A) haben auch Figuiet und Mialhe (1) untersucht, außerdem auch das der Quellen im Kölnischen Hof (B) und im Adler (C) daselbst; das der Quellen No. 2 (D) und No. 5 (E) zu *Nauheim*; das der Elisabethquelle (F) und der Kaiserquelle (G) zu *Homburg*; das der Quelle No. 6a (H) und No. 6b (I) zu *Soden*, welche beide letzteren auch Spuren von Thonerde enthalten. Die folgende Zusammenstellung giebt den Gehalt nach Grammen in 1 Liter Wasser.

Salzsäuren
und Mineral-
wasser.
Deutsche und
schweizer-
rische.

	A	B	C	D	E
Chlornatrium	7,332	6,791	7,316	23,046	27,333
Chlormagnesium	0,246	0,280	0,254	3,760	2,653
Chlorkalium	0,038	0,101	0,043	1,005	—
Schwefels. Kalk	0,085	0,136	0,098	0,627	0,047
Kohlens. Kalk	0,180	0,150	0,450	1,095	1,280
„ Magnesia	0,008	Spur	Spur	—	—
„ Eisenoxydul	0,009	0,010	0,015	0,121	0,016
Brommagnesium	0,019	0,016	0,008	0,090	0,100
Kiesels. Natron	0,183	Spur	0,041	0,039	0,005
Summe der festen Bestandtheile . . .	8,100	7,484	8,225	29,783	31,434

	F	G	H	I
Chlornatrium	10,649	16,021	14,327	10,898
Chlormagnesium	1,187	1,302	0,311	0,284
Chlorkalium	0,030	0,027	0,207	0,229
Schwefels. Kalk	0,027	0,018	0,094	0,082
Kohlens. Kalk	0,940	1,027	0,540	0,979
„ Magnesia	0,360	Spur	0,108	0,098
„ Eisenoxydul	0,043	0,097	0,045	0,037
Kiesels. Natron	0,064	0,031	0,061	0,064
Summe der festen Bestandtheile . . .	13,300	18,523	15,691	12,671

Figuiet und Mialhe vergleichen diese Mineralwasser mit französischen, von welchen sie untersucht haben das von *Niederbronn* im Elsaß (A, welches auch Spuren von Mangan enthält), das der Source de la Place (B) und der Source de l'intérieur de l'établissement (C) zu *Bourbonne*, und das von *Balaruc* (D). Sie machen darauf aufmerksam, wie man durch Mischen von Meerwasser, dem der genannten

Französische.

(1) J. pharm. [3] XIII, 401; J. chim. méd. [3] IV, 635; Pharm. Centr. 1848, 662.

Salzseen
und Mineral-
wasser.
Französische.

französischen Mineralwasser und gewöhnlichem Wasser die Zusammensetzung deutscher Mineralwasser nachahmen könne.

— Dieselben (1) haben untersucht das Mineralwasser von *Rieumajou* bei *Salvétat* im Dep. de l'Herault (E); *Legrip* (2) das von *Doulauz* im Dep. der Creuse (F); *Girardin* (3) das Wasser der Quellen St. Paul (G) und *la Maréquerie* (H) zu *Rouen*; E. *Marchand* (4) das von *Valmont* (I), welches auch 0,00087 eines grünen, in Wasser nicht, in Aether schwer, in Alkohol leichter löslichen Harzes und sehr geringe Spuren von Kupfer enthält. In folgender Zusammenstellung ist für 1 Liter Wasser der Gehalt an festen Bestandtheilen nach Grammen und an Kohlensäure nach Cubikcentimetern angegeben.

	A	B	C	D	E
Chlornatrium	3,070	5,783	5,771	6,802	0,007
Chlormagnesium	0,288	0,392	0,381	1,074	—
Chlorkalium	0,260	—	—	—	—
Chlorcalcium	0,825	—	—	—	—
Bromnatrium	0,040	0,065	0,064	0,003	—
Brommagnesium	—	—	—	0,032	—
Schwefels. Kalk	0,090	0,899	0,879	0,803	—
„ Kali	—	0,149	0,129	0,053	—
„ Natron	—	—	—	—	0,029
Kohlens. Natron	—	—	—	—	0,214
„ Kalk	0,120	0,108	0,098	0,270	0,770
„ Magnesia	—	—	—	0,030	0,060
„ Eisenoxydul	0,091	—	—	—	—
Kieselerde	—	—	—	—	0,071
Eisenoxyd	—	—	—	Spur	0,031
Thonerde	Spur	0,030	0,029	—	Spur
Kiesels. Natron	Spur	0,120	0,120	0,013	—
Organ. Subst. u. Verlust . .	—	—	—	—	0,048
Summe d. festen Bestandth. .	4,784	7,546	7,471	9,080	1,230
Freie Kohlensäure	—	—	—	—	739

(1) J. pharm. [3] XI, 338; J. pr. Chem. XLII, 465; Pharm. Centr. 1847, 431. — (2) J. chim. méd. [3] IV, 83; Pharm. Centr. 1848, 431. — (3) J. chim. méd. [3] IV, 643; J. pharm. [3] XV, 118. — (4) J. chim. méd. [3] IV, 698.

	F	G	H	I	Salzsäuren und Mineral- wasser. Französische.
Chlornatrium	0,0350	—	—	0,07297	
Chlormagnesium	—	0,028	0,041	Spur	
Chlorkalium	—	—	—	0,00949	
Chlorcalcium	—	0,046	0,087	0,00454	
Salpeters. Kalk	—	—	—	0,00382	
Schwefels. Kalk	—	0,008	0,012	0,01075	
„ Kali	—	—	—	0,00465	
„ Magnesia	—	0,006	0,008	—	
„ Eisenoxydul	—	Spur	0,001	—	
„ Thonerde	—	Spur	—	—	
Kohlens. Ammoniak	—	—	—	0,00227	
„ Kalk	0,0100	0,068	0,079	0,28865	
„ Magnesia	—	—	0,011	0,04514	
„ Eisenoxydul	0,0750	0,069	0,094	0,00558	
Quells. Eisenoxydul	—	—	—	—	
Kieselerde	0,0210	0,002	0,003	0,01260	
Thonerde	0,0074	—	—	—	
Organ. Subst. u. Verlust	0,0040	0,005	0,007	—	
Summe d. festen Bestandtheile	0,1524	0,232	0,343	0,46133	
Freie Kohlensäure	340	—	—	766	

Henry (1) hat untersucht das Mineralwasser von *Cassèjous* im Dep. des Aveyron (A, welches auch Spuren von Kali und Mangan und im Ocker von Arsen enthält); derselbe (2) das Wasser der Source Grande Grille (B), Source nouvelle (C), Source Prè-Salé (D) und Nouvelle-Source Célestins (E) zu *Vichy*, der Source du Puits (F), Source de l'Hôpital (G), Source des Dames (H), Source de l'Abattoir (I) zu *Cusset*, der ersten (K) und der zweiten (L) Quelle zu *Hauterive* (in allen diesen sind auch Spuren von Strontian, Lithion, Jod und Brom, organischer Materie und vielleicht auch von phosphor- und salpeters. Salzen enthalten). Folgende Zusammenstellung giebt für 1 Liter Wasser den Gehalt an festen Bestandtheilen nach Grammen und an Kohlensäure nach Liter.

(1) J. pharm. [3] XII, 241; J. pr. Chem. XLII, 462; Pharm. Centr. 1847, 879. — (2) J. pharm. [3] XIII, 5; Pharm. Centr. 1848, 264.

Salzsäuren und Mineral- wasser. Französische.		A	B	C	D	E	F
Zweifach kohlenst. Natron . .	—	4,900	4,840	4,700	4,137	4,62	
" " Kalk	0,030	0,167	0,094	0,445	0,277	0,38	
" " Magnesia	—	0,065	0,057	0,408	0,210	0,22	
" " Eisenoxydul	0,086	—	—	—	—	—	
Quellsaures Eisenoxydul . . .	—	—	—	—	—	—	
Schwefels. Natron	—	0,469	0,410	0,241	0,170	0,40	
" Kali	—	0,020	0,004	0,020	0,020	0,02	
" Kalk	0,074	—	—	—	—	—	
Kiesels. Thonerde	—	0,230	0,233	0,070	unbest.	0,08	
Eisen und Mangan	—	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00	
Kiesels. Natron	—	0,400	0,340	0,276	0,120	0,03	
Chlornatrium	0,060	0,538	0,500	0,295	0,358	0,38	
Chlorkalium	—	0,004	0,003	0,004	0,022	0,02	
Summe der festen Bestandtheile	0,250	6,734	6,482	6,860	5,315	6,15	
Freie Kohlensäure	0,67	0,231	0,272	0,310	0,501	1,04	

	G	H	I	K	L
Zweifach kohlenst. Natron . .	5,150	4,100	2,353	5,240	5,203
" " Kalk	0,661	0,200	0,158	0,140	0,120
" " Magnesia	0,330	0,039	0,405	—	—
Schwefels. Natron	0,502	0,440	1,034	0,320	0,275
" Kali	0,010	0,005	0,020	Spur	Spur
Kiesels. Thonerde	0,120	—	—	—	—
Eisen und Mangan	0,120	0,001	0,060	0,050	0,060
Kiesels. Natron	0,120	0,030	0,130	0,050	0,060
Chlornatrium	0,460	0,400	0,354	0,410	0,482
Chlorkalium	0,020	0,015	0,011	0,001	0,010
Summe der festen Bestandtheile	7,253	5,230	4,165	6,170	6,150
Freie Kohlensäure	0,280	0,480	0,640	0,511	0,502

Boullay und Henry (1) haben sich mit der Frage beschäftigt, in welchem Zustand der Schwefel in den Schwefelwassern von *Barzun* und *Barèges* in den Pyrenäen enthalten sei; sie kommen zu dem Schluss, dass diese Wasser ursprünglich ein Einfach-Schwefelmetall (Schwefelnatrium) enthalten; durch den Einfluss von Luftströmungen im Innern der Erde werde bewirkt, dass das Wasser an dem Ausflus Schwefelnatrium und veränderliche Mengen von Schwefelwasserstoff enthalte: keineswegs aber sei darin Schwefelnatrium-Schwefelwasserstoff als bestimmte chemische Verbindung enthalten.

(1) J. pharm. [3] XI, 177; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 510.

Das Wasser der *Mofetta di S. Quirico* in Toskana (A) hat Orosi (1) untersucht; Abbéne (2) hat das Mineralwasser von *Prè-Saint-Didier bei Courmayeur* in Piemont untersucht, das der oberen (B) und der unteren (C) Quelle (in beiden sind Spuren von Brom und Jod enthalten); Laminne (3) das von *Tongern* (D) in Belgien. Folgendes giebt den Gehalt in 1000 Theilen Wasser :

	A	B	C	D
Spec. Gewicht	—	1,00072	1,00123	—
Chlorkalium	0,0320	—	—	—
Chlornatrium	0,0188	0,036	0,050	0,0090
Chlormagnesium	0,0377	0,046	0,060	—
Chlorcalcium	—	—	—	—
Kohlens. Natron	—	—	—	0,0194
„ Kalk	1,1367	0,197	0,310	0,1080
„ Magnesia	0,2428	0,049	0,077	0,0274
„ Eisenoxydul	0,0741	—	—	—
„ Manganoxydul	0,0447	—	—	—
Schwefels. Kali	0,0150	Spur	Spur	0,0192
„ Natron	0,2100	0,134	0,270	—
„ Kalk	—	0,040	0,060	—
Phosphors. Natron	—	—	—	0,0010
Thonerde	0,0049	Spur	Spur	0,0020
Eisenoxyd	—	0,006	0,010	0,0060
Manganoxyd	—	0,002	0,003	—
Kieselerde	0,0697	0,016	0,020	—
Quellsäure	—	—	—	0,0040
Organische Substanz	0,0501	0,034	0,040	0,0140
Summe der festen Bestandtheile	1,9365	0,560	0,900	0,2100
Freie Kohlensäure	3,2940	—	—	—

Merck und Galloway (4) haben das Mineralwasser (Königsbad) von *Bath* (A) analysirt; Th. J. Herapath (5) das von *Beacon-Hill bei Bath* (B); Abel und Rowney (6) die Mineralwasser von *Cheltenham* : das eisenhaltige Cambridge-Wasser (C), das stark salzige Pitville-Wasser (D),

(1) Aus Gaz. Toscana 1847, 99 in Pharm. Centr. 1847, 413; J. pr. Chem. XLII, 468. — (2) J. pharm. [3] XII, 412; Pharm. Centr. 1848, 47. — (3) J. pharm. [3] XIII, 354; J. chim. méd. [3] IV, 461; Pharm. Centr. 1848, 512. — (4) Phil. Mag. [3] XXXI, 56; Chem. Soc. Mem. III, 262; Ann. Ch. Pharm. LXIII, 318; J. pr. Chem. XLII, 467; Pharm. Centr. 1847, 335. — (5) Chem. Gaz. 1848, 430. — (6) Chem. Soc. Qu. J. I, 198; Ann. Ch. Pharm. LXIX, 246; Pharm. Centr. 1849, 411.

Salzwollen
und Mineral-
wasser.
Englische.

das schwefelhaltige Wasser Nr. 1 Royal Old Wells (E), das Salzwasser Nr. 4 Royal Old Wells (F; in allen diesen Cheltenham-Wässern waren Spuren von Schwefelwasserstoff enthalten); Ure (1) das Mineralwasser von Tenbury in Worcestershire (G). Folgende Zusammenstellung gibt den Gehalt an festen Bestandtheilen nach Grains, an freier Kohlensäure nach englischen Cubikzollen für 1 Gallone (den Raum von 70000 Grains Wasser) :

	A	B	C	D	E	F	G
Spec. Gewicht . .	—	—	1,0010	1,0076	1,0064	1,0079	1,0090
Chlorkalium . .	—	—	5,0491	—	—	—	—
Chlorcalcium . .	—	—	—	—	9,2575	—	425,6
Chlormagnesium . .	14,581	1,120	—	—	52,6197	8,0003	51,3
Chlornatrium . .	12,642	4,000	1,2138	481,1933	229,7876	590,3310	1361,4
Bromcalcium . .	—	—	—	—	2,0272	—	—
Bromnatrium . .	—	—	—	3,2928	—	—	16,3
Jodnatrium . .	—	—	—	Spur	—	—	—
Brommagnesium . .	—	—	—	—	—	3,0632	—
Jodmagnesium . .	—	—	—	—	—	0,4861	—
Schwefels. Natron .	10,229	0,320	—	112,8666	234,0562	94,9410	—
" Magnesia . .	—	—	—	—	—	—	—
" Kalk . .	80,052	4,480	—	—	—	—	6,0
" Kali . .	4,641	—	0,4781	2,9512	Spur	Spur	—
Phosphors. Kalk . .	—	—	0,5579	Spur	Spur	Spur	—
" Eisenoxyd . .	—	—	—	—	0,1834	—	—
Kohlens. Kalk . .	8,820	11,200	25,1209	7,7021	22,0808	17,0611	—
" Magnesia . .	0,329	Spur	4,3624	11,3897	1,9719	6,8026	—
" Eisenoxydul . .	1,071	0,012	2,8936	—	0,5999	Spur	1,5
" Kali . .	—	0,010	—	—	—	—	—
" Natron . .	—	—	4,1867	20,1481	—	—	—
Org. Extractivstoff .	—	—	0,0098	3,4993	0,0231	18,0530	—
Quells. Magnesia . .	—	0,080	—	—	—	—	—
Quellsatzs. Magnesia .	—	0,040	—	—	—	—	—
Quellsäure . .	—	—	0,2429	0,3591	16,8245	0,3332	—
Quellsatzsäure . .	—	—	0,1470	—	—	—	—
Kieselerde . .	2,982	Spur	0,6678	2,7755	1,0129	2,7468	—
Salpeters. Salze . .	—	Spur	—	—	—	—	—
Verlust . .	—	—	0,3598	0,5719	1,8004	0,0091	—
Summe der festen Bestandtheile .	144,018	21,262	45,2900	645,6058	572,2451	741,7774	1802,0
Freie Kohlensäure . .	—	—	19,919	16,254	32,705	25,294	—

Islandische.

Kieselerdehaltiges Quellwasser von Island analysirte Damour (2), und zwar (A) von dem grossen Geyr

(1) Pharm. J. Trans. VIII, 128. — (2) Ann. ch. phys. [3] XII, 470; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 421.

Regen-, Brunnen-, Fluß-, Meer- und Mineralwasser. 1011

(spec. Gew. 1,001; es roch nach Schwefelwasserstoff), (B) von der Quelle Badstofa (Reykir), (C) von der Quelle südlich vom Hvergarden (Reykir), (D) von der Quelle Store-Hver, mitten im Hvergarden, (E) von der Quelle von Laugarnes bei Reykjavik. In 1000 Theilen Wasser sind enthalten :

Salzsäuren
und Mineral-
wasser.
Jalindische.

	A	B	C	D	E
Schwefels. Kali	0,0180	0,0229	—	—	—
" Natron	0,1348	0,0103	—	—	0,0221
" Magnesia	0,0091	—	—	—	—
" Kalk	—	0,0400	—	—	—
Chlornatrium	0,2638	0,2873	—	—	0,0547
Chlor	—	—	0,1732	unbest.	—
Natron	0,1227	0,0711	0,3188	0,3072	0,0508
Kali	—	—	—	0,0150	—
Kieselerde	0,5190	0,2630	0,3240	0,3160	0,1350
Schwefel	0,0036	0,0061	0,0091	0,0030	0,0019
Schwefelsäure	—	—	unbest.	unbest.	—
Kohlensäure	0,1520	unbest.	unbest.	unbest.	unbest.

Mulder (1) untersuchte das Mineralwasser (A) von *Assinan* in Niederländisch-Indien; Lewy (2) das Wasser (B) einer Therme (Temperatur 69,°4) aus dem *Paramo de Ruiz* in Neu-Granada (Südamerika), welche freie Schwefel- und Salzsäure enthält (spec. Gew. 1,0073). In 1000 Theilen Wasser sind enthalten :

Ostindische
und südame-
rikanische.

	A	B
Chlorcalcium	1,0129	—
Chlormagnesium	0,5713	—
Chlornatrium	16,8340	0,91
Jodmagnesium	0,0775	—
Schwefels. Magnesia	—	0,94
" Kalk	—	0,34
" Thonerde	—	1,66
" Eisenoxyd	—	1,02
Kieselerde	0,0267	0,18
Schwefelsäure	—	2,55
Salzsäure	—	0,33

(1) Scheik. Onderz. IV, 524. — (2) Cbmpt. rend. XXIV, 449. Mit vervollständigenden Bemerkungen von Boussingault über vulkanische Wasser, welche freie Schwefelsäure enthalten, Compt. rend. XXIV, 397; Ann. ch. phys. [3] XX, 109; im Ausz. J. pharm. [3] XI, 487; J. pr. Chem. XL, 438; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 292; Pogg. Ann. LXXI, 444; Pharm. Centr. 1847, 414.

Quellenab-
sätze.
(Ocker.)

Ocker (Quellenabsätze) wurden vollständiger untersucht (der Untersuchung auf Arsen wird weiter unten weitläufiger gedacht werden): von Ludwig (1) der Ocker der Quelle von *Driburg* (A); von Rammelsberg (2) der Ocker der Badequelle (B) und der Trinkquelle (C) zu *Alexisbad* am Harz; von Ewald (3) der Absatz des groſſen Soolsprudels zu *Nauheim* (D); von Filhol (4) der Ocker der Quelle des Herrn Ruéffi bei *Poir* (E); der Quelle *St. Madeleine de Flourens* (F) und einer andern Quelle (G) nahe bei *Toulouse* (für diese Analysen von Filhol ist angegeben, daſs der Ocker bei 100° getrocknet war).

	A	B	C	D	E	F	G
Eisenoxyd	57,803	65,80	53,88	49,86	40,570	50,421	53,100
Manganoxyd	—	0,76	6,95	0,40	Spur	—	—
Kalk	6,683	0,15	0,40	—	—	—	—
Magnesia	—	0,04	0,12	—	—	—	—
Eisenoxydul	—	—	1,68	—	—	—	—
Kohlens. Kalk	—	—	—	20,81	2,108	2,859	4,503
„ Magnesia	—	—	—	—	1,060	0,825	0,675
Chlornatrium u. andre lösliche Salze	—	—	—	2,59	—	—	—
Thonerde	—	—	—	—	—	3,970	2,910
Schwefelsäure	0,543	—	—	—	—	—	—
Lösliche Kieselerde . .	—	0,43	6,91	2,81	5,000	2,000	4,200
Arsen	—	0,958	0,025	—	0,050	0,032	0,058
Arsenige Säure	0,063	—	—	—	—	—	—
Kupfer	—	0,017	0,001	—	Spur	Keins	—
Zinn	—	0,003		—	—	—	—
Wasser	23,333	26,33	23,93	23,58	18,000	20,027	19,508
Organische Substanz . .	0,542			—	16,800	15,189	12,327
Sand	5,888	6,02	6,71	—	16,412	3,970	2,719
Kohlensäure	6,145	—	1,86	—	—	—	—
Verlust		—	—	—	—	—	—
	100,000	100,008	101,966	100,00	100,000	100,100	100,000

In dem Absatz, welchen das von *Arcueil* nach Paris geführte Wasser in der Leitung bildet, fanden *Boutron-Charlard* und *Henry* (5) 90,0 Procent kohlens. Kalk,

- (1) *Arch. Pharm.* [2] LI, 145; im *Ausz. Pharm. Centr.* 1847, 719.
 — (2) *Pogg. Ann.* LXXII, 571; im *Ausz. Pharm. Centr.* 1848, 14. —
 (3) Jahresbericht der Wetterauischen Gesellschaft für 1849, 77. — (4) *J. pharm.* [3] XIII, 13. — (5) *J. pharm.* [8] XIV, 173.

6,0 kohlen. Magnesia, 2,2 schwefels. Kalk und 1,8 Kiesel-
erde, Eisenoxyd und organische Materie.

Die Jahre 1847 und 1848 haben zahlreiche Nachwei-
sungen über den Gehalt verschiedener Mineralquellen an
schweren Metalloxyden gebracht, welche man vorher in
ihnen übersehen hatte. Abgesehen von den älteren be-
deutungslosen Angaben eines Paracelsus', Thurneys-
ser's und anderer Scheidekünstler des 16. Jahrhunderts über
den Gehalt von Mineralwasser an Arsen, Antimon, Vitriol
u. s. w. waren bis auf die neuere Zeit nur wenige Erfah-
rungen in dieser Beziehung festgestellt worden. Ficinus (1)
wollte 1823 in allen bei Teplitz hervorbrechenden Quellen
Kupferoxyd gefunden haben; Schweigger (2) vermuthete
in demselben Jahr, das Karlsbader Wasser möge Nickel
enthalten. Bley (3) bestimmte 1828 den Kupfergehalt des
Wassers aus dem Ernabrunnen im Selkethal am Harz zu
0,0496 Gran auf 16 Unzen Wasser. Berzelius (4) fand
0,0133 schwefels. Zinkoxyd in 1000 Theilen des Mineral-
wassers von Ronneby, welches er 1827 gemeinschaftlich
mit Trolle-Wachtmeister untersuchte; und 1839 (5)
in dem Saidschützer Wasser Spuren von Zinnoxid und
Kupferoxyd. Schafhäütl (6) machte 1840 aufmerksam
auf die Gegenwart von Arsen in vom Wasser abgesetzten
Eisenerzen, und auf die häufige Anwesenheit dieses Metalls
und auch des Antimons und Zinns im Eisen. Tripier (7)
gab 1840 an, in 1 Liter des Mineralwassers von Hammam
Mes Kutin bei Constantine seien 0,0005 Grm. Arsen ent-
halten, welche Angabe damals um so mehr bezweifelt

Arsen,
Kupfer u. s. w.
in Mineral-
wasser.

- (1) Aus Frouiep's Notizen VI, 194 in Berzelius' Jahresber. IV, 132.
— (2) Aus Schweigger's Neuem Journal für Ch. u. Ph., N. R. IX, 388
in Berzelius' Jahresber. IV, 133. — (3) Trommsdorff's Neues Journal
der Pharm. XVIII, 2. — (4) Aus den Abhandl. der schwed. Akad. für
1827, in Berzelius' Jahresber. VIII, 287. — (5) Compt. rend. IX, 164;
Ann. Ch. Pharm. XXXI, 240. — (6) Phil. Mag. [8] XVII, 570; J. pr.
Chem. XXI, 129. — (7) J. chim. méd. [2] VI, 278; Arch. Pharm. [2]
XXVI, 327; Pharm. Centr. 1841, 676.

Arsen,
Kupfer u. s. w.
in Mineral-
wasser.

wurde, da Henry und Chevallier bei einer früheren Analyse dieses Wassers eines Arsengehalts nicht erwähnten; beide letztgenannten Chemiker bestätigten indeß 1845 die Gegenwart des Arsens in diesem Wasser (1). Baur (2) fand 1845 Antimonoxyd in einem Mineralwasser aus der Umgegend von Schüpfheim im Canton Luzern, 1,507 Gram in 349 Unzen Wasser.

Walchner (3) zeigte seit 1844, daß kleine Quantitäten Kupfer und Arsen in jedem Eisenerze vorkommen, daß das Vorkommen dieser Metalle das des Eisens in Ackererden, in Thon und Mergel begleitet. Er fand Kupfer und Arsen in dem Pallas'schen Meteoreisen (4), in dem mexikanischen von Yuanhuitlan bei Oaxaga, in einem Meteor-eisen von Tennessee und in einem andern nordamerikanischen Meteoreisen. Kupfer und Arsen fand er in den Ockerab-sätzen der eisenhaltigen Quellen von Griesbach, Rippoldau, Rothenfels und Steinach am Schwarzwald, von Lamscheid am Hunsrücken, aus dem Brohlthal, von Cannstadt, von Ems, Schwalbach, Wiesbaden und Pyrmont; in dem Ocker des Wiesbadner Wassers auch Antimon.

In Beziehung auf deutsche Mineralquellen wurde dies zunächst bestätigt durch Figuier (5) für das Wiesbadner Wasser; er bestimmte den Arsengehalt für 200 Grm. Ocker (= dem in kochendem Wasser unlöslichen Rückstand der

(1) J. chim. méd. [3] I, 413. — (2) Jahrb. pr. Pharm. X, 8; Pharm. Centr. 1845, 717. — (3) Amtlicher Bericht über die 22. Versammlung deutscher Naturforscher u. Aerzte in Bremen, 58; Compt. rend. XXIII, 612; Ann. Ch. Pharm. LXI, 109; J. pr. Chem. XL, 109; im Aus. Pharm. Centr. 1846, 908. — (4) Monheim fand 1816 in der angeblich meteorischen Eisenmasse von Aachen Arsen, was Stromeyer bestätigte; Stromeyer 1833 denselben Bestandtheil in einer bei Magdeburg gefundenen und für meteorisch gehaltenen Eisenmasse; Rummeler 1840, daß der im Pallas'schen Meteoreisen und dem von Atakama vorkommende Olivin arsenige Säure enthalte, welcher Angabe in Beziehung auf den Olivin aus dem Pallas'schen Eisen Berzelius in seinem Jahresbericht über 1840 bestimmt widersprach. — (5) Compt. rend. XXIII, 634; Pharm. Centr. 1846, 908.

Verdunstung von 359 Liter Mineralwasser) zu 0,124 Grm. Arsen; er glaubte, es sei dieses als arsenigsaures Natron im Wasser gelöst enthalten. — Will (1) fand sowohl in dem sich freiwillig absetzenden Ocker als in dem unlöslichen Verdampfungsrückstand der Rippoldsauer Quellen Arsen, Kupfer, Blei, Zinn und Antimon, und zwar (unter der Voraussetzung, in diesen Sedimenten sei das Verhältniß zwischen Eisenoxyd und den genannten Metallen dasselbe wie in dem Wasser) für 10000 Theile Wasser :

	der Josephsquelle	Wenzelsquelle	Leopoldsquelle
Eisenoxyd	0,2784	0,1835	0,431
Arsenige Säure	0,0060	0,0040	0,0090
Zinnoxydul	0,00025	0,00017	0,00038
Antimonoxyd	0,00016	0,00010	0,00024
Bleioxyd	0,00025	0,00016	0,00037
Kupferoxyd	0,00104	0,00069	0,00156

Arsen,
Kupfer u. s. w.
in Mineral-
wasser.

In dem Absatz aus verschiedenen Wiesbadner Quellen fand er auf 100 Eisenoxyd 1,98 bis 2,94 Gehalt an andrem Metall, dieses ganz als Arsen betrachtet also 3,0 bis 3,9 arsenige Säure; auch in den Ockern der Sodner und Homburger Quellen fand er Arsen und Zinn. — Keller (2) fand unter Buchner's d. j. Leitung in dem Ocker aus der Ragoczy- und der Pandurquelle zu Kissingen nur eine zweifelhafte Spur Kupfer, hingegen mit Sicherheit Arsen; in dem Ocker aus der Eisenquelle zu Brückenau nur eine Spur Arsen, aber eine ziemliche Menge Kupfer; in den Ockern von beiden Orten auch Zinn. In dem Ocker aus dem eisenhaltigen Wasser von Kellberg bei Passau war weder Arsen noch Kupfer mit Bestimmtheit nachzuweisen. Keller (3) bestimmte später genauer, dafs enthält

	AsO ₃	SbO ₃	SnO	PbO	CuO
1 Krug (= 18720 Gran) Pandur :	0,0216	0,0024	0,0025	0,0020	Spur
" " " Ragoczy :	0,0144	0,0028	0,0031	0,0025	Spur
1 bair. Maß Brückenaues Wasser :	0,0001	0,0001	0,0001	—	0,0021 Gran.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 192; Pharm. Centr. 1847, 476. — (2) Anzeigen der bayerischen Akad. 1847, Nro. 75; J. pr. Chem. XL, 442; Jahrb. pr. Pharm. XV, 20; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 478. 719. — (3) Repert. Pharm. [2] XLVIII, 289; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 190; Arch. Pharm. [2] LV, 181.

Arsen,
Kupfer u. s. w.
in Mineral-
wasser.

Liebig fand Arsen in dem Mineralwasser von Liebenstein in Sachsen-Meiningen (vergl. S. 1002). Ludwig (1) bestimmte, daß der Ocker der Driburger Quelle 0,06 Procent arsenige Säure auf 57,30 Eisenoxyd, der des Liebensteiner Quelle auf 35,88 Eisenoxyd 0,7612 Schwefel arsen ergab, in welchem letzteren eine geringe Menge Schwefelzinn eingerechnet ist. Rammelsberg (2) fand in dem Ocker des Alexisbads (Badequelle) am Harz auf 65,9 Procent Eisenoxyd 0,958 Arsen, 0,017 Kupfer und 0,003 Zinn (nach ihm ist das Arsen als Arsensäure in diesem Ocker enthalten); in dem des Alexisbrunnens (Trinkquelle) auf 53,9 bis 55,8 Eisenoxyd 0,025 Arsen und 0,001 Kupfer und Zinn. Bley und Diesel (3) fanden in 100 lufttrocknem Ocker vom Alexisbad (Badequelle) am Harz 0,9215 arsenige Säure mit Spuren von Antimon, in solchem von dem Alexisbrunnen (Trinkquelle) 0,1125, aber kein Antimon; letzterer Ocker enthält nach ihnen auch Zink. Fischer (4) in Ovelgönne fand Arsen und Kupfer in dem Ocker des Wildunger Sauerbrunnens. Van Kerckhoff fand Arsen, Antimon, Mangan, Kupfer und Zinn in dem Mineralwasser von Mondorff bei Luxemburg (vergl. Seite 1002).

In Beziehung auf französische Mineralwasser fand Flandin (5) in dem eisenhaltigen Wasser von Passy bei Paris weder Arsen noch Kupfer; ebenso wenig Chatin (6) in diesem, wohl aber in dem von Trianon, und zwar in 2500 Liter (denen etwa 1 Kilogramm Ocker entspricht) 28 bis 30 Milligramm Arsen; Chatin glaubte, das Vorkommen von Arsen könne auf diejenigen eisenhaltigen Wasser beschränkt sein, welche kohlen. Eisenoxydul ent-

- (1) Arch. Pharm. [2] LI, 145; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 719.
(2) Pogg. Ann. LXXII, 571; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 14. Die vollständige Analyse vergl. S. 1012. — (3) Arch. Pharm. [2] LII, 268. —
(4) Arch. Pharm. [2] LII, 263. — (5) Compt. rend. XXIII, 635. —
(6) Compt. rend. XXIII, 931; J. chim. méd. [3] III, 8; Ann. ch. phys [3] XXII, 327.

halten (wie das von Trianon), und in denen fehlen, welche das Eisen als schwefels. Eisenoxydul enthalten (wie das von Passy). Chevallier (1) fand in dem Ocker der Quellen von Forges unwägbare Spuren von Kupfer, aber kein Arsen; Spuren von Arsen Lemonnier (2) in dem Ocker der eisenhaltigen Quelle zu Bagnères de Bigorre in den Pyrenäen, O. Henry (3) in dem Ocker der Quelle von Casséjoul (Dep. des Aveyron), und Langlois (4) in dem Ocker und dem durch Verdampfung erhaltenen Rückstand des Wassers einer eisenhaltigen Quelle in der Nähe von Metz. Chevallier und Schaufele (5) fanden 0,0015 Grm. Arsensäure in dem Rückstand von 2,5 Liter Wasser einer Mineralquelle zu Bussang in den Vogesen, Arsen und sehr wenig Kupfer in dem Ocker derselben; Spuren von Arsen in dem Mineralwasser von Chatenois (Kestenholzer-Bad) und Niederbronn (Dep. Niederrhein), von Sulzbach, Sulzmatt und Watweiler (Dep. Oberrhein), erheblichere Quantitäten in den Ockerabsätzen dieser Quellen; sie geben eine Zusammenstellung der Mineralquellen, hauptsächlich der französischen, in Beziehung auf Arsengehalt, in welchen derselbe noch für viele namentlich nach Versuchen von Chevallier und Goble angezeigt wird. Letztere (6) fanden Arsen in dem Ocker, nicht in dem Verdampfungsrückstand, des Wassers von Cransac (Dep. Aveyron); Spuren von Kupfer, kein Arsen, in dem Ocker von Chateau-Thierry (Aisne); Arsen in dem Ocker von Royat (Puy-de-Dome); Spuren von Arsen und Kupfer in dem Ocker von Hermonville (Marne), von Kupfer in dem Ocker von Pargny, von Arsen in dem Wasser von Hauterive (Allier), in dem Ocker von Martigné-Briant (Maine-

Arsen,
Kupfer u. a. w.
in Mineral-
wasser.

(1) J. chim. méd. [3] III, 3. — (2) Compt. rend. XXIV, 629; J. chim. méd. [3] III, 381; J. pr. Chem. XLI, 851. — (3) J. pharm. [3] XII, 241; Pharm. Centr. 1847, 879. — (4) J. chim. méd. [3] IV, 405. — (5) J. chim. méd. [3] IV, 401; theilweise Compt. rend. XXV, 750; Pharm. Centr. 1848, 79. — (6) J. pharm. [3] XIII, 324; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 510.

Arsen,
Kupfer u. s. w.
in Mineral-
wasser.

et-Loire), kaum in dem Wasser aber mehr in dem Ocker von Fenu (Maine-et-Loire), in dem Wasser und dem Ocker von Provins (Seine-et-Marne); weder Arsen noch Kupfer in dem Ocker von Amiens (Somme); Spuren von Kupfer in dem Ocker von Candé (Vienne); weder Arsen noch Kupfer in dem Wasser von St. Remy-l'Honoré (Seine-et-Oise); Arsen in dem Wasser von Vichy (Allier), Mont-Dore und Saint-Mart (Puy-de-Dome); Arsen weder in dem Wasser noch in dem Ocker von Saint-Allyre (Puy-de-Dome), nicht in dem Wasser aber in dem Ocker von Jaude (Puy-de-Dome); Arsen nicht in dem Wasser von St. Amand (Nord) aber in dem von Plombières; Arsen in dem Wasser und dem Ocker (hier auch Kupfer) von Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne), und in dem Ocker aller Quellen von Spa. — Girardin (1) fand sowohl in dem Wasser als dem Ocker der eisenhaltigen Quellen St. Paul und la Maréquerie zu Ronen weder Arsen noch Kupfer; E. Marchand (2) in dem Ocker der Quelle von Valmont kein Arsen, aber geringe Spuren von Kupfer. — Einige hierher gehörige Bestimmungen von Filhol finden sich in der oben (Seite 1012) gegebenen Zusammenstellung der Analysen von Quellenabsätzen (Ockern).

(1) J. chim. méd. [3] IV, 643. — (2) J. chim. méd. [3] IV, 693.

Technische Chemie.

Karsten (1) hat es versucht, die Grenze des Kohlenstoffgehaltes zu ermitteln, welche die Carburete des Eisens in diejenigen drei Kategorien trennt, die man technisch als Guß- oder Roheisen, Stahl und Stabeisen unterscheidet. Als Ausgangspunkt und obere Grenze diente ihm ein aus Spatheisenstein mit Holzkohle erblasenes Spiegeleisen, welches nur gebundenen Kohlenstoff enthielt; er bestimmte diesen, um den Einfluß der Methode zu eliminiren, mit folgenden Mitteln und Resultaten :

Metalle
und Legi-
rungen.
Kohlenstoff im
Eisen.

Durch Verbrennung mit Kupferoxyd	= 4,2835 pC.
„ mit chlors. Kali und chroms. Blei =	5,7046 „
„ „ „ „ „	= 5,6987 „
Mit Kupferchlorid	= 5,5523 „
„ „ „ „ „	= 5,6978 „
Mit Eisenchlorid (sublimirtem)	= 5,4232 „
„ „ (auf nassem Weg bereitetem) .	= 5,2867 „
Mit Chlorsilber	= 5,6056 „
„ „ „ „ „	= 5,7234 „
<hr/>	
Mittel der 9 Analysen	= 5,4417 „

oder mit Weglassung der ersten Analyse = 5,5865 pC.
Kohlenstoff. — Bis herab auf 2,3 pC. hat das Eisen noch

(1) Aus den Berichten der Berl. Akad. in J. pr. Chem. XL, 229; Dingl. pol. J. CIV, 39; J. pharm. [3] XII, 139. Man vergl. damit die Analysen von amerikanischem Guß- und Stabeisen von Svanberg in Berzelius' Jahresber. XXVI, 198.

die Eigenschaft des Roheisens, insbesondere die Fähigkeit bei langsamem Erkalten Graphit abzusondern. Eisen von 2 pC. ist noch nicht, von 1,9 pC. kaum schmiedbar, als schon Stahl aber noch nicht schweißbar; bei 1,75 pC. ist die Schweißbarkeit noch gering. Diese nimmt mit abnehmender Härte zu. Der Kohlenstoffgehalt von 1,4 bis 1,5 pC. bezeichnet das gemeinschaftliche Maximum der Härte und Festigkeit. Eisen mit 0,5 Kohlenstoff ist ein sehr weicher Stahl, und bildet die Grenze zwischen diesem (d. h. Eisen, welches sich noch härten läßt) und Stabeisen. Diese Grenzen liegen merklich höher, wenn das Eisen rein ist, sie liegen tiefer, wenn es mit Silicium, Schwefel und Phosphor behaftet ist.

Phosphor und
Arsen im
Eisen.

Schafhäütl (1) macht darauf aufmerksam, daß Arsen und Phosphor nur selten in Guß-, Stabeisen und Stahl fehlen, wie ihn zahlreiche Analysen belehrt haben. Er bringt dies in Zusammenhang mit dem neuerdings beobachteten Arsengehalt der Eisenerze und Mineralwasser, und hält dies für um so wahrscheinlicher, als es ihm zuerst gelungen ist, in den Eisensorten auch Zinn und Antimon nachzuweisen. Er hebt endlich hervor, daß das berühmte Dannemora- und das treffliche Low-Moor-Eisen von England ihre Güte einem Arsengehalt, und daß das vorzügliche russische sogenannte C C N D Eisen (von Demidoff's Eisenwerken bei Nischnetagilsk) sie einem Phosphorgehalt mit verdanke.

Verhüttung
von
Kupferern.

A. Parkes (2) hat ein Patent für einige Verbesserungen in der Verhüttung der Kupfererze (und ähnlicher Schwefelmetalle) erhalten. In dem ersten Theil desselben empfiehlt er als Zuschläge beim Steinschmelzen Gyps, Glaubersalz, schwefels. Kali, oder Schwerspath. — Im zweiten Theil beschreibt er die Reduction des Kupfersteins mittelst Kupferoxyd, oder kohlen. Kupferoxyd, deren Wirkung durch einen Fluß [Chlorcalcium oder Chlorbaryum (!)] unterstützt werden soll.

(1) J. pr. Chem. XL, 304. — (2) Chem. Gaz. 1848, 491.

Ein wichtiger Fortschritt in der Verhüttung der Kupfer-
 erze ist durch die Erfindung von Rivot und Phillips (1), Kupferpro-
 oduct durch
 Niederschla-
 gen mit Eisen.
 eine Umänderung des Verfahrens von Napier (2), ge-
 schehen. Letzterer hatte vor einigen Jahren vorgeschlagen,
 das Kupfer aus den in einem Graphittiegel geschmolzenen
 Erzen durch den galvanischen Strom niederzuschlagen, und
 brachte zu dem Ende den negativen Pol einer Batterie
 mit dem Graphit, den positiven Pol mit dem Schmelzproduct
 durch eine Eisenplatte in Verbindung. — Die in der *Ecole
 des mines* in Paris angestellten zahlreichen Versuche über
 diese Methode belehrten R. und Ph., daß das Eisen schon
 ohne Beihülfe des Stroms das Kupfer aus im rothglühenden
 Fluß befindlichen Silicaten, gerade wie aus den Salzlösungen
 in der Kälte, niederschlägt. Indem sie diese Erfahrung
 praktisch zu machen strebten, hatten sie zunächst dem
 großen Aufwand an Eisen zu begegnen, den die Nieder-
 schlagung erheischte. Nachdem sie ermittelt hatten, daß
 Eisenoxydul als Silicat in der oxydirenden Flamme des
 Flammofens noch leichter in Oxyd übergeht als in den
 wässerigen Auflösungen seiner Salze an der Luft, und daß
 ferner das metallische Eisen auf das Kupfer des durch die
 Schmelzung erzeugten (aus Kalk, Eisen und Kupfer be-
 stehenden) Silicats durchaus nicht einwirkt, bevor der ganze
 Eisengehalt desselben in den Zustand des Oxyduls über-
 gegangen ist : kamen sie auf die fruchtbare Idee, die Re-
 duction zum größeren Theil durch Kohle zu bewerkstelligen
 und durch metallisches Eisen zu vollenden. Man brauchte
 von da an nur noch 15 pC. Eisen vom Gewicht des
 Kupfers.

Das Verfahren in der Ausbildung, die es von den Er-
 findern erhalten hat, ist dieses. Die unter Mühlsteinen
 zu feinem Sand aufbereiteten Erze (Kiese) werden im
 Flammofen geröstet, und alsdann bis zur Zersetzung der

(1) *Compt. rend.* XXIV, 617; *Dingl. pol. J.* CV, 187. Bericht von
 Pelouze darüber : *Compt. rend.* XXV, 789; *Dingl. pol. J.* CVII, 121;
Bull. Soc. d'enc. 1848, 352. — (2) *Vergl. Dingl. pol. J.* XCVII, 298.

drohen (1). Es sind diese die Erfindung eines Deutschen, Ziervogel (unseres Wissens zuerst im Mansfeldschen zur Ausführung gebracht). Nach der ersten Art werden die Erze mit Kochsalz geröstet, das entstandene Chorsilber mittelst einer heißen Kochsalzlösung aufgelöst und diese Lösung mit metallischem Kupfer gefällt. — Nach der zweiten Methode werden die Erze durch die Röstung in schwefels. Salze verwandelt, diese ausgezogen und die Lösung ebenfalls mit Kupfer niedergeschlagen.

Nasse
Versilberung.

Eine einfache und leicht auszuführende Versilberung auf nassem Weg (ohne Galvanismus) hat Stein in Dresden (2) angegeben. Man soll 1 Theil Silbersalpeter mit 3 Th. Cyankalium (nach Liebig's Vorschrift) zusammenreiben und soviel Wasser zusetzen, daß ein mäßig dicker Brei entsteht. Dieser Brei wird mit einem wollenen Lappen rasch und gleichförmig aufgerieben, worauf die Versilberung von selbst zum Vorschein kommt. Diese angeblich sehr schöne Versilberung haftet nicht so fest, daß sie mit Trippel oder Kreide stark gerieben werden kann.

Roseleur und Lavaux (3) empfehlen für denselben Zweck und gleiche Art der Ausführung ein Bad aus 100 Theilen schwefl. Natron und 15 Theilen irgend eines Silbersalzes. Dieses Bad wirkt auf die zu versilbernden Gegenstände aus Kupfer oder dessen Legierungen theils durch Austausch des Silbers gegen Kupfer, theils durch Reduction von Silber durch die schweflige Säure. Diese wenig dauerhafte Versilberung eignet sich nur für kleine Bijouteriewaaren. — Als Bad zum Vergolden durch bloßes Eintauchen empfehlen dieselben eine Auflösung von Goldchlorid oder Goldoxyd in einem pyrophosphor. Alkali. Die Gegenstände sollen sich fast augenblicklich vergolden, während in einem ähnlichen Bade aus dreibasisch-phosphor. Alkali gar keine Vergoldung erfolgt.

(1) Moniteur industriel 1847, 1165; Dingl. pol. J. CVI, 75. —

(2) Pol. Centr. 1847, 11. Lieferung; Dingl. pol. J. CV, 27. — (3) Technologiste 1847, 341; Dingl. pol. J. CV, 29.

Die Vergoldung der Räder von Uhren hatte bisher Vergoldung.
unübersteigliche Schwierigkeiten, weil die bekannten Vergoldungsarten die stählernen Getriebe entweder mitvergoldeten oder angreifen. Letzteres findet insbesondere bei der seit-
her üblichen Anquickung zum Behuf der Feuervergoldung statt. Es ist nun Ph. Plantamour (1) gelungen, eine Anquickflüssigkeit zusammenzusetzen, welche durch ihre alkalische Beschaffenheit zugleich die Räder reinigt und anquickt, beides ohne die Stahlgetriebe im mindesten anzugreifen. Er löst Quecksilber in Salpetersäure, und versetzt die Lösung so lange mit Ammoniak, bis der anfangs gebildete Niederschlag wieder aufgelöst ist. Dies geschieht rasch, wenn ein Ueberschufs von Säure, also salpeters. Ammoniak, vorhanden ist, worin sich das gebildete Doppelsalz leicht löst. In diese Lösung taucht man die Räder ohne weiteres mehrere Minuten; das überschüssige Ammoniak beseitigt die fette Unreinigkeit der Oberfläche, worauf die Verquickung des gelben Metalls erfolgt. Die verquickten Gegenstände überzieht man noch naß mit Goldamalgam und erhitzt sie über einer Spirituslampe, am besten auf einer Trommel, welche mit Oeffnungen zum Einstecken der Getriebe versehen ist. Auf diese Art vermeidet man das Heißwerden und Weichwerden der Stahltheile.

Die gewöhnliche Verzinnung von Blech hat den Fehler Blechverzinnung.
zu großer Weichheit und Leichtflüssigkeit; diese können nach Budy und Lammatsch (2) vermieden werden, wenn man das Zinn mit $\frac{1}{8}$ Nickel legirt. Der höhere Preis dieser Legirung soll sich dadurch compensiren, daß man nur halb soviel brauche.

Zu dem von Mohr vorgeschlagenen Verfahren, chemische Porcellan- und Glasgeräthe mit einem galvanisch Verkupferung von Glas und Porcellan.
niedergeschlagenen Kupferüberzug zu versehen, hat Els-

(1) Arch. ph. nat. V, 60; Compt. rend. XXIV, 784; Dingl. pol. J. CV, 34; J. pharm. [3] XII, 297. — (2) Aus dem Brevet d'Invention in Pol. Centr. 1848, 530; Dingl. pol. J. CIX, 315.

Verkupferung
von Glas und
Porcellan.

ner (1) einige Verbesserungen angegeben. Sie betreffen zunächst den Ersatz des zu theuren Kopalfirnisses (von dem der leitende Ueberzug angebracht wird) durch einen wohlfeileren Firnis, welcher aus 2 Th. Asphalt und 1 Th. Mastix besteht, beide zusammengeschmolzen und in Terpenthinöl zu Syrupconsistenz aufgelöst. Ebenso ersetzt Elsner den leitenden Ueberzug aus Blattgold, Bronzepulver oder Messingfeile durch Graphitpulver. Um endlich zu verhindern, daß sich der Kupferüberzug von Gegenständen oder Theilen flacher, nicht geschlossener Formen an Kugelmütze ablöst (wie z. B. bei Porcellanschalen regelmäßig geschieht), macht Elsner die Oberfläche durch Aetzen mit Flußsäure rau. Bei kleineren Gegenständen wird dies in gewöhnlicher Weise, bei größeren durch Bestreichen mit einem Brei aus Flußspath und Schwefelsäure bewerkstelligt. — Wenn mittelst dieses Verfahrens Schalen von Kupfer erzeugt werden, also die Glas- oder Porcellangefäße nur als Formen dienen sollen, unterläßt man natürlich das Anätzen mit Flußsäure, und wählt, um eine blanke, vergoldbare Oberfläche zu erhalten, statt des Graphits zum leitend machen feinertheiltes Kupfer, welches man aus einer Kupferlösung mittelst Zink fällt.

Verkupferung
von Eisen.

Nach H. Reinsch (2) soll die, bekanntlich äußerst locker haftende, Ueberkupferung des Eisens, wie man sie durch Eintauchen in Kupfervitriol erhält, sehr dauerhaft polirbar, von beliebiger Dicke und zu allen technischen Zwecken brauchbar nach folgendem Verfahren hergestellt werden können. Salzsäure wird mit 3 Vol. Wasser verdünnt, in diese einige Tropfen Kupfervitriollösung gebracht und in diese Flüssigkeit das vorher mit Weinstein und Kohlenpulver blank gescheuerte Eisen einige Secunden eingetaucht. Man reibt nun das Eisen mit einem Lappen ab, setzt etwas mehr Kupferlösung zu und legt das Eisen

(1) Verh. Gew. Bef. Pr. 1847, Novbr. u. Decbr. 174. — (2) Jahrb. pr. Pharm. XVI, 337.

wieder in die Flüssigkeit, womit man so lange fortfährt, bis der Ueberzug die gehörige Dicke besitzt.

Eine neue Methode, Eisen und Stahl zu verbleien, ist Verbleien von Eisen u. Stahl. von Parkes (1) angegeben worden. Man soll die vollkommen gescheuerten Arbeitstücke in ein Bad von einer dieser Legirungen : 9 Blei mit 3 Antimon, oder 9 Blei mit 1 Zinn und 1 Antimon, eintauchen, deren Oberfläche mit geschmolzenem Chlorbaryum, oder Kochsalz, oder einer Mischung von beiden bedeckt ist.

Ein großer Uebelstand, beim Aetzen in Kupfer und Stahl mit Salpetersäure ist bekanntlich die damit verbundene Gasentwicklung. Um diesen zu beseitigen haben Schwarz und Böhme (2) folgende Aetzflüssigkeiten vorgeschlagen. — *Für Stahl* : 10 Th. (40 pCtge) rauchende, käufliche Salzsäure mit 70 Th. Wasser verdünnt, versetze man mit einer siedenden Lösung von 2 Th. chlors. Kali mit 20 Th. Wasser. Die Flüssigkeit hat einen schwachen Chlorgeruch und wird für die Anwendung mit 100 bis 200 Th. Wasser verdünnt. — *Für Kupfer* : Man löse 2 Th. Jod und 5 Th. Jodkalium in 40 Th. Wasser, für schwächere Wirkungen in der doppelten Menge Wasser. — Beide Flüssigkeiten sollen allen Anforderungen, selbst bei den feinsten Linien, entsprechen.

Die Goldscheidung mittelst Schwefelsäure ist von Goldscheide-
rei mit Schwe-
felsäure. M. Pettenkofer (3) in einer musterhaften Arbeit wissenschaftlich beleuchtet worden, welche unsere Kenntnisse über diesen Gegenstand wesentlich durch die Entdeckung des Platins im Scheidegold und durch die Ermittlung gewisser Erscheinungen vermehrt haben, welche die Abscheidung der letzten Antheile Silber durch Schwefelsäure verhindern.

Bekanntlich muß der Goldgehalt von 16 Th. Scheidegut zwischen 4 und 3 Th. betragen und das Silber wenig-

(1) Chem. Gaz. 1849, 492. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 68; Dingl. pol. J. CLX, 313. — (3) Dingl. pol. J. CIV, 118.

Goldacheide-
rei mit Schwefelsäure.

stens $\frac{1}{2}$ der Legirung ausmachen, wenn das Feinmach- am leichtesten von Statten gehen soll. Dafs der Goldgehalt diese obere Grenze hat, ist vorauszusehen; viel auffallender ist es, dafs nach der Erfahrung aller Practiker der Goldgehalt auch eine untere Grenze hat, und dafs die Abscheidung des Silbers durch Schwefelsäure um so gröfsere Schwierigkeit hat, je mehr der Goldgehalt unter dieser Grenze sinkt. Aehnliche Beobachtungen hat man schon früher bei der Scheidung mittelst Salpetersäure gemacht. Pettenkofer hat die seinigen in der Scheideanstalt zu München angestellt, wo man das Gold der Kronenthale (0,0007 ihres Gewichts) durch Auflösen derselben in Schwefelsäure und gufseisernen Kesseln scheidet. Die Scheidung geht anfangs rasch vorwärts bis zu 958 bis 960 Tausendtel Feingehalt; nur durch einen grofsen Ueberschufs von Säure und anhaltendes Kochen kann derselbe auf 970 bis 971 Tausendtel, aber niemals weiter gebracht werden. Bei einer besonders gemachten Probe war dazu ein achtmaliges Auskochen erforderlich, und selbst durch 4 weitere Operationen konnte der Feingehalt nicht um $\frac{1}{2}$ Tausendtel erhöht werden. In der Praxis pflegte man sich dadurch in der Weise zu helfen, dafs man das Scheidegold mit Salpetersäure schmolz, den Regulus aufs neue in günstigem Verhältnisse mit Silber legirte und einer neuen Scheidung unterwarf – die nicht selten auf dieselbe Schwierigkeit führte.

Aus dem Scheidegold der ersten Scheidung können geringe Mengen von schwefels. Bleioxyd, basisch-schwefels. Eisenoxyd und Spuren von Schwefelkupfer durch Digestion mit kohlens. Natron, Auswaschen und Behandeln mit Salpetersäure geschieden werden. Der Rückstand gab in Durchschnitt mehrerer Bestimmungen 97,0 pC. Gold, 2,8 Silber und 0,2 Platin, bei dem Glühen in Wasserstoff nur Spuren von Chlor und Schwefel; auch konnte in der Lösung durch Königswasser weder Phosphor noch Arsen nachgewiesen werden. Das Silber ist mithin *regulär* in dem Scheidegold enthalten. Es kann daraus weder durch

kochende Schwefelsäure, noch durch kochende Salpetersäure im mindesten gelöst werden. Nach der Behandlung mit Eisenchloridlösung zieht Ammoniak keine Spur von Chlorsilber aus. Noch auffallender ist die Thatsache, daß man über dieses Scheidegold zu wiederholtenmalen Schwefel abdestilliren kann, ohne daß Schwefelsilber gebildet wird; am auffallendsten ist sein Verhalten gegen kochende Schwefelsäure, welcher gepulvertes zweifach-chroms. Kali zugesetzt wird. Es löst sich alsdann, unter Bildung von Chromoxyd, reichlich Gold auf, während Silber und Platin unangegriffen bleiben.

Goldscheide-
rei mit Schwefelsäure.

Pettenkofer zieht aus diesen Erscheinungen den Schlufs, daß das Silber im Scheidegolde *mit anderen Eigenschaften*, als seinen gewöhnlichen zurückgehalten werde; spricht sich jedoch nicht weiter darüber aus, ob man hier an amorphes Silber im Gegensatz zu dem gewöhnlichen, oder an eine schwer zersetzbare Legirung in bestimmten chemischen Proportionen zu denken hat; letzteres ist nicht eben wahrscheinlich, weil im Scheidegold auf 1 Aeq. Silber 19 Aeq. Gold kommen. — Jener Zustand des Silbers wird zwar durch Gold allein hervorgebracht, aber durch den Platingehalt verstärkt.

Das einzige wirksame Agens, um dieses Silber aufzulösen, hat Pettenkofer in den zweifach-schwefels. Alkalien gefunden, und dadurch der practischen Scheiderei einen sehr grofsen Dienst geleistet. Die Schwefelsäure, welche bei 326° siedet, kann man auf diese Weise, indem man sie als zweites Aequivalent einem schwefels. Alkali hinzufügt, bei der Glühhitze einwirken lassen. Scheidegold, bis auf 3,0 pC. entsilbert, enthielt nach dieser Behandlung noch 0,6 Silber. Das schwefels. Natron ist seiner Löslichkeit und Wohlfeilheit wegen vorzuziehen. Am besten mengt man das Scheidegold mit $\frac{1}{4}$ trockenem Glaubersalz in einem eisernen Kessel, gießt das zweite Aeq. (0,7 des Glaubersalzes) Schwefelsäurehydrat hinzu, und erhitzt bis das Salz in Flufs kommt. Es bildet sich unter Entweichen von schwefliger Säure (und Salzsäure aus dem anhängen-

Goldscheide-
rei mit Schwefelsäure.

den Kochsalz) schwefels. Silberoxyd und Schwefelsäure geht weg, wobei die Masse sich zusammenballt, was man durch Umrühren zu verhindern sucht. Das schwefels. Salz ist größtentheils neutral geworden, und man braucht nur, um den Rest des Silbers zu lösen, einfach die Procedur zu wiederholen, erhitzt aber nur so lange, bis etwa die Hälfte neutral geworden ist. Um endlich das Scheidegold aus der Masse abzuscheiden, kocht man diese mit Schwefelsäure wie gewöhnlich; es löst sich das schwefels. Natron und schwefels. Silberoxyd, worauf der Rückstand gewaschen, getrocknet und mit Salpeter geschmolzen wird. Die Operation dauert, mit 20 bis 24 Mark vorgenommen, $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ Stunden, und liefert nach der ersten Schmelzung Gold von 994, nach der zweiten von 998 bis 990 Tausendtel Feingehalt; der gute und bequeme Verlauf derselben hängt sehr von dem Glanzbiersalzverhältniss und der Temperatur ab, welche die Glühhitze nicht ganz erreichen soll.

Es lag nahe, auf Grund vorstehender Erfahrungen die sogenannte Quartation einer experimentellen Kritik zu unterziehen; diese führte den Verfasser auf die zwei Hauptsätze: 1) dafs bei der Scheidung mit Salpetersäure das Verhältniss von 3 Silber zu 1 Gold keine Naturnothwendigkeit ist, sondern die Probe bei einem Verhältniss des Silberzusatzes bis herab auf 1,75 Th. Silber noch scharf bleibt (von den Verhältnissen, welche ungefähr Au Ag_3 entsprechen, war dies schon durch Kandelhardt und Chaudet bekannt); 2) dafs das durch die Quart geschiedene Gold um so silberhaltiger ausfällt, je mehr die Menge des Silbers, von der angegebenen Grenze an, gegen die des Goldes steigt.

Mit der Entdeckung des Platingehaltes im Scheidegold durch Pettenkofer ist auch der Schlüssel zu der in allen Scheidereien gemachten Erfahrung geliefert, dafs dieses Product sich nie gehörig fein und weich zeigt, wenn es nicht vorher mit Salpeter geschmolzen wird. Der schmelzende Salpeter oxydirt bekanntlich das Platin leicht. Mit dem Platin geht indessen auch eine sehr bemerkliche

Menge Gold in die Schlacke, denn obgleich das Gold an und für sich sehr schwer von Salpeter angegriffen wird, so geschieht dies doch bei Gegenwart von Platin in hohem Grade. Es kann sich aber auch treffen, wie beim Scheidegold, daß ein Theil des Platins, durch die Gegenwart des Silbers geschützt, im Gold bleibt (1 bis 2 Tausendtel). Die bei der Schmelzung mit Salpeter fallenden Schlacken hinterlassen, mit Wasser behandelt, ein graues zartes Pulver, enthaltend : Thonerde, Kieselerde und Kali, etwas Blei-, Kupfer-, Eisenoxyd, nebst Platin- und Goldoxyd und eingemengtem metallischen Gold. Man pflegte bisher dieses Pulver (die ausgelaugte Schlacke) zu schlämmen, um das regulinische Gold zu gewinnen und unter die Krätze zu werfen. Diese Schlammrückstände enthalten aber nach Pettenkofer 19 bis 20 pC. und oft mehr Gold, 2,5 bis 3,5 pC. Platin und etwas Silber, welche man wegen der Leichtigkeit der Rückstände nicht darin vermuthet hatte noch durch Amalgamation ausziehen konnte. Eine nach des Verfassers Methode (vergl. Dingl. pol. Journ. C, 459) angestellte Schmelzprobe mit Bleizucker lieferte von 5 Grm. ausgelaugtem und getrocknetem Schlackenrückstand einen Bleikönig, der auf der Kapelle einen 1,5 bis 2 Grm. schweren, platinhaltigen Blick hinterliefs. — Da eine Scheiderei, die jährlich 6 bis 800 Mark Gold liefert, in diesen Schlacken mehrere Mark Gold und 3 bis 4 Mark Platin verliert, so ist ein anderer Weg für die Zugutmachung als der bisherige erforderlich, welchen Pettenkofer zu ermitteln versprochen hat.

Goldscheide-
rei mit Schwe-
felsäure.

Aus den umfassenden ihm zu Gebote stehenden Erfahrungen geht hervor, daß alles im Verkehr befindliche Silber (mit Ausnahme des aus den Scheidereien stammenden) platinhaltig ist; dies beweist insbesondere der Platingehalt der älteren Münzen (Brabanter Thaler), welche zu einer Zeit geprägt sind, in welcher noch keinerlei Anwendung des Platins statt hatte. — Bei der geringen Affinität des Platins zum Quecksilber muß das Platin, nach der

Amalgamation der Gold- und Silberkrätze in der Krätzmühle, in den Rückständen (Krätznachsand) angereichert zurückbleiben. Wirklich erhielt Pettenkofer von zwei Proben Nachsand 0,017 und 0,01 pC. Platin.

Es bedarf kaum der ausdrücklichen Erwähnung, daß durch den Platingehalt der Werth des Silbers aus Krätznachsand um ein merkliches (um $5\frac{1}{2}$ pC.) erhöht wird.

Hydrostat.
Silberprobe.

Karmarsch (1) suchte für diejenigen Fälle der Anwendung, für welche die Silberprobe auf der Muffel und dem nassen Weg, wegen der nothwendigen Apparate und Handfertigkeit, nicht zulässig sind — eine einfachere und dabei genauere als die Strichprobe, die *hydrostatische*, zu substituiren. Sie soll durch bloße Bestimmung des spec. Gewichts einer Silber-Kupferlegirung den Feingehalt angeben. Karmarsch fand bei den Voruntersuchungen über die Einflüsse auf das spec. Gewicht der Silberlegirungen, daß Kupfer und Silber sich beim Legiren ausdehnen, und zwar um $\frac{1}{2}$ pC. beim 13 löthigen, um $\frac{1}{4}$ pC. beim 11 löthigen und um $\frac{1}{4}$ pC. beim 9 löthigen Silber, und daß ausgewalztes Feinsilber beim Prägen um $\frac{1}{2}$ pC. seines Volums, 9 löthiges Silber um $1\frac{1}{2}$ pC. verdichtet wird und so die übrigen Legirungen nach Verhältniß ihres Feingehaltes. Allgemein ist daher eine Legirung um so dichter, je mehr sie dem mechanischen Druck unterworfen war; der Grad dieser Verdichtung ist verschieden nach der Löthigkeit und compensirt die Ausdehnung beim Legiren nur zum kleineren Theil. Schon darin liegt eine Unsicherheit in der Basis der hydrostatischen Probe, welche den Verfasser bestimmt hat, von gegossenem und wenig bearbeitetem Silber zu abstrahiren und sich ausschließlichs an das geprägte Silber zu halten, wobei sie gerade am wenigsten Bedürfnis ist. Auch sind größere Gegenstände durch ihr Volum (wenn man sie nicht zerschneiden will), und

(1) Mittheilungen des Gewerbevereins für Hannover, 1847, 55. Lieferung (vergl. das Citat 1) auf S. 1034).

unreine oder gelöthete Sachen (wegen der fremden Metalle) ausgeschlossen. Endlich setzt die Genauigkeit der Probe die Abwesenheit von nichtsilberhaltigen Theilen und streng genommen auch der weißgesottenen Oberfläche voraus.

Hydrostat.
Silberprobe.

Wenn in einer Mark (= 288 Grän) Kupfer ein Grän durch reines Silber ersetzt wird, so wird sich das spec. Gewicht der Legirung um $\frac{1}{288}$ der Differenz zwischen dem spec. Gewicht des Silbers und dem des Kupfers vermehren (1). Ist daher das spec. Gewicht des Kupfers = K, diese Vermehrung = p, so hat man für das spec. Gewicht der Legirung L im vorliegenden Fall $L = K + p$, allgemein $L = K + np$, wenn n den jedesmaligen Feingehalt bezeichnet und vorausgesetzt, daß keine Verdichtung stattfindet. Die Größen K und p können nicht aus dem bekannten spec. Gewicht des Silbers und Kupfers bestimmt werden, theils weil diese Größen zu schwankend sind, theils wegen der Verdichtung. Karmarsch hat darum eine Reihe Wägungen von Legirungen verschiedenen, aber genau bekannten Feingehältes angestellt, und benutzt die Mittelzahlen und die äußersten spec. Gewichte, um daraus die Werthe für K und p der betreffenden Metalle zu berechnen, in dem Zustande, wie sie sich in der Legirung befinden. Auf diese Art findet er mittelst der Methode der kleinsten Quadrate $K = 8,814$ und $p = 0,000579$. Die obige Gleichung nach Einführung dieser Werthe für n gelöst, giebt $n = \frac{L - 8,814}{0,000579}$, woraus der Verfasser eine Gebrauchstabelle construirt. Die Formel, an bekannten Legirungen geprüft, giebt einen durchschnittlichen Fehler von $2,26 \text{ Grän} = \frac{8}{1000}$. Bei geprägtem Silber weichen die berechneten Resultate von der Kapellenprobe selten mehr

(1) Das ist keineswegs der Fall, sondern (abgesehen von eintreten der Verdichtung oder Ausdehnung) wird sich das Volum um die Differenz der Volume von 1 Grän Kupfer und 1 Grän Silber vermindern. Die Rechnung hiernach giebt aber ganz andere Resultate, als Karmarsch's Formel.

als 3 Grän d. i. $\frac{10,4}{1000}$ ab. Daraus ergibt sich der Werth der Methode von selbst.

Ein anderer Theil der Beobachtungen Karmarsch's (1) erstreckt sich auf die Abnutzbarkeit der Silberlegirungen. Es ergab sich, daß Münzen in dieser Beziehung nicht über 14löthig sein sollen; weniger als 12löthig sind sie zwar dauerhafter, aber wegen der Farbe nicht zulässig.

Gold-Zink-
legirung.

In England ist die Beobachtung, daß Gold von 12 Karat Gehalt und weniger, mit Zink statt Silber legirt, die Farbe gewisser gesetzlicher Gold-Silberlegirungen hat, vielfach betrügerisch mißbraucht worden (2).

Peruanische
Goldlegirung.

How (3) fand in einer Legirung aus dem Grabe eines Inka in Peru 38,93 Gold, 54,82 Silber und 5,80 Kupfer.

Griechische
Bronze.

Erdmann (4) hat eine Anzahl griechischer Bronzemünzen von unzweifelhafter Aechtheit (von Prof. Rofs in Halle an Ort und Stelle gesammelt und bestimmt) analysiren lassen. Die Resultate (siehe die nachstehende Tabelle No. 1 bis 8) bestätigen den von Göbel aufgestellten Satz, daß in den Bronzemünzen der Griechen und ihrer Kolonien, wohl aber in denen der Römer Zink vorkommt.

No. 1) Alt-Attisch, analysirt von A. Mitscherlich. No. 2) Atheniensisch, aus der römischen Zeit, analysirt von demselben und E. Schmid. No. 3) Atheniensisch, analysirt von R. Wagner. No. 4) Münze eines Macedonischen Königs, analysirt von O. Monse. No. 5) Münze Alexanders des Großen, analysirt von E. Schmid. No. 6) Münze von demselben, analysirt von R. Wagner. No. 7) Attische Münze, analysirt von Ulich. No. 8) Ebenfalls Attisch, analysirt von Heldt (beide auf Veranlassung Marchand's in dessen Laboratorium).

(1) Polytechnische Mittheilungen von Karmarsch und Vols, 3. Jahrgang 1846, 3. und 4. Heft. Mit der vorherg. Abhandl. im Ausz. in J. pr. Chem. XLII, 198; Dingl. pol. J. CVIII, 278. — (2) Technologiste 1847 552; Dingl. pol. J. CVI, 155. — (3) Chem. Gaz. 1846, 495; J. pr. Chem. XLIII, 318. — (4) J. pr. Chem. XL, 374.

Bestandtheile	Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 7	Nr. 8
Kupfer	88,46	76,41	83,62	87,95	95,96	86,76	87,89	88,81
Zinn	10,04	7,05	10,85	11,44	3,28	10,24	11,58	9,61
Blei	1,50	16,54	5,53	—	0,76	2,31	—	—
Eisen	—	—	—	—	—	—	0,27	1,18
Gold	—	—	—	—	Spur	Spur	—	—
	100,0	100,0	100,0	99,39	100,0	99,31	99,74	99,60

Ueber die Natur und Bearbeitung einiger in China gebräuchlicher Metalllegirungen hat Stan. Julien (1) Nachricht gegeben. Man gebraucht nur das legirte, nicht das reine Kupfer : die Legirung desselben mittelst Galmei kann warm, die mit japanischem Blei mufs kalt geschlagen werden. Die Legirung mit einer gewissen Menge Arsen (pé-tong) ist weifs, viel schwerer zu bearbeiten als Messing und bei Reichen im Gebrauch. Für musikalische Instrumente legiren die Chinesen das Kupfer mit $\frac{1}{4}$ Zinn. — Bei Geschirren sind Löthungen gebräuchlich, nämlich die kleine (weiche) mit Zinn und die grofse (harte) mit Glockengut (d. i. Kupfer mit $\frac{1}{4}$ Zinn), welche mit einem Brei aus Reis aufgetragen wird. — Die Becken werden ohne Ambos, auf der Erde (?) geschlagen; man kann ihnen je nach dem Grade der Ausbauchung den weiblichen (scharfen) oder den männlichen (tiefen) Ton geben.

Chinesische
Bronze.

Brunel, Bisson und Gaugain (2) geben, statt der im Jahr 1841 vorgeschlagenen Cyanverbindungen, zum Uebersetzen der Metalle mit Bronze oder Messing auf galvanischem Wege folgende Vorschrift : 50 Th. kohlen. Kali, 2 Th. Chlorkupfer, 4 Th. Zinkvitriol und 25 Th. salpeters. Ammoniak, zusammen in Wasser aufgelöst. Der zu bronzierende Gegenstand wird mit dem — Pol einer Bunsen'schen Batterie verbunden, als zersetzende positive Platte ein Messing- oder Bronzeblech angewendet. Nach dem Zeugnis von Becquerel sollen die Producte mit der schönsten gewöhnlichen Bronze den Vergleich aushalten.

Galvanische
Bronze.

(1) Compt. rend. XXIV, 1069; J. pr. Chem. XLI, 284. — (2) Aus dem Moniteur industriel 1848, Nro. 1227 in Dingl. pol. J. CVIII, 20; Bull. soc. d'enc. 1848, 260.

Glocken-
metall.

Das Metall zweier im Jahr 1670 von Peter Hemo in Amsterdam gegossener Glocken des Darmstädter Glockspiels, — nämlich 1) vom Ton des zweigestrichenen h, 2) vom Ton des dreigestrichenen c — ist von A. Heyl (1) analysirt worden :

	Zinn	Blei	Kupfer	Nickel	Eisen	Arsen	} in 100
Nr. 1	21,67	1,19	73,94	2,11	0,17	Spur	
Nr. 2	21,06	2,14	72,52	2,66	0,15	Spur	Thl.

Chinesische
Kupferleg-
rungen.

II. Onnen (2) hat nachstehende Kupferlegirungen tersucht (die Trennung des Nickels vom Zink geschah nach Methode von Smith) : 1) Chinesisches Kupfer oder Pitong, ein breiter Kuchen, von weißgelber Farbe. — 2) I selbe, ein Ring, von unregelmäßig gelber Farbe. — 3) 0 Benennung, schön roth. — 4) Chinesisches Kupfer, e Sorte, schön roth. — 5) Chinesisches Kupfer, zweite S kupferroth. — 6) Chinesisches Kupfer, dritte Sorte, den No. 5 gleich. — 7) Benannt wie No. 4, kupferroth. 8) Benannt wie No. 5, aber schwärzlichroth. — 9) V s ich wie das vorige.

Zinn ist nicht vorgefunden worden.

Nummer . . .	1	2	3	4	5	6	7	8
Spec. Gew. . . .	8,57	7,84	8,31	8,93	8,70	8,45	8,58	8,70
Silber	0,12	0,14	0,14	0,505	0,07	0,07	—	—
Kupfer	87,54	85,09	98,49	97,79	82,21	62,49	97,12	92,65
Eisen	1,17	4,08	0,01	0,21	0,19	0,40	1,28	0,10
Nickel	11,84	9,49	1,19	1,35	0,71	0,74	1,84	2,11
Kobalt	0,44	1,16	—	—	—	—	—	—
Schwefel	0,10	0,49	—	—	—	—	0,30	0,06
Zink	—	—	—	—	17,56	35,84	—	—
Blei	—	—	—	—	—	—	—	5,75

Kupferamal-
gam für Zahn-
ärzte.

Seit einiger Zeit bedienen sich die französischen Z ärzte eines Kupferamalgams zum Plombiren der Zi Pettenkofer (3) giebt über diese merkwürdige Sub folgende schätzbare Beobachtungen.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXII, 86. — (2) Scheik. Onderz. IV, J. pr. Chem. XLIV, 242. — (3) Dingl. pol. J. CIX, 444; Repert. F [3] II, 79; Pharm. Centr. 1849, 444. Auch der S. 450 erwähnte schwamm wird zum Plombiren der Zähne gebraucht.

Die Oberfläche dieses Amalgams, welches in Gestalt Kupferamal-
gam für Zahn-
ärzte. kleiner 5 bis 6 Grm. schwerer Brode bezogen wird, ist graulich angelaufen, die Härte bedeutender als Bein, Zusammenhang und Festigkeit groß. Das Gefüge ist feinkörnig krystallinisch. Eine untersuchte Probe bestand aus 0,3 Kupfer und 0,7 Quecksilber. Das Amalgam hat die merkwürdige Eigenthümlichkeit, daß es bis nahe zum Siedepunkt des Wassers erhitzt aufschwillt und Quecksilbertropfen ausschwitzt, welche beim Abkühlen wieder verschwinden. Wird ein so erhitztes Stück noch warm im Mörtel zerrieben, so erhält man eine plastische, wie magerer Thon formbare Masse, deren Bildsamkeit durch fortgesetztes Kneten bis zu der des fetten Thones gesteigert werden kann. Bleibt die geformte Masse 10 bis 12 Stunden in Ruhe, so erhärtet sie, indem sie die vorigen Eigenschaften wieder annimmt, und zwar — was für die Anwendung hochwichtig ist — ohne Aenderung des spec. Gewichts, d. h. ohne Veränderung des Volums. Dergestalt bleibt die Ausfüllung eines hohlen Zahns nach dem Erhärten fest eingepaßt. Die beschriebene Erweichung und Erhärtung kann oft hintereinander vorgenommen werden.

Pettenkofer schreibt diese Erscheinungen einem Amorphismus zu, in welchen das Amalgam bei der Erweichung aus dem krystallinischen, festen Zustand übergehe; doch läßt das Freiwerden von Quecksilber auch auf eine chemische Ursache schließen. Nach Pettenkofer's Versuchen zeigen alle Kupferamalgame zwischen 0,25 und 0,33 Kupfergehalt dasselbe Verhalten.

Als beste Vorschrift zur Darstellung des Amalgams empfiehlt Pettenkofer, einen Krystallbrei von schwefels. Quecksilberoxydul (durch Auflösen von Quecksilber in Schwefelsäurehydrat bei mäßiger Wärme bereitet) unter Wasser von 60 bis 70° mit regulinischem feinzertheiltem Kupfer (durch Fällung des Vitriols mit Eisen bereitet) zu reiben. Ein Theil des Kupfers schlägt alsdann, unter Bildung von Kupfervitriol, das Quecksilber nieder, welches

Kupferamal-
gam für Zahn-
ärzte.

sich mit dem Rest zu Amalgam verbindet. Auf 100 Th. aufgelöstes Quecksilber braucht man das aus 232,5 Th. Kupfervitriol mit Eisen ausgefällte Kupfer. — Weil sich leicht, besonders bei zu hoher Temperatur, beim Auflösen Quecksilberoxyd- statt Oxydulsalz bildet, so ist es zweckmäßiger — um einen Ueberschufs an Quecksilber im Amalgam zu vermeiden — 293 Th. Kupfervitriol zu nehmen. Man hat alsdann dem ausgewaschenen Amalgam, nach Maafsgabe der Quantität Oxydulsalz, die sich gebildet hatte, noch Quecksilber in kleinen Portionen unter Umrühren zuzusetzen, bis das Ganze gehörig bildsam geworden ist. (Leicht und schnell erhält man dieses Amalgam, wenn das feinertheilte Kupfer mit einigen Tropfen einer Auflösung von salpeters. Quecksilberoxydul benetzt und dann mit Quecksilber in einer erwärmten Reibschale zusammengerieben wird. Das Zusammenreiben muß anhaltend und kann unter heißem Wasser geschehen; man setzt soviel Quecksilber zu bis die gewünschte salbenartige Consistenz erreicht ist). — Das Amalgam wird weder von heißem Wasser, noch von verdünnten Säuren oder Alkalien, noch von Weingeist oder Aether angegriffen, und möchte noch zu vielen anderen Zwecken, als Kitt z. B., dienlich sein.

Nickelhaltiges
Kupfer.

G. F. Wille hat die Analyse einiger nickelhaltigen Hüttenproducte in Auftrag der kurhessischen Oberberg-Direction unternommen (1). Diese Producte sind :

- 1) Schwarzkupfer von Richelsdorf, durch Zusammenschmelzen der, beim Gahrmachen des dortigen Kupfers fallenden, Gahrkrätze erhalten (Schwarzkrätzkupfer). —
- 2) Gahrkupfer, aus diesem Schwarzkupfer gewonnen. —
- 3) Gahrkupfer aus Schwarzkrätzkupfer, welches aus der Gahrkrätze der Friedrichshütte zu Richelsdorf erhalten wird; oberste Scheibe. —
- 4) Dasselbe; zweite Scheibe. —
- 5) Gahrkupfer aus gewöhnlichem Schwarzkupfer der Friedrichshütte; oberste Scheibe. —
- 6) Dasselbe; zweite Scheibe. —

(1) J. pr. Chem. XLII, 189.

(Die folgenden Scheiben von 3) und 4) enthalten nur Spuren ^{Nickelhaltiges} Kupfer.

Die Analysen ergaben :

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kupfer	71,0	76,8	83,25	96,98	83,00	87,75
Eisen	11,0	4,0	3,40	0,20	0,80	0,30
Nickel	10,0	13,6	12,82	2,99	12,10	7,85
Kobalt und Arsen .	—	—	—	—	Spur	Spur
Sauerstoff	—	—	—	—	3,70	2,58
Schwefel	7,0	5,1	1,19	0,10	—	—
Verlust	1,0	0,5	—	—	0,40	1,52
	100,0	100,0	100,66	100,27	100,0	100,00

Man vergleiche damit frühere Beobachtungen über den Nickelgehalt des Kupfers von Genth (1). Schon seit längeren Jahren werden auf der sächsischen Saigerhütte zu Grünthal namhafte Quantitäten Nickel als Nebenproduct beim Kupfergahrmachen gewonnen.

R. F. Marchand (2) hat die Analyse einer durch ihren ^{Nickelspeifse} Reichthum an Wismuth ausgezeichneten Nickelspeifse aus Sachsen bekannt gemacht, welche von Schneider ausgeführt worden. Die Trennung von Kobalt und Nickel geschah nach H. Rose's Methode :

Schwefel . . .	2,182	Uebertrag . .	51,659
Wismuth . . .	13,185	Kobalt	3,262
Arsen	35,319	Nickel	43,248
Eisen	0,973	Kupfer	1,568
	<u>51,659</u>		<u>99,737</u>

C. Schnabel (3) theilt folgende Analysen von nickel- ^{Nickelhaltige} haltigen Producten mit : ^{Hüttenpro-}

	Nickelhaltiges Gahrkupfer. Isabellenhütte bei Dillenburg	Nickelmetall von Henkel in Kassel; aus Nickelspeise
Kupfer	97,49	7,96
Nickel	0,69	89,35
Eisen	0,31	2,69
Schwefel	0,14	—
Silicium	1,35	—

(1) J. pr. Chem. XXXVII, 193. — (2) J. pr. Chem. XLIII, 317.
— (3) Pogg. Ann. LXXI, 516; Dingl. pol. J. CV, 238.

Englisches
Neusilber.

Das englische Neusilber ist von Louyet (1) und von Elsner (2) analysirt worden. No. 1 bis 3 dient in Birmingham zu Geschirren, die nachher versilbert werden; No. 4, von Sheffield, zu Blanchetten, und zeichnet sich durch besondere Elasticität aus. Es fanden in 100 Theilen:

	Louyet			Elsner
	No. 1.	No. 2.	No. 3.	No. 4.
Kupfer . .	63,34	62,40	62,63	57,4
Zink . . .	17,01	22,15	26,05	25,0
Nickel . .	19,13	15,05	10,85	13,0
Eisen . . .	Spur	Spur	Spur	3,0
Verlust . .	0,52	0,40	0,47	1,6

Schmelz-
punkte ver-
schiedener
Legirungen.

Thomson (3) untersuchte die Schmelzpunkte der Legirungen von Blei, Zinn, Wismuth und Zink. — Für die Legirungen aus Zinn und Blei ergab sich :

Aequiv. Verhältnifs	Spec. Gew.		Schmelzpunkt
	gefunden	berechnet	
Pb + Sn	9,288	9,899	182,2°
Pb + 2 Sn	8,688	9,209	182,8
Pb + 3 Sn	8,549	9,002	182,8
Pb + 4 Sn	7,850	8,545	190,0

Es findet mithin in allen Fällen Ausdehnung statt und Verminderung des Schmelzpunktes; denn das Mittel aus den Schmelzpunkten beider Metalle einzeln genommen ist 273,6°. — Die Legirungen Pb + Bi und Pb + 2l zeigten ein spec. Gewicht von 10,831 und 10,509, während die Rechnung für das mittlere spec. Gewicht 10,580 und 10,328 ergibt, also eine Zusammenziehung stattfindet. Der Schmelzpunkt der ersten ist 134,3°, der zweiten Legirung 128,2°, das Mittel aus den Schmelzpunkten der beiden Metalle einzeln genommen ist 288,6°. — Die Legirungen sind schön und weiß, aber spröde. Ebenso die Legirungen von Zinn und Wismuth; diese ergaben für :

(1) Technologiste Decbr. 1846; Dingl. pol. J. CIII, 234. — (2) A den Verhandlungen des preussischen Gewerbevereins in Dingl. pol. CIII, 155. — (3) Verh. Gew. Bef. Pr. 1848, 45, im Ausz. aus Procès phil. Soc. Glasgow.

	Spec. Gew.		Schmelzpunkt
	gefunden	berechnet	
Bi + Sn	8,709	8,972	137,8°
Bi + 2 Sn	8,418	8,513	134,4

Die Legirungen aus Zinn und Zink, welche weifs, hämmerbar und dem Pewter ähnlich sind, ergaben für :

	Spec. Gew.		Schmelzpunkt
	gefunden	berechnet	
Zn + Sn	6,427	7,181	195,3°
Zn + 2 Sn	7,231	7,222	196,5

Die Legirung Sb + Pb ist weifs, brüchig und hat ein geringeres spec. Gewicht als das mittlere der Bestandtheile; Sb + Sn ist sehr brüchig, hat aber ein höheres spec. Gewicht als das berechnete.

Das übliche Verfahren, Schwefelsäure in Bleikammern zu fabriciren, ist von den Industriellen fortwährend, als das für den grossen Maassstab am meisten geeignete, anerkannt und ausschliesslich im Gebrauch. Nichtsdestoweniger sind die Vorzüge dieses umständlichen, mit in der Anschaffung und Unterhaltung gleich kostspieligen Apparaten verbundenen Verfahrens, sehr relativ. Es scheint aber nicht, dass die beiden Erfindungen, über welche wir zu berichten haben, die Frage einer einfacheren und wohlfeileren fabrikmässigen Darstellung der Schwefelsäure in genügender Weise gelöst haben.

Schwefel-
säurefabri-
cation.

Die eine davon ist eine von Schneider (1) erfundene Methode, Schwefelsäure aus Rohschwefel, ohne Bleikammern und ohne Mitwirkung der Oxyde des Stickstoffs, in einem einfachen, wohlfeilen Apparate vermittelt »besonders präparirten Bimssteins« zu machen. Sie hat in der industriellen Welt, hauptsächlich durch die Empfehlung der Bericht-erstatte der Academie in Paris — Payen, Pelouze und

(1) Bull. soc. d'enc. 1848, 78; Dingl. pol. J. CVII, 159. 368; Vollständigere Beschreibung und Abbildung Bull. soc. d'enc. 1848, 372; Dingl. pol. J. CIX, 354.

Schwefel-
säurefabrica-
tion.

Dumas — großes Aufsehen gemacht. Die von Schneider veröffentlichte Beschreibung berechnet die Herstellungskosten auf weniger als die Hälfte von dem der Bleikammern gleicher Wirksamkeit; sie ist ausführlich in den weniger wesentlichen Theilen, dagegen wortkarg und dunkel in den wesentlichen Theilen, und übergeht die Zubereitung des Bimssteins gänzlich mit Stillschweigen. Auch die sonst sehr detaillirte Abbildung ist unverständlich, weil sich Auf- und Grundriss des Apparates nach den Regeln der Zeichenkunst nicht genau aufeinander zurückführen lassen. Das Ganze ist ein System weiter Steinzeugröhren, welche auf einem gemeinschaftlichen Sammelbehälter, in Jochen oder Zickzackbiegungen, aufgestellt sind. Diese Röhrenleitung empfängt am einen Ende schweflige Säure und Luft aus einem Brenner; der Gasstrom passirt nicht durch den Bimsstein, sondern an ihm vorbei, da dieser auf dem ganzen Weg in Schalen an der inneren Wand der Röhren vertheilt ist, ohne deren Lumen auszufüllen; in jedes Röhrenjoch fließt von oben ein Wasserstrahl, der durch Hilfsröhren im Inneren auf die einzelnen Schalen mit Bimsstein vertheilt wird, daselbst die Schwefelsäure aufnimmt und in den Sammelbehälter nach unten abfließt. Die Art, wie die Hilfsröhren wirken, ist in der Abbildung und Beschreibung völlig unverständlich.

Es liegt nahe, unter der Präparation des Bimssteins eine Verplatinirung zu vermuthen, so daß das Schneider'sche Mittel eine Art wohlfeiler Platinschwamm wäre. Auch ist gewiß, daß die äußerst schwache Wirksamkeit des Bimssteins schon durch Ueberziehen mit 2 pC. Platin sehr merklich erhöht wird. Indessen stellt Schneider, soviel wir wissen, die Mitwirkung dieses Metalls in Abrede, und verkauft überhaupt sein Verfahren als Geheimniß; da er sich übrigens weigert, seine Abnehmer von der Wirksamkeit seines Apparates im Großen durch Augenschein vor der Erlegung der Kaufsumme zu überzeugen, so werden wir schwerlich im Stande sein ehestens weiter dar-

über zu berichten, und lassen dahingestellt sein, ob seine Erfindung eine von denjenigen ist, die nicht zur Ausführung sondern nur zum Geheimverkauf bestimmt sind. Sie hat sich bis Jetzt so gut wie gar nicht verbreitet.

Schwefel-
säurefabrica-
tion.

Tilghman (1) hat ein Verfahren in England patentirt erhalten, welches die Ersetzung des Rohschwefels durch Gyps in der Schwefelsäurefabrication bezweckt. Er bringt Gypsstücke in einem senkrechtstehenden, inwendig mit Magnesit überzogenen, thönernen Cylinder zur starken Rothglühhitze, leitet durch den Boden und die damit verbundenen glühenden Thonröhren Wasserdampf, und durch den Deckel die gasförmigen Zersetzungsproducte (nämlich Sauerstoff, schweflige und Schwefel-Säure) nach den Bleikammern. In der Retorte soll Aetzkalk zurückbleiben. — Im Kleinen gelingt diese Zersetzung selbst bei lebhafter Rothglühhitze nicht. Auch möchte dieses Verfahren, wenn es an sich ausführbar ist, kostspieliger sein, als der Rohschwefel bei dem wohlfeilen Wassertransport.

In gleicher Weise behandelt Tilghman entwässertes Bittersalz; nach demselben Princip, aber auf der Sohle eines Flammofens, in dessen Decke die Dampfrohren angebracht sind, den schwefels. Strontian und Baryt.

Die fabrikmässige Umgestaltung des Glaubersalzes in Soda hat, seit dem Bekanntwerden der Leblanc'schen Methode, sich zu einem hochwichtigen Industriezweige ausgebildet und nach und nach eine enorme Ausdehnung erlangt, in dem Maasse, als eine Menge und gerade solche Industriezweige, welche nicht auf Gegenstände der Mode, sondern auf das bleibende Bedürfnis zielen, von ihr abhängig geworden sind. Es ist auffallend, daß der Chemismus des Sodaprocesses, gerade in den verflossenen Jahrzehnten seines bedeutenden Aufschwungs und obgleich wir nichts weniger als eine klare Einsicht in denselben besitzen, von den Chemikern so gänzlich vernachlässigt geblieben

Sodafabrica-
tion.

(1) Rep. of pat. inv. 1847, 160; Dingl. pol. J. CVI, 196.

Sodafabrica-
tion.

ist; — aber auch um so erfreulicher, daß ihm in den beiden letzten Jahren eine sehr thätige Aufmerksamkeit zu Theil geworden. Am meisten haben sich J. Brown (1) und B. Unger (2) den Dank der Wissenschaft und der Praxis durch ihre Untersuchung verdient. Während Brown sich ausschließlich auf dem Boden der Praxis und der von ihr vorgezeichneten Bahn festhält, bewegt sich Unger mehr in dem rein wissenschaftlichen Versuche und der Speculation; während der erstere sich darauf beschränkt, den chemischen Bestand aller im Verlauf der Fabrication auftretenden Producte festzustellen, bezweckt die Untersuchung des letztern wesentlich die Entwicklung der Theorie von der Umwandlung des Glaubersalzes in Soda.

Brown geht von dem zu Grunde liegenden Naturproduct, von dem Kochsalz aus, und vergleicht damit das aus seiner Zersetzung hervorgehende Glaubersalz.

Das Kochsalz stammt aus den Salzsoolen des new red sandstone der Grafschaft Cheshire in Nord-England, welche die Sodaindustrie dieses Landes fast ausschließlich damit versehen. Er fand :

Das Glaubersalz.	im Kochsalz	in dem daraus gewonnenen Glaubersalz
Chlornatrium . . .	93,161	1,095
Chlorkalium . . .	Spur	—
Chlormagnesium . .	0,106	—
Schwefels. Kalk . .	1,009	0,973
„ Magnesia . .	0,135	0,289
Kohlens. Kalk . . .	0,150	—
Schwefels. Natron . .	—	96,217
Eisenoxyd	—	0,230
Schwefelsäure . . .	—	0,885
Wasser	5,460	—
Sand	—	0,310
	<hr/> 100,021	<hr/> 99,999

(1) Proceedings of the phil. Soc. of Glasgow; Phil. Mag. [3] XXXIV, 15; Dingl. pol. J. CXI, 343. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXI, 129; LXIII, 104; LXVII, 78; Dingl. pol. J. CIV, 45; CXI, 334; J. pharm. [3] XII, 129.

Während Leblanc Glaubersalz, Kalkstein und Kohle in dem Verhältniß 100 : 100 : 50 vorgeschrieben hatte, wendet man jetzt in der Regel das Verhältniß 100 : 103 : 62 als entsprechender an. Wir übergehen die nähere Beschreibung des Schmelzprocesses bis auf die Bemerkung, daß man ihn in der Praxis zu einem Zeitpunkt als beendet ansieht und die Schmelze aus dem Ofen zieht, wo dieselbe noch in voller Gasentwicklung steht und letztere nicht etwa bereits völlig aufgehört hat. In dem erhaltenen Schmelzproduct fanden die beiden Chemiker Nachstehendes :

	Englische rohe Soda Brown	Rohe Soda von Ringkuhl Unger
Natrium	18,345	18,53
Calcium	21,670	25,88
Magnesium	0,214	0,40
Eisen	3,129	1,54
Thonerde	1,038 (1)	Spur
Schwefel	12,536	11,85
Chlor	1,131	1,55
Schwefelsäure	0,643	1,13
Kohlensäure	14,520	15,30
Kieselerde	3,394	4,08
Wasser	0,700	4,99
Sand	4,285	2,02
Kohle	7,998	1,59
Ultramarin?	0,295	—
Sauerstoff und Verlust	9,723	11,14
	<hr/> 100,000	<hr/> 100,00
Davon sind löslich	40,43	} nicht bestimmt.
unlöslich	59,56	

Das Wasser ist nach Unger zum Theil hygroscopisch (2,10 pC.), zum Theil chemisch gebunden (2,89 pC.), und keine andere Säure des Schwefels außer SO_3 , ebensowenig ein Mehrfach-Schwefelmetall nachweisbar. — Beim Auslaugen der rohen Soda entsteht bekanntlich eine grüne Lösung, welche sich in der Siedhitze unter Ausscheidung grüner Flocken entfärbt. Brown findet diese Flocken aus

(1) Im Original steht irrthümlich berechnet 0,846.

Sodafabrica-
tion.
Rohes Soda.

Kiesel-, Thonerde und etwas Kalk zusammengesetzt, und nimmt sie etwas voreilig für (zersetzten) Ultramarin, auf den bloßen Grund hin, daß die Bildung dieses Körpers in den Sodaöfen hie und da beobachtet worden. Es ist umgleich wahrscheinlicher, daß diese grüne Färbung von Schwefeleisen herrührt, und Brown den Eisengehalt jener Flocken übersehen hat.

Die directen, empirischen Ergebnisse der Analyse sind von den genannten Beobachtern in folgender Weise rationell gruppirt worden; zur Vergleichung fügen wir eine Analyse Richardson's von roher Soda aus Newcastle bei:

	Brown	Unger	Richardson
Kohlens. Natron	35,64	23,57	9,89
Natronhydrat	0,61	11,12	25,64
Schwefels. Natron	1,16	1,99	3,64
Chlornatrium	1,91	2,54	0,60
Thonerde-Natron	2,35	—	—
Schwefelnatrium	1,13	—	—
Calciumoxysulfür (3 CaS, CaO)	29,17	34,76	35,57
Aetzkalk	6,30	kohlens. Kalk 12,90	15,67
Schwefeleisen	4,92	2,45	1,22
Kiesels. Magnesia	3,74	4,74	0,88
Wasser	0,70	2,10	2,17
Ultramarin?	0,29	—	—
Kohle	8,00	1,59	4,28
Sand	4,28	2,02	0,44
	<u>100,20</u>	<u>99,78</u>	<u>100,00</u>

Daß an dieser Zusammenstellung die Conjectur einen größeren Antheil hat, als die Beweisführung durch Induction, zeigt schon die große Verschiedenheit der vorstehenden Columnen, bei so großer Uebereinstimmung in den directen Ergebnissen der Analyse. Die Hauptdifferenz liegt in einem sehr wesentlichen Punkte, nämlich in der Verrechnung des Natrons. Unger nimmt den disponiblen Kalk als kohlens. Kalk, neben einem entsprechenden Antheil Natronhydrat an. Diese an sich nicht wahrscheinliche Annahme kann in dem von Schwarzenberg gefundenen hohen Gehalt des Sodasalzes von Kassel an Natronhydrat worauf sich Unger beruft, keine Stütze finden, weil diese

ein Product des Auslaugens sein kann. Wenn Unger auf der andern Seite durch einen directen Versuch mit Tiegel und Windofen darthut, daß durch Glühen eines Gemenges von 3 Aeq. kohlens. Kalk mit 1 Aeq. Glaubersalz und überschüssiger Kohle ein Theil des Kalkes kohlsauer bleibt, so wird auch dadurch für seine Ansicht wenig bewiesen, denn die Umstände sind für den Kalk im offenen Feuer des Sodaofens, zur Abgabe seiner Kohlensäure, viel günstiger. Brown hat durch unmittelbare Digestion der rohen Soda mit Alkohol, wobei nur sehr geringe Mengen Alkali gelöst wurden, seine Ansicht bewiesen, wonach der überschüssige Kalk als Aetzkalk, und nur verschwindende Mengen Natron als Hydrat vorhanden sind. — Die Verbindung des Kalks mit Schwefelcalcium in der rohen Soda, welche beim Auslaugen so wichtig ist, glaubte Dumas muthmaßlich als $2\text{CaS}, \text{CaO}$ annehmen zu müssen. Unger hat aus den Gewichtsverhältnissen seiner Analyse, sowie aus der Analogie mit dem von H. Rose beschriebenen $3\text{BaS}, \text{BaO}$, die Zusammensetzung $= 3\text{CaS}, \text{CaO}$ hergeleitet, welche auch Brown angenommen hat.

Den Rückstand, welcher beim Auslaugen der rohen Soda erhalten und mit dem ganzen Schwefelgehalt des Glaubersalzes über die Halde gestürzt wird, haben beide Chemiker, nach derselben Methode wie die rohe Soda, analysirt, und zwar Brown eine Probe aus einer Fabrik, Unger eine Probe die er selbst aus Kasseler roher Soda dargestellt.

Gefunden in der Analyse :			Berechnet nach der rohen Soda :		
	Brown	Unger		Brown	Unger
Natrium	?	1,06	Kohlens. Kalk	24,22	19,56
Calcium	32,19	39,11	3 CaS, CaO	20,36	32,80
Magnesium	0,43	0,59	Kiesels. Magnesia . . .	5,99	6,91
Eisen	3,96	2,56	Eisenoxyd	5,71	3,70
Schwefel	13,18	18,90	Sand	5,75	3,09
Schwefelsäure	2,50	—	Kohle	12,71	2,60
Kohlensäure	11,19	8,55	Unlöslicher Theil	74,74	
Gebundenes } Wasser . }	2,10	2,56	Schwefels. Kalk	4,28	3,69
Hygroskop. }		3,45	Unterschweflgs. Kalk .	Spur	4,12
Kieselerde	5,28	5,94	Zweifach-Schwefelcalcium	3,58	4,67
Sand	5,75	3,09	Einfach- "	8,53	3,25
Kohle	12,08	2,60	Kalkhydrat	5,58	10,69
Sauerstoff und Verlust .	11,34	11,59	Kohlens. Natron	1,31	—
			Schwefelnatrium	—	1,78
			Wasser	2,10	3,45
			Löslicher Theil	25,38	
				100,12	100,31

Sodafabrication.

Rückstand vom Auslaugen der rohen Soda.

Sodafabrication.

Brown fand in dem Sodarückstand 26,26 pC. auflösliche und 73,74 unlösliche Theile; die letzteren ergab 10,66 Kohlensäure und 21,89 Calcium. Auffallend ist, dass er gar keiner Natriumbestimmung erwähnt und doch kohlen Natron in der Zusammenstellung auführt; er hat ferner nicht ausdrücklich hervorgehoben, ob der von ihm untersuchte Rückstand völlig frisch war, oder nicht, was bei der raschen Oxydation desselben an der Luft von grossem Belang ist. Nach Brown's (approximativer) Bestimmung ist der Schwefel des Zweifach-Schwefelcalciums 2,2 pC., der der unterschwefligen Säure eine unwägbare Spur. Unger fand für erstern 4,68, für letzteren 0,016 pC.

Theorie der Umwandlung des Glaubersalzes in Soda.

Die Analysen der rohen Soda und des Auslaugerrückstandes, welche überdies in ihren Mischungsverhältnissen grossen Schwankungen unterliegen, sind bei weitem keine Grundlage von hinreichender Breite, um darauf eine Theorie des Sodaprocesses zu construiren, wie sie Unger gewagt hat. Wir lassen diese um so lieber unberührt, weil Unger bald nachher selbst davon absteht, auf den experimentellen Weg zurückkehrt und in seinen beiden späteren Abhandlungen (1) eine Reihe höchst schätzenswerther Thatsachen mitgetheilt hat, die wir hier in gedrängter Kürze wiedergeben:

Der erste Abschnitt ermittelt die Einwirkung der Kohle auf Glaubersalz, abgesehen von Kalk, und von Glaubersalz auf Kalk, abgesehen von Kohle, bei verschiedenen Graden der Glühhitze. Es zeigte sich:

1) Dafs die Kohlensäure durch Kohle bei der Schmelzhitze des Silbers noch nicht zu Kohlenoxyd reducirt wird.

2) Dafs das Glaubersalz mit Kohle bei einem Hitzgrade, welcher zwischen dem Schmelzpunkt des $14\frac{1}{2}$ löthigen und dem des reinen Silbers liegt, wesentlich Kohlensäure und nur Spuren von Kohlenoxyd bildet.

In einer Mischung von 26,67 Gewichtstheilen Zuckerkohle (mit 24,27 Kohlenstoff) und 73,33 Glaubersalz bleibt

(1) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 240; LXVII, 78.

nach dem Glühen (wobei übrigens nachweisbar kein Schwefelnatrium verflüchtigt wird) 11,35 Gewichtstheile Kohle unangegriffen zurück, und sind folglich 12,92 Gewichtstheile Kohlenstoff durch den Sauerstoff des Glaubersalzes verbrannt worden. Dieser verlangt der Rechnung nach 12,39 Kohlenstoff, um Kohlensäure zu bilden.

*Theorie der
Umwandlung
des Glaubersalzes in Soda.*

3) Dafs durch Glühen von Schwefelnatrium und Glaubersalz Schwefelsäure zersetzt wird; denn in einem Gemenge von Kohle mit dem 12- bis 50fachen Gewicht an Glaubersalz wird weit mehr Glaubersalz zersetzt, als dem verbrannten Kohlenstoff entspricht.

4) Dafs Glaubersalz und kohlen. Kalk schon bei der Temperatur, bei welcher das erstere durch Kohle reducirt wird, ihre Säuren, aber unter complicirten Erscheinungen, austauschen; denn der constante Glühverlust, welchen ein Gemenge von Glaubersalz und kohlen. Kalk (beide chemisch rein und zwar in Verhältnissen von 1 : 3, von 2 : 3 und von 1 : 1 Aequivalent angewendet) erfuhr, war stets um mehrere Procente gröfser, als dem Kohlensäureverlust des überschüssigen, d. h. nicht mit dem Glaubersalz umgesetzten, Kalkes entspricht. Hieraus, sowie aus der Analyse des Glührückstandes schließt Unger, dafs jedesmal 3 Aequivalent Glaubersalz auf 1 Aequivalent kohlen. Kalk einwirken, und neben Kohlensäure auch noch Sauerstoff und zwar aus dem schwefels. Kalk weggehe. Der Körper, welcher hiernach bleibt, ist nach dem Verhältnifs Ca SO zusammengesetzt, und wird von Unger für $3 \text{ CaS} + \text{CaO}, \text{SO}_3$ gehalten, woraus das basische Schwefelcalcium ($3 \text{ CaS} + \text{CaO}$) hervorgehe. Wodurch der Sauerstoffverlust des Gypses veranlaßt wird, und auf welche Weise aus $3 \text{ CaS} + \text{CaO}, \text{SO}_3$ das basische Schwefelcalcium des Sodarückstandes entsteht, ist nicht mit Entschiedenheit dargethan.

Der zweite Abschnitt handelt von dem Verhalten der drei Bestandtheile der Sodabeschickung, wenn diese gleich-

Sodafabrica-
tion.
Theorie der
Umwandlung
des Glaubersalzes in Soda.

zeitig unter verschiedenen Umständen aufeinander einwirken.

1) Einfluss der Temperatur. Ein inniges Gemenge von 100 Glaubersalz (wasserfrei), 100 Kreide und 55 Buchenkohlenpulver wurde sechs verschiedenen Hitzgraden ausgesetzt. Bei keinem Hitzgrad trat Schmelzung ein; von jeder einzelnen Probe wurden die auflöslichen Salze abgeschieden und analysirt :

Bestandtheile des löslichen Theils.	Erster Hitzgrad	Zweiter Hitzgrad	Schmelzhitze des Silbers	Vierter Hitzgrad	Fünfter Hitzgrad	Wieviel Kohlenpulver
Kohlens. Natron . .	10,8	15,4	29,0	26,0	19,0	14,4
Einf.-Schwefelnatrium.	0,8	0,6	0,9	6,9	11,8	15,8
Unterschweflgs. Natron	0,0	0,0	0,4	0,6	0,9	1,6
Schwefels. Natron . .	26,5	23,2	10,3	3,5	3,2	1,6

Man sieht hieraus, dass die Bildung von kohlens. Natron mit steigender Hitze zunimmt, bei der Temperatur des schmelzenden Silbers ein Maximum erreicht, und bei noch höherer Temperatur wieder abnimmt. Keines von allen sechs Producten kann mit vollem Recht rohe Soda genannt werden, obgleich die drei ersten, wenn man die große Menge unzersetztes Glaubersalz abzieht, sich einer solchen nähern. Es muss also neben dem richtigen Mischungsverhältniss und dem richtigen Hitzgrade noch ein Drittes zur Bildung von roher Soda gehören; dieses ist

2) der Einfluss des Wasserdampfes auf die glühende Masse. Werden die obigen Glühproducte einem Wärmegrad ausgesetzt, der zwischen dem Schmelzpunkt einer Legirung von 1 Silber mit 9 Zinn und dem einer Legirung von gleichen Theilen liegt, und ein Strom von Wasserdampf darüber geleitet, so verwandeln sie sich in wahre rohe Soda. Einige Versuche mit Schwefelcalcium und einem Gemenge von Gyps und Kohle (welche den Wasserdampf zersetzt) zeigten, dass durch die Einwirkung d

Wassers auf beide in der Glühhitze ein Theil des Schwefelcalciums seinen Schwefel an den Wasserstoff abgiebt und den Sauerstoff aufnimmt ($4 \text{ CaS} + \text{HO} = 3 \text{ CaS}, \text{CaO} + \text{SH}$). Mithin beruht die Wirksamkeit des Wasserdampfs wesentlich in der Bildung jenes so wichtigen basischen Schwefelcalciums. Bei Gegenwart von CO_2 entsteht zugleich CO , CaO .

Wir schliessen mit dem Wunsche, es möchte Unger recht bald Gelegenheit geboten werden, seine durch wissenschaftliche Hülfsmittel und im Kleinen gewonnenen, sehr dankenswerthen Erfahrungen in der grossen Praxis zu prüfen, mit ihr zu vergleichen und zu bestätigen.

Die fabrikmässigen Producte, welche aus der rohen Soda gewonnen werden, sind (a. S. 1044 a. O.) von Brown weiter untersucht worden, und zwar in der der englischen Sodaindustrie gewöhnlichen Form.

Man laugt mittelst der Methode successiver Sättigung mit warmem Wasser aus (No. I und II sind die Salze, welche man durch Verdampfen und Trocknen dieser Lauge bei 100° erhält), dampft ab und calcinirt (kohlensäuert) die Salzmasse im Flammofen (*carbonating furnace*) (III und IV) zu „Soda ash“. — Bei dem sogenannten *Carbonate of Soda*-Proceß pflegt man bis zur annähernden Trockne einzudampfen und die Mutterlauge (mit dem NaS und NaO , HO) ablaufen zu lassen; das rückständige Salz, getrocknet (V und VI) wird im *Carbonating furnace* fertig gemacht (VII und VIII). Eine bessere Sorte wird durch wiederholtes Auflösen, Eindampfen und Calciniren der vorigen dargestellt (IX und X). Diese feinere Sorte dient zugleich zur Darstellung des krystallisirten kohlens. Natrons (XI und XII). Das allerreinste Fabricat endlich, welches zuweilen in Glashütten gebraucht wird (XIII und XIV), entspringt aus der Calcination dieser krystallisirten Soda.

Sodafabrica-
tion.

	I und II		III und IV		V und VI		VII u. VIII	
Kohlens. Natron . . .	68,91	65,51	71,61	70,46	79,64	80,92	84,00	83,76
Natronhydrat . . .	14,43	16,07	11,23	13,13	2,71	3,92	1,06	0,73
Schwefels. Natron . .	7,02	7,81	10,20	9,15	8,64	7,43	8,76	9,49
Schweflgs. " . . .	2,23	2,13	1,11	1,14	1,24	1,11	Spur	0,38
Unterschweflgs. Natron	Spur	Spur	—	—	Spur	Spur	—	—
Schwefelnatrium . . .	1,31	1,54	—	—	Spur	0,23	—	—
Chlornatrium . . .	3,97	3,86	3,05	4,28	4,13	3,14	3,22	2,79
Thonerde-Natron . . .	1,02	1,23	0,92	0,73	1,17	1,01	1,01	0,62
Kiesels. " . . .	1,03	0,80	1,04	0,99	1,23	1,32	0,98	0,78
Unlösliches . . .	0,81	0,97	—	—	0,97	0,77	0,71	0,84
Sand	—	—	0,31	0,46	—	—	—	—

	IX und X		XI und XII		XIII u. XIV	
Kohlens. Natron . . .	84,31	84,72	36,47	36,93	98,12	97,98
Natronhydrat . . .	Spur	0,28	0,94	0,54	1,08	1,12
Schwefels. Natron . .	10,26	9,76	—	—	—	—
Schweflgs. " . . .	Spur	—	—	—	—	—
Chlornatrium . . .	3,48	3,14	0,42	0,31	0,74	0,56
Thonerde-Natron . . .	0,63	0,71	—	—	—	—
Kiesels. " . . .	0,41	0,32	—	—	—	—
Wasser	—	—	62,15	62,21	—	—
Unlösliches	0,25	0,50	—	—	—	—

Beringer (1) — indem er sich darauf stützt, daß Schwefelnatrium nur bei Gegenwart von Wasserdampf in der Glühhitze durch Kohlensäure zersetzt wird, und daß dieser an sich träge Proceß beschleunigt wird, wenn man fertige Kohlensäure hinzuleitet — hat die Idee, Soda ohne Kalkstein auf diese Weise aus dem reducirten Glaubersalz zu fabriciren. Er erklärt jedoch diese Idee in ihrer Anwendung auf den Sodaproceß selbst nicht für practisch — eine Ansicht, die wir vollkommen theilen — und will sie auf die Verarbeitung der Mutterlaugen beschränkt wissen. Zu diesem Zwecke soll die Kohlensäure aus den Kalköfen der Chlorkalkfabrication benutzt werden, was in der Praxis mehr Schwierigkeit als Vortheil bringen dürfte.

Neue Methode
der Sodafabri-
cation.

Tilghman (2) in London hat im Anfang 1847 ein Patent auf ein Verfahren der Sodaerzeugung genommen

(1) Dingl. pol. J. CIV, 286. — (2) Repert. of patent inventions Sept. 1847, 160; Dingl. pol. J. CVI, 196.

welches viel Aufsehen erregt hat und — wenn seine praktische Ausführbarkeit sich anders bestätigt — einen großen Umschwung der gegenwärtigen Industrie bewirken würde. Die Umwandlung des Kochsalzes geschieht nach diesem Verfahren, mit völligem Ausschluss des Schwefels oder der Schwefelsäure, lediglich durch die Einwirkung von Wasserdampf und Thonerde (durch Glühen von schwefels. Thonerde) in der Glühhitze. Die Thonerde wird in Stücken von $\frac{1}{4}$ Centner beiläufig in einen glühenden Cylinder von feuerfestem Thon gefüllt, und mit Wasserdampf vermischte Kochsalzdämpfe hindurchgeleitet. Diese letzteren erhält man durch Einleiten von Dampf in eine gußeiserne Retorte, worin Kochsalz in glühendem Fluß erhalten wird. Es entsteht auf der einen Seite Salzsäure, welche in einen Verdichter strömt; auf der andern Seite bleibt in der Retorte eine natronaluminathaltige Masse zurück, welche man mit heißem Wasser auslaugt, trocknet und auf's neue benutzt. Die Lauge wird mit Kohlensäure behandelt und so in Soda verwandelt. Die Reaction der Thonerde auf das Kochsalz ist nach unserer Erfahrung bei der Rothglühhitze von geringer Energie, und die Nothwendigkeit der Weißglühhitze hat für solche Fälle in der Praxis immer viel mißliches.

*Neue Methode
der Sodafabrication.*

In einem andern Theil seines Patent es eröffnet der Erfinder der neuen Sodafabrication einen nicht minder lockenden Prospect, indem er ein ähnliches Verfahren anzeigt, Kochsalz ohne Schwefel oder Schwefelsäure in Glaubersalz und dieses in Soda zu verwandeln. Zu dem Ende soll ein thönerner Cylinder mit gleichen Theilen Kochsalz und Gyps gefüllt, rothglühend gemacht, und Wasserdampf darüber geleitet werden. Die entwickelte Säure strömt nach einem Verdichter. Die auflöslichen Salze des Products werden mit Wasser ausgezogen und daraus das Glaubersalz von dem unzersetzen Kochsalz durch Krystallisation getrennt.

Kene Methode
der Sulfafabri-
cation.

Das so erhaltene Glaubersalz mengt der Erfinder mit gepulverter Thonerde, breitet das Gemenge auf der Sohle eines Flammofens aus und treibt über die glühende Masse einen Strom von Dampf, während sie fortwährend umgerührt wird. Nach geschehener Zersetzung zieht man das Natron mit Wasser aus und behandelt die Lösung gerade so mit Kohlensäure, wie in dem zuerst erwähnten Fall bei dem Kochsalz.

Ob diese Methoden fähig sind das herrschende Leblanc'sche Verfahren zu ersetzen, und welche von beiden die meisten practischen Vorzüge hat, muß bis auf weitere Erfahrungen, welche zur Zeit nicht bekannt geworden sind, dahin gestellt bleiben. Bei einem Versuch über die Zersetzung des Kochsalzes durch Gyps und Wasserdampf im Kleinen erhielt man reichliche Entwicklung von Salzsäure, sowie Reaction auf Glaubersalz im löslichen Theil des Rückstandes, — wenn ein gläsernes Verbrennungsrohr, nicht aber wenn ein Flintenlauf gewählt wurde. Es scheint sonach die Kieselerde der Zersetzungsretorten in dem Tilghman'schen Patent eine bedenkliche Rolle zu spielen.

Salze.
Salinenwesen.

In seiner Schrift »Untersuchung der -- königl. württemberg. Salinen« hat Fehling neben den Salzsoolen (siehe deren Analysen S. 1001) auch mehrere Nebenproducte des Salinenbetriebs und das für den Handel bestimmte Salz untersucht. Die käuflichen 18 Sorten Koch- und Steinsalz enthalten neben Chlornatrium noch : Chlorcalcium, schwefels. Natron, schwefels. Kalk, kohlen. Kalk, kohlen. Magnesia, Thon und Feuchtigkeit. Die Steinsalzsorten von Wilhelmshaus sind 98,36 bis 99,97 procentig; die Kochsalzsorten haben einen zwischen 92,19 (mittelgrobes Salz von Friedrichshall) und 98,9 (schwäb. Hall) pC. betragenden Gehalt an Chlornatrium. Der schwefels. Kalk

ist die vorherrschende Verunreinigung. Andere Chlor-Salinenwesen.metalle außer Chlorcalcium sind nicht vorhanden, und dieses nur in sechs Sorten.

Von den Mutterlaugen (deren spec. Gew. zwischen 1,2028 bis 1,2081) enthalten alle Chlornatrium, Bromnatrium, Chlorcalcium, schwefels. Kalk, Chlormagnesium; nur 5 Chlorkalium, nur 2 schwefels. Natron und 1 schwefels. Bittererde. Durch weiteres Abdampfen derselben entstehen die sogenannten „concentrirten Mutterlaugen“, welche sich besser für medicinische Zwecke und weiteren Transport eignen. Ihr spec. Gewicht ist zwischen 1,2143 und 1,2555; sie enthalten bestimmbare Mengen Chlorkalium, was in den einfachen nicht der Fall war. Der Gehalt an den löslicheren Salzen ist stark vermehrt, der an Chlornatrium entsprechend vermindert. Es spiegelt sich dies am meisten an dem Bromnatrium; dieses Salz ist z. B. in der ersten Mutterlauge von Friedrichshall 2 Gran, in der zweiten 14,8 Gran, in der dritten 57,5 Gran im Pfund. Jod konnte in keiner einzigen Lauge entdeckt werden.

Fünf untersuchte Pfannensteine enthalten: Kochsalz, Chlorcalcium, Chlormagnesium, schwefels. Natron (nur von schwäb. Hall), schwefels. Kalk als Hauptbestandtheile, kohleens. Kalk und Magnesia (nur von schwäb. Hall), Eisenoxyd, Thonerde, Thon, Kieselerde und Wasser.

Jacquelain (1) hat ein Verfahren bekannt gemacht, aus Chromerz (Chrom Eisenstein) zweifach-chroms. Kalk zu fabriciren, aus welchem man dann durch doppelte Zersetzung zweifach-chroms. Kali etc. darstellen kann. Dieser Weg ist bequemer und wohlfeiler, als die directe Verarbeitung der Erze zu dem Kalisalz.

Fabrication
von chroms.
Salzen.

Die in höchst feines Mehl gemahlenden und gesiebten Erze werden in Drehfässern mit Kreide gemengt, und das Gemenge 9 bis 10 Stunden lang in einer 1½ bis 2 Zoll

(1) Moniteur industriel 1847, No. 1182; Dingl. pol. J. CVI, 405; CVII, 134; J. pr. Chem. XLIII, 202; vergl. die übrigen Citate S. 416.

Fabrication
von chroms.
Salzen.

hohen Schichte auf der Sohle eines Flammofens einer lebhaften Rothglühhitze ausgesetzt und wenigstens stündlich umgewendet. Nach dieser Zeit löst sich das Gemenge bis auf die sandigen Theile in Salzsäure; es sieht gelblichgrün aus und besteht nun im Wesentlichen aus einfach-chroms Kalk. — Diese geglühte Masse zertheilt man unter Mühlsteinen, rührt sie mit heißem Wasser an und setzt unter stetem Umrühren Schwefelsäure bis zur schwachsauren Reaction zu. Das Kalksalz ist nun in zweifach-chromsaures verwandelt; es enthält noch schwefels. Eisen, welches in demselben Gefäß mittelst angerührter Kreide gefällt wird wobei das Chromsalz unverändert bleibt. Nach gehöriger Ruhe wird die klare Flüssigkeit vom Bodensatz abgelassen sie enthält nur zweifach-chroms. Kalk und etwas Gyps. Sie kann sogleich zur Darstellung von zweifach-chroms Blei, Kali etc. verwendet werden.

Tilghman(1) schlägt vor, das feingepulverte Chromerz mit 2 Th. schwefels. Kali und 2 Th. Kalk gemengt, 18 bis 20 Stunden lang, im stark oxydirenden Feuer eines Flammofens zu glühen — und zwar gleichzeitig in einem Strom von Wasserdampf.

Ein anderer, wohl beachtenswerther Vorschlag von demselben geht dahin, das Chromerz mit Feldspathpulver und Kalk zu glühen.

Blutlangensalzfabrication.

Die Erfindung von Possoz und Boissière(2), Blutlangensalz aus dem Stickstoff der Luft zu fabriciren, welche in der letzten Zeit viel Aufsehen gemacht hat, besteht darin, daß man mit 30 pC. Potasche getränkte, gepulverte Holzkohle in stehenden, weiten, thönernen Cylindern auf die hohe Weißglühhitze 10 Stunden lang erhitzt und Luft durchleitet

(1) Repert. of patent inventions 1847, 155, 160; Dingl. pol. J. CV, 195, 201. — (2) Compt. rend. XXVI, 208; Dingl. pol. J. CVII, 444 Pharm. Centr. 1848, 281. Die Beschreibung und Abbildung des Apparates siehe in Lond. J. of Arts 1845, 380; Dingl. pol. J. XCV, 293 ferner in Repert. of patent inventions 1847, 280; Dingl. pol. J. CIV, 444

Die durchgeglühte Kohle wird mit Spatheisensteinpulver gemengt und ausgelaugt.

Nach Keating (1) soll der Gyps (ähnlich wie mit Alaun) sehr gut durch Borax gehärtet werden können. Zu dem Ende befeuchtet er die gebrannten Gypsstücke mit einer Lösung aus 1 Gth. Borax in 9 Gth. Wasser durch und durch, worauf sie 6 Stunden lang stark geglüht und darauf gemahlen werden. Noch besser soll der Erfolg sein, wenn man dieser Lösung 1 Gth. Weinstein und die doppelte Wassermenge zusetzt.

Härten des Gypses.

Elsner (2) hat eine Eisenhohofenschlacke von Gleiwitz, welche erfahrungsmäßig mit Kalk einen hydraulischen Mörtel giebt, durch zwei seiner Schüler untersuchen lassen. Diese Schlacke hatte eine grünliche Färbung, welche durch Uebergießen des feinen Pulvers mit heißer Essigsäure unter Schwefelwasserstoffentwicklung verschwand, wobei die Säure etwas Eisen aufnahm; sie war also wohl durch Schwefeleisen verursacht. Mit Salzsäure gelatinirte die Schlacke sehr stark.

Schlacken zu hydraulischem Cement.

Jacobi Grashof

	1.	2.	
Kieselerde . .	40,12	40,44	
Thonerde . .	15,37	15,38	
Kalkerde . .	36,02	33,10	Hieraus berechnet Elsner die
Manganoxydul .	5,80	4,40	Formel :
Eisenoxydul . .	1,25	1,63	$2 (3 \text{ CaO}, \text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3, \text{SiO}_2)$
Kali	2,25	2,07	$+ 3 \text{ CaO}, 2 \text{ SiO}_2$
Schwefel . . .	0,70	0,76	
	<u>101,51</u>	<u>97,78</u>	

Gannal (3) hat eine Methode Bleiweiß zu fabriciren bekannt gemacht, die wir hier nur den Grundzügen nach berühren, weil sie lediglich eine Modification der Wood'schen Methode (4) und der schon früher von Prechtel (5)

Bleiweiß-fabrication.

- (1) Reports of patent inventions 1846, 184; Pol. Centr. 1847, 126; Dingl. pol. J. CIV, 158; J. pr. Chem. XL, 191; Bull. soc. d'enc. 1847, 93. — (2) Verh. Gew. Bef. Pr. 1847, 3. Lieferung; Dingl. pol. J. CVI, 321. — (3) Journ. Franklin Inst. Jul. 1847; Dingl. pol. J. CVI, 273. — (4) Dingl. pol. J. LIV, 127. — (5) Prechtel, techn. Encycl. II, 466.

Bleiweißfabri-
cation.

angegebenen ist. — Man lasse aus Bleiblech von 5 bis 8^m Stärke einen Cylinder von 2^m Länge und 0,3 bis 0,4 Durchmesser fertigen, welcher so in ein Gehäuse von Stahleisen eingeschlossen wird, daß er um seine Axe (50 mal in der Minute) gedreht werden kann. Durch eine weitere Spundöffnung bringt man granulirtes Blei mit Wasser ein durch eine engere Oeffnung der Kurbel gegenüber geht ein Schlauch in die Trommel, welcher einen Strom von Kohlensäure (durch Verbrennung von Holzkohle) mittels eines Gebläses einführt. Der Proceß wird beschleunigt wenn man dem Wasser etwas Salpetersäure oder salpeters Bleioxyd zusetzt. Das Product wird von dem unzersetzten feinertheilten Blei sorgfältig abgeschlämmt.

Tourmentin (1) erhielt ein Patent auf Bleiweißbereitung mittelst basischen Chlorbleies (aus Kochsalz und Glätte). Diese Bleiverbindung soll mit soviel Wasser angerührt werden, daß ein Strom von (nach obiger Art bereiteter) Kohlensäure ohne Schwierigkeit durchgetrieben werden kann (vergl. die Abbildung des Apparates a. a. O.). Es entsteht neutrales Chlorblei und Bleiweiß, wenn die Flüssigkeit mit Kohlensäure gesättigt ist. Diese wird nunmehr in einen bleiernen Kessel geschafft und mit einer hinreichenden Menge (eisenfreiem) Kreidepulver so lang gekocht, bis sie filtrirt nicht mehr von Schwefelammonium geschwärzt wird. Das entstandene Bleiweiß wird durch Waschen von dem Kalksalz befreit und zugleich abgeschlämmt.

Zinns. Natron.

R. Brown hat die Beobachtung (vergl. Seite 437) daß sich beim Kochen des metallischen Zinns mit Natronlauge und Bleioxyd zinns. Natron bildet, zur technischen Darstellung dieses Salzes, in größerem Maßstabe ohne Erfolg, zu benutzen gestrebt.

Ersatz für
grüne Arsenik-
farben.
Titangrün.

Zum Ersatz der grünen Arsenikfarben in Malerei und Tapetendruck schlägt Elsner (2) das unschädliche Titan

(1) Lond. J. of Arts 1848, 269; Dingl. pol. J. CIX, 218. — (2) Verh. Gew. Bef. Pr. 1846, 5. Lieferung; Dingl. pol. J. CV, 180.

grün (Titaneisencyanür), durch Fällen von Titansäure mit Blutlaugensalz, nach folgender Methode vor. Geschlämmter Rutil, oder Iserin, wird im hessischen Tiegel mit (12 Gth.) zweifach-schwefels. Kali aufgeschlossen, die geschmolzene Masse zerrieben, bei 50° mit Salzsäure (mit 2 Gth. Wasser verdünnt) digerirt und filtrirt. Das Filtrat wird abgedampft, bis ein Tropfen auf einer kalten Platte erstarrt; es bildet alsdann in der Abdampfschale einen Brei, den man auf einem Filter gut abtropfen läßt und dann anhaltend in einer Porcellanschale unter Zusatz von Salmiak (um die Bildung von einem basischen Eisensalz zu verhüten) kocht. Die schwerlösliche Titansäure wird hierdurch und durch Waschen und Filtriren fast weiß erhalten. — Der kohlen. Kalk, den der Iserin gewöhnlich enthält, kann vor dem Aufschließen leicht durch Salzsäure entfernt werden. — Zum Behuf der Fällung des Titaneisencyanürs ist die erhaltene breiartige Titansäure mit einer concentrirten Lösung von Salmiak zu übergießen, gut umzurühren und zu filtriren. Die auf dem Filter gebliebene Titansäure wird hierauf, wo möglich bis zur völligen Lösung, bei 50 bis 60° mit verdünnter Salzsäure digerirt, und die saure Flüssigkeit, nach Zusatz von Blutlaugensalzlösung, rasch zum Sieden erhitzt. Der schön dunkelgrüne Niederschlag wird mit salzsäurehaltigem Wasser ausgewaschen und vorsichtig getrocknet, weil er sich jenseits 100° zersetzt. Die Farbe steht übrigens dem Schweinfurter Grün etc. weit nach.

Erste für
grüne Arse-
nikfarben.
Titangrün.

Aus der von der Titansäurebereitung sich ergebenden rückständigen Flüssigkeit kann durch Eindampfen noch mehr Titansäure erhalten werden.

Bolley (1) in Aarau empfiehlt zu gleichem Zweck das bors. Kupferoxyd. Der Niederschlag aus 16 Th. Kupfervitriol und 24 Th. Borax wird mit kaltem (nicht mit heißem Wasser, welches ihn zersetzt) ausgewaschen, anfangs bei gewöhnlicher Temperatur, gegen Ende in der Wärme ge-

Bors. Kupfer-
oxyd.

(1) Schweiz. Gew. Blatt 1847, 28; Dingl. pol. J. CV, 158.

trocknet. Die hornartige Masse soll dann durch Glühen in einem hessischen Tiegel, wobei sie nicht schmelzen darf, entwässert werden. Sie erhält dadurch eine angenehm gelblichgrüne Nuance, wenn länger geglüht dunkelgrün, und braucht nur noch geschlämmt zu werden.

Nach dem Berliner Gewerbe-, Industrie- und Handelsblatt (1) ist die Farbe dieses bors. Kupferoxyds hellblaugrün, und zum Ersatz der grünen Arsenfarbe nicht geeignet. — Beide, das Titangrün und das bors. Kupferoxyd, sind nach Beringer (2) zu theuer. Er zieht es vor, das Grün aus Chromgelb und Berlinerblau zu mischen, anstatt, wie Elsner früher angegeben, aus Berlinerblau und gelben Pflanzenfarben.

Glasberei-
tung und
Töpferei.
Aho
Glasman'erei.

J. Müller (3) hat rothes, blaues und gelbes Glas aus den Glasmalereien der Wiesenkirche von Soest (von ächt germanischem Styl, welche gegenwärtig restaurirt werden) untersucht.

Das *rothe* enthielt: Kieselerde, Alkalien, Kalk, Magnesia, Thonerde, Eisenoxydul, Kupferoxyd (? Oxydul); das *blaue*: Kieselerde, Kalk, Thonerde, Kobaltoxyd, Eisenoxyd, Zinnoxid; das *gelbe*: Kieselerde, Thonerde, Eisenoxyd. Auf die übrigen Bestandtheile ist nicht untersucht worden.

Künstl. Aventurin.

C. Kersten (4) hat den künstlichen Aventurin von der Glasfabrik von Bigaglia in Venedig analysirt. Die Probe war ihm von Wolf, Director der Glashütte in Adorf bei Winterberg in Böhmen, übergeben worden und lieferte:

Kieselerde . . . 67,3	83,0	Uebertrag . . . 83,0	Diese Zahlen stimmen auffallend mit den früher von Pélégot erhaltenen überein.
Kalk 9,0		metall. Kupfer 4,0	
Eisenoxydul . . 3,4		Kali 5,3	
Zinnoxid . . . 2,3		Natron 7,0	
Bleioxyd . . . 1,0		99,3	

(1) Dingl. pol. J. CVI, 157. — (2) Dingl. pol. J. CVIII, 144. —

(3) Jahrb. pr. Pharm. XVII, 265. — (4) J. pr. Chem. XLII, 138.

Bei den Alten war unter dem Namen *Hämatinon* eine Hämatinon. Glasmasse für Prunkgefäße, Mosaiken etc. im Gebrauch, die unter andern von Plinius beschrieben und ziemlich häufig in den pompejanischen Nachgrabungen gefunden wird. Sie zeichnet sich durch eine schön rothe, zwischen der des Mennigs und Zinnobers liegende, Farbe aus. Sie ist undurchsichtig, härter als gewöhnliches Glas, sehr politurfähig, von muscheligem Bruch und einem spec. Gewicht = 3,5. Durch Schmelzen auf gewöhnliche Weise geht die rothe Farbe verloren und kann durch keinen Zusatz wieder hergestellt werden. Es entsteht eine grünlich-schwarze Masse, die durch reducirende Substanzen höchstens in ein trübes Braunroth umgewandelt werden kann. Das Hämatinon enthält kein Zinn und aufser Kupferoxydul keinerlei färbende Substanz. — Alle Versuche der Neueren, das antike Hämatinon nachzubilden, sind gescheitert (der italienische sogenannte Porporino ist davon in jeder Beziehung gänzlich verschieden); bis es endlich M. Pettenkofer (1) geglückt ist, durch Analyse des Hämatinons und darauf basirte synthetische Versuche ein Verfahren auszumitteln, um diesen Stoff in beliebigen Quantitäten mit aller Sicherheit zu erzeugen, so daß daraus — unter den gehörigen Vorsichtsmafsregeln — Platten jeder Gröfse gegossen und Gegenstände aller Art an der Pfeife geblasen werden können. — Pettenkofer's bis jetzt noch nicht veröffentlichte Erfindung verspricht dem Verfasser nicht nur den Dank der Künste, sondern auch der Wissenschaft, insofern das Hämatinon, in Eigenschaften und Natur, mit dem rothen Ueberfangglas und dem künstlichen Aventurin zusammenhängt, und daher Aufschluß über das noch immer räthselhafte Verhalten dieser merkwürdigen Producte zu erwarten steht.

Zum Löthen von zerbrochenem Porcellan empfiehlt A. Wächter (2) einen Glasfluß aus 3 Gth. Mennige, 2 Gth. feingemahlenem weißem Sand und 3 Gth. krystallinischer

Email zum
Löthen von
Porcellan.

(1) Dingl. pol. J. CVII, 78, wo P. obige Eigenschaften angiebt.
— (2) Dingl. pol. J. CX, 416.

Thone. Bei 100° getrocknet. — 2) *Thon aus der oberen Schicht des Thonlagers (sandy clay, d. i. sandiger Thon, auch *s clay* oder *Bull* genannt)*. Dient, wegen seines hohen Kieselergehalts, als Masse für die mit Kochsalz glasierte Waare. Spec. Gewicht 2,558. — 3) *Thon aus der zweiten Schichte des Thonlagers, Pfeifenthon (pipe clay)*, zu Tabackspfeifen gebraucht. — 4) *Blauer Thon (blue clay)*, von graulicher Farbe, sich weiszbrennend. Vorzüglichste Schichte. — 5) *Rother oder brauner Thon*, einer oberen Schichte angehörig; bei Glasgow reichlich vorkommend; eisenschüssig, sich dunkelbraun brennend. Zu ordinären Waaren, Blumentöpfen, Backsteinen etc. — 6) *Gelber Thon*, kommt an mehreren Orten Englands vor; brennt sich vermöge eines Eisengehaltes gelb. Einen ähnlichen Thon macht man durch Versatz von 2) mit 5). Dient zur sogenannten rohrfarbigen (*cane-ware*) und der Rockingham-Waare. — 7) *Feuerfester Thon (fire clay)*, auch, obwohl unrichtig, *Marl* oder *Mergel* genannt. Zu Kapseln, Schmelztiegeln, Glashäfen, feuerfesten Backsteinen etc. Brennt sich vermöge gröberer Gemengtheile porös.

Außerdem gebraucht man noch Feuerstein und halbzersetzten Granit (*cornish stone*), beide calcinirt, gemahlen und geschlämmt.

Thonwaaren. II. *Thonwaaren.* — 1) *Porcellan*. Wird in England aus Feuerstein, *cornish stone*, Porcellanthon und Knochenerde (keine Porcellan des Continents enthält diese) bereitet; es gehört zur Gattung des unächten oder weichen Porcellans. Die Probe No. 1 ist aus einer andern Fabrik als No. 2 und 3. Zur Vergleichung wurde: No. 4 eine Probe Berliner, spec. Gewicht = 2,419, No. 5 feines chinesisches, spec. Gewicht = 2,31 und No. 6 geringeres chinesisches Porcellan, spec. Gewicht = 2,314, analysirt. No. 7 gewöhnliche weisse Waare (*earthen ware*), eine Art *Fayence*. Aus Feuerstein, Granit, Porcellanerde und blauem Thon verfertigt. Probe von Glasgow, spec. Gewicht 1,36. Diese Waare wird häufig in der Masse gefärbt, und zwar blau, salbeifarbig u. a.

III. *Glasur* für No. 2. Man stellt zuerst eine Fritte Thonwaren. (*fret*) aus Borax, Porcellanerde, Feuerstein, Granit und Pariserweiss dar. Die Fritte, die übrigens ein vollkommenes Glas ist, wird in Wasser abgeschreckt, und mit einem weiteren Zusatz von Granit, Feuerstein und Bleiweiss fein gemahlen. No. 8 ist die Fritte, No. 9 die Glasur.

IV. *Farben*. No. 10 blauer Kobaltkalk, welcher in die Druckfarbe verwendet wird.

Andere Farben sind nicht untersucht worden; wir verweisen daher wegen der übrigen nicht uninteressanten Angaben über diese Stoffe auf die Abhandlung.

I. Thonarten :

Ordnungsnummer	1	2	3	4	5	6	7
Analyse von	Couper	Couper	John Brown	J. Higginbotham.	Couper	Couper	John Brown
Kieselerde.	46,31	66,68	53,66	46,38	49,44	58,07	66,16
Thonerde	39,91	26,08	32,00	38,04	34,26	27,38	22,54
Magnesia	0,44	Spur	Spur	Spur	1,94	Spur	Spur
Kalk	0,43	0,84	0,40	1,20	1,48	0,50	1,42
Eisenoxydul	0,27	1,26	1,35	1,04	7,74	3,30	5,31
Alkali	12,67	—	—	—	—	—	—
Wasser	—	5,14	12,08	13,57	5,14	10,30	3,14
	100,03	100,00	99,49	100,23	100,00	99,55	98,57

II. Thonwaren :

Ordnungsnumm.	1	2	3	4	5	6	7
Analyse von	Couper	Couper	Crichton	Couper			
Kieselerde.	39,88	40,40	39,68	72,96	71,04	68,96	68,55
Thonerde	21,48	24,15	24,65	24,78	22,46	29,24	29,13**)
Magnesia	—	0,43	0,81	—	—	—	—
Kalk	10,06	14,22	14,18	1,04	3,82	1,60	1,24
Phosphors. Kalk.	26,44	15,32	15,39	—	—	—	—
Eisenoxydul	—	—	—	—	—	—	—
Alkali	2,14 *)	5,28	5,79	1,22	2,68	—	—
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,92

*) Bei dieser und den 4 folgenden Nummern aus dem Verlust berechnet. — **) Thonerde und Eisenoxyd.

Eine rationellere Methode würde diesen Analysen, wenigstens was die Thone betrifft, ein höheres Interesse

Rosa (diese drei mittelst Gold), *Gelb* (aus Antimon und Uran), *Grün* (aus Chromoxyd), *Blau* (aus Kobaltoxyd), *Schwarz* (aus Iridium, ferner aus Kobalt und Mangan), *Grau* (aus denselben Stoffen), *Roth* und *Braun* (beide aus Eisenoxyd, zum Theil aus Chrom), endlich von *weißer Email* und *Farbenflufs*. Indem wir wegen des weiteren an die Abhandlung verweisen, bemerken wir noch, daß nach dem Verfasser die aufgebrannten Farben unter dem Mikroskop dreierlei Ansehen zeigen: 1) von homogener durchsichtigen Gläsern; 2) von durchsichtigen farbigen Theilen, zerstreut in durchsichtigen farblosen Theilen; 3) ein emailartiges, oder von einem undurchsichtigen Niederschlag, zertheilt in einer durchsichtigen Grundmasse.

Steinzeug.

Salvetat (1) hat folgende Sorten Steinzeug analysirt, wobei die Proben jedesmal nach dem Pulvern mit Wasser ausgezogen wurden, um etwa anhängendes Glasursalz zu entfernen: 1) Steingut von *Vauxhall* bei London, feine weißliche Masse, gut aufgedreht, mit poröser äußerer Oberfläche; Kochsalzglasur; 2) von *Helsingborg*, grobe, graulich Masse, schlecht aufgedreht; Salzglasur; 3) von *Frechen*, dunkelbraune Masse, gut aufgedreht; erdige Glasur; 4) von *Ziegler* in *Voisinlieu*, gut gearbeitete, weißliche Masse; Salzglasur; 5) von *St. Amand*, gewöhnliche Masse; Erdglasur; 6) von *Saveignies*, hellbraune Masse, grob, sehr klingend; 7) *chinesisches* Steingut, sehr feine Masse, gut bearbeitet, rothbraun; 8) von *Japan*, dem vorigen ähnlich; 9) von *Baltimore*, sehr feine weißliche Masse; 10) *Wedgwood*-Geschirr, feine, gelbliche Masse, sehr klingend und gut aufgedreht.

Die Ziffern der Analysen lassen deutlich erkennen, daß es zweierlei Kategorien von Steinzeug giebt: solches mit 62 bis 66 pC. Kieselerde, wie No. 3 und die 5 letzten Nummern, die nicht, oder doch nur mit erdiger Glasur versehen werden; und solche mit 75 pC. Kieselerde, wie die

(1) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 249; Dingl. pol. J. CIX, 440.

übrigen 4 Nummern, welche mit Kochsalz glasirt werden.
— Es wird bei dieser Glasurmethode das Kochsalz stets zersetzt, sobald hinreichend Kieselerde vorhanden ist, gleichviel ob sie gebunden oder frei ist.

	Glasirtes Steinzeug					Unglasirtes Steinzeug				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kieselerde	74,00	74,60	64,01	74,30	75,00	65,80	62,00	62,04	67,40	66,49
Thonerde	22,04	19,00	24,50	19,50	22,10	27,64	22,00	20,30	29,00	26,00
Magnesia	—	Spur	0,92	0,80	Spur	0,64	Spur	Spur	—	0,15
Kalk	0,60	0,62	0,56	0,50	0,25	1,12	0,50	1,08	0,60	1,04
Eisenoxydul	2,00	4,25	8,50	3,90	1,00	4,25	14,00	15,58	2,00	6,12
Alkali	1,06	1,30	1,42	0,50	0,84	0,24	1,00	Spur	0,60	0,20
	99,70	99,77	99,91	99,50	99,19	99,89	99,50	99,00	98,60	100,00

Schlofsberger (1) ist auf die nähere Beleuchtung des bekanntlich von Hermbstädt aufgestellten Satzes eingegangen, daß der Stickstoff- (Kleber-) Gehalt der Körner der Getreidearten in geradem Verhältniß zu dem Stickstoffgehalt des angewendeten Düngers stehe. Schon durch einige Widersprüche in Hermbstädt's Versuchen aufmerksam gemacht (wonach z. B. der Taubenmist mit 8 pC. Stickstoff Körner von nur 12 pC., die Ziegen- und Menschenexcremente mit 2 bis 3 pC. Stickstoff Körner von 33 pC. dieses Elementes erzeugten), verweist der Verfasser auf die (im Einzelnen noch zu veröffentlichende) Untersuchung von John, Repetenten in Hohenheim. Die im Jahre 1846 von demselben angestellten vergleichenden Versuche ergaben keine bedeutende, irgend constante Beziehung obiger Art. Ebenso wenig war dies bei den Versuchen von Burnet in England der Fall, worauf sich der Verfasser weiterhin beruft. Burnet fand den Klebergehalt des Waizens in folgenden fünf Fällen: keine Düngung; Düngung mit Harn, Schwefelsäure und Holzasche; mit Harn, Schwefelsäure und Glaubersalz; mit Harn, Schwefel-

(1) Dingl. pol. J. CV, 451, aus Riecke's Wochenblatt 1847, No. 35.

säure und Kochsalz; mit Harn, Schwefelsäure und Natrium salpeter — nur zwischen 9,4 und 10,5 pC. verschieden.

Einfluss des
Kohlenstoffs
als Dünger.

Dubreuil, Fauchet und Girardin (1) haben Versuche über die Düngung des Korns (*blé russe*) in der A ange stellt, dass das Salz auf die verschiedenen Abtheilungen des Feldes in verschiedenen Dosen angewendet wurde. Im Vergleich mit den Abtheilungen, welche kein Salz erhalten hatten, gab sich der Einfluss desselben durch ein entschieden fettes und mastiges Ansehen, aber auch in den meisten Fällen durch eine grosse Neigung zum Niederlegen zu erkennen. Im Allgemeinen war der Ertrag bei Salzdüngung höher, sowohl in Korn als Stroh, und zwar am meisten bei 3 bis 4 Kilogr. per Are. Jenseits dieser Dosis ist die Wirkung mehr auf Stroh. Bei dem Marktpreis des Salzes (40 Fr. die 100 Kilogr.) bezahlt übrigens der Mehlertrag der Producte die Auslage nicht.

Das Feld war vor dem Versuch mit Klee bestellt und mit einer halben Düngung versehen.

Taubenmist.

In dem Laboratorium der königl. Ackerbaugesellschaft zu London (2) ist ägyptischer, als Handelsartikel eingeführter Taubenmist mit nachstehendem Resultat analysirt worden:

Wasser	6,65
Org. Substanz mit 3,27 pC. Stickstoff (= 3,96 Ammoniak)	59,68
Ammoniak	1,50
Alkalische Salze	0,42
Phosphors. Kalk und Magnesia	7,96
Kohlens. Kalk	2,37
Sand	21,42

Verhältniss
der Salpeter-
bildung zur
Fruchtbarkeit
des Bodens.

F. Kuhlmann (3) ist durch seine Versuche über die Verwandlung der Salpetersäure in Ammoniak und die Ammoniaks in Salpetersäure auf Betrachtungen über die Verhältniss dieser Erscheinungen zur Fruchtbarkeit des Bodens geleitet worden. Sie haben ihn auf den Schluss geführt, dass hierbei verschiedene Vorgänge und Einwi

(1) Compt. rend. XXVI, 308; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 33 — (2) Dingl. pol. J. CVI, 159. — (3) Ann. ch. phys. [3] XX, 223; pr. Chem. XLI, 289.

kungen stattfinden : eine oberflächliche, welche das fruchtbarmachende Element (kohlens. Ammoniak) unter dem Einfluß des atmosphärischen Sauerstoffs durch Salpeterbildung fixirt; und eine in einer gewissen Tiefe stattfindende, welche die Salpetersäure unter dem Einfluß der faulen Gährung in Ammoniak zurückführt. — Beide, Action und Reaction, müssen nach ihm Hand in Hand gehen, wenn die Fruchtbarkeit befördert werden soll; wenn gewisse Landstriche zur zweiten Bedingung nicht geeignet sind, so häuft sich der Salpeter, es entstehen Salpetergruben, wie auf Ceylon, in Indien u. a. — (Vergl. S. 385 und 391.)

Verhältnisse
der Salpeter-
bildung zur
Fruchtbarkeit
des Bodens.

Kuhlmann (1) hat ferner eine Fortsetzung seiner agronomischen Versuche über die Natur des Düngers geliefert. Diese führen ihn zu dem allgemeinen Schluß, daß die stickstoffhaltigen Theile des Düngers die Hauptträger seiner Wirksamkeit sind, und daß die salzigen Bestandtheile einen Antheil daran haben, der um so größer ist, je mehr sie sich (unter günstigen Bedingungen) dem passenden Grade der Auflöslichkeit nähern. Hinsichtlich der zahlreichen und interessanten Einzelheiten verweisen wir auf die Originalabhandlung.

Persoz (2) erhielt ein augenscheinlich und auffallend günstiges Resultat, als er Hortensien, in gewöhnliche Gartenerde gesetzt, mit einem Gemisch von 3 Kilogr. Knochenkohle, 1,5 Kilogr. Salpetersäure und 0,5 Kilogr. phosphors. Kali düngte. Sie überholten andere Hortensien, welche zur Vergleichung unter gleichen Umständen in Haideerde gesetzt wurden, aber ungedüngt blieben, an Blatt- und Blütenentwicklung bei weitem. Eben so verhielt sich ein Weinstock bei Düngung mit 0,5 Kilogr. Kalisilicat, 1,5 Kilogr. Kalk-Kaliphosphat und dem gleichen Gewicht getrockneten Bluts und Gänseexcrementen; er trieb Jahrestriebe von 11 Meter

Mineraldün-
ger.

(1) Ann. ch. phys. [3] XX, 265; J. pr. Chem. XLI, 417; XLII, 63; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 600. — (2) Compt. rend. XXIV, 559; J. pr. Chem. XLI, 454; Ann. Ch. Pharm. LXV, 126; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 255.

Mineraldün-
ger. Länge, und auf 9 Schossen 25 Trauben, während ein gleicher nicht gedüngter Weinstock nur Triebe von 4,6 Mete und 4 oder 6 Blüthen lieferte, die wieder verkümmerten

Polstorff (1) hat über die Ernährung der Pflanzen durch die mineralischen Stoffe und über die Form, welche die Wirksamkeit letzterer bedingt, zwei Reihen von Versuchen angestellt. Die eine Reihe ist im begrenzten Raum (blei gefütterten Kasten), die andere im Freien, beide mit Gerst ausgeführt worden. Bei der ersten Reihe wurden die Pflanzen in Ziegelmehl gezogen und die Proben resp. mit kiesels. Natronkali, kohle. Kalkkali, phosphors. Kalk natronkali, Knochenerde, Gyps, phosphors. Magnesia-Ammoniak, menschlichen Excrementen, Asche von diesen und Asche der Gerstenpflanze gedüngt. Es ergab sich im Allgemeinen: daß die Gerste in einem Boden, der nur die Aschenbestandtheile enthält, sich vollständig ausbilden kann; daß daher der Stickstoffgehalt der Körner nicht abhängig ist vom Boden; daß endlich verschiedene Formen (Zustände) des Mineräldüngers von ganz verschiedener Erfolg sein können. So lieferten die Excremente einen weit höheren Ertrag, als die Asche derselben, beide als Dünger angewendet. — Bei Versuchen im Freien, mit denselben Mineräldüngern, waren die zwei Hauptergebnisse, daß phosphors. Magnesia-Ammoniak für sich auf die Körnerbildung gar nicht, auf die Halmbildung schädlich wirkt und daß der ammoniakfreie Mineräldünger hemmend auf die Vegetation wirkt.

Seeschlamm
als Dünger. J. Th. Herapath (2) hat zwei natürliche mineralische Producte untersucht, welche in großem Maßstabe zu Düngung verwendet werden. Das eine ist der Seesand von den Küsten von *Devonshire* und *Cornwall*, im speciellen Fall 1) von einer Bucht bei *Ilfracombe*, welcher am besten für schweren Thonboden taugt; das andere die sogenannt

(1) Ann. Ch. Pharm. LXII, 192; Pharm. Centr. 1847, 707. — (2) Chem. Gaz. 1848, 342.

„Corallines“ 2), welche das Hauptingredienz von Barker's *submarine manure* ausmachen, wozu sie mit Salz calcinirt und mit Abtrittdung, Fischen etc. versetzt werden.

	1.	2.	
Wasser	0,500	2,010	Die löslichen Salze bestehen
Lösliche Salze . . .	0,300	Spur	hauptsächlich aus Koch-, Glauf-
Organische Materie .	2,420	9,040	ber- und Bittersalz mit etwas
Kohlens. Kalk . . .	47,438	84,257	Kali.
„ Magnesia . . .	0,097	1,373	No. 1 gab 0,1845 pC., No. 2
Schwefels. Kalk. . .	Spur	Spur	gab 0,689 pC. Stickstoff, welche
Phosphors. Kalk . .	0,025	0,100	entsprechen resp. 0,224 und
Eisenoxyd }	0,460	0,820	0,837 Ammoniak.
Thonerde }	—	—	
Fluorcalcium	—	Spur	
Sand und Kieselerde	18,760	2,400	
	100,000	100,000	

Die Gegenwart von phosphors. Kalk in plutonischen Gesteinen war von Fownes dargethan, aber später von Kersten bestritten worden. Neuerdings findet aber Deck (1) die Zusammensetzung eines Minerals aus compactem Basalt von der blauen Koppe beim Meißner (Kurhessen) = $\text{Ca}\left\{\begin{smallmatrix} \text{Cl} \\ \text{Fl} \end{smallmatrix}\right\} + 3 (\text{CaO}, 3 \text{PO}_4)$, oder gleich der des Apatits.

Also eine neue Bestätigung der Beobachtung von Fownes, nachdem schon Phosphorsäure in einem Hornblendegestein von Arendal in Norwegen nachgewiesen worden.

Von J. Müller (2) sind vier Bodenarten untersucht, aber dabei anzugeben unterlassen worden, in welchen geognostischen und agronomischen Verhältnissen sie sich vorfanden; ebenso wenig hat es der Verfasser für gut gefunden, von der Beschaffenheit mehr als Farbe und Korn anzuzeigen. Eine der Proben war mit „wellenförmigen Runzeln“ versehen und zeigte Stücke eines Schalthiers. Weder bei dieser, noch bei den andern Proben ist eine mechanische Scheidung der chemischen vorausgegangen. Wir verweisen diejenigen, welche sich für die Zusammensetzung der vier Erdklumpen interessiren sollten, auf die Abhandlung.

(1) Chem. Gaz. 1848, 344. — (2) Repert. Pharm. [2] XLV, 310.

Hinsichtlich Analysen von Bodenarten vergl. bei Flachbau und bei den Untersuchungen von Pflanzenaschen u. Pflanzentheilen.

Untersuchungen von Pflanzenaschen u. Pflanzentheilen.

Die Untersuchung der mineralischen Bestandtheile d. Pflanzen, welche ihrer vorwiegenden technischen Beziehungen wegen, insbesondere zur Landwirthschaft, in diesem Abschnitt gezogen worden ist, hat noch immer fortgedauert die Aufmerksamkeit der Chemiker zu fesseln. Ein Blick auf die zahlreichen analytischen Arbeiten läßt sogleich erkennen, daß man u. a. Eine Richtung vorzugsweise verfolgt und studirt hat: nämlich den Einfluß des Bodens auf die Aschenstoffe und die Vertheilung ihrer Bestandtheile nach den Organen der Pflanzen. Wenn man zugiebt, daß die Normale und Gesetzmäßige in dem mineralischen Bestand der Pflanzen — bei der so überaus großen Veränderlichkeit desselben — nur gleichsam auf statistischem Wege d. h. nur dann ermittelt werden kann, wenn man die Untersuchungen vervielfältigt und unter allen denkbaren Umständen und Einflüssen wiederholt, und auf diese Art die Zufällige und Individuelle allmählig erkennt und eliminirt lernt, so kann man diese Richtung nur eine erfreulich nennen. Zugleich ist mehrfach der Mineralbestand in Beziehung auf das Wachsthum studirt, und so eine Entwicklungsgeschichte der Pflanzen in diesem Sinne angebahnt worden.

Wir haben die Ergebnisse der Analyse in den beiliegenden Tabellen übersichtlich zusammengestellt, und fügen — indem wir uns darauf beziehen — im Folgenden dasjenige hinzu, was im Einzelnen bemerkenswerth ist.

Wallnufs.

Glasson: Analyse der Wallnufsasche (*Juglans regia*) (1) bloße Anzeige der analytischen Resultate, ohne Angabe der Methode der Einäscherung. Es hätte bemerkt werden müssen, ob die Asche der Nufs im Ganzen, oder nur einzelner Theile untersucht ist. No. 12 der Tabelle.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 343; J. pr. Chem. XLI, 91; J. pharm. [3] XII, 74.

Asc

(Z)

(A)

	21.	240.	41.	42.	43.	44. a.	44. b.	Ordnungsnummer
erg	Herapat						Wittstein	
oh	Rettig- Wurzel	Mehl- Kakern boder neifen rüchte v. d. Wein- aube	Grüne Schale der Früchte von der „Wein- traube“	Mehl- kern der Früchte von der „Kreuz- horst“	Grüne Schale der Früchte von der „Kreuz- horst“	Braune Schale der reifen Früchte	Vitis he- deracea Grüne Blätter	
44	18,77	118,53	47,48	36,67	54,02	37,63	23,97	Kali.
71	18,48	—	—	—	—	—	12,01	Natron.
00	13,51	2'9,42	6,64	10,20	8,14	13,54	20,26	Kalk.
57	1,39	10,48	0,86	0,36	0,68	1,94	8,06	Magnesia.
—	—	—	—	—	—	—	0,07	Thonerde.
16	—	—	—	—	—	—	0,67	Eisenoxyd.
28	—	—	—	—	—	—	—	Manganoxyd.
19	3,75	1,36	0,76	1,02	1,22	2,94	3,09	Schwefelsäure.
48	—	—	—	—	—	—	—	Chlorwasserstoff-Säure.
—	—	—	—	—	—	—	1,80	Chlor.
49	0,26	10,16	0,43	0,15	0,37	0,69	5,00	Kieselerde.
55	23,81	7,83	24,61	13,07	27,97	18,88	9,97	Kohlensäure.
13	8,99	418,74	3,98	19,15	5,40	15,36	15,10	Phosphorsäure.
—	0,13	—	—	—	—	—	—	Phosphors. Eisenoxyd.
—	—	—	—	—	—	—	—	Phosphors. Kalk, -Mag- nesia und -Eisenoxyd.
—	—	3,48	15,42	19,38	2,20	9,02	—	Chlorkalium.
—	10,89	—	—	—	—	—	—	Chlornatrium.
—	—	—	—	—	—	—	—	Kohle.
—	—	—	—	—	—	—	—	Sand.
00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Summe.
000	8,285	13,36	7,29	2,26	4,53	1,70	1,56	Aschenprocente.

(B)

82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	Ordnungsnummer
Hafer Hafer :							
Spelzen (Spelzen) von			Körner von				
Hopetonhafer von :			Kartoffel- hafer von Northum- berland	Hopetonhafer von :			
Northum- ber- land	Wig- ton- shire	Air- shire		Northum- ber- land	Wig- ton- shire	Air- shire	
6,83	5,55	5,30	31,56	20,96	—	20,65	Kali.
3,93	—	—		—	—	—	Natron.
1,95	4,31	2,03	5,32	6,57	10,41	10,28	Kalk.
0,88	1,01	0,64	8,69	11,00	9,98	7,82	Magnesia.
—	—	—	—	—	—	—	Thonerde.
1,58	1,61	1,80	0,88	0,88	5,08	3,85	Eisenoxyd.
0,92	0,86	0,72	—	—	1,25	0,42	Manganoxyd.
9,61	5,01	4,90	—	17,37	—	—	Schwefelsäure.
—	—	—	—	—	—	—	Chlorwasserstoff-Säure.
—	—	—	—	—	—	—	Chlor.
4,46	2,91	1,61	0,89	1,29	—	—	Kieselerde.
—	—	—	—	—	—	—	Kohlensäure.
1,04	2,65	1,80	49,19	38,48	46,26	50,44	Phosphorsäure.
—	—	—	—	—	—	—	Phosphors. Eisenoxyd.
—	—	—	—	—	—	—	Phosphors. Kalk, -Mag- nesia und -Eisenoxyd.
—	2,37	0,40	—	—	5,82	1,03	Chlorkalium.
0,24	—	—	0,35	0,49	—	—	Chlornatrium.
—	—	—	—	—	—	—	Kohle.
†) 68,39 †)	71,82 †)	80,11 †)	0,98	2,31	3,70	4,40	Sand.
98,83	98,10	99,83	97,86	98,85	98,27	98,89	Summe.
—	—	—	2,22	2,14	—	—	Aschenprocente.

schena

(Zu Seite 10)

(C)

106.	107.	108.	124.	125.	126.	127.	128.	Ordnungsnummer
h				Orleanspflaumen				
	Feige, ganze Frucht		Pflaumen, ganze Frucht	Haut	Fleisch	Kern	Samen- schale	
tengel		Kc		der Frucht				
13,98	28,36	31.	59,21	58,86	54,59	26,52	21,69	Kali.
14,43	24,14	2.	0,54	3,52	8,72	1,94	7,69	Natron.
25,10	18,91	8.	10,04	8,25	4,86	8,49	28,06	Kalk.
Spur	9,21	13.	5,46	9,29	4,69	16,17	3,77	Magnesia.
—	—	—	—	—	—	—	—	Thonerde.
—	—	—	—	—	—	—	—	Eisenoxyd.
—	—	—	—	—	—	—	—	Manganoxyd.
16,50	6,73	Sp	3,83	1,96	3,23	7,11	6,61	Schwefelsäure.
—	—	—	—	—	—	—	—	Chlorwasserstoff-Säure.
—	—	—	—	—	—	—	—	Chlor.
19,77	5,93	—	2,36	0,81	3,15	2,38	2,57	Kieselerde.
—	—	—	—	—	—	—	—	Kohlensäure.
—	—	42.	12,26	9,85	15,44	33,05	25,24	Phosphorsäure.
10,06	2,76	2.	6,04	7,45	4,80	3,83	4,37	Phosphors. Eisenoxyd.
—	—	—	—	—	—	—	—	Phosphors. Kalk, -Magne- nesia und -Eisenoxyd.
—	—	—	—	—	—	—	—	Chlorkalium.
Spur	4,02	Sp	—	—	0,62	0,49	Spur	Chlornatrium.
—	—	—	—	—	—	—	—	Kohle.
—	—	—	—	—	—	—	—	Sand.
00,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Summe.
0,84	—	—	0,40	0,89	0,31	1,64	0,24	Aschenprocente.

getreide im natürlichen (

(D)

159.	160.	161.	162.	163.	164.	165.	Ordnungsn
Porter							
von London	von Dublin	Schot- tischer	von London	von London	von Dublin	Schot- tischer	
1 Sh. 6 P.	2 Sh. 6 P.	2 Sh.	2 Sh.	2 Sh.	2 Sh.	2 Sh.	
11,94	32,04	20,88	16,03	22,88	21,38	18,86	Kali.
24,83	42,72	38,77	50,82	30,52	24,01	33,76	Natron.
3,87	1,54	1,62	1,31	1,33	0,83	1,34	Kalk.
0,66	0,51	0,17	0,10	1,27	1,19	1,39	Magnesia.
—	—	—	—	—	—	—	Thonerde.
—	—	—	—	—	—	—	Eisenoxyd.
—	—	—	—	—	—	—	Manganoxyd.
12,20	1,57	6,36	4,53	4,97	2,76	2,18	Schwefelsäure
—	—	—	—	—	—	—	Chlorwasser
14,53	6,78	0,15	7,42	10,92	10,10	11,39	Chlor.
12,93	6,94	13,28	9,52	15,24	19,74	18,60	Kieselerde.
—	—	—	—	—	—	—	Kohlensäure
19,54	7,89	18,77	10,28	12,86	19,99	12,48	Phosphorsäure
—	—	—	—	—	—	—	Phosphors.
—	—	—	—	—	—	—	Phosphors.
—	—	—	—	—	—	—	Phosphors.
—	—	—	—	—	—	—	nesia und
—	—	—	—	—	—	—	Chlorkalium
—	—	—	—	—	—	—	Chlornatrium
—	—	—	—	—	—	—	Kohle.
—	—	—	—	—	—	—	Sand.
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Summe.
6,864	5,720	6,050	9,001	14,579	11,113	6,054	Aschenproz

Thornton J. Herapath: Asche der Rettigwurzel (1) ^{Rettig.} und der Kaffeebohnen (2); beide nach Rose's Methode, ^{Kaffeebohnen.} d. h. Verkohlung des Vegetabils, Ausziehen der Kohle und Einäscherung des Rückstandes. No. 21 und 22 der Tabelle.

Carl Etti (3): Wurzel von *Beta vulgaris italica* (No. 140 ^{Beta vulgaris.} der Tabelle); völlig getrocknet und dann im Platintiegel eingäschert. Der Ueberschufs in der Summe der Bestandtheile rührt daher, dafs die Kohlensäure nicht direct bestimmt, sondern nach der Voraussetzung berechnet ist, als ob alle disponiblen Basen damit nach der Einäscherung gesättigt geblieben wären.

J. Namur: Asche der Blätter von *Brassica rapa* (4). ^{Brassica rapa.} No. 18 der Tabelle. Ohne weitere Angabe.

C. Rammelsberg: Analyse der Asche des Samens, ^{Flachs.} sowie des Strohes der Flachspflanze (5). Tabelle No. 19 und 20. Ohne weitere Angabe.

Thomas Rowney und H. Blow: Analyse der Asche des Orangenbaums (6). ^{Orangenbaum.} No. 13 bis 17 incl. der Tabelle. — Das Material stammt von den Pflanzungen des Hrn. Da Cumara auf der Insel St. Michael. Darstellung der Asche durch directe Einäscherung in einem offenen Tiegel; die Früchte vorher ausgekernt und getrocknet. Um die etwa reducirten schwefels. Salze wieder herzustellen, wurde die Asche im Platintiegel mit etwas Quecksilberoxyd geglüht. Die Analysen bestätigen die schon von Saussure gemachte Beobachtung, dafs die mineralischen Bestandtheile sich in demjenigen Theil der Pflanzen am meisten anhäufen, worin der vegetative Procefs die meiste Thätigkeit entwickelt; sie betragen in den Blättern 3- bis 4mal mehr als in den Früchten, Kernen und dem Stamm. — In den Wurzeln, Blättern und dem Stamm herrscht der Kalk, in den Früchten

(1) Chem. Gaz. 1848, 279. — (2) Chem. Gaz. 1848, 159; Pharm. Centr. 1848, 461. — (3) Repert. Pharm. [2] XLV, 187. — (4) Ann. Ch. Pharm. LIX, 264; Phil. Mag. [3] XXXIII, 78; J. pharm. [3] XIII, 51; Froriep's Not. 1848, 151; J. pr. Chem. XL, 128. — (5) J. pr. Chem. XLI, 350. — (6) Phil. Mag. [3] XXXI, 271; J. pr. Chem. XLII, 822; Pharm. Centr. 1847, 655; Chem. Gaz. 1847, 227.

und Kernen das Alkali vor. In den Kernen ist der Phosphorsäuregehalt bedeutend, obwohl geringer als in den sonst ähnlichen Citronenkernen nach Souchay.

Raps und
Erbsen.

C. Rammelsberg untersuchte die Vertheilung der unorganischen Bestandtheile der Pflanzen in den einzelnen Theilen, und zwar im vorliegenden Fall bei Raps und Erbsen (1) No. 1, bis 8 incl. der Tabelle. — Bemerkenswerth ist, daß in den Samen beider Vegetabilien ausschließlich Kali, in dem Stroh dagegen auch Natron, und zwar dieses in überwiegender Menge, enthalten. Die Erden herrschen im Stroh, die Phosphorsäure herrscht im Samen vor. Das Stroh enthält beträchtlich mehr, beim Raps 8-, bei den Erbsen 22mal soviel Kohlensäure, als die Samen. — Die Darstellung der Asche geschah nach Rose's Methode; das durch Auskochen der Kohle erhaltene ist in der Tabelle als „löslicher Theil“, das durch Einäscherung der ausgezogenen Kohle erhaltene als „unlöslicher Theil“ bezeichnet. „Natürlich“ bemerkt der Verfasser, „ist dies (der lösliche Theil) nicht die ganze Menge (des wirklich Auflöslichen), da die Pflanzenkohle vermöge ihrer Structur die vollständige Extraction — verhindert“.

O. L. Erdmann, Tabelle No. 9 bis 11 incl., theilt vorläufig in Anschluß an Obiges Analysen über dieselben Vegetabilien (2) aus einer später zu veröffentlichenden größeren Arbeit mit. Sie bestätigen im Allgemeinen die von Rammelsberg gezogenen Schlüsse, zeigen aber zugleich, welche bedeutende Unterschiede die Verschiedenheit des Standorts zur Folge hat.

Wachsthum
der Wicke.

J. Schleiden und E. Schmid (3) haben die Entwicklung der Wickenpflanze (*Vicia sativa*) durch Vergleichung der Elementarzusammensetzung in verschiedenen Wachsthumperioden studirt. Die Pflanzen wurden den 15. Mai ausgesät und resp. am 2. Juni (erste Periode),

(1) Pogg. Ann. LXXI, 148; J. pr. Chem. XLI, 84. — (2) J. pr. Chem. XLI, 89. — (3) Aus dem 3. Programm des physiol. Instituts zu Jena in Pogg. Ann. LXXI, 138; Pharm. Centr. 1847, 532.

12. Juli (zweite Periode, Blüthe), 6. August (dritte Periode, Mitte der Reife) und 3. September (vierte Periode, Ende der Reife) für den Versuch eingesammelt. Die Wägungen sind Durchschnittswägungen von einigen hundert Exemplaren jedesmal, und geben daher gewissermaßen das Gewicht der mittleren, oder Normalpflanze. — In der ersten Periode ist das Gewicht dieser Normalpflanze im Verhältniß von 1:1,29 kleiner, als das des Samens, während sich der absolute Gehalt an Stickstoff gleich bleibt, der an Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff etwa um ein Drittheil kleiner, der Aschengehalt um etwa 47 pC. gröfser ist; in den folgenden Perioden nimmt das absolute Gewicht der ganzen Pflanze und jedes einzelnen Bestandtheils zu. Die absolute Menge des Stickstoffs vermehrt sich von der ersten bis zur vierten Periode um das 32fache, die des Kohlenstoffs um das 67-, die des Wasserstoffs um das 65-, die des Sauerstoffs um das 71- und die des Aschengehaltes um das 70fache. — Während des Wachsthum^{Wachsthum der Wicke.}s ändert sich die Vertheilung dieser Bestandtheile sehr wesentlich: der Stickstoff vermindert sich im Stengel von 9,11 auf 2,36 pC.; die Aschenbestandtheile ziehen sich in der letzten Periode aus dem Stengel mehr und mehr in die Samen und Hülsen. Wir verweisen wegen der Details auf die Originalabhandlung.

H. Watts: Analyse der Hopfenasche; No. 23 der Tabelle (1). Der Hopfen war von derjenigen Varietät, welche gewöhnlich *„the Grape“*, d. i. Traubenhopfen genannt wird, und stammt von schwerem Thonboden bei *Hawkhurst* in *Kent*. Die Ernte war eine mehr als mittlere, nämlich 12 Ctr. englisch (zu 112 Pfund) per Acre, getrockneter versandbarer Hopfen (Blüthe). In diesem Zustande, in welchem er eingäschert wurde, verliert er noch 11,5 pC. Feuchtigkeit bei 100°. Durch Behandlung der Asche mit kochendem Wasser lösten sich im Mittel von zwei Versuchen 35,77 pC. und blieben ungelöst 64,23 pC. Der Hopfen.

Hopfen. lösliche Theil bestand aus Ohlornatrium, Chlorkalium, koh lens., schwefels., kiesel. und phosphors. Kali; der un lösliche Theil aus kohlens. Kalk und Magnesia, aus phos phors. Kalk, Magnesia, Thonerde und Eisenoxyd, sowi aus Kohle und Sand. Aus dem Aschengehalt und Ertra des Hopfens berechnet Watts, dass mit jeder Ernte diese Hopfens dem Boden per Acre 87 Pfund Bestandtheile ent zogen worden, worunter 12 bis 13 Unzen Phosphorsäure 17 Pfund Kali und 15 Pfund 10 Unzen Kieselerde Hieraus erklärt sich die sehr erschöpfende Wirkung de Hopfens auf den Boden.

Roskastanie. E. Wolff hat in einer ausführlichen Untersuchung der in den verschiedenen Theilen des Roskastanienbaum (*Aesculus hippocastanum*) enthaltenen mineralischen Stoffe (1) Tabelle No. 31 bis 44 a incl., einen Beitrag zur Lösung der Frage geliefert, wie die Gewichtsverhältnisse der minera lischen Stoffe beim Uebergang von einem Organ in das andere modificirt werden, und wie sie in den Organen ver theilt sind. Um den Resultaten einen allzu lokalen Cha racter zu benehmen, sind die untersuchten Pflanzentheile von zwei Standorten gewählt worden: 1) von der »Wein traube« bei Halle, einer auf tiefkrumigem, steinigem Por phyrgrund gelegenen Kaffeeswirthschaft; 2) von der »Kreuz horst« bei Magdeburg, einem feuchten, oft überschwemmten humusreichen Waldboden, worin die Kastanien kräftiger gedeihen als im vorigen. Die Feuchtigkeitsbestimmungen lieferten für die einzelnen Theile folgendes Resultat:

Pflanzentheile	Trockene Substanz	Wasser	Pflanzentheile	Trockene Substanz	Wasser
1. Holz	51,55	48,45	10. Unreife Früchte	18,99	81,0
2. Bast	45,02	54,98	11. Reife Früchte .	—	—
3. Rinde	—	—	12. Kernsubstanz .	47,12	52,8
4. Blattstengel .	15,96	84,04	13. Kernsubstanz .	50,33	49,6
5. Blätter	24,59	75,41	14. Grüne Schale .	17,30	82,7
6. Blütenstengel .	14,71	85,21	15. Dieselbe	18,88	81,1
7. Kelch	16,84	83,16	16. Braune Schale .	36,00	64,0
8. Staubfäden .	16,40	83,60	17. Dieselbe	39,09	60,9
9. Blumenblätter .	13,55	86,67			

(1) J. pr. Chem. XLIV, 385; Pharm. Centr. 1848, 913.

Die Methode, nach welcher die mineralischen Bestandtheile aus dem Vegetabil abgeschieden wurden, ist im Wesentlichen die von Rose und Erdmann. Wolff verkohlte die Substanz zuerst bei möglichst niedrigem Hitze-grad in der nichtglühenden Muffel; er zog dann die Kohle nach einander zuerst mit Wasser, dann mit verdünnter Salzsäure aus, trocknete den Kohlerückstand und äscherte ihn vollständig im Muffelofen ein. Die meist sehr unbedeutende Aschenmenge wurde ebenfalls mit Säure aufgelöst und die vereinigten Säureauszüge, der wässrige Auszug und der unlösliche Rückstand jeder besonders analysirt.

Das Verhältniß des löslichen zu dem in heißem Wasser unlöslichen Theil der Mineralbestandtheile ergab sich, in Procenten ausgedrückt, wie folgt :

Pflanzentheile	In Wasser		Pflanzentheile	In Wasser	
	löslich	unlöslich		löslich	unlöslich
Junge Rinde . . .	11,35	88,65	Blumenblätter . . .	72,20	27,80
Junges Holz . . .	29,21	70,79	Junge, unreife Früchte	77,77	22,23
Blattstengel . . .	59,38	40,62	Reife Früchte . . .	78,85	21,15
Junge Blätter . . .	89,77	60,23	Grüne Schale d. Früchte	85,37	14,63
Blüthenstengel . . .	81,16	18,84	Dieselbe	81,96	18,04
Kelch u. Fruchtknoten	72,70	27,30	Kernsubstanz „ „ „	77,02	22,98
Staubfäden	72,22	27,78	Braune Schale „ „ „	68,77	31,23

Der Verfasser giebt nun eine umfassende Berechnung der Sättigungscapacität der Asche für organische Substanzen, nach der Summe des Sauerstoffs desjenigen Antheils der Basen, welcher disponibel bleibt, wenn man den den Mineralsäuren zukommenden Theil abrechnet. Die Rechnung (für deren Einzelheiten das Original zu vergleichen ist) ergab in runder Zahl für die Rinde 27, für Holz und Blätter 24, für die Blattstengel und die braune Schale der Früchte 21 und für alle übrigen Theile 18 pC. disponiblen Sauerstoff. Es zeigte sich ferner, daß für dieselben Pflanzentheile von verschiedenen Orten und Bodenarten dieser Sauerstoff gleich bleibt, aber auch durchaus keine Vertretung der Basen unter einander stattfindet. So berechnete sich z. B. die Menge der an Kohlensäure gebundenen Basen :

Bofska/anie.

	Kernsubstanz		Grüne Fruchtschale	
	von der „Weistraube“	von der „Kreuzhorst“	von der „Weistraube“	von der „Kreuzhorst“
Kalkerde	5,69	4,58	6,62	6,90
Magnesia	1,29	1,41	1,69	1,20
Kali	93,02	94,01	91,69	91,90
Sauerstoffgehalt dieser Basen	17,93	17,83	18,14	18,05

In Betreff der Vertheilung der einzelnen Aschenbestandtheile stellte sich Folgendes heraus. Die *Kalkerde* entschieden in der Rinde vorwiegend, und nimmt einerseits nach dem Holz, Blattstengeln und Blättern, noch mehr ab andererseits nach den Blüthen- und Fruchtkorganen. Umgekehrt verhält sich das *Kali*. Die *Magnesia*, als untergeordneter Gemengtheil, läßt keinen entschiedenen Character erkennen. Dasselbe gilt von der *Schwefelsäure*, doch ist hierbei bemerkenswerth, daß diese Säure, während sie in den Blättern in mehreren Procenten angetroffen wurde, dennoch in Rinde und Holz absolut fehlt obgleich diese Organe zwischen Blättern und Boden in der gleichen Stellung haben. Das *Chlorkalium* häuft sich am meisten in den Blattstengeln und den Fruchtkorganen, doch ist letztere der Standort vom entschiedensten Einfluß, indem es das einmal in der Kernsubstanz, das anderemal in der äußeren Schalen vorherrscht. Der *Kohlensäuregehalt* nimmt wenn man von Holz und Rinde ausgeht, nach den Blättern hin ab, aber nach den Blüthen und Früchten hin entscheiden zu, welche letzten in Uebereinstimmung mit allen jetzt gemachten Beobachtungen zugleich der Hauptsitz der *Phosphorsäure* (des Phosphors) sind. Von der Kieselerde sind überhaupt kaum mehr als Spuren vorhanden.

Man darf bei solchen Betrachtungen über die Vertheilung der Aschenbestandtheile in den verschiedenen Organen nicht außer Augen setzen, daß alles lediglich relative Bedeutung hat. Ein wahrhaft dem Sachverhalt entsprechendes Bild liefse sich nur geben, wenn man zugleich das absolute Gewicht der Organe des Baumes selbst wüßte und Rechnung nähme.

Es folgt nun eine Vergleichung des mineralischen Bohnenstängel. Bestandes der einzelnen Organe im Ganzen, zuvörderst zwischen Rinde und Holz. Dabei zeigt sich, daß die Asche der Rinde betrachtet werden kann als Asche des Holzes (0,3 Th.) mit kohlen. Kalk in großem Ueberschuß (0,7 Th.). Jene 0,3 Mineralbestandtheile der Rinde, welche in ihrer Mischung mit denen der Asche des Holzes zusammenfallen, betrachtet Wolff als die normale Mischung der Mineralstoffe des von den Wurzeln aufsteigenden Saftes, und nimmt sie zum Ausgangspunkt bei seinen weiteren speculativen Untersuchungen über die Aschen der übrigen Organe. Die Zusammensetzung dieser Normal-Saftasche wäre: Kalkerde 35,71, Magnesia 4,72, Kali 23,52, Chlorkalium 16,26, Phosphorsäure 16,79, Kieselerde 3,00, und der Sauerstoffgehalt der für Kohlensäure disponiblen Basen = 24,25 für 100 Th. derselben.

Die Asche der Blattstiele ist hiernach zu betrachten als Normal-Saftasche, worin der auflösliche Theil durch 15 pC. Chlorkalium, ebensoviel schwefels. Kali und 30 pC. kohlen. Kalk vermehrt ist. Die procentische Zusammensetzung der Blätterasche wird erhalten, wenn man von den in Wasser unlöslichen Theilen der Blattstielasche 10 pC. kohlen. Kalk abzieht und dem löslichen Theil 60 pC. schwefels. Kali hinzufügt. Die Zusammensetzung der unlöslichen Theile der Asche der Blütenstengel ergibt sich, wenn man von der Normal-Saftasche und zwar von dem unlöslichen Theil derselben 50 pC. kohlen. Kalk abzieht; die der löslichen Theile durch Hinzufügen von 15 pC. Chlorkalium, 25 pC. phosphors. und 15 pC. schwefels. Kali. — Fügt man den in Wasser unlöslichen Theilen der Blütenstengel 20 pC. kohlen. Kalk zu und den löslichen Theilen 20 pC. kohlen. Kali, so hat man die Zusammensetzung der Asche der reifen Früchte, oder eigentlich der mittleren Zusammensetzung der Asche des Kerns und der Schale (1). Die 20 pC. kohlen. Kalk kommen allein der

(1) Da Kern und Schale der Frucht möglicher Weise sehr un-

grünen Schale zu Gute; dagegen ist die Kernsubstanz, welche lösliche Aschentheile betrifft, um einen Minderbetrag von 10 pC. Chlorkalium und den ganzen Gehalt von phosphors. Kali von der äußeren Schale verschieden.

Wir verweisen übrigens für die zahllosen Einzelheiten und Details auf diese höchst dankenswerthe Arbeit selbst, welche mehr als 100 Octavseiten einnimmt.

Wittstein (1) hat die Asche der grünen Blätter von *Vitis hederacea* analysirt (No. 44.b. der Tabelle).

Weinstock.

Ueber den Weinstock und seine Cultur sind mehrere Untersuchungen unternommen worden; zunächst hat Crasso (2) die seinigen fortgesetzt und zwar diesmal zur Beantwortung der Frage, wie weit die Verschiedenheit (in Blume und Geschmack) der Weine je nach Boden und Rebsorten sich in dem Bestand an mineralischen Stoffen im Most ausspricht. Die Analysen folgender Theile des Weinstocks sind nach Will und Fresenius' Methode ausgeführt: die Bestimmung der Phosphorsäure geschah mit schwefels. Magnesia; die Einäscherungen wurden in der Platinschale über der Weingeistlampe mit doppeltem Luftzuge ausgeführt.

No. 45 der Tabelle. Most von unreifen blauen Trauben des Kleinburgunders oder schwarzen Clävnern (Metzger) Südliche Lage eines Porphyrabhangs. Die Beeren weich durchscheinend, nach innen noch ganz grün, nur nach der Sonnenseite hellroth. — No. 46 der Tabelle. Most von reifen blauen Trauben derselben Art und desselben Standorts; Beeren gleichmäßig tiefblau. — No. 47 der Tabelle. Most von reifen blauen Trauben des Kleinburgunders. Südliches Berggehäng mit schwererem, aus Plänermergel entstandenen Thonboden. Farbe der Beeren heller als die vorigen, be-

gleiche Gewichtsmengen ausmachen, so beruhen die aus obigem analytischen Mittel gezogenen Schlüsse auf unsicherer Grundlage.

(1) Repert. Pharm. [2] XLVI, 329; Pharm. Centr. 1847, 739. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXII, 59; Pharm. Centr. 1847, 565. Zu vergl. die frühere Abhandlung Ann. Ch. Pharm. LVII, 69.

sonders an der inneren Seite. — No. 48 der Tabelle. Most Weinstock.
 von reifen grünen Trauben des Schönfeilners oder grünen
 Sylvaners (Babo und Metzger). Lage und Boden
 wie No. 45. Gehört zu den besseren Sorten. Farbe der
 Beeren selbst bei höchster Reife grün. — Die übrigen Ver-
 hältnisse dieser 4 Mostarten folgen hier tabellarisch :

No. der Tabelle	Erndtzeit 1845	Spec. Gew. des Mostes	100 Theile Most bedürfen zur Sättigung kohlen. Kall :
45	13. September	1,060	1,520
46	22. October	1,085	1,055
47	28. "	1,080	1,250
48	22. "	1,065	1,110

No. 49 der Tabelle. Blaue Schalen des Kleinburgun-
 ders, welche beim Pressen von No. 45 zurückbleiben. —
 No. 50 der Tabelle. Grüne Schalen des Schönfeilners,
 ebenso von No. 48 erhalten. — No. 51 der Tabelle. Kerne
 des Kleinburgunders mit No. 45 erhalten. — No. 52 der
 Tabelle. Kerne des Schönfeilners, ebenso von No. 48. —
 No. 53 der Tabelle. Holz des Kleinburgunders auf ver-
 wittertem Plänermergel.

Im Allgemeinen zeigen die Resultate von Crasso's
 Analysen, daß die Verschiedenheiten in den Mineralbe-
 standtheilen des Saftes ebenso bedeutend sind nach den
 Arten der Reben, als nach dem Standort; sie zeigen ferner,
 daß der Betrag der Mineraltheile am meisten an Alkali
 und Phosphorsäure mit der Reife wächst; sie bestätigen
 endlich für die Reben, was Wolff für die Kastanien ge-
 funden, daß nämlich im Holz der Kalkgehalt vorherrscht,
 in den Früchten aber gegen das Alkali zurücktritt.

In ganz ähnlichem Sinn wie Crasso, aber mit un-
 gleich weniger Gründlichkeit und Zuverlässigkeit, hat
 Walz (1) die Reben und Trauben der Umgegend von

(1) Jahrb. pr. Pharm. XV, 65. Frühere Analysen über die Asche
 des Weinstocks vergl. Jahrb. pr. Pharm. XIII, 93; im Auszug Pharm.
 Centr. 1847, 120.

Weinstock. Heilbronn untersucht. Die in der Tabelle No. 54 bis 56 aufgeführten Analysen beziehen sich auf folgende Proben No. 54 der Tabelle. Clevner Reben, mit den Blättern. – No. 55 der Tabelle. Riesling Reben mit den Blättern. – No. 56 der Tabelle. Drollinger Reben mit den Blättern.

Schon diese Bezeichnung ist sehr unbestimmt. Ist hier jedesmal ein ganzer Rebstock eingäschert? Oder wieviel Holz, Rinde und Blätter jedesmal genommen worden? Die Einäscherung geschah nach der bekannten Methode (welcher?).

Wo möglich noch weniger Umsicht zeigt die Analyse der verschiedenen Weinbergsboden, welche theilweise den Keuper angehören, am Fuß der Gehänge jedoch aus Löss mit Gerölle bestehen. Von einer vorläufigen mechanischen Trennung des bereits verwitterten Bodentheils vom unaufgeschlossenen Geröll ist natürlich keine Rede. Ebenso wenig von einer Scheidung nach Löslichkeit. Der Verfasser giebt kein Quartier; seine Proben werden ohne Barmherzigkeit in „ein feines Pulver“ verwandelt und den Agentien zu Beute hingeworfen! Er findet auch nichts dabei, die aus der analysirten Probe erhaltenen Resultate dem ganzen Acker zur Last zu schreiben. Ein Geröllstück mehr oder weniger, ein Feuerstein, den ein Bauer verloren hat, in jener Handvoll Probeerde, und der Kieselerdegehalt der Heilbronner Weinbergerde verdoppelt sich! Da der Gang der Analyse nicht angegeben ist, so müssen wir es dem Verfasser überlassen, das Räthsel eines Gehaltes von 8 pCt. freier Thonerde (neben kieselsaurer), von 8 pCt. Alkali u. s. w. zu erklären. Wir übergehen diese werthlosen Resultate und die im Original folgenden von 6 Arten Most aus gleichen Gründen.

Most. In den Mostarten sind nicht nur die mineralischen sondern auch die organischen Bestandtheile bestimmt, alle auf die dritte Decimalstelle, aber ohne Angabe der Methode. Letzteres ist zu bedauern, weil man sonst hätte lernen können, nicht nur wie Wein-, Trauben-, Aepfel- und Citron-

säure, sondern auch wie Zucker, ja Gummi und Gerbestoff auf 0,001 bestimmt werden. Selbst unbekannter Stoffe wie »Kleber« und »Farbstoff« ist Walz mit gleicher Schärfe, des letzteren bis auf 0,008 pC. der festen Stoffe, habhaft geworden!

Most.

Eine Analyse von Most, Grumbacher 1846r Riesling, von der sich Aehnliches sagen läßt, hat L. Beltz, ebenfalls ohne Angabe der Methode, geliefert (1). Der Most von 1,08 spec. Gew. enthielt im Quart 1764,32 Gran feste Stoffe, nemlich : 1680,0 Traubenzucker, 7,72 Weinsäure, Weinstein 18,50, Pflanzenleim 50,50, Thonerde 3,00, Kalkerde 2,00, Magnesia 2,60. — Die Phosphorsäure u. a. scheint vergessen.

Kane hat eine höchst schätzenswerthe Fortsetzung seiner Untersuchung über die Cultur des Flachses geliefert (2), welche den Einfluß des Bodens und des Wassers (beim Rösten) auf seine Güte durch die Analyse der mineralischen Bestandtheile zu ermitteln sucht. Die Materialien der Untersuchung verdankt Kane Herrn Marshall in Leeds. — Die Substanzen (vorher zerschnittene Stengel) sind zuerst im hessischen Tiegel verkohlt, und dann — aber ohne Auslaugen der Kohle — in der Platinschale eingeäschert worden.

Flachstengel.

Der befolgte Gang bei der Analyse war dieser : Scheidung der Asche durch verdünnte Salzsäure in Rückstand und saure Lösung; Scheidung des Rückstandes durch Kalilauge in Kieselerde und in Sand mit Kohle; Theilung der sauren Lösung in 3 Theile: 1) zur Bestimmung der Alkalien; 2) der Phosphorsäure, des Mangans, der Thonerde, des Kalks und der Magnesia; 3) des Eisenoxyds und der Schwefelsäure. Die Bestimmung der Phosphorsäure geschah nach Will. Der Bodenanalyse ging eine sorgfältige Schlammung des feinen, erdigen Theils vom Sand voraus; letzterer wurde

(1) Jahrb. pr. Pharm. XIV, 327. — (2) Phil. Mag. [3] XXXI, 36 u. 105; J. pr. Chem. XLI, 434; die frühere Abhandlung J. pr. Chem. XXXII, 354.

Flachsarten-
g-l.

gewogen; ersterer getrocknet, die organischen Substanzen durch Glühen zerstört und der Rest analysirt wie die Asche.

Der Verdampfungsrückstand von 2 Gallonen (bei No. 3 nur eine Gallone) filtrirten Wassers wurde getrocknet, zur Bestimmung der organischen Stoffe geglüht, und der Glührückstand mit destillirtem Wasser zum Behuf getrennter Analysen in einen löslichen und unlöslichen Theil geschieden.

Wir lassen zuerst die Beschreibung der analysirten Flachsarten folgen :

No. 24 der Tabelle. Grober Flachs, auf dem Boden No. 4 gewachsen. Spät, erst nach dem 15. Mai gesät. Stickstoffgehalt der bei 100° getrockneten Stengel 0,982 pCt. — No. 25 der Tabelle, von demselben Boden. Qualität vorzüglich. Stickstoff der Stengel = 0,756 pCt. — No. 26 der Tabelle, von demselben Boden, sehr fein, beste Art des Jahrgangs. Stickstoff der Stengel = 0,876 pCt. — No. 27 der Tabelle. Derselbe Boden. Ziemlich grob. Gesät am 2. Mai, gerauft am 29. Juli. Stickstoff der Stengel = 0,901 pCt. — No. 28 der Tabelle. Holländischer Boden No. 5. Stickstoff der Stengel = 1,00 pCt. — No. 29 der Tabelle. Bei Dublin. Stickstoff der Stengel = 0,56 pCt. — No. 30 der Tabelle. Bei Dublin. Andere gute Probe von Armagh. Stickstoff der Stengel = 0,627 pCt.

Durch Vergleichung der Aschen vorstehender Flachsarten (s. d. Tab.) bemerkt man zuerst, daß der Schwefelsäuregehalt in Beziehung (und zwar in umgekehrtem Verhältniß) mit dem Gehalt an Kohlensäure (organischen Säuren in der Pflanze) steht; ferner, daß die Asche des irländischen Flachs 21 bis 25 pCt. Kieselerde statt 3 bis 5 pCt. wie die andern Sorten enthält. Eine bestimmte Vertretung zwischen Kieselerde und einem andern Körper ist übrigens nicht zu erkennen. Noch weiter als hiervon weicht die Asche des Flachses von Armagh in dem enormen Eisengehalt ab (13,52 pCt. Oxyd), vielleicht dem höchsten bis jetzt beobachteten. Trotz dieser ungeheuern Unterschiede

ist die Capacität der Aschen für organische Säuren dieselbe, nemlich bei den belgischen und holländischen durch 13,28, bei den irländischen durch 13,53 pCt. Sauerstoff ausgedrückt. Mit Recht macht der Verfasser auf den durchgängig sehr hohen und darum landwirthschaftlich wichtigen Gehalt an Phosphorsäure aufmerksam, welcher nicht in das Handelsprodukt, sondern in die Abfälle beim Brechen übergeht, also dem Boden wieder erstattet werden kann.

Die untersuchten Bodenarten gehörten meist zu den sandig-lehmigen, nur einzelne zu den sandigen Krumen. Sie waren sehr locker und porös, reich an stickstoffhaltigen organischen Substanzen und färbten das Wasser beim Kochen, wobei sich etwas Alkalien und Salze lösten.

Bestandtheile	Bodenarten, getrockn. bei 100°. — Abstammend von:					
	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
	Heestert bei Courtray	Escamafles, beste Flachsgegend des Distr. von Courtray	Hamme Zog, bestes Flachsland des Distr. von Antwerpen	einem Distrikt, der nur groben Flachs u. magere Ernte liefert.	einem guten Flachsdistrict in Holland.	Crowle in Lincolnshire; sog. „Warp“.
Kali	0,160	0,123	0,068	0,151	0,583	0,534
Natron	0,298	0,146	0,110	0,206	0,306	0,088
Eisenoxyd	3,298	1,663	1,202	1,543	6,047	4,500
Manganoxyd	Spur	Spur	Spur	—	Spur	starke Sp.
Thonerde	2,102	1,383	1,125	0,988	5,626	3,065
Kalk	0,357	0,227	0,481	0,366	3,043	5,538
Magnesia	0,202	0,153	0,140	0,142	0,105	0,052
Schwefelsäure	0,025	0,017	0,013	0,026	0,023	0,113
Phosphorsäure	0,121	0,152	0,064	0,193	0,159	0,222
Chlornatrium	0,017	0,030	0,067	0,009	0,023	0,067
Thon	14,920	9,280	5,760	4,400	17,080	—
Sand	75,080	84,065	86,797	88,385	60,947	80,702
Organ. Substanz, Rest der Feuchtigkeit	3,123	2,361	4,209	3,672	5,841	5,328
Verlust	0,297	0,400	0,025	—	0,217	—
	100,000	100,000	100,000	100,081	100,000	100,204

Das sogenannte „Warp“ No. 6 findet sich im Humberfluß und bildet den schlammigen Grund der Flachsländer der Westküste; es hat noch keine Ernte getragen. —

Flachs-
stengel.

Kane zieht aus diesen Resultaten den Schlufs, dafs die Fruchtbarkeit der berühmten belgischen Flachsboden, d. h. ihre grofse Lockerheit sowie ihr Gehalt an Alkalien, Phosphorsäure und Magnesia, das Ergebnifs einer fleifsigen Cultur durch thierischen Dünger ist, welche nur einen leichten, sandigen Grund erheischt mit so viel Lehm als nöthig, ihn eben zusammenhängend zu machen.

Folgen schliesslich die Analysen einiger zum Rösten dienender Wasser, nämlich: Nr. 1. von einem grofsen Teich (ehemaligen Torfstich) von der Schelde gespeist; klar bis auf etwas suspendirte Substanz. — Nr. 2. Von einer der besten Rösten bei Hamme Zog in Belgien, gespeist von der Schelde; bleibt 6 oder 8 Wochen in der Röste stehen. Es bildet sich Anfangs eine Pflanzendecke, welche vor dem Rösten beseitigt wird; die Arbeiter schaufeln alsdann den Schlamm vom Boden auf und machen damit den Flachs untersinken. In diesem Zeitpunkt ist die, mithin sehr schlammige, Probe genommen. — Nr. 3. Von einem ähnlichen Teich eines andern Theils des Landes; fast klares Wasser. — Nr. 4. Vom Lysflufs in Frankreich; fast klar vor dem Einflufs in die Röste geschöpft. — Nr. 5. Von einer Röste in Holland.

Bestandtheile	Es gaben 100 Th. Verdampfungsrückstand von:				
	Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5
Eisenoxyd	0,514	6,633	2,584	6,200	1,183
Magnesia	0,856	1,369	1,530	1,192	7,601
Kalk	6,940	8,435	17,829	5,484	3,613
Natron	28,620	11,607	30,232	28,298	19,277
Kali	8,740	4,181	15,762	5,405	8,205
Schwefelsäure	8,054	8,435	11,627	9,300	5,607
Salzsäure	25,765	8,682	2,580	7,754	9,439
Phosphorsäure	—	—	—	0,079	—
Kohlensäure, organ. Substanz, Verlust	20,511	50,658	17,856	36,288	45,075
	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
100000 Th. Wasser gaben Verdampfungsrückstand:	51,70	139,69	50,68	45,11	42,40

Der Verfasser wagt es nicht, aus diesen Daten bestimmte Schlüsse auf den Einflufs des Wassers, insbeson-

dere des hohen Kaligehaltes aller und des hohen Eisengehaltes einiger Arten zu ziehen, was erst nach ausführlicheren Untersuchungen möglich sein wird.

Wir haben im Eingang dieses Abschnittes über die mineralischen Bestandtheile der Pflanzen bereits hervorgehoben, daß dieser Zweig der Phytochemie von einigen Analytikern im Sinn einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzen aufgefaßt worden sei.

Einen höchst anerkennenswerthen Beitrag zu dieser Richtung hat J. P. Norton in einer umfassenden Untersuchung über die Haferpflanze (1) in den verschiedenen Stadien ihres Wachsthum's geliefert. Er setzte sich zur Aufgabe, die Unterschiede und Veränderungen, welchen die Feuchtigkeit und der mineralische Bestand in den einzelnen Theilen der Pflanze und im Verlauf ihrer Entwicklung unterliegen, beides nach qualitativer und nach quantitativer Richtung durch die Analyse festzustellen. Die Untersuchung zerfällt zufolge dieses Ganges in zwei natürliche Abtheilungen: 1) in die Untersuchung des sich entwickelnden, und 2) in die des reifen Hafers.

Wir geben zuerst eine Uebersicht der quantitativen Verhältnisse; sie beginnt mit jungen 4 bis 6 Zoll hohen, aus einem einzigen Blatte und dem Ansatz zum Stengel bestehenden Pflanzen, gesammelt am 4. Juni 1845, welche erst bei 100° ausgetrocknet und dann bei gelindeste Rothglühhitze im Platintiegel eingeäschert wurden.

(1) Sill. Am. J. [2] III, 100. 318; Pharm. Centr. 1847, 466. 481.

Der reife
Hafer.

Zeit des Einsammelns	Was- ser- gehalt	Aschengehalt		Zeit des Einsammelns	Was- ser- gehalt	Aschengehalt	
		der frischen	der trocknen			der frischen	der trocknen
		Pflanzen				Pflanzen	
Blätter :				Knoten des Halmes :			
4. Juni. .	80,51	2,16	10,83	23. Juli. .	76,05	2,40	10,0
11. " . .	82,76	1,86	10,79	30. " . .	75,54	2,54	9,6
18. " . .	82,02	1,63	9,07	6. August .	74,82	2,63	10,4
25. " . .	78,53	2,35	10,95	13. " . .	75,29	2,80	10,4
2. Juli. .	80,26	2,24	11,35	20. " . .	75,38	2,90	11,7
9. " . .	76,97	2,81	12,20	27. " . .	78,55	2,98	11,2
16. " . .	76,53	3,06	12,61	3. Sept. .	70,65	3,14	10,7
23. " . .	77,61	3,85	16,45	Spren (Spelzen) :			
30. " . .	77,00	3,78	16,44	16. Juli. .	55,01	2,72	6,0
6. August .	76,63	3,75	16,05	23. " . .	56,95	3,92	9,1
13. " . .	74,06	6,14	20,47	30. " . .	50,49	6,08	12,2
20. " . .	79,93	4,25	21,14	6. August .	45,04	7,88	13,7
27. " . .	70,68	6,49	22,13	13. " . .	40,86	11,05	18,6
3. Sept. .	24,60	15,78	20,90	20. " . .	47,08	11,20	21,0
Halm :				27. " . .	40,44	13,38	22,4
4. Juni. .	87,04	1,36	10,49	3. Sept. .	21,96	21,43	27,4
11. " . .	87,05	1,28	9,88	Körner (ungeschält) :			
18. " . .	87,13	1,28	9,32	2. Juli. .	80,84	0,94	4,9
25. " . .	84,74	1,40	9,17	9. " . .	75,56	1,02	4,9
2. Juli. .	83,66	1,28	7,83	16. " . .	69,88	1,17	3,9
9. " . .	82,05	1,40	7,80	23. " . .	63,22	1,33	3,9
16. " . .	80,85	1,52	7,94	30. " . .	62,06	1,60	4,9
23. " . .	79,60	1,63	7,99	6. August .	62,44	1,62	4,9
30. " . .	76,64	1,74	7,45	13. " . .	55,11	1,87	4,9
6. August .	75,66	2,01	7,63	20. " . .	49,76	1,83	3,9
13. " . .	69,80	2,00	6,62	27. " . .	45,92	1,90	3,9
20. " . .	76,27	1,58	6,66	3. Sept. .	30,74	2,53	3,9
27. " . .	71,75	2,19	7,71				
3. Sept. .	71,70	2,36	8,35				

Der Wassergehalt ist am größten in den Blättern und Stengeln, klein ist er in den Knoten, am kleinsten in den Spelzen und der Frucht; er nimmt bei allen mit zunehmender Reife ab.

Der Aschengehalt ist am größten in den Spelzen, kleiner in den Blättern, Knoten, Halmen und am kleinsten in der Frucht; er nimmt bei allen mit fortschreitender Reife zu, ausgenommen bei der Frucht (ungeschälter) und nimmt auch hier nur scheinbar ab; denn diese Abnahme

ist nur die Vermehrung des aschenarmeren Kerns gegen ^{Der reife Hafer.} die aschenreichen Spelzen.

Der Mineralbestand derselben Pflanzentheile und zwar in verschiedenen Zuständen der Entwicklung (Nr. 57 bis 75 incl. d. Tab.) bietet mehrere Interessante. Zunächst die auffallende Abnahme des Chlors (Chlornatriums) mit zunehmender Reife bei allen Theilen der Haferpflanze, bei den Blättern fast bis zum Verschwinden. Bei diesen vermindert sich dabei gleichzeitig und gleichmäÙig der Gehalt an Alkali bis fast auf die Hälfte; dagegen bleibt sich die Summe der Alkalien in den Halmen durchweg gleich, indem der Gehalt an Kali und Natron mit dem abnehmenden Chlornatriumgehalt wächst. — Bei den Blättern und Halmen ist die Vermehrung der Kieselerde mit zunehmender Reife bedeutend, bei jenen mehr als das dreifache, bei diesen mehr als das doppelte, während die Phosphorsäure abnimmt, aber mäÙig und mit groÙen Schwankungen (1). — Bei den Körnern ist am wenigsten Veränderung sichtbar, weil die Schale und der Mehlkern dieses zusammengesetzten Organs in ihrer Entwicklung einander compensiren. — Auch der Stickstoffgehalt mehrt sich allmählig, denn er betrug in 100 Th. trockner Pflanze am:

16. Jul.	30. Jul.	13. Aug.	20. Aug.	27. Aug.	3. Sept.	ganz reif.
1,71	1,35	1,38	1,81	1,79	2,20	2,18 pCt.

Die Untersuchung des Strohs hat folgende Daten ergeben; für 100 Theile trockene Substanz: ^{Der reife Hafer.}

	Hopetonhafer		Braun. Hafer		Kartoffelhaf.		Sandhafer		Gesundes	Brändiges
	Nor-thum-ber-land	Kil-whiss	Swan-ston, Edinb.	Nor-thum-berland	Kil-whiss	Stroh				
Wasser	11,21	10,11	9,36	10,99	9,19	—	—			
Asche im oberen } Theile	4,95	5,44	8,25	9,23	10,01	5,64	6,52			
„ „ mittleren } des	6,11	4,23	6,53	7,41	9,01	7,89	6,10			
„ „ unteren } Strohs	5,88	5,86	7,10	9,76	7,80	9,17	7,78			

(1) Wir erinnern hier an den gänzlich relativen Charakter der zu Grunde liegenden Zahlen. So kann man z. B. aus diesem Grunde nicht klar sehen, ob die Abnahme eines Bestandtheils eine wirkliche, oder nur der Reflex von der Zunahme eines dritten ist.

Der reife
Hafer.

Der Aschengehalt nimmt also nicht regelmässig von unten nach oben ab und ist für gleiche Höhe sehr wenig gleichbleibend; dies gilt auch für den qualitativen Bestand des Strohs, wie die Nrn. 76, 77 und 78 der Tabelle zeigen. Auch die Verschiedenheit des Bodens erzeugt, wie zu erwarten, Ungleichheiten. So lieferten 2 Sorten Stroh, Nr. 1 von besserem sandigem Lehm Boden, Nr. 2 von ganz armem Boden, wo sie schlecht gedieh, Asche von folgender Zusammensetzung :

	Oberes Stroh.		Mittleres Stroh.		Unteres Stroh.	
	Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 1.	Nr. 2.
In Wasser lösliche Salze	41,96	71,70	55,22	84,03	77,46	90,26
Phosphors. Kalk, -Eisen und -Magnesia . .	2,94	0,77	5,03	1,51	0,78	2,21
Kalk und Magnesia . .	11,29	14,34	9,70	8,73	9,16	2,65
Kieselerde	43,75	13,18	32,05	5,72	12,55	4,86
	99,94	99,99	100,00	99,99	99,95	99,98

Die Asche der Blätter beträgt mehr als die des Strohs, ist aber von eben so grosser Unbeständigkeit; dies ergibt sich aus folgenden Daten. Es wurden in pC. gefunden :

	Hopetonhafer		Brauner Hafer	Sandhafer	Kartoffelhafer		Mittel
	Nr. 1.	Nr. 2.			Nr. 1.	Nr. 2.	
Wasser	9,08	9,57	10,11	10,95	10,33	11,02	10,14
Asche (der getrockn. Blätter)	7,19	8,44	10,29	14,79	14,59	20,90	12,70

Der Kartoffelhafer (5. u. 6. Columnne) stammte aus einem armen, der Hopetonhafer (1. u. 2. Columnne) aus lehmigem Boden. — Die Schwankungen in qualitativer Beziehung ergeben sich aus der Vergleichung von Nr. 79 der Tabelle mit nachstehender Uebersicht der Zusammensetzung der Asche :

	Hopetonhafer		Sandhafer	Spitze	Scheide	Der reife Hafer.
	Leichter Lehm	Moorboden	Sandiger Lehm	des Blattes		
In Wasser lösliche Salze . .	36,77	56,50	45,77	43,26	48,28	
Phosphorsaurer Kalk, -Eisen- oxyd und -Magnesia . . .	7,23	3,66	1,00	0,85	1,15	
Kalk und Magnesia	10,24	1,33	3,27	3,76	2,78	
Kieselerde	45,75	38,50	49,96	52,13	47,79	

Die Asche der Blätter nähert sich also der des obern Strohs; sie ist ebenfalls in der Spitze und in der Basis des Blatts verschieden.

Der Aschengehalt der Spelzen ist gröfser, als der der übrigen Theile. Es wurden in pC. gefunden:

	Hopetonhafer			Sandhafer	Brauner Hafer	Kartoffelhafer		Mittel
	Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 3.			Nr. 1.	Nr. 2.	
Wassergehalt . . .	10,28	10,69	10,58	9,60	11,62	11,16	10,95	10,69
Asche d. trocknen Spelzen . . .	7,23	10,69	16,53	18,97	19,16	18,59	27,47	16,94

Zur Vergleichung mit der Analyse (Nr. 80 der Tabelle) giebt der Verfasser noch folgende Zusammenstellung:

	Hopetonhafer,		Kartoffelhafer, Sandbod.	Brauner Hafer, Lehmbod.
	Leichter Gerstenb.	Leichter Moorbod.		
Lösliche Salze	35,02	34,12	19,86	18,66
Phosphors. Kalk, -Magnesia und -Eisenoxyd	4,29	8,73	2,26	2,40
Kalk und Magnesia	4,03	7,14	7,01	4,44
Kieselerde	56,65	50,01	70,86	74,50
	99,99	100,00	99,99	100,00

Die Untersuchung der Asche der Körner und Schalen beginnt mit der Feststellung des Gewichtsverhältnisses beider Organe. Es ergab sich dieses wie folgt:

	Hopetonhafer				Kartoffelhafer.	Braunhafer.	Victoriahafer.	Schwarzer Tarrhafer	Sandhafer.	Mittel
	Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 3.	Nr. 4.						
Körner	76,40	77,99	77,39	74,26	76,80	76,28	71,86	72,38	76,28	75,54
Schale	23,42	22,00	22,61	25,55	23,20	23,66	28,22	27,62	23,68	24,26

Der reife
Hafer.

Der Wassergehalt von beiden ergab sich im Mittel von 6 Fällen gleich oder doch nur um 1 pC. verschieden nämlich in den Körnern 12,17, in den Schalen 11,47 pC. Den Aschengehalt fand der Verfasser in 100 Theilen wie folgt :

	Hopetonhafer				Kartoffelhafer	Braunhafer	Sandhafer	Mittel
	Leichter Lehmbo-	Armer Moorbo-	Kalkarmer Bo-	Verbessertes Moorbo-	Dürres Sandbo-	Guter Lehmbo-	Sandiger Lehmbo-	
Körner . .	2,14	2,81	2,28	2,32	2,22	2,11	1,61	2,07
Schale . .	6,47	5,27	6,49	7,11	6,99	8,24	8,08	6,60

Zu den Analysen der Schalenasche (Nr. 81, 82, 83, 84 der Tabelle) und der Körnerasche (Nr. 85, 86, 87, 88 der Tabelle) giebt der Verfasser noch folgende, die den Einfluß des Bodens darstellen :

	Schalen				Körner		
	Hopetonhafer		Kartoffelhafer	Braunhafer	Sandhafer	Hopetonhafer	
	Leichter sandiger Lehmbo-	Magerer Moorbo-	Sandbo-	Guter Lehmbo-	Lehmbo-	Armer Sandbo-	Reicher Humusbo-
In Wasser lösliche Salze	22,92	33,84	23,14	19,96	68,52	70,69	72,9
Phosphors. Kalk, -Magnesia u. -Eisen . . .	1,84	4,62	1,10	2,49	21,60	18,63	12,4
Kalk und Magnesia . .	6,79	1,54	5,18	3,28	7,10	7,11	7,9
Kieselerde	68,55	60,00	70,57	74,25	2,78	3,30	2,4
	100,00	100,00	99,99	99,98	100,00	99,99	100,00
Aschenprocente der trocknen Pflanzh . . .					1,80	1,48	2,4

Für die Frucht des reifen Hafers hat Norton eine Gesamtanalyse nach der älteren, halb mechanischen, halb chemischen Methode, d. h. durch Abschlämmen der Stärk und chemische Untersuchung der Kleien und Flüssigkeiten ausgeführt. Die Hauptmasse des Klebers ist löslich ungerinnbar durch Hitze und wird von Norton als Casein (Legumin) angesprochen. Wir begnügen uns mit Anführung des Endresultats dieser wenig zuverlässigen Bestimmungen :

	Hopetonhafer			Kartoffelhafer	Der reife Hafer.
	Northumber- land	Airshire	Airshire	Northumber- land	
Stärke	65,24	64,80	64,79	65,60	
Zucker (unrein). . .	4,51	1,58	2,09	0,80	
Gummi.	2,10	2,41	2,12	2,28	
Oel	5,44	6,97	6,41	7,38	
Casein	15,76	16,26	17,72	16,29	
Eiweiss.	0,46	1,29	1,76	2,17	
Pflanzenleim	2,47	1,46	1,33	1,45	
Epidermis.	1,18	2,39	2,84	2,28	
Salze und Verlust . .	2,48	1,84	0,94	1,75	
	100,00	100,00	100,00	100,00	
Stickstoffgehalt . . .	2,19	2,35	2,28	2,76	

Sehr befremdend ist der ungewöhnliche Gehalt an fettem Oel, wenn er sich anders bestätigen sollte.

Der Aschengehalt der Sassaparillawurzel ist von Sassaparilla-
wurzel. Schleiden und H. Ludwig (1) untersucht worden. Der erstere fand in : 1) bester Honduras = 5,10 pC.; 2) ungewöhnlich dicker Honduras = 1,94 pC.; 3) einer als „Caraccas“ verkauften Honduras = 2,36 pC.; 4) bester Caraccas = 5,07 pC.; 5) einer Tampico = 3,92 pC. Asche.

Die Asche von Nr. 3 hat Ludwig untersucht (Nr. 89 der Tabelle). Von dieser Asche waren 54,71 pC. löslich und 45,288 unlöslich.

Eine Untersuchung der Aschenbestandtheile des Maulbeerbaums, mit besonderer Berücksichtigung der Vertheilung in den Organen, hat Thornton J. Herapath (2) geliefert. Der frische Pflanzentheil wurde gepresst, mit kaltem, dann mit heißem Wasser, und zuletzt mit verdünnter Essigsäure erschöpft; der Rückstand ist die „holzige Substanz“. Wird dieser mit starker Salpetersäure digerirt, ausgewaschen, mit verdünnter Kalilauge digerirt, diese dreifache Behandlung mehrmals wiederholt und endlich der Rückstand mit Salzsäure gekocht und gewaschen, — Maulbeer-
baum.

(1) Arch. Pharm. [2] LII, 61. Pharm. Centr. 1848, 669. —
(2) Chem. Soc. Qu. J. I, 103. Pharm. Centr. 1848, 716.

Maulbeer-
baum.

so bleibt die „reine Cellulose.“ Werden beide, die Holzsubstanz und die Cellulose, von einander abgezogen, so ist die Differenz die „incrustirende Substanz“. Saft nennt der Verfasser die Summe des Löslichen in allen Waschflüssigkeiten und Auszügen. Er giebt zuerst eine Uebersicht der Vertheilung der drei Substanzen und dann ihr Aschengehaltes. Es sind enthalten in 1000 Theilen des :

	frischen Pflanzentheils			trocknen Pflanzentheils		
	Beeren	Blätter	Zweige	Beeren	Blätter	Zweige
Cellulose (trocken)	5,10	33,3	101,4	68,4	336,1	203,0
Incrustirende Substanz „	13,60	65,1	309,7	182,0	266,0	620,0
Saft „	55,98	146,5	88,0	749,6	598,0	176,0
Holzige Substanz „	18,70	98,4	411,1	250,4	402,0	824,0

Der Aschengehalt ergab sich wie folgt für 100 Theile

	Beeren	Blätter	Zweige
In den Organen im Ganzen . . .	9,27	10,20	2,61
Im Saft der	11,28	12,83	5,83
In der Cellulose der	1,02	1,09	0,39
In der incrustirenden Substanz der .	4,82	7,79	2,42
„ „ holzigen „ „ .	3,78	6,11	1,92

Hiernach sind die Analysen der Asche No. 90 bis 100 incl. der Tabelle von selbst verständlich.

Fossiles Holz.

G. Reich (1) hat die Analyse der Asche von fossilem Holz und Coniferenzapfen der bernsteinführenden Formation — ohne Angabe der Methode — publicirt (No. 101 und 142 der Tabelle).

Spirogyra
quinina.

W. v. d. Marck (2) hat die Spirogyra quinina (Kützinger) untersucht. Gewaschen (wobei es nicht gelang, alle anhängenden Sandkörner und Infusorien vollständig zu entfernen) und getrocknet, hinterließen 100 Th. dieser Alge 2,5 trockene Substanz (mit 7,5 pC. Stickstoff), welche durch Einäscherung (auf welchem Weg ist nicht angegeben) 0,5 Asche gab. Diese Asche bestand aus kohlenst. und schwefelst. Alkalien und Chlornatrium (35,8 pC.), kohlenst. Kalk (1,5 pC.), kohlenst. Magnesia (9,3 pC.), phosphorst. Kalk (18,4 pC.).

(1) Arch. Pharm. [2] LIV, 158. — (2) Arch. Pharm. [2] LI, 156

phosphors. Magnesia (3,4 pC.), Spuren von Eisenoxyd und endlich Kieselerde (31,6 pC.).

Die Annalen der Chemie und Pharmacie brachten eine ^{Verschiedene Pflanzen.} Zusammenstellung von Aschenanalysen verschiedener Pflanzen und Pflanzentheile (ohne Text und weitere Angaben) von Thomas Richardson (1), welche in der Tabelle No. 102 bis incl. 139 aufgeführt sind.

Der Thonerdegehalt der Pflanzenaschen ist noch immer ^{Thonerdegehalt der Asche.} Streitfrage. Berzelius hatte schon früher Thonerde in der Asche von *Lycopodium complanatum* und *Helleborus niger* nachgewiesen. Die neuern Versuche des Fürsten zu Salm-Horstmar (2) scheinen dies zu bestätigen; er fand in jenem 38,5 pC. (der Asche), in diesem bestimmbare Mengen, in *Juniperus communis* und *Erica vulgaris* kaum wägbare Spuren von Thonerde; sie fehlt gänzlich in den Nadeln von *Pinus sylvestris*. Salm-Horstmar sucht den Grund der verschiedenen Aufnahmefähigkeit der Pflanzen für diesen Körper in der von ihm bei *Lycop. compl.* beobachteten sauern Reaction der Wurzelenden, welche bei *Junip. comm.* fehlt; — er hat aber vor allem versäumt, irgend einen Beweis zu liefern, daß die untersuchten Vegetabilien rein von mechanisch anhängenden erdigen Theilen waren, da doch schon Knop (3) bewiesen hat, daß die Thonerde der Flechtenasche lediglich davon herrührt. — Derselbe Vorwurf ist Wittstein (4) zu machen, der fast in allen Gartensträuchern, aufser *Berberis* und *Prunus*, Thonerde fand. Erdmann (5) ist es nicht gelungen, in verschiedenen Hölzern und reinen Samen, bei welchen die Möglichkeit jener Verunreinigung von vornherein ausgeschlossen war, auch nur eine Spur Thonerde nachzuweisen. In sofern bleibt es auch zweifelhaft, ob die in den Aschenanalysen der Tabelle an-

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVII, Anhang zum 3. Heft. — (2) J. pr. Chem. XL, 302; Chem. Gaz. 1847, 806. — (3) J. pr. Chem. XXXVIII, 347. — (4) Repert. Pharm. [2] XLIV, 322; J. pr. Chem. XL, 254. — (5) J. pr. Chem. XL, 254.

gemerkten Gehalte von Thonerde wirklich zum Vegeta-
gehören, oder nicht.

Aschengehalt
verschiede-
ner Hölzer.

Chevandier (1) hat über den mittleren Gehalt v
schiedener (bei 140° getrockneter?) Holzarten Folg
als die mittleren Resultate von sehr vielen Bestimmung
mitgetheilt :

100 Holz gaben an Asche :

Weide . . .	2,00
Zitterespe . .	1,73
Eiche . . .	1,65
Hainbuche . .	1,62
Erle . . .	1,38
Rothbuche . .	1,06
Fichte . . .	1,04
Tanne . . .	1,02
Birke . . .	0,85

Im Durchschnitt aus allen Holz
gaben an Asche :

100 Holz von jungen Stämmen . .	1
„ Kieferholz	1
„ Aeste	1
„ Reiser	1

Nahrungs-
mittel.
Fleischsub-
stanz und
Fleisch-
extract.

Die Untersuchung von Liebig (2) „über die Besta-
theile der Flüssigkeiten des Fleisches“ bringt auch in
technische Chemie gehörige Resultate, sofern sie die Zu-
reitung des Fleisches und das Verhältniß der Fleischnahr

(1) Compt. rend. XXIV, 269. Ein Bericht de Candolle's i
diese und die früheren (seit 1844 veröffentlichten) Untersuchungen C
vandier's über die Zusammensetzung der verschiedenen Holzarten
den Waldertrag findet sich in Arch. ph. nat. VIII, 5. Wir entleh
diesem Bericht noch folgende Zusammenstellung über die Zusamm
setzung verschiedener (getrockneter) Hölzer, in welcher der Sauer
mit Wasserstoff als zu Wasser verbunden, der überschüssige Wasserstoff
in Procenten angegeben ist :

	Kohlenstoff	Wasserstoff	Stickstoff	Wasse
Rothbuche	49,85	0,70	1,06	48,39
Eiche	50,44	0,70	1,06	47,80
Hainbuche	49,48	0,63	0,84	49,05
Birke	51,30	1,09	0,88	46,73
Zitterespe	50,35	0,96	0,82	47,87
Erle	51,86	1,03	1,15	45,96
Weide	51,10	0,77	0,86	47,27
Tanne	51,59	0,95	1,04	46,42
Fichte	51,71	0,94	0,81	46,54

(2) In der S. 876 angeführten Abhandlung.

zu ähnlichen Nahrungsmitteln erforscht und auf experimentellem Wege die Natur der sogenannten „Fleischbrühe“ näher bestimmt hat.

Fleischbe-
reitung und
Fleisch-
extract.

Die Ansicht, als bestehe das Wesen der Fleischbrühe in der aufgelösten Leimsubstanz — eine Ansicht, von der man übrigens in der Praxis vielfach zurückgekommen war, erweist sich hiernach als völlig unhaltbar. Die Gallerte giebt der Fleischbrühe keinen Geschmack und ist ihrer Menge nach bei weitem unzureichend, um daraus die Nahrunghaftigkeit der Fleischbrühe zu erklären. Nach fünfstündigem Sieden gingen von gehacktem und vorher kalt ausgelaugtem Fleisch des Ochsen $\frac{1}{4}$ pC., des Kalbes $1\frac{1}{4}$ pC. an die Brühe über, wovon die Gallerte höchstens die Hälfte beträgt. — Es bestätigt sich im Gegentheil die Ansicht Proust's, daß die eigenthümlichen Bestandtheile der Fleischbrühe fertig gebildet im Fleische, keineswegs aber bloße Produkte des Kochens sind. Die Rückstände des zerhackten, kalt ausgezogenen Muskelfleisches der verschiedensten Thiere (wie Fuchs und Ochse) sind nicht von einander zu unterscheiden; alle Eigenthümlichkeiten des Fleisches derselben, besonders im Geschmack, beruhen lediglich in den löslichen Theilen (in der Fleischbrühe).

Liebig's Erfahrungen bieten ein eben so einfaches als handliches Mittel, um in wenigen Minuten eine Fleischbrühe von der höchsten Potenz zu bereiten. Man menge fein gehacktes, mageres Ochsenfleisch mit dem gleichen Gewicht kalten Wassers, lasse wenn möglich kurze Zeit maceriren, und erhitze dann das Ganze langsam zum Sieden. Nach einem Aufwallen von einigen Minuten scheidet sich die klare Fleischbrühe von dem geronnenen Eiweiß und der sehnenartig gewordenen Fleischfaser. Sie braucht nach dem Abseihen nur gewürzt und mit gebrannten Zwiebeln oder Caramel etwas gefärbt zu werden. Das Färben ist eine kaum erlässliche Concession, welche man dem gewohnten Vorurtheil machen muß.

Fleischzubereitung und Fleisch-extract.

Durch Eindampfen im Wasserbade oder bei noch gelinderer Wärme färbt sich die Brühe von selbst und hinterläßt ein braunes Extract von feinem Bratengeruch, welches beliebige Zeit aufbewahrt werden kann. Dieses Extract liefert jeden Augenblick, in etwa 30 Th. Wasser gelöst und gesalzen, die trefflichste Fleischbrühe. — Die Nützlichkeit des Fleischextractes für die Krankenpflege, den ärztlichen Spital- und Felddienst, sowie in der Haushaltung leuchtet hiernach von selbst ein. Man sieht zugleich, daß die Knochenbrühe, die Bouillontafeln etc. von einer wahren Fleischbrühe grundverschiedene Zubereitungen sind, und mit derselben nie in eigentliche Concurrenz treten können.

Als Gegenstand des Handels gedacht, kommt das Fleischextract etwas zu hoch zu stehen; indessen scheint darin eine neue Quelle der Verwerthung des Viehstandes für die Niederlassungen des Amerikanischen Continents latent zu sein, soweit diese an zu großer Entfernung von den Sammelplätzen der civilisirten Districte leiden.

Für die Zubereitung des Fleisches ergibt sich, daß die Bereitung einer gehaltreichen Fleischbrühe und schmackhaften Fleisches durch Kochen gleichzeitig nicht möglich sind. Nach der Bereitung von Fleischbrühe nach obiger Vorschrift ist der Fleischrückstand für sich völlig ungenießbar, geschmacklos und zähe, und dem gekochten Rindfleisch unserer Tafeln so unähnlich wie möglich. — Will man umgekehrt dem gekochten Fleisch möglichst viel Kraft und Schmackhaftigkeit zuwenden, so bringe man das Fleisch sogleich in vorher *siedendes* Wasser. Wird nach einigen Minuten die Temperatur desselben durch Zugießen von kaltem Wasser auf etwa 70° abgekühlt und so bis zum Gahrwerden erhalten, so hat man alle Bedingungen zu diesem Zwecke erfüllt.

Sofern es auf der einen Seite feststeht, daß die reine Fleischfaser — abgesehen von den Saftbestandtheilen — durch Kochen statt zu erweichen vielmehr horn- oder schnenartig wird, leuchtet ein, daß dieses bei der üblichen

Zubereitung des Fleisches durch Zweierlei verhindert wird : Fleischau-
bereitung und
Fleisch-
extract.
einmal weil die Temperatur im Innern eines Fleischstückes die Siedhitze niemals erreicht, dann aber auch, weil sie hoch genug ist, um das Eiweiß zum Gerinnen zu bringen, welches die Fasern umgiebt und bis zu einem gewissen Grade schützt. Die Temperatur des kochenden Fleisches im Innern ist nämlich nicht nur die des gerinnenden Eiweißes (56,5°), sondern sie kann nicht niedriger als die des gerinnenden Blutfarbstoffs (65—70°) sein.

Für das Einsalzen des Fleisches geben Liebig's Untersuchungen einen völlig neuen Gesichtspunkt. Die sogenannte »Salzlacke« welche Fleisch und trocknes Salz zusammen bilden, beträgt $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{2}$ vom Fleischsaft, und enthält die Hauptbestandtheile einer concentrirten Fleischbrühe. Die Salzlacke reagirt sauer, und gerinnt beim Sieden durch Albumin; sie enthält Phosphorsäure, Milchsäure, viel Kali, Kreatinin und ohne Zweifel auch Kreatin. Es unterliegt sonach keinem Zweifel, daß gesalzenes Fleisch um die in die Lacke übergegangenen Bestandtheile an Nahrungswerth verliert, und die Erfahrung, daß bei gesalzener Fleischnahrung die Gesundheit auf die Dauer Störung erleidet, ist verständlicher.

Boussingault (1) hat seine früheren Beobachtungen Einfluß des
Salzes auf die
Viehfütte-
rung. über den Einfluß des Salzes als Zusatz zu dem Viehfutter durch schätzbare Beiträge vermehrt. Jene früheren hatten ergeben, daß das Salz auf die Entwicklung des Viehes und die Fleischproduction den ihm gewöhnlich zugeschriebenen Einfluß bei weitem nicht ausübt. Die neue Versuchsreihe, die sich über eine Periode von 13 Monaten erstreckt, ist mit einer Anzahl Stiere unternommen worden, von denen eine Abtheilung zu ihrer Ration Salz bekam, die andere nicht, — beide unter gleicher Behandlung — und führte auf folgendes Endergebnis :

(1) Ann. ch. phys. [3] XX, 113; XXII, 116. 503; Compt. rend. XXV, 729; Dingl. pol. J. CVII, 804; J. pr. Chem. XL, 168; XLIII, 383; XLV, 127; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 330. 446.

Einfluss des Salzes auf die Viehfütterung.	Ursprüngliches Gewicht	Gewicht nach 13 Monaten.	Zunahme in 13 Monaten	Verzehrtes Heu	Von 100 Kilogr. Heu erzeugtes lebendiges Gewicht	
					1. Abth. (mit Salz)	2. Abth. (ohne,)
	434 K.	950 K.	516 K.	7178 K.	7,19 K.	
	407 K.	855 K.	452 K.	6615 K.	6,88 K.	

Im Durchschnitt erhielt die erste Abtheilung also 18,2 K. Heu täglich, und erzeugte damit 1,309 lebendes Gewicht; derselben Heuration entspricht bei der zweiten Abtheilung ein Fleischzuwachs von 1,243 Kilogr. Der Werth des Zuwachses, nämlich 66 Gr., wiegt die Kosten der dabei aufgewandenen 102 Gr. Salz nicht auf. »Obgleich«, bemerkt Boussingault weiter, »das Salz sonach keinen auffallenden Einfluss auf das Wachsthum hat, so scheint es einen desto wohlthätigeren auf das Aussehen und die Eigenschaften der Thiere zu üben«. Die Stiere, die 11 Monate des Salzes beraubt waren, verhielten sich träg und von kaltem Temperament; ihr Fell war ohne Glätte, zerzaust und theilweise kahl. Die mit Salz genährten zeigten Feuer, feine Glätte der Haare und hätten sicher einen merklich höheren Marktpreis erhalten.

Unterschied zwischen trockenem und genetztem Futter.

E. Oppermann (1) hat unter Leitung Boussingault's die sehr verbreitete Ansicht der practischen Landwirthe, dass eingeweichtes Futter besser nähre als trockenes, durch Versuche geprüft. Je zwei Rinder (17 bis 19 Monate alt) wurden 14 Tage lang mit Rationen von 3 Kilogr. auf 100 K. ihres Gewichtes, und zwar die unter Nr. 1 mit eingeweichtem, die unter Nr. II. mit trockenem Heu gefüttert. Die Rinder Nr. I. hatten um 23 K., die Nr. II. um 20 K. im Mittel zugenommen, ein Mehrbetrag zu Gunsten des genetzten Futters, der übrigens B. den Mehraufwand an Arbeit nicht zu ersetzen scheint. — Bei Umkehrung der Ordnung im Füttern blieb sich das Resultat wesentlich gleich; ebenso wenig Einfluss hatte das Netzen des Futters auf die Milch-erzeugung. Nur wo es sich um schnelle Mästung handelt,

(1) Ann. ch. phys. [3] XIX, 249.

könnte das Netzen Vortheil gewähren, weil das Vieh das Futter in diesem Zustand (bis zu 12 mal) schneller frisst.

Mit dem Nachweis betrügerischer Zusätze zum Getreidemehl haben sich viele Chemiker beschäftigt. Um einen (in Frankreich oft angewendeten) Zusatz von Mehl aus Bohnen oder andern Leguminosen zu erkennen, rath Villain (1), den Kleber des gefälschten Mehls darzustellen, der sich charakteristisch durch Zusammenhang, Elasticität, Farbe etc. von dem des reinen Mehls unterscheidet.

Mehlverfälschung.

Lassaigue (2) benutzt eine Lösung von Eisenvitriol, welcher einen Aufguß von reinem Mehl gelblich, von Mehl mit Bohnen gefälscht bouteillengrün färbt. — Donny (3) wendet nacheinander Salpetersäure und Ammoniak an. Getreidemehl zeigt dabei keine besondere, Bohnenmehl aber eine tief rothe Farbe; behandelt man nach ihm bohnenmehlhaltiges Mehl mit Kalilauge, so bleibt Cellulose ungelöst und unter dem Mikroskop deutlich erkennbar, während reines Mehl nichts der Art bietet.

Die Verfälschung mit Maismehl kann nach Filhol (4) an der eigenthümlich gelben Färbung erkannt werden, welche verdünnte Kalilauge hervorbringt. — Nach Mauviel-Lagrange (5) soll man das verdächtige Mehl erst mit Salpetersäure übergießen, dann die Mischung verdünnen und mit kohlen. Kali sättigen; ist es rein, so entsteht nur ein Niederschlag in gelben Flocken, ist es gefälscht, so erzeugen sich zugleich zahlreiche orangegelbe Punkte.

Louyet (6) theilte eine Methode mit, um Mehlverfälschungen zu entdecken, welche für Gutachten in Handelsachen etc.

- (1) J. chim. méd. [3] IV, 524, — (2) J. chim. méd. [3] III, 633. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXI, 5. Dasselbe Verfahren beschreibt auch Mareska J. pharm. [3] XII, 98; Pharm. Centr. 1847, 682. — (4) Ann. ch. phys. [3] XXI, 187. — (5) J. chim. méd. [3] IV, 339. — Vergl. Zusammenstellungen über Fälschung verschiedener Nahrungsmittel von Chevallier J. chim. méd. [3] IV, 510, und von Donny über verschiedene Erkennungsmittel von Mehlverfälschung Ann. ch. phys. [3] XXI, 5. — (6) J. chim. méd. [3] IV, 164; J. pharm. [3] XIV, 355; Dingl. pol. J. CVIII, 290; CXI, 442.

Mehlverfälschung.

genüge. Sie besteht in der Aschenbestimmung des Mehls und geht davon aus, daß Weizenmehl durchschnittlich 0,8, Roggenmehl 1,0, Bohnen- und Erbsenmehl 3, Leinkuchen 10 pC. Asche liefert. Die Fälschung soll aber nicht allein aus der Aschenerhöhung, sondern auch aus der Qualität der Asche, insbesondere daraus ersehen werden, ob die phosphors. Salze zwei- oder dreibasisch sind. Die Mißliche dieses Vorschlags leuchtet von selbst ein: Kleinheit des Maassstabes, woran beobachtet wird und völlige Unsicherheit desselben; endlich ist die Constitution der phosphors. Salze einer Asche nach Erdmann bekanntlich etwa zufälliges, durch die Einäscherung und nicht in der Natur bedingtes. Wir verweisen in Betreff der zahlreichen Aschenbestimmungen der Mehlartern auf das Original.

Malztaig als Brodsurrogat.

Schlofsberger (1) hat den von Essig in Leonberg als Brodmehlsurrogat empfohlenen, sogenannten »Malztaig« oder »Obertaig« der Bierbrauereien geprüft. Man versteht darunter bekanntlich jene taigartige Masse, welche sich (aus den mehligten Theilen des Malzes bildend) auf den Trebern beim Maischen absetzt. Sie enthält 75 bis 78 pC. Wasser, 4 bis 7 pC. Stärke und 3,9 bis 4,8 pC. Stickstoff, (also mehr Kleber als das Mehl) und viele phosphors. Salze. Mit einem Zusatz von Malztaig bereitetes Roggenbrod enthält 3 bis 4 pC. Stickstoff bei 50 bis 52 pC. Wasser, und zeigte eine sehr gute Haltbarkeit bei Abwesenheit von jedem üblen Angeschmack.

Oidium aurantiacum.

Payen (2) hat Versuche angestellt um die Zweifel niederzuschlagen, welche sich gegen seine Entdeckung erhoben hatten, wonach die orangerothe Masse, welche bei einer gewissen Verderbnis des Brodes sich entwickelt, ein aus dem Mehl übergegangener, eigenthümlicher Pilz (*Oidium aurantiacum*) ist. Man glaubte nemlich, daß die

(1) Dingl. pol. J. CIII, 818 aus Riecke's Wochenblatt, 1847, 3; ferner Dingl. pol. J. CIV, 375. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 253; Compt. rend. XXVII, 4.

Sporen dieses Pilzes bei der Backhitze getödtet werden müßten. — Als Payen diese Sporen in einem Glasrohr einer Hitze von 100 bis 120° aussetzte und sie dann auf Brodkrumen aussäete, entwickelten sich jene Pilze reichlich, was bei einer Gegenprobe mit derselben, nicht eingesäeten Krume unterblieb. — Eine Hitze von 140° zerstört die Keimkraft völlig.

Die Kartoffelkrankheit ist noch immer nicht mit Bestimmtheit auf ihre thatsächliche Veranlassung zurückgeführt, dagegen zum Object kühner Speculation geworden.

Kartoffel-
krankheit.

G. Kemp (1) fand, daß der gesunde Theil einer Kartoffel 4,14 bis 4,25, der kranke Theil 5,55 bis 5,78 Asche hinterläßt. Der letztere gab ferner im Mittel dreier Analysen 41,93 pC. C, 6,86 H, 1,23 N, 44,28 O. — Die Vergleichung dieser Zahlen mit denen einer Elementaranalyse der rohen Kartoffel von Boussingault (wobei K. völlig den Einfluß der Ortsverschiedenheit, des Jahrgangs etc. vergift) führt den Verfasser auf die Folgerung *a priori*, daß sich bei der Kartoffelfäule Buttersäure entwickeln müsse (wie andre gefunden haben), und auf die Schlußfolgerung, daß die Kartoffelkrankheit eine abnorme Tendenz zu einer unzeitigen Keimbildung sei. Pilze und dergleichen sind nach Kemp secundäre Erscheinungen.

H. Reinsch (2) geht von der Ansicht aus, das Innere der Kartoffel sei wie eine Apotheke, d. h. jeder Stoff des Saftes in einem besonderen Gefäß, oder vielmehr Zelle; er definirt die Kartoffelkrankheit als die Folge derjenigen chemischen Action, welche erfolge, wenn die Zellenwände sich bis zum Durchbrechen verdünnen, die eingeschlossenen Stoffe plötzlich chemisch aneinandergelassen und denjenigen Bürgerkrieg führen, welcher gewöhnlich Fäulniß heißt.

(1) Chem. Gaz. 1847, 69 u. 186. — (2) Jahrb. pr. Pharm. XVI, 182.

Melassen-
asche.

In der Asche des Rohzuckers und der Melasse eines und desselben Zuckerrohrs fand Richardson (1) :

	Melasse	Rohrzucker
Kali	36,23	19,42
Kalk	12,72	14,67
Magnesia	11,14	10,72
Eisenoxyd	2,62	6,55
Kupferoxyd	Spur	0,71
Manganoxydul		Spur
Chlorkalium	1,58	8,03
Chlornatrium	25,87	15,46
Schwefelsäure	7,91	10,85
Kieselerde	1,93	18,59
Aschengehalt	3,60	1,33

Zuckerlute-
rung.

J. Scoffren (2) von London hat ein Patent auf eine neue Läuterungsmethode der Rohzuckerlösungen genommen. Sie besteht in der Anwendung einer Auflösung von Bleiglätte in Essig und Fällen des überschüssigen Bleies — nach der Filtration — mit schwefliger Säure. Schwerlich ist dies ein wahrer Fortschritt des Raffinirbetriebs.

Wein.

Batillot hat in einem besonderen Werke : *„traité sur les vins de France“* (3) eine große Menge von interessanten Nachrichten und Erfahrungen über die Weinproduction Frankreichs zusammengestellt. Auf das Originalwerk verweisend entnehmen wir daraus nur das Folgende: Nach dem Verfasser sind in den rothen Weinen zwei Farbestoffe: der *Rosin* und der *Purpfit*. Der *Rosin*, sagt Batillat, sei rosafarbig, in Wasser und Alkohol, nicht aber in Aether löslich; er sei aus Wasser weder durch Gallerte noch Eiweiß fällbar; er sei vorwiegend in dem Bodensatz der Fässer nach dem ersten Abstechen. — Ebenso sei der Bodensatz alter Weine fast ganz *Purpfit*; dieser habe eine schwärzlich dunkelrothe Farbe, herben Geschmack, sei in Wasser und

(1) Phil. Mag. [3] XXXI, 386; Dingl. pol. J. CVI, 453; J. pr. Chem. XLII, 319. — (2) Aus London Journ. of Arts, Oct. 1848, 196 in Dingl. pol. J. CX, 261. — (3) Im Auszug im J. pharm. [3] XIV, 107; Bull. soc. d'enc. 1848, 451; Dingl. pol. J. CX, 66.

Aether (nicht aber in Weingeist), ebenso in Schwefelsäure löslich und könne aus letzterer durch Wasser gefällt werden. Er bilde mit Gallerte einen in Alkohol und Wasser unlöslichen Niederschlag. — Als ein treffliches Mittel, die Rothweine haltbarer zu machen, rühmt der Verfasser die Weinsäure; sie soll nicht nur ein wahres Präservativ gegen viele sogenannte Krankheiten, sondern auch gegen den schädlichen Einfluß hoher Temperaturen sein. Die Bordeauxweine haben den großen Vorzug, daß sie ohne Schaden die Linie passiren; dem Burgunder könne man dieselbe Eigenschaft ertheilen, wenn man auf das Liter 1 Grm. Weinsäure zusetze.

Fresenius (1) hat einige der vorzüglichsten 1846er Rheingauer Weine einer chemischen Untersuchung mit Rücksicht auf ihren Werth unterworfen. Es waren ihm zu diesem Zwecke: 1) Hattenheimer; 2) Markobrunner; 3) Steinberger (diese drei sind Durchschnittproben des ganzen 1846er Ertrags der nassauer Domänen); 4) Steinberger, Auslese, von der nassauer Domänendirektion zugestellt worden. Sämmtliche Proben waren rein gehalten, in geschlossener Gährung erzeugt, zur Zeit der Untersuchung vier Monate alt, aber noch nicht abgestochen. No. 1), 2) und 3) waren fast klar, 4) noch in schwacher Gährung.

Die Bestimmung des Weingeistes geschah aus dem spec. Gewicht des Rectificats; die des Zuckers aus der durch Gährung entwickelten Kohlensäure nach der Formel des wasserfreien Traubenzuckers ($C_{12}H_{22}O_{11}$); die der freien Säure mit dem Will-Fresenius'schen acidimetrischen Apparat; die des Extracts durch Verdampfen und Trocknen bei 100° :

	1)	2)	3)	4)
Wasser	85,08	83,68	84,38	78,27
Extract im Ganzen	4,21	5,18	5,56	10,55
Wasserfreier Traubenzucker	3,58	4,62	4,49	8,63
Freie Säure, ausgedrückt als \bar{T},HO	0,556	0,583	0,497	0,424
Alkohol	10,71	11,14	10,07	10,17

(1) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 384; Dingl. pol. J. CVII, 289; Pharm. Centr. 1848, 140.

Wein.

Hiernach berechnet sich die Menge des wasserfreien Traubenzuckers im Most von 1) = 24,52, von 2) = 26,25 von 3) = 24,12, von 4) = 28,46 pC. — Die durch die Analyse bestimmten Faktoren lassen, weder einzeln noch zusammen, einen sicheren Schluss zu auf die Güte des Weines, weil einer der wichtigsten — die Blume — nicht quantitativ ermittelbar ist.

Liebig (1) macht darauf aufmerksam, daß die Rheinweine durch das Lagern und das damit nothwendig zusammenhängende Auffüllen auf der einen Seite zwar an Blume und Geschmack, auf der anderen Seite aber auch in einer dem Genuß nachtheiligen Weise an Säure gewinnen. Anfangs scheidet sich der Weinstein, der durch die Verdunstung, sowie durch die fortschreitende Alkoholbildung an Löslichkeit verloren hat, ungefähr in gleichem Schritte aus, als er durch das Auffüllen in dem Fasse vermehrt wird. Allein mit dem Auffüllen empfängt der Inhalt eines Fasses zugleich freie Weinsäure, die sich ebenfalls vermehrt und von einer gewissen Zeit an die Löslichkeit des Weinsteines wieder steigert. Daher die auffallende Säure sehr alter Rheinweine. Die Abstumpfung der Säure durch die gewöhnlichen alkalischen Agentien kann natürlich nicht ohne Nachtheil der Qualität des Weines geschehen. Dagegen giebt Liebig ein naheliegendes Mittel, nämlich das neutrale weinsaure Kali, an, um diesen Zweck ohne die geringste Beschädigung des Geruchs und Geschmacks der Weine zu erreichen. Bei einem alten 1811er Weine sind per Liter 3,5 Grm. nothwendig gewesen. Natürlich ist ein bemerklicher Ueberschufs von großem Nachtheil auf den Geschmack. Ebenso wenig ist außer Augen zu setzen, daß die Bildung der »Blume« durch die Säure vermittelt wird und folglich diese niemals vor der Gährung abgeschieden werden darf (2).

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 352; Arch. ph. nat. VIII, 281; Pharm. Centr. 1848, 375. — (2) Dumas erwähnt im VI. Bande (1843) S. 515 seiner Chimie appliquée, daß diese Entsäuerungsmethode im Großen Eingang gefunden habe.

Wein.

Ure (1) hat sich neuerdings bemüht, aus seinen Erfahrungen über die in den Docks zu London lagernden (Port-) Weine die Unzweckmäßigkeit von Liebig's Mittel darzu-
thun. Er hätte ohne besondere Versuche wissen können, daß man mit neutralem weinsaurem Kali keine von Essigsäure herrührende saure Beschaffenheit entfernen kann; er hätte ferner nicht übersehen dürfen, daß Liebig jenes Mittel ausdrücklich für Rheinweine empfohlen hat. Buchner (2) bestätigt den Erfolg von Liebig's Methode.

Bouchardat (3) hat die Rebsorten der niedern Bourgogne untersucht und ist für die daraus bereiteten Weine zu folgendem Resultat gelangt:

	Quantität Wein per Hectare	In dem Wein von 1 Hectare ist		
		Alkohol	Wein- und Aepfelsäure	Kali
Gouais blanc . . .	240 Hectolit.	7,88 Hectol.	112,4 Kilogr.	15,3 Kilgr.
Gros Gamay (ist die schlechteste Sorte) .	160 " "	8,18 " "	67,2 "	9,44 "
Gros Verreau . . .	90 " "	6,28 " "	36,9 "	5,13 "
Petit " . . .	60 " "	4,92 " "	20,4 "	3,92 "
Melon . . .	80 " "	7,28 " "	24,3 "	3,92 "
Servoyen vert . . .	50 " "	4,40 " "	17,0 "	2,35 "
" rose . . .	30 " "	3,00 " "	7,7 "	1,23 "
Pineau noir . . .	20 " "	2,12 " "	4,2 "	0,74 "
" blanc. . .	15 " "	1,52 " "	3,9 "	0,61 "

Er kommt zu der Schlußfolgerung, daß Lage und Gegend einen geringeren Einfluß auf die Güte des (Burgunder-) Weins hat, als man gewöhnlich annimmt, namentlich einen geringeren, als die Verschiedenheit der Rebsorte.

Aechter Malagawein ist nach den Beobachtungen von Fr. Mayer (4) dunkelbraun, aber vollkommen klar; er darf, selbst in halbvollen Flaschen, in 2 bis 3 Wochen weder Kahne noch Bodensatz bilden. Sein Geruch muß specifisch lieblich, sogenannter Spaniolgeruch, und (wenigstens bei den jüngeren Sorten) zugleich schwach säuerlich brenzlich

(1) Pharm. J. Trans. VIII, 63; Repert. Pharm. [3] I, 216. — (2) Repert. Pharm. [3] I, 206. — (3) Aus Rev. scientif. Aug. 1846 in Jahrb. pr. Pharm. XIV, 268. — (4) Jahrb. pr. Pharm. XV, 201.

Wein. (caramelartig) sein, und dadurch verrathen, daß er aus gekochtem Most gewonnen worden. Der Geschmack ist süß geistig. Die specielleren Eigenschaften sind an 7 Sorten untersucht worden, nämlich: 1) 1834er aus einer ungenannten Materialhandlung, welche bemerkt, daß die Angabe des Jahrgangs unverlässig sei; 2) 1834er aus einer andern ungenannten Handlung; 3) 1840er von derselben Handlung; 4) 1841er von B. Rümelin in Heilbronn; durch Connaissement dieser Handlung ist die unzweifelhafte Aechtheit dieser Sorte vom Verfasser ausdrücklich dargethan; 5) 1842er und 6) 1844er beide ebenfalls von Rümelin; 7) ohne Angabe des Jahrgangs von derselben Quelle wie No. 1.

Nach zunehmendem Weingeistgehalt geordnet ergaben diese bei der Untersuchung:

	Jahrgang	Spec. Gew.	Alkohol. Vol. pC.	Kryst. Traubenz. Gew. pC.	Extract Gew. pC.
No. 7.	unbekannt	1,037	12,50	9,91	14,4
No. 1.	1834	1,069	13,17	nicht best.	nicht best.
No. 2.	1834	1,069	13,50	"	"
No. 6.	1844	1,057	14,93	"	"
No. 4.	1841	1,057	15,00	14,72	18,4
No. 5.	1842	1,056	15,34	14,51	18,7
No. 3.	1840	1,070	16,07	nicht best.	nicht best.

Der Alkoholgehalt wurde durch Destillation des Weines, der Zucker nach der Gährungsmethode mit dem Will-Fresenius'schen Apparate bestimmt. Aus dem Unterschied des spec. Gewichts des unveränderten Weins und des spec. Gewichts des auf sein ursprüngliches Volum verdünnten Destillationsrückstandes ergaben sich von den obigen sehr abweichende Zahlen für den Alkoholgehalt.

Berechnet man den dem Alkohol entsprechenden Zuckergehalt und fügt ihn dem Zuckergehalt der 4. Columnne hinzu, so erhält man den Zuckergehalt des Mostes von No. 4) zu 40,18; von No. 5) 40,16 und von No. 7) zu 38,38 pC.

Aether mit dem Wein geschüttelt, entzieht ihm das Aroma und hinterläßt nach der Verdunstung ein nicht sehr

flüchtiges, entschieden saures Extract, mit welchem Reactionen auf Wein-, Citron- und Aepfelsäure erhalten wurden. Wein.

Die untersuchten Weine gaben auf Zusatz von Ammoniak eine Fällung von phosphorsaurem Magnesia-Ammoniak; dieser Niederschlag betrug bei No. 1) 0,147 pC., bei 3) 0,129 pC., bei 4) 0,139 pC. Außerdem bewies die qualitative Analyse die Gegenwart von Schwefelsäure, Kalk, Gerbstoff; bei einer (nicht bezeichneten) Probe ergaben sich 0,38 pC. Asche. Der feste Rückstand des zur Trockne verdampften Phlegmas löste sich wieder klar und ohne Trübung in Wasser.

In Betreff der weiteren Angaben über Cultur und Erzeugung des Malagaweins in Spanien verweisen wir auf die sehr umfassende Zusammenstellung in der angeführten Abhandlung.

Zur Entfuselung des Branntweins schlägt W. Peters (1) vor, die Fässer wie gewöhnlich mit gut ausgeglühter Holzkohle zu beschicken, in die Mitte dieser Beschickung aber eine Schichte von 1 Th. Braunsteinpulver mit 2 Th. Knochenkohle einzuschalten. Ein solches Faß soll 12 bis 15 Monate wirksam bleiben. Entfuselung des Branntweins.

Knop (2) hat Versuche angestellt, die Entfuselung des Kartoffelbranntweins durch Oxydation des Fuselöls zu bewirken. Er fällt eine Kupfervitriollösung mit Aetzkali, gießt die Flüssigkeit mit dem Kupferoxydhydrat in Branntwein, der vorher mit einer geringen Menge Kali versetzt ist und digerirt eine Zeit lang. Nach einigen Tagen zeigte sich unter dem Einfluß der Sonnenwärme ein Theil des Oxyds in Oxydul reducirt. Der abgezogene Branntwein hatte nur noch einen Krautgeruch, keinen Fuselgeruch mehr. Es steht sehr dahin, ob dieses Verfahren das gegenwärtig herrschende verdrängen wird.

(1) Mittheilungen des Gewerbevereins für das Königreich Hannover, Lief. 53 u. 54; Dingl. pol. J. CVIII, 79; Arch. Pharm. [2] LIII, 335; Pharm. Centr. 1848, 368. — (2) Pharm. Centr. 1847, 687.

Anorgani-
sche Bestand-
theile der eng-
lischen Biere.

Th. Dickson (1) hat eine umfassende analytische Untersuchung über die anorganischen Bestandtheile der britischen Biere unternommen, um daraus womöglich eine Norm zur Aufstellung des relativen Ernährungswertes zu gewinnen. Die Resultate der nach Fresenius und Will ausgeführten Analysen, auf trockene Substanz und nach Abzug der Kohle berechnet, sind in der Tabelle zu S. 1074 No. 143 bis No. 165, mitgetheilt. Bei dem grossen Einflusse der verschiedenen Beschaffenheit des Bodens, von welchem die Frucht, und der Verschiedenheit des Brauprocesses, von welchem die Biere abstammen, liess sich ein Ergebniss, wie das gewünschte, nicht erwarten. Immerhin ist dasselbe von grossem Interesse für die genauere Kenntniss der Nahrungsmittel, worin es eine Lücke ausfüllt, und um so schätzenswerther, als Dickson nicht einen vereinzeltten Fall, sondern gleich eine Uebersicht über eine ganze Gattung geliefert hat, was für derartige Untersuchungen nicht hoch genug angeschlagen werden kann.

Kupfer aus
Essig zu ent-
fernen.

In Essigfabriken gewährt ein kupferner Kessel zur Anwärmen des Ansatzes viele Bequemlichkeit, aber auch den Nachtheil, den Essig kupferhaltig zu machen. Roder (2) macht den sehr zweckmässigen Vorschlag, den Essig etwa 14 Tage lang mit 2 bis 3 pC. frischgeglühter Holzkohle zu digeriren. Der Kupfergehalt ist nach dieser Zeit vollkommen absorbiert.

Brenn-
stoffe und
Beleuch-
tungs-
stoffe.
Brennstoffe.

W. Baer (3) hat die erste Reihe einer Untersuchung verschiedener Brennmaterialien bekannt gemacht. Sie umfasst Holz-, Torf-, Braunkohlen- und Steinkohlenarten. Wir geben die Resultate in der beiliegenden Tabelle. In Be-

(1) Phil. Mag. [3] XXXIII, 341; Dingl. pol. J. CX, 371; Pharm. Centr. 1849, 179; Froriep's Notizen 1849, Nr. 179. — (2) Aus Bolley schweiz. Gewerbebl. in Dingl. pol. J. CV, 79. — (3) Arch. Pharm. [1] LVI, 159.

Zinstoffe.

(A)

Art der Brennstoffe.	100 Th. Brenn- stoff im natür- lichen Zustande verlieren Wasser bei 110° C.	Specifisch. Gewicht.	
Birkenholz	13,14	—	Baer.
Rothbuche, erste Sorte	14,4 bis 13,6	—	
„ zweite Sorte	13,7	—	
Weißbuche	12,8	—	
Eiche	8,0	—	
Else	13,7	—	
Kiene, junge Stämme	12,1	—	
„ alte, geößte Stämme	11,9	—	
Torf	15,7	—	
„	21,7	—	
„	18,4	—	Vaux.
„	16,4	—	
„	18,9	—	
Braunkohle	21,2	—	
„	11,0	—	
Steinkohle	1,2 bis 0,85	—	
„	0,99	—	
Coak der vorigen	—	—	
Steinkohle	1,355	1,276	
„	0,906	1,276	
„	3,232	1,279	La Cava.
„	11,29	1,2765	
„	8,89	1,276	
„	5,624	1,578	
„	2,00	1,3925	
„	34,66	1,129	
Sorte Torf	25,56	0,8495	
Steinkohle	—	—	
„	—	—	
„	—	1,356	Nendvich.
„	—	1,313	
„	—	1,350	
„	—	1,378	
„	—	1,291	
„	—	1,339	
„	—	1,317	
„	—	1,282	
„	—	1,287	
„	—	1,423	
Braunkohle	—	1,494	
„	—	1,359	
„	—	1,403	
„	—	1,347	
„	16,68	1,285	
„	17,00	1,300	
„	17,82	1,289	
„	17,10	1,334	

edener Brennstoffe.

hörig.)

(B)

Der trockner Brennstoffe				100 Th. Brenn- stoff im natür- lichen Zustande verlieren Wasser bei 110° C.	Spec. Ge- wicht.	
		hinterlassen :				
fel.	Sauerstoff.	Asche.	Coak.			
5	7,19	3,24	85,5	1,06	1,300	
9	2,58	1,52	92,9	2,44	1,375	
9	3,39	2,64	79,8	0,74	1,289	
3	7,04	—	—	1,27	1,344	
3	1,03	3,96	88,1	—	1,304	
9	2,44	6,54	83,7	—	1,312	
Stein	3,24	3,36	82,5	0,78	1,310	
	4,55	6,09	85,0	0,70	1,358	
7	0,60	3,26	84,3	—	1,326	
1	3,52	3,24	74,8	0,67	1,310	
5	5,04	10,96	62,5	—	1,340	
2	3,58	6,00	68,8	—	1,255	
1	5,58	5,60	65,6	—	1,280	
7	9,41	—	83,9	—	1,320	
9	4,38	5,52	64,8	—	1,320	
9	1,50	6,94	71,7	—	1,320	
2	0,39	1,50	77,5	—	1,275	
1	3,60	14,72	63,1	—	1,390	
2	8,29	8,92	56,0	—	1,290	De la Beche Playfair
3	15,51	4,37	49,8	—	1,277	
3	14,37	3,10	53,5	—	1,316	
" 8	5,05	10,70	58,4	—	1,200	
3	8,33	4,00	52,0	—	1,250	
2	8,58	3,52	56,6	—	1,290	
5	4,37	3,07	59,2	—	1,250	
" 7	6,48	10,00	57,8	—	1,283	
" 3	10,80	—	90,1	—	1,590	
9	10,95	3,96	—	—	1,240	
Stein	20,75	7,74	—	—	1,280	
and	24,22	14,32	—	—	1,370	
7	19,19	3,23	—	—	1,210	
5	6,63	4,84	65,8	—	1,100	
Kün	0,42	4,96	71,7	—	1,140	
B ₂	2,91	—	85,1	—	1,150	

treff der Holzarten (No. 1 bis 8 incl.) ist zu tadeln, daß der Verfasser, wie einige seiner Vorgänger, unterlassen hat, die untersuchten Spezien botanisch festzustellen, so daß man nicht weiß, ob sein »Eichenholz« *Quercus robur* oder *penduncul.* ist, oder was man unter »Kienholz« zu denken hat.

Die Torfarten sind :

9) Aus dem alten königlichen Torfstich bei Buchfeldt und Neulangen, erste Sorte. 10) Von da, zweite Sorte. 11) Aus dem königlichen Torfstich bei Flatow, erste Sorte. 12) Aus dem neuen Stich bei Linum, zweite Sorte. 13) Von da, dritte Sorte. — Auch hier vermißt man nähere Angaben über Beschaffenheit und Alter der Torfe.

Die Braunkohlen sind : 14) Böhmisches von Schönfeld bei Aussig; 15) Plauensche, geformte.

Die Steinkohlen : No. 17) Humricks Coal von Stockton nebst deren Coak; No. 18) und No. 16) Hawthorn Hartly Coal von Newcastle, beide stark backend.

Die qualitative Prüfung der Aschen dieser fossilen Brennstoffe ist in einiger Beziehung interessant. Bei den beiden Steinkohlen besteht dieselbe aus Kalk (spärlich bis Spuren; Magnesia nur in der ersten Sorte), Eisenoxyd, Thonerde, Schwefelsäure und Kieselerde in sehr wechselnder Menge. In den Braunkohlenaschen bleiben sich diese Verhältnisse gleich, doch treten in der ersten Sorte Chlor und Kali, in der zweiten Sorte noch Natron hinzu. — In der Asche der fünf Torfsorten sind auch diese Bestandtheile noch durch Kohlensäure und Phosphorsäure (letztere in 2 und 5 fehlend) vermehrt. Durch einen direkten Versuch ist dargethan, daß nur Natron, kein Kali vorhanden ist.

Die Wasserbestimmung bezieht sich auf »lufttrockne« Substanz. Die Analyse geschah durch Verbrennung, womit? ist nicht angegeben. Die Hölzer wurden durch Sägen in die Quere in Späne verwandelt. Schwefel und Stickstoff der Kohlen ist nicht berücksichtigt.

Brennstoffe.

Chevandier's Resultate hinsichtlich der Zusammensetzung verschiedener Holzarten vergl. S. 1098.

Eine neue und sehr sorgfältige Untersuchung der britischen Kohlen verdanken wir Fred. Vaux (1). Er bestimmte den Schwefel mittelst Salpeter, kohlen. Kali und Kochsalz, den Stickstoff nach Will und Varrentrapp's Methode, die übrigen Elemente durch Verbrennung wie gewöhnlich. Es sind von ihm folgende Sorten untersucht worden. No. 19) (der Tabelle): Newcastle caking Coal, schwarzblau; harziger Glanz; Bruch kubisch; spröde, schwach beschmutzend, hie und da mit dünnen Schichten Schwefelkies stark blähend und backend; Coak: halbmattglänzend; Bruch grobkörnig. — No. 20): Wigan Cannel Coal; dunkelgrauschwarz; Harzglanz; Muschelbruch, am wenigsten spröde; schwächer backend, halbmattglänzender Coal. No. 21): Von St. Helens, Lancashire; Rusty-Park-Flöz Schwarz; Bruch kubisch; Harzglanz ohne sichtbaren Kies. Erweicht nur schwach, backt nicht zusammen; Coak harporös, halbmattglänzend. — No. 22): Von Staffordshire, Probe vom Ten-yard-Flöz bei Wolverhampton. Braun schwarz, stark harzglänzend; Bruch blättrig mit Neigung zum muschlichen in der Quere, zerbrechlich, leicht, nicht beschmutzend und ohne Schwefelkieschichten; sehr aufblähen blumenkohlartig; Coak sehr glänzend, feinkörnig. — No. 23): Von dem untern Theil desselben Flözes. Schieferige Textur; Bruch und Verhalten wie die vorige, aber weniger backend und blähend; Coak glänzender und grobkörniger. — No. 24): Aus dem Oregon-Gebiet. Braunschwarz, hart, schiefrig; Blätterbruch; nicht beschmutzend, gar nicht blähen noch backend; Coak dicht, kaum von der Kohle verschieden. Sie ist die Decke eines Flözes gewöhnlicher Art. — No. 25): Anthrazit von Wales. Dunkel eisenschwarz, lebhafter Metallglanz; nicht abschmutzend; schwer zu zerschlagen, aber zerreiblich; Bruch schiefrig, Querbruch

(1) Chem. Soc. Qu. J. I, 318.

unvollkommen muschlich; nicht backend, behält ihren Glanz. Brennstoffe.

No. 26) : Lignit von Bovey-Heathfield, Chudleigh bei Exeter, Devonshire. Erdbraun; fasrig blättrig; an der Sonne oder im Wasser knisternd, in letzterem gänzlich zerfallend, nicht abschmutzend. Etwas wenig backend. — No. 27) : Eine Sorte Torf.

Die Steinkohlen von Toscana hat La Cava (1) analysirt und zwar: No. 28) von Monte Massi; magere Kohle; ohne Glanz; mit klarer Flamme brennend; spec. Gewicht 1,36 bis 1,39. Giebt 42,43 bis 43,46 pC. flüchtige Theile und 57,57 bis 56,54 Coak. — No. 29) : vom Monte Bomboli; fette Kohle; mit schwacher Flamme brennend, erweichend, aufblähend; spec. Gewicht 1,38 bis 1,40. Giebt 39,2 bis 38,7 pC. flüchtige Theile und 60,7 bis 61,26 Coak.

Die fossilen Kohlen Ungarns sind in einer umfassenden Arbeit von C. M. Nendtvich (2) aus Pesth studirt worden, und zwar in folgenden Arten, welche größtentheils den Braunkohlen, an zwei Stellen jedoch den Steinkohlen angehören:

A. Steinkohlen des Baranyer Komitates, ältere Steinkohle; Flötze wechselnd mit Kohlenschiefer und Kohlen-sandstein; bis zu 5 und 8 Schuh mächtig. Kohlschwarz, mit starkem Fettglanz, fettig anzufühlen. Bruch uneben, ins schiefrige. Zerreiblich, an der Luft zerfallend. Sehr fett, stark backend. Sehr schwefelkieshaltig. Giebt 77 bis 84 pC. Coak. Von diesen ist No. 30) aus der Grube des Ign. Rosman, No. 31) aus der des Joseph Andrassevich, beide bei Fünfkirchen; No. 33) von der Barbaragrube bei Szabolcs; No. 32) von der Franciscigrube, ebenfalls bei Szabolcs; No. 34) von der Michaeligrube bei Vassas; No. 35) Sphärische Kohle von der königlichen Universitäts-herrschaft zu Vassas; kugelig schalige, eigenthümliche Absonderung, in Nestern in der vörhergehenden; luftbeständig.

(1) J. pharm. [3] XII, 803. — (2) J. pr. Chem. XLI, 8; XLII, 865; Jahrb. pr. Pharm. XVI, 78.

Brennstoffe.

B. Steinkohlen des Krassoër Komitates (Banat); die besten Ungarns. Kohlschwarz, Bruch uneben, grobkörnig, oft schiefrig, matter Fettglanz, mit Schichten von Faserkohl. An Luft und Wetter nicht zerfallend, sehr wenig schwefelkieshaltig. Ausgezeichnete Sinterkohle. Ihr natürlicher Wassergehalt ist 2,70 bis 3,70 pC. Von diesen ist No. 36) aus der Grube von Purkari; No. 37) aus der Grube von Gelistye; No. 38) aus der Markusgrube; No. 39) aus der Simon- und St. Antongrube.

C. Kohlen des Graner und Comorner Komitates; zu älteren Braunkohlenformation gehörig; bis zu mehreren Klaftern Mächtigkeit. Schwarz, matter Glanz, Bruch schiefrig, oft muschelartig; Absonderung rhomboëdrisch, schwer zerreiblich, Pulver von brauner Farbe. Spec. Gewicht zwischen 1,34 bis 1,49. An der Luft zerfallend, schwefelkiesreich. Von diesen sind No. 40) von Tokodt, No. 41) von Csolnok, No. 42) von Sárissáp, diese im Graner, und No. 43) von Zsemle im Comorner Komitat.

D. Braunkohlen vom Brennberger Kohlenwerk, 1½ Meilen von Oedenburg. Das Flötz bildet 2 Mulden, welche von einem mittelst eines grauen Sandsteines auf Glimmerschiefer aufliegen. Deutliche Holztextur; aufser von Buchenblättern keine Abdrücke.

a. Aus dem Rudolphilager. No. 44) erste Varietät: schwarz; Strich braun; Glanz matt; Gefüge ausgezeichnet feinfaserig; Bruch in die Länge schiefrig, in die Quere uneben, flachmuschelig. An den Absonderungsflächen Spuren von Schwefelkies. Luftbeständig. Spec. Gewicht = 1,285.— No. 45) zweite Varietät. Farbe dunkler; Strich wie No. 40); Glanz seidenartig; Gefüge feinfaserig, wie Ebenholz. Bruch wie No. 44) mit Spuren von Schwefelkies und Gyps. Spec. Gewicht = 1,300.

b. Des Josephilagers. No. 46) dritte Varietät; wie No. 44), nur im Querbruch fast rechtwinkliche Absonderungsflächen; daher grofse Neigung zum kubischen Bruch. Dieselben Mineraleinmengen. Spec. Gewicht

1,289. — No. 47) vierte Varietät; fast untergegangene Holzstructur; mit glasglänzenden Längsstreifen; im Uebrigen wie No. 46). Spec. Gewicht 1,334.

Die Verbrennung der Kohlen geschah mit Kupferoxyd in einem Apparat, ähnlich dem Dumas'schen zur Bestimmung des Aequivalents von Kohlenstoff. Der Stickstoff ist gar nicht, der Schwefel dagegen in den letzten 4 Analysen auf die bekannte Art mit Salpeter und kohlen. Kali bestimmt, dabei jedoch unterlassen worden, den Schwefel der in der Kohle enthaltenen schwefels. Salze abzu ziehen; hierdurch sind die angegebenen Schwefelgehalte unrichtig.

Die in der herkömmlichen Weise angestellten Analysen von Brennmaterialien sind zwar ein trefflicher Anhaltspunkt um den theoretischen Nutzaffect zu bestimmen, aber sie sind durchaus zur Feststellung des praktischen Werthes, einem bestimmten praktischen Zwecke gegenüber, unzureichend, indem sie gewisse, an sich unwesentliche Eigenschaften oder Momente unberücksichtigt lassen, die nichts desto weniger bei der Anwendung vom größten Einfluß sind. In diesem Sinne hat eine Anzahl britischer Chemiker und Ingenieure, unter Leitung von De la Beche und Playfair, eine sehr schätzenswerthe Untersuchung (1) über den Werth vieler britischer, einiger überseeischer Steinkohlen und mehrerer künstlicher Brennstoffe für die Dampfschiffahrt angestellt. Dieser Werth ist zusammengesetzt aus der Verdampfungskraft (d. h. aus der Menge Dampf, welche ein bestimmtes Gewicht Brennstoff in einer gegebenen Zeit zu liefern vermag), aus dem Raum, welchen dieses Gewicht beim Transport im Schiffsraum einnimmt, und endlich aus der Abnutzung beim Transport (Cohäsion).

Praktischer
Werth
verschiedener
Kohlen.

Die Verdampfungskraft der Brennstoffe wurde in größerem Mafsstab unter einem Dampfkessel ermittelt, welcher so eingerichtet war, daß man (nach den erforderlichen Correctionen) diejenige Quantität, welche zur Erhitzung des

(1) Mech. Mag. 1848, Nr. 1285—88; Dingl. pol. J. CX, 212. 268.

Praktischer
Werth
verschiedener
Kohlen.

Wassers auf 100° aufgegangen war, in Abzug bringe und folglich die Quantität Wasser von 100^q bestimmen konnte, welche in Dampf verwandelt worden. Unter diese Correctionen fand die unvollkommene Verbrennung der Brennstoffe gehörige Berücksichtigung, indem man der Asche beigemengten Coaktheile in Rechnung brachte; dagegen ergab die Analyse der im Kamin abziehenden Gase nur Kohlensäure, schweflige Säure, Sauerstoff und Stickstoff, also keine in Abrechnung zu ziehenden unverbrannten Theile (was sehr gegen die Erfahrung ist). Zum Vergleich wurde der theoretische Nutzeffekt durch die Elementaranalyse (von Wrightson, siehe die Tabelle) und durch Glühen mit einem Ueberschuss von Bleiglätte nach Berthier's Methode, bestimmt.

Der Raum, den ein Brennstoff beim Aufstauen einnimmt, kann natürlich nicht durch das spec. Gewicht bestimmt, sondern muß — wegen der Zwischenräume — direct gemessen werden. Dieser für die Dampfschiffahrt ungemein belangreiche Factor ist um so kleiner, je mehr die Absonderung der Steinkohle, oder die Form des Brennstoffes, kubisch ist. Für den Abgang beim Transport, d. h. für die durch die Schiffsbewegung verursachte Reibung der einzelnen Kohlenstücke an einander, und die Verwandelung von ganzen Kohlen in unbrauchbares Pulver, suchte man einen wenigstens relativen Maßstab zu gewinnen, indem man die Proben gleich lang in einer Trommel rotiren ließ und den gebildeten Staub absonderte und wog. Indeß wir wegen der Einzelheiten der Versuche, Correctionen und Berechnungen, sowie wegen der ausführlicheren Schlussfolgerungen auf die Abhandlung verweisen, geben wir die praktisch wichtigen Grundresultate in tabellarischer Uebersicht. I. »Oekonomische (praktische) Verdampfungskraft d. h. Anzahl der durch 1 Pfd. Brennstoff verdampften Pfunde Wasser von 100°. II. Dieselbe, nach Abzug der Coaktheile in der Asche. III. Theoretische Verdampfungskraft, d. h. Anzahl der Pfunde Wasser von 100°, welche

von 1 Pfd. Brennstoff verdampft werden, berechnet aus den Versuchen mit Bleiglätte. IV. Gewicht der Brennstoffe per C. F. Stauraum. V. Gewicht derselben per derben C. F., aus dem spec. Gewicht berechnet; beides in Pfunden. VI. Abgang durch Reibung nach Procenten. VII. Verdampfungskraft nach dem Stauraum, d. h. Anzahl der Pfunde Wasser von 100°, verdampft durch 1 C. F. (Stauraum) Brennstoff; berechnet aus IV. und II. Alle Masse und Gewichte sind englische, nämlich 1 Pfd. = 453,6 Gramm; 1 C. F. = 0,0283153 C. Meter. — Die Ordnungsnummern correspondiren denen der S. 1113 angehängten Tabelle.

Ursprung d. Brennstoffe und Arten	Ordnungsnummer	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
Steinkohlen	48	9,35	9,66	16,72	60,17	81,11	49,3	581,20
	49	9,46	9,70	13,84	58,25	85,79	68,5	565,02
	50	8,94	—	16,38	50,92	80,42	57,7	455,18
	51	9,40	10,60	16,40	57,43	83,85	46,5	608,78
	52	9,94	10,30	16,49	57,08	81,36	51,2	587,92
	53	8,86	9,20	17,02	56,93	81,85	53,5	528,75
	54	8,72	8,98	16,24	57,72	81,73	46,5	518,32
	55	6,36	7,40	15,91	66,17	84,73	52,7	489,62
	56	10,14	11,80	15,64	53,22	82,72	56,2	540,12
	57	9,52	10,59	15,81	56,33	81,73	53,7	536,26
	58	8,84	—	13,89	56,39	83,60	52,7	498,46
	59	8,70	9,35	14,75	55,28	78,30	72,5	480,90
	60	8,42	8,82	15,45	56,00	79,86	55,7	471,52
	61	9,53	10,44	16,76	58,66	82,35	35,0	459,02
	62	7,47	8,04	14,31	55,70	82,35	57,5	416,07
	63	9,79	9,99	14,70	50,50	82,60	54,0	494,39
	64	10,21	10,64	16,68	53,30	78,81	45,0	455,19
	65	7,53	7,75	12,92	53,30	86,72	62,0	401,34
	66	8,00	8,34	13,63	53,00	80,48	62,0	424,00
" von Schottland	67	7,08	7,10	13,77	49,80	79,67	85,7	352,58
	68	7,71	7,86	12,80	51,66	78,61	88,2	398,29
	69	8,46	8,67	15,15	54,60	78,61	64,0	460,82
	70	7,56	7,69	15,12	55,00	78,61	63,0	415,80
" von England	71	7,40	7,91	14,85	54,25	80,48	69,7	401,45
	72	7,30	7,66	13,20	52,50	77,99	65,7	383,25
" von Irland	73	8,52	8,98	—	54,44	80,05	55,0	463,86
	74	9,85	10,49	16,21	62,80	99,57	74,0	618,58
Künstliche Brennstoffe. . .	79	8,92	9,74	15,02	65,08	88,68	—	580,51
	80	8,53	8,65	14,87	65,30	71,12	—	557,00
	81	10,86	10,60	16,42	69,05	72,25	—	715,35

Tauglichkeit
englischer
Kohlen zur
Gasberei-
tung.

Fyfe (1) hat die englischen Steinkohlensorten in Beziehung auf ihre Tauglichkeit zur Gasbereitung untersucht und Nachstehendes gefunden:

	Specifisch. Gewicht	Durch Chlor verdichtbare Procente	1 Kubik- fuß Gas verbrennt in	1 Tonne Kohle liefert Kubikfuß
	des Gases			
Englische Backkohlen . .	0,464	—	—	—
„ „ v. Newcastle	—	3,5 bis 5,5	47'20" bis 50'25"	8000
Yorkshire-Parrotkohle . .	—	7,66	52'30"	11500
Wigan, Cannelkohle . .	0,460 bis 570	7,55	57'	9500 bis 11500
Parrotcannelkohle, schot- tische	—	9 bis 20, im Mittel 15	56" bis 94"	9500

Richardson (2) hat die Asche einer Steinkohle, welche in Kelso in Schottland benutzt und wahrscheinlich bei Berwick gewonnen wird, mit folgendem merkwürdigen Resultate analysirt: Titansäure 7,01, Kieselerde 1,84, Schwefelsäure 21,20, Chlor 9,57, Cadmiumoxyd 1,42, Eisenoxyd 26,99, Nickeloxyd 1,38, Zinkoxyd 2,03, Magnesia 1,6, Kali 18,34, Natron 6,87 in 100 Th. — Wenn man die übrigen Säuren an die Basen vertheilt, so bleiben Titansäure, Kieselerde und Eisenoxyd fast genau im Verhältniß des Mosander'schen Titan - Eisenerzes von Arendal in Norwegen.

Verkohlung
des Holzes
mit Dampf.

Violette (3) hat in der Pulverfabrik zu Esquerd bei St. Omer Versuche in großem Maßstabe über die Verkohlung des Holzes in heißem Wasserdampf angestellt. Die zu Grund liegende Idee gehört übrigens nicht ihm, sondern Thomas und Laurens an, die sie bereits früh zur Ausführung brachten. Der Verfasser studirte die Anwendbarkeit des Verfahrens auf das zur Pulverfabrikation dienende Produkt, welches bekanntlich unvollkommen verkohlte Holzkohle ist, in einem eigens construirten Apparat.

(1) Edinburgh new phil. Journ. 1848, Nr. 2 u. 3; Dingl. pol. CXI, 31. — (2) Privatmittheilung. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXI 475; im Ausz. Compt. rend. XXVI, 683; Dingl. pol. J. CLX, 137.

worin der erzeugte Dampf in einer Spirale auf einige hundert Grade geheizt und in die Kohlungetorten geleitet wird. Es ergaben sich folgende Resultate :

	Dauer d. einzelnen Versuche	Verbrauch unter dem Dampfess. Steinkohle	Verbrauch u. Heizung d. Dampfes. Holz	Quantum des Kohlenholzes	Ertrag an Rothkohlen	
					absoluter	in Procenten
Mittel der ersten Versuchsreihe . . .	2h 11m	29k, 7	21k, 3	25k, 0	8k, 63	34,01
zweiten verbess. Versuchsreihe	2h 20m	21k, 0	14k, 8	28k, 1	10k, 27	36,50
Mittel aus 4 Jahr- gängen { altes Verfahren in den Cylindern	—	—	—	—	—	14,08 bis 17,81 Schwarzkohle

Es ist mithin an Zeit, an Quantität und zumeist an Qualität gewonnen; letzteres um so mehr, als der Dampf allen Theer mit fortnimmt, und so die Bildung von jener dichten, dem Schiefspulver so nachtheiligen Theerkohle verhindert. Es kostet die Erzeugung von 100 Kilogr. Kohle nach dem alten Verfahren 15 Fr., nach dem neuen hingegen bei Heizung der Spirale mit Holz 12 Fr., mit Koak 8,9 Fr.

Nach einer wohlfeileren von Milly (1) vorgeschlagenen Methode, Stearin zu fabriciren, soll man den Talg $\frac{1}{4}$ Stunde lang mit verdünnter Schwefelsäure sieden lassen und dann 15 pC. Terpenthinöl hinzugießen. Die in blechnen Kasten erkaltete Mischung wird dann wie gewöhnlich geprefst.

Stearin-
fabrikation.

Durch das so sehr allgemein gewordene Verspinnen und Verweben von mit Baumwolle gemischtem Leinen ist ein betrügerischer Handel eingerissen und ein sicheres Mittel dringendes Bedürfnis geworden, Baumwolle von Leinen rasch und leicht zu unterscheiden.

Anwendung
von Pflanzen-
faser; Färberei.

Unterscheidung
verschiedener
Holzfaser.

(1) Dingl. pol. J. CX, 437. — Ueber einen verbesserten Apparat, das in der üblichen Methode der Stearinfabrikation erhaltene Gemisch fester Säuren zu pressen, vergleiche : Bull. soc. d'enc. 1848, 88; Dingl. pol. J. CX, 112.

Unterschei-
dung ver-
schiedener
Holzfasern.

Der Verein zur Beförderung der Gewerbe in Preu hat das Verfahren von F. S. C. Lehnerdt (1) gek Die mit Seifenwasser etc. vollkommen von Appretur befr trockne Probe taucht man zur Hälfte in Schwefelsäure 66° B. = 1,834 spec. Gewicht und zwar 1 bis 1½ Minute l alsdann wirft man sie in Wasser, woselbst sie einige Au blicke ruhig bleibt, um dann ausgewaschen und getroc zu werden. Die Säure corrodirt die Baumwolle um vieles rascher als das Leinen; es werden daher gemis Fäden verdünnt, rein baumwollene Fäden ganz entf Da reines Leinen indessen ebenfalls verdünnt wird, s die Probe im ersten Fall etwas misflich, aber im and Fall sicher. Gefärbte Muster werden am besten zuerst färbt oder gebleicht.

Dasselbe Verfahren hat übrigens schon früher Kind in Bremen beschrieben.

In ähnlicher Weise hat M. Vincent (3) ein Ur scheidungskennzeichen für die Faser von *Phormium t* aufgesucht. Er fand ein solches zuerst in Salpeters von 36° B., welche jene Faser in der Kälte roth fi nicht so die von reinem Hanf. Später glaubte er Cl wasser vorziehen zu müssen. Die Faser von *Phorri tenax*, 2 bis 3 Secunden darin eingetaucht und nach gießen des Chlorwassers mit Ammoniak übergossen (nicht umgekehrt), färbt sich damit violett; die Fasern Hanf (besonders von gut geröstetem), von *Agave ameri* und *foetida* (Martinique), *Bromelia*, *Hibiscus cannabinus*, *getto* (Domingo), *Crotalaria juncea* (Indien), *Abaca* (Mar und *Corchorus capsularis* werden ebenfalls, aber viel schwäc violett; die Faser von *Asclepias gigantea* und Flachs ble ungefärbt. — Wir lassen dahingestellt, ob diese P

(1) Verh. Gew. Bef. Pr. 1847, 19. 1848, 24. — (2) Ann Pharm. LXI, 258; Phil. Mag. [3] XXXI, 157; J. pharm. [3] XI, Dingl. pol. J. CII, 334; ferner in Zusammenstellung mit den frü Proben Dingl. pol. J. CV, 189. — (3) Compt. rend. XXVI, Pharm. Centr. 1848, 500.

wirklich bestimmt genug ist und nicht, bei weniger sorgfältiger Vorbereitung der Fasern, auf Täuschung führt.

Als sogenanntes »Antichlor« d. h. als Mittel um der Antichlor. schädlichen Nachwirkung des Chlors (unterchlorigs. Salze) auf die damit gebleichten Papiermassen oder Zeuge zu begegnen, hat man sich bisher vorzugsweise des schweflign. Natrons bedient, welches mit dem anhängenden, durch Waschen nicht zu entfernenden Bleichsalze schwefels. Natron und Chlormetall bildet. So zweckentsprechend dieses Mittel ist, so glaubten doch Bobierre und Moride (1), wegen seiner großen Zersetzbarkeit und schwierigen Aufbewahrung als Ersatzmittel Zinnsalz (Zinnchlorür) empfehlen zu müssen, um praktische Versuche damit zu veranlassen.

Ueber die Darstellung des Zinnsalzes nach Nöllner vergleiche diesen Jahresbericht, S. 437.

Schunck's (2) Untersuchungen über die wesentlichen Krappfarben. Bestandtheile des Krapps, sowie über die Hauptmomente seiner Benutzung in der Färbekunst sind bereits S. 767 dargelegt worden. Im Einzelnen folgert Schunck daraus für die Färbepaxis folgende Erklärungsweise:

Da man in der Regel die ganze Wurzel anwendet, da also die verschiedenen Bestandtheile derselben gleichzeitig in Wirksamkeit treten, so erklärt sich hieraus die Nothwendigkeit gewisser Maafsregeln und Manipulationen, wie sie die Erfahrung längst an die Hand gegeben und festgestellt hat. Hierher gehört vor allen die von jeher und allgemein anerkannte Thatsache, dafs schöne und dauernde Farben nur bei Gegenwart von Kalk im Farbebad möglich sind, mag dieser nun in der Wurzel, im Wasser oder sonstwie hinzugekommen sein. Behandelt man Krapp mit verdünnter Salz- oder Schwefelsäure, so zeigt die Probe nach dem Auswaschen — mit einer unveränderten Gegenprobe verglichen — eine entschiedene Abnahme der Färbekraft,

(1) Compt. rend. XXV, 592; Dingl. pol. J. CVI, 394; Bull. soc. d'enc. 1848, 352. — (2) In den S. 767 angef. Abhandl.; auch Dingl. pol. J. CX, 40.

Krappfärben. welche durch Kalkwasser oder Kalkmilch wieder herge- oder gar erhöht wird. Der Kalk erhöht jedoch die Färbkraft des Alizarins (im isolirten Zustande) nicht; er mindert sie im Gegentheil in dem Grade, als er sich verbindet. Sie wird aber auch durch Rubiacin und Alpha- und Betaharz des Krapps beeinträchtigt, welche und Schwarz, am meisten Purpur, schwächen und weissen Grund einen Stich in's Gelbe verleihen; dieser ähnliche Einfluß wird durch den Kalk so gut wie ganz gehoben. Dasselbe geschieht bei dem noch weit nachtheiligeren Einfluß der Pektinsäure, welche die Färbkraft des Alizarins fast vollständig lähmt, während sich der pektins. Kalk indifferent verhält. Nach einem Versuch von Schunckel verhält die Basen der Beize (Thonerde, Eisenoxyd) weit mehr Ziehung zur Pektinsäure, als zum Alizarin, und nicht jene statt des Alizarins aus dem Färbebad auf, wenn nicht durch die Dazwischenkunft des Kalks verhindert. Gerade so verhalten sich Rubiacin und die Harze. — Kalk ist daher als ein Präservativ nothwendig, welche schädlichen Bestandtheile des Krapps bindet, dadurch den Proceß eliminirt, und der Färbkraft des Alizarins freie und ungestörte Wirksamkeit eröffnet. Man sieht gleich daraus, daß dem vortheilhaften Einfluß des Kalks eine ganz bestimmte Grenze gesteckt ist, über welche hinaus er direct schädlich wird, indem er alsdann dem Färbproceß Alizarin entzieht.

Etwas anders als mit den genannten Nebenbestandtheilen des Krapps verhält es sich mit dem Xanthin. Gebeiztes Zeug nimmt aus der kochenden Lösung desselben zunächst keine, aber sogleich eine braune Farbe an, in welcher sich das Xanthin an der Luft oxydirt und dunkelfarbig wird. Nicht gebeiztes Zeug erhält einen braunen Grund. Während des Krappfärbens wird nun das Xanthin in Zweifel mehr oder weniger oxydirt, tritt dadurch in die Kategorie des Rubiacins und der Harze, und setzt die stehende braune Substanz an alle Theile des Zeugs an.

Wie natürlich kann der Kalk durch andere Basen in Krappfärben. dem Farbebad vertreten werden. In der Ausübung gelingt es nun begreiflicher Weise nicht, mittelst des Kalks die Nebenbestandtheile des Krapps scharf und bis auf die letzte Spur von dem Zeug abzuhalten; die Farbentöne fallen im Gegentheile durch die Dazwischenkunft derselben immer mehr oder weniger trüb oder unrein aus, so daß das Zeug nach geschieder Färbung noch nachträglich mit einer alkalischen Lösung behandelt werden muß. Diese ist die siedende Seifenbrühe beim Aviviren, und dieser Proceß gleichsam eine Fortsetzung der Wirkung des Kalks, wobei die Pektinsäure, die Harze, das Rubiacin und Xanthin durch Lösung in dem Alkali beseitigt werden, indem sich die fette Säure mit dem Alizarin (sowie der Thonerde und dem Eisenoxyd der Beize) verbindet.

Es ist Schunck gelungen, in dem gefärbten Zeug das Alizarin mit Bestimmtheit, die anderen Substanzen aus dem Krapp mit Wahrscheinlichkeit nachzuweisen; ebenso in avivirtem Zeug Alizarin und fette Säuren.

Nicht minder wichtige Aufschlüsse geben die Beobachtungen Schunck's über das sogenannte Garancin. Unter diesem technischen Ausdruck versteht man bekanntlich ein Präparat aus Krapp (durch Behandeln mit heißer Schwefelsäure und Auswaschen), welches entschiedene practische Vorzüge, theils durch schönere Färbung, theils dadurch gewährt, daß die weißen Parthien beim Färben damit weder einen Stich ins Braune noch ins Gelbe annehmen. Die Behandlung mit Säure hat nach Schunck eine doppelte Wirkung. Ein Theil des Alizarins ist in der Krappwurzel mit Kalk und Magnesia verbunden und so zum Färben unfähig; diesen setzt die Säure in Freiheit und macht ihn nutzbar. Ferner wird das schädliche Xanthin (so weit die Säure dieses nicht zersetzt) bei dem Auswaschen entfernt, da es von Säuren nicht niedergeschlagen wird. Was man früher von Zerstörung der schädlichen Bestandtheile des Krapps und seiner Holzfaser angegeben hat, ist nach Schunck

Krapp-färben. ungegründet oder doch nur für einen Theil des Xanthins wahr, welcher durch heisse Säure in eine dunkle Substanz verwandelt wird, die dem Garancin die dunkle Farbe ertheilt.

Schunck schliesst seine Arbeit mit dem Vorschlag an den Produktionsorten des Krapps diesen mit siedendem Wasser auszuziehen und mit Säuren zu fällen. Der Nischlag, der allen Farbestoff enthält, würde mit Erspargnis grosser Transportkosten statt des Krapps in den Handel bringen sein.—In einer wahrscheinlich etwas später erschienenen Veröffentlichung dieser Arbeit hat der Verfasser vorstehende Theorie wesentlich modificirt, vergl. Seite

J. Higgin (1) hat durch seine Untersuchung den Krapp die praktischen Ergebnisse Schunck's nach andern Seiten vervollständigt. Er bestätigt die 3 Farben des letzteren: Alizarin, Rubiacin und Xanthin, weist eine nahe Beziehung zwischen denselben nach. — Ihm findet ein wesentlicher Unterschied zwischen der Wirkung des heissen und des kalten Wassers auf Krapp. In dem kalten Auszug verschwindet nach 1 bis 2 Stunden das Xanthin gänzlich, das Rubiacin fast gänzlich. Ein Auszug, der von Alizarin völlig befreit war und das Zeug mehr roth färbte, enthielt nach dieser Zeit wieder Alizarin und färbte roth, indem das Xanthin verschwand. Higgin schliesst daraus, dass sich Xanthin in Alizarin umsetzt, und erkennt aus andern Beobachtungen Rubiacin für die Zwischenstufe. Diese merkwürdige Umsetzung beruht nicht auf Oxydation, sondern auf Gährung, wahrscheinlich durch einen kleberartigen Bestandtheil des Krapps. Sie entwickelt sich am besten bei 49 bis 54° und währt alsdann nicht länger als $\frac{1}{2}$ Stunde. Guter Krapp enthält mehr Ferment, als sein eigener Bedarf. Auszüge mit kochendem Wasser coloriren sich ohne Umsetzung des Xanthins. — Zur Be-

(1) In der S. 778 angef. Abhandl.

gung angestellte Färbeversuche zeigten: 1) daß das Fär- Krappfärben.
 bevermögen des Krapps im Verhältniß des absichtlich zu-
 gesetzten Xanthins nach dessen Gährung gesteigert erscheint;
 2) daß Krapp oder Garancin mit heißem Wasser ange-
 macht ungleich schlechter färbt, als mit kaltem; 3) daß
 Krapp von Xanthin befreit viel schwächere Farbe giebt, als
 wenn man ihn mit dem Xanthin gähren läßt.

In der Praxis beginnt man mit niederer Temperatur
 und läßt sie allmähig steigen, so daß sie nach einer Stunde
 130° beträgt. Dies ist nach Higgin die Periode der Gäh-
 rung. Man färbt erst mit dem vorhandenen, nachher mit
 dem hierbei sich bildenden Alizarin. Nach dem Färben ist
 Rubiacin u. a. übrig, welche die Töne trüben. Higgin
 erklärt daraus endlich, warum man in der Praxis mit Vor-
 theil geringe (xanthinhaltige) Krappsorten und gute mischt,
 und warum im Fals gegohrene dadurch verbessert werden,
 wie besonders die holländischen.

Wegen Färberei vergl. auch das S. 745 ff. angeführte.

Bossy (1) hat ein Patent darauf genommen, Papier mit- Wasserdich-
tes Papier.
 telst einer Thonerdeseife wasserdicht zu machen. Er im-
 prägnirt die Faser des Zeugs zu dem Ende nacheinander,
 erst mit Aetzkalk und Natronlauge, dann mit einem Bad
 aus Cocosseife und gemahlenem Wegerich- (plantain) Samen
 und zuletzt mit einer Lösung von schwefelsaurer Thonerde.

Williams (2) hat einen originellen Weg zur Verfertigung Haarfirnis.
 von sogenanntem „künstlichem Haar“ zu Geweben, zu
 Polstern etc. angegeben. Man soll die gewöhnlichen Faser-
 stoffe (Baumwolle, Flachs, Seide, Wolle) in dem von ihm
 erfundenen Haarfirnis tränken und bei mäßiger Wärme
 trocknen. Der Haarfirnis wird bereitet durch Auflösen
 von 10 bis 40 Th. Abfällen von Schweinsborsten oder Rofs-
 haar in 100 Th. trocknendem Oel oder (Lein-) Oelfirnis.

Hutin und Boutigny (3), von der Ansicht ausgehend,

(1) Lond. J. of Arts, März 1846; Bull. soc. d'enc. 1847, 597. —

(2) Monit. industr. 1848, Nr. 1247; Dingl. pol. J. CIX, 74. — (3) Compt.
 rend. XXVI, 481; J. pr. Chem. XLV, 383; Dingl. pol. J. CVIII, 873.

Conserviren
des Holzes.

dafs die Absorption von Feuchtigkeit und zerstörer Agentien bei dem Holze stets vom Hirn ausgeht, gi folgendes Verfahren an, um die an der Hirnseite des He mündenden Gefäfsse dauernd zu verstopfen. Man ta das entsprechende Ende der Eisenbahnschwellen (denn diese handelt es sich zumeist) in einen Kohlenwasser z. B. Schieferöl, und zünde diesen an. Nach dem l schen der Flammen tauche man das Ende 1 bis 2 Zoll in eine Mischung aus Pech, Theer und Gummilack, theere dann das Ganze wie gewöhnlich.

Ch. Payne (1) schlägt in den Poren des Holzes Schwefelbaryumlösung durch Eisenvitriol nieder. Die führung der Lösungen in die Poren des Holzes bewerk ligt derselbe dadurch, dafs er die Luft aus denser erst mittelst Dampf, dann mit der Luftpumpe aus-, endlich die Flüssigkeiten mittelst eines Druckes von bis 140 Pfd. per Q. Z. eintreibt. Statt des Schwefelbary werden auch Kali- und Natronschwefellebern empfohl

Gerberei.

M. A. Turnbull (2), in der richtigen Erwägung, der vom Enthaaren in den Häuten zurückgebliebene die Gerbsäure zur Veränderung disponirt und dadurch Wirkung der Lohbrühe schwächt, schlug vor, den vor dem Gerben mittelst einer starken Zucker- (Melas lösung auszuziehen; man soll an Zeit und Lohe betr lich sparen.

Schleifs-
baumwolle
und Aehn-
liches.

Geleitet von eigenthümlichen Ansichten und Versu über die Natur der Salpeter-Schwefelsäure, unter Schönbein (3) eine Anzahl organischer Stoffe der kung dieser Säure und entdeckte während dieser U suchung, welche sich vom Schlufs des Jahres 1845 l

(1) Lond. J. of Arts 1847, 185; Verh. Gew. Bef. Pr. 1847,
(2) Ann. ch. phys. [3] XXI, 74. — (3) Phil. Mag. [3] XXX
Arch. ph. nat. IV, 20.

den Anfang 1846 erstreckte, die Schiefsbaumwolle. In den beiden folgenden Jahren sind unsere Kenntnisse über diesen interessanten und vielbesprochenen Stoff sehr wesentlich erweitert worden.

Die wichtigsten Aufschlüsse gaben die Untersuchungen von Kerckhoff und Reuter (1). Die Verfasser sind zuerst näher auf die Erörterung einiger Umstände eingegangen, welche auf die Resultate der Analyse Einfluss äufsern. Dahin gehören: 1) Unreinheit der verwendeten Baumwolle; sie ist in der Regel mit fettigen Theilen behaftet, welche beim Eintauchen in die Säure eine ungleiche Benetzung und folglich ungleiche Einwirkung zur Folge haben. Durch Auskochen in einer mäßig starken Sodalauge, Auswaschen, Abspülen in verdünnter Salpetersäure und nochmaliges Auswaschen bis das Wasser nicht mehr auf Salpetersäure reagirt, läßt sich dieser Uebelstand vollkommen beseitigen. 2) Die Art, die fertige Schiefsbaumwolle zu trocknen. Nachdem die Verfasser vergebens gesucht hatten, mit einer bei mehr als 100° getrockneten Substanz constante Resultate zu erhalten, bemerkten sie, daß bei 105° lufttrockene Schiefsbaumwolle den Geruch von salpetriger Säure entwickelt, und daß, wenn zwischen 105° und 115° getrocknet wird, der Kohlenstoff mit steigender Temperatur von 24,74 pC. auf 27,22 pC., der Wasserstoff von 2,34 auf 2,80 steigt. Es ist hiernach nicht zu zweifeln, daß bei einer Temperatur, welche der Entzündungstemperatur (131°) sehr nahe ist, die Salpetersäure in der Schiefsbaumwolle und die organische Substanz zersetzend auf einander einwirken, wobei die Salpetersäure ohne Explosion reducirt wird.

Zusammen-
setzung der
Schiefs-
baumwolle.

K. und R. fanden sich daher durch diese Erfahrung auf folgende Behandlung hingewiesen. Sie tauchen die,

(1) J. pr. Chem. XL, 262. 284; Compt. rend. XXIV, 46. Vergl. ferner die Zusammenstellung der Untersuchungen über Schiefsbaumwolle in J. pr. Chem. XL, 193 und XLIII, 242; Pharm. Centr. 1847, 690; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 391.

Zusammen-
setzung der
Schiefs-
baumwolle.

nach obigem Verfahren gereinigte Baumwolle in ein Gemisch von gleichen Theilen stärkster Salpetersäure und gewöhnliche Schwefelsäure, worin sie wenigstens 3 Minuten bleibt. Das fertige Präparat wird ausgedrückt, erst mit Regen-, dann mit destillirtem Wasser bis zur gänzlichen Entfernung der Säuren ausgewaschen, zwischen Fließpapier gepresst und schließlich im trocknen luftleeren Raum bei gewöhnlicher Temperatur (jedoch nicht über 15°) gänzlich von Wasser befreit. Es gelingt dies letztere um so leichter, da die Schiefsbaumwolle sehr wenig hygroskopisch ist.

Theils wegen der leichten Zersetzbarkeit bei mehr als 100°, welche das Mischen der zu analysirenden Schiefsbaumwolle mit warmem Kupferoxyd bedenklich macht, theils aus Besorgniß vor der Heftigkeit der Zersetzung beider Körper, wagten es die Verfasser nicht, die Verbrennung auf die übliche Weise vorzunehmen. Sie zogen es vor, die Analyse mittelst eines Apparats auszuführen, welcher dem von Thénard und Gay-Lussac vor 50 Jahren gebrauchter ähnlich ist. Die Substanz wird mittelst eines Hahns portionweise in Kügelchen eingebracht; die durch die Explosion jedes Kügelchens entstandenen Gase streichen über glühendes Kupferoxyd und metallisches Kupfer, und werden zum Behuf des Wägens als Kohlensäure und Wasser in Absorptionsapparaten aufgefangen. Die Stickstoffbestimmungen geschahen, mit einigen Modificationen, nach Dumas Methode.

E. Schmidt und Hecker (1) suchten sich bei ihren Versuchen über die Zusammensetzung der Schiefsbaumwolle vor allem über die Zusammensetzung der rohen Baumwolle Gewissheit zu verschaffen. Die 4 in diesem Sinne ausgeführten Analysen führen indessen diese Frage zu keiner bestimmten Lösung, denn diejenigen Analysen, welche am meisten Kohlenstoff gegeben, weichen unter sich um 1,27 pC. im Kohlenstoffgehalt ab und übertreffen den aus der Payen'schen Formel ($C_{14} H_{20} O_{10}$) berechneten um

(1) J. pr. Chem. XL, 257; Pol. Centr. 1847, 86.

0,98 pC., während sie gegen den aus der Baumhauer'schen Formel ($C_{24} H_{21} O_{21}$) berechneten um 0,6 pC. zurückbleiben. Es ist endlich nicht angegeben, wie und wie weit die analysirte rohe Baumwolle gereinigt worden, aber sie enthielt noch 1 pC. Asche. Wenn sich daher der Mittelwerth jener 4 Analysen von roher Baumwolle auch sehr gut der Baumhauer'schen Formel anschliesst, so ist dieser Mittelwerth doch aus viel zu abweichenden Resultaten hervorgegangen, als dass man mit den Verfassern sich mit Bestimmtheit für diese Formel entscheiden könnte.

Zusammensetzung der Schiefsbaumwolle.

Die gekrempelte Baumwolle wurde so oft in ein Gemisch von Schwefel- und Salpetersäure (in welchem Verhältniss?) getaucht, bis sie nicht mehr an Gewicht zunahm; die so präparirte und ausgewaschene Schiefsbaumwolle trockneten die Verfasser bei 90° bis 100°, theils in einem Luftstrom, theils im luftleeren Raum bis keine Gewichtsabnahme mehr stattfand, nachdem sie gefunden hatten, dass ihr bei gewöhnlicher Temperatur im Vacuum über Schwefelsäure nicht alles Wasser entzogen werden könne, dass sie aber bei 110° schon anfangs sich zu zersetzen.

Sehr umsichtig und sorgfältig verfuhr W. Crum (1) bei der Vorbereitung der rohen Baumwolle. Er benutzte die feine Sorte von Sea - Island, welche gekrempelt und gebleicht war, kochte sie mit Aetznatron, bleichte ein zweitesmal mit Bleichkalk, kochte wieder mit Aetznatron und behandelte endlich mit verdünnter Salpetersäure. Nach jeder Operation wurde die Baumwolle in einen Sack gebracht und ausgewaschen. Sie hatte 5,6 pC. ihres Gewichtes verloren und hinterliess, so gereinigt, nur noch 0,09 pC. Asche. Die völlig getrocknete Wolle wurde zu ihrer Verwandlung in Schiefsbaumwolle in Flocken von je 10 Gran noch warm in 1 Unze Säuregemisch (1 Vol. Schwefelsäure von 1,84 spec. Gewicht auf 3 Vol. Salpetersäure von 1,517 spec. Gewicht) gebracht.

(1) Phil. Mag. [3] XXX, 426; J. pr. Chem. XLI, 201; J. pharm. [3] XII, 296.

Zusammen-
setzung der
Schiefs-
baumwolle.

Die Bestimmung des Kohlenstoffs der Schiefsbaumwolle geschah durch Verbrennung mit chroms. Bleioxyd, welche durch chlors. Kali unterstützt wurde, und zugleich durch Messen der Kohlensäure. Der Wasserstoff und Sauerstoff zusammen wurden, freilich auf höchst unsicherer Weise, aus den durch Verpuffung entstandenen Gasen, d. h. aus deren Gehalt an Wasser und Wasserstoff in den Ammoniakverbindungen berechnet. Der Stickstoff ist nach Crum bei dieser Gelegenheit vorgeschlagenen, Methode zur Analyse von salpetersäurehaltigen Verbindungen (siehe Seite 95) als Salpetersäure oder vielmehr als Stickoxyd bestimmt. Die zur Analyse verwendete Probe hinterließ in Salpetersäure gelöst, abgedampft und verbrannt 0,22 pC. Asche. Dies ist bei weitem mehr, als in der rohen Baumwolle, es scheint daher die Salpetersäure nicht rein gewesen zu sein.

Thomas Ransome (1), der ebenfalls die Zusammensetzung der rohen Baumwolle vorher festzustellen suchte, kam, ebenso wie J. H. Gladstone (2), auf die Form $C_{24}H_{20}O_{20}$.

Fehling (3) und unter dessen Leitung Roser und Kraufs untersuchten Schiefsbaumwolle, mittelst verschiedenen Gemische aus Schwefel- und Salpetersäure und länger oder kürzeres Eintauchen dargestellt, durch gewöhnliche Verbrennung mit Kupferoxyd. Das anfangs zu Hülfe genommene chlors. Kali wurde später als überflüssig weggelassen. Der Stickstoff ist nach Liebig's relativer Methode bestimmt. Auch Fehling fand es bedenklich, Schiefsbaumwolle bei 100° zu trocknen und zog vor, »lufttrocken« zu analysiren. Die unvollkommene Trocknung erklärt die Abweichungen seiner Resultate von den Uebrigen zwar in Bezug auf den zu niedrigen Stickstoff und den hohen Wasserstoffgehalt, aber auch der Kohlenstoffgehalt hätte dadurch sinken müssen.

(1) Phil. Mag. [3] XXX, 1. — (2) Phil. Mag. [3] XXXI, 51
Chem. Soc. Mem. III, 412. — (3) Dingl. pol. J. CIII, 220.

Pelouze (1) ging wie seine Vorgänger auf die Zusammensetzung der reinen Baumwolle ein, und entschied sich mit Payen, durch Wiederholung der Analyse, für die Formel $C_{24}H_{20}O_{20}$. Nach Pelouze wird die Schiefs-
 wolle bei 100° schon entschieden unter Salpetersäuregeruch zersetzt; dagegen verändert sie sich bei 40° bis 55° nicht merklich.

Zusammen-
setzung der
Schiefs-
baumwolle.

Sämmtliche Beobachter, besonders Fehling, Pelouze, Kerckhoff, stimmen darin überein, dafs die Bildung der Schiefsbaumwolle nach einigen Minuten beendet ist und keine weitere Veränderung eintritt, wie lange man auch die Baumwolle mit der Säure in Berührung lassen mag; sowie dafs die Säure von reiner Baumwolle durchaus nichts als Wasser aufnimmt. Wir geben die Resultate obiger Untersuchungen in übersichtlicher Zusammenstellung.

Ungelöste gewöhnliche Schiefsbaumwolle.

	van Kerckhoff und Reuter					Hecker und Schmidt				
Kohlenst.	24,87	24,59	24,88	25,03	24,66	24,78	25,16	25,73	25,00	26,06
Wasserst.	2,59	2,58	2,53	2,50	2,49	2,75	2,68	2,79	2,77	2,94
Stickstoff	13,84	14,34	14,03	14,33	14,31	13,50	12,73	12,26	—	—
Sauerstoff	58,70	58,49	58,56	58,14	58,54	59,77	59,43	59,22	—	—

	Ransome		Crum		Pelouze		Petten- kofer(2)	Gladstone
Kohlenstoff	26,16	26,41	24,69	25,16	25,2	bis 25,8	26,03	26,1 bis 27,9
Wasserstoff	3,14	3,19	2,48	—	2,9	" 2,3	2,78	3,22 " 3,33
Stickstoff	10,20	—	13,80	—	12,6	" 13,0	12,40	12,75
Sauerstoff	60,36	—	59,03	—	59,3	" 58,9	58,79	—

(1) Compt. rend. XXIV, 2; Dingl. pol. J. CIII, 224; Pogg. Ann. LXXI, 144. — (2) Baier. Kunst- und Gewerbeblatt, Januar 1847; Dingl. pol. J. CIII, 219; Pharm. Centr. 1847, 63.

	Fehling							
	Eingetaucht in ein Gemenge von 80 bis 90 Grm. Salpeters. (1,45) und 240 bis 270 Grm. käuf. Schwefelsäure						Nochmals 10 Min. in dieselb. aber frische Mischung getaucht	Sch baum w Schön
	2½ Min.	5 Min.	7½ Min.	10 Min.	12½ M.	15 Min.		
Kohlenstoff	25,9	26,7	26,4	25,8	26,1	26,1	25,8	25
Wasserstoff	3,7	4,1	3,9	3,8	3,7	3,7	3,9	3
Stickstoff	10,7	10,5	9,5	10,2	11,0	9,3	9,5	9
Sauerstoff	59,7	58,7	60,2	60,2	59,2	60,9	60,8	60

Mit Aether behandelt :

Schönbein und Böttger (1) :	Flores Domonte und Menard (2)	
	In alkoholischem Aether	
	unlöslich	löslich
in Essigäther gelöst gewesen		
	27,43	28,5
	3,54	3,5
	14,26	11,6
	54,77	56,4
		23,38
		2,92
		11,36
		62,34

Bildung der
Schiefs-
baumwolle.

Geht man von der Thatsache aus, daß das Säur
misch in den obigen Verhältnissen bei der Umwandl
der Baumwolle keine organische Substanz, sondern ledig
Wasser aufnimmt, und daß durchaus keine Gasentwickl
statt hat, — geht man mit andern Worten davon
daß die Bildung der Schiefsbaumwolle nur ein Eintr
der Elemente von NO_2 und ein Austreten der Elem
von HO ist, wie vielfach bewiesen und allgemein a
nommen, so führt die, von den angeführten Analytil
gefundene Zusammensetzung auf eine Vertretung be
in folgenden Verhältnissen.

Eine Vertretung von 6 HO durch 6 NO_2 mit ob
Formel nimmt nur Crum an; eine solche von 5 HO di
5 NO_2 nur Gladstone. Nach jenem ist die Schiefsbaumw
daher = $\text{C}_{24} \text{H}_{14} \text{N}_6 \text{O}_{44}$, nach diesem $\text{C}_{24} \text{H}_{11} \text{N}_5$ (

(1) Augsb. Allg. Zeitung, 3. Jan. 1847, Beil. S. 21; Dingl. p
CIII. 220; Pogg. Ann. LXX, 320; Arch. ph. nat. IV, 20. 28. — (2)
Recueil etc. (vergl. S. 672) April 1847, 104 in J. pharm. [3] XII,
Pogg. Ann. LXXI. 144; Compt. rend. XXIV. 390.

Hecker und Schmidt dagegen geben die Formel $C_{24}H_{16}N_5O_{41}$, wonach 5 HO durch 5 NO₃ ersetzt werden, wenn man mit ihnen für reine Baumwolle $C_{24}H_{21}O_{21}$ annimmt. Bezieht man dagegen die Hecker-Schmidt'sche Formel für Schiefswolle auf Baumwolle = $C_{24}H_{20}O_{20}$, so treten davon 4 HO aus und 5 NO₃ ein. — Kerckhoff und Reuter erklären die Bildung der Schiefsbaumwolle mittelst der Formel $C_{24}H_{16}N_5O_4$, wonach 7 HO aus- und 6 NO₃ eintreten. — Pelouze ist der Ansicht, die Schiefsbaumwolle sei = $C_{24}H_{17}N_5O_{42}$, indem 3 HO durch 5 NO₃ ersetzt werden. Teschemacher und Porret (1) stellen die Formel $C_{24}H_{16}O_{16} + 8 NO_3$ auf, welche letztere 8 NO₃ darnach 4 HO ausschieden. Fehling suchte aus seinen Analysen zu beweisen, daß die explodirende Baumwolle, analog dem Xyloidin, einfach $C_{24}H_{20}O_{20} + 4 NO_3$ ohne alle Wasserausscheidung sei, was sicher irrthümlich ist, da sich die gebrauchte Säure (in Folge der Bildung der Schiefswolle) bewiesener Maßen mit Wasser verdünnt, dessen Ursprung man alsdann nicht einsieht. — Nicht minder im Widerspruch mit der Beobachtung stehen die Formeln für die Schiefsbaumwolle, welche die Uebrigen aufgestellt haben. Nach Ransome's Formel = $C_{24}H_{16}N_4O_{40}$ müßten aus der Baumwolle 4 H austreten, während 4 NO₃ aufgenommen werden. Aehnlich kamen Schönbein und Böttiger aus der Analyse der aus der Auflösung in Essigäther gefällten Schiefsbaumwolle auf die offenbar dem Sachverhalt widersprechende Formel $C_9H_6N_4O_{13}$. Weder Ransome, noch Schönbein und Böttiger haben erklärt: der erstere, was aus dem abgeschiedenen Wasserstoff wird, da dieser weder durch die Salpetersäure oxydirt werden, noch in einer andern gleichzeitig entstehenden Verbindung Zuflucht finden kann, indem beides der Beobachtung zuwider ist; die letzteren, wohin der überschüssige Kohlenstoff und Sauerstoff kommt.

Bildung der
Schiefs-
baumwolle.

(1) Phil. Mag. [3] XXX, 273; Chem. Soc. Mem. III, 258.

Bildung der
Schiefswolle-
baumwolle.

Am weitesten von allen übrigen weichen die Resultate von Flores Domonte und Menard ab. Sie geben in alkoholischem Aether unlöslichen Theil die Formel $C_{24}H_{16}O_{16} + 4NO_3$ (1), für den löslichen Theil die Formel $C_{24}H_{16}O_{18} + 6NO_3$. Bei der Bildung jenes wären 4 durch 4 NO_3 , bei der Bildung dieses 2 HO durch 6 NO_3 ersetzt worden. Die Verfasser gehen in ihrem kurzen Bericht so wenig auf die näheren Umstände ein, daß man sich den Werth ihrer Formeln kein festes Urtheil bilden kann.

Alles dies zusammengefaßt ergibt sich, daß die Zusammensetzung der Schiefswolle nach so zahlreichen umfassenden Untersuchungen dennoch ungewiß geblieben ist, und dies um so mehr, als diejenigen Beobachter, welche inzwischen bekannt gewordenen Lösungsmittel zur Darstellung benutzt haben, am weitesten abweichen und Theil in Widersprüche gerathen sind. Die Schwierigkeiten in der Analyse und in der Vorbereitung der Substanz (das Trocknen), sowie der Mangel eines scharfen Kennzeichens für die Vollendung des Umwandlungsprocesses, wirken gleichzeitig auf die Unsicherheit der Resultate. Schon Linné fand den Kohlenstoff der bei 100° getrockneten Substanz um 1½ pC. höher als der bei 55° getrockneten. Ebenso wir im Betreff der mitgetheilten Analysen ungewiß, ob Säure frei war von salpetriger Säure oder nicht, während doch in letzterem Fall nach Payen ein viel weniger explosives, also chemisch verschiedenes Product entsteht. Endlich ist der Ausgangspunkt, die Formel der reinen Baumwolle selbst, noch ein Streitpunkt, obgleich dadurch der relative Werth der mitgetheilten Formeln nicht geändert wird. Es war natürlich, daß alle Beobachter nach dem nämlichen Prüfstein ihrer so abweichenden Ansichten griffen und diese mittelst der Gewichtszunahme zu stützen gesucht haben, welche eine gegebene Menge Baumwolle bei der Umwandlung erleidet. Wir lassen auch diese Resultate in übersichtlicher Zusammenstellung folgen:

(1) Am 8. 1134 a. O. steht O_3 anstatt O_{16} , offenbar durch Druckf

Beobachter :	Nach ihm geb. 100Baumwoll. an Schiefs- baumwolle :	Nach seiner Theorie sollen 100 Baumwolle geben :	Bildung der Schiefs- baumwolle.
Teschemacher und R. Porret	154	222 (1)	
Teschemacher (2)	169	—	
W. Crum	177,9	183	
Fehling, erste Versuchsreihe mit 10 Grm. Baumwolle	150 bis 160	166	
Fehling, zweite Reihe mit 30 Grm.	160 bis 170		
Pelouze	174 bis 176	174,9	
Hecker und Schmidt	169	167,7	
van Kerckhoff und Reuter	176,2	175,1	
Gladstone, mit nach Schönbein bereiteter Schiefswolle	173 bis 175,5	169,4	

Wenn man von den beiden ersten Fällen absieht, die sich selbst widerlegen, so stellt sich heraus, daß die verschiedenen Autoren jedesmal so ziemlich diejenige Gewichtsvermehrung beobachtet haben, welche ihre resp. Theorien verlangen. Es bleibt also weiteren Forschungen vorbehalten, zu entscheiden, ob es verschiedene oder nur Eine Schiefsbaumwolle giebt, und welches deren Zusammensetzung ist. Gladstone hat übrigens gefunden, daß ein großer Ueberschuß von Schwefelsäure bei der Bereitung einen Theil des Produkts auflöst, was einiges Licht auf manche der obigen Zahlen wirft.

Nach Kindt (3) lassen sich Schiefsbaumwolle und reine Baumwolle leicht unterscheiden, wenn man sie mit Jodlösung (in Jodkalium) befeuchtet und nach einiger Zeit mit 4 Th. Wasser verdünnte Schwefelsäure hinzufügt; jene wird gelb, diese blau.

Nach Kerckhoff und Reuter löst sich Schiefsbaumwolle bei gewöhnlicher Temperatur in Schwefelsäure von 1,5 bis 1,7 spec. Gewicht ohne Färbung und so leicht als gewöhnliche Baumwolle. Die Lösung ent-

(1) Sie berechnen am S. 1135 a. O. aus der von ihnen aufgestellten Formel $C_1, H, O, + 4 NO_2$ (ob durch Druckfehler oder Irrthum?) eine Gewichtsvermehrung von 100 zu 150. Eine richtige Rechnung ergibt übrigens die Zahl 222, 2. — (2) Phil. Mag. [3] XXX, 258; Chem. Soc. Mem. III, 253. — (3) Pogg. Ann. LXX, 167; Dingl. pol. J. CIII, 214.

Eigenschaften
der Schiefs-
baumwolle.

wickelt bei ungefähr 100° eine bedeutende Menge und färbt sich erst viel später braun. Cellulose färbt unter gleichen Umständen schon bei 90°. Das entwichene Gas ist Kohlensäure und Stickoxyd. Mäßig concentrirte Kalilauge löst [nach Kerckhoff (1)] die Schiefsbaumwolle in der Kälte langsam, rascher bei 60°, wahrscheinlich unter verschiedenen Zersetzungerscheinungen. Die Lösung entwickelt, mit Essigsäure neutralisirt, reichlich Stickstoff, noch reichlicher mit Schwefelsäure, immer ohne Triäthylamin. Diese Flüssigkeit wird dann von einfach-essig. Blei gefällt und nach der Filtration auch noch durch Bleizucker gefällt. Jener Niederschlag lieferte, mit Schwefelwasserstoff zersetzt, eine Säure von der procentischen Zusammensetzung der Tartrelsäure (Fremy's), in einem anderen Versuch von der Citronsäure. Der Niederschlag mit Bleiessig lieferte die procentische Zusammensetzung des tartryls. Bleiessig. Den Identitätsbeweis hat Kerckhoff bis jetzt für alle diese Fälle geliefert.

R. Porret (2) brachte 1 Th. Schiefsbaumwolle mit 20 Th. Salpetersäure von 1,45 spec. Gewicht bei einer Temperatur zusammen, welche langsam von 38° auf 67° gelte und auf diesem Punkt erhalten wurde. Alle Schiefsbaumwolle löste sich zu einer durchsichtigen Flüssigkeit mit Gasentwicklung, und konnte durch Verdünnung mit Wasser mit unveränderten Eigenschaften als Pulver gefällt werden. Als die Temperatur auf 113° gesteigert wurde, entwickelten sich reichlich untersalpeters. Dämpfe. Durch Neutralisation der salpeters. Lösung (oder der schwefels. Lösung, welche auf gleiche Weise dargestellt gleiches Verhalten zeigte) mit kohlenst. Kali entsteht ein graulicher, reichlicher Niederschlag, welchen Porret ohne weitere Untersuchung auf eine bloße Reaction gegen Lackmus hin, höchst eilig für eine „neue Pflanzenbase“ erklärt.

(1) J. pr. Chem. XL, 285. — (2) Chem. Soc. Mem. III, 287 Mag. [3] XXX, 409; Pharm. Centr. 1847, 689; J. pr. Chem. XL

De Vry (1) stellte Pyroxylin aus Stärke ganz auf dieselbe Weise wie aus Baumwolle dar, was später auch Cottureau (2) gelang. Ersterer fand ferner, daß sich gewöhnliches Pyroxylin bei 80° bis 90° in Salpetersäure löst, und von Schwefelsäure und Wasser weiß gefällt wird. Der Niederschlag durch Wasser ist bitter, löslich in Alkohol und in überschüssigem Wasser. Schwefelsäure fällt nach ihm aus einer bei 30° bis 35° bereiteten salpeters. Lösung wieder Pyroxylin, Wasser hingegen Xyloidin. Concentrirte Essigsäure löst kein Pyroxylin.

Eigenschaften
der Schiefs-
baumwolle.

Gladstone fand die Schiefsbaumwolle unlöslich in Wasser; löslich in Schwefelsäure und Aetzkali; schwer löslich in Ammoniak, kohlens. Alkalien, Salpetersäure und Essigsäure.

Payen (3) vermuthet, daß der Aether aus der Schiefsbaumwolle wenigstens 2 Stoffe auflöse, wogegen Ménard und Flores Domonte behaupten, sie sei in reinem Aether absolut unlöslich. Damit stimmt Gladstone überein, welcher sie in starkem Weingeist und Aether »fast unlöslich«, in Essigäther aber löslich fand.

Die Löslichkeit in Essigäther und in essigs. Methyloxyd ist bekanntlich schon früher von Richier (4) entdeckt worden. — Neuerdings ist eine Lösung von Schiefsbaumwolle, unter dem Namen von *Collodium*, von Amerika aus bekannt und für mehrere Anwendungen eingeführt worden; ihre Bereitung beruht auf folgenden Löslichkeitsverhältnissen. Nach Sourisseau (5) und Lepage (6) quillt Schiefsbaumwolle, mit käuflichem Aether zusammengebracht, nach einigen Augenblicken zu einer dicken, kleisterartigen Gallerte auf, ohne sich eigentlich zu lösen. Wenn diese durch Schütteln in mehr Aether zertheilt wird, oder besser,

Collodium.

(1) Compt. rend. XXIV, 19. — (2) Compt. rend. XXIV, 205. — (3) Compt. rend. XXIV, 85. — (4) Compt. rend. XXIV, 392. — Vorschriften für die Darstellung des Collodium J. pharm. [3] XIV, 263; J. chim. méd. [3] IV, 541; J. pr. Chem. XLV, 376; Pharm. Centr. 1848. 910. — (5) J. pharm. [3] XIV, 417. — (6) J. pharm. [3] XIV, 420.

Collodium. wenn man etwas Weingeist (selbst gewöhnlichen) hinz so erhält man eine mehr oder weniger dicke, kleister halbflüssige Masse, welche das Collodium ist. Auf aufgestrichen, trocknet es rasch zu einer durchsich explosibeln, durch Reibung sehr elektrisch werdenden bran ein, die sich leicht ablöst, wenn man keine W anwendet. Wird die innere Fläche eines Kolbens durcl schwenken damit überzogen, so erhält man, wie Grü zeigte, kleine Ballons, welche mit Wasserstoff gefüllt bei ger als 3 Zoll Durchmesser noch steigen. — Auf der hängt das eintrocknende Collodium fest an, und ist da sowie durch seine starke Zusammenziehung, vortreffli eignet Wundränder zu vereinigen. Einen andern Vorth der Behandlung von wunden Stellen gewährt es als und wasserdichte Substanz, so dafs ihm eine wichtig dauernde Anwendung in der Heilkunde gesichert s

Die mit Aether dargestellte Gallerte läfst sich Coagulirung mit sehr viel (besonders stärkerem) Wei verdünnen; man erhält, nach Umschütteln und Ruhe vollkommene, filtrirbare Lösung; am Boden des Ge bleibt fast immer ein Rest von Gallerte mit vielen un quollenen Fasern. Die Lösung in Aetherweingeist g nicht mit jeder Schiefsbaumwolle, aber um so eher, je man Feuchtigkeit bei der Bereitung und Darstellung meidet. Getrocknete Baumwolle in ein Gemenge vor peter und Schwefelsäure getaucht, entspricht am best

Zersetzungs-
produkte der
explodirten
Schiefs-
baumwolle.

Jean (2) fand, dafs die Zersetzungsprodukte Explosion der Schiefswolle für gleiche Bereitungsweis selben sind und umgekehrt.

Dieselben Produkte haben auch Hecker und Sch studirt. Sie erhielten durch Entzündung von Schiefs wolle im Toricellischen Vacuum, auf 1 Grm. Substar rechnet und auf 0° und 0^m,76 Druck reducirt : 1) 556 2) 598 CC., 3) 609 CC., 4) 589 CC., im Mittel 581

Gase. Die qualitative Analyse ergab Kohlensäure, Kohlenoxyd, Stickgas, Stickoxydgas, Kohlenwasserstoff und Wasser, zuweilen auch Cyan und Ammoniak; die quantitative Analyse ergab aus nicht sehr gut übereinstimmenden Ziffern folgenden Mittelwerth, welchen wir mit den von Teschemacher und Porret gefundenen Resultaten zusammenstellen :

Zersetzungs-
produkte der
explodirten
Schiefs-
baumwolle.

	Hecker u. Schmidt	Teschemacher u. Porret		
Kohlensäure	20,8	12,92	27,31	Kubikzoll Engl. von 100 Grains
Kohlenoxyd	37,6	20,47	68,24	
Stickoxyd	17,2	21,94	68,24	
Stickstoff	4,0	4,11	13,65	
Cyan	—	7,58	13,65	
Kohlenwasserstoff (CH)	4,6	—	—	
Verl. u. Wasser . . .	15,8	32,98	—	
		100,0 G. Th.	100,0 G. Th.	191,09 Kubikzoll.

Wenn 100 Grains 191,09 Kub.-Z. engl. Gas geben, so entspricht dies 483 CC. von 1 Grm., was sehr schlecht mit den Zahlen von Hecker und Schmidt stimmt. Da aber beide nicht ausdrücklich angeben, wie sie es mit dem Wasserdampf gehalten (den Hecker und Schmidt wahrscheinlich mitbegriffen, Teschemacher und Porret wahrscheinlich nicht), so bleibt ungewiß, ob der Unterschied hiervon, oder von verschiedener Beschaffenheit des Präparats, oder von der Analyse selbst, oder von einer Verschiedenheit der Umstände bei der Verbrennung herrührt. — Man sieht jedoch, daß die Verbrennung der Elemente bei der Oxydation der Schiefsbaumwolle eine unvollkommene ist. Sie läßt sich aber vervollständigen und somit die Wirkung vermehren, wenn man eine Substanz zusetzt, welche Sauerstoff entwickelt. Teschemacher und Porret erhielten durch Verbrennung von 1 Gew. Th. Schiefswolle mit 0,4 G. Th. chlors. Kali : 0,42 G. Th. Kohlensäure, 0,198 G. Th. Kohlenoxyd, 0,178 G. Th. Stickstoff und 0,200 G. Th. Wasser.

Auch Coathupe (1) fand, daß die Kraft der Schießbaumwolle sich durch Tränken mit Sauerstoff entwickelnde Salzen vermehre, und daß diesem Zweck das chlororsaure Kali bei weitem am meisten entspreche.

Schönbein hat inzwischen in England ein Patent seine Erfindung auf den Namen von J. Taylor (2) genommen, und beschreibt darin die Darstellung, wie folgt: Man soll gereinigte Baumwolle in ein Gemisch von 1 V Salpetersäure von 1,45 bis 1,50 spec. Gewicht mit 3 V Schwefelsäure von 1,85 spec. Gewicht eintauchen, nachdem dieses auf 10° bis 15° erkaltet ist, und durch Umrühren und Zertheilung der Baumwolle eine möglichst gleichmäßige Tränkung bewerkstelligen. Es wird nicht angegeben, wie lange das Eintauchen dauern soll, dagegen angerathen, die Schießwolle mit einem Pistill den größeren Theil der Säure auszudrücken und sie in diesem Zustande 1 Stunde stehen zu lassen, worauf man sie unter einem Wasserstrahl bis zum Verschwinden der sauren Reaction und endlich mit sehr schwacher Potaschenlösung auswascht. Das Trocknen geschieht bei 65°. Um die Wirksamkeit des Präparats zu erhöhen, soll man es mit einer Lösung von Salpeter in 160 Th. Wasser tränken. — Daß der Salpeter diesen Zwecke nur wenig und nicht im Verhältniß der größeren Kosten entspricht, haben bereits früher die ballistischen Versuche der Direction *des poudres et salpêtres* in Paris erwiesen.

Langsame
Zersetzung
der Schieß-
baumwolle.

Die Produkte der langsamen Zersetzung der trocknen Schießbaumwolle bei 100° sind von Kerckhoff und Reut studirt worden. Sie fanden, daß diese im Vacuum sehr langsam, aber unter anhaltendem Gewichtsverlust verläuft, welcher nach 12 Stunden 21 pC. beträgt. Setzt man die trockne Schießbaumwolle bei 100° feuchter Luft aus, so ist die folgende Zersetzung das Widerspiel der Bildung der Schieß-

(1) Phil. Mag. [3] XXXI, 152. — (2) Repert. of patent invent., 1847, 292; Dingl. pol. J. CIV, 450. — (3) Dingl. pol. J. CIII, 46

baumwolle, indem stufenweise Wasser aufgenommen und Salpetersäure oder deren Elemente¹ abgeschieden werden. Wir enthalten uns weiterer Mittheilungen über die dabei verbleibenden Verbindungen, bis die Untersuchung derselben beendigt sein wird.

Nach Schönbein und Böttger (1) verursacht ein starker Hammerschlag auf Schiefsbaumwolle zwar einen starken Knall und Verstäubung, nicht aber eigentliche Entzündung, indem nur der getroffene Theil explodirt. Anhaltend mit zerstoßenem Glase gerieben, fand keine Entzündung statt. Sie fanden ferner, daß sich die Schiefsbaumwolle (im Oelbad)

bei 130°	gar nicht,	
„ 150°	erst nach Verlauf von 12 Minuten,	
„ 175°	„ „ „ „ 30 Sekunden,	
„ 200°	„ „ „ „ 12 „	
„ 230°	augenblicklich	

Entzündbarkeit.

entzündet.

Oxland (2) schließt aus seinen Erfahrungen über das Trocknen des Torfes, daß Schiefsbaumwolle vor der völligen Trockne sich leichter entzündet, als wenn alle Feuchtigkeit ausgetrieben ist, und rath die Trocknung deshalb in einem Luftstrom von höchstens 27° bis 32° vorzunehmen.

Artillerie-Lieutenant P. Weifs (3) hat die Wirkung der Schiefsbaumwolle im Verhältniß zu der des Schiefspulvers durch Rechnung zu bestimmen gesucht. Da er dabei die oben mitgetheilte, nicht hinreichend genaue Analyse von Fehling und die Hypothese zu Grunde legt, das Schiefspulver entwickle bei seiner Verbrennung eine Temperatur von 2000°, so unterlassen wir, auf das Weitere dieser Speculation einzugehen.

Praktische Beobachtungen.

Die Sprengversuche von Hall und Sohn (4) bei Erdarbeiten und zwar bei einem 28' tiefen Einschnitt in Thon und Sandstein, auf 5 Fuß dicken Schichten angestellt,

(1) Am S. 1134 a. O. — (2) Chem. Gaz. 1847, 340. — (3) Dingl. pol. J. CIII, 370. — (4) Dingl. pol. J. CIV, 465 aus Mech. Mag.

Praktische
Beobach-
tungen.

ergaben, daß 1 Gew. Th. Schiefswolle 6 Gew. Th. Schießpulver ersetzt, so daß man jedesmal statt 6 nur 1 Loch bohren und zu laden hat. Der Effekt hängt übrigens viel von dem kompakteren oder lockerern Zustande der Ladung ab.

Auch Combes (1) hat seine Sprengversuche in Gypssteinbruch von Belleville in der Nähe von Paris fortgesetzt. Auf die Beobachtung hin, daß die Schiefswolle hinreichend Sauerstoff zur vollständigen Verbrennung hält und die nach dem Sprengen mit einer Petarde 600 gr. aus dem Spalte entweichenden Gase noch entzündet werden konnten, wendet er sich zur Wirkung der Schießbaumwolle mit Zusatz von sauerstoffreichen Salzen.

Eine Petarde, welche 3 Kilogr. Sprengpulver faßt, wird mit einem Gemenge von 500 Grm. Schießbaumwolle 400 Grm. chlors. Kali (die theoretisch zur vollständigen Verbrennung erforderliche Menge) geladen. Der Effekt entsprach dem einer Petarde von 3 Kilogr. Sprengpulver, 2,5 Kilogr. Schießpulver, oder 900 Grm. reiner Schießbaumwolle. Mit andern Worten, der Effekt des Gemenges ist dem einer ebenso großen Menge Schießbaumwolle gleich und übertrifft den des Sprengpulvers um das 3,3 fache. Es traten weder Dämpfe, noch Rauch, noch entzündliche Stoffe auf. — Bei einem zweiten Versuch, wo man das kostspielige chlors. Kali zu ersetzen suchte, verwendete man Schießbaumwolle mit 80 pC. Kali- oder 70 pC. Natronsalp. d. h. soviel als die Theorie verlangt, und hatte nahezu denselben, sonst gleichartigen Effekt.

Bonjean's (2) ballistische Versuche bewiesen, daß Pyroxylin aus kardirter Baumwolle weder durch so viel als aus geleinemtem, noch aus ungeleinemtem Papier, noch aus Papier ersetzbar ist.

Wartmann (3) fand in seinen Versuchen die Explosivkraft der explodirenden Schießbaumwolle, je nach Art der Verfertigung, 3 bis 9 mal größer als die des Schießpulvers.

(1) Compt. rend. XXVI, 61; Dingl. pol. J. CVIII, 141. — (2) Compt. rend. XXIV, 190. — (3) Arch. ph. nat. IV, 193.

Wir bedauern, von den wichtigsten praktischen Versuchen über diesen Gegenstand — von denen nämlich, welche die vom ehemaligen Bundestag niedergesetzte Commission in Mainz angestellt hat — nicht berichten zu können, weil diese vor ihrer gänzlichen Vollendung durch die Märzer-eignisse unterbrochen und bis jetzt nicht bekannt gemacht wurden. Wenn wir anders richtig belehrt sind, so sind diese — nachdem man die Schwierigkeit überwunden hatte, Patronen zu machen, die jedesmal eine gleichmäßige Ladung von geeigneter Compression repräsentiren — durchaus zu Gunsten für die Schiefsbaumwolle ausgefallen und auf alle Arten Schußwaffen ausgedehnt worden.

Praktische
Beobach-
tungen.

Bonjean (1) schlug vor — um Verwechslungen vorzubeugen — die Schiefsbaumwolle mit Sandelholzauszug (als letztes Waschwasser) rosa zu färben. Ein Zusatz von etwas Alaun soll die Farbe und zugleich die Wirksamkeit erhöhen.

Unter den zahlreichen Produkten der Einwirkung der Salpeter-Schwefelsäure auf der Cellulose ähnliche, organische Substanzen ist noch der *Knall-Mannit* von technischem Interesse. Flores Domonte und Menard (2) erhielten bei der Analyse desselben 17,3 bis 17,1 pC. Kohlenstoff, 1,8 bis 1,9 pC. Wasserstoff und 17,5 bis 17,0 Stickstoff, woraus sie die Formel $C_{12}H_{18}O_7 + 5NO_5$ berechnen. Der Knall-Mannit kann krystallisirt erhalten werden. Stufenweise erhitzt, schmilzt dies Präparat und zersetzt sich dann, aber ohne Knall. Es explodirt dagegen leicht, und ohne Rückstand zu lassen, durch einen Schlag mit dem Hammer mit derselben Heftigkeit wie Knallquecksilber, und soll dieses in der Fabrikation von Zündhütchen, als wohlfeileres und ebenso wirksames Material, ersetzen können. Sobrero (3) hat darüber im Kleinen sehr gelungene Versuche angestellt, und hebt dabei hervor, daß

Knall Mannit.

(1) Compt. rend. XXIV, 22. — (2) Compt. rend. XXIV, 89. 390; J. Pharm. [3] XII, 159; Pharm. Centr. 1847, 892. — (3) Compt. rend. XXV, 122; Dingl. pol. J. CV, 387.

Knall-Mannit. das neue Knallpräparat viel weniger gefährlich zu bereiten ist, als das bisherige.


Demselben Chemiker gelang es, ähnliche Knallpräparate aus Dextrin, Glycerin und Rohrzucker darzustellen.

Rohrzucker mit Salpeterschwefelsäure bei $+ 2^{\circ}$ behandelt, verwandelt sich nach Schönbein (2) ohne Gärung in eine klebrige, unlösliche Masse, welche mit Wasser gewaschen und getrocknet in der Kälte fest und brüchig, etwas erwärmt weich und knetbar, in der Siedhitze halbflüssig ist. Weiter erhitzt entwickelt sie reichliche Dämpfe und verpufft ohne Rückstand. Sie ist geschmacklos, geruch- und farblos, durchsichtig und verhält sich gegen Lösungsmittel wie ein Harz.

L. Thompson (3) empfahl den Knallzucker für Feuerwerkerei zu verschiedenen Sätzen.

Svanberg (4) fand dasselbe wie Schönbein, und stellte eine analoge Verbindung aus Gummi arabicum dar, welche von Xyloldin und dem Knallzucker verschieden ist.

(1) Compt. rend. XXIV, 246. — (2) Pogg. Ann. LXX, 167; J. Mag. [3] XXXI, 7; Arch. ph. nat. IV, 20; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 505. — (3) Pharm. J. Trans. VIII, 166; J. pharm. [3] XIII, 103. (4) Berzelius' Jahresber. XXVII, 389; Pharm. Centr. 1848, 702.



Mineralogie.

Scheerer hat in mehreren Fortsetzungen seiner früheren Abhandlungen über polymere Isomorphie (1) die Reihe der gemäß seiner Hypothese berechneten Mineralformeln vervollständigt und dieselben zuletzt in einer Uebersicht zusammengestellt (2). Gegen seine Hypothese, nach welcher bekanntlich 1 Aequivalent Magnesia oder der mit dieser isomorphen Basen durch 3 Aeq. Wasser, und 1 Aeq. Kupferoxyd durch 2 Aeq. Wasser isomorph ersetzbar sind, haben Haidinger (3), Naumann (4), (dieser auch schon früher (5), Blum (6), Rammelsberg (7) und Bischof (8) gewichtige Einreden vorgebracht. Alle halten übereinstimmend den Aspasolith und Serpentin, die Hauptstützen von Scheerer's Hypothese, nicht für ursprünglich wasserhaltig

Allgemei-
ne.
Polymere
Isomorphie.

(1) Oefversigt af K. V. Acad. Förh. III, 28 und IV, 69; Berzelius' Jahresber. XXVI, 54. 329 und XXVII, 228; Pogg. Ann. LXVIII, 319; Jahrb. Miner. 1846, 798. — (2) Pogg. Ann. LXX, 411. 545; LXXI, 285. 445. — (3) Berichte über die Mittheilungen von Freunden der Naturwissenschaften in Wien, herausgegeben von Haidinger, II, 50; naturwissenschaftliche Abhandlungen, herausgegeben von Haidinger, I, 79; Pogg. Ann. LXXI, 266. — (4) J. pr. Chem. XL, 1. — (5) J. pr. Chem. XXXIX, 196. — (6) Blum's Pseudomorphosen, Nachtrag, 57. — (7) Rammelsberg's Handwörterb. 3. Suppl. 7. 20. 109; N. Jen. Lit.-Zeitung 1848, 1214. — (8) Bischof's Lehrb. der chem. und phys. Geologie, II, 253. 279. 384.

Polymer
Isomorphie

und für isomorph mit Cordierit und Chrysolith, sondern pseudomorph aus letzteren gebildet. Insbesondere suchte Naumann zu zeigen, daß der Aspasiolith in demselben Verhältnisse zum Cordierit stehe, wie Fahlunit, Chrysolith, Chlorophyllit, Bonsdorffit und Esmarkit, wie bei ihrer zuerst durch Shepard (1) und Dana angenommenen und später durch Haidinger (3) nachgewiesenen pseudomorphen Entstehung aus Cordierit das dabei aufgenommene Wasser keinen Verlust an Magnesia erlitten (vergl. Chlorophyllit). Außerdem suchte Naumann zu zeigen, daß nach Scheerer's Analyse des Aspasioliths eben so gut 4, ja selbst 5 Aeq. Wasser als isomorphe Vertreter von 1 Aeq. Magnesia angenommen werden könnten. Rammelsberg folgert aus der Berechnung von 13 der zuverlässigsten Analysen von reinen, kohlensäurehaltigen Serpentin, daß auch hier die Vertretung von MgO durch HO anzunehmen sei. Haidinger hebt besonders den gänzlich amorphen Zustand des Aspasioliths hervor, während doch als isomorph zu gleichende Mineralien beide krystallinisch sein müßten. Auf diese und andere Einwürfe stellt Scheerer in einer scharfsinnigen Entgegnung (4) zunächst die Richtigkeit Naumann's Berechnung seiner Analyse des Aspasioliths als von einem unsicheren Ausgangspunkt (dem Sauer der Thonerde) ausgehend, in Abrede, und sucht die von Naumann bezweifelte genaue Uebereinstimmung der Krystallformen des Serpentin von Snarum und des Chrysoliths näher nachzuweisen. Serpentin und Aspasiolith sollen allerdings krystallinisch sein, obgleich es damit eine eigene Wandlung habe. Die Ursprünglichkeit des Wassers in beiden wird wiederholt behauptet, und er hält jetzt auch den Wassergehalt des Basalts gleich dem der Urgebirge für ursprünglich.

(1) Shepard, Treatise on Mineralogy, 2. Edit.; Sill. Am. J. [2] 266. — (2) Dana, Syst. of Min., 2. Edit. — (3) Pogg. Ann. L3 441. — (4) J. pr. Chem. XLIII, 10; Pogg. Ann. LXXIII, 155.

resp. die darin eingeschlossenen Zeolithe für mit Basalt gleichzeitig gebildet.

Bekanntlich nahm Hermann auf Grund seiner Ana-^{Heteromerie.}lysen der Turmaline an, daß es deren bei ganz gleicher Krystallform von 3 verschiedenen Grundmischungen gebe: Schörl, Achroit und Rubellit (1). Er hat dieses Verhältniß, das er Heteromerie nannte, jetzt auch an einer Reihe anderer Mineralien nachzuweisen gesucht (2). Hierher gehören u. a. die Augite, Hornblenden, Epidote (vergl. diese), die monoklinometrischen und die triklinometrischen Feldspathe, sowie die von Scheerer als polymer-isomorph aufgeführten Mineralien. Es erklärt sich die abweichende Zusammensetzung, welche die Glieder dieser und anderer Mineralgruppen bei gleicher Krystallform, unabhängig von Isomorphie, öfters zeigen, daraus, daß sie zwei oder mehr heteromere Glieder frei oder zusammen krystallisiert enthalten. Seiner Ansicht nach können überhaupt alle Körper von gleicher Krystallform — die Natur, Anzahl und Gruppierung ihrer Atome mag noch so verschieden seyn (NaO , NO_3 ; CaO , CO_2) — nach Art isomorpher Körper zusammenkrystallisiren, wenn sie nur den erforderlichen Grad von Molekular-Anziehung zu einander haben. Darin, daß letzteres selten der Fall ist, liegt der Grund, daß heteromere Verbindungen minder häufig als isomorphe in der Natur vorkommen und bisher nicht künstlich dargestellt wurden. Sie entstanden am häufigsten bei der Ausscheidung aus glühend-breiartigen Massen, wobei die Krystalle gezwungen wurden, in Ermangelung normaler Moleküle isomorphe oder heteromere Moleküle aufzunehmen.

Rammelsberg (3) hat die von Hermann aufgeführten Fälle von Heteromerie näher beleuchtet, und findet dieselben theils auf unsichere Analysen gegründet, theils genügend aus der Gleichheit oder Proportionalität der

(1) J. pr. Chem. XXXV, 232; Rammelsb. Handwörterb. 2. Suppl. 164. — (2) J. pr. Chem. XLIII, 35; im Ausz. Jahrb. Miner. 1848, 816. — (3) N. Jen. Lit.-Ztg. 1848, 1214.

Atomvolumen erklärbar, und darum die Annahme einer neuen Hypothese unnöthig.

Begriff der
Mineral-
species.

Kobell und Fuchs haben die Frage besprochen, wie weit den isomorphen Bestandtheilen bei Aufstellung Mineralspecies Einfluss zu gestatten sei. Kobell (1) trachtet als wahre Species die sogenannten Grenzglie und Mittelglieder. Erstere sind die »Verbindungen von lativ gleicher Zusammensetzung und Krystallisation, w sie mit einer Basis vorkommen (CaO , CO_2 ; MgO , C oder, im Falle sie aus zwei Verbindungen verschiede Art bestehen, in jeder von diesen nur eine Basis vorkom (3FeO , $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3$, SiO_2 ; 3CaO , $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3$, Si). Eine Reihe Grenzglie bilden das eigentliche miner gische Genus, oder mit Fuchs die oryktognostische l mation. — Mittelglieder sind die Verbindungen der Gr glieder zu gleichen Aequivalenten. Sie zeichnen sich d constante Charactere (Verbreitung, Spaltungswinkel, che sche Eigenschaften u. a.) aus. Auch Verbindungen von Form $2A + 3B$; $3B + 2C$ u. a., sowie Verbindungen Mittelglieder untereinander: Zwischenglieder, scheinen zukommen und als Species brauchbar. — Bei der B theilung eines Minerals werden aus dessen Analyse zunä die Grenzglie A, B u. s. w., aus diesen die Mittelgli $A + B$ u. s. w. berechnet. Bleibt ein Ueberschufs, so das Mineral der überwiegenden Species, als mit A oder $A + B$ gemengte Varietät zugetheilt, und die Beimeng in der Formel mittelst kleiner Buchstaben angegeben, z Granat von Ohlápian (3MgO , $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3$, SiO_2) + (3Fe $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3$, SiO_2) mit einem Ueberschufs von Th eisengranat = $3(\text{MgO}$, FeO , fe o), $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3$, Si .

Fuchs (2) will nur die Grenzglie als Species ten lassen, denn mit der Annahme von Mittel- und Zwisch gliedern würden Uebergänge von einer Species zur and zugelassen und damit der oberste Grundsatz einer je

(1) J. pr. Chem. XLIV, 99. — (2) J. pr. Chem. XLV, 1.

naturhistorischen Doktrin verletzt, »dafs jede Species ein völlig abgeschlossenes Ganze bilde«. Die Mittel- und Zwischenglieder betrachtet er als zusammenkrystallisirte Species, wobei die integrierenden Moleküle durch die Krystallisationskraft gezwungen wurden, sich gleichmäfsig zu vertheilen und parallel aneinander zu legen. Ein Vikariren der Bestandtheile in dem seither genommenen, leider zum Theil von ihm selbst verschuldeten, Sinn kann er durchaus nicht gestatten. Anders aber bei den Formationen, die er nun definirt *»als den Inbegriff von Spezien, welche gleichmäfsige chemische Constitution und gleiche oder im Wesentlichen gleiche Krystallisation haben, und sich in allen Verhältnissen ohne wesentliche Veränderung der Krystallisation mischen können«*, und wobei die früher in Bezug auf die Species vikarirend genannten Bestandtheile jetzt in Bezug auf die Formation alternirend zu nennen sind.

Naumann (1) verwahrte sich gegen die ihm von Berzelius (2) irriger Weise unterlegte Absicht, als habe er mit seinem sogenannten gemischten System ein neues Mineralsystem aufstellen wollen. Ein den strengsten Anforderungen der Wissenschaft entsprechendes, methodisch gegliedertes, natürliches System könne nach seiner Ueberzeugung vor weiterer Ergründung des Causalzusammenhanges zwischen den physischen und chemischen Eigenschaften gar nicht geliefert werden, und deshalb habe er absichtlich die Ausdrücke »reihenförmige Zusammenstellung, oder übersichtliche Gruppierung der Mineralspecies« gebraucht. Mit dem Ausdruck »gemischtes System« sollte nur gesagt werden, dafs die Aehnlichkeit in den physischen und chemischen Eigenschaften *zugleich* gesucht werden müsse; nicht aber seien damit zweierlei Classificationsprinzipien, sondern nur *eines, das der allgemeinen naturhistorischen Aehnlichkeit*, aufgestellt worden.

Mineral-
system von
Naumann.

(1) J. pr. Chem. XL, 321. — (2) Berzelius' Jahresber. XXVI, 294.

Neuestes Mi-
neralsystem
von Berzelius.

Rammelsberg (1) hat ein rein chemisches Mineralsystem nach den Principien ausgearbeitet, welche Berzelius Beurtheilung des Naumann'schen gemischten System aufstellte. Es würde hier zu weit führen, dieser vielen schätzbaren Anmerkungen begleiteten Ausführung's Einzelne zu folgen, welche vom Verfasser beschriebene als ein bloßer Versuch bezeichnet wird.

Metallolde.
Diamant.

In den Goldwäschern von Twitty's Grube in der Itakolumit-Region in Rutherford-County in Nord-Carolina ward ein durchsichtiger, 4,12 Gran schwerer Diamant gefunden und befindet sich im Besitz des Herrn Shepard, welcher das Vorkommen von Diamanten dort aus dem von ihm entdeckten Vorkommen des Itakolumits im Voraus vermuthet hatte (2).

Hinsichtlich des Verhaltens des Diamants in hoher Temperatur vergl. S. 333.

Metalle.
Platin.

Gediegenes Platin ist in Nordamerika unter Waschung aus dem Bergwerk des Herrn Erwin in Rutherford-County gefunden worden. Ch. U. Shepard (3) erhielt ein kleinerenförmiges Korn von 2,541 Grains (spec. Gew. = 18) von dort. — Auch im goldhaltigen Sande der Ohlápian in Ungarn soll nach Molnár Platin neben nickelhaltigem gediegenem Eisen vorkommen (4). Kopetzky und Paterna fanden aber bei näherer Prüfung das Platin nicht (5), und das Eisen enthält nach ihnen kein Nickel, weshalb sie glauben, daß es von den Geräthschaften der Arbeiter herrühre. Bei Wiederholung seiner Versuche jedoch Molnár (6) 34 Gran kleine Magneteisenkrystalle aus, auf welchen Platin saß und wovon er Platinsalz darstellte. Auch seine Angabe bezüglich des Eisens wiederholt derselbe.

(1) Berzelius' neues chem. Mineralsystem, herausgeg. von Rammelsberg, Nürnberg 1847; Pogg. Ann. LXXI, 477. — (2) Sill. Am. J. II, 253; im Ausz. Pogg. Ann. LXX, 544. — (3) Sill. Am. J. [2] 280; im Ausz. J. pr. Chem. XLV, 454. — (4) Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) III, 412. — (5) Haidinger's Berichte III, 439. — (6) Haidinger's Berichte III, 475.

Gediegenes Gold ist in Gabbro eingesprengt von Professor Ulrich aus Zürich im August 1847 auf der Höhe des Saasgrates (11,000 Schuhe über der Meeresfläche) zwischen dem Saas- und Zermathale gefunden worden (1). — Bezüglich des durch die Tagesblätter allbekannt gewordenen und als fabelhaft reich geschilderten Vorkommens von Gold in Californien sind in wissenschaftlichen Zeitschriften noch keine Nachrichten erschienen. Eine Probe von Peabody an die *École des mines* in Paris geschenkten Waschgoldes aus Californien bestand aus kleinen schön goldgelben Blättchen und einem rundlichen Korn von 0,628 Grm. Gewicht. Den Blättchen waren kleine, durch den Magnet ausziehbare Körnchen Titaneisen? beigemischt. — Die Blättchen enthielten in 100 Th. 90,70 Au, 8,80 Ag und 0,38 Fe (2). — In Rußland betrug die Ausbeute an Waschgold im Jahr 1847 1780,943 Pud = 29835 Kilogr.; nämlich vom Ural 324,628 Pud, von Nertschinsk 25 Pud, von Ost- und West-Sibirien 1431,315 Pud. Die Ausbeute an Gold vom Altai und den Silberminen von Nertschinsk betrug 45 Pud (3).

Gold.

Schneider (4) untersuchte in Marchand's Laboratorium ein Goldamalgam, welches in Platinerz von Columbia in erbsengroßen, leicht zerdrückbaren Kugeln eingewachsen war. Es bestand aus 57,40 pC. Hg; 38,39 Au; 5,0 Ag = $\text{Hg}_{1,2} \left. \begin{smallmatrix} \text{Au} \\ \text{Ag} \end{smallmatrix} \right\} 5$.

Goldamalgam.

Unter Waschgold aus dem Bergwerk des Herrn Erwin, Rutherford-county in Nordamerika, fand Willis kleine Körner von der Farbe des Palladiums, welche sich bei der qualitativen Prüfung durch C. U. Shepard (5) als Wismuthgold mit etwas anhängendem Quecksilber erwiesen. Spec. G. = 12,4 bis 12,9, Härte = 2,5 bis 3; hämmerbar, zuletzt brüchig. Struktur? (Bruch) hakig. V. d. Löthrohr leicht zur Kugel schmelzbar, beim Erkalten krystallisirend. Beim Abtreiben v. d. L.

Wismuthgold.

(1) Jahrb. Miner. 1848, 522. — (2) Ann. des mines [4] XIV, 105.

(3) Hermann's Archiv für wissenschaftl. Kunde von Rußland, 1848. —

(4) J. pr. Chem. XLIII, 317. — (5) Sill. Am. J. [2] IV, 280.

bildet sich weißer Rauch, gelber Beschlag und ein Gold von etwa der halben Gröfse der Probe. Shepard hielt die Legirung für ein Hüttenprodukt; Gibbon und Cling halten sie aber für natürlich, da in den südlichen St von Nordamerika öfters Wismuth gefunden worden se

Kupfer.

Forrest Shepherd berichtet von einem in se Besitze befindlichen grossen Geschiebe gediegenen Kupfer welches im Juli 1845 dicht an der Südküste des O Sees unweit des Elmflüsschens gefunden wurde. Es ist 3½ Fufs lang, 2½ Fufs breit und 7 bis 8 Zoll dick, 1625 l schwer, und zeigt an der Oberfläche Pünktchen gediegenes Silbers und in Höhlungen Bröckchen von Syenit und Stein. Es stammt wahrscheinlich von einer 8 bis 9 M südwärts befindlichen Kuppe geschichteten Grüns worin man gediegenes Kupfer, gleichfalls mit Silberpu besetzt, gefunden. Schon früher fand man am Oberen ein 2200 Pfd. schweres Geschiebe gediegenen Kupfer.

Rhodus (3) erklärte den Bildungsprocefs des sch gediegenen Kupfers, welches sich in papierdünnen Blättern im zersetzten Basalt bei Rheinbreitbach findet. Das Kupfererz und Kupferglaserz eines den Basalt durchschneidenden Quarzganges lieferten bei der Verwitterung Kupfervervi dessen Lösung den Basalt durchsickernd durch den Kalk, Magnesia- und Alkaligehalt des letzteren zersetzt während die organische Materie der Tagewasser das Kupferoxyd reducirte. — Der Basalt verlor seinen ganzen Kalk- und Alkaligehalt, sowie der Olivin des Basalts die Hälfte seiner Magnesia und seines Eisenoxyd. Kalk und Magnesia fanden sich in den Grubenwasser als schwefels. Salze wieder.

Telluride.
Blättertellur.

Nach Jackson (4) findet sich das bisher so seltene Blättertellur in beträchtlicher Quantität auf einem neu entdeckten erzführenden Gang in Glimmerschiefer zu Whitehall bei

(1) Sill. Am. J. [2] IV, 115. — (2) Sill. Am. J. [2] III, 186.
(3) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 212. — (4) Sill. Am. J. [2] VI, 186.

drichsburg in Virginien. Es ward, bis es Jackson in die Hände kam, für Molybdänglanz gehalten und weggeworfen.

Den Tetradymit von Schubkau fand Hruschauer (1) Tetradymit.
übereinstimmend mit den Analysen von Berzelius und Wehrle zusammengesetzt aus:

Bi	Te	S	Summe
59,2	35,8	4,6	99,6

Sartorius (2) analysirte unter Genth's Leitung einen Arsenide.
Speiskobalt.
durch hohen Nickelgehalt ausgezeichneten Speiskobalt von Richelsdorf (zollgroße Krystalle von $\infty O \infty . O . \infty O$). Nach Abzug von 0,94 pC. S und 0,82 Fe, welche als beigemengter Schwefelkies betrachtet wurden, gab die Analyse:

Ni	Co	Fe	As	Summe
14,06	9,17	1,42	73,53	98,18

Schnabel (3) analysirte den aus mikroskopisch Kobaltglanz.
kleinen, aber deutlichen Krystallen bestehenden Kobalt-
schliech von der Grube Philippshoffnung bei Siegen (I);
Hubert (4) den derben Kobaltglanz von Orawitza in
Oberungarn (II), und Patera eine faserige Varietät von
demselben Fundorte (III). Die beiden letzteren enthalten
Gold und gediegenes Wismuth eingesprengt; das Wismuth,
bis zu 18 pC. betragend, kann abgesaigert werden. — Alle
entsprechen der bekannten Berzelius'schen Formel:
 $Co As + (Co Fe) S_2$:

	Co	Fe	As	S	Summe
I.	29,77	6,38	44,75	19,10	100,0
II.	30,37	5,75	44,13	19,75	100,0
III.	32,02	4,56	43,63	19,79	100,0
Rechnung	35,54	"	45,18	19,28	100,0

Löwe (5) analysirte krystallisirten Arsenik-Nickelglanz Nickelglanz.

(1) Bericht über die 21. Versammlung deutscher Naturforscher, 195;
J. pr. Chem. XLV, 456. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 278. —
(3) Osterprogramm 1847 der Realschule zu Siegen; Pogg. Ann. LXXI,
516; Rammelsberg's Handwörterb. 3. Suppl. 65. — (4) Haidinger's Be-
richte (vergl. S. 1147) III, 389. — (5) Haidinger's Berichte II, 82;
Haidinger's Abhandl. I, 343.

Nickelglanz. von Schladming in Steiermark (I) und eine derbe Va
von Prackendorf in Oberungarn (II).

	Ni	Fe	As	S	Summe
I.	26,14	9,55	49,83	14,13	99,65
II.	28,75	8,90	46,10	16,25	100,00

Aus der ersten dieser Analysen, schon durch Rammelsberg nach einer Privatmittheilung Löwe's bekannt, leitet Löwe die Formel $\text{Fe S}_2, \text{Ni S} + 2 \text{Ni As}$ ab, betrachtet das Mineral als eine neue Species (Gersdorff). Rammelsberg (2) wendet gegen diese Formel mit, ein, daß sie 2 isomorphe Metalle auf 2 verschiedenen S-felungsstufen enthält, des binären Gegensatzes entbehrt überdies nicht der procentischen Zusammensetzung spricht. Er zeigt (3), daß sowohl obige, als Kobell's Analysen einen Ueberschuß von Ni und As nähernd $= \text{Ni}_2 \text{As}$ ergeben, wenn man die von Berzelius angenommene Zusammensetzung damit vergleicht hält es darum für nicht ganz unwahrscheinlich, daß solchen Nickelglänzen die gewiß regulär krystallisirende Verbindung $\text{Ni}_2 \text{As}$ isomorph beigemischt sei.

Sulfuride.
Wismuth-
glanz.

Derber Wismuthglanz von Orawitz in Ober-Ungarn enthält nach Hubert's (4) Analyse:

S	Bi	Cu	Pb	Fe	Au	Summe
19,46	74,55	3,13	2,26	0,40	0,53	100,35

Nach Abzug von 1,59 S zur Bildung von beigemem Bleiglanz, Kupferglanz und Eisenkies giebt er 80,7 und 19,26 S, $= \text{Bi S}_3$.

Magnetkies.

G. Rose (5) hat gezeigt, daß der Magnetkies Fe S sein kann, sondern mit Berzelius als eine Verbindung von FeS mit $\text{Fe}_2 \text{S}_3$ betrachtet werden muß. Er erläutert, wie Stromeyer zuerst zeigte, aller Magnetkies bei der Lösung in Salzsäure einen Ueberschuß von S

(1) Rammelsberg's Handwörterb. 2. Suppl. 102. — (2) Rammelsberg's Handwörterb. 3. Suppl. 89. — (3) N. Jen. Allg. Lit.-Ztg. 1848, 1. (4) Oestr. Blätter für Literatur, 1847, 1133; Haidinger's Berichte S. 1147) III, 401. — (5) Pogg. Ann. LXXIV, 219.

weder frei, noch in Form von Schwefelkies darin gewesen sein kann, da reiner Magnetkies von letzterem nichts bei der Lösung hinterläßt und Schwefelkohlenstoff keinen Schwefel auszieht. Rammelsberg (1) führt als Bestätigung dafür an, daß Magnetkies beim Glühen in Wasserstoff eben so viel S abgibt, als derselbe bei der Lösung in ClH hinterläßt. Der Magnetkies ist stets magnetisch; sorgfältig dargestelltes künstliches FeS aber nicht. Das spec. Gew. des Magnetkieses ist weit niedriger, als das des Schwefelkieses, während es umgekehrt sein müßte. Die Aehnlichkeit der Krystallform mit einigen Einfach-Schwefel- und -Antimonmetallen, auf welche hin Breithaupt die Zusammensetzung FeS annahm, ist kein genügender Grund, da auch Körper von ungleicher atomistischer Zusammensetzung Gleichheit der Form haben. — Rose hält die Formel $5 \text{FeS} + \text{Fe}_2 \text{S}_3$ für die allein richtige. Die Abweichungen der Analysen von reinem Magnetkies sind nicht bedeutend genug zur Annahme zweier andern Species ($\text{FeS} + \text{Fe}_2 \text{S}_3$ und $9 \text{FeS} + \text{Fe}_2 \text{S}_3$), und es rühren die kleinen Abweichungen der Analysen von zwischen den Zusammensetzungsflächen befindlichem Eisen-oxyd her.

Haidinger (2) hat ein neues zu den Blenden gehöriges Mineral beschrieben und Hauerit genannt, welches durch Adler zu Kalinga unweit Neusohl in Ungarn entdeckt worden ist, wo es in schönen, zum Theil sehr großen Krystallen des tesseralen Systems, oder in kugelförmigen Gruppen mit radialstänglichem Gefüge, ähnlich manchem Schwefelkies, in Thon, Gyps oder Schwefel eingewachsen vorkommt. Sehr vollkommen spaltbar nach $\infty \text{O} \infty$, $\text{H.} = 4$, sp. G. = 3,463 (Hauer). Röthlichbraun bis bräunlichschwarz mit bräunlichrothem Strich. In dünnen Splittern durchsichtig, mit bräunlichrother Farbe. Unvollkommen metallglänzend bis metallähnlich diamantglänzend.

(1) N. Jen. Lit.-Ztg. 1848, 851. — (2) Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) II, 2; Haidinger's Abhandl. I, 101.

Hauerit. — Im Kolben giebt es Schwefel und hinterläßt berg Schwefelmangan, MnS ; vor dem Löthrohr auf Kohle felflamme; mit Phosphorsalz, nach Entfernung alles f fels, Manganreaktion.

Zusammensetzung nach der Analyse von Pater

berechnet		gefunden		} Nach Abzug Kieselerde und Eisens als Sch felkies.
Mn	46,28	42,97	45,198	
2 S	53,72	53,64	54,802	
Fe	"	1,80	"	
SiO_2	"	1,20	"	

Zinnober. Ein neues höchst ergiebiges Zinnoberbergwerk Ober-Californien eröffnet worden. Lyman (2), der selbe besuchte, schreibt darüber d. d. 24. Mai 1848: Almaden liegt zwischen San Francisco und Monterey bei der Küste, 1200 Fufs über der Ebene, auf einem F der Sierra Azul, welche aus einem grünlichem Talk besteht. Der Zinnober findet sich nesterweise in 42 Schuhe mächtigen Schicht gelblicher Erde. Das kommen war den Eingebornen seit undenklicher Z Grube der rothen Erde bekannt, wovon sie zum Be ihrer Körper holten. Während Lyman's Anwes gewann man täglich aus 1600 Pfund Zinnober in not tigen Destillationsapparaten 2 bis 300 Pfund Queck in den letzten 3 Wochen im Ganzen etwa 10,000 l Der Zinnober wird ausserdem noch an 15 bis 20 s Stellen im Umkreis weniger Meilen gefunden.

Nadelierz. Chapman (3) hat Nadelierz von Ekatherine in Sibirien analysirt. Dünne prismatische Krystalle Quarz sitzend und von Malachit begleitet. Härte = 2,5. Spec. Gewicht = 6,1.

	S	Bi	Pb	Cu	Summe
I.	18,89	28,04	40,43	12,64	100,00
II.	16,56	36,73	35,77	10,94	100,00

Chapman leitet aus seinen Zahlen die bekannt des Bournonits correspondirende Formel : $3 Cu_2 S$,

(1) Haidinger's Abhandl. (vergl. S. 1147) I, 107; Haiding. I II, 18; im Ausz. Pogg. Ann. LXX, 148. — (2) Sill. Am. J. [2] — (3) Chem. Gaz. 1847, 337.

+ 2 (3 PbS, BiS₃) ab, welche aber die unter II) berechneten Procente verlangt. Zwar stehen S, Pb und Cu im richtigen Verhältniß; von Bi ward aber $\frac{1}{3}$ zu wenig erhalten. Eine Correction ist nicht erlaubt, weil Chapman sonst einen Ueberschuß von 12,8 pC. erhalten haben müßte; eine andere Formel, welche Wahrscheinlichkeit für sich hätte, läßt sich aber auch nicht berechnen.

Jamesonit von einem neuen Fundort zu Arany-Idka ^{Jamesonit.} in Ober-Ungarn ward von Löwe (1) analysirt. Spec. Gewicht 5,601. Vor dem Löthrohr auf Kohle leicht schmelzbar, unter Beschlag von Bleioxyd und antimoniger Säure.

S	Sb	Pb	Cu	Ag	Fe	Zn	Bi	Gangart	Summe
18,069	32,168	39,668	1,729	1,440	2,909	0,339	0,214	2,815	99,851

Löwe berechnet daraus die Formel 2 (Pb S, Sb S₃) + Pb S, welcher in der That die für S, Sb und Pb gefundenen Zahlen ganz gut entsprechen; es bleibt aber dann gar kein S für die andern Metalle übrig, welche davon 4,188 pC. verlangen.

Nach einer von Poselger (2) in Rammelsberg's ^{Federerz.} Laboratorium ausgeführten Analyse hat ein von Zincken auf der Antimongrube bei Wolfsberg gefundenes derbes Mineral von 5,6788 spec. Gewicht die Zusammensetzung des Federerzes.

Pb	Sb	S	Summe
48,48	32,98	20,32	101,78

Pettko (3) analysirte Berthierit von Arany-Jdka ^{Berthierit.} in Ober-Ungarn. Spec. Gewicht = 4,043. In Chlorwasserstoffsäure unter Entwicklung von Schwefelwasserstoffgas und ohne Abscheidung von Schwefel löslich. — Zusammensetzung die des gleichen Minerals von Anglar nach Berthier's Analyse:

FeS + SbS ₃	S	Sb	Fe	
gefunden	29,270	57,882	12,848	100,0
berechnet	28,95	58,38	12,67	100,0

(1) Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) I, 62. — (2) Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 44. — (3) Haidinger's Berichte, I, 62.

Fahlerz.

Volger (1) sucht zu beweisen, daß die bekannten schönen Ueberzüge von Kupferkies auf Schwarzgültige vom Rosenhöferzug bei Clausthal nicht bloße Inkrustationen sondern Pseudomorphosen nach Fahlerz seien.

Sachsenheim (2) beobachtete an Fahlerz vom H. das seither nicht bekannte Hexakisoctaëder $\frac{3}{2} O$ untergeordnet in Combination.

Wasserfreie
Oxyde.
Rothzinkerz.

Whitney (3) analysirte grobkörniges, in Franklin eingesprengtes Rothzinkerz von der Franklinhütte (I), und großblättriges, von blättrigem Magneteisen begleitetes von Sterling (II).

	ZnO	Mn ₂ O ₃	Unzersetzt	Glühverlust	Summe
I.	94,45	Spuren	4,49	1,09	100,03
II.	96,19	3,70	0,10	„	99,99

Es ist hierdurch entschieden, daß der von Berthier und Bruce gefundene größere Mangengehalt unwesentlich ist. Das Pulver des Rothzinkerzes von der Franklinhütte soll sich nach dem Glühen mit tiefrother Farbe in Schwefelsäure lösen.

Mennige.

Noeggerath (4) erhielt vom Dombaumeister Zwin ein Stück Blei, womit eiserne Klammern am Dom zu Clausthal eingegossen waren, und welches sich unter dem lang andauernden Einfluß der Atmosphäre mit einer dünnen Schicht Mennige bedeckt hatte, am stärksten an den Berührungstellen mit dem Gestein (Trachyt vom Drachenfels).

Uranpfecherz.

Hinsichtlich des Uranpfecherzes vergl. S. 1167.

Arkansit.

Shepard (5) hat seine frühere (6) Beschreibung von Powell zu Magnet-Cove in Nordamerika entdeckten Arkansits vervollständigt. Die kleinen undeutlich spiegelnden Krystalle sind Combinationen eines rhombischen Octaëders mit $\infty P_x \cdot \infty \bar{P}_x$ und $x\bar{P}_x$, ersteres Prisma mit Würfeln von 101° bis $101^\circ 15'$, letzteres von 123° . Spec. Gr.

(1) Pogg. Ann. LXXIV, 25. — (2) Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) IV, 431. — (3) Pogg. Ann. LXXI, 169. — (4) Jahrb. Min. 1847, 1. Heft. — (5) Sill. Am. J. [2] IV, 279. — (6) Sill. Am. J. II, 250.

= 3,854. Shepard hatte früher Titansäure und Yttererde als Bestandtheile des Arkansits angegeben. Nach wiederholter qualitativer Prüfung soll die Säure Niobsäure sein. (Nach neueren Untersuchungen, deren Mittheilung dem Jahresbericht für 1849 vorbehalten bleiben muß, ist der Arkansit eine Varietät des Brookits.)

Riegel (1) untersuchte schön krystallisirten Braunstein Pyrolusit.
von Krettnich:

	MnO, Mn ₂ O ₃	O	CuO	Fe ₂ O ₃	HO	Unlöslich	Summe
I.	84,40	11,50	Spur	0,54	1,10	2,06	99,60
II.	86,00	11,65	Spur	0,40	1,40	0,71	100,16

Nach Völcker (2) enthält der Braunstein häufig Kobalt. Dieses, sowie auch Nickel, hatte Gregory schon früher darin nachgewiesen (3).

Rhodus (4) analysirte schlackiges Magneteisen aus Titaneisen.
dem Basalt vom Virneberg bei Rheinbreitbach (Sp. G. = 5,1), und fand es zusammengesetzt wie das von Unkel nach Rammelsberg's Analyse (5):

Fe	O	TiO ₂	Summe
65,87	24,50	9,63	100,00

Nimmt man mit Rose und Scheerer das Titan als Oxyd an, so berechnet sich aus vorstehenden Zahlen die Formel $(6 \text{ FeO}, \text{Fe}_2 \text{O}_3) + (4 \text{ Ti}_2 \text{O}_3, 5 \text{ Fe}_2 \text{O}_3)$, wonach das Mineral ein Gemenge von Magneteisen mit Titaneisen von der Zusammensetzung dessen vom Ilmensee ist.

Tchihatscheff (6) hat in Kleinasien ein neues sehr Smirgel.
bedeutendes Vorkommen von Smirgel entdeckt. Das Mineral findet sich in großen, aus Kalkstein ausgewitterten Blöcken, in den Thalschluchten zwischen dem Dorfe Eskihissar (Stratonicea der Alten) und dem See Akistschai (Latmus); in größerer Menge aber an den Abhängen des Gummugdagh (mons Thorax), Almandagh und des Samsun-

(1) Jahrb. pr. Pharm. XVI, 319; J. pr. Chem. XLV, 455. —

(2) Ann. Ch. Pharm. LIX, 27. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 277. —

(4) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 219. — (5) Rammelsb. Handw. 1. Suppl. 144. — (6) Compt. rend. XXVI, 363.

dagh (Mykale). Auch auf Samos soll kürzlich Smirgel gefunden worden sein.

Quarz.

Durch schnelles Erhitzen oder Abkühlen erhielt Kergott (1) an Bergkrystallen deutlichere Spaltungsflächen als man seither beobachtete. Sie liegen sowohl nach als nach $-R$, und verursachen auf ∞P eine netzartige Zeichnung, deren Linien parallel den Combinationsebenen einer vorherrschenden R Fläche mit den seitwärts liegenden Flächen von ∞P sind. Nur Ein Krystall bekam Spaltungsflächen nach einem einzigen R . Manche Krystalle wurden rothglühend in kaltem Wasser gelöscht innen feinfaserig seidenglänzend; die Fasern waren so gegen die Axe geneigt, daß der Querbruch einerseits ein kegelförmiges Ende, anderseits eine entsprechende Vertiefung zeigte.

Chalcedon.

Rennenkampf (2) glaubt in etwa 200 auf dem Hundstode gesammelten Moosachatzen, Baumsteinen und Mokka-Steinen Abdrücke gewisser Moosarten, Tremellen mit Keimkörnern, Cladonien etc. zu erkennen. Sie sollen mit ihren Verzweigungen durch die Absatzschichten der Chalcedon hindurchtragen, während Dendritbildungen sich nur zwischen denselben und auf Klüftchen finden. Göppert (3) ist dagegen der Ueberzeugung, daß wirkliche Pflanzenschlüsse in Chalcedon nicht existiren.

Wasserhaltige
Oxyde.
Hyalith.

Bei Fortsetzung seiner früheren Versuche (4) erhielt Ebelmen durch sehr langsame Zersetzung mit Alkalien gemischten Kieselsäureäthers an feuchter Luft vollkommen reine und durchsichtige Massen künstlichen Hyaliths, Hydrophan's von ansehnlicher Größe (5). Durch Zugabe geistiger Lösungen von Farbstoffen zum Aether konnten die Hyalithe farbig erhalten werden, und durch Zusatz Goldchlorid bekam er topasgelbe Massen, aus denen unter dem Einfluß des reflectirten Sonnenlichts feine Gitterlinien hervortraten.

(1) Pogg. Ann. LXXIII, 603. — (2) Jahrb. Miner. 1847, 26.
(3) Flora 1848, 29; im Ausz. Jahrb. Miner. 1848, 750. — (4) Ann. phys. [3] XVI, 129; im Ausz. Berzelius' Jahresber. XXV, 754.
(5) Compt. rend. XXV, 855.

blättchen auschieden, welche der Masse das Ansehen des schönsten Avanturin's gaben.

Ueber das Vorkommen und die Gewinnung des edlen Edler Opal.
Opals bei Kaschau hat Pulsky (1) nähere Nachrichten mitgetheilt. Die ältesten Opalgruben sind wahrscheinlich die sogenannten 50 Gräber: zahllose verschüttete Schachte in einem Thal bei Czerwenitza. Die jetzt in Betrieb stehenden Gruben befinden sich an den Bergen Simonka und Libanka, wo der Opal gangartig und auf Höhlen in Trachyt vorkommt, und bei unvollständiger Erfüllung der letzteren eine horizontale Oberfläche und horizontale Schichtungsflächen zeigt, ein Beweis, daß derselbe ursprünglich flüssig gewesen. Schon bei der Gewinnung hat er viele Sprünge, oder bekommt dieselben in kurzer Zeit.

Salvetat (2) untersuchte Kieselguhr aus der Umge- Kieselguhr.
gend von Algier. Er enthält 9 pC. Wasser und giebt an Kalilauge 80 pC. amorphe Kieselsäure ab. Der thonige Rückstand besteht aus 6,48 pC. SiO_2 , 1,41 Al_2O_3 , 0,55 Fe_2O_3 , 0,56 CaO , 2,0 MgO , K_2O und NaO . — Salvétat nennt diesen Kieselguhr Randanit, wegen der Aehnlichkeit mit dem von Randan und Ceyssat. Die Kieselsäure darin hält er für ein Hydrat von fester Zusammensetzung, $= 2\text{SiO}_2 + \text{HO}$ bei 16° und $= 4\text{SiO}_2 + \text{HO}$ bei 100° getrocknet. Wegen der 11 pC. beigemengten Thons ist dies aus obigem Guhr nicht zu beweisen.

Marignac (3) hat kleine, sehr deutlich ausgebildete Diaspor.
und mit spiegelnden Flächen versehene Diasporkrystalle auf rothem Korund im körnigen Dolomit vom St. Gotthard gefunden, und durch Messung derselben die Angabe Haidinger's (4) bestätigt, daß der Diaspor dem rhombischen Krystallsystem angehöre. Der gemessene Krystall stellte eine Combination von $\infty P. \infty \check{P} 3. \infty \check{P} 4. \infty \check{P} \infty. P. 2 \check{P} 2. 2 \check{P} \infty$,

(1) Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) III, 213; Jahrb. Miner. 1848, 828. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 848. — (3) Arch. ph. nat. VI, 296. — (4) Pogg. Ann. LXI, 307.

ähnlich dem Topas dar. Einige der wichtigsten gemessene Winkel sind :

$P = 151^{\circ}36'$ im brach. H. Schn., $116^{\circ}38'$ im makr. H.S., — ind.
 $2\check{P}2 = 126^{\circ}12'$ „ „ „ „ $122^{\circ}15'$ „ „ „ „ $97^{\circ}0'$ „
 $2P = 130^{\circ}0'$ „ „ „ „ — „ „ „ „ — „
 $\infty\check{P}\infty = 117^{\circ}46'$ „ „ „ „ — „ „ „ „ — „

Aus den beiden letzteren folgt Hauptaxe : Makrodiagon
 Brachydiagonale = 0,3018 : 1 : 0,4680. Spaltbar
 $\infty\check{P}\infty$. Auf ∞P gestreift.

Hydrargillit.

Hermann (1) analysirte den Hydrargillit von Schischinskaja-Gora (Slatoust) (2), nachdem er ihn durch Digestion mit Salzsäure durchsichtig und perlmutterglänzend erhalten hatte. Spec. Gew. = 2,387. Nach Abzug von schwefelsaurer Thonerde gab derselbe die seither dem Gillebrandit (s. d.) zugeschriebene Zusammensetzung : $Al_2O_3 + 3HCl$. Dieselbe Zusammensetzung besitzt nach Kobell (3) das seither für Wawellit gehaltene Mineral von Villa Rica in Brasilien (II).

	Al_2O_3	HO	PO_3	Summ
I.	64,03	34,54	1,43	100,0
II.	65,6	34,4	„	100,0
Rechnung	65,56	34,44	„	100,0

*) Nebst Spuren von Fe_2O_3 und SO_3 .

Bohnerz.

Delesse (4) untersuchte das früher von Berthier analysirte magnetische bohnerzähnliche Mineral von St.-Brieux (Côtes du Nord). Spec. Gewicht 3,988. Zusammensetzung :

SiO_2	Al_2O_3	Cr_2O_3	Fe_2O_3	FeO	CaO	HO	Kohle	Thon	Si
6,50	7,50	0,50	65,45	13,25	0,45	4,85	1,30	0,20	1

Manganate.
Crednerit.

Ein von Credner zu Friedrichsrode mit dem Borthit (siehe diesen) zusammen gefundenes neues Kupfermanganerz (6) wurde von diesem selbst (7) und von Rammelsberg analysirt (8). Der letztere benannte es. — E

(1) J. pr. Chem. XL, 2. — (2) G. Rose, Reise n. d. Ural II, Pogg. Ann. XLVIII, 564. — (3) J. pr. Chem. XLI, 152; Jahrb. 1848, 705. — (4) Ann. des mines [4] XIV, 69. — (5) Essais par la méthode II, 248. — (6) Jahrb. Miner. 1847, 5. — (7) u. (8) Pogg. Ann. LXXIV

rige oder körnige Massen in Psilomelan oder Hausmannit eingewachsen. Drei einem schiefen rhombischen Prisma entsprechende Spaltungsrichtungen; auf der vollkommensten (OP?) lebhaft metallglänzend und rhombisch gestreift. Etwas spröde. Bruch uneben. Härte = 4,5 bis 5, spec. Gew. 4,89 bis 5,07 (Cr.), 4,95 bis 4,97 (R.). Undurchsichtig, eisenschwarz. Strich schwarz in's Bräunliche. Nur dünne Splitter an den Kanten schmelzbar. Giebt mit Soda auf Kohle ein geschmeidiges Kupferkorn, mit Salzsäure Chlor, aber nicht mehr nach dem Glühen in Wasserstoff, wobei es 13,5 bis 13,58 pC. an Gewicht verliert (R).

Crednerit.

		CuO	MnO	CaO	BaO	Mn ₂ O ₃	O	HO	Rückst.	Sme.
Cred- ner	1)	43,85	—	—	—	55,73	—	—	—	99,58
	2)	42,13	22,96	0,63	0,52	31,25	—	0,25	0,63	98,35
Ram- mels- berg	1)	23,73	64,24	—	2,01	—	8,83	—	—	98,81
	2)	32,35	56,29	0,76	3,08	—	8,58	—	—	99,06
	3)	34,65	54,72	—	2,71	—	6,51	—	—	98,59
	4)	40,02	51,69	—	1,04	—	—	—	—	—
	5)	40,65	52,55	—	1,48	—	5,78	—	—	100,46

Alle Proben enthielten Spuren von VO₃. — Credner stellt die dem Volborthit analoge Formel 4 (CuO, MnO), Mn₂O₃ auf; Rammelsberg aber, da der Sauerstoff hinreicht alles MnO als Mn₂O₃ anzunehmen, die Formel 3 (CuO, BaO), 2 Mn₂O₃, nach welcher die Analyse 51,39 MnO und 5,76 Sauerstoff geben mußte, übereinstimmend mit den zwei letzten Bestimmungen, wozu das reinste und frischeste Material verwendet ward.

Ueber künstliche Mineralien der Spinellreihe vergl. S. 23; (Spinelle.) über ein neues Hexakisoctaëder am Magneteisen S. 25.

Ferrate.
Magneteisen.

Genth (1) untersuchte den sogenannten Eisenmulm, der sich auf der Grube Alte Birke bei Siegen in der Nähe eines Basaltdurchbruchs durch stark manganhaltigen Spath-eisenstein findet. — Schwarz, abfärbend, stark vom Magnet angezogen. Spec. Gewicht = 3,76.

	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	Sand	Summe
1)	66,71	—	17,11	1,34	—
2)	—	13,65	17,62	1,57	—
3)	65,68	14,09	16,25	2,34	98,36

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 270.

Außerdem Spuren von Co, Cu, CO₂ und HO.— Mulm ist demnach erdiges Magneteisen, worin über Hälfte FeO durch MnO ersetzt ist. Er ist offenbar die Einwirkung des Basalts auf den Spatheisenstein entstanden. (Vergl. S. 443.)

Aluminate.
Chromelaiten.

Moberg (1) vermuthet, daß der Chromeisenstein Pyrop das Chrom nicht als das gewöhnliche Oxyd enthalten, da es sich bei ihnen nicht wie gewöhnlich in der Fe zu erkennen giebt und außerdem Berthier's, Laugier Seybert's und Abich's Analysen nicht genau das Stoffverhältniß von RO : R₂O₃ = 1 : 3 geben. Er ansieht deshalb einen kaum magnetischen und vorher mit Säure digerirten Chromeisenstein von Beresow (I), und seine Ansicht dadurch bestätigt, daß er obiges Sauerstoffsverhältniß = 1 : 3,727 fand. Die Analyse hiernach berechnet giebt die unter II stehenden Zahlen (At. Gew. von Cr = 26,

	Cr ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	CrO	FeO	MgO	SiO ₂	Summ
I.	64,17	10,83	—	18,42	6,68	0,91	101,
II.	58,40	10,83	5,17	18,42	6,68	9,91	100,

Vergl. S. 414 dieses Berichts.

Kristallinit.

Kobell (2) analysirte den von ihm bei Bodenmais gefundenen und von Breithaupt (3) Spinellus superior genannten Spinell. Nach Abzug von 10 pC. unzersetzter Rückstandes und Berechnung des nicht direct bestimmten Eisenoxyduls ist die gefundene Zusammensetzung:

Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	ZnO	MnO	MgO	Summe
49,73	8,70	8,04	26,72	1,45	3,41	98,5

Gemäß seinen Ansichten über Mineralspecies mit isomorphen Bestandtheilen (vergl. S. 1150) betrachtet Kobell dieses Mineral als ein neues Zwischenglied der Spinelle, zusammengesetzt aus Pleonast und einem dem Ferrosinilit analog zusammengesetzten Mittelglied, letzteres verhaltend, = (MgO, Al₂O₃ + FeO, Al₂O₃) ÷ (ZnO, Al₂O₃ + FeO, Fe₂O₃). Statt des nicht mineralogisch klingenden

(1) J. pr. Chem. XLIII, 114. — (2) J. pr. Chem. XLIV, 99.

(3) Breithaupt, Handb. der Min. III, 623.

Breithaupt'schen Namens schlägt er den Namen Kreittonit vor, wie voriger in Beziehung auf das hohe spec. Gew. (4,49).

Den Namen Coracit giebt Le Conte (1) einem von Coracit.
Stannard an der Nordküste des oberen Sees gefundenen Mineral, wo dasselbe 2 Zoll mächtige Gangspalten in Syenit erfüllt. Amorph mit rauhem muschligem harzglänzendem Bruch. Schwarz mit grauem Strich. $H.=4,5$, $sp.G.=4,378$. Vor dem Löthrohr für sich unverändert; mit Flüssen Uranreaction. In Salzsäure leichtlöslich; Lösung gelblich grün. Eine quantitative Analyse ward nicht gemacht, da das Mineral zu sehr von Quarz, Kalkspath und Magnetkies durchwachsen war. Da aber die qualitative Untersuchung aufser etwas Thorerde, wahrscheinlich von beigemengtem Thorit, hauptsächlich Uranoxydul und Thonerde nachwies, so betrachtet Le Conte das Mineral als Uranpecherz, worin U_2O_3 zum Theil Uranpecherz
durch Al_2O_3 ersetzt wäre. Diese Meinung gewinnt dadurch an Bestand, dafs Scheerer (2) auf dem Gebirgsrücken Strömsheien bei Valle (Norwegen) erbsengrofse reguläre Octaëder mit abgestumpften Ecken von Uranpecherz fand, vom spec. Gewicht = 6,71 und folgender Zusammensetzung:

U_2O_3	$(NbO_3, PeO_3, SiO_3, PbO)$	MnO	HO	Unlös. u. Verl.	Summe
76,6	15,6	1,0	4,1	2,7	100,0

Zwar ist nach dieser nur mit 0,718 Grm. ausgeführten Analyse das Erz sehr unrein und, wie der Wassergehalt zeigt, schon stark zersetzt, aber zusammengehalten mit der Krystallisation und der anerkannt den Spinellsubstanzen analogen Zusammensetzung des Uranpecherzes dürfte die Analyse doch genügen, letzteres der Spinellgruppe zuzuweisen und die Isomorphie von U_2O_3 mit Al_2O_3 u. s. w. darzuthun.

Haidinger (3) weist nach, dafs Descloizeaux's Chrysoberyll
Messungen des Chrysoberylls nur annähernd richtig sind, und bemerkt, dafs derselbe besser gethan hätte, sich die Vollständigkeit und Genauigkeit der deutschen krystallogra-

(1) Sill. Am. J. [2] III, 173. — (2) Pogg. Ann. LXXII, 569; N. Jen. Lit.-Ztg. 1848, 855. — (3) Haiding. Berichte (vergl. S. 1147) II, 445.

phischen Arbeiten zum Muster zu nehmen, statt zu sagen: »man habe bisher nur *les quelques nombres* von Phil und Mohs gehabt.«

Wasser-
haltiges
Aluminat.
Völcknerit.

Hermann (1) analysirte ein neues seltenes Mineral dem Talkschiefer der Schischinskaja bei Slatoust, welches von Capt. Völckner erhielt. — Weisse perlmutterglänzend, fettig anzufühlende Blättchen, auch hexagonale Tafeln, sehr vollkommen spaltbar nach 0 P, minder gut nach C. Spec. Gewicht = 2,04. Vor dem Löthrohr sich aufbläht, stark leuchtend, unschmelzbar. In Säuren leicht löslich unter Entwicklung von 3,92 pC. CO₂, welche Hermann als aus der Luft angezogen betrachtet. Die Zusammensetzung ist 6 (MgO, 2HO) + Al₂O₃, 3 HO.

	Al ₂ O ₃	MgO	HO	Summe
Gefunden	17,65	38,59	43,76	100,0
Rechnung	16,55	39,95	43,50	100,0

Rammelsberg berechnete daraus die Formel (MgO, Al₂O₃ + 10HO) + 5 MgO, HO (2), später aber wahrscheinlichere: MgO, Al₂O₃ + 5 (MgO, 3 HO). (3)

Silicate im
Allgemeinen.
Classification.


Chapman (4) hat eine Classification der Silicate rein chemischen Principien ausgearbeitet, und hält sie wesentlich verschieden von allem, was vorher da gewesen ist, aber ganz dieselbe, welche Rammelsberg (5) Uebersicht der Formeln der Silicate gegeben.

Formeln und
Classification.

Laurent (6) findet die seitherigen, nach dem chemischen Princip eingerichteten Formeln der natürlichen Silicate complicirt und phantastisch. Sie drücken deren Zusammensetzung nicht mit Sicherheit aus, machen die Classification unsicher und erschweren nur das Studium der Silicate durch ihre zahlreichen Widersprüche. Um alle diese Uebelstände zu beseitigen, schlägt Laurent neue einfache Formeln vor, welche sich auf die Annahme gründen,

(1) J. pr. Chem. XL, 12. — (2) Rammelsb. Handw. 3. Suppl. — (3) N. Jen. Lit.-Ztg. 1848, 855. — (4) Chem. Gaz. 1848, 3. — (5) Rammelsb. Handw. 2. Suppl. 302. — (6) Compt. rend. XXIII, n. XXIV, 94; im Ausz. J. pharm. [3] XII, 70.

die Kieselsäure = Si O und mehrbasisch sei, und daß Formeln und Classification der Silicate. alle Metalloxyde, welche Salze bilden können, aus gleichviel Aequivalenten Metall und Sauerstoff zusammengesetzt und wenigstens zum Theil unter einander isomorph seien (vergl. S. 31). Es lassen sich dann alle Silicate unter folgende Typen bringen :



Zu jedem dieser Typen gehört eine Anzahl wasserhaltiger oder basischer Subtypen von der Form $n\text{SiO} + 2(\text{R})\text{O} + n\text{RO}$. — Laurent's Theorie ist von Rammelsberg (1) einer ausführlichen, aber nicht günstigen Beurtheilung unterworfen worden, was Gerhardt's Mißfallen erregte (2). Jedenfalls muß anerkannt werden, daß bei vielen Silicaten der Sauerstoff der Basen RO und R_2O_3 zusammengenommen dem der Kieselsäure gleich oder nahe gleich kommt. Vergleiche z. B. Epidot, Idokras u. a.

Rammelsberg (3) hat eine den Mineralogen und Chemikern gleich willkommene Uebersicht der natürlichen Silicate nach den Sauerstoffverhältnissen ihrer Bestandtheile ausgearbeitet.

Unterstützt von D. Forbes hat John Percy eine Künstliche Silicate. (Schlacken.) Reihe krystallisirter Schlacken untersucht (4).

- (1) J. pr. Chem. XL, 374. — (2) J. pharm. [3] XIII, 70. — (3) Rammelsberg's Handwörterbuch, 3. Suppl. 134; Pogg. Ann. LXXII, 95. — (4) Report of the 16. Meeting of the British Association for the Advancement of Science, 351.

No.	Spec. Gew.	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	CaO	MgO	KO	CaS	
1	2,905	38,05	14,11	—	1,27	0,40	35,70	7,61	1,85	0,82	
2	2,915	38,76	14,48	—	1,18	0,23	35,68	8,84	1,11	0,98	
3	2,924	37,63	12,78	—	3,91	2,64	33,46	6,64	1,92	0,88	
4	2,918	37,91	13,01	—	0,93	2,79	31,43	7,24	2,60	3,65	
5	—	39,52	15,11	—	2,02	2,89	32,52	3,49	1,06	2,15	
6	—	42,06	12,93	—	4,94	2,26	32,53	1,06	2,69	1,03	0,31 *)
7	—	28,32	24,24	—	0,27	0,07	40,12	2,79	0,64	3,38	0,26 **)
8	—	45,59	11,88	—	1,11	0,91	38,20	—	—	1,76	
9	—	53,37	5,12	—	0,95	1,41	30,71	9,50	—	—	
10	—	53,76	4,76	—	1,48	1,30	29,48	9,82	—	—	
11	—	55,77	13,90	—	2,12	2,52	22,22	2,10	1,78	—	0,46 ***)
12	—	22,76	7,30	—	61,28	3,58	3,41	0,76	—	—	
13	4,080	29,60	1,28	17,11	48,43	1,13	0,47	0,35	—	—	1,61 †)
14	4,188	23,86	0,91	23,75	39,83	6,17	0,28	0,24	—	—	0,62 †)

*) 2 Al₂O₃, 3 P₂O₅.**) CaO, SO₃.

***) S.

†) FeS.

Künstliche
Silicate.
(Schlacken)

No. 1) bis 6) sind Hohofenschlacken : 1) und 2) von ley, 3) und 4) von Russelshall bei Dudley, 5) von We bury bei Tipton und 6) von Marchienne bei Cha (Belgien). Alle sind tetragonal : $\infty P. 0 P$, auch mit ∞ sie sind durch Salzsäure zersetzbar und zusammengesetzt der Humboldttilit nach Damour (1): $2(3 RO, SiO_2) + Al_2 Si O_5$. — No. 7) ist ebenfalls Hohofenschlacke, von bury; weisse durchsichtige tetragonale Tafeln. Perc trachtet sie als Gehlenit, und stellt für diesen die Formel $3(3 CaO, Si O_2) + 3 Al_2 O_3, Si O_2$ auf (vergl. S. 11). No. 8) ist aus einem Cupolofen, worin Gufseisen unter Zug von Kalk umgeschmolzen wurde; lange gelbe tetragonale Prismen, nach $0 P$ spaltbar, zusammengesetzt wie Humboldt nach Kobell's (2) Analyse : $3(2 RO, SiO_2) + Al_2 O_3, Si O_2$. — No. 9) und 10) sind feine monoklinometrische Prismen, strahlige Massen aus dem Hohofen bei Olsberg am Rammelsberg; sie nähern sich hinsichtlich der Zusammensetzung mehr thonerdehaltigen Augiten. — No. 11) ist aus einem Hohofen bei Seraing, und gleich den vorigen in Salzsäure unlöslich.

(1) Rammelsberg's Handwörterb. 2. Suppl. 64. — (2) Rammelsberg's Handw. I, 315.

No. 12) ist aus einem Feinheerd von Bromford bei Birmingham. — No. 13) und 14) stammen aus Puddelöfen, letztere von Bloomfield bei Tipton; es sind rhombische Krystalle, $\infty P \cdot \infty \check{P} \infty \cdot 2 \check{P} \infty$, mit den Winkeln des Chrysoliths, spaltbar nach $0 P$; nach Percy Eisenchrysolithe, deren Eisengehalt erst später zu Oxyd wurde.

Precht (1) fand in einem klar geschmolzenen Gläsatz von $1\frac{1}{4}$ Centner Gewicht, dem man eine bedeutende Quantität Feldspath zugesetzt hatte, nach dem Erkalten einen Theil dieses Minerals in blättrigen Massen und einigen großen deutlichen Krystallen wieder ausgeschieden.

Künstliche
Feldspath-
Krystalle.

Gibbs (2) analysirte hellbraunen Zirkon von Litchfield (Maine, Nordamerika), spec. Gewicht = 4,7 (I.); und Damour (3) von Alluaud d. ä. im Schriftgranit von Chanteloube (Haute Vienne) gefundenen Malakon (III. und IV.) Letzterer bildete kleine zimmetbraune Blättchen von 4,047 spec. Gew.; ein einziger deutlicher Krystall wurde gefunden, von der Form und nahe denselben Winkeln wie Zirkon: $P \cdot \infty P \infty \cdot 4 P 4$; $P = 83^\circ 30'$ (Mittelkante) und $124^\circ 40'$ (Polk.).

Wasser-
freie Sil-
cate mit
Basen
 R_2O_3 .
Zirkon und
Malakon.

	Si O ₂	ZrO	Fe ₂ O ₃	Mn ₂ O ₃	CaO	HO	Unzers. Rückst.	Summe
I.	35,26	63,33	0,79	—	—	—	0,36	99,74
II.	31,23	61,70	2,91	Spur	Spur	3,29	—	99,13
III.	30,87	61,17	3,67	0,14	0,08	3,09	—	99,02

Damour hält den Wassergehalt des Malakons für wesentlich, wegen der Uebereinstimmung mit Scheerer's Analyse, während dieser selbst und andere Autoren die von denen des Zirkons abweichenden Eigenschaften des Malakons durch die Annahme einer allotropischen Modification der Zirkonerde in letzterem erklären (4).

Schneider (5) analysirte in Marchand's Laboratorium ächt chinesischen Agalmatolith, spec. Gewicht = 2,763.

Mit Basen
RO.

Agalmatolith.

(1) Wien. Acad. Ber. II, 230. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 559. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 87. — (4) Pogg. Ann. LXII, 436; Berz. Jahresber. XXV, 327; Rammelsberg's Handwörterb. 2. Suppl. 179. — (5) J. pr. Chem. XLIII, 317.

SiO ₂	MgO	FeO	MnO	Al ₂ O ₃	HO
63,28	31,92	2,26	0,23	0,53	0,78

Die Analyse führt zu der Formel 6 MgO , 5 welche Kobéll für den Talk vom Greiner und von siansk aufstellte (1).

Augit.

Delesse (2) analysirte krystallisirten spargelg Augit aus dem Porphyr von Ternuay (I); spec. Gew. = 3,135. — Gruner (3) untersuchte ein blafsgrü graues seidenglänzendes Mineral von Collobrières (D du Var), wo es mit Magneteisen und Granat verwa ein nicht unbedeutendes Lager in Glimmerschiefer l Spec. Gewicht = 3,713 (II).

SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	CaO	MgO	HO
I. 49,00	5,08	7,19	Spur	18,78	15,95	2,26
II. 43,9	1,9	52,2	—	0,5	1,1	—

Delesse zieht den Wassergehalt des Augits als mer-isomorph in Rechnung, allein auch ohnediefs giebt Analyse die Augitformel, wenn man den Sauerstof Si O₂ und Al₂ O₃ zusammenrechnet. — Gruner betr das von ihm untersuchte Mineral als Eisenaugit. Formel 3 Fe O , 2 Si O_2 verlangt 54,38 pC. Fe O und 45, Si O₂, womit seine Analyse nahe stimmt.

Hornblende.

Delesse (4) analysirte (I) grüne blättrige und fa: Hornblende aus dem Kugeldiorit von Corsika, sp. Gew. = derselbe (II) dunkelgrüne krystallisirte, schwer sch bare, aus dem Syenit von Servance (5), spec. Gew. = Moberg (6) analysirte eine Hornblende von Kimito

	Si O ₂	Al ₂ O ₃	Cr ₂ O ₃	FeO	MnO	CaO	MgO	NaO	KO	HO u. F.H.
I.	47,88	8,23	0,50	16,15	Spur	7,05	18,40	0,65	0,14	1,00
II.	47,40	7,35	—	15,40	Spur	10,83	15,27	2,95	—	(HO) 1,00
III.	43,23	11,72	—	26,81	1,60	9,71	7,03	—	—	—

- (1) Kastner's Arch. XII, 29; Rammelsb. Handw. II, 189. — (2) rend. XXV, 637; J. pr. Chem. XLV, 223; Jahrb. Miner. 1848, (3) Compt. rend. XXIV, 794; Ann. des mines [4] XIV, 800. — (4) ch. phys. [3] XXIV, 437; Compt. rend. XXVII, 411; Instit. 1848, (5) Ann. des mines [4] XIII, 679; Mémoires de la société d'émulat Doubs, 1847; im Ausz. J. pharm. [3] XII, 456; Arch. ph. nat. V, (6) Act. soc. sc. Fenn. II, 810; J. pr. Chem. XLII, 454.

Unter Annahme, dafs 1 Aequiv. Al_2O_3 für 1 Aequiv. SiO_2 isomorph eintreten könne, geben die 2 ersteren Analysen das Sauerstoffverhältnifs von RO zu $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3$ nahe wie 4 : 9. Die letzte giebt dieses Verhältnifs wie 4 : 9,556.

Genth (1) analysirte kleine, stark glasglänzende, hellgelbgrüne Chrysolithkörner (I) aus der Thjorsa-Lava vom Hekla (vergl. bei Laven); spec. Gewicht = 3,226 bei 17°. — Rhodius (2) analysirte einen zersetzten undurchsichtigen wachsglänzenden Olivin (II) aus dem verwitterten Basalt vom Virneberg bei Rheinbreitbach, spec. Gewicht = 1,98. Er wird von Salzsäure vollkommen zersetzt (vergl. S. 1154).

	SiO_2	MgO	Fe_2O_3	FeO	NiO	CoO	Al_2O_3	Summe
I.	43,44	49,31	—	6,93	0,32	Spur	Spur	100,0
II. a)	49,2	16,8	1,4	31,5	—	—	—	98,9
II. b)	53,6	18,0	0,7	26,1	—	—	—	98,4
ber. n. Rh.	52,7	17,5	—	29,8	—	—	—	100,0

Genth's Analyse führt zur bekannten Formel $3\text{RO}, \text{SiO}_2$. Rhodius berechnet $2\text{SiO}_2, (\text{MgO}, \text{FeO}) = 4\text{SiO}_2, 3(\text{MgO}, \text{FeO})$, wonach dieser Olivin bei seiner Zersetzung $\frac{1}{3}$ seiner Basen verloren hat.

Rosengarten (3) analysirte in Rammelsberg's Laboratorium Willemits aus Oberschlesien (I); Monheim (4) solchen vom Busbacher Berg bei Stolberg, und zwar krystallisirten vom spec. Gewicht 4,18 (II.a), und dichten vom spec. Gewicht 4,02 bis 4,16 (II.b). Der letztere beschrieb auch das Vorkommen des Willemits am Busbacher Berg, sowie am Altenberg bei Aachen. Alle Analysen entsprechen der Formel $3\text{ZnO}, \text{SiO}_2$.

	SiO_2	ZnO	Fe_2O_3	FeO	CaO	MgO	CO_2	Summe
I.	27,34	70,82	—	1,81	—	—	—	99,97
II. a)	26,90	72,91	0,35	—	—	—	—	100,16
II. b)	26,53	69,06	4,36	—	0,41	0,13	0,04	100,53
Rechn.	27,11	72,89	—	—	—	—	—	100,00

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 19. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 216. — (3) Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 65. — (4) Verhandlungen des naturh. Vereins der preufs. Rheinl. 1848, 162.

Bagrationit.

Kokscharow (1) beschrieb und benannte ein Fürsten Bagration in der Achmatowsk'schen Grube Ural gefundenes Mineral. Monoklinometrisch; Hauptklinodiag.: Orthodiag. = 1 : 1,7504 : 1,1288, $\alpha = 65^\circ 5'$. gemessene Winkel: $0P:\infty P = 104^\circ 8'$; $\infty P:\infty P\infty = 125^\circ$; $P:\infty P = 150^\circ 41',5$. Berechnet: $\infty P = 70^\circ 50'$ im klin. H.S.; $0P:-P\infty = 157^\circ 20'$; $-P:-P = 118^\circ 16',9$; $2P = 71^\circ 35',6$. Beobachtet wurden $\infty P.\infty P\infty.-P\infty.\frac{1}{2}P.P\infty.2P\infty.4P\infty.-P.2P.-4P2.-$ Nicht spaltbar. Bruch muschlig, uneben. Härte = 6,5. Spec. Gew. = 4. Schwarz, undurchsichtig, Strich braun. Glasglänzend, unvollkommen metallglänzend. Unlöslich in Säuren. In dem Löthrohr unter blumenkohlartigem Aufblähen zum Kochen zur schwarzen magnetischen Kugel. Mit Flüssigkeit Eisenreaktion. — Wegen der Uebereinstimmung in spec. Gewicht und Krystallform hält Kokscharow dieses Mineral für neben Gadolinit gehörig. Eine Analyse ex. noch nicht.

Wasser-
freie Silicate
mit
Basisen RO
und R₂O₃.
Epidot.

Marignac (2) hat einen sehr flächenreichen vorwiegend spiegelnden Epidotkrystall vom Vesuv, sowie eine andere aus dem Lenzthal und der Dauphinée gemessen und abgebildet. Marignac stellte den Krystall so, daß die von Naumann mit $\infty P\infty$ bezeichnete Fläche die Basis nahm; wir geben die Winkel, indem wir die Flächen nach der von Naumann angenommenen Stellung bezeichnen: $-P = 69^\circ 56'$; $P = 70^\circ 14'$; $\infty P = 62^\circ 48'$ (alle 3 im klin. Hauptschnitt); $\infty P\infty:-P\infty = 115^\circ 27'$; woraus $\alpha = 89^\circ$. Es sind wahrscheinlich die Winkel von $-P$ und P vertauscht, denn α würde hiernach unter die längere Endkanten des Octaëders fallen. Es stimmen im Uebrigen die Messungen mit denen von Haidinger und Kupffer überein.

Richter (3) untersuchte Zoisit, sogenannten Spod.

(1) Pogg. Ann. LXXIII, 182. — (2) Arch. ph. nat. IV, 14.
(3) Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) III, 114.

(Zu Seite 1175 gehörig.)

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11. a) b)	12.
	Zoisit von Passeyer.	Brauner Epidot von der Bothlane.	Grauer Zoisit von Falligl.	Grüner Zoisit		Schwärzlich- grüner Pistazit		Dichromatischer Pistazit von Werchneiwinsk (Puschkin).		Pistazit von Bourg- d'Oisans.	Grasgrüner durchsichtiger Pistazit von Achmatowak.	Beck- landit von Achma- towak.
				von Aren- dal.	v. d. Na- simakaja bei Ach- matowsk.	von der Schum- naja.	von Aren- dal.	v. Bu- rowa.				
Spec. Gew.		3,387	3,28	3,37	3,34	3,43	3,49	3,35	3,43	3,38	3,39	3,51
SiO ₂	40,57	44,56	40,95	37,32	36,45	37,47	36,79	36,37	37,47	37,60	36,87	36,97
Al ₂ O ₃	32,67	23,72	30,34	22,85	24,32	24,09	21,24	18,13	18,64	18,57	18,72	21,84
Fe ₂ O ₃	—	8,33	—	11,56	9,54	10,60	12,96	14,20	14,15	13,37	12,34	10,19
FeO	4,60	—	4,96	1,86	3,25	2,81	5,20	4,60	2,56	5,55	2,20	9,19
CaO	20,81	24,71	21,56	22,03	22,45	22,19	21,27	21,45	22,08	21,19	24,79	21,14
MgO	—	—	—	0,77	—	—	—	0,40	—	1,40	0,89	—
NaO	—	—	—	—	—	—	—	0,08	2,38 *)	—	0,91	—
HO	1,22	—	0,56	0,29	0,77	0,34	0,55	0,67	0,65	0,46	0,59	0,68
CO ₂	—	—	1,13	2,64	2,73	1,90	2,31	0,89	0,79	1,22	1,61	0,83
BO ₃	—	—	—	—	—	—	—	Spuren	—	—	Spuren	—
	99,37	101,32	99,50	99,32	100,11	99,40	100,32	97,29	98,60	98,80	98,42	100,38

*) Nebst etwas Lithion.

von Passerer, Rammeisberg 1), kristallinen dunkelbraunen Epilith von der Bräune bei Garmisch, und Hermann 2) 9 Varietäten Epilith neben einem vorher für schwarzen Syden gehaltenen Borkstein von Annamowitz. Der letztere ist nach Auerbach, der auch die von Hermann untersuchten Epilith kristallographisch bestimmte, die Form des Epiliths wie G. Rose schon im Borkstein von Wernberg und vom Lauber See nachwies: nur sind die Krystalle, zum in der Richtung der Orthodiagonale, in der Richtung der Kanten von $-P$ verlängert. Die Krystalle sind Combinationen von P , $-P$, ∞P , $-P \infty$ und $P \infty$. — Wie die Tabelle zeigen, stimmen die Epilith nach Hermann gegen 2) G. K. Rose'sche, welche nach seiner Ansicht einen Theil der Kieselsäure (SiO_2) homöopäth ersetzen.

Die Analysen enthält die folgende Tabelle.

Die Analysen No. 1 und 2 führen zu der allgemein angenommenen Formel $3 RO, SiO_2 + 2 R_2O_3, SiO_2$. Da aber bei Hermann's Analysen, außer No. 3 und 4, nicht der Fall ist, so nimmt er unter Zuhilfenahme von Beckmann's chem. Analyse und Gmelin's vergl. S. 1176. für die Epilith drei verschiedene Grundmischungen an, vergl. S. 1149:

Grundmischung von	Formel
3 $SiO_2, SiO_2 + 2 R_2O_3$	
A. Quarz 1 Hbl. $(SiO_2, SiO_2) + 1 Hbl., 1 SiO_2$	
B. Borkstein 1 Hbl. 10 1 1	
C. Epilith 1 1 1	

Zu A. gehören außer den Epilithen No. 3, 4, 5 und 6 die von Fichtel, Giffert und von Fichtelgötting, Bucholz, Thall, Gmelin, Wernick von Gienne, Brewster u. a. Zu B. gehören No. 10, 11 und 12. Die unter No. 7, 8 und 9 stehenden Pyramide betrachten er als bestimmte Verbindungen von Zink und Borkstein. No. 7 = $3 A - R$, No. 8 und 9 = $2 A - 1 B$. Die Gmelin werden nach ihrem Wassergehalt in mehrere bestimmte Glieder getheilt. — Nach

Rammelsberg: *Handb. d. Geog. u. d. Bergb. Chem. Kalk.*
S. 1176.

Hermann enthalten fast alle Epidote FeO und Fe_2O_3 zugleich. Nach direkt in dieser Beziehung von Rammelsberg (1) angestellten Versuchen enthält jedoch wenigstens Epidot von Arendal kein FeO und giebt die gewöhnliche Formel. Er glaubt, daß durch zu starkes Glühen Hermann's Versuchen ein Theil Fe_2O_3 reduziert wurde.

Orthit:
(Allanit;
Cerin.)

Hermann (2) analysirte den Bucklandit (L) von Werchoturje und den früher von ihm selbst (3) sowie Choubine (4) als Tschewkinit untersuchten Ural-Orthit (L) von Miask (spec. Gewicht = 3,55).

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	CaO	LaO	YO	CaO	MgO	HO	Sum
I.	32,46	18,09	13,84	6,77	9,76	1,50	13,18	1,02	3,40	10	
II.	34,47	14,36	7,66	8,23	14,79	7,66	—	10,20	1,07	1,56	10

Für den Ural-Orthit berechnet Hermann das Stoffverhältniß von $\text{HO} : \text{RO} : \text{R}_2\text{O}_3 : \text{SiO}_2 = 1 : 6 : 6 : 6$; woraus die Formel $2(3\text{RO}, \text{SiO}_2 + \text{R}_2\text{O}_3, \text{SiO}_2) + \text{H}_2\text{O}$ folgt, übereinstimmend mit Berlin's Analyse des Orthits vom Thiergarten bei Stockholm (5). Dasselbe Resultat erhielt Rammelsberg bis auf den doppelten Wassergehalt für den Orthit von Hitteroën (6).

Da der Bucklandit von Werchoturje, der nach G. Rammelsberg die Krystallform der Epidote besitzt, die Zusammensetzung der Orthite gab, so verglich Hermann gemeinschaftlich mit Auerbach die Krystallform des Orthits, Allanits und Cerins mit der des Epidots, wobei sich das später von Kokscharow bestätigte (7) interessante Resultat ergab, daß alle diese Mineralien gleichgestaltet sind. Hermann stellt daher Orthit, Allanit und Cerin als heteromere Glieder zum Epidot (vergl. S. 1175), und führt an, daß kürzlich Nordenskjöld den Pistazit von Sillböhle (Finnland) mit einem Kern von Orthit gefunden habe. — Der Ural-

(1) N. Jen. Lit.-Ztg. 1848, Nr. 230 u. 305. — (2) J. pr. Chem. XLIII, 35. 81; im Ausz. Jahrb. Miner. 1848, 816. — (3) J. pr. Chem. XXIII, 273. — (4) Berzelius' Jahresber. XXVI, 373. — (5) Berzelius' Jahresber. XXVI, 369. — (6) N. Jen. Lit.-Ztg. 1848, 1218. — (7) J. pr. Chem. XLIV, 204. —

Orthit ward erst in neuerer Zeit krystallisirt gefunden. Ein Krystall ist = $P \infty . \infty P \infty . - P \infty . - P . (P 3)$, Habitus tafelförmig durch Vorherrschen von $P \infty$, während die von Kokscharow gemessenen Krystalle den Habitus der Epidote haben.

Kerndt (1) analysirte das von ihm entdeckte und von Bodinit und Muromontit. Breithaupt (2) Bodinit genannte Mineral (I) aus dem Oligoklas zwischen Boden und Mauersberg bei Marienberg in Sachsen. Bis jetzt fanden sich nur undeutliche rhombische? Prismen von 110° bis 112° , ohne Anzeigen von Spaltbarkeit. Härte = 6,5, spec. Gew. = 3,523. Röthlich oder schwärzlich braun, Strich schmutzig weifs. Glasglänzend, undurchsichtig. Beim Glühen Feuererscheinung wie bei Gadolinit. Nur an scharfen Kanten schmelzbar. Von starken Säuren zersetzt. — Mit dem Bodinit zusammen finden sich schwarze amorphe Körner von 4,263 spec. Gew., welche beim Glühen keine Feuererscheinungen zeigen. Kerndt analysirte sie ebenfalls (II), und betrachtet sie mit Kersten (3) als eine vom Bodinit verschiedene Species, die er Muromontit nennt, vielleicht aber auch seien sie ein Gemenge.

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	YO	BeO	CeO	LaO	MnO	CaO	MgO	KO	NaO	HO	Sme.
I.	26,12	10,33	12,04	17,43	—	10,46	7,56	1,61	6,32	2,33	1,21	0,84	3,01	99,26
II.	31,08	2,23	11,23	37,14	5,51	5,54	3,53	0,90	0,70	0,42	0,17	0,65	0,84	99,94

Kerndt berechnet für den Bodinit die Formel $9RO, 2SiO_3 + Al_2O_3, SiO_3$ (das Wasser zu 1 Aequivalent als basisch gesetzt.) Entsprechender und mehr an Orthit erinnernd dürfte indessen die Formel $5(3RO, SiO_3) + 2Al_2O_3, SiO_3 + 3HO$ erscheinen, wenn das Wasser wesentlich ist?

Hermann (4) analysirte die bisher noch nicht untersuchten Idokrase vom Ural unter besonderer Rücksicht auf den Oxydationszustand des Eisens. — (I) Wiluit vom Wilui-Flufs. Krystalle bis zu 2 Zoll Länge : $0P . \infty P . P . \infty P \infty$, tafelförmig durch Vorherrschen von $0P$. Bräunlichgrün, dünne Splitter durchscheinend, spec. Gew. = 3,375. Leicht

(1) J. pr. Chem. XLIII, 219. 228. — (2) Pogg. Ann. LXII, 273.
— (3) Pogg. Ann. LXIII, 135. — (4) J. pr. Chem. XLIV, 194.

Idokras. und ruhig schmelzbar, dann durch Salzsäure zersetzbar (II) Idokras von der Nasimskaja. Form des vorigen. P. ziengrün, durchscheinend, spec. Gew. = 3,40. Beim Glü 0,70 pC. Verlust (CO_2) gebend. — (III) Idokras von Paläkov Distrikt Slatoust. Gangartig in Serpentin. Derb, stäng seltener Krystalle, ausgezeichnet durch Vorherrschen 3 P 3 und Abwesenheit von 0 P. Hell spargelgrün, du sichtig, spec. Gew. = 3,42. — (IV) Sogenannter Chryso von Kyschtim, als Geschiebe in den Goldseifen. D apfelgrün, durchscheinend, spec. Gew. = 3,3 bis 3,37. ähnlicher Idokras, sog. Prehnit von Katharinenburg, fi sich bei Mramorsk.

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	CaO	MgO	KO und NaO	CO ₂	Si
I.	38,23	14,32	5,34	1,03	0,50	34,20	6,37	—	—	—
II.	37,62	13,25	7,12	0,60	0,50	36,43	3,79	—	0,70	1
III.	38,18	14,34	5,26	0,61	2,10	32,68	6,20	—	—	—
IV.	39,20	16,56	1,20	0,30	—	34,73	4,00	2,00	1,50	—

Auf Grund dieser Analysen stellt Hermann für Idokras statt der seither angenommenen Granatformel Formel 3 (3 RO, Si O_2) + 2 ($\text{Al}_2 \text{ O}_3, 2 \text{ Si O}_2$) auf, we das Sauerstoffverhältnifs von $\text{RO} : \text{R}_2 \text{ O}_3 : \text{Si O}_2 = 9 : 6 : 15$ voraussetzt. Für Kieselsäure = Si O_2 wird dasselbe annähe zu $9 : 6 : 15$ und die Formel zu $3 (3 \text{ RO, Si O}) + 2 (\text{Al}_2 \text{ Si O}_3)$, wonach der Idokras $\frac{1}{2}$ weniger Thonerdesilicat enthi als Granat und sich hieraus die Formverschiedenheit be Mineralien erklärte. Dafs Hermann's Annahme u unbegründet ist, zeigt die nachfolgende Uebersicht (1) Sauerstoffverhältnisse nach mehreren der bekannteren l ysen von Idokras.

	Hermann				von der Schischimskaja,			von Mon-	v. Sas-	v. Czik-	v. Egg-	
								ser-	thal.	lowa,		
	I.	II.	III.	IV.	Mag-nus	Varren-trapp		Kobell	Kamertop	Mag-nus	Mag-nus	
	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.					
RO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
R ₂ O ₃	5,90	6,16	6,14	6,07	6,39	5,96	6,00	5,24	7,14	7,52	5,97	
SiO ₂	14,42	14,77	15,03	15,58	14,90	14,21	14,32	14,53	15,06	16,39	14,41	

(1) V. bis XII. nach Rammelsb. Handw. 2. Thl. 256.

Moberg (1) untersuchte den Böhmisches Pyrop unter besonderer Rücksicht auf den Oxydationszustand des darin enthaltenen Eisens und Chrms. Da er beim Glühen des feinsten Pulvers in Wasserstoffgas keine Gewichtsabnahme, dagegen aber beim Glühen an der Luft eine Zunahme von 0,37 pC. erhielt, und außerdem die Farbe des Minerals nicht auf Cr_2O_3 deutet, so nimmt er Eisen und Chrom als Oxydule im Pyrop an und berechnet demgemäfs die Resultate seiner Analyse, wie folgt:

SiO_2	Al_2O_3	FeO	CrO	MnO	CaO	MgO	Summe
41,35	22,35	9,94	4,17	2,58	5,29	15,00	100,68

Das Sauerstoffverhältnifs von $\text{RO} : \text{R}_2\text{O}_3 : \text{SiO}_2$ ist hiernach = 11,15 : 10,44 : 21,48 = 1 : 1 : 2, wie beim Granat, zu welchem schon Trolle-Wachtmeister den Pyrop stellte.

Genth (2) beschrieb ein neues Mineral, welches sich mit Chrysolith in Thjorsa-Lava eingewachsen fand (vergl. bei Laven). Monoklinometrisch? Nach einer Richtung deutlich spaltbar. Bruch uneben in's Muschlige, spröde. Auf den Spaltungsflächen perlmuttartig glänzend, sonst Glasglanz. Durchsichtig, weifs in's Graue, Strich weifs. Härte = 6, sp. Gewicht = 2,688. Vor dem Löthrohr in dünnen Splittern schmelzbar. Von Salzsäure nicht zersetzt.

	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	MgO	CaO	NaO	KO	Summe
I.	49,15	—	1,62	Spur	17,28	—	—	—
II.	48,36	30,59	1,37	0,97	17,16	1,13	0,62	100,20

Genth stellt dafür die Formel $2 (3 \text{RO}, 2 \text{SiO}_2) + 5 (\text{Al}_2\text{O}_3, \text{SiO}_2)$ auf, und macht auf die nahen Beziehungen des Minerals zum Skapolith, Barsowit und Bytownit aufmerksam, in welchen sich die Silicate von RO und $\text{R}_2\text{O}_3 = 1 : 2$ und $1 : 3$ verhalten, während sie bei Thjorsauit = $1 : 2\frac{1}{2}$ sind.

Rammelsberg (3) untersuchte den krystallisirten Gehlenit vom Monzoniberg unter besonderer Rücksicht auf

(1) J. pr. Chem. XLIII, 114. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 18. — (3) Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 47.

den Oxydationsgrad des Eisens (welchen er nach Fr. Methode bestimmte).

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	CaO	MgO	Verlust S und HO
29,78	22,02	3,22	1,73	0,19	37,90	3,88	1,28

Statt des früher allgemein angenommenen Sauer verhältnisses von $RO : R_2O_3 : SiO_2 = 2 : 2 : 3$ ergibt Analyse 3:3:4, wonach Rammelsberg die Formel Gehlenits = 3 (3 RO, SiO₂) + 3 R₂O₃, SiO₂ schreibt

Jacksonit.

Den Namen Jacksonit giebt Whitney (1) einem neuen Mineral von Keweenaw- und Isle-Royal am Oberen See (Nord-Amerika). Strahlig-faserige oder strahlig-blättrige Massen. Durchsichtig, milchweiss. Härte = 6; spec. Gew. = 2,881. Vor dem Lötrohr unter starkem Aufblähen schmelzbar. Von Salzsäure vollständig zersetzt, unter Abscheidung pulverförmiger Kieselsäure. Formel die des Prehnits (Walmstedt) ohne Wassergehalt: $2 CaO, SiO_2 + Al_2O_3, SiO_2$.

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	NaO	S
Rechnung . .	46,18	25,69	28,13	—	1
Gefunden . .	46,12	25,91	27,03	0,85	

Feldspathic
Baulit.

Die Selbstständigkeit des von Forchhammer (2) neue Species aufgestellten, aber von Rammelsberg für ein aus Feldspath und Quarz zusammengeschmolzenes Gemenge gehaltenen Baulits ist durch Genth's (4) Untersuchung eines durch Bunsen vom Krabla mitgebrachten Auswürflings ausser Zweifel gestellt worden, indem er Forchhammer das Sauerstoffverhältniss von $RO : R_2O_3 : SiO_2$ constant = 1 : 3 : 24 fand und ausserdem das Mikroskopische beobachtete. Das derbe Mineral stellt ein glasglänzendes, farbloses und durchscheinendes bis durchsichtiges, körnig-krystallinisches Aggregat von unebenem Muschlige neigendem Bruch dar, ohne bemerkbare Spaltbarkeit. Die kleinen nicht meßbaren Krystalle geh

(1) Journ. Boston Soc. Nat. Hist. V, 486; im Ausg. Sill. A [2] VI, 269. — (2) Berzelius' Jahresber. XXIII, 261. — (3) Ram Handw. 2. Suppl. 23. — (4) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 270.

dem monoklinometrischen System an, und stellen Combinationen von $\infty P. \pm P \infty$ oder $OP. \pm mP$ dar. Härte = 5,5 bis 6, spec. Gewicht = 2,656. Schmilzt vor dem Löthrohr in dünnen Splittern zu farblosem Glas; wird von Chlorwasserstoffsäure nicht angegriffen. Die Analyse gab:

SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	NaO	KaO	MgO u. MnO	Summe
80,23	11,71	1,46	2,26	4,92	Spuren	100,58

woraus die von Berzelius gegebene Formel $RO, 2 SiO_2 + Al_2 O_3, 6 SiO_2$ folgt.

Delesse untersuchte: I. Fahlgelben Feldspath aus dem Syenit des Ballon de Servance (1). Orthoklas. Derb, auch in Zwillingen nach der Form der Karlsbader. Härte etwas unter 6, spec. Gewicht = 2,551. Vor dem Löthrohr schwer schmelzbar zu blasigem Glas. — II. Weißen Feldspath (2). Porphyrtartig in der sogenannten Arkose der Vogesen eingewachsen. Spec. Gewicht ?

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	KaO	NaO	HO	Summe
I.	64,26	19,27	0,50	0,70	0,77	10,58	2,88	0,40	99,36
II.	61,57	18,98	Spur	0,58	0,30	12,69	1,59	—	98,71

No. I. giebt das Sauerstoffverhältniß von $RO : R_2O_3 : SiO_2 = 1 : 3,01 : 11,02$; No. II. = $1 : 3,11 : 11,25$.

Hubert (3) untersuchte auf Haidinger's Veranlassung den bekannten, schön krystallisirten Periklin aus dem Pfischthal: (I) klare Krystalle; (II) durch anfangende Verwitterung porcellanartig gewordene. Periklin.

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	NaO	Summe
I.	69,00	19,50	1,10	9,05	98,65
II.	70,66	18,33	0,53	10,00	99,52

Sauerstoffverhältniß in I. $RO : R_2O_3 : SiO_2 = 1 : 3,46 : 13,64$

" " II. " " " = $1 : 3,16 : 13,55$.

Haidinger giebt an, daß Periklin öfters mit kleinen Adularkryställchen in regelmäßiger Stellung besetzt ge-

(1) Compt. rend. XXV, 103 (hier NaO = 6,44; KaO = 6,40 angegeben); Ann. des min. [4] XIII, 671 (hier NaO und KO wie oben); im Ausz. J. pharm. [3] XII, 455; Arch. ph. nat. V, 332; Jahrb. Miner. 1848, 769. — (2) Arch. ph. nat. VII, 177. — (3) Wien. Acad. Ber. 2. Hft. 193.

funden werde, wie auch das Umgekehrte an Feldspath v
Cavalierberg bei Hirschberg in Schlesien vorkomme. A
im Innern des letzteren sind kleine Albitkryställchen
halten. Sie sind nach Haidinger auf Kosten des M
terkrystals entstanden.

Oligoklas.

Kern dt (1) untersuchte den lauchgrünen Oligol
von Boden bei Marienberg (I), in welchem der Bodenit
Muromontit eingewachsen vorkommen (vergl. S. 1177). A
gezeichnet fettglänzend, auf den Spaltungsflächen per
terartig glasglänzend. Dünne Splitter durchscheinend. Hi
etwas über 6. Spec. Gewicht in kleinen Stückchen = 2
als Pulver = 2,68.

Außerdem untersuchte Kern dt (2) den vielleicht hier
gehörigen derben, seltener krystallisirten, lauchgrünen F
spath von Bodenmais (II.) mit Magnetkies, Quarz u. a. zusam
vorkommend. Die Krystalle durch Vorhersschen von F
ausgezeichnet (Periklinform?). Spaltbarkeit sehr deut
nach 2 Richtungen (Winkel?). Dünne Splitter halbdur
sichtig. Härte = 6. Spec. Gew. kleiner Stücke = 2,5
des Pulvers = 2,549 bei 15°. Vor dem Löthrohr et
schwerer schmelzbar als voriger zu blasigem Glas. Z
sammensetzung nach dem Mittel aus 2 Bestimmungen, v
bei einmal mittelst Fluorwasserstoff, das anderemal mitt
kohlen-sauren Natrons aufgeschlossen wurde.

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	Mn ₂ O ₃	FeO	MnO	CaO	MgO	KO	NaO	Sum
I. 61,96	22,66	0,35	0,40	—	—	2,02	0,10	3,08	9,43	10	
II. 63,66	17,27	—	—	0,45	0,15	0,39	2,28	10,66	5,14	10	

No. I. giebt das Sauerstoffverhältniß von RO : R₂ C
SiO₂ = 1 : 3 : 9, wie es die Formel des Oligoklasses verlan
in No. II. ist es aber = 1 : 1,91 : 7,83, also abweichend v
dem aller bekannten Feldspathe. Kern dt nimmt
= 3 : 6 : 24, und berechnet die Formel 3 RO, 2 Si
+ 2 (Al₂ O₃, 3 Si O₂).

(1) J. pr. Chem. XLIII. 215. — (2) J. pr. Chem. XLIII, 207.

Mit dem Orthoklas von Servance zusammen, so wie Andesin.
in dem Syenit mehrerer anderer Ballons der Vogesen fand Delesse einen Feldspath, welcher sich bei der Untersuchung als übereinstimmend mit Abich's Andesin erwies. Nach 3 Richtungen spaltbar, die 2 vollkommensten unter $86^{\circ} 11'$ und gleich dem Albit mit feiner Zwillingstreifung versehen. Im frischen Zustand durchscheinend und graulich oder grünlich weifs. Bei anfangender Verwitterung undurchsichtig, milchweifs oder korallenroth werdend, zuletzt schmutzig weissen Kaolin gebend. Leichter schmelzbar als der Orthoklas. Härte dieselbe. Analysirt wurden: I. milchweisser von Servance, spec. Gew. = 2,683 (1); II. korallenrother von Coravillers, spec. Gew. = 2,651 (2); III. grünlicher von Chagey (Haute-Saône), spec. Gew. = 2,736 (3).

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MnO	CaO	MgO	NaO	KO	HO	Summe
I.	58,92	25,05	Spur	Spur	4,64	0,41	7,20	2,06	1,27	99,55
II.	58,91	24,59	0,99	Spur	4,01	0,39	7,59	2,54	0,98	100,00
III.	59,95	24,13	1,05	Spur	5,65	0,74	5,39	0,81	2,28	100,00

Delesse setzt das Wasser basisch in Rechnung; allein auch ohnediefs stimmen seine Analysen nahe mit der Andesinformel $3\text{RO}, 2\text{SiO}_2 + 3(\text{R}_2\text{O}_3, 2\text{SiO}_2)$.

Delesse (4) untersuchte folgende Varietäten Labrador: Labrador.
I. grünen krystallisirten aus dem Melaphyor von Belfahy (Haute Saone). Spec. Gew. = 2,719. Schwer schmelzbar, von Schwefelsäure und von Salzsäure langsam zersetzt. — II. grünlich-weissen aus dem Porphyr der alten Steinbrüche von Lakonien. Spec. Gew. = 2,883. — III. von Tyfholen-Udden in Norwegen. Sp. Gew. ? — Ausserdem: IV. grünlichen (5) von Ternaury a) und von Haut Rovillers b), (Grundmasse der dortigen Porphyre). Krystalle mit 2 Spaltungsrichtungen und feiner Zwillingstreifung. Fettglänzend. Sp. Gew. = 2,771. Vor dem Löthrohr unter Aufwallen zu weissem

(1) u. (2) In der oben S. 1181 (bei Orthoklas von Servance) angef. Abh. — (3) Compt. rend. XXV, 636; Jahrb. Miner. 1848, 41. — (4) Mém. de la soc. d'émulation du Doubs 1847; Arch. ph. nat. V, 258; J. pharm. [3] XII, 298. J. pr. Chem. XLIII 417. — (5) Ann. d. min. [4] XII, 287; im Ausz. Compt. rend. XXV, 636; J. pr. Chem. XLV, 219; Jahrb. Miner. 1848, 34.

Labrador. blasigem Glas schmelzbar. Von Salzsäure leichter angegr als gewöhnlicher. — V. grünlich-weißen, perlmutter glänzenden, aus dem Kugel-Diorit von Corsika (1). D Blättchen mit Zwillingsstreifung. Spec. Gew. = 2 Von Salzsäure leicht und vollständig zersetzt, unter scheidung pulverförmiger Kieselsäure.

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	CaO	MgO	KO	NaO	HO	S
I.	52,89	27,39	1,24	—	0,30	5,89	Spur	4,58	5,29	2,28	—
II.	53,20	27,31	1,03	—	Spur	8,02	1,01	3,40	3,52	2,51	1
III.	55,70	25,23	1,71	—	—	4,94	0,72	3,53	7,04	0,77	—
IV. a)	48,83	32,00	1,50	—	—	4,61	—	—	—	—	—
b)	49,32	30,07	0,70	—	0,60	4,25	1,96	4,45	4,85	3,15	—
V.	48,62	34,66	—	0,66	—	12,02	0,33	1,06	2,55	0,49	1

Delesse nimmt hier überall den Wassergehalt Scheerer als ursprünglich und basisch an. Da No und V. nicht genau das für die Labradorformel erforder Sauerstoffverhältnifs von $RO : R_2 O_3 : SiO_2 = 1 : 3 : 6$ g so nimmt es Delesse = 1 : 3 : 5 an und erklärt sie für neue Species.: Vosgit = 3 $([RO], SiO_2) + 3 R_2 O_3$, S Rammelsberg (2) erklärt dagegen das Mineral mit I für etwas zersetzten Labrador. Für No. IV. ist das Sauerstoffverhältnifs (wenn von $Al_2 O_3$, als bei der Zerset bleibend, ausgegangen und HO nicht in Rechnung gez wird) = 0,86 : 3 : 5,4, woraus hervorgeht, daß Ramm berg's Ansicht begründet ist.

Glimmer.

Marignac (3) beschrieb schwarzgrauen monoklin trischen Glimmer aus dem Binnenthal (Wallis). Der stellte eine Combination dar von ∞P . ($\infty P m$). ($\infty P m P$ und $0 P$, letztere Fläche silberglänzend und auf die sc fen Kanten von ∞P gerade aufgesetzt. Durch wiederl Messung mit dem Reflexionsgoniometer ergab sich ∞P : = $120^\circ 40'$ im klinod. Hauptschnitt; $0 P : \infty P = 94^\circ$ woraus sich $\alpha = 84^\circ 27'$ berechnet; $\infty P : (\infty P \infty) = 119^\circ$ Nur annähernd konnten gemessen werden $\infty P : (\infty P \infty) = 150^\circ$, woraus für $(\infty P m)$ $60^\circ 40'$ im klinodiagon

(1) Compt. rend. XXVII, 411; Ann. ch. phys. [3] XXIV, 481

(2) J. pr. Chem. XLIII, 417 und XLV, 219. — (3) Arch. ph. VI, 301.

Hauptschnitt folgt; $0P : (\infty Pm) = 92^\circ$ und $0P : mP = 81^\circ 30'$ (über ∞P gemessen). — Kengott (1) fand an einem großen Glimmerkrystall von Monroe (New-York) mittelst des Anlege-Goniometers ∞P nur $= 112^\circ$ und $0P : \infty P = 109^\circ 15'$. Glimmer.

Marignac (2) hat auch gelbe Krystalle von hexagonalem Glimmer vom Vesuv gemessen. Sie stellten Combinationen von $0P$ und ∞P dar, mit 3 Pyramiden von $95^\circ 37'$, $98^\circ 23'$ und $102^\circ 28'$ Neigung gegen $0P$. Die abwechselnden Polkanten der Pyramiden waren ersetzt durch die Flächen eines Rhomboëders, für welches $R : R = 62^\circ 46'$ (in der Polkante) und $R : 0P = 99^\circ 40'$ gefunden wurde.

Von wasserhaltigen Silicaten mit Basen R_2O_3 untersuchten: I. Rammelsberg (3) ein weißes strahliges Steinmark von Schlackenwalde. Vor dem Löthrohr stark leuchtend, unschmelzbar, von Salzsäure nicht zersetzt. — II. Monheim (4) weißen Halloysit vom Altenberg bei Aachen, dort als Ueberzug auf Zinkglas und Zinkspath. Spec. Gewicht $= 2,21$. — III. Damour und Salvétat (5) Halloysit von Montmorillon, dort nesterweise in Thon. Seifenartig, sich in Wasser zertheilend, dabei nicht plastisch werdend. Unschmelzbar. An warme Natronlauge $3,2 pC.$ SiO_2 , und an Salzsäure ohne Brausen CaO , MgO , KO , MnO , Fe_2O_3 nebst etwas Al_2O_3 abgebend. Durch abwechselnde Behandlung mit beiden vollständig zersetzt. Bei 100° hartnäckig $15,12 pC.$ Wasser zurückhaltend. — IV. Kaiser (6) einen seither für Steinmark gehaltenen, stark durchscheinenden Ueberzug auf Grauwacke vom Silbernaaler Zug bei Clausthal. Spec. Gew. $= 2,552$. Unschmelzbar.

Wasserhaltige Silicate mit Basen R_2O_3 . Amorphe Thonerdesilicate.

- (1) Pogg. Ann. LXXIII, 601. — (2) Arch. ph. nat. VI, 300. — (3) Rammelsb. Handwörterb. 3. Suppl. 117. — (4) Verhandl. Rheinl. naturh. Verein 1848, 41; Jahrb. Miner. 1848, 569. — (5) Ann. ch. phys. [3] XXI, 376; J. pr. Chem. XLII, 454; Jahrb. Miner. 1848, 585. — (6) Jahrb. Miner. 1848, 785.

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	ZnO	KO	NaO	HO	Sum
I.	43,46	41,48	—	1,20	—	—	—	0,37	13,49	100
II.	40,31	33,23	—	—	—	1,23	—	—	23,69	95
III. a)	50,04	20,16	0,68	1,46	0,23	—	1,27	Spur	26,00	99
III. b)	49,40	19,70	0,80	1,50	0,27	—	1,50	Spur	25,67	98
IV.	57,70	27,10	—	0,80	1,41	—	—	—	14,00	100

No. I. entspricht der Formel des Pholerits: $\text{Al}_2\text{SiO}_5 + 2 \text{HO}$; No. II. der Formel $3 \text{Al}_2\text{O}_3, 4 \text{SiO}_2 + 12 \text{H}_2\text{O}$. No. III. giebt nach Abzug von 3,2 pC. amorpher SiO_2 von 10,55 pC. bei 100° weggehenden Wassers die Formel $\text{RO}, 3 \text{SiO}_2 + 4 (\text{R}_2\text{O}_3, 2 \text{SiO}_2) + 16 \text{HO}$. Wenn, anzunehmen, $\text{RO}, 3 \text{SiO}_2$ bloß beigemengt ist, wird Formel $= \text{R}_2\text{O}_3, 2 \text{SiO}_2 + 4 \text{HO}$. No. IV. giebt $2 \text{Al}_2\text{SiO}_5 + 6 \text{HO}$.

Hinsichtlich der Zusammensetzung verschiedener lithischen Thonarten vergl. S. 1063.

Amorphe
Eisenoxyd-
silicate.

Von der Ansicht ausgehend, daß Chloropal, Nontronit und die andern hierher gehörigen Eisenoxydsilicate eine Menge von constant zusammengesetzten Silicaten mit amorpher Kieselsäure seien, hat Kobell (1) I. einen neuen Chloropal von Haar bei Passau, II. einen aus Nontronit, III. Nontronit vom Andreasberg untersucht. Der erstere findet sich als pistaziengrüne Knollen von 1 cm Durchmesser im Hangenden eines Graphitlagers. Er wird in concentrirter Kalilauge dunkel-ockerbraun, was nach Kobell für alle Chloropale charakteristisch ist. Sie werden von Salzsäure unter Abscheidung schleimig-pulverförmigen SiO_2 langsam zersetzt und enthalten alle das Fe als Fe_2O_3 . Zum Ausziehen der amorphen SiO_2 ward das Pulver so lange mit Kalilauge gekocht, bis Opalpulver (von Haar) in einer Gegenprobe gelöst war. I. a) und II. a) geben die Zusammensetzung im Ganzen; I. b), II. b) und III. b) die Zusammensetzung nach der Behandlung mit Kalilauge:

	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	HO	Unlös.	Sum
I. a)	80,66	9,74	1,03	—	—	5,33	2,66	99
II. a)	70,00	14,25	0,75	—	—	15,00	—	100
I. b)	52,10	40,60	3,00	1,60	1,08	—	—	98
II. b)	52,33	43,34	2,82	0,93	0,73	—	—	99
III. b)	49,00	46,00	—	—	—	—	—	—

(1) J. pr. Chem. XLIV, 95; Münch. gel. Anz. XXVI, 543.

Der Sauerstoff von R_2O_3 und SiO_2 verhält sich in I. b) $= 1 : 2,03$, in II. b) $= 1 : 1,96$ und in III. b) $= 1 : 1,88$, wonach Kobell das im Chloropal enthaltene Silicat im wasserfreien Zustande als Fe_2O_3 , $2 SiO_2$ annimmt und von dem Wasser 3 Aequivalente hinzurechnet, während er den kleinen Rest dem beigemengten Opal zugetheilt. Da Chloropal und Nontronit sich chemisch gleich verhalten, sind sie nicht mehr als besondere Specien zu betrachten; auch hält Kobell den Pinguit für hierher gehörig.

Monheim (1) untersuchte ausgewählt reines krystallisiertes Zinkglas (Kieselzinkerz) vom Altenberg bei Aachen (spec. Gew. $= 3,43$ bis $3,49$); I. war wasserhell, II. etwas milchig. III. ist von Rezbanya. Die Untersuchung geschah hauptsächlich in der Absicht, die schwankenden Angaben bezüglich des Wassergehaltes zu berichtigen.

Wasserhaltige Silicate mit Basen RO.
Zinkglas.

	SiO_2	ZnO	Fe_2O_3	HO	CO_2	Summe
I.	25,40	67,05	—	7,47	0,31	100,23
II.	24,31	65,74	0,43	7,51	0,31	98,30
III.	25,34	67,02	0,68	7,58	0,35	100,97
Rechn.	25,08	67,44	—	7,48	—	100,00

Es ist hiernach die von Berzelius aufgestellte Formel $2(3 ZnO, SiO_2) + 3 HO$, welche die als berechnet gegebenen Zahlen verlangt, die richtige. Monheim ist der Ansicht, daß das ZnO ursprünglich als Carbonat in Lösung gewesen und das Zinkglas durch Wechselwirkung des ersteren auf Alkali- oder Erdsilicate gebildet worden sei. Nach seinen Versuchen ist Zinkglas nicht unbedeutend und ohne Zersetzung löslich in kohlensäurehaltigem Wasser.

Rammelsberg (2) analysirte Apophyllit aus dem Apophyllit-Gabbro des Radauthals am Harz. Spec. Gew. $= 1,961$.

SiO_2	CaO	KO	Fluosilicat	HO	Summe
52,44	24,61	4,75	1,43 °)	16,73	99,96

°) Datha 0,46 Fl.

(1) Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preuss. Rheinl. 1848, 157. — (2) Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 18.

Wasserhal-
tige Sill-
eate mit
Basen
ROund R₂O₃.
Chlorastrolith.

Als Chlorastrolith bezeichnet Whitney (1) einen neuen Zeolith von Kewenaw-Point und Isle-Royal oberen Sec. Blaulich-grüne schwach schillernde radialfaserige Aggregate. Auf dem Bruch perlmutterglänzend. Härte = bis 6. Spec. Gew. = 3,18. Vor dem Löthrohr unter Aufschmelzen leicht zu graulichem blasigem Glas schmelzbar. Von Salzsäure leicht zersetzt. Löst sich nach Whitney betrachtet als Zoisit + 3 HO = 3 RO, SiO₂ + 2 R₂O₃, SiO₂ + 3

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	NaO	KO	HO	Summe
Gefunden	36,99	25,49	6,48	19,90	3,70	0,40	7,22	100,0
Rechnung	38,25	24,32	6,31	19,97	3,70	—	7,45	100,0

Gibbs (2) analysirte in durchsichtigen Nadeln kry-
stallisirten Skolezit von Island. Die Zusammensetzung ist
Rose'schen Formel CaO, SiO₂ + Al₂O₃, SiO₂ + 3
entsprechend.

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	HO	Summe
Gefunden	46,72	25,90	13,71	13,67	100,0
Rechnung	45,99	26,09	14,21	13,71	100,0

Engelhardt (3) und Genth (4) untersuchten
Chabasit, der bei Annerod unweit Gießen in Menge
dem aus blasigem Basalt entstandenen Ackerboden her-
kommt (5). Er ist milchweiß und nur durchscheinend.

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	KO	NaO	HO	Summe
Engelh. a)	48,31	19,47	0,14	11,00	0,26	1,17	—	19,65	100
b)	48,43	19,72	—	10,82	—	—	—	—	—
Genth	47,00	19,71	0,15	10,63	—	0,33	0,65	22,29	100
Rechn.	47,52	20,22	—	11,02	—	—	—	21,24	100

Engelhardt hatte das Mineral bei 100° getrocknet
wobei es im Mittel 4,72 pC. Wasser = 3 Aeq. ver-
lor. Von dem Rest war $\frac{1}{2}$ stärker gebunden und ging erst ü-
ber der dunklen Rothglühhitze fort. — Berechnet man Eng-

(1) Jour. Bost. Soc. nat. Hist. V, 486; im Ausz. Sill. Am. J.
VI, 270. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 559; J. pr. Chem. XLII, 458.
(3) Ann. Ch. Pharm. LXV, 370; J. pr. Chem. XLV, 458. — (4) J.
Ch. Pharm. LXVI, 274; J. pr. Chem. XLV, 458. — (5) Die
Ställe haben die Form des Phakoliths: Durchkreuzungszwillinge
R. — $\frac{1}{2}$ R. $\frac{1}{2}$ P2.

hardt's Zahlen auf den lufttrocknen Zustand des Minerals, so erhält man 23,27 pC. Wasser und 46,13 pC. Kieselsäure, und dann entsprechen diese Zahlen, gleich Genth's Analyse, annähernd der Berzelius'schen Formel : $3 \text{ RO}, 2 \text{ SiO}_3 + 3 (\text{Al}_2\text{O}_3, 2 \text{ SiO}_3) + 18 \text{ HO}$ (vergl. Rechnung). Der Ueberschufs an Wasser und der Verlust an Kieselsäure erklären sich aus dem, wie das Ansehen zeigt, etwas zersetzten Zustande des Minerals. Engelhardt berechnete: $\text{RO}, \text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3, 3 \text{ SiO}_2 + 5 \text{ HO}$, und Genth : $3 \text{ RO}, 2 \text{ SiO}_3 + 3 (\text{Al}_2\text{O}_3, \text{SiO}_3) + 18 \text{ HO}$.

Damour (1) hat die Analyse des Faujasits wiederholt, Faujasit. und zwar mit einer gröfseren Quantität Material, als ihm das erstemal zu Gebote stand.

	SiO_2	Al_2O_3	CaO	NaO	HO	Summe
Gefunden	46,12	16,81	4,79	5,09	27,09	99,90
Rechnung	45,64	17,26	4,70	5,20	27,20	100,00

Es folgt hieraus das Sauerstoffverhältnifs von $\text{RO} : \text{R}_2\text{O}_3 : \text{SiO}_3 : \text{HO} = 1 : 3 : 9 : 9$ und die Formel ($\frac{1}{4} \text{ CaO}, \frac{1}{4} \text{ NaO}$), $\text{SiO}_3 + \text{Al}_2\text{O}_3, 2 \text{ SiO}_3 + 9 \text{ HO}$, wonach der Faujasit bis auf den um die Hälfte kleineren Wassergehalt die Zusammensetzung der kieselsäurereicheren Chabasite hat. — Genth (2) fand dieses seltene Mineral in blasigem Basalt bei Annerod unweit Giefßen, begleitet von Chabasit und Phillipsit.

Descloizeaux (3) hat kleine durchsichtige Phillipsit Phillipsit.
(Christianit.) krystalle aus Trapp-Mandelstein von der Bai von Dyre-fiord auf Island gemessen. Sie stellten rhombische Combinationen von $\infty \bar{P} \infty . \infty \bar{P} \infty . \bar{P} \infty . P$ vor, und an einzelnen Krystallen fand sich $\bar{P}n$. Die gemessenen Winkel sind : $\bar{P} \infty : \infty \bar{P} \infty = 124^\circ 22'$; $\bar{P} \infty : P = 147^\circ 30'$; $\bar{P} \infty = 111^\circ 15'$; $P : \infty \bar{P} \infty = 122^\circ 30'$; $P : P = 123^\circ 7'$ (im brachydiag. Hauptschnitt) und $\bar{P}n : \infty \bar{P} \infty = 138^\circ 54'$. Die zwei ersten Winkel ergeben : Hauptaxe : Makrodiagonale : Brachydiagonale = 1 : 1,461 : 1,295; $P : P = 123^\circ 7'$ im br. HS., $115^\circ 0'$

(1) Ann. des min. [4] XIV, 67. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 274. — (3) Compt. rend. XXV, 712; Arch. ph. nat. VI, 238; J. pr. Chem. XLV, 455.

Phillipsit.
(Christianit.)

im makr. HS. und $91^{\circ} 46'$ in der Basis; $\check{P}_{\infty} = 111^{\circ} 16'$ in HS.; $\bar{P}_{\infty} = 104^{\circ} 40'$ im m. HS.; $\infty P = 96^{\circ} 53'$ im br. HS. Aus dem letzten Winkel folgt $P_n = \check{P}_{\frac{1}{2}}$ (Descloizeaux rechnet $\frac{1}{2}$), was bisher noch nicht beobachtet wurde. D Messungen weichen, wenn auch nicht bedeutend, von nen Naumann's (1) und Haidinger's (2) ab.

Genth (3) analysirte den Phillipsit vom Stempel Marburg. Die kleinen Krystalle, Zwillinge von der $F \infty \bar{P}_{\infty} . \infty \bar{P}_{\infty} . P$, waren zerklüftet und gelblichweiss

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	KO	NaO	HO	Sum
48,17	21,11	0,24	6,97	6,61	0,63	16,62	100.

Das Sauerstoffverhältnifs von $RO : R_2O_3 : SiO_2 : H$ $= 1 : 3,04 : 7,82 : 4,5$, wie das von Rammelsberg (4) 1 Connel's Analyse des Minerals vom Riesendamm berechnt. Die Beschaffenheit der Krystalle deutet aber auf angegene Verwitterung hin, und defshalb dürfte der Wassergehalt etwas höher anzunehmen sein. Dann entspricht die Analyse der Formel Rammelsberg's: $3 RO, 2 SiO_2 + 3 (Al, 2 SiO_2) + 15 HO$.

Da Marignac (5) für das von Levy ursprüngl. Phillipsit genannte Mineral vom Vesuv obiges Sauerstoffverhältnifs $= 1 : 3 : 6 : 3\frac{1}{2}$ gefunden, so scheiden Descloize. und Dufrénoy (6) den Phillipsit wieder in 2 Species. Zum Phillipsit gehören die Varietäten vom Vesuv, von Reale und vom Capo di Bove. Die Varietäten von Marb. Annerod und Island werden von Descloizeaux Christianit genannt.

Gismondin.

Credner (7) erhielt durch Herrn de Medicis Spad Rom (von welchem auch Kobell das Material zu seiner Analyse bekam) deutliche und glänzende Gismondinkrystalle vom Capo di Bove. Sie gehören nach ihm nicht tetragonalen, sondern dem rhombischen Systeme an,

(1) Lehrb. 1. Aufl. 371. — (2) Handbuch der bestimmenden Mineralogie 527. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 272; J. pr. Chem. XLV, 45. — (4) Handw. 2. Suppl. 60; 3. Suppl. 50. — (5) Ann. ch. phys. [3] 44. — (6) Traité de minéralogie, III, 449. 478. — (7) Jahrb. M 1847, 559.

erscheinen meist in Zwillingen mit gekreuzten Hauptaxen, Gismondin.
 wie sie Wernekinck am Baryt-Harmotom vom Schiftenberg bei Giefßen beobachtete (1). Die einzelnen Krystalle sind Combinationen von $\infty \bar{P} \infty . \infty \bar{P} \infty . P$. Credner hält hiernach Gismondin und Phillipsit für identisch, und verweist deshalb auf die Uebereinstimmung von Marignac's Analyse des Phillipsits vom Vesuv (2) mit Kobell's Analyse des Gimondins vom Capo di Bove (3); allein die erstere giebt das Sauerstoffverhältniß von $RO : R_2O_3 : SiO_3 : HO = 1 : 3 : 6 : 3\frac{1}{2}$; letztere giebt dasselbe $= 1 : 4 : 7 : 5$. — Es ist sehr zu bedauern, daß die Winkelangaben fehlen.

Nordenskiöld's schon früher (4) bekannt gewordene Diaphanit.
 Arbeit über den Diaphanit ist jetzt ausführlicher (5) erschienen; ebenso (6) eine schon früher (7) bekannt gewordene Untersuchung des Neoliths von Scheerer. Neolith.

Marignac (8) untersuchte den Gigantolith von Tam- Gigantolith.
 mela. Spec. Gew. = 2,871. Es fanden sich daran zwar Absonderungsflächen nach OP, aber keine eigentlichen Spaltungsflächen. (Aufgeschlossen wurde bei I. durch NaO, CO₂; bei II. durch FIIH.)

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	KO	NaO	HO	Summe
I.	42,59	26,78	14,21	1,07	2,74	—	—	5,70	—
II.	—	26,47	14,10	0,88	2,54	5,44	0,86	6,08	—
Mittel	42,59	26,62	14,16	0,95	2,63	5,44	0,86	5,89	99,14

Marignac berechnet das Sauerstoffverhältniß von $RO : R_2O_3 : SiO_3 : HO = 1 : 2 : 4 : 1$, und stellt die Formel $3 RO, 2 SiO_3 + 2 (Al_2O_3, SiO_3) + 3 HO$ auf; er erhielt demnach um die Hälfte mehr HO und RO, als Trolle-Wachtmeister, welcher obiges Verhältniß $= 1 : 3 : 6 : 1$ fand und die Formel $RO, SiO_3 + Al_2O_3, SiO_3 + HO$ gab.

(1) Gilbert's Ann. LXXVI, 171. 336. — (2) Ann. ch. phys. [3] XIV, 41. — (3) J. pr. Chem. XVIII, 105; vergl. Rammelsberg's Handwörterb. II, 290 u. 3. Suppl. 51. — (4) Petersb. Acad. Bull. V, 266; im Ausz. Berzelius' Jahresber. XXVII, 234. — (5) Pogg. Ann. LXX, 554. — (6) Pogg. Ann. LXXI, 285; vergl. Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 86. — (7) Oefversigt af K. V. Acad. Förh. IV, 70; Berzelius' Jahresber. XXVII, 251. — (8) Arch. ph. nat. IV, 159.

Marignac macht darauf aufmerksam, daß seine Form genau die des Ottrelits nach Damour's Analyse ist; ist im Ottrelit $RO = FeO$ und MnO . Er sieht in die Analogie eine starke Stütze für Alger's Ansicht, Gigantolith und Ottrelit nebst Phyllit (1) zu einer Species gehören.

Chlorophyllit.

Rammelsberg (2) analysirte den Chlorophyllit Unity, New-Hampshire. Spec. Gew. = 2,782. Salzsäure: etwas Eisenoxyd, kein Eisenoxydul, aus; greift ihn im Uebrigen nicht, oder nur wenig an.

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	CaO	HO	Summ
46,31	25,17	10,99	10,91	0,58	6,70	100,6

Unter der Annahme, daß das Mineral gleich dem Cordierit einen Theil des Eisens als Oxydul enthalte (1,35 und 9,50 Fe_2O_3), berechnet Rammelsberg die Formel $3 RO, 2 SiO_2 + 3 (R_2O_3, SiO_2) + 4 HO$, wonach selbe Cordierit ist, der bei seiner Metamorphose 4 $\frac{1}{2}$ Wasser aufgenommen hat.

Pin.it.

Rammelsberg (3) untersuchte I. den blaugrauen mit rothem glimmerigem Ueberzug von Penig, sowie den mit noch frischem Glimmer bedeckten von Aue Schneeberg. Marignac (4) untersuchte III. hellgrauer nit aus der Auvergne (spec. Gew. = 2,74); IV. grünlich-grauen aus Sachsen (spec. Gew. = 2,75), und V. schwach-grünen vom Mont Brevent bei Chamouny; (spec. C = 2,84.) Die 3 letzteren Pinite schienen wenig zers. Sie waren in dünnen Splittern durchscheinend und besaßen homogenen, nicht erdigen, etwas fettglänzenden Bruch.

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	CaO	MgO	KO	NaO	HO	Su
I.	47,00	28,36	7,08	0,79	2,48	10,74	1,07	3,83	100
II.	46,83	27,65	7,84	0,49	1,02	6,52	0,40	7,80	99
III.	47,50	31,80	3,92	—	1,78	9,05	0,92	5,03	100
IV.	46,10	32,46	4,27	—	2,26	9,00	0,46	5,45	100
V.	44,70	31,64	6,57	—	2,86	7,89	0,95	5,39	100

(1) Thomson's Miner. I, 238; Dufrénoy's Miner. III, 592.

(2) Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 34. — (3) Rammelsberg's Handw. 3. Suppl. 94. — (4) Arch. ph. nat. VI, 157; im Ausg. pharm. [3] XII, 151.

Rammelsberg unternahm seine Analyse in der Absicht, die Beziehung des Pinit zum Cordierit nachzuweisen. Aus I. folgert er die Formel $3 \text{ RO}, 2 \text{ SiO}_3 + 3 (\text{Al}_2\text{O}_3, \text{SiO}_3) + 2 \text{ HO}$, und betrachtet diesen Pinit als Bonsdorffit oder Cordierit $+ 2 \text{ HO}$. Aus II. berechnet er die Formel $3 (\text{RO}, \text{SiO}_3) + 4 (\text{Al}_2\text{O}_3, \text{SiO}_3) + 6 \text{ HO} = 3 \text{ RO}, 2 \text{ SiO}_3 + 3 (\text{Al}_2\text{O}_3, \text{SiO}_3) + (\text{Al}_2\text{O}_3, 2 \text{ SiO}_3 + 6 \text{ HO}) = \text{Aspasiolith} + \text{HO}$. — Marignac berechnet die Formel $3 (\text{RO}, \text{SiO}_3) + 4 (\text{Al}_2\text{O}_3, \text{SiO}_3) + 4 \text{ HO}$.

Marignac (1) analysirte auch den Liebenerit von Liebenerit. Monte Viesena im Flemsthal. Hexagonale? Prismen von hell grünlich-grauer Farbe. Härte = 3,5. Spec. Gew. = 2,814. Nur an den Kanten schmelzbar. Von Salzsäure nur unvollständig zersetzt unter Entwicklung von etwas Kohlensäure. (Aufgeschlossen wurde bei I. durch NaO , CO_2 , bei II. und III. durch FlH .)

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MgO	KO	NaO	HO u. CO ₂	Summe
I. 45,03	36,42	1,70	1,54	—	—	—	—	
II. 44,19	36,77	1,71	1,39	9,79	1,00	5,15	100,0	
III. 44,76	36,34	1,83	1,27	10,00	0,84	4,96	100,0	

Diese Analysen geben genau das Sauerstoffverhältniß von $\text{RO} : \text{R}_2\text{O}_3 : \text{SiO}_3 : \text{HO} = 1 : 6 : 8 : 1,5$, woraus die Formel $3 \text{ RO}, 2 \text{ SiO}_3 + 6 (\text{Al}_2\text{O}_3, \text{SiO}_3) + 5 \text{ HO}$ folgt. — Oellacher (2) hat die Formel $\text{RO}, 2 \text{ SiO}_3 + 3 (\text{Al}_2\text{O}_3, \text{SiO}_3) + 3 \text{ HO}$ aufgestellt, welche das Sauerstoffverhältniß $3 : 6 : 10 : 2$ voraussetzt. Marignac ist geneigt, das Mineral zum Pinit zu stellen, während Haidinger (2), Breithaupt (3) und Blum (4) dasselbe als eine Pseudomorphose nach Nephelin aufführen.

Sartorius von Waltershausen (5) hat den von ihm Palagonit. in Sicilien entdeckten Palagonit auch auf Island und zwar von besonderer Reinheit gefunden. Bunsen (6) hat den-

(1) Arch. ph. nat. VI, 293; im Ausz. J. pharm. [3] XIII, 290. — (2) Haidinger's Handb. d. best. Miner. 518; desselben Uebersicht d. mineral. Forschungen, 1843, 36. — (3) Breithaupt, Handb. der Mineralogie, III, 475. — (4) Blum's Pseudomorphosen, Nachtr. 24. — (5) Göttinger Studien, 1845, 402. — (6) Ann. Ch. Pharm. LXI, 265.

Palagonit. selben beschrieben und analysirt. Amorph, mit uneben im Kleinen muschligem Bruch. Härte etwas unter 5; le zersprengbar. In feinen Splittern durchscheinend. Fir glänzend in's Wachsglänzende. Im auffallenden I kaffeebraun, im durchfallenden honiggelb. Spec. C = 2,429. Im Kolben Wasser gebend. Vor dem Löth leicht schmelzbar zur magnetischen Perle. Von verdün Säure leicht zersetzt. I. von Seljadalr; II. von der Sels kette; I.a und I.b sind die beiden vorhergehenden Analy nach Abzug des hygroscopischen Wassers und des Ur lichen auf 100 Theile berechnet :

	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	KaO	NaO	HO	hygrosc. HO	Unlös.	St
I.	37,417	14,175	11,165	8,766	6,036	0,685	0,652	17,152	—	4,108	10
II.	32,911	12,865	8,925	7,548	4,244	0,995	1,283	14,636	7,102	9,573	10
I. a	38,952	14,758	11,624	9,126	6,284	0,713	0,678	17,858	—	—	10
I. b	39,459	15,424	10,701	9,049	5,088	1,193	1,538	17,548	—	—	10

Bunsen giebt die Formel $3(\text{MgO}, \text{CaO}, \text{KaO}, \text{NaO}) + 2\text{SiO}_2 + 2[(\text{Fe}_2\text{O}_3, \text{Al}_2\text{O}_3), \text{SiO}_2] + 9\text{HO}$, und bemerkt, dass das Mineral sich gleich dem Ottrelit als ein was haltiger Skapolith betrachten lasse.

Hisingerit. Hisingerit, I. von Riddarhyttan und II. von der Lingegrube in Södermanland, ist von Rammelsberg untersucht worden. No. II. ist unschmelzbar; No. I. : schmelzbar zur schwarzen, magnetischen Schlacke, v wegen des Gehalts an Schwefelkies, wovon derselbe du wachsen war. Die Analyse gab (bei I. nach Abzug 24,99 pC. FeS_2 und 2,32 pC. Cu_2S) :

	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	FeO	CaO	MgO	HO	Summe	
I. a)	33,07	34,78	17,59	2,56	0,46	11,54	100,0	gefu
b)	30,06	34,76	23,46	—	—	11,72	100,0	berec
II. a)	32,18	30,10	8,63	5,50	4,22	19,37	100,0	gefu
b)	28,40	32,83	22,16	—	—	16,61	100,0	berec

Für I. berechnet Rammelsberg die For $3\text{FeO}, \text{SiO}_2 + 2(\text{Fe}_2\text{O}_3, \text{SiO}_2) + 6\text{HO}$; Nr. II. g dieselbe Formel mit 9 HO.

Zwei vielleicht zum Schillerspath gehörige Mineralien wurden I. von Rammelsberg (1) und II. von Shepard (2) untersucht. No. I, von Zincken im Radauthal gefunden, ist derb, grün und fettig anzufühlen. Spec. Gew. = 2,76.— No. II, von Williams zu Texas, Grafschaft Lancaster in Pennsylvanien, gefunden und nach ihm benannt, kommt als Ausfüllungsmasse von Spalten zwischen Serpentin und Chromeisenstein vor. Es ist dem Diallag ähnlich, derb, blättrig, schwach perlmutterglänzend, apfelgrün und durchsichtig. Spec. Gew. = 2,59 bis 2,64. Von Salzsäure wird es langsam zersetzt.

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MgO	HO	Summe
I.	41,48	6,49	16,61	27,24	10,13	101,95
II.	45,40	8,50	—	33,60	12,50	100,00
Rechnung für II.	46,06	8,52	—	33,42	11,96	100,00

Das erstere giebt nach Rammelsberg unter Zusammenrechnung von SiO₂ und Al₂O₃ die Formel des Schillerspaths nach Kobell.— Für das letztere berechnet Shepard die Formel 3(MgO, 1½ SiO₂) + Al₂O₃, SiO₂ + 3 HO. Es ist hier offenbar ein Rechnungsfehler untergelaufen. Die Analyse entspricht vielmehr der Formel 5(2 MgO, SiO₂) + Al₂O₃, SiO₂ + 8 HO (vergl. Rechnung), wonach das Mineral neben Pyrosclerit zu stellen wäre.

Von serpentinartigen Mineralien untersuchten :

I. Rammelsberg (3) blaugrünen faserigen Pikrolith von Texas, Lancaster-County in Pennsylvanien. Von Magnesit begleitet. Spec. Gew. = 2,557.

II. Delesse (4) ein graulichgrünes durchscheinendes blättriges Mineral von Villa Rota am Po. Auf den Theilungsflächen perlmutterglänzend, fettig anzufühlen. Von Säuren leicht zersetzt. Spec. Gew. = 2,644. Schwer schmelzbar.

III. Derselbe (5) faserigen Chrysotil aus dem Serpentin von Goujot bei Eloyes, Vogesen. Spec. Gew. = 2,219.

(1) Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 106. — (2) Sill. Am. J. [2] VI, 249. — (3) Handw. 8. Suppl. 108. — (4) Ann. des mines [4] XIV, 78; Arch. ph. nat. VI, 111; Jahrb. Miner. 1848, 658. — (5) Arch. ph. nat. VII, 116.

Silicate
mit
Hydraten.
Schillerspath-
ähnliches
Mineral.

Williamsit.

Serpentin.
(Pikrolith u.
Chrysotil)

Serpentin.

IV. Schmid (1) lauchgrünen faserigen Chrysotil aus dem Serpentin von Zöblitz. Spec. Gew. = 2,60 bis 2,65. Schwer schmelzbar.

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MgO	NaO	HO	Summ
I.	43,79	—	2,03	41,03	—	12,47	99,3
II.	41,34	3,22	5,54	37,61	—	12,06	99,7
III.	41,58	0,42	1,69	42,61	—	13,70	100,0
IV.	43,70	2,76	10,03	29,96	1,98	12,27	100,7

Rammelsberg hat aus seiner Analyse (I) das Sauerstoffverhältniß von RO : Si O₂ (+ Al₂O₃) : HO = 9 : 12 abgeleitet, und nachgewiesen, daß noch 12 andere zuverlässige Analysen von Serpentin und zu diesem gehörigen Mineralien nahe dasselbe Sauerstoffverhältniß geben. stellte hiernach die Formel 2 [(3 Mg O, 2 Si O₂) + 3 H + 3 (Mg O, HO) auf, zu welcher auch die Analyse No. I annähernd führt, da sie obiges Verhältniß = 9,4 : 12 : 12 giebt. — Für No. II. und No. IV. berechnet sich dasselbe = 8,5 : 12 : 5,6 und = 7,1 : 12 : 5,3. — Delesse giebt für No. II. die Formel (RO)₃, Si O₂ [vergl. wegen (RO) S. 114] und Schmidt für No. IV. die Formel 3 RO, 2 Si O₂ + 2 H

Steatitartige
Mineralien.
Pseudomorphose nach
Granat.

Hermann (2) untersuchte einen grünlichen Steatit aus der nesterweise und auch als Pseudomorphose nach Granat und Epidot? im Talkschiefer der Schischikaja-Gora vorkommt. Spec. Gew. = 2,50. Ueber Spiritusflamme giebt derselbe kein oder nur wenig Wasser im Essenfeuer aber 13,4 pCt.

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	HO	Magneteisen u. Unlös.	Summ
25,60	22,21	5,00	30,96	13,43	2,25	99

Der Sauerstoff von SiO₂, Al₂O₃ und Fe₂O₃, MgO und H verhält sich wie 1,106 : 0,968 : 1 : 0,973; also = 1 : 1 : 1 : 1. Hermann nimmt deshalb die von Rammelsberg für den Steatit von Snarum nach Hochstetter's und Czwartowsky's (3) Analysen berechnete Formel, aber :

(1) J. pr. Chem. XLV, 14. — (2) J. pr. Chem. XL, 17. — (3) J. pr. Chem. XVII, 377; Berzelius' Jahresber. XXIII, 280; Rammelsberg Handw. 1. Suppl. 140 u. 3. Suppl. 116.

doppelt soviel R_2O_3 an, nämlich $3MgO, SiO_3 + 2Al_2O_3, SiO_3 + 3(MgO, 2HO)$.

Hierher dürfte auch das specksteinartige Mineral gehören, welches sich am Monzoniberg im Fassathal als Pseudomorphose nach Pleonast findet. Dasselbe ist von Marignac (1) untersucht worden. Seine Analyse weicht von der Stadler's sowohl im Kieselsäure-, als im Wassergehalt bedeutend ab, woraus hervorgeht, daß das Mineral keine constante Zusammensetzung hat.

Pseudomorphose nach Pleonast.

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	Mn ₂ O ₃	MgO	CaO	HO	Summe
31,10	17,50	2,76	—	29,69	5,56	13,67	100,28 Marignac
37,50	15,70	4,60	1,70	25,80	8,70	6,00	100,00 Stadler.

Aus Marignac's Analysen ergibt sich das Sauerstoffverhältniß für $R_2O : R_2O_3 : SiO_3 : HO = 13 : 9 : 16 : 12$, woraus man $[3RO, 2SiO_3 + 3(R_2O_3, SiO_3) + 2HO] + 10(MgO, HO)$, oder in Rücksicht auf die Entstehung des Minerals vielleicht besser $6RO, 5SiO_3 + 3(Al_2O_3, MgO) + 4(MgO, 3HO)$ ableiten könnte? Das Mineral enthielte hiernach noch Spinellsubstanz.

Der Mineralienhändler Augustin entdeckte am Monzoniberg ein neues glimmerartiges Mineral, welches von Liebenauer Brandisit, von Breithaupt Disterrit (*δις τετρας*, zweifach hart) genannt wurde. Haidinger (2) beschrieb dasselbe und Kobell (3) analysirte es. Starre hexagonale Täfelchen: $OP \cdot \infty P$; vollkommen, aber schwierig spaltbar nach OP . Härte auf $OP = 5$, auf $\infty P = 6\frac{1}{4}$ bis $6\frac{1}{2}$ (Kobell), sehr spröde. Auf OP perlmutterglänzend. Dünne Blättchen stark durchscheinend, optisch einaxig. Lauchgrün, bei der Verwitterung röthlichgrau werdend. Dichromatisch: Axe leberbraun, OP lauchgrün. Spec. Gew. = 3,015 bis 3,062. Vor dem Löthrohr unschmelzbar. Von kochender Schwefelsäure zersetzt, von Salzsäure nicht. Möglichst frische Stücke gaben bei der Analyse:

Disterrit.
(Brandisit.)

(1) Arch. ph. nat. VI, 302. — (2) Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) I, 4 u. II, 349. — (3) J. pr. Chem. XLI, 154; im Ausz. Jahrb. Miner. 1848, 575; Arch. ph. nat. VI, 60.

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	KO	HO	Summe
Gefunden	20,00	43,22	3,60	4,00	25,01	0,57	3,60	100
Rechnung	19,89	45,00	—	—	31,04	—	3,95	100

nebst Spuren von Mn₂O₃, CuO und Cl. Kobell stellt Formel $4 (\text{MgO}, \text{Al}_2\text{O}_3) + 3 (\text{RO}), 2 \text{SiO}_2$ auf, w (RO) = MgO, CaO und HO (1). Stellt man das außerhalb der Klammern, so wird die Formel = $4 (\text{MgO}, \text{Al}_2\text{O}_3) + 3 \text{RO}, 2 \text{SiO}_2 + 2 \text{HO}$, welche die oben rechneten Procente fordert. — Die Formel ist nach Kobell durch das Zusammenvorkommen des Minerals Pleonast und Augit gerechtfertigt.

Chlorit.
(Leuchtenbergit; Eisenchlorit.)

Hermann (2) hatte darauf hingewiesen, daß von Komonen als besondere Species aufgestellte Leuchtenbergit nichts anderes als Chlorit sein dürfte, da er diesem sowohl im Aeußeren als auch chemisch bis den von Komonen zu niedrig gefundenen Wassergehalt übereinstimme, (8,68 pC. statt 12,91). — Durch 2 Analysen des Leuchtenbergit's, I. von Hermann II. von Marignac (4), wird jetzt Hermann's Angabe vollkommen bestätigt. Nach Hermann giebt der Leuchtenbergit seinen Wassergehalt nur dann vollständig wenn er als feines Pulver $\frac{1}{4}$ Stunde lang in der Hitze geglüht wird.

Durch die Analyse eines silberweißen krystallisierten (0 P. P. ∞ P) Chlorits von 2,603 spec. Gew. aus der Nähe des Flusses Iremel, District Slatoust, suchte Hermann gleichzeitig die Frage zu entscheiden, ob der Eisengehalt der Chlorite als Oxydul oder als Oxyd anzunehmen ist. Die Analyse III. zeigt für den geringen Eisengehalt im Vergleich mit den Analysen grüner Chlorite, ein entsprechend größeren Magnesiagehalt, woraus Hermann mit Recht schließt, daß das Eisen in Chloriten größtentheils als Oxydul enthalten sein muß.

(1) Vergl. wegen (RO) S. 1147. — (2) J. pr. Chem. XXXI, 99
(3) J. pr. Chem. XL, 13. — (4) Arch. ph. nat. IV, 162.

und demnach Varrentrapp's Formel 3 (MgO, FeO), Chlorit.
 $\text{SiO}_3 + \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{MgO}, 2\text{HO}$ die richtige sei.

Ein vielleicht hierher gehöriges parallelfaseriges grünes Mineral aus zelligen Höhlungen des Porphyr von la Grève, Vogesen, hat Delesse (1) analysirt (IV). Voltz hatte dasselbe frageweise als Pikrolith bezeichnet. Härte = 2 bis 2,5. Spec. Gew. = 2,89. Vor dem Löthrohr nur an den Rändern schmelzbar zur schwarzen magnetischen Schlacke. Von Säuren, sowohl vor als nach dem Glühen, leicht zersetzt, unter Abscheidung aufgequollener Kieselsäure.

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MgO	CaO	HO	Summe
I.	32,35	18,00	—	4,37	32,29	—	12,50	98,51
II.	32,23	14,76	—	7,25	30,76	4,02	11,39	100,41
III.	30,80	17,27	1,37	—	37,08	—	12,30	98,82
IV.	31,07	15,47	17,54	4,07	19,14	0,46	11,55	99,30

Nimmt man im letzteren Mineral, welches Delesse Eisenchlorit (*chlorite ferrugineux*) nennt, das Eisen als Oxydul an, so ergibt sich das Sauerstoffverhältniß von SiO_2 : Al_2O_3 : RO : HO = 6,70 : 3 : 4,89 : 4, also, bis auf den Ueberschufs von 0,7 bei SiO_2 , wie das des Chlorits.

Delesse (2) untersuchte die Grünerde vom Monte Grünerde. Baldo bei Verona. Unter dem Mikroskop zeigte sie sich aus kleinen unregelmäßigen Körnchen bestehend. Berthier's Angabe von deren Zersetzbarkeit durch Chlorwasserstoffsäure bei längerer Digestion bestätigte sich. Dafs das Eisen als Oxydul darin enthalten sei, ward mittelst Goldchlorid nachgewiesen. Chrom fand sich nicht. Spec. Gew. = 2,907. Zusammensetzung :

SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	KO	NaO	HO	Summe
51,25	7,25	20,72	Spur	5,98	6,21	1,92	6,67	100,00

Delesse berechnet hieraus die Formel $8\text{RO}, \text{SiO}_3 + \text{Al}_2\text{O}_3, \text{SiO}_3 + 6\text{HO}$.

(1) Mém. de la soc. d'émulat. du Doubs 1847; Arch. ph. nat. V, 262; J. pr. Chem. XLIII, 429. — (2) Ann. des mines [4] XIV, 74; Arch. ph. nat. VIII, 106; Jahrb. Miner. 1848, 545.

Silicate
mit
Fluoriden.
Humit.

Marignac (1) hat kleine stark glänzende, sehr flächreiche gelbe Humitkrystalle vom Vesuv gemessen (flexions-Goniometer) und analysirt. Das Mineral gehört nach nicht, wie Dana und G. Rose annahmen, dem monoklinometrischen, sondern übereinstimmend mit Phillips' Angaben dem rhombischen System an. Brachydiagonale: Makrodiagonale: Hauptaxe = 0,461:1:2,026. $OP:\bar{P}\infty = 102^\circ$ $OP:\bar{P}\infty = 116^\circ 16'$. Zwillinge mit unter 120° gegen einander geneigten Hauptaxen, nach $m\bar{P}\infty$ ($m = \frac{1}{2}$?). Sp. Gew. = 3,150. Die Analyse gab:

SiO ₂	MgO	FeO	Verlust (Fl)
30,88	56,72	2,19	10,21

Marignac hält mit Monticelli und Covelli Humit für identisch mit Chondrodit, und bezieht sich auf die Uebereinstimmung seiner Messungen mit denen Phillips und seiner Analyse mit der des amerikanischen Chondrodits von Rammelsberg (2). Obgleich die gedachte Identität nicht unwahrscheinlich ist, so dürfte doch nicht gerade durch die obigen Resultate erwiesen seyn, denn Phillip's Messungen beziehen sich ebenfalls auf Humit, und Rammelsberg fand 3 pC. SiO₂ mehr. Es müßte das rhombische System auch am Chondrodit nachgewiesen werden, der nach Dana monoklinometrisch

Chondrodit.

Nach Hermann (3) kommt der Chondrodit in nur kleinen, derben röthlich-gelben Massen an der Schischakaja-Gora und in glänzenden, stark durchscheinenden, orangefarbenen Krystallen von 3,10 spec. Gew. zu Achmatow vor. Gelegentlich dieser Mittheilung verändert er Rammelsberg's Formel: $2(3\text{MgO}, \text{SiO}_2) + \text{MgFl}$ zu $2(3\text{MgO}, \text{SiO}_2 + \text{MgO}, \text{MgFl})$, weil des letztern Analysen 4 pC. SiO₂ weniger gaben, als die Formel verlangt. Er erwähnt aber nicht, daß Rammelsberg die letztere Formel selbst berechnet, sie aber wieder verwarf (2), weil nach der angew

(1) Arch. ph. nat. IV, 152. — (2) Pogg. Ann. LIII, 130; Rammelsberg's Handw. 1. Suppl. 28. — (3) J. pr. Chem. XL, 19.

deten älteren Bestimmungsmethode der Eisengehalt zu hoch und der Kieselerdegehalt zu niedrig ausfallen mußte.

Whitney (1) untersuchte in H. Rose's Laboratorium die sechs folgenden Mineralien, und hat sich um die Erkenntnis ihrer chemischen Constitution durch seine schöne Arbeit ein bedeutendes Verdienst erworben. — I. Sodalith von Litchfield, Maine in Nordamerika. Kommt dort in einzelnen Granitblöcken mit Zirkon, Cancrinit und Elaeolith vor. Er verliert vor dem Löthrohr augenblicklich seine schöne saphirblaue Farbe, und schmilzt zu klarem bläsigem Glas. Die Farbe dürfte nach Whitney vielleicht von Eisensäure herrühren. — II. Nosean vom Laachersee. Wird vor dem Löthrohr heller und schmilzt nur an den Kanten. — III. Grünlich blauen Hauyn vom Albanergebirge, dort mit Vesuvian in Glimmer. Decrepitirt beim Glühen heftig, und schmilzt vor dem Löthrohr zu grünlich-blauem Glas. — IV. Hauyn von Niedermendig. — V. Ittnerit. — VI. Zwei Varietäten von Cancrinit aus Litchfield: a) schwefelbis citronengelben (spec. Gew. 2,448; Härte = 5,5 bis 6); b) gelblich- bis spargelgrünen (spec. Gew. 2,461; H. = 5 bis 5,5). Beide sind hexagonal, sehr vollkommen spaltbar nach ∞P , glasglänzend ins Fettige; sie verlieren im Kolben Wasser und alle Kohlensäure, und geben vor dem Löthrohr unter Schäumen klares farbloses Glas. — Alle genannte Mineralien, Ittnerit ausgenommen, lösen sich leicht und klar nicht nur in verdünnten Mineralsäuren, sondern selbst in einigen organischen Säuren, z. B. Essigsäure, Weinsäure, Kleesäure. Mit concentrirten Säuren gelatiniren sie, mit Ausnahme des Cancrinit, der sich in concentrirter Salzsäure, wie schon Rose zeigte, klar löst, und erst beim Kochen, aber dann plötzlich gelatinirt. Nur der Hauyn entwickelt beim Lösen Schwefelwasserstoff, aber höchst wenig.

Silicate
mit
Chloriden,
Sulfaten,
Carbona-
ten.
Sodalith.

Nosean.

Hauyn.

Ittnerit.

Cancrinit.

(1) Berl. Acad. Ber. 1847, 39; Pogg. Ann. LXX, 431.

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	KO	NaO	CaO	Cl	SO ₂	Glühverlust	Sum
I, 1)	37,30	32,88	—	0,59	23,86	—	6,97	—	—	101
2)	37,63	30,93	1,08	—	25,48	—	—	—	—	—
Rechnung	37,21	31,66	—	—	25,47	—	7,29	—	—	101
II, 1)	36,52	29,54	0,44	—	23,12	1,09	0,61	7,66	1,37	104
2)	36,53	29,42	—	—	22,97	1,62	0,61	7,13	1,37	99
Rechnung	36,65	30,59	—	—	24,82	—	—	7,94	—	104
III	32,44	27,75	Spur	2,40	14,24	9,96	Spur	12,98	—	99
Rechnung	32,46	27,09	—	—	16,49	9,88	—	14,08	—	104
IV, 1)	33,90	28,07	—	—	19,28	7,50	—	12,01	—	104
2)	34,83	28,51	0,31	—	18,57	7,23	—	12,13	—	101
Rechnung	33,58	28,52	—	—	18,94	6,82	—	12,14	—	104
V	35,69	29,14	—	1,20	12,57	5,64	1,25	4,62	9,83 *)	104
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Mn ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	NaO	KO	CO ₂	HO	Sum
VI, a, 1)	37,42	27,70	0,86	Spur	3,91	20,98	0,67	5,95	2,82	104
2)	37,89	27,89	0,64	—	3,88	21,24	—	5,95	2,82	99
3)	37,84	28,26	—	—	3,82	20,94	—	5,95	2,82	99
VI, b	37,20	27,59	—	0,27	5,26	20,46	0,50	5,92	3,28	104
Rechnung	37,63	28,46	—	—	3,87	21,45	—	6,09	2,49	104

nebst Spuren von Chlor.

*) an Wasser.

Für den Sodalith giebt Whitney die schon Kobell aufgestellte Formel $3 \text{ NaO}, \text{ SiO}_2 + 3 (\text{Al}_2\text{SiO}_5) + \text{Na Cl}$, und betrachtet ihn demzufolge als eine Verbindung von 1 Aeq. Elaeolith (nach der älteren Gmelin'schen Formel) mit 1 Aeq. Chlornatrium. Nosean und der Albaner Hauyn enthalten gleichfalls Elaeolith, erster mit 1 Aeq. NaO, SO₂, letzterer mit 2 Aeq. CaO, S verbunden. Der Hauyn von Niedermendig läßt sich gegen als eine Verbindung von 1 Aeq. Nosean mit 2 A Albaner Hauyn betrachten. — Whitney versuchte nicht, aus seiner mit der Gmelin'schen nahe übereinstimmenden Analyse des Ittnerits eine Formel zu berechnen. Rammelsberg (1) zeigte aber, daß dieses nach Spaltbarkeit und allgemeinen Eigenschaften dem vorigen nahe stehen aber im Wassergehalt verschiedene Mineral sich darstellen lassen als zusammengesetzt aus 3 Aeq. (Sodalith + 6 HO) + 10 A (Albaner Hauyn + 6 HO), letzterer mit dem halben

(1) Rammelsberg's Handwörterb. 3. Suppl. 59. (Vergl. auch das S. 30 u. 55.)

halt an CaO, SO₃. — Der Cancrinit von Litchfield ist nach Whitney [2 NaO, SiO₃ + 2 (Al₂O₃, SiO₃)] + (½ NaO, ¼ CaO), CO₂ + HO, und unterscheidet sich demnach vom Cancrinit des Ilmengebirges (nach Scheerer's Formel) sowohl im Wassergehalt, als durch die Vertretung der Hälfte des Kalkcarbonats durch Natroncarbonat. — Das darin enthaltene Silicat ist Elaeolith nach der neueren Formel von Scheerer.

Marignac (1) hat kleine wasserhelle Turmalinkry- Turmalin.
stalle, wahrscheinlich aus der Dauphinée, gemessen, woran sich seither nicht beobachtete Flächen befanden. Sie stellen Combinationen dar von $+\frac{\infty P}{2}$, $-\frac{\infty P}{2}$, $\infty P 2$ mit $\frac{2}{3} R$, $-\frac{1}{3} R$ und 2 Skalenoëdern, wovon das eine (n) die Combinationskanten der Rhomboëder, das andere (s) die Combinationskanten zwischen $-\frac{1}{3} R$ und $\infty P 2$ abstumpfte. — Die Messung ergab die Polkanten von $\frac{1}{3} R = 143^{\circ} 57'$, dieselben Kanten von $-\frac{1}{3} R = 116^{\circ} 30'$; $\frac{1}{3} R : n = 168^{\circ} 22'$, und $\frac{1}{3} R : s = 99^{\circ} 45'$ (über n und $-\frac{1}{3} R$ gemessen).

Die früher für Tantalsäure, dann für Niobsäure gehaltene Metallsäure aus dem Wöhlerit hat Scheerer (2) bei wiederholter Untersuchung für ein Gemenge von Niobsäure und Pelopsäure erkannt. Er vermuthet, dafs das Mineral gleich dem Eukolit auch Ceroxydul enthalte. Titanate,
Tantalate
u. a.
Wöhlerit.

Scheerer (3) hat das früher (4) unter dem Namen Eukolit.
»brauner Wöhlerit« beschriebene und nur qualitativ untersuchte Mineral aus dem Zirkonsyenit in Norwegen nun quantitativ analysirt.

SiO ₂	Metallsäuren u. Zirkonerde	Fe ₂ O ₃	CaO	CeO	NaO	MnO	MgO	HO	Sme.
47,85	14,05	8,24	12,06	2,98	12,31	1,94	Spur	0,94	100,37

Da in demselben die Zirkonerde grösstentheils durch Eisenoxyd ersetzt ist, und die übrigen Hauptbestandtheile

(1) Arch. ph. nat. VI, 299. — (2) Pogg. Ann. LXXII, 565. —
(3) Pogg. Ann. LXXII, 565. — (4) Pogg. Ann. LXI, 222; Berzelius' Jahresber. XXV, 375.

sich in andern Verhältnissen darin befinden, als im Wölerit (1), so betrachtet Scheerer das Mineral als besondere Species und nennt es Eukolit. Die früher für Tantalssäure gehaltene Metallsäure ist nach ihm höchst wahrscheinlich ein Gemenge von Niobsäure und Pelopsäure.

Eukolit.

Hunt (2) beschrieb und analysirte ein neues titanhaltiges Mineral, welches bei Amity (New-York) nebst Serpentin, Titaneisen, Spinell und Chondroit im Dolomit eingewachsen vorkommt. Es gleicht im Aeußern dem dort vorkommenden Warwickit (3). — Schiefe rhombische Prismen von blau-schwarzer oder braun-schwarzer Farbe mit bläulichem Strich. Harz- bis metallglänzend; Härte = 3 bis Spec. Gew. = 3,188. Im Kolben Wasser gebend und hell werdend. Wird an der Luft erhitzt ziegelroth. Unschmelzbar. Wird von Chlorwasserstoffsäure wenig angegriffen, von Schwefelsäure in der Wärme leicht gelöst.

	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Ti ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	MgO	CaO	HO	Sum
1)	18,50	13,00	25,15	13,84	22,20	1,30	7,35	101
2)	18,00	51,81			23,11	1,36	6,82	101

Hunt schlägt die Formel $2(\text{Fe}_2\text{O}_3, \text{Ti}_2\text{O}_3, \text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{MgO}, \text{SiO}_2 + 2\text{HO})$ vor, und hält das Mineral für umgewandeltes Titaneisen. Rammelsberg macht darauf aufmerksam, daß es das erste bekannte wasserhaltige titanhaltige Mineral ist, glaubt aber, daß der Titangehalt Titansäure anzunehmen sei (4).

Greenovit.

Descloizeaux (5), dem Breithaupt's (6) Untersuchung des Greenovits nicht bekannt zu sein scheint, hat dieses Mineral ebenfalls krystallographisch untersucht, und ist zu dem gleichen, von Delesse (7) und Marignac (auch auf chemischen Wege gefundenen, Resultat gelangt.

(1) Pogg. Ann. LIX, 327; Berzelius' Jahresber. XXIV, 289.

(2) Sill. Am. J. [2] II, 30; J. pr. Chem. XLII, 453. — (3) Berzelius' Jahresber. XIX, 294 u. XX, 243. — (4) Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 41. — (5) Ann. ch. phys. [3] XX, 84. — (6) Pogg. Ann. LVIII, 27; Breithaupt's Handb. der Miner. III, 749. — (7) Ann. des mines [4] 325; Rammelsb. Handw. 2. Suppl. 158. — (8) Ann. ch. phys. [3] XI 47; Rammelsb. Handwörterb. 3. Suppl. 123.

dafs der Greenovit eine Varietät des Sphen's ist. Seine Messungen stimmen im Wesentlichen mit denen von G. Rose, Levy und Phillips an Sphen gemachten überein. Die abweichenden Spaltungsrichtungen des Greenovits nach ($\frac{1}{3}$ P2) und — (2 P 2), wovon er die letztere übrigens auch an grünlich-gelbem Sphen vom St. Gotthardt beobachtete, hält er nicht für wesentlich, sondern für abhängig von den Lagerungsverhältnissen.

Hermann hatte den von Wöhler (1) im Pyrochlor ^{Pyrochlor.} von Miask gefundenen Thorerdegehalt in Abrede gestellt (2), weshalb Wöhler seine Analyse durch Städeler wiederholen liefs, die Erde auf das Genaueste prüfte und Proben davon an Berzelius sandte. Nach beiden ist es wirklich Thorerde (3). — Hermann bleibt jedoch bei seiner früheren Behauptung (4). Weil er 5,57 pC. Zirkonerde, Wöhler aber keine fand, so scheint ihm der Pyrochlor durch Austausch isomorpher Bestandtheile verschiedene Zusammensetzung haben zu können. Wöhler habe selbst in einer Probe Pyrochlor von Brevig 5,15 pC. Thorerde, in einer andern gar keine gefunden. (Es ward in letzterer von den Basen überhaupt nur CaO und U₂ O₃ bestimmt.) Die Säure (Tantalsäure) im Pyrochlor erklärt Hermann jetzt für Ilmensäure mit etwas Niobsäure und vielleicht auch Pelopsäure gemengt. (Vergl. bei Samarskit S. 1209.)

Peretz (5) hat in H. Rose's Laboratorium den schwarzen ^{Yttrotantalit.} Yttrotantalit von Ytterby (spec. Gew. 5,67), im Wesentlichen mit gleichem Resultat wie Berzelius, analysirt.

TaO ₅	WO ₃	YO	FeO	CaO	UO	MgO	CuO	Summe
58,65	0,60	21,25	6,29	7,55	3,94	1,40	0,40	100,08

Beim Glühen gaben Proben von verschiedenen Stufen Gewichtsverluste von 3,9, 4,86 und 5,54 pC., wobei das Mineral gelblich-braun und das spec. Gew. gröfser, als vor dem

(1) Pogg. Ann. XLVIII, 83; Berz. Jahresber. XX, 244. — (2) J. pr. Chem. XXXI, 94; Berz. Jahresber. XXV, 375. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXI, 264. — (4) J. pr. Chem. XL, 475. — (5) Berl. Acad. Ber. 1847, 224; im Ausz. J. pr. Chem. XLII, 143; Pogg. Ann. LXXII, 155.

Yttrotantalit. Glühen ward, nämlich zu 6,40. Rose hat die darin enthaltene Säure einer näheren Prüfung unterworfen. Sie ist Tantal säure ganz von denselben Eigenschaften, wie die dem finnischen Tantalit. Die aus beiden dargestellten Chloride stimmten ebenfalls mit einander überein. Von Niob und Pelopsäure ward keine Spur gefunden.

Auch Hermann (1) hat sich überzeugt, daß die Säure in diesem Mineral Tantal säure ist, woran er früher wegen des zu niedrig erhaltenen spec. Gew. (4,05) zweifelt. Wiederholte Versuche gaben dasselbe = 6,7. Er nimmt die Tantal säure wie Niob säure und Pelopsäure zusammengesetzt = MO_2 an, und schreibt die Formel Yttrotantalits 2 (YO, UO), TaO_2 .

Euxenit und Polykras.

Scheerer (3) erhielt unter der Bezeichnung Yttrotantalit ein Mineral, welches bis auf das etwas höhere spec. Gewicht (4,73 bis 4,76) so sehr mit dem Euxenit von Jölster (4) übereinstimmt, daß er es für identisch damit hält. Es findet sich in der Gegend von Tvedestrand in rothbraunem Orthoklas eingewachsen. Die Krystalle sind rhombisch. $P \propto P \propto \bar{P} \propto m \bar{P} \propto (m = 2?)$. Nach annähernder Messung ist $\infty P = 140^\circ$; $P = 152^\circ$ (beide im brachydr. H). Die Analyse, mit wenig Material angestellt, gab:

Metallsäure	YO	UO	CeO	FeO	HO	Summa
58,64	28,97	7,58	2,91	2,60	4,04	99,74

Die Metallsäure erwies sich als ein Gemenge von Tantal säure, Niob säure und Pelopsäure, erstere vorherrschend. Im Euxenit von Jölster fand Scheerer ebenfalls Pelopsäure neben Niob säure. Daß keine Tantal säure darin hatte er schon früher angegeben (5). Dasselbe gilt von Polykras (6), welchen Scheerer wegen der Gleichheit in Krystallform und Aehnlichkeit in den übrigen Eigenschaften auch mit dem Euxenit zu vereinigen geneigt

(1) J. pr. Chem. XLIV, 207. — (2) J. pr. Chem. XXXVIII, 149. — (3) Pogg. Ann. LXXII, 566. — (4) Pogg. Ann. L, 149; Berz. Jahresber. XXI, 179. — (5) Berzelius' Jahresber. XXVI, 374. — (6) Pogg. Ann. LXXII, 568.

Die geringen Unterschiede entsprechen nach ihm dem verschiedenen Gehalt an isomorphen Bestandtheilen.

Folgende Varietäten von Columbit wurden untersucht: Columbit.
(Tantalit.)
I. Columbit aus Nordamerika, von Grewinck. Spec. Gew. von Stücken = 5,323, von Pulver = 5,320 (1). — II. Sibirischer, von Th. Bromeis (2). Spec. Gew. = 5,44. Mit Samarskit verwachsen; eine durch Afdeef an H. Rose gesandte Probe, in dessen Laboratorium beide vorstehende Analysen ausgeführt wurden. — III. Von Middletown in Nordamerika, von Hermann (3). Spec. Gew. = 5,80. Strich dunkel-nelkenbraun. — IV. Von Chanteloube (Limoges), einem neuen Fundort. Bestimmung und Analyse von Damour (4). Spec. Gew. = 7,64 bis 7,65. Amorph, bläulich-schwarz, mit glatten glänzend-schwarzen Bruchflächen und graulich-schwarzem Strich. Unschmelzbar. Vor dem Löthrohr mit Weinsteinkohle und Soda ein Zinnkorn gebend. Von Säuren nicht angegriffen. — V. Ebendaher von Damour (5). Rechteckige Prismen mit Abstumpfungsflächen und Winkeln wie am Columbit aus Baiern, sp. G. = 5,60 bis 5,727. Vor dem Löthrohr mit Phosphorsalz im Reductionsfeuer eine bräunlich-gelbe Perle gebend. Von concentrirter Schwefelsäure zersetzt.

	I.	II.	III.	IV.	V.			
					a.	b.	c.	d.
Met. Säuren	80,06	78,59	78,22	—	78,44	78,88	78,90	77,92
TaO ₅	—	—	—	82,98	—	—	—	—
WO ₃	—	—	0,26	—	—	—	—	—
SnO ₂	0,96	—	0,40	1,21	—	—	—	—
SiO ₂	—	—	—	0,42	—	—	—	—
FeO	12,59	12,76	14,06	14,62	14,96	14,04	14,50	14,56
MnO	5,97	4,48	5,63	Spur	6,52	7,83	7,15	8,19
YO	—		—	—	—	—	—	—
CaO	—	0,75	—	—	—	—	—	—
MgO	—	3,01	0,49	—	—	—	—	—
CuO	—	0,04	—	—	—	—	—	—
PbO	0,44	—	—	—	—	—	—	—
U ₂ O ₅		—	—	—	—	—	—	—
Summe	100,02	100,19	99,06	99,23	99,92	100,75	100,55	100,67

(1) Pogg. Ann. LXX, 572; im Ausz. Berl. Acad. Ber. 1847, 86; J. pr. Chem. XLI, 219. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 157; Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 118. — (3) J. pr. Chem. XLIV, 207. — (4) Ann. des min. [4] XIII, 387; im Ausz. Compt. rend. XXV, 670; J. pr. Chem. XLII, 451. — (5) Ann. d. min. [4] XIV, 423.

Columbit. No. V. d. der Tabelle war etwas verwittert, mit mattem Bruch.

Durch Uebersendung von $\frac{1}{2}$ Pfund amerikanischen Columbits durch Silliman ward H. Rose in Stand gesetzt die darin enthaltene Säure genauer zu untersuchen. Es enthält Niobsäure mit sehr wenig Pelopsäure. Von letzterer hält der bairische Columbit vielleicht die Hälfte mehr, woraus sich dessen höheres spec. Gewicht erklärt. Im sibirischen Columbit ist fast reine Niobsäure; er enthält außer ihr nur Spuren von Pelopsäure und kleine Mengen Wolframsäure, wovon auch die beiden ersteren etwas enthalten. Von diesen Angaben weichen die Hermann's ab. Aus dem niedrigen Mischungsgewicht und Reactionen des Säuregemenges aus dem nordamerikanischen Columbit schließt er auf einen vorherrschenden Gehalt an Ilmensäure, neben Pelopsäure und Niobsäure. In demselben Säuren nebst etwas Wolframsäure, nur wenig Pelopsäure, soll das sibirische Mineral (spec. Gew. = 5,73; Pulver dunkelbraun) enthalten. Eine Probe des Columbit von Bodenmais (spec. Gew. = 6,29; Strich schwarz) enthielt fast reine Pelopsäure. Uebrigens glaubt Hermann, daß seine Niobsäure, die man am reinsten aus Aeschinit erhält, etwas anderes sei, als was Rose unter diesem Namen versteht. — Die allgemeine Formel der Columbite ist nach Hermann = $2 RO, 3 (HO_2, NbO_2, PeO_2)$, die des Yttrotalits aus Finnland = $2 RO, 3 TaO_2$. — Damour giebt No. IV. dieselbe Formel. Die Gegenwart von NbO_2, PeO_2 neben TaO_2 hält er nicht für wahrscheinlich wegen des hohen spec. Gewichts; dagegen vermuthet er dieselbe im krystallisirten Columbit (No. V.).

Samaritit.
(Uranotantalit;
Yttrioilmenit.)

Hermann gab bekanntlich an, in dem Yttrotantalit vom Ilmengebirge, den er jetzt Yttrioilmenit nennt, die Säure eines neuen Metalls, des Ilmeniums, entdeckt zu haben. Das Mineral, von 5,614 bis 5,68 spec. Gew., gleicht,

auch Hermann angiebt, so sehr dem Uranotantal G. Rose's (1), dafs es von den sibirischen Mineralogen dafür gehalten und von Hermann an G. Rose gesandte Proben von diesem für identisch mit dem Uranotantal erklärt wurden. Nach Auerbach ist es isomorph mit Columbit. In von Samarski und von Afdeef erhaltenem Uranotantal, welcher nach H. Rose identisch mit dem Yttrilmenit, aber von geringerem spec. Gew. (= 5,39 bis 5,45) ist, hatte dieser nur Niobsäure und Wolframsäure gefunden. Titansäure, wovon der Yttrilmenit 5,9 pC. enthalten soll, fehlte. Eine neue Untersuchung des von Afdeef erhaltenen Minerals durch Peretz (2) unter H. Rose's Leitung gab :

	Metallsäure	U ₂ O ₃	FeO	YO	MgO	CaO u. MgO	Summe
1)	56,38	14,16	15,43	9,15	0,80	0,92	96,84
2)	56,00	16,70	15,90	11,04	0,75	1,02	101,41
3)	55,91	16,77	15,94	8,86	0,75	1,88	99,61

nebst Spuren von Kupferoxyd in 2). Das Mineral ward durch Schmelzen mit KO, 2 SO₃ aufgeschlossen, ist aber auch durch Digestion mit concentrirter Salz- oder Schwefelsäure zersetzbar. Bei näherer Prüfung der erhaltenen Metallsäuren wurden wieder nur Niob- und Wolframsäure gefunden, welche im Gemenge die von Hermann der Ilmensäure zugeschriebenen Reactionen zeigen. Rose stellt deshalb die Existenz der Ilmensäure und die Eigenthümlichkeit des Yttrilmenits ganz in Abrede. Den Uranotantal nennt er Samarskit, da der frühere Name wegen des fehlenden Tantal säuregehaltes nicht mehr paßt. Wegen der Isomorphie des Samarskits mit Columbit scheint ihm das Uranoxyd des ersteren die Pelopsäure des letzteren zu vertreten, und deshalb Uranoxyd gleiche atomistische Zusammensetzung wie Pelopsäure, Niobsäure und vielleicht auch Tantal säure zu haben; eben so dürfte nach Rose vielleicht die Yttererde

(1) Pogg. Ann. XLVIII, 555; G. Rose, Reise n. d. Ural II, 72. —

(2) Pogg. Ann. LXXI, 157; im Ausz. Berl. Acad. Ber. 1847, 131; Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 106. 129.

Samarakit. im Samarskit zum Theil das Eisen- und Manganoxys ersetzen. Eine Entscheidung über die chemische Constitution des Samarskits, Columbits und Tantalits hält er jedoch noch nicht an der Zeit.

In fortgesetzten Entgegnungen (1) behauptet Herman die Verschiedenheit des Samarskits vom Yttrilmenit (des Formel er auf Grund seiner früheren Analyse $[YO, FeUO], [TiO_2, TiO_2]$ annimmt), so wie die Eigenthümlichkeit der Ilmensäure, welche sich auch im Pyrochlor und Columbit vom Ilmengebirge, so wie im Columbit aus Nordamerica finden soll. Dagegen erklärt H. Rose (2) eine von Wöhler dargestellte Säure aus dem Pyrochlor von Miask ebenfalls für Niobsäure mit Tantsäure, nebst etwas Wolframsäure und Pelopsäure, während der Unterschied im spec. Gew. des Samarskits und Yttrilmenits daher rühren soll, dass zu seinen Bestimmungen ungeglühtes, zu denen Herman geglühtes Mineral gedient habe. Durch Glühen werde dasselbe leichter.

Wolframsäure.
Wolfram.

Kussin (3) analysirte den Wolfram von Zinnwald und Kerndt (4) (unter H. Rose's Leitung) außer diesen noch die Wolframe von 13 andern Fundorten, darunter 8 bis jetzt nicht analysirte (Nr. 2 bis 8 und 10). Breithaupt's Eintheilung des Wolframs in oligonen (mit röthlichbraunem Strich und 6,9 bis 7,1 spec. Gew.) und diatonen (mit schwarzbraunem Strich und 7,3 bis 7,5 spec. Gew.) erscheint durch diese Analysen begründet, indem die erste der Formel $2(FeO, WO_3) + 3(MnO, WO_3)$, letztere der Formel $4(FeO, WO_3) + MnO, WO_3$ ziemlich scharf entsprechen. — Die Wolframsäure bestimmte Kerndt durch Schmelzen des Wolframpulvers mit kohlen-saurem Natron. Fällung des Auszugs mit salpetersaurem Quecksilberoxyd und Glühen. Sie ward jedesmal mittelst Flusssäure auf K

(1) J. pr. Chem. XL, 475. 476; J. pr. Chem. XLII, 129; J. Chem. XLIV, 216. — (2) Pogg. Ann. LXXII, 469; Berl. Acad. B. 1847, 279; J. pr. Chem. XLII, 252; Pogg. Ann. LXXIII, 449.
(3) Rammelsberg's Handw. 3. Suppl. 127. — (4) J. pr. Chem. XLII,

selsäure geprüft. In einigen Varietäten glaubte Kerndt ^{Wolfram.} einen geringen Gehalt von Niobsäure zu erkennen.

K u s s i n :				
Wolfram von Zinnwald :				
berechnet		gefunden		
5 WO ₃	76,89	75,89	75,92	75,90
2 FeO	9,30	9,43	9,38	9,40
3 MnO	13,81	13,80	14,04	13,86
	100,0	99,12	99,84	99,16

K e r n d t :								
	Zinnwald	Lock Fell. Cumberland.	Neu bescheert Glück. Freiberg.	Huntington. Connecticut.	Trumbul. Connecticut.	Mäuseberg bei Nendorf. Harz.	Schlacken- walde.	Altenberg.
Spec. Gew.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Körner	7,22	7,281	7,228	7,411	7,218	7,231	7,482	7,198
Pulver	7,23	7,239	7,229	7,486	7,269	7,230	7,535	7,189
berechnet :	gefunden :							
5 WO ₃	76,89	76,34	75,62	75,96	75,83	75,47	75,76	75,80
2 FeO	9,30	9,61	9,54	9,53	9,20	9,53	9,73	9,78
3 MnO	13,81	14,20	14,85	14,49	15,56	14,26	14,49	14,41
	100,0	100,15	100,01	99,98	100,59	99,26	99,98	99,99
								99,54
								99,97

K e r n d t :						
	Ehren- frieders- dorf.	Nert- schinsk.	Monte- video.	Chante- loube.	Harz- gerode.	Godolphins- ball. Cum- berland.
Spec. Gew.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Körner	7,499	7,496	7,499	7,480	7,225	7,209
Pulver	7,540	7,503	7,518	7,510	7,228	7,230
berechnet :	gefunden :					
5 WO ₃	76,82	75,85	75,64	76,02	75,82	75,90
4 FeO	18,59	19,26	19,55	19,20	19,32	19,24
1 MnO	4,59	4,89	4,80	4,75	4,84	4,80
	100,00	100,00	99,99	99,97	99,98	99,94
						100,00

Kerndt hat den Wolfram auch krystallographisch untersucht. Seine Messungen (Hauptaxe : Makr. : Brachyd. = 0,8134 : 1 : 0,8659) stimmen nahe mit denen von Phillips überein; er hält ihn (wie G. Rose) für rhombisch, indem das hemiëdrische Auftreten der Octaëder-

Wolfram. flächen, sowie die ungleiche Beschaffenheit und Anordnung der vorderen und hinteren Flächen von $\frac{1}{2}$ $\bar{1}$ welche für die Annahme des monoklinometrischen Syst bestimmten, nur dem Wolfram von einzelnen Fund (Zinnwald) eigen seien. Kerndt beobachtete am Wolfram Zinnwald eine neue Zwillingsbildung mit Durchkreuzung wie beim Kreuzstein, und 2 Verwachsungen in paralleler Stellung nach $0P$ und $\infty \bar{P}\infty$.

Rammelsberg (1) analysirte ein braunrothes nadelförmiges Mineral von Schlaggenwalde, welches in Stein übergeht und mit Flussspath und Apatit durchwachsen ist. Spec. Gew. = 6,45.

WO ₃	FeO	MnO	CaO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Glühverl.	PO ₃ u. Fl.	Σ
67,05	6,72	19,73	3,02	1,01	1,08	0,78	0,61	1

**Wolframblei-
era.**

Kerndt (2) hat das Wolframbleierz von Zinnwald untersucht. Seine Messungen stimmen bis auf wenige Minuten mit denen Levy's überein. $P = 131^{\circ} 24'$ (Mittelkanten); $99^{\circ} 44' 24''$ (Polkanten). Hauptaxe = 1,56 beobachtete $P. \frac{1}{2} P. P\infty. \infty P. 0P$. Härte = $3\frac{1}{2}$ bis 4. Spec. Gew. in Körnern = 8,103, als Pulver = 8,127. Strich farblos, etwas in's Gelbliche. Die Zusammensetzung neuer brauner Krystalle fand er = (PbO, CaO, FeO, MnO), V

	WO ₃	PbO	CaO	FeO u. MnO	Summe
1)	51,43	47,12	1,26	0,31	100,12
2)	52,03	44,86	1,53	0,63	99,05
Rechnung	51,58	48,42	—	—	100,00

**Molybdate.
Gelbbleierz.**

John Brown (3) zerlegte Gelbbleierz (Fundort unbekannt) durch Digestion mit Ammoniumsulfhydrat. (Pb als PbO, O₃ und Mo als MoS₃ bestimmt.)

	berechnet	gefunden
PbO	61,48	60,23
MoO ₃	38,52	39,19
	100,00	99,42.

(1) Rammelsberg's Handwörterb. 8. Suppl. 127. — (2) J. pr. Chem. XLII, 81. — (3) Phil. Mag. [3] XXXI, 253; J. pr. Chem. XLII

Bei der Wiederaufnahme einer verlassenen Grube, ^{Vanadate.} Mina grande, bei San Yago in Chili fand sich ein etwa ^{Vanadinhal-} 0,5 Meter mächtiger Gang von schmutzig gelbem derbem ^{tiger} Pyromorphit (I), dessen häufige Höhlungen eine braun- ^{Pyromorphit.} schwarze erdige Masse enthalten (II), welche öfters auch dichte Warzen von bräunlichgelbem Strich bildet. Sie schmilzt schon in der Lichtflamme zur schwarzen Perle. Domeyko (1) analysirte beide.

	PbO	CuO	VO ₃	AsO ₃	PO ₃	PbCl	SiO ₂ ?	CaO	Al ₂ O ₃ u. Fe ₂ O ₃	Thon	HO	Summe
I.	58,3	0,9	1,8	11,5	5,1	9,0	—	7,9	1,1	2,0	1,1	98,7
II. a)	54,9	14,6	13,5	4,6	0,6	0,3	1,0	0,5	3,5	1,0	2,7	97,2
II. b)	51,9	16,9	13,3	4,6	0,6	0,3	1,3	0,5	3,4	1,5	2,7	97,0

Da in II a und b sich der Sauerstoff von PbO : CuO : VO₃ = 3,7 : 3,4 : 3,4 verhält, so glaubt Domeyko eine feste Verbindung von der Formel 6 PbO, VO₃ + 6 CuO, VO₃ annehmen zu dürfen.

Credner (2) hat den bisher ausschließlich am ^{Volborthit.} Ural vorgekommenen Volborthit auf einem Brauneisensteingange des Gottlobs bei Friedrichsrode gefunden, verwachsen mit Pyrolusit und mit einem neuen Kupfermanganerz (Crednerit), oder als Anflug auf Psilomelan. Credner untersuchte I. blättrigen Volborthit (spec. Gew. = 3,495), II. feinkörnigen grauen (spec. Gew. = 3,86), und III. feinkörnigen, licht-zeisiggrünen.

	CuO	CaO	MgO	MnO	VO ₃	HO	Unlös.	Summe
I.	44,15	12,28	0,50	0,40	36,58	4,62	0,10	98,63
Rechn.	45,81	13,16	—	—	37,39	3,64	—	100,00
II.	38,27	16,65	0,92	0,52	39,02	5,05	0,76	101,19
III.	38,90	17,40	0,87	0,53	36,91	4,62	0,77	100,00
Rechn.	39,29	18,82	—	—	38,18	3,71	—	100,00

Credner stellt die allgemeine Formel 4 RO, VO₃ + HO auf (entsprechender 3 RO, VO₃ + RO, HO zu schreiben?). Bei I. ist RO = $\frac{2}{3}$ Kalk und $\frac{1}{3}$ Kupferoxyd, bei II. und III = $\frac{2}{3}$ des ersteren und $\frac{1}{3}$ des letzteren.

(1) Compt. rend. XXIV, 793; Ann. des mines [4] XIV, 145. —

(2) Jahrb. Miner. 1847, 1. Hft.; Pogg. Ann. LXXIV, 546.

Arseniate.
Condurrit.

Der Condurrit, zuerst von Faraday (1) und von Kobell (2) analysirt, ist neuerdings von Rammelsberg (3) und von Blyth (4) untersucht worden. W Kalilauge, kohlensaures Ammoniak und Salzsäure arsenige Säure, letztere beide auch Kupferoxydul. Nach Rammelsberg löst die Salzsäure 62,29 pC. Cu_2O , 3,70 As_2O_3 . Im unverändert gefärbten Rückstand 12,81 Cu; 13,89 As; 2,20 S; 0,70 Fe_2O_3 und Außerdem enthält der Condurrit 5,83 HO. Zwei Analysen des Minerals im Ganzen gaben im Mittel 70,24 18,27 As; 0,66 Fe und 1,07 Rückstand.

Blyth machte nicht weniger als 13 Analysen, in der Arsenikgehalt zwischen 17,37 und 19,88 pC. Kupfergehalt zwischen 55,47 und 60,83 pCt. sch Als Mittel aus den vier besten Analysen giebt er 60,2 19,51 As; 0,25 Fe; 2,33 S; nebst 27,70 pC. Wasser, o scher Substanz und Sauerstoff an. — Beide Chemiker den Condurrit nicht für eine feste Verbindung, s für ein *Gemenge* von Kupferoxydul, arseniger Säure pferkies, Blyth) und dem Reste eines Arsenikk durch dessen Verwitterung das Mineral entstanden. Formel des ursprünglichen Arsenikkupfers berechnet melsberg aus dem in Salzsäure unlöslichen The Cu_2As_3 ; Blyth aber aus dem Ganzen zu Cu_6As_7 [kuper von Calabazo in Chili nach Domeyko (5) gleich er selbst den Beweis führte, daß das ursprüngn Verhältniß zwischen Kupfer und Arsenik nicht me Condurrit vorhanden sein kann.

Phosphate.
Pyromorphit
(als Hütten-
product).

Noeggerath (6) erhielt von der Eisenhütte zu A (Kreis Bernkastel, Mosel) wo phosphorsäure- und bleiox tige Eisenerze verschmolzen werden, Grünbleierz in wo

(1) Phil. Mag. 1827, 286. — (2) J. pr. Chem. XXXIX, 204 Jahresber. XXVII, 258. — (3) Pogg. Ann. LXXI, 305; Ramm Handwörterb. 8. Suppl. 19. — (4) Chem. Soc. Qu. J. I, 213 Ch. Pharm. LXVI, 362. — (5) Ann. des mines [4] III, 9. — (6) Miner. 1847, 1. Hft.

gebildeten 6seitigen Prismen und knospenförmigen Aggregaten, noch auf dem Gestein des Mauerwerkes sitzend.

Hermann (1) stellt wiederholt den Thorerdegehalt des Monazits von Miask gegen Kersten (2), Berzelius (3) und Wöhler (4) in Abrede. Früher sollte Kersten schwefelsaures Lanthanoxyd mit Thorerdesalz verwechselt haben, jetzt soll es ein neu entdecktes basisch-schwefelsaures Ceroxydulsalz gewesen sein. Nach directen Versuchen von Hermann ist das Cer im Monazit nicht als Oxyd, sondern als Oxydul enthalten, weshalb er seine frühere Analyse jetzt wie folgt corrigirte :

PO ₃	CeO	LaO	CaO	MgO	SnO ₂	Summe
28,05	37,36	27,41	1,46	0,80	1,75	96,83

Der sich jetzt herausstellende Verlust von 3,17 pC. soll von Wasser herrühren, welches früher nicht bemerkt wurde, weil dasselbe beim Glühen des Minerals an der Luft gegen Sauerstoff (zur Bildung von Ceroxyd) ausgetauscht wurde. Die Zinnsäure ist als Stannat, 3 RO, 2 SnO₂, beigemengt, und dieses abschlämmbar. Nach Abzug desselben stimmt die Analyse jetzt mit der Berzelius'schen Formel : 3 (CeO, LaO), PO₃ (5).

Mit dem Monazit zusammen vorkommend fand Hermann (6) ein neues Mineral, welches er Monazitoid nennt. Es ist dem ersteren höchst ähnlich und besitzt auch ganz gleiche Krystallform. Braun, harzglänzend, durchscheinend. Härte = 5. Spec. Gew. = 5,281. Vor dem Löthrohr stark leuchtend, unschmelzbar. Von Salzsäure nur theilweise zersetzt unter Entwicklung von etwas Chlor. Zusammensetzung :

PO ₃	TaO ₅ ?	CeO	LaO	CaO	HO	Summe
17,94	6,27	49,35	21,30	1,50	1,36	97,92

nebst Spuren von MgO und Fe₂O₃. Die der Tantalsäure

- (1) J. pr. Chem. XL, 21. — (2) Pogg. Ann. XLVII, 395. — (3) Berzelius Jahresber. XXV, 377. — (4) Pogg. Ann. XLVII, 424. — (5) Berzelius' Jahresber. XX, 245. — (6) J. pr. Chem. XL, 28.

ähnliche Säure gleicht der aus finnischem Tantalit. Hermann bringt sie wie die Zinnsäure im Monazit als $2\frac{1}{2}$ TaO_3 in Abzug, und stellt für den Monazitoid die Formel $5(\text{CeO}, \text{LaO}), \text{PO}_3$ auf. — Monazit und Monazitoid sind nach Hermann heteromere Gemenge, welche spec. Gew. von 5,12 bis 5,25 haben. Ein solcher gemener Krystall von 5,18 spec. Gew. gab: 22,70 PO_3 ; 3,75 Ta_2O_5 , 73,55 RO , und enthielt demnach nahe gleiche Theile beider Mineralien.

Alluaud.

Damour (1) beschrieb ein neues, dem Triphyllin verwandtes Mineral, welches Mathieu im Schriftegranit Chanteloube (Limoges) entdeckte. Es bildet große blättrige Massen von nelkenbrauner Farbe, welche nach zwei Richtungen vollkommen, nach einer dritten undeutlich spaltbar sind. Die Spaltungsflächen sind rechtwinklich aufeinander. In dünnen Splitteln durchscheinend. Ritzt Flussspath wird von Stahl geritzt. Spec. Gew. = 3,468. Im Kolben des Schmelzapparats schmilzt es, und schmilzt vor dem Löthrohr unter Schmelze leicht zum nicht magnetischen Korn. In Salzsäure ist es leicht löslich und giebt dabei etwas Chlor.

	PO_3	Fe_2O_3	MnO	MnO_2	NaO	HO	SiO_2	SiO
Gefund.	41,25	25,62	23,08	1,06	5,47	2,65	0,60	—
Rechn.	42,63	23,38	26,63	—	4,67	2,69	—	1

Formel = $3(\frac{1}{2}\text{MnO}, \frac{1}{2}\text{NaO}), \text{PO}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3, \text{PO}_3 +$

Vivianit.

Die Bildung von Vivianit betreffend vergl. S. 443

Gibbitt.

Hermann (2) ward durch seine Untersuchung Hydrargillits (vergl. S. 1164) veranlaßt, auch den Gibbs zu analysiren, und fand, daß Torrey und Thomson einen Gehalt von 36,87 pC. Phosphorsäure überschätzen, wie seiner Zeit Davy, Klaproth, Gren and John diese Säure im Wawellit überschätzen. Die Zusammensetzung ist = $\text{Al}_2\text{O}_3, \text{PO}_3 + 8\text{HO}$, was, Rammelsberg (3) bemerkt, die Zusammensetzung

(1) Compt. rend. XXV, 670; Ann. des mines [4] XIII, 341; im J. pharm. [3] XIII, 160; J. pr. Chem. XLII, 453. — (2) J. pr. Chem. XL, 32. — (3) Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 48.

künstlich, durch Fälen von Alaun mit phosphorsaurem Natron, dargestellten Thonerdephosphats ist.

	Al ₂ O ₃	PO ₅	HO	Rückstand	Summe
Gefunden I.	26,13	36,87	35,00	2,00	100,00
II.	26,66	37,62	35,72	—	100,00
Rechnung	26,38	36,65	36,97	—	100,00

Hermann erwähnt keiner Prüfung auf Fluor.

Durch zahlreiche Messungen (mit dem Reflexions- Lazulith. Goniometer) an Lazulith von Wehrau zeigte Prüfer (1), daß derselbe nicht dem rhombischen, sondern dem monoklinometrischen Krystallsystem angehört. Seine Angaben sind: $\alpha = 88^\circ 2'$; Hauptaxe: Orthodiagonale: Klinodiagonale $= 1,708 : 1 : 0,975$; $P = 99^\circ 40'$ und $100^\circ 20'$ (klinodiagonaler Hauptschnitt), $97^\circ 30'$ (orthodiagonaler Hauptschnitt), $135^\circ 25'$ (in der Basis); $P \infty = 120^\circ 20'$; $(P \infty) = 61^\circ 25'$; $\infty P = 91^\circ 30'$; $P \infty : 0 P = 118^\circ 30'$. — Die flächenreichen Krystalle sind prismatisch durch Vorherrschen von $+ P$, oder tafelförmig durch Vorherrschen von $- P \infty$. Sie sind ferner meist Zwillinge nach $\infty P \infty$, von rhombisch-pyramidalem Ansehen. Es kommen auch andere, nach $-\frac{1}{2} P$ zusammengesetzte vor. Der Lazulith besitzt nach Haidinger Dichroismus (2).

Rhodus (3) analysirte unter Will's Leitung I. den Phosphorochalcit und Ehlit. Phosphorochalcit von Rheinbreitbach und II. den Ehlit von Ehl bei Linz. (Der erstere in nierenförmigen Aggregaten mit hervorragenden, scharf ausgebildeten Krystallenden; in dünnen Splittern durchsichtig und smaragdgrün. Der letztere vorigem sehr ähnlich, nur etwas bräunlich und beim Erhitzen plötzlich in feine Fasern zerfahrend. Ettling). Beide sehr rein, namentlich ohne Arseniksäuregehalt.

	CuO	PO ₅	HO	Summe
I.	70,8	20,4	8,4	99,6
Rechnung	70,64	21,36	8,00	100,0
II.	63,1	28,9	7,3	99,3
Rechnung	63,83	28,94	7,23	100,0

(1) Haidinger's Abhandl. (vergl. S. 1147) I, 169; Haiding. Berichte II, 226. — (2) Haiding. Abhandl. I, 175. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXII, 369.

Der Phosphorochalcit ist hiernach $3\text{CuO}, \text{PO}_3 + 3(\text{C} \text{ H O})$, wie schon Kühn gefunden; der Ehlit aber $3\text{C} \text{ PO}_3 + \text{CuO}, 2\text{HO}$. — Da seine Analyse des Ehlits Berthier's (1) Analyse des Libethenits übereinstimmt, Rhodius geneigt, beide für identisch zu erklären; aber dieselben gesehen, wird Hausmann (2) beistimmend, daß sie im Aeußeren zu sehr von einander abweichen, als daß man sie vereinigen könnte. Kühn's (3) Kupferdiaspor, an den das Verhalten des Ehlits bei dem Erhitzen erinnert, enthält 69,61 pC. Kupferoxyd.

Uranglimmer.

Werther (4) hat I. den Uranit von Autun und den Chalkolith von Gunnislake analysirt.

	PO_3	U_2O_3	CaO	BaO	CuO	SiO_2	Erdiges	HO	Su
I.	14,00	63,28	5,86	1,03	—	—	—	14,30	98
II.a)	15,01	58,45	—	—	—	—	—	15,22	—
b)	13,52	57,20	—	—	—	—	0,61	15,55	—
c)	14,40	60,80	—	—	8,27	0,49	0,22	—	—

Die Analysen entsprechen der von Berzelius gestellten Formel; Werther schlägt aber die einfache Formel $[(\text{CuO}, \text{CaO}) + 2\text{U}_2\text{O}_3], \text{PO}_3 + 8\text{HO}$ vor, er gefunden, daß in einer von ihm neu entdeckten kristallinischen Verbindung $(2\text{U}_2\text{O}_3, \text{HO}), \text{PO}_3 + 8\text{H}_2\text{O}$ (vergl. S. 419) das basische Wasser durch kochen basisch essigsaurem Kupferoxyd gegen Kupferoxyd ausgetauscht und so künstlicher Chalkolith dargestellt werden kann. (Vergl. auch S. 420). — Es verdient hier bemerkt zu werden, daß Genth im Siebengebirge Uranit Holzstein fand (5).

Struvit.

Ulex (6) fand bei wiederholter Untersuchung Struvits einen Gehalt an Eisen- und Manganoxydul. Seine neuen Analysen führen übrigens zu der schon früher gegebenen Formel $\text{NH}_4\text{O} + 2(\text{MgO}, \text{FeO}, \text{MnO}) + \text{PO}_3 + 12\text{H}_2\text{O}$.

(1) Ann. des mines VIII, 334. — (2) Hausmann's Handb. d. 2. Aufl. II, 1100. — (3) Ann. Ch. Pharm. LI, 125. — (4) J. pr. C XLIII, 332. — (5) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 280. — (6) Ann. Ch. Ph LXVI, 41.

	NH ₃ und HO	MgO	FeO	MnO	PO ₃	Summe
I.	53,62	15,50	1,11		28,90	99,13
II.	53,64	13,15	2,22	2,01	28,05	99,07
III.	53,76	13,46	3,06	1,12	28,56	99,96
IV.	54,62	11,72	4,15	1,94	27,24	99,67

Ammoniak und Wasser wurden nicht für sich bestimmt. — Ueber die Axenverhältnisse des Struvits vergleiche S. 28.

Der bekannte faserige Cölestin von Dornburg bei Jena enthält nach einer von Maddrell (1) in Rammelsberg's Laboratorium gemachten Analyse 54,731 pC. SrO, 1,416 CaO und 43,756 SO₃.

Sulfate.
Cölestin.

Fresenius (2) analysirte körnigen Schwerspath von Naurod bei Wiesbaden.

BaO, SO ₃	SrO, SO ₃	Fe ₂ O ₃	SiO ₂	HO	Summe
89,47	1,85	0,29	8,15	0,08	99,84

Haarsalz.

Auf einer alten vermauerten Zeche des Bergwerks zu Rudain bei Königsberg in Ungarn fand Jurasky (3) das feldspathreiche und stark schwefelkieshaltige Gestein zwei Finger dick mit weißem Haarsalz und Eisenvitriol überzogen. Auf Drusenräumen fanden sich kleine sechsseitige, nach Haidinger's Untersuchung optisch 2axige und monoklinometrische Täfelchen : $(\infty P \infty) . \infty P \infty . \pm P \infty$, mit 2 Winkeln von etwa 92°, die übrigen etwa 134°. Die Analyse ergab :

Al ₂ O ₃	FeO	SO ₃	HO	Unlös.	Summe
14,30	2,15	36,75	44,60	2,01	99,81

was nach Abzug des Eisens als Eisenvitriol zu der bekannten Formel Al₂O₃, 3 SO₃ + 18 HO führt.

Haidinger (4) beschrieb und benannte ein von Schwind zu Ischl entdecktes und als neu erkanntes Mineral. Es kommt in zollgroßen krystallinischen Massen mit

Löwmit.

(1) Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 36. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 390. — (3) Oestr. Blätter für Lit. 1847, 434; Haid. Ber. (vergl. S. 1147) II, 332; Jahrb. Miner. 1847, 848. — (4) Abhandl. der K. Böhm. Ges. d. W. [5] IV; Haid. Ber. II, 266.

Löwëit. großblättrigem Anhydrit verwachsen vor. Es ist undeutlich spaltbar nach einer tetragonalen Pyramide mit Seitenkanten von etwa $105^{\circ} 2'$ und Endkanten von etwa $111^{\circ} 44'$, wonach die Hauptaxe = 1,3 ist. Deutlicher spaltbar ist es nach ∞P und $\infty P \infty$, deutlich nach $0 P$. Optisch einaxig. Strahlenbrechung doppelt: $O = 1,491$, $E = 1,494$; O-Axe attraktiv. Glasglänzend, gelblich-weiß bis honiggelb. Härte = 2,5 bis 3; spröde. Spec. Gewicht = 2,376. Geschmack schwach salzig-zusammenziehend. Zusammensetzung nach Karafiat:

NaO	MgO	SO ₃	HO	Fe ₂ O ₃ u. Mn ₂ O ₃	MnO	Summ
18,97	12,78	52,35	14,45	0,66	Spur	99,21

Es ward etwas weniger Natron und Magnesia erhalten als die Schwefelsäure zur Sättigung erfordert. Von dieser ausgehend erhält man 39,38 MgO, SO₃, 46,45 NaO, SO₃, 14,45 HO, entsprechend der Formel $2 \text{MgO}, \text{SO}_3 + 2 \text{NaO}, \text{SO}_3 + 5 \text{HO}$. Doch dürften auf 1 Aeq. des Doppelsalzes 2 HO anzunehmen sein, in der Voraussetzung, daß Salz den Ueberschuß angezogen habe. Vielleicht ist Johblödit (1) identisch mit Löwëit.

Medjidit.

Lawrence Smith (2) fand auf Uranpfecherz von Adonopel 2 neue Uranmineralien, wovon er das eine zu Ehren des Sultans Medjid, das andere nach Liebig benannte (vergl. S. 1226). Der Medjidit ist unvollkommen krystallin, durchsichtig, dunkel bernsteingelb. Bruchflächen harzglänzend. Härte = 2,5. (Spec. Gew. nicht angegeben.) Kolben Wasser gebend und dunkelgelb, geglüht schwarz werdend. Vor dem Löthrohr mit Flüssen Uranreaction zeigend. In verdünnter Salzsäure löslich, in Wasser nicht. Zusammensetzung: $\text{U}_2 \text{O}_3, \text{SO}_3 + \text{CaO}, \text{SO}_3 + 15 \text{HO}$. (I Detail der Analyse ist nicht angegeben.)

Schwefelsaures Kupferoxyd mit Kupferchlorid

Arthur Connel (3) untersuchte ein in feinen, nach Brooke dem hexagonalen Systeme angehörigen Nad

(1) Rammelsberg's Handwörterbuch, 3. Suppl. 27. — (2) Ann. Pharm. LXVI, 253. — (3) Report of the British Association for 1849; Edinb. new phil. Journ. XLIII, 244; J. pr. Chem. XLII, 453.

krystallisirtes Mineral von Cornwallis. Es ist durchscheinend, glasglänzend, dunkelblau, in feinen Fasern hellblau; unlöslich in siedendem Wasser, aber leicht löslich in Salpetersäure oder Salzsäure. Die qualitative Analyse ergab CuO , SO_3 und Cu Cl nebst wenig HO . Zur quantitativen Analyse war nicht Mineral genug zu erhalten. Es sind nur 10 Handstücke bekannt, wovon sich eines im British Museum befindet.

Haidinger (1) hat an den Tropfsteinen der sogenannten Galmehöhle und der Frauenhöhle bei Neuberg in Steiermark beobachtet, daß sich der Kalk aus dem Wasser zuerst in Form einer schleimigen bergmehlartigen Substanz absetzt, welche unter Vermittlung des kohlensäurehaltigen Wassers allmähig faserige, dann stängliche Structur und endlich die Beschaffenheit des vollkommen rhomboëdrischtheilbaren Kalkspaths annimmt.

Wasser-
freie
Carbonate.
Stalaktiten-
bildung.

Während seines Aufenthaltes auf Island hat Descloizeaux (2) Nachforschungen über das Vorkommen des Doppelspaths angestellt. Von der bekannten Reinheit findet er sich nur an einer einzigen (der von Robert angegebenen) Stelle in einer engen Schlucht am Eingang der kleinen Eskifiordur-Bucht, dem nördlichsten der beiden Zweige, in welche sich die Rödefiordur-Bucht endigt. Man sieht den Kalkspath nur auf einer Seite der Schlucht, wo er einen Raum von 17,8 Meter Länge und 4,2 Meter Höhe einnimmt, große Blasenräume eines schwarzen basaltähnlichen Gesteines erfüllend. In einem sehr großen dieser Räume befindet sich ein Block von circa 6 Meter Breite und 3 Meter Höhe, nach seinen ungefähren Umrissen ein einziges Rhomboëder R darstellend.

Kalkspath.

Schnabel (3) analysirte Doppelspath von Brilon (I.); Hochstetter (4) weißten krystallisirten Kalkspath von

(1) Wien. Acad. Ber. II, 202; Haiding. Berichte (vergl. S. 1147) IV, 358. — (2) Bulletin géologique [2] IV, 768; im Ausz. Jahrb. Miner. 1848, 590. — (3) Beilage zum Osterprogramm 1847 der Realschule zu Siegen, 11. — (4) J. pr. Chem. XLIII, 316.

Kalkspath. 2,702 spec. Gew. (II); Richter (1) weissen schwefelwasserstoffhaltigen, Bleiessigpapier schwärzenden Kalkspath schwarzem, über Gyps gelagertem Kalkstein von Markt (III); Gibbs (2) zinkhaltigen Kalkspath aus den Meigruben von Olkucz (IV); und Monheim (3) desgl. aus Galmeidruse vom Altenberg bei Aachen (V) und

	CaO	MgO	FeO	ZnO	SiO ₂	CO ₂	HO
I.	55,30	0,13	—	—	—	43,52	1,07
II.	56,00	Spur	1,60	—	1,90	43,45	—
III.	56,10	—	—	—	—	43,80	0,10
IV.	50,76	0,85	0,51	4,07	—	43,81	—
	CaO, CO ₂	FeO, CO ₂	ZnO, CO ₂	MnO, CO ₂	SiO ₂		
V.	89,27	9,31	1,64	—	—		
VI.	89,56	8,23	1,01	0,69	0,18		

Sandstein von Fontainebleau.

Die bekannten Kalkspathrhomboëder von Fontainebleau enthalten nach einer Analyse von Morlot (4) 58 pC. selbst bis zu 95 pC. mechanisch beigemengten Sand. Der geringe Rest von Kalkspath hatte also eine so grofse Kalkauflösungskraft geäußert, dafs er die überwiegende Sandauflösung zu bis zu 2" grofsen Rhomboëdern geformt hat, unter Beibehaltung der Spaltbarkeit. Eine ähnliche Erscheinung beobachtet man am Sandstein von Wallsee und Berg, wo 1" grofse Körner durch spaltbaren Kalk verkittet sind.

Ankerit.

Siemianowsky (5) analysirte den Ankerit vom Hausberg in Salzburg. Zusammensetzung:

CaO, CO ₂	MnO, CO ₂	FeO, CO ₂	Summe
85,83	13,36	1,10	100,29

Bitterspath.

Ott (6) analysirte in Form von R. 4 R krystallinen Bitterspath (I) von Kapnik ($R = 106^{\circ} 16'$, $4R = 106^{\circ} 16'$, Härte = 3,5, spec. Gewicht = 2,89); Gibbs (7) körnigen rhomboëdrisch spaltbaren carmoisinrothen

(1) Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) II, 479. — (2) Rammelsb. Handwörterb. 3. Suppl. 62. — (3) Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 62. — (4) Haidinger. Berichte II, 107. — (5) Haidinger. Berichte I, 198; bezüglich der Structur des Ankerits Leydolt daselbst I, 115. — (6) Haidinger. Berichte, II, 403. — (7) Pogg. Ann. LXXI, 564; J. pr. Chem. XLII, 458.

spath von Przibram (II), ausgezeichnet durch seinen Gehalt ^{Bitter-spath.} an CoO , CO_2 , welches bis jetzt nur im Kalksinter von Riechelsdorf vorkam; Gerned (1) Raunkalk von Beyenrode im Thüringerwald (III).

	CaO	MgO	FeO	MnO	CoO	CO ₂	Summe
I.	29,43	19,60	0,68	3,60	—	46,50	99,81
II. a)	31,72	16,63	1,36	—	5,17	45,12	100,00
b)	31,86	17,37	1,16	—	4,24	45,37	100,00
III.	28,93	23,46	3,48	—	—	42,45	98,31

Alle geben annähernd CaO , $\text{CO}_2 + \text{RO}$, CO_2 .

Einen Magnesit aus Griechenland fand Brunner (2) ^{Magnesit.} zusammengesetzt aus :

MgO	CO ₂	Al ₂ O ₃ u. Fe ₂ O ₃	Summe
51,026	49,492	Spuren	100,518

Auf Breithaupt's Veranlassung analysirte Fritzsche (3) ^{Mesitinspath. (Pistomesit.)} den krystallisirten Mesitinspath von Traversella in Piemont (I), und auch Gibbs (4) analysirte denselben (II). Beide fanden ihn aus $2 (\text{MgO}, \text{CO}_2) + \text{FeO}, \text{CO}_2$ zusammengesetzt, während Stromeyer nach brieflicher Mittheilung an Breithaupt (5) gleiche Aeq. von beiden Gliedern erhalten hatte. — Für einen Mesitinspath von Thurnberg bei Flachau in Salzburg (IV) in Rhomboëdern von $107^\circ 18'$ und von 3,412 bis 3,417 spec. Gew. fand Fritzsche (6) jedoch dasselbe Verhältniß, wie Stromeyer, weshalb Breithaupt diesen Mesitinspath von den übrigen als eine besondere Species, Pistomesit, trennte. — Dem zwischen beiden vorigen stehenden Verhältniß $5 (\text{MgO}, \text{CaO}, \text{CO}_2) + 3 (\text{FeO}, \text{CO}_2)$ entspricht nach Patera (7) der Mesitinspath, welcher den Lazulith von Werfen begleitet (V). Derselbe ist spaltbar nach R ($107^\circ 10'$), hellbraun und von 3,33 spec. Gewicht.

(1) Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 26. — (2) Verhandl. der Schweiz. naturf. Gesellschaft in Winterthur, 1847; Jahrb. Miner. 1848, 482. — (3) Pogg. Ann. LXX, 146. — (4) Pogg. Ann. LXXI, 566. — (5) u. (6) Pogg. Ann. LXX, 146. — (7) Oestr. Blätter f. Literatur, 1847, 363; Haiding. Berichte (vergl. S. 1147) II, 296; Haiding. Abhandl. I, 175; Jahrb. Miner. 1848, 66.

	I.	II.	III.	IV.	V.
FeO	24,18	26,61	35,13	33,92	27,37
MgO	28,12	27,12	20,66	21,72	26,76
CaO	1,30	0,22	—	—	—
CO ₂	45,76	46,05	44,21	43,62	45,84
	99,36	100,00	100,00	99,26	99,97

Erdiges Man-
gancarbonat.

Kane (1) hat bei Glandree, Pfarrei Tulla, Grafscl
Clare in Irland unter einem auf *old red sandstone* ruh
den Torflager eine mehrere Zoll mächtige Lage erdi
kohlensäuren Manganoxyduls gefunden. Das reinere gle
in der Farbe dem künstlich dargestellten; meistens ist
aber gelbbraun von beigemengtem Torf. Die Analyse g

	MnO, CO ₂	CaO, CO ₂	FeO, CO ₂	Thon u. Sand	Org. Mat., Wasser und Verlust	Summe
1)	74,55	Spur	15,01	0,33	10,11	100,00
2)	79,94	2,43	11,04	0,37	6,22	100,00

Eisenspath.

Rosengarten (2) untersuchte braunschwarzen
stallisirten Eisenspath (I) von der Wölch im Lavantthal, K
then (zum Theil in Brauneisenstein übergegangen); G
son (3) fast weisse Krystalle von Bieber in Kurhessen (4)
Schnabel (4) Sphärosiderit aus dem Basalt der G
Alte Birke bei Eisern unweit Siegen (III); Monheim
grüne Krystalle auf Brauneisenstein vom Altenberg
Aachen (IV), von 3,60 spec. Gew. und hohem Kalkge

	FeO	Fe ₂ O ₃	MnO	CaO	MgO	CO ₂	Unlös.	Summe
I.	43,83	11,30	7,31	—	2,44	35,12	—	100,00
II.	53,06	—	4,19	1,08	2,23	38,37	0,48	100,00
III.	43,59	—	17,87	0,08	0,24	38,22	—	100,00
	8 (FeO, CO ₂)		2 (MnO, CO ₂)		3 (CaO, CO ₂)		SiO ₂	Summe
IV. {	64,04	16,56	20,22	1,10	101,92	gefur		
	63,58	15,81	20,61	—	100,00	berec		

Eisen-Zink-
spath.
(Kupnit.)

Monheim (6) analysirte den von Breithaupt

- (1) Phil. Mag. [3] XXXII, 37; im Ausz. Pharm. Centr. 1848,
— (2) Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 112. — (3) Ann. Ch. Pharm. I
91; vgl. S. 443. — (4) Osterprogramm der Realschule zu Siegen 1847,
(5) Verh. des naturhist. Vereins der preufs. Rheinl. 1848, 36; Jahrb. M
1848, 585. — (6) Verh. des naturhist. Vereins der preufa. Rheinl. 1
36; Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 131.

besondere Mineralspecies »Kapnit« aufgeführten eisenhaltigen Zinkspath von Altenberg bei Aachen.

	Spec. Gew.	ZnO, CO ₂	FeO, CO ₂	MnO, CO ₂	CaO, CO ₂	MgO, CO ₂	Galmei	Summe
1)	4,09	71,08	23,98	2,58	2,54	—	—	100,18
2)	4,15	60,35	32,21	4,02	1,90	0,14	2,49	101,11
3)	4,00	58,52	35,41	3,24	3,67	—	0,48	101,82
4)	4,04	55,89	36,46	3,47	2,27	—	0,41	98,50
5)	4,00	40,48	53,24	2,18	5,09	—	—	100,94
6)	—	28,00	67,00	—	5,00	—	—	100,00

Da der Eisengehalt, wie zu erwarten stand, sehr wechselnd ausfiel, so hält Monheim die Annahme einer besonderen Species für unzulässig, und schlägt für die hellgrünen zinkreichen Varietäten die Benennung Zinkeisenspath, für die dunkelgrünen oder durch Oxydation des Eisens braun gewordenen Varietäten die Benennung Eisenzinkspath vor.

Monheim untersuchte auch durch größeren Mangan-
gehalt ausgezeichnete Zinkspathe von Aachen. I. hellgrüne Rhomboëder, spec. Gew. = 403, II. dunkelgrüne, spec. Gew. = 3,98, beide (1) vom Herrenberg; III. gelblich-weiß vom Altenberg (2), spec. Gew. = 4,20.

	ZnO, CO ₂	MnO, CO ₂	FeO, CO ₂	MgO, CO ₂	CaO, CO ₂	SiO ₂	HO	Galmei	Summe
I.	85,78	7,62	2,24	4,44	0,98	0,09	Spur	—	101,15
II.	74,42	14,98	3,20	3,88	1,68	0,20	0,56	—	98,92
III.	84,92	6,80	1,58	2,84	1,58	—	—	1,85	99,57

Unter der Benennung Nickelsmaragd beschrieb Silliman d. j. (3) ein den amerikanischen Mineralogen seit 1846 unter dem Namen grünes Chromoxyd bekannt gewesenes Mineral (4) von Texas, Lancaster-County in Pennsylvanien, wo es als tropfsteinartige Rinde auf Chromeisenstein vorkommt. Es ist amorph, mit unebnem, etwas schuppigem Bruch; Härte = 3 bis 3,5; spec. Gew. = 2,57 bis 2,693; es ist stark glasglänzend, smaragdgrün mit gelblich-grünem Strich. Im Kolben erhitzt giebt es Wasser und wird schwärzlich-grau. Es ist leichtlöslich in Salzsäure unter Brausen und Hinterlassung von etwas Chromeisen. Bei einer ersten Analyse übersah Silliman den Kohlensäure-

- (1) Verhandl. des naturhist. Vereins der preuss. Rheinl. 1848, 171. —
 (2) Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 131. — (3) Sill. Am. J. [2] VI, 248. —
 (4) Proceed. of the Boston nat. Hist. Soc. 1846, No. 18.

gehalt und bestimmte das Mineral als NiO , 2 HO (1). Die Zusammensetzung ist $= \text{NiO}, \text{CO}_2 + 2 (\text{NiO}, 3 \text{HO})$.

	NiO	CO ₂	HO	Summe
Gefunden .	58,82	11,69	29,49	100,00
Rechnung .	59,73	11,66	28,61	100,00

Hydro-Nickel-
magnetit.

Ein hierher gehöriges, an gleichem Fundort auf Serpentin vorkommendes Mineral, welches aufser den obigen Bestandtheilen noch Magnesia enthält, nennt Shepard (2) Hydro-Nickelmagnetit. Es konnte nur qualitativ untersucht werden.

Liebigit.

Lawrence Smith (3) entdeckte auf Uranpfecherz von Adrianopel ein neues Uranmineral, und benannte es nach Ehren Liebig. Warzenförmige, nach einer Richtung deutlich spaltbare, mit prächtig apfelgrüner Farbe durchsichtige Massen. Härte = 2 bis 2,5. Spec. Gew. nicht angegeben. Gibt im Kolben Wasser und wird dabei grau. Wird in der Glühhitze schwarz, kalt wieder oranienroth, in stärkerer Hitze bleibend schwarz. Gibt mit Flüssen Uranreaction. Ist Salzsäure unter Brausen löslich. Zusammensetzung nach dem Mittel aus zwei mit sehr wenig Mineral ausgeführten Analysen $= \text{U}_2\text{O}_5, \text{CO}_2 + \text{CaO}, \text{CO}_2 + 20 \text{HO}$.

	U ₂ O ₅	CaO	CO ₂	HO	Summe
Gefunden .	38,0	8,0	10,2	45,2	101,4
Rechnung .	36,3	7,1	11,1	45,5	100,0

Aurichalcit.

A. Connel (4) untersuchte ein blättriges blafsgrün perlmutterglänzendes Mineral von Matlock.

ZnO	CuO	CaO	MgO	CO ₂	HO	Summe
42,5	32,5	Spuren		27,5		102,7

Nach seiner Zusammensetzung gehört das Mineral zu Aurichalcit oder zum Buratit. Da Connel die Kohlensäure nicht für sich bestimmte, so erscheint die von demselben aufgestellte Formel $2 (\text{ZnO}, \text{CuO}), \text{CO}_2 + \text{HO}$ zweifelhaft.

Borat.
Boracit.

Beim Aufsäubern eines Bohrlochs zu Staffsforth war eine verhältnissmässig grosse Menge eines dem Kalkstein ähnlichen Minerals aus einer Tiefe von etwa 1400 Schritten zu Tage gefördert, welches Karsten bei näherer Unter-

(1) Sill. Am. J. [2] III. 407; Jahrb. Miner. 1848, 587; Pogg. A. LXXIII. 154. — (2) Sill. Am. J. [2] VI. 250. — (3) Ann. Ch. Phys. LXVI, 253. — (4) Edinb. n. phil. Journ. XLV, 36; J. pr. Chem. XLV, 4

suchung als derben Boracit erkannte (1). Die Oberfläche der Stücke erschien zerfressen und zuweilen mit kleinen Steinsalzkristallen besetzt, der Bruch dicht und eben. Farbe schneeweiss, an der Luft gelblich werdend. Härte = 4,5; spec. Gew. = 2,9134. Unter dem Mikroskop erschien das Mineral amorph, das Pulver ward aber bei dem Erwärmen auf einer Metallplatte pyroelektrisch, wie das des krystallisirten Boracits (2). Die Analyse gab: 29,48 pC. MgO, 69,49 BO₃ und 1,03 FeO, CO₂ nebst Spuren von MnO und Fe₂O₃, HO. Karsten glaubt, daß der Boracit wesentlichen Antheil an der Zusammensetzung des Stafsfurter Steinsalzgebirges habe, und erinnert mit Recht an das erhöhte Interesse, welches das Vorkommen von Boracit als Gebirgsart hinsichtlich der Borsäure-Exhalationen in Italien u. a. darbietet (3).

Boracit.

Hankel (4) hat eine Reihe Versuche angestellt, wodurch er darlegt, daß der von ihm schon früher beobachtete, allein von P. Riefs und G. Rose (5) geläugnete Wechsel der Elektricitäten an den einzelnen elektrischen Polen des Boracits sowie des Titanits bei dem Erwärmen allerdings Statt findet, und zwar selbst mit oftmaliger Wiederholung, sowohl bei steigender als sinkender Temperatur.

Da Hermann's (6) und Chodnew's (7) Analysen des Chioliths kein übereinstimmendes Resultat gegeben, so analysirte Rammelsberg (8) einen von G. Rose erhaltenen Chiolith (spec. Gew. = 3,003 bis 3,077) und Pearce unter Leitung Rammelsberg's einen von Crantz erhaltenen von 2,84 bis 2,89 sp. G. Es zeigte sich, daß unter dem Namen Chiolith zwei äußerlich ganz gleiche, aber verschieden zusam-

Fluoride.
Chiolith.

(1) Karsten's Arch. XXI, 2. 491; Berl. Acad. Ber., Jan. 1847, 14; Pogg. Ann. LXX, 557; J. pr. Chem. XL, 314. — (2) Report of the Brit. Assoc. 1847, Notices, 55. — (3) Pogg. Ann. LXXI, 243; vergl. Bischof, chem. u. phys. Geologie, I, Kap. 6. — (4) Pogg. Ann. LXXIV, 231. — (5) Pogg. Ann. LIX, 351. — (6) J. pr. Chem. XXXVII, 188; Berzel. Jahresber. XXVII, 230. — (7) Verhandl. der K. Russ. mineral. Gesells. zu Petersb. 1845—1846, 208; Rammelsberg's Handw. 3. Suppl. 31. — (8) Pogg. Ann. LXXIV, 314; im Ausz. J. pr. Chem. XLV, 455.

Chiolith. mengesetzte Mineralien von Miask erhalten werden. Rammelsberg's Analyse stimmt mit der von Chodnew, n dem letztere nach Abzug von 0,59 K, 0,93 Mg, 1,04 Y? 0,86 Glühverlust auf 100 berechnet worden, und führt der Formel $2 \text{ Na Fl} + \text{Al}_2 \text{ Fl}_2$. Die Analyse Pearce stimmt mit der von Hermann, und führt zu der Formel $3 \text{ Na Fl} + 2 \text{ Al}_2 \text{ Fl}_2$. (Die Resultate von Rammelsb und von Pearce sind die Mittelzahlen aus je drei Analy

	Rammelsb.	Chodnew	Rechnung		Hermann	Pearce	Rec
2 Na	27,68	27,48	27,40	3 Na	23,78	23,95	24
2 Al	15,75	17,01	16,32	4 Al	18,69	18,44	18
5 Fl	—	55,51	56,28	9 Fl	57,53	—	57
Summe		100,00	100,00		100,00		100

Es giebt demnach jetzt 3 verschiedene Verbindu von Fluornatrium mit Fluoraluminium :

- 1) Kryolith 2) Chiolith Chodnew's 3) Chiolith Hermann
 $3 \text{ Na Fl} + \text{Al}_2 \text{ Fl}_2$ $2 \text{ Na Fl} + \text{Al}_2 \text{ Fl}_2$ $3 \text{ Na Fl} + 2 \text{ Al}_2 \text{ Fl}_2$

von welchen die mittlere vielleicht Nipholith (*vig* nennen wäre.

Chloride.
Steinsalz.

Fehling (1) untersuchte Steinsalz von Wilhelms bei Schwäbisch-Hall.

	NaCl	NaO, SO ₃	CaO, SO ₃	CaCl	CaO, CO ₂	MgO, CO ₂	Thon u. Fe, O ₂
I.	99,97	—	0,02	—	—	—	0,01
II.	98,36	0,03	0,55	—	0,52	0,13	0,53
III.	98,81	—	0,11	0,02	0,16	0,15	0,80

Martinsit.

Ein zu Staffsurth erbohrtes Steinsalz gab nach 3 einstimmenden Analysen 90,98 pC. NaCl und 9,02 MgO, was der Formel $10 \text{ Na Cl} + \text{MgO}, \text{SO}_3$ entspricht. sten (2) nennt dasselbe Martinsit.

Mendipit.

Der Mendipit ist vor einigen Jahren auf der Kunigunde bei Brilon in Westphalen gefunden wo Rhodius (3) und Schnabel (4) haben dafür dieselbe sammensetzung erhalten, wie Berzelius :

(1) Fehling, chem. Unters. der Soolen der würtemb. Salinen, 1847; Würtemb. naturwissenschaftl. Jahreshfte, IV, 36; J. pr. XLV, 276. — (2) Berl. Acad. Ber. 1847, 16. — (3) Ann. Ch. LXII, 373. — (4) Osterprogramm der Realschule zu Siegen, B 1847, 10; Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 78.

	Pb Cl	2 Pb O	Summe
Rhodus	39,07	60,10	99,17
Schnabel	38,74	61,26	100,00

Nach Nendtvich (1) enthält der Bergtheer von Mu-
 raköz unweit Csáktornya in Ungarn weder in seiner festeren
 noch in seiner öligen Modification Sauerstoff, sondern hat
 im Ganzen dieselbe Zusammensetzung wie das Petrolen
 Boussingault's (C_8H_8); er enthält demnach kein Asphalten.

Die Pseudomorphosen und deren Bildung betreffend
 sind mehrere Arbeiten erschienen. Für einen Auszug
 daraus, der auch nur entfernt Anspruch auf Vollständi-
 gkeit machen könnte, würde der uns in vorliegendem
 Bericht gestattete Raum nicht hinreichen, weshalb wir
 uns auf den Literaturnachweis beschränken müssen :
 1) Haidinger, Pseudomorphosen von Eisenoxyd; in dessen
 Abhandlungen II, 267 und in dessen Berichten IV, 1. —
 2) Sillem, Beschreibung einer Reihe zum Theil neuer
 Pseudomorphosen; in Pogg. Ann. LXX, 565. — 3) Blum,
 Nachtrag zu den Pseudomorphosen des Mineralreichs. Stuttg.
 1847. — 4) Bischof, Lehrbuch der phys. Geologie, II. Ban-
 des 1. und 2. Abtheilung. Bonn (wie das ganze Werk
 von unschätzbarem Werth für die Bildungsgeschichte der
 einfachen und zusammengesetzten Mineralien). — 5) Suckow,
 die Lehre von der Verwitterung im Mineralreich. Leipzig,
 1848.

(1) Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) III, 271.

Chemische Geologie.

Allgemei-
nes.
Methodik
chemisch-
geologischer
Forschung.

Die wichtigste Erscheinung der Jahre 1847 und 1848 im Gebiete dieser Wissenschaft ist G. Bischof's Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie (1). Es ist dies in der That das erste und bis jetzt das einzige Werk dieser Art in der gesammten Literatur, welches die chemischen und physikalischen Vorgänge in der Erdrinde, bei der Bildung der Gesteine, der Quellen, der Pseudomorphosen der Mineralien und der Metamorphosen der Felsarten, bei der Entstehung der Gänge, Erzlager u. s. w. zu seiner Aufklärung gemacht hat, frühere Erfahrungen in diesem Gebiete einer wissenschaftlichen Kritik unterwirft, und durch eine reiche Fülle eigener Versuche den in der letzten Zeit öfter betretenen Weg einer rationellen Einsicht in die Bildungs-, Entwicklungs- und Umwandlungsgeschichte der Erdrinde, in der Geschichte der geschichteten und massigen Gesteine vorgezeichnet und ebnet hat. Von den Quellen und Gewässern und ihren chemischen Inhalten ausgehend, der nur das Product oder Educt eines Processes auf unserem Wege sein kann, weist G. Bischof für alle diese Stoffe die Gesteine nachzuweisen

(1) Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie von Gustav Bischof. Bonn 1847 und 1848. (Des zweiten Bandes dritte theilung ist noch nicht erschienen.)

welchen sie vorkommen, die Art und Weise, wie sie in einen aufgelösten Zustand versetzt und zu neuen Bildungen und Umbildungen verwandt worden sind. Ueberall stützt er sich auf Vorgänge, die noch unter unsern Augen vor sich gehen, und findet in diesen hinreichende Ursachen für die Umänderungen, die man in allen Gesteinen wahrnimmt. Er verfolgt jeden einzelnen Gemengtheil eines Gesteins bis zu seinem Ursprung, ermittelt mit seiner Entstehungsgeschichte auch die oft so complicirte Geschichte des Gesteins selbst, wobei er den pseudomorphen Mineralien seine hauptsächlichste Aufmerksamkeit widmet und dieselben zu der vorzüglichsten Stütze der Lehre von einer unendlich langsamen chemischen Umwandlung der Gesteine macht, welche uns einen tiefen Blick in das Wirken und Walten chemischer Kräfte in und unter der Oberfläche und dem durch sie bewirkten Zusammenhang der unorganischen mit der organischen Natur gestattet.

Methodik
chemisch-
geologischer
Forschung.

Der Umfang dieses Jahresberichtes verbietet hier weiter auf den Inhalt eines Werkes einzugehen, das seiner Reichhaltigkeit und Gründlichkeit wegen keines Auszuges fähig ist, das ohnehin als die erste Quelle der geologischen Chemie in den Händen eines jeden Geologen und Chemikers sein muß.

Delesse (1) hat eine Methode angegeben, nach welcher sich die Volum- und Gewichtsverhältnisse der Gemengtheile einer Felsart leichter und genauer bestimmen lassen, als durch die mühsame Handscheidung, welche überdies wegen den zu geringen Unterschieden im spec. Gewicht nicht oft ausführbar ist. Die Methode dürfte indessen in der Praxis ihre großen Schwierigkeiten darbieten, und auch wohl in den meisten Fällen nur ein annäherndes Resultat geben. Sie gründet sich auf die von Delesse weiter ausgeführte Betrachtung, daß sich in einer gleich-

Bestimmung
der Gemeng-
theile von
Gesteinen.

(1) Arch. ph. nat. VI, 114; Ann. des mines [4] XIII, 379. 686; im Ausz. Compt. rend. XXV, 544; Naumann's Lehrbuch der Geognosie, I, 431.

Bestimmung
der Gemeng-
theile von
Gesteinen.

förmig gemengten Felsart die Volume der Gemengtheil unter einander verhalten wie deren Oberflächen $p, p', p'' \dots$ welche auf einer ebenen Fläche P (eines Parallelepipedium) sichtbar sind. Sind die spec. Gewichte $d, d', d'' \dots$ der Gemengtheile, sowie D der Felsart bekannt, so ergibt sich aus $\frac{p \cdot d}{P \cdot D} + \frac{p' \cdot d'}{P \cdot D} + \frac{p'' \cdot d''}{P \cdot D} \dots = 1$ die Gewichtsverhältnisse; man würde selbst die chemische Zusammensetzung der Felsart aus derjenigen der Gemengtheile nach

$$A = \frac{p \cdot d}{P \cdot D} a + \frac{p' \cdot d'}{P \cdot D} a' + \frac{p'' \cdot d''}{P \cdot D} a'' \dots$$

berechnen können, worin A, a, a', a'' einen chemischen Bestandtheil der Felsart und der Gemengtheile bedeutet. Um p, p', p'', P zu bestimmen, legt Delesse auf eine eben geschliffene und (damit die Gemengtheile deutlicher sichtbar werden) vorher mit Oel getränkte Fläche der Felsart Goldschlägerhaut oder Durchzeichnenpapier, zeichnet die Umrisse der Gemengtheile nach, und illuminiert die Zeichnung, worauf dieselbe mit Gummi auf Staniol geklebt und mit der Scheere ausgeschnitten wird. Nach Entfernung des Papiers werden die Stücke gewogen und so p, p', p'', P im Gewicht ausgedrückt erhalten. Auf diese Weise fand Delesse die Zusammensetzung folgender Felsarten nach Volum:

Rother ägyptischer Granit	43 A	9 B	44 C	4
Porphyrtiger (zum Theil) Granit von Choly (Vogesen)	45 E	2 F	52 C	1
Körnige Varietät desselben	46 E, F		55 C	2
Porphyrtiger Granit (Vogesen)	28 E	7 F	60 C	6
Porphyrtiger Granit (Vogesen)	11 E	5 F	80 G	4
Syenit vom Ballon	18 A	36 H	46 I	
Varietät desselben	17 A	34 H	49 I	
Grobkörniger Diorit	62 K	38 L		
Kugeldiorit (Corsica)	84 K	16 L		
Quarzporphyr (Vogesen)	11 E	73 M	13 C	3
Rother antiker Porphyr	11 F	87 O	2 L	
Melaphyr (Girromagny)	35 P	62 Q	3 R	
Porphiro-verde antico	43 P	57 S		
Abart desselben	42 P	58 S		
Labradorreiche Abart	54 P	46 S		

A rother Orthoklas. — B weißer Feldspath mit Zwillingbildung wie Albit. — C grauer Quarz. — D schwarzer Glimmer. — E weißer Orthoklas. — F röthlicher Oligoklas. — G Quarz mit den beiden Feldspathen und etwas Glimmer eine Grundmasse bildend. — H weißgelber Andesit. — I Quarz mit Hornblende und etwas Glimmer. — K weißer Albit mit etwas Quarz. — L grüne Hornblende. — M weißgelber Quarz und Feldspathgrundmasse. — N Flint und Glimmer. — O kastanienbraune Grundmasse. — P grünlicher Labrador. — Q dunkelviolette Grundmasse. — R Kalkspathmandeln. — S grüne Grundmasse.

Eine an Thatsachen reiche Abhandlung über den Magnetismus der Mineralkörper und Felsarten und über die bedingenden Ursachen einiger Anomalien im Erdmagnetismus hat Fournet (1) geliefert, und daran beachtungswerthe Rathschläge in Bezug auf die Aufstellung magnetischer Instrumente geknüpft. — Nach Durocher (2) zeigen nur Granite selten Magnetismus, aber unter 38 Mustern von Dioriten, Trappen, Basalten, Trachyten und Laven wirkten 34 auf die Nadel, was von einem kleinen Gehalt an Eisenoxydul, von Titaneisen oder Magnetkies abzuhängen scheint, obgleich auch die Mehrzahl nicht magnetischer Gesteine Eisenoxyd an kochende Essigsäure abgibt und durch Calcination röthlich wird.

Rivot und Phillips (3) haben Untersuchungen über die elektrische Leitungsfähigkeit der hauptsächlichsten Gesteine bei hoher Temperatur angestellt, die in Bezug auf die Rolle, welche die Electricität bei gewissen Arten von Erzgängen, besonders in Hinsicht ihres oft plötzlichen Anreicherns mit der Aenderung des Gesteins, geologische Wichtigkeit erhalten können; und sie gedenken ihre Untersuchung auch auf die Leitungsfähigkeit derselben Gesteine bei niederer Temperatur und bei der Dazwischenkunft von Wasser und einem hohen Druck auszudehnen. Die meisten Gesteine oder Mineralien der Erdrinde leiten die Electricität durchaus nicht bei einer gewöhnlichen Temperatur oder unterhalb der Rothglühhitze, und nachdem sie gänzlich ausgetrocknet sind. Die einzigen leitenden Mineralien bei gewöhnlicher Temperatur sind einige Schwefelmetalle, wie Bleiglanz, Eisenkies, Kupferkies, Schwefelantimon, und das Magneteisen. Dagegen leitet eine große Anzahl von Gesteinen die Electricität bedeutend, wenn sie mit Wasser imprägnirt oder wenn sie auf eine höhere Temperatur gebracht sind. Feuerfeste Thone sind Leiter bei gewöhn-

Magnetismus
der Gesteine.

Gangbildungen.
Leitung
der Gesteine
für Electricität.

(1) Jahrb. Miner. 1848, 661. — (2) Compt. rend. XXV, 208; Jahrb. Miner. 1848, 209. — (3) Ann. des mines [4] XIV, 57.

Leitung der
Gesteine für
Electricität.

licher Temperatur, wenn sie nass sind, Nichtleiter wenn ausgetrocknet sind, und sie bewahren die letztere Eigenschaft bei jeder Temperaturerhöhung. Diese Eigenschaft war sehr nützlich bei der Ausführung der Versuche, indem sie den Einfluss der Tiegel und der feuerfesten K auf die Leitungsfähigkeit der verschiedenen untersuchten Stoffe aufhob.

Indem wir auf die Abhandlung selbst verweisen, können wir hier nur noch die Reihenfolge der Gesteine aufführen, wie sie nach diesen Beobachtern in ihrer Leitungsfähigkeit abnehmen:

1. Schwarze Hornblende. 2. Chloritschiefer, parallel den Bläddurchgängen. 3. Toadstone. 4. Rother Porphyr. 5. Elvan von Cornwall. 6. Chloritschiefer, senkrecht auf den Bläddurchgängen. 7. Rother gepulverter und geschmolzener Porphyr. 8. Schwarzer Augit. 9. Sphäroide (Orthoklas, Albit, Ryakolith). 10. Killa. 11. Glimmer. 12. Gneiss, Granit. 13. Quarz, weißer und grüner Augit, grüne Hornblende, Elvan von Freiberg. 14. Feuerfeste Thone, Kalk.

Schmelz-
versuche mit
Felsarten.

Delesse (1) hat eine Menge Schmelzversuche an Gesteinen vorgenommen, die geologisches Interesse besitzen. Manchmal kann ein Gestein mehrere Tage im Schmelztiegel erhalten werden, ohne die Wände des Tiegels zu verformen; doch machen die vulkanischen Felsarten davon eine Ausnahme, indem sie den Tiegel stark corrodieren und sich durchbohren können — eine wichtige Thatsache, die den Unterschied in der Zusammensetzung der Laven erklärt, da sie leicht das benachbarte Gestein auflösen, und dadurch auch einen Durchbruch bewirken können. Die Wirkung auf den Tiegel erstreckt sich am häufigsten nicht ein Millimeter über die Berührungsfläche, und hier ist die letzte porcellanartig geworden. Es folgt hieraus, dass die geschmolzene Masse ziemlich allgemein die mittlere Zusammensetzung der Felsart giebt, was auch Delesse durch vergleichende Analysen nachgewiesen hat.

(1) Arch. ph. nat. VI, 97; im Ausz. Compt. rend. XXV, 5
Institut. 1847, 389; Sill. Am. J. [9] V, 258; VI, 133; J. pharm.
XIII, 68; Pogg. Ann. LXXIII, 454; Jahrb. Miner. 1848, 336.

Veränderungen des specifischen Gewichts verschiedener Felsarten, wenn sie aus dem krystallinischen in den glasartigen Zustand übergehen.

(Zu S. 1285 gehörig.)

Felsart.	Fundort.	Wasser pC.	Spec. Gewicht	
			der Felsart	des Glases
<i>Granit, Quarzporphyr.</i>				
Granit von mittlerem Korn, sehr quarzreich und nur hier und da Glimmerschüppchen enthaltend. . .	La Roche in Berny (Côte d'or) . .	—	2,622	2,321
Feinkörniger, quarzreicher Granit mit weißem Orthoklas, Oligoklas und schwarzem Glimmer	Voly (Vogesen) . .	—	2,635	2,353
Feinkörniger Granit	Vire (Calvados) . .	—	2,730	2,450
Granit (Ch. Deville)	Bec d'Andoux . .	—	2,623	2,360
Feinkörniger Granit	St. Honorine (Orne) . .	—	2,684	2,423
Porphyrtartiger Granit von mittlerem Korn mit rosenrothem Orthoklas .	Flamanille (Manche)	0,26	2,680	2,427
Feinkörniger Granit	St. Brieux (Côt. d. Nd.)	0,55	2,751	2,496
Quarzporphyr von grünlich-weißer Grundmasse mit Quarzkrystallen u. undeutlichen Krystallen v. Orthoklas	Montrenillon (Nièvre)	1,08	2,576	2,301
<i>Syenitischer Granit.</i>				
Syenit mit fleischfarbenem Orthoklas, weißem Andesin, dunkelgrüner Hornblende und Quarz	Ballon de Servance (Haute Saône) .	0,70	2,700	2,447
Syenit mit bräunlichem Orthoklas, rothem Andesin, dunkelgrüner Hornblende und Quarz	Coravillers (Haute Saône)	0,70	2,660	2,425
Syenit mit bräunlichem Orthoklas, rothem Andesin, dunkelgrüner Hornblende und Quarz (Varietät des Vorigen)	Ebendasselbst	0,70	2,643	2,478
<i>Granitporphyr.</i>				
Granitischer Porphyr nach Grüner	Rochotte bei Fautcogney (H. Saône)	0,94	2,651	2,425
<i>Porphyr.</i>				
Rother antiker Porphyr von kastanienbrauner Grundmasse mit kleinen Krystallen von rosenrothem Oligoklas	Aegypten	0,29	2,763	2,486
Brauner Porphyr (E. de Beaumont)	Kirchhof von Fautcogney (H. Saône)	2,00	2,614	2,359
Weißer Porphyr, Grundmasse eines Kalialbits und Quarz aus dem Uebergangsgebirge	Auxelle-Haut (Haute Rhine)	1,99	2,662	2,418
Grauer Porphyr m. Andesin Grundmasse	Chagey (H. - Saône)	2,34	2,764	2,514
Brauner Porphyr mit undeutlichen Feldspathkrystallen	Plancher-les-Mines (Haute-Saône) . .	1,01	2,633	2,423

Felsart.	Fundort.	Wasser pC.	Spec. Ge der Felsart
<i>Diorit.</i>			
18. Dioritporphyr mit schön-tiefgrüner Grundmasse und ohne Quarz . . .	Aegypten	1,81	2,921
19. Grobkörniger Diorit mit dunkelgrüner Hornblende ohne Quarz	Chateau - Lambert (Haute-Saône) . .	1,40	2,799
20. Diorit von mittlerem Korn mit schwärzlicher Hornblende ohne Quarz . .	Ebendas.	1,44	2,858
<i>Euphotid.</i>			
21. Variolith der Durance	—	2,29	2,896
22. Euphotid mit bläulichem Feldspath und smaragdgrünem Diallag . .	Rampans (Corsika)	2,68	3,100
23. Euphotid mit Feldspathkrystallen und broncefarbigem Diallag	Mont-Genèvre . .	5,78	2,898
<i>Melaphyr.</i>			
24. Porphyr von Belfahy (Melaphyr von schwärzlich-grüner Grundmasse und großen grünlichen Krystallen von Labrador)	Belfahy (Haute-Saône)	2,14	2,775
<i>Trachyte.</i>			
25. Rosenfarbener wenig krystallinischer Trachyt (Ch. Deville)	Chahora-Berge	—	2,727
<i>Altvolkanische Gesteine, Basalte.</i>			
26. Alte Laven von blaß kastanienbrauner Farbe mit Krystallen von Anorthit	Vom Fuß des Hekla	—	2,844
27. Schwarzer dichter Basalt mit Olivinkörnern	Kaiserstuhl	—	2,931
28. Basaltische Lava (Ch. Deville) . .	Cône del. Majorquin.	—	2,946
29. Basalt des Pic de Logo (Ch. Deville)	Cap-Verdische Inseln	—	2,971
30. Mandelstein mit Achaten	Oberstein (Pfalz) .	3,68	2,670
<i>Neue vulkanische Gebirgsarten, Laven.</i>			
31. Glasige Lava vom Pic (Ch. Deville)	Vom Pic Teneriffa .	—	2,570
32. Neue Lava vom Ausbruch 1846, tiefer in's schwarze übergehender Farbe, körnig-krystallinischer Textur mit Höhlungen	Hekla	—	2,762
33. Dichter, schwarzer Obsidian mit muscheligem Bruch	Ebendas.	—	2,383
34. Grüne Lava (Ch. Deville)	Vulkan von Chahora	—	2,486
35. Bimsstein vom Pic (Abich)	Teneriffa	—	2,477
36. Obsidian vom Pic (Ch. Deville) . .	Ebendas.	—	2,482
37. Gelblicher Obsidian (Ch. Deville) .	Los Pedros Blancas	—	2,383
38. Minette (dunkelbraun, die einen Gang von 50 Centimetern im Syenit bildet)	Ballon d'Alsace . .	2,65	2,644

Was die Härte der gewonnenen Gläser anbelangt, so ist diese nicht so mannichfaltig, wie man nach den großen Unterschieden in ihrer Zusammensetzung erwarten könnte. Gläser von Graniten, granitischen Gesteinen, Quarzporphyren haben eine Härte = 7, Feldspathglas = 6, Porphyry und Dioritgläser gleich oder unter = 6, Euphotide, Basalte, neue Laven, Minetten unter Apatit = 5. Die Härte des Glases ist also allgemein um so größer, je reicher die Felsart an Kieselerde ist.

Schmelz-
versuche mit
Felsarten.

Das spec. Gewicht vermindert sich bekanntlich; wir theilen die Versuche von Delesse in der anliegenden Tabelle mit.

Das Wasser hält Delesse in fast allen diesen Gesteinen für chemisch gebunden; es verschwindet beim Schmelzen. Das spec. Gewicht der wasserhaltigen Feldspathe verringert sich bei der Calcination; also müsse auch das spec. Gewicht sich um so mehr verringern, je mehr wasserhaltige Feldspathe oder Wasser die Gesteine enthalten.

Die Glasmassen sind fast immer mehr oder weniger tief bouteillengrün, doch variirt die Farbe vom schwarzen bis zum grünlichen und weißgrauen, je nachdem die Felsart reich oder arm an Eisen ist. Bald ist das Glas vollkommen homogen, bald sieht man kleine weiße Skelette aus Quarz, die sich nicht in der Masse auflösen, selbst wenn man sie mehrere Tage im Fluß erhält. Quarz ist nur sehr schwierig in Silicaten aufzulösen, selbst wenn man ihn lange in Contact mit feurigflüssigen Massen hält.

Delesse beschreibt auch das Aussehen der einzelnen Gläser, doch müssen wir in dieser Beziehung auf die Abhandlung selbst verweisen, und bemerken nur noch in Beziehung auf vulkanische Felsarten, daß viele nach dem Schmelzen ganz gleiches Aussehen, und manche von ihnen dieselbe Dichtigkeit wie die künstlichen Gläser haben, da ja auch ihre Abkühlung in der Natur oft ebenso schnell vor sich gegangen ist.

Die Resultate dieser Untersuchungen sind hauptsächlich, dafs, wenn Felsarten vom krystallinischen in der glasigen Zustand übergehen, sie eine Verringerung ihres specifischen Gewichtes erfahren, welche unter sonst gleicher Umständen um so gröfser ist, je mehr Kieselerde und Alkali, und welche um so kleiner erscheint, je mehr Eisen Kalk und Thonerde sie enthalten. Wenn man die Felsarten nach der Ordnung der Verringerung ihres specifischen Gewichtes classificirt, so kommen die ältesten im Allgemeinen zuerst, die neuesten zuletzt, und immer ist die Verringerung des specifischen Gewichtes beinahe in umgekehrter Ordnung zu der Schmelzbarkeit.

Blau-
Farbe
des
Wassers
und
Eises.

In den mit weissen Kieselinkrustationen ausgekleideten Becken der heifsen Quellen Islands ist das Wasser grünlich blau. Nach Bunsen (1) ist reines Wasser blau, und Abweichungen hiervon rühren immer von Beimengungen oder dem Reflex eines dunklen oder gefärbten Untergrundes her. Man sieht dies, wenn man glänzende weisse Gegenstände auf weifsem Grunde durch eine Wasserschicht von 2 Meter Dicke, in einer inwendig geschwärzten Röhre enthalten, betrachtet, oder nur durch Sonnenlicht, welche durch eine solche Schicht gegangen ist, beleuchtet werden läfst.

Gangbildung.

Burat, welcher die Continuität aller bekannten Erzlagertstätten verschiedener Art nach der Tiefe zu annimmt (2), ist der Ansicht (3), dafs die Verschiedenheit der Erze in den oberen und unteren Tiefen der Gänge nicht von einer nachträglichen Umwandlung der ursprünglichen Gangausfüllung durch atmosphärische Einflüsse und unterirdisches Wasser herrühre, indem sich z. B. die Kies in Oxyde, kohlensaure, phosphorsaure, arseniksaure u. s.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXXII, 44; über denselben Gegenstand auch die blaue Farbe der Grotte von Capri vergl. Melloni in Arch. phil. nat. V, 321; Literatur über Farbe der Gletscher und der aus ihnen kommenden Wasser vergl. diesen Jahresber. S. 202. — (2) Ann. d. mines [4] XI, 27. — (3) Ann. des mines [4] XIII, 235.

Verbindungen verwandeln, sondern in einer großen Anzahl von Fällen gleichzeitig mit der Entstehung der Erzlagerstätten selbst sei. Hätten sie die erstere Entstehungsweise, so müßte sich nach Burat überall diese Umänderung finden, was aber nicht der Fall sei. Er kann auch nicht begreifen, woher die Menge Phosphorsäure rühre, die in mehreren Gängen den Bleiglanz bis auf 60 Meter Tiefe in phosphorsaures Blei verwandelte. Er hält vielmehr dafür, daß diese Veränderungen das Resultat eines gemischten Einflusses unterirdischer Kräfte und der Niederschläge sind, während weiter in der Tiefe die Emanationen von unten allein bestimmend waren. Diefes soll namentlich für die Galmeilagerstätten am Rhein und in Schlesien gelten; sie sind nach Burat hervorgegangen aus Sedimentablagerungen, welche die Producte unterirdischer Emanationen mit den Thonen schichteten.

Die unterirdischen Emanationen ändern sich, je mehr man sich von der Ursprungsstätte entfernt, und bilden auf diese Weise Zonen in den Erzgängen von verschiedener Natur.

Die Schwefelmetalle, Oxydule und vielleicht gediegene Metalle bilden die unterste bekannte Zone, die bisweilen an der Oberfläche in Gestalt eruptiver Erzlagerstätten erscheint; sie zeichnet sich aus durch den compacten und homogenen Zustand der Massen. (Eisenglanz der Insel Elba, Magneteisen von Taberg in Schweden, Eisenkiese in den Hornblendegesteinen von Toscana und Norwegen, gediegene Metalle in den Trappgesteinen u. s. w.)

Eine zweite Zone ist characterisirt durch den krystallinen und geodischen Zustand der Mineralien, durch die Mischung und Mannichfaltigkeit der Arten und der Ganggesteine; hierher gehören fast alle Gänge. (Schwefelkies, Fahlerze, Bleiglanz, Blende, Rothgültigerz vom Harz u. s. w.) Sie sind ebenfalls durch Sublimation gebildet. Sie erinnern an die Emanationen der heutigen Krater durch

Wasserdampf, sie sind Emanationen der unterirdischen Massen der ersten Zone.

Nach dem Tage zu finden sich in der dritten Zone Phosphate, Chlorüre, Arseniate, die krystallinischen (haarförmigen) Gedicgenmetalle, und die erdigen Oxyde sogenannten Eisenhuts oder des Gossan von Cornwall. Die obere Zone hat eine mittlere Dicke von 50 Meter, Maximum 100 Meter; die mittlere hat man mit 800 M nicht durchteuft, und die Dicke der unteren ist unbestimmt.

Versteinerungsprocess.

Marcel de Serres und Figuier (1) erklären die nothwendigen Bedingungen des Versteinerungsprocesses: Versenkung des Thierkörpers in Wasser und Gehalt des Wassers an überflüssigen Kalksalzen oder kieselartigen Salzen. Dann kommen die Beschaffenheiten der Thierstammen selbst in Betracht; solche, die eine grössere Consistenz haben, sind meistens durch Kalk, und die verglichenen durch Kieselerde versteinert. Die Verfasser sind der Ansicht, daß der Versteinerungsprocess noch vor sich geht und theilen derartige Beobachtungen aus dem Mittelmeere sowie vergleichende Analysen von Schalen von gegenwärtig daselbst lebenden Thieren, von jüngst versteinerten solchen aus der oberen Tertiärformation mit, die wir wiedergeben. Liegen die Muscheln an der Küste, so werden sie nach und nach zerstört, aber nicht versteinert. In einiger Entfernung von der Küste verschwinden die Vertiefungen, Vorsprünge, Rippen u. s. w., in der Höhlung der Schalen sammelt sich Sand an, der immer mehr und mehr anhaftet und erhärtet und zufällig kleinere Schalen einschließt. Die Kalkmasse, welche sich bei fortschreitender Substitution in der ganzen Masse der Conchilien niederschlägt, äußert nun eine Art von Centralattraction auf in dem in der Nähe befindlichen Wasser gelöste Salze, sich nun sowohl auferhalb wie innerhalb der Schalen krystallisirt ansetzen. Solche oft sehr regelmäßige Kry-

(1) Edinb. new phil. Journ. XLIV, 50; Pharm. Centr. 1848, 1

überzüge findet man namentlich aus kohlensaurem Kalk gebildet. Der ursprüngliche Kalk ist also verdrängt und von neuem ersetzt worden. Aber nicht alle Conchilien erleiden dieselbe Art von Verwandlung. Austern und Kammuscheln nehmen die versteinemde Flüssigkeit vorzugsweise zwischen den Blättern ihrer Lamellen auf, wodurch sie fester und steinähnlicher werden als im frischen Zustande; bei einigen mit dünnen Klappen werden die Schalen mit einem Kalkkitte überzogen, der dieselben zusammenleimt, gerade wie sich dieß bei den vorweltlichen findet. *Ostrea edulis* ist oft mit Kalkspathkrystallen bedeckt, wodurch sie so dick, wie die in Gebirgsmassen versteinerten wird.

Versteine-
rungsproceß.

Ist der Versteinerungsproceß vollendet, so findet man vom ursprünglichen Gebilde der Schalen keine Spur mehr. Wo solche versteinerte Muschelschalen in Wasser liegen, das faulende Substanzen enthält, da nimmt die Oberfläche sehr oft eine schwarze oder dunkelblaue Farbe an, die von Schwefeleisen herrührt, was sich aus dem Eisenoxydgehalte der Schalen und reducirten schwefelsauren Salzen bildet. Wie die Versteinerung von Conchilien fort-dauert, so bilden sich auch immer noch muschelführende Sandsteine. Mit Sand überschüttete, mehr oder weniger versteinerte Muschelschalenmassen werden im mittelländischen Meere von einem Thon durchdrungen, der sie wie römisches Cement erhärten macht. Im Wasser liegende Metallmassen werden dabei ein Attractionscentrum für die Basen der im Wasser aufgelösten Salze, die sich mit dem Oxyd des Metalls, mit Muschelfragmenten und Sand zusammenkitten und den Anfang zu einer Felsbildung abgeben.

	Thie- rische Mate- rie	Koh- lens. Kalk	Koh- lens. Mag- nesia	Schwe- fels. Kalk	Phos- phors. Kalk	Eis- ox
<i>Ostrea edulis</i> , lebend	3,9	93,9	0,3	1,4	0,5	Sp
<i>Ostrea edulis</i> , jüngst versteinert . .	1,5	96,3	0,1	0,7	—	1,4
<i>Ostrea hippopus</i> , obere Tertiärformation	0,8	96,5	1,4	0,5	—	0,1
<i>Pecten glaber</i> , lebend	3,0	96,0	Spuren	0,7	0,3	Spu
<i>Pecten glaber</i> , jünger versteinert . .	0,9	97,3	0,8	0,5	—	0,1
Ein <i>Pecten</i> , obere Tertiärformation	0,7	96,7	0,4	0,8	—	1,4
<i>Venus virginea</i> , lebend	3,0	96,0	Spuren	0,3	0,1	Spu
<i>Venus virginea</i> , jünger versteinert . .	0,6	99,2	—	0,2	—	—
<i>Venus similis</i> , obere Tertiärformat.	1,0	97,9	—	0,6	—	0,1
<i>Pectunculus glycymeris</i> und <i>flam-</i> <i>latus</i> , lebend	2,4	97,2	Spuren	0,4	—	Spu
<i>Pectunculus glycymeris</i> und <i>flam-</i> <i>latus</i> , jüngst versteinert	0,7	99,0	—	0,3	—	—
<i>Pectunculus pulvinatus</i> , obere Ter- tiärformation	0,8	98,4	—	0,4	—	0,1
<i>Cardium tuberculatum</i> , lebend	2,0	97,8	Spuren	0,2	—	Spu
<i>Cardium tubercul.</i> , jüngst versteinert	0,8	98,7	Spuren	0,5	—	Spu
Ein <i>Cardium</i> , obere Tertiärformat.	0,5	98,8	0,1	0,3	—	0,1

Versteine-
rungsprocess.

Kuhlmann (1) sucht die Entstehung der Kiesel-
trationen fossiler Muscheln dadurch zu erklären, daß
Zersetzung des in allen Kalksteinen und in einer Mer-
anderer Felsarten vorhandenen kiesel-sauren Alkali's ni-
nur durch die Kohlensäure der Luft, sondern au-
durch das kohlensaure Ammoniak vor sich gegang-
ist, welches das Resultat der Zersetzung des Th-
res ist, das die Schale bewohnte. Vielleicht konnte
Ammoniak, nachdem es seine Kohlensäure abgegeben,
die Kieselerde vor ihrer Verbindung mit dem Kali zu tren-
nen, unaufhörlich Kohlensäure aus der Luft anziehen.

Zinkspath als
Versteine-
rungsmittel.

Müller in Aachen (2) berichtet über ein bis jetzt ni-
bekanntes Versteinerungsmittel einer Koralle des Eife-
Kalkes, den Zinkspath aus den Galmeigruben am Herr-
berg bei Stolberg. Nöggerath (3) fügt dazu noch ein-
Beispiele aus Tarnowitz und den Stolberger Gruben.

Bildung com-
pacter Ge-
steine aus
Infusorien.

Ehrenberg (4) theilt eine Beobachtung mit, um

(1) Compt. rend. XXIV, 263. — (2) Verhandlungen des naturh.
Vereins der preuß. Rheinl. 1848, 143. — (3) Verhandl. des naturh.
Vereins der preuß. Rheinl. 1848, 144. — (4) Berl. Acad. Ber. 18
158; Jahrb. Miner. 1847, 115.

Umbildung von losen Infusorienlagern (Kieselguhr) in festes Gestein und zumal Halbopal ohne Zuziehung feuriger Kräfte zu erläutern. Er fand an einer größeren Form der *Pinnularia Rhenana* aus den rheinischen Braunkohlen von Rott und Geistingen, daß sie stets mit vielen concentrischen Ringen augenartig erfüllt ist, die in den kleinen Zellen der *Pinnularia* etwa wie die Achatbildungen in den Mandelsteinen entstanden sein mußten. Zuweilen waren alle Schalen ganz mit dergleichen concentrischen Augenbildungen erfüllt, zuweilen gab es nur einzelne im innern Raume. »In der Nähe der dort vorkommenden schichtenförmigen Halbopale war die Erfüllung im Uebergang mit der Verschmelzung, welche letzte den Halbopal ausmacht.« Von Inkrustation und gewöhnlicher Sinterung ist nirgends eine Spur vorhanden; der Vorgang des Processes in wohl erhaltenen Braunkohlenlagern schließt jede Einwirkung hoher Temperaturgrade aus.

Die Untersuchungen Kuhlmann's (1) über die Gegenwart von Kali oder Natron in den Kalksteinen der verschiedenen geologischen Epochen, namentlich in den hydraulischen Kalken, sowie in vielen anderen Gesteinen, die sich den älteren trefflichen Erfahrungen von Fuchs anschließen, sind auch von geologischem Interesse, indem sie die allgemein Geltung des Cämentbildungsprocesses bei der Bildung und Erhärtung von Felsarten und Mineralien darthun und die Art der Agglutination der Conglomerate, Breccien u. s. w. durch sichere chemische Erfahrungen erläutern und versinnlichen. Kuhlmann hält die Gegenwart von Alkalien für die Bildung eines Kalksilicats für höchst wichtig, wenn auch nicht für wesentlich. Kreide mit einer Auflösung kieselsaurer Alkalien in Berührung gebracht, zersetzt sich zum Theil, es bildet sich kieselsaurer Kalk und kohlen-saures Alkali; mangansaures Kali hat auf Kreide oder Gyps den Einfluß, daß dieselben sich

Einfluß der
Cämentbil-
dung auf Ge-
steinerhär-
tung.

(1) Ann. ch. phys. [8] XXI, 364; J. pr. Chem. XLII, 436; Arch. ph. nat. VI, 330; Compt. rend. XXIV, 263.

Einfluß der
Gämenbil-
dung auf Ge-
steinsverhär-
tung.

mit Manganoxyd imprägniren und eine beträchtliche Härte erlangen, während sich auf der Oberfläche Dendriten von Manganoxyd bilden, wie auf den natürlichen Steinen, Mergeln u. s. w. Auch Oxyde können die Rolle einer Säure in ihrer Affinität zum Kalk spielen; Kuhlmann fand, daß diese Verwandtschaft hinreichend mächtig ist, um die löslichen alkalischen Verbindungen dieser Oxyde durch den Kalk zu zersetzen. Der kiesel-saure Kalk, der die Kreide begleitet und sie in vielen Adern durchschwärmt, hat wohl keinen andern Ursprung als den der Infiltration einer Auflösung des kiesel-sauren Kali's oder Natrons. Die Gegenwart von etwas Kali in der Kreide giebt dieser Meinung großes Gewicht. Die Infiltrationen der Kieselerde und ihre Krystallisationen in den Kalkfelsen, die Bildungen kieseliger und thoniger Bindemittel, die Feuersteine, die Achate, die versteinerten Hölzer u. s. w. beruhen auf denselben Reactionen.

Bei diesen Bildungen scheint außer der allmählichen Zusammenziehung und Austrocknung des im Augenblicke seiner Entstehung in einem gelatinösen Zustande befindlichen kiesel-sauren Kalkes die Kohlensäure der Luft oder der Gewässer eine Hauptrolle zu spielen, indem sie das kiesel-saure Kali in kohlensaurer verwandelt. Wo Thonerde Kali vorhanden ist, scheint durch die Berührung der Luft ein ähnliches Resultat einzutreten, indem durch die Kohlensäure niedergeschlagene Thonerde durch langsame Zusammenziehung eine große Härte annimmt.

Nachdem durch Zersetzung erdiger Carbonate durch das kiesel-saure Kali oder Natron sich erdige Silicate gebildet haben, so verlieren diese durch die Einwirkung der mit Kohlensäure oder alkalischen Bicarbonaten gesättigten Gewässer in einigen Fällen den Kalk oder die Magnesia und Kieselerde bleibt zurück.

Metamorphi-
smus.

Fournet (1) hat bei einer Untersuchung der Gesteine der Vogesen die durch die plutonischen Gesteine bewirkte

(1) Bullet. de la société géolog. de France [2] IV, 220; Arch. géol. nat. V, 293.

ten Veränderungen einer näheren Untersuchung unterworfen. Indem er zu dem Resultate gekommen ist, daß die Schichtgesteine der Vogesen zum Theil auf den feurig flüssigen Gesteinen geschwommen sind, und beide eine gegenseitige Einwirkung auf einander ausgeübt haben, bezeichnet er die Fälle, wo das Schichtgestein verändert wurde, mit dem Namen *Exomorphismus*; den Fall aber, wo die Veränderung das plutonische Gestein selbst betraf, nennt er *Endomorphismus*. Er bezeichnet als

exomorphische Gesteine :	endomorphische Gesteine :	normale Eruptivgesteine :
Schiefer, modificirte Sandsteine,	Porphyre, modificirt durch die Schiefer	Quarzporphyr,
Grüne Porphyre,	und Sandsteine,	Granitischen Porphyr,
Schwarze Porphyre,	Thonsteinporphyr,	Rothen Eurit.
übergehend in	braune Porphyre.	

Wir müssen hinsichtlich weiterer Nachweisungen auf die ausführliche Abhandlung selbst verweisen.

Haidinger (1) hat den Metamorphismus der Gesteine zum Gegenstand einer ausführlichen Betrachtung gemacht, und ist dabei von der electrochemischen Anschauungsweise ausgegangen. Die Grundlage seiner Betrachtung ist die Bildung der Pseudomorphosen der Mineralspecies, mit denen die Gebirgsarten gleiche geognostische Stellungen haben. Er bringt dieselben in zwei Kategorien. Bei der einen findet durch die alle Gesteine erfüllende und dieselben nach ihrer geognostischen Stellung sammt den in ihr aufgelösten Körpern durchströmende Gebirgsfeuchtigkeit eine electropositive Veränderung, eine Reduction, Statt, der Katode entsprechend, und Haidinger nennt sie *katogene Pseudomorphosen*; bei der anderen eine Oxydation, eine electronegative Veränderung, der Anode entsprechend und diese nennt er *anogene Pseudomorphosen*. Bei der Absetzung aufgelöster Bestandtheile in freie Räume, Drusen oder Gänge nimmt Haidinger eine Infiltration, Durchschwi-

(1) Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) IV, 102. 211; Haidinger's Abhandl. I, 305; Wien. Acad. Ber. II. Hft. 128; Jahrb. Miner. 1849, 218.

Zerzierung
von Gesteinen
durch Wasser.

Glas, weißes böhmisches Glas, Wedgwood Kitt, chinesisches Porcellan, Anthracit, bituminöse Kohle, Lignit, Holzkohle, Asche von Kohle und Holz, Hölzer — bent. Bei der ersten Methode wurden alle Mineralien und Glieder durch kohlenaures Wasser theilweise zersetzt und gelöst; die meisten auch durch reines Wasser. Bei der zweiten Methode reichte eine Behandlung mit kohlenaurem Wasser während 48 Stunden und mit destillirtem Wasser während einer Woche oft schon hin, so viel Material zu gewinnen, als nöthig war, um eine quantitative Analyse zu veranstalten. Hornblende, Actinolith, Epidot, Citrit, Serpentin, Feldspath, Mesotyp u. s. w. gaben 0,4 bis 0,5 ihrer angewandten Masse als Auflösung ab, bestehend aus Kalk und Magnesia, Eisenoxyd, Alaunerde, Kieselerde, Alkali; dieses und die zwei ersten in Form von Carbonat, das Eisen der Hornblende, des Epidots u. s. w. aus dem Zustand des Carbonats während der Abdunstung in Oxyd übergehend, das sich in braunen Flocken mit Kieselerde und Alaunerde am Boden ansammelt. So lieferten 40 G Hornblende während 48 Stunden bei 15° mit kohlenaurem Wasser digerirt und wiederholt geschüttelt 0,08 Kieselerde, 0,05 Eisen, 0,13 Kalkerde, 0,95 Magnesia und eine Spur Mangan. Die meisten der genannten Mineralien, in einem Achatmörser zerrieben und mit reinem Wasser befeuchtet, geben eine bestimmte Alkalireaction. Talk- und Kalktalkate werden sehr leicht von kohlen. und selbst von reinem Wasser angegriffen, und dieß erklärt sehr einfach die Leichtigkeit, womit Pflanzen jene Erden aus einem Boden ziehen im Stande sind, der Kalk- und Talksilicate enthält.

Anthracit, bituminöse Kohle und Lignit geben bei der ersten Methode deutliche Beweise von anwesendem Alkali, während ihre Aschen keine geben, daher die Abwesenheit der Alkalien in diesen Aschen nur aus der hohen Temperatur erklärt werden kann, bei der diese Aschen sich bilden, nicht aber aus einem wirklichen Mangel der Kohlen an jenen Stoffen. Durch Abreiben von Holz mit kohlenaurem

Wasser zu einem feinen Pulver lassen sich die Alkalien und deren Carbonate auch in den Pflanzen nachweisen. Dagegen ist die Flüchtigkeit von Kali, Natron und ihren Carbonaten bei starker Rothglühhitze so groß, daß man auf dem Wege der Einäschung oft wohl kaum die Hälfte des wirklichen Bestandes derselben erhalten dürfte (?).

Grange (1) hat vergleichende Analysen der Wasser des Talk-, Anthracit- und Kreideterains des Thales der Isère gemacht, aus denen sich einige merkwürdige Resultate ergeben. Die absolute Quantität der in den Wassern aufgelösten Salze vermehrt sich von dem Gipfel der Berge bis in die Ebene, dagegen wechselt ihre relative Menge. Die auflöslichen Salze, hauptsächlich die Chlorüre, vermindern sich, die unlöslichen oder wenig löslichen Salze, Gyps und kohlenaurer Kalk, vermehren sich dagegen. Die relative Menge der Chlorüre, der Sulfate und der Carbonate ist verschieden in den drei Terrainarten. Die Chlorüre herrschen im Kalkterrain vor und wechseln zwischen 25 bis 32 pC., in dem Anthracitterrain bilden sie nicht mehr als 10 bis 16 pC., in dem Kalkterrain nur 4 bis 8 pC. der in den Wassern aufgelösten Salze. — Die Sulfate finden sich beinahe in derselben Menge in dem Kalk- und Anthracitterrain, sie wechseln im ersten Falle von 24 bis 31 und im zweiten von 18 bis 37 pC. In dem Néocomien betragen sie nicht mehr als 5 oder 12 pC. der aufgelösten Salze. — Die Carbonate wechseln von 36 bis 47 pC. im Granitboden, von 48 bis 71 im Anthracitboden und von 83 bis 88 im Kreideterain. — Die Sodalze (Chlorüre und Sulfate) herrschen in dem Talkterrain vor und hauptsächlich in dem Anthracitterrain; die absolute Menge der Sulfate in diesem letzten Terrain ist viel höher. — Die Salze der Magnesia finden sich mit einer merkwürdigen Beständigkeit in dem Talkterrain und in dem Anthracitterrain, sie wechseln in relativer Menge von 19 bis 23 pC. in den granitischen Felsarten und Schieferen, und von 11 bis 23 pC. in dem Anthracitterrain.

Abhängigkeit
der Quellen-
bestandtheile
von der Höhe
ihres Vorkom-
mens und dem
Terrain.

(1) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 464.

Abhängigkeit
der Quellenbe-
standtheile
von der Höhe
ihres Vorkom-
mens und dem
Terrain.

Die geologische Natur des Terrains erklärt diese Eigenthümlichkeit. Es mag noch bemerkt werden, daß die Quellen, die an der Berührung der granitischen Gesteine und der Kalkthonschiefer liegen, sehr magnesiareich sind, was von der Menge von Gyps und Dolomit herrührt, man in allen diesen Gegenden findet.

G. Bischof (1) fand bei seinen Analysen von 33 Mineralquellen in den Umgebungen des Laacher Sees und von süßen Quellen, welche theils aus den krystallinischen Gesteinen des Siebengebirges, theils aus dem Porphyryr-Münster am Stein und am Donnersberg, theils aus dem Granit unterhalb Heidelberg bei Schriesheim und Weinheim kommen, daß bei allen das kohlensaure Natron das vorherrschende unter den löslichen Salzen ist; Glaubersalz und Kochsalz fehlen zwar nie, betragen aber stets weniger, als jenes Salz. Die nur in Kohlensäure löslichen Salze sind kohlensaurer Kalk, kohlensaure Magnesia und kohlensaures Eisenoxydul. Aus allen diesen Quellen entströmt mehr oder weniger kohlensaures Gas. Der Höhenunterschied der Quellen am Laachersee beträgt 500' bis 800', und die fixen Bestandtheile, namentlich die löslichen, nehmen mit zunehmender Höhe des Hervorkommens ab. Allgemeinen sind die an Bestandtheilen reichsten Quellen also auch die tiefsten und wärmsten; doch stehen Gelde und Temperatur nicht in geradem Verhältnisse. Auch in der Eifel, im Nassanischen und in der Auvergne zeigt sich dieses Gesetz. Die in tiefen Thälern liegenden Mineralquellen sind am reichsten an fixen Bestandtheilen, während die zahllose Menge von Sauerlingen auf den Höhen nur kohlensaure Erden und Eisen und nur sehr wenige lösliche Salze enthalten.

Die qualitative Prüfung der genannten süßen Quellen unternahm Bischof in der Absicht, die Salze kennen

(1) Verhandlungen der niederrhein. Gesellschaft für Natur- und Ackerkunde zu Bonn, 5. Nov. 1846; Jahrb. Miner. 1848, 624.

lernen, welche die Basalte, Dolerite, Trachyte, Porphyre und Granite in den bezeichneten Gegenden enthalten. Als Resultat ergab sich, daß die Hauptbestandtheile jener süßen Quellen Chlorcalcium, Chlormagnesium und Chlornatrium sind, und daß nur selten und nur da der Gyps auftritt, wo die Quellen ihren Lauf theilweise durch sedimentäre Gebilde nehmen. In den Basalten in den Umgebungen des Laacher Sees treten neben Chlornatrium schwefelsaure Salze und hauptsächlich schwefelsaures Natron auf, und in den Gesteinen, aus welchen die böhmischen Mineralquellen kommen, ist dieses Salz fast durchgängig das Vorwaltende. Da die süßen Quellen aus dem Porphyr bei Münster am Stein dieselben Hauptbestandtheile enthalten, wie die dortigen und die Kreuznacher Soolquellen, so ist es höchst wahrscheinlich, daß auch diese Quellen ihren Salzgehalt aus dem Porphyr ziehen. Es ist schon längst bekannt, daß diesen Quellen der sonst immer vorkommende Gyps fehlt.

Abhängigkeit
der Quellen-
bestandtheile
von der Höhe
ihres Vorkom-
mens und dem
Terrain.

- Bischof erklärt den Ursprung der Salze im Meere aus dem Auslaugen der Felsarten durch das atmosphärische Wasser, und stellt in dieser Beziehung einige Berechnungen an, wegen deren wir auf den Aufsatz selbst und auf Bischof's Werk verweisen müssen.

M. J. Vogel (1) bespricht die Beziehungen der Mineralquellenbildung zur Gebirgsmetamorphose, indem er selbst die nahe der Erdoberfläche gebildeten Mineralwasser nicht als Produkte der Auslaugung allein betrachtet, sondern als integrierende Glieder der allgemeinen Gebirgsmetamorphose, da dieselben bald als Ursache, bald als Wirkung oder Coeffect der Gestein-Metamorphose erscheinen. Der Verfasser bezieht sich dabei auf den von Haidinger aufgestellten Unterschied der anogenen und katogenen Gebirgsmetamorphose, und betrachtet die in den oberen Stufen sich bildenden Mineralwasser, die vorherrschend Kalk-,

(1) Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) IV, 436. 448; Jahrb. Miner. 1849, 318.

Gyps-, Bitter-, Alaun-, Vitriol-, Schwefelwasserstoff- und Soolquellen sind und in Beziehungen zu den Oxydationsprocessen der anogenen Metamorphose stehen, als *anogene*, die Thermal- und Sauerquellen, als durch die Reductionen der katogenen Umwandlung erzeugt, als *katogene Mineralquellen*. Die ersteren ziehen ihren im Vergleich geringen Kohlensäuregehalt aus dem Durchsinken atmosphärischer Wasser durch die Humusdecke, aus der Verwandlung von Spatheisenstein in Eisenoxydhydrat, und verwandeln durch die Kohlensäure einfach-kohlensauren Kalk, Magnesia und Eisen in lösliche Bicarbonate, oder enthalten sie auch als einfache Carbonate. In Beziehung auf Thermal- und Sauerquellen huldigt der Verfasser nicht der Ansicht, daß sie *im Allgemeinen* den vulkanischen verwandten Processen ihren Ursprung verdanken.

Gasentwick-
lung in
Erzminen.

Daubrée (1) hat einige Beobachtungen über Gasexplosionen in dem Eisenrogenstein von Gundershoffen und Winkel, so wie in einem Kupferbergwerk von Giromagny mitgetheilt, da früher nur solche von Kohlenbergwerken bekannt waren. Wenn er es nicht für unmöglich hält, daß sich in den Bergwerken — wie in denen von Giromagny, wo Eisenkiese und Blenden vorkommen, oder wo, wie in Gundershoffen und Winkel, das Eisen nicht vollständig oxydirt ist — durch langsame Wirkung das Wasser zersetzen und kleine Mengen Wasserstoffgas bilden kann, welches sich bei geringem Luftzug in der Höhe der Stollen ansammelt, so ist es ihm doch wahrscheinlicher, daß das brennbare Gas Grubengas ist, welches sich in Gundershoffen aus den oberen bituminösen Liasmergeln, auf denen das Lager ruht, in Winkel aus bituminösen jurassischen Schichten, in den Uebergangsgebilden von Giromagny aus Anthracitlagern in dem benachbarten Gestein entwickelt.

(1) Ann. des mines [4] XIV, 33; im Ausz. Compt. rend. XXVI, 98; J. pr. Chem. XLIII, 898.

Fr. Schneider (1) erzählt ebenfalls ein Beispiel von Gasentwick-
 schlagenden Wettern in Erzminen, und zwar von der Ma-
 thias-Büttnergründelgrube bei Felső-Slovinka, wo 4. Berg-
 leute verunglückten. Er leitet die Ansammlung der explo-
 dierenden Gase davon ab, daß in Folge des Einsturzes eines
 Stollens der Wetterumlauf in jener Grube aufgehoben
 wurde. Wahrscheinlich bildeten sich die schädlichen Luft-
 arten durch Zersetzung der Grubenwasser, des faulen Zim-
 merholzes und vielleicht auch durch vorhandenen Eisenkies.

Gasentwick-
 lung in
 Erzminen.

Eine sehr vollständige Zusammenstellung über Vulkane, Vulkanische
 Erdbeben und heiße Quellen hat Daubeny (2) in der und pseudo-
 vulkanische
 zweiten Ausgabe seines Werks gegeben. Phänomene.

Bunsen (3) giebt uns eine Bildungsgeschichte der
 Thermen, Fumarolen und Solfataren, sowie eine von den
 früheren durchaus abweichende Erklärung der Geisir und
 übrigen Springquellen Islands. Zwischen ihnen und den
 thätigen Vulkanen der Insel besteht ein inniger Zusammen-
 hang; beide folgen einer Hauptrichtung, nämlich der der
 vorzüglichsten Thäler und Höhenzüge, der Hauptgangsyste-
 me sowie der vielen vulkanischen Spalten und Klüfte.

In den gegenseitigen Beziehungen des Palagonitge-
 birges zu den plutonischen Massen, die dasselbe durch-
 drungen haben und noch fortwährend bei der Eruption der
 noch thätigen Vulkane in Gestalt von Lavagängen und
 Schichten durchdringen, liegt der Ausgangspunkt dieser
 Erklärung.

Der Palagonittuff (4) ist das älteste Glied der Forma-

(1) Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) III, 224; Jahrb. Miner.
 1849, 331. — (2) A description of active and extinct volcanos, of earth-
 quakes and of thermal springs, with remarks on the causes of these
 phenomena, the character of their respective products and their influence
 on the past and present condition of the globe. London 1848. —
 (3) Ann. Ch. Pharm. LXII, 1. — (4) Ueber den Palagonit, der eine
 Mineralspecies bildet (Ann. Ch. Pharm. LXI, 265), vergl. den mineral.
 Theil des Jahresber. S. 1193; ferner: Sartorius von Waltershausen, über
 die submarinen vulkanischen Ausbrüche des Val di Noto, in den Göttinger
 Studien, Gött. 1845, 402; Sandberger, geol. Verhältnisse des Herzogth.
 Nassau, Wiesbaden 1847, 81.

tionenreihe der Insel, und seine Bildung ist der des Trachy und des in diesen übergehenden Klingsteins vorangegangen. Der ältere Trapp, ein in Mandelstein übergehendes doleritartiges Gestein, bezeichnet die dritte Hebungsperiode bei der das Gestein in mächtigen Gängen aufstieg und seitlich in weit ausgedehnten parallelen Schichten in den Tuffmassen verbreitete. Der vierten Periode gehören die olivinreichen basaltartigen Erhebungen zu, und mit der fünften endlich, der der älteren und jüngeren Laven, schließt die Reihe der plutonischen Hebungen ab.

Entstehung
der Quellen.

Die Quellen sind Meteorwasser, die auf die Hochebe des Innern fallen, oder von den Gletschern herrühren; ihr unterirdischer Lauf wird durch die der vulkanischen Hebungsline entsprechenden Klüfte und Spalten unterbrochen, sie werden in eine Tiefe geführt, wo unter dem Einfluß der vulkanischen Bodenwärme Erhitzung und Dampfbildung erfolgt. Das Wasser, durch die vereinte Kraft der Dämpfe und des hydrostatischen Druckes gehoben, bricht dann in Thermenzügen hervor, die eine nordöstliche Richtung haben. Daß es Meteorwasser sind, welche als Quellen

Stickstoff in
den Quellen.

wieder aufsteigen, ergibt sich aus dem Stickstoff, welcher für sich oder mit anderen Gasen gemischt aus den Kochquellen aufsteigt, und zwar *nie in einem größeren Verhältniß, als es die Diffusion der atmosphärischen Luft zu Wasser erheischt*. Auch fehlt dem Wasser nie ein geringe Gehalt an Ammoniaksalzen und organischen Extractivstoffen. Doch ist hiermit die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß auch der Wassergehalt des Palagonits in den Tuffen einen nicht unwesentlichen Antheil an der Dampfbildung an den Suffionen, Geisiren und Vulkanen Islands hat. Dieses Wasser (17 pC.) erzeugt eine Dampfmenge, die bei 100° und 0^m,76 das 512,7fache Volumen des ursprünglich Fossils einnimmt.

Mineralbestandtheile
der Quellen.

Die mineralischen Bestandtheile der Quellen kommen aus einer Wechselwirkung des ursprünglich reinen Wassers und der vulkanischen, mit diesen zu Tage kommenden Gasen

auf die den Quellenboden constituirenden Gesteine, also besonders den Palagonit. Vor Allem ist ein großer Gehalt an Kieselerde vorherrschend, und die Quellen lassen sich, wenn man die wenigen Säuerlinge auf dem westlichen Theile der Insel ausschließt, in zwei Hauptgruppen theilen, von denen die eine die sauren, die andere die alkalischen Kiesel-erdequellen begreift. — Die ersteren gehören den eigentlichen Solfataren an, und sie verdanken ihre schwach saure Reaction gewöhnlich mehr einem geringen Gehalte an Ammoniak-, Natron- und Kali-Alaun, als unbedeutenden Spuren freier Schwefelsäure oder Salzsäure, und enthalten außerdem schwefelsaure und chlorwasserstoffsäure Salze von Kalk, Magnesia, Natron, Kali und Eisenoxydul, ferner Kieselerde und schweflige Säure, oder an deren Stelle Schwefelwasserstoff. Sie sind besonders durch Quellenabsätze von Gyps und Schwefel charakterisirt, und bilden nur selten periodische Eruptionsquellen. — Die alkalischen Wasser dagegen sind die verbreitetsten, und bilden die periodischen Springquellen, sowie den größten Theil der gewöhnlichen warmen und kochenden Quellen. Ihre äußerst schwache alkalische Reaction rührt von Schwefelalkalien und kohlen-saurem Natron und Kali her, welche der Kieselerde zum Auflösungs-mittel dienen und die für diese Quellen so charakteristischen Kiesel-tuffbildungen bedingen. Schwefelsaure und salzsaure Alkalien nebst Spuren von Magnesia sind die gewöhnlichsten Begleiter dieser Wasser.

Mineral-
bestandtheile
der Quellen.

Die mit dem Palagonit in Wechselwirkung tretenden vulkanischen Gase Islands bestehen aus schwefliger Säure, Schwefelwasserstoff und mehr untergeordnet Kohlensäure und Chlorwasserstoffsäure.

Vulkanische
Gase.

Der Stickstoff gehört ursprünglich der Atmosphäre oder der organischen Natur an, wofür auch die Salmiakbildung am Hekla spricht, die sich daselbst bei einem neuen Lavastrome nur auf die Zone beschränkte, in welcher das Wiesenland von demselben überfluthet war (1). Die Fumarolen des

(1) Sartorius von Waltershausen (physisch-geographische Skizze

Vulkanische
Ursache.

Kraterrückens und der vier neuen Kratere gaben nur Schwefel, Salzsäure und schweflige Säure, ohne eine Spur ammoniakalischer Producte.

Die dem heißen Boden entsteigende wässrige schweflige Säure löst den Palagonit auf, das Eisenoxyd tritt seinen Sauerstoff an die schweflige Säure ab, es entsteht Schwefelsäure und Eisenoxydul; dann wird auch die schweflige Säure an der Luft durch den Sauerstoff der Atmosphäre oder in der Tiefe durch den im Quellwasser diffundirten Sauerstoff der Luft oxydirt, es werden schwefelsaure Salze und Kieselerde in Lösung versetzt. Diefes ist das erste Stadium der Fumarolenwirkung, wo schweflige Säure, Schwefelwasserstoff, Schwefel und Wasserdampf den Boden durchbrechen und sich über die Schwefelfelder ausbreiten oder sich ein blauschwarzer, siedender Thonbrei in ungeheuren Blasen erhebt. Doch ist nach den Analysen das Verhältniß, in welchem die in den sauren Kieselerdequellen auftretenden Basen zu einander stehen, nicht das der Palagonitbestandtheile, woraus sich ergibt, daß die Thätigkeit der durch schweflige Säure bedingten chemischen Zersetzungen mit der Auflösung des Palagonits noch keineswegs ihr Ende erreicht hat (1). Der gesammte Eisenoxydul

von Island. Abdruck aus den Göttinger Studien, 1847) bestritt den von Bunsen behaupteten organischen Ursprung des Salmiaks in den Fumarolen Islands, und leitete ihn von dem Ammoniakgehalt der Atmosphäre her; doch ohne genügende Gründe, wie dieses von Bunsen mit vielen Belegen erörtert wurde (Ann. Ch. Pharm. LXV, 1), obgleich derselbe keineswegs die Möglichkeit einer Salmiakbildung aus dem atmosphärischen Ammoniak bei der Gegenwart von Chlorwasserstoffsäure in Abrede stellt (Bunsen und Playfair, Report on the gases evolved from iron furnaces. Mem. of Brit. Assoc. 1845).

(1) Diefes ergibt sich leicht, wenn man das Verhältniß der im Palagonit sich findenden Basen mit denen in den Sulfionenwassern auftritt, den vergleicht. Bunsen fand in 10000 Wasser aus einem der größten kochenden Schlammkessel der Reykjahlider Solfatare, zwischen dem nordöstlichen Abhang des Námarfjall und dem Burfellavastrom, 1,271 schwefels. Kalk, 1,0662 schwefels. Magnesia, 0,7333 schwefels. Ammoniak, 0,3261 schwefels. Thonerde, 0,2674 schwefels. Natron, 0,1363 schwefel

gehalt, sowie ein Theil der Thonerde und Kalkerde wird ^{Vulkanische Gase.} wieder aus der Lösung entfernt. Bunsen fand, daß der Palagonit bei der Digestion mit einer neutralen Lösung von Eisenvitriol unter Bildung von schwefelsaurem Kalk das Eisenoxydul entweder als Hydrat, oder vielleicht als kiesel-saures Salz fällt. Die freie schweflige Säure löst daher ursprünglich das Eisenoxyd der Tuffe als Oxydulsalz neben einem Theil der übrigen Bestandtheile derselben auf, setzt dasselbe aber, wenn die Auflösungen bei ihrem Durchgange durch die Gebirgsart neutral geworden sind, bei weiterer Berührung mit derselben als Oxydulhydrat, oder, wenn Sauerstoff zugegen ist, als Oxydhydrat wieder ab. Der zersetzte Palagonit wird dadurch in abwechselnde, ohne Ordnung sich durchsetzende Lager von weißem eisenfreien und gefärbtem eisenhaltigen Fumarolenthon verwandelt, deren Gränzen mit-hin die Schichten bezeichnen, wo die erste Action der sauren in die zweite der neutralen Lösungen übergegangen ist. Diese Thonlager haben große Aehnlichkeit mit gewissen Gebilden der Keuperformation, deren verschieden gefärbte Schichten also wohl nicht dem Absatz aus dem Wasser, sondern bloßer nachfolgender chemisch metamorphischer Veränderung einer und derselben Gebirgsart zuzuschreiben sind.

Dieselbe Einwirkung, welche der Palagonit auf die ^{Gypfbildung.} neutralen Lösungen des schwefelsauren Eisenoxyduls aus-übt, wiederholt sich bei den schwefelsauren Salzen der Thonerde und des Eisenoxyduls. Beide werden dadurch aus ihren neutralen Lösungen unter Bildung von Gyps gefällt, so daß die Thonerde nicht nur aus den Suffionenwassern entfernt, sondern auch von einer Stelle zur andern im Bereiche dieser Zersetzungen geführt wird, wovon die Ungleichheit und Mannigfaltigkeit in der Zusammensetzung der Thon-

Kali, 0,4171 Kieselerde, 0,0537 Thonerde und 0,0820 Schwefelwasserstoff (Ann. Ch. Pharm. LXII, 1). Vergl. auch Damour's Analysen in diesem Jahresber. S. 1010.

schichten herrührt. Dieser Gyps stimmt ganz mit den Gypsschichten in den Mergeln und Thongebilden der Triasformation überein, bei denen die gänzliche Abwesenheit kalkschaliger Conchylien auf die Einwirkung saurer Dämpfe hindeutet, sowie sich auch für das Verhältniß der tertiären Thonbildungen zu den Tuffen der Basalte, Dolerite und Trachyte aus diesen Fumarolenwirkungen Aufschlüsse schöpfen lassen.

Alaunbildung.

Als Erzeugnisse der Solfatarenthätigkeit in Island sind noch Federalaun, Schwefelkies, Schwefelkupfer, schwefelsaures Kupferoxyd und der Schwefel selbst zu bemerken. Der Federalaun bildet sich an der Oberfläche des Fumarolenthons nur in Zeiten, wo eine trockene Atmosphäre seine Auswitterung am Boden begünstigt. Gewöhnlich findet er sich nur auf dampfenden Schlammkrusten, und man sieht deutlich, daß die Eigenschaft des Palagonits, die neutralen Thonerdelösungen zu fällen, die Bildung dieses Salzes vorzugsweise nur da zuläßt, wo durch das Spiel der Fumarolen ein fortwährender Säurezufluß unterhalten wird, und zwar führt vornehmlich die schweflige Säure diese Bedingung herbei. Aber auch der Schwefelwasserstoff, der in den Dampfexhalationen vorkommt, erleidet in Berührung mit dem porösen Fumarolenthon auf Kosten des atmosphärischen Sauerstoffs eine Contactsverbrennung, als deren Hauptprodukt die Schwefelsäure auftritt. Regengüsse lösen das gebildete Salz auf und führen es in die Tiefe den Palagonitschichten zu, welche die Thonerde fällen.

Schwefelbildung.

Der Schwefel der Fumarolenmündungen scheint aus der Wechselwirkung der schwefligen Säure und des Schwefelwasserstoffs in Berührung mit Wasserdämpfen, oder aus der Zersetzung des Schwefelwasserstoffes auf Kosten des atmosphärischen Sauerstoffs hervorzugehen (1).

(1) Eine ganz analoge Entstehungsgeschichte, wie die der Thone, Schwefel u. s. w. der Isländischen Solfataren, nur daß hier Trachyte und Diorite verändert wurden, wird von Haidinger (Berichte [vergl. S. 1147] II, 399) den mit gediegenem Schwefel bei Kalnika, unweit Végles bei

In Folge der Einwirkung des Schwefelwasserstoffs auf die Palagonitsubstanz werden Einfach-Schwefeleisen und alkalische Schwefelmetalle erzeugt. Durch die Bildung des ersteren wird der Palagonit in eine schwarze Masse verwandelt, welche dem Thon der kochenden Schlammpfuhle eine blauschwarze Farbe ertheilt, und bisweilen setzt es sich in Gestalt eines schwarzen Pulvers von den Quellen zu Tage geführt in sandiger Form ab. Die alkalischen Schwefelmetalle werden von dem kochenden Wasser gelöst, und verwandeln sich, wo sie mit dem Schwefel in Berührung treten, in Polysulfüre. Diese lösen aber leicht geringe Spuren des Einfach-Schwefeleisens mit grüner Farbe auf, und setzen es unter Umständen wieder ab, und es begreift sich daraus leicht, wie das durch Schwefelwasserstoff unter Abscheidung von Schwefel zu Einfach-Schwefeleisen umgebildete Eisenoxyd von den zugleich gebildeten alkalischen Polysulfüren gelöst und denselben ein Atom Schwefel entziehend als Zweifach-Schwefeleisen oder Schwefelkies wieder abgesetzt werden kann.

Bildung von
Schwefelkies.

Bunsen (1) hat nun ferner, um den Ursprung der alkalischen Kieselerdequellen zu ergründen, zahlreiche Versuche angestellt, und auch das Wasser des großen Geisir durch Sandberger untersuchen lassen (2). Es ergibt sich daraus folgendes Resultat: Alle isländischen Gesteine werden durch heißes Wasser zersetzt. Sie spalten sich dadurch in saure und basische Silicate. Die

Alkalische
Kieselquellen.

Altsohl in Ungarn, vorkommenden Thonen, Brauneisensteinen u. s. w. vindicirt. Derselbe Proceß zeigt sich hier, wie in Island, nur in einem viel späteren Stadium.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXII, 48. Auszug eines Schreibens von R. Bunsen an J. J. Berzelius. Marburg, Nov. 1846; Augsb. Allgem. Ztg. 24. Dec. 1848. — (2) Sandberger fand in 1000 Th. dieses Wassers 0,5097 Kieselerde, 0,1939 kohlens. Natron, 0,0088 kohlens. Ammoniak, 0,1070 schwefels. Natron, 0,0475 schwefels. Kali, 0,0042 schwefels. Magnesia, 0,2521 Chlornatrium, 0,0088 Schwefelnatrium, 0,0557 Kohlensäure (Ann. Ch. Pharm. LXII, 49). Vergl. Damour's Analyse S. 1010 dieses Jahresberichts..

Alkalische
Kieselquellen.

ersteren werden vom Wasser gelöst, die letzteren bleiben als unlösliche Thonlager zurück. Die löslichen Silicate dringen mit dem Quellwasser zu Tage, verdunsten und bilden Kieselsinter und Opale. Der Palagonittuff hat den wesentlichsten Einfluss auf die Geisirbildung. Behandelt man Palagonitpulver bei 100° bis 106° einige Stunden lang mit destillirtem Wasser, so lösen sich in 1000 Grammen Wasser Kieselsäure 0,03716, Kali 0,00162 und Natron 0,00824. Lässt man mit Kohlensäure gesättigtes Wasser auf das pulverisirte Fossil einwirken, so lösen sich, mit Ausnahme der Thonerde und des Eisenoxydes, alle übrigen Bestandtheile desselben als zweifach-kohlensaure Salze auf. Palagonitpulver, zehn Stunden lang mit gesättigtem Schwefelwasserstoffwasser erhitzt, gab unter Bildung von Einfach-Schwefeleisen eine Lösung von Kieselerde, Calciumsulfhydrat, Magnesiumsulfhydrat, Natriumsulfhydrat, Kaliumsulfhydrat. Die Bestandtheile des Palagonits nehmen daher einen sehr verschiedenen Antheil an der Zersetzung, welche durch die Einwirkung des erhitzten Wassers, der Kohlensäure und des Schwefelwasserstoffs herbeigeführt wird. Die alkalischen Kieselerdequellen, wo die schweflige Säure mehr zurücktritt, nehmen einen von den Suffionenwassern sehr abweichenden Character an, denn die Zusammensetzung des Wassers, wie die Natur der Thonablagerungen müssen in einem bestimmten Verhältniss zu dem mehr oder weniger grossen Widerstand stehen, den die einzelnen Bestandtheile des Palagonits dem Angriff jener schwächeren vulkanischen Säuren, d. h. dem Wasser, der Kohlensäure und dem Schwefelwasserstoff, entgegensetzen.

Wenn die kiesel-sauren Alkalien, welche das erhitzte Wasser dem Palagonit entzieht, mit Kohlensäure, Salzsäure und Schwefelsäure in Berührung kommen, so müssen sich diese Alkalien in kohlensaure, schwefelsaure und chlorwasserstoffsäure Salze verwandeln, während die Kieselsäure in den gebildeten kohlensauren Alkalien und in

Wasser gelöst bleibt und sich theilweise bei der Verdampfung desselben als Kieseltuff abscheidet. Alkalische
Kieselquellen.

Die Einwirkung der Kohlensäure erstreckt sich aber nicht nur auf die vom Wasser aufgenommenen Alkalien, sondern sie dehnt sich auch direct auf die Palagonitsubstanz aus, indem sie aufer einer Lösung von Kieselerde in Wasser und kohlensauren Alkalien zugleich noch die Bildung von sauern kohlensauren Verbindungen der Magnesia und Kalkerde veranlaßt. Daß von diesen Erden nur Spuren der ersteren im Geisirwasser sich wiederfinden, erklärt sich aus dem Umstande, daß der saure kohlensaure Kalk beim Kochen in Kohlensäure und unlösliches neutrales Salz zerfällt, oder durch die kieselsauren Alkalien unter Bildung von kohlensaurem Alkali in derselben Weise zersetzt wird. Das Magnesiasalz dagegen muß sich, ganz dem Ergebnisse der Analyse entsprechend, spurenweise im Geisirwasser wiederfinden.

Die Schwefelwasserstoffproducte aus dem Palagonit erleiden durch Kohlensäure eine ähnliche Zersetzung. Schwefelwasserstoff entweicht als Gas unter Ausscheidung von kohlensaurem Kalk und theilweiser Fällung von kohlensaurer Magnesia. Das Endproduct dieser Reactionen ist wiederum Kieselsäure in Wasser und kohlensauren Alkalien gelöst, denen sich bei weniger vorherrschender Kohlensäure noch Schwefelalkalien, die constanten Begleiter der Kieselquellen, beigesellen. Das Verhältniß des Kalis zum Natron im Geisirwasser ist ein durchaus verschiedenes von dem, welches sich im Palagonit zeigt, und aus den Versuchen ergibt sich, daß das Natron aus dem Palagonit durch reines Wasser oder Kohlensäure in einem weit größeren Verhältniß aufgelöst wird, als das Kali, ja sogar bei der Kohlensäure in einem noch größeren, als der Zusammensetzung des Geisirwassers entspricht. Es ist daher begreiflich, daß, wenn die Zersetzungen der drei vulkanischen Gase zusammenwirken, sehr wohl die relativen

Alkalische
Kieselquellen.

Mengen dieser Alkalien, wie sie sich im Geisirwasser finden, aufgelöst werden können.

Wo in Island der Klingstein und ältere Trapp den Tuff, noch mehr aber, wo der ältere Trapp den Klingstein in Gängen durchbricht, zeigt das durchsetzte Gestein eine sich oft auf mehrere Fufs hin erstreckende Schmelzung und Frittung, durch die es eine obsidian- oder pechsteinartige Beschaffenheit annimmt. Wenn man die von diesen Gängen aus eingeprefsten horizontalen Schichten an ihrer Berührungsfläche mit dem Tuff verfolgt, so sieht man bald fast jede Spur einer Schmelzung oder Feuereinwirkung verschwinden. Der Tuff ist ein leicht schmelzbares, wasserhaltiges Silicat, das mithin seine ursprüngliche Beschaffenheit und seinen Wassergehalt in unmittelbarer Berührung mit jenen meist geschmolzenen glühenden Trappschichten bewahrt hat. Noch befremdender sind die mit Quarz, Chalcedon, Kalkspath, Zeolithen und andern wasserhaltigen Silicaten angefüllten Blasenräume der mit dem Tuff und Trapp abwechselnden Mandelsteine.

Bunsen findet die Erklärung dieser Thatsachen in den Erscheinungen der noch jetzt thätigen Fumarolen. Wo die glühendflüssige Trappmasse die geringe Abkühlungsoberfläche des Ganges traf, konnte das Wasser, das den Tuff seiner ganzen Masse nach durchfeuchtete, leicht der nachdringenden Feuerfluth weichen, das Gestein wurde entwässert und geschmolzen. Wo sich dagegen das flüssige Gestein von jenen Gängen aus in horizontalen Schichten durch den Tuff verbreitete, da wurde durch die Wasserdampfentwicklung der weiteren Feuereinwirkung auf das, einschliessende Gestein um so eher ein Ziel gesetzt, als die grosse specifische Wärme des Wassers und die nicht minder erhebliche latente Wärme seines Dampfes eine gröfsere Temperaturerhöhung der Tuffschichten unmöglich machte. Es müssen sich also die Fumarolenwirkungen, die durch diese Wasserdampfentwicklungen bedingt waren, in den Tuff- und Trapp-

massen, welche ihnen zum Heerde dienten, wieder-
finden. Die mit dem Tuff und Trapp wechselnden
Mandelsteine, die mit wasserhaltigen Mineralien angefüllt
sind, liefern daher ein treues Abbild der Zersetzungser-
scheinungen, die man noch jetzt an den isländischen Suf-
fionen und Kochquellen in voller Thätigkeit trifft.

Die Mandelsteine sind die Erzeugnisse einer von den
Berührungsflächen der Trapp- und Tuffschichten ausge-
henden Metamorphose des ursprünglichen Gesteines. Sie
sind ihrer Hauptmasse nach ein eisenoxydhaltiger oder
kieseligter Thon, wie er als Product der noch thätigen
Fumarolen auftritt, und verlaufen sich durch unzählige
Zersetzungsphasen nach beiden Seiten hin in die völlig
unzersetzten Lagen jener beiden Gebirgsarten. Die
Durchdringung neptunischer und plutonischer Gebilde ist
einer auf die Eruptionskatastrophe unmittelbar gefolgten
grofsartigen Fumarolenwirkung zuzuschreiben, welche die
ursprünglichen Gesteine durch eine den noch zu beob-
achtenden Erscheinungen entsprechende Spaltung ihrer
Gemengtheile in lösliche und unlösliche Silicate zu diesen
thonigen Mandelsteinen umbildete, wobei der erzeugte
plastische Thon durch die entwickelten Dämpfe und Gase
leicht von jenen unzähligen Blasenräumen erfüllt werden
konnte, indem man die Krystallisationsproducte der den
Thon durchdringenden löslichen Silicate als gleichsam
complementäre Gemengtheile desselben wiederfindet. Die
Infusorien, deren Reste man in den festen Zersetzungs-
rinden vulkanischer Gesteine findet, konnten leicht die
Bedingungen ihres Lebens auf einer durch Fumarolen-
wirkung auf ihrer Oberfläche in Thon verwandelte und
später durch infiltrirte lösliche Silicate erhärteten Masse
finden (1).

Alkalische
Kieselquellen.

Entstehung d.
Mandelsteine
durch Fuma-
rolenwirkung.

(1) Sartorius von Waltershausen (physisch-geographische Skizze von Island) suchte die von Bunsen aufgestellte Theorie der Bildung der Zeolithe in den isländischen Mandelsteinen und des Palagonits durch eine Hypothese zu vervollständigen, indem er dem Druck einen wesent-

Geisirtheorie.

Bunsen (1) hat eine auf sorgfältige thermometrisch Messungen gegründete Theorie der Geisir aufgestellt, die von den früheren Erklärungen dieses Phänomens durchaus abweicht, und die wir als eine exacte Anwendung der Physi auf geologische Phänomene hier nicht unerwähnt lassen dürfen. Eine ganz ähnliche Erklärung hat nach ihm Descloizeaux (2) gegeben, mit dem er gemeinschaftlich die Temperaturen des Wassers in der Tiefe des Geisirrohrs beobachtete. — Jede Kieselerdequelle baut sich durch Sinterabsatz eine Röhre auf, und kann in einer gewissen Höhe zu einem Geisir werden. Ist die Röhre oben offen und wird sie von einer unten stark erhitzten und schnell hervordringenden Wassersäule erfüllt, so entsteht eine kontinuierliche Springquelle. Das Wasser hat an der Mündung eine Siedetemperatur, die dem Atmosphärendruck entspricht, wenn die Quelle aber einen Röhrenaufsatz gebildet hat, erreicht es unter dem Drucke der in dieser Röhre

lichen Einfluß auf die chemische Verwandtschaft vindicirt. Da der Druck der Deus ex machina der Geologen ist, so war es von Interesse, die Wirkung desselben durch den Versuch festzustellen. Es war nämlich Wöhler gelungen, Apophyllit bei einer Temperatur von 180 bis 190 unter einem Druck von 10 bis 12 Atmosphären in Lösung zu versetzen und bei dem Erkalten in Krystallen wieder zu erhalten. Doch war aus diesem Versuch nicht zu ersehen, inwieweit der erhöhte Druck und inwieweit die erhöhte Temperatur wirksam war. Bunsen (Ann. C. Pharm. LXV, 82) erzeugte mit einer einfachen Vorrichtung einen meßbaren Druck von 110 Atmosphären, was einer Meerestiefe von mehr als 3000 Fufs entspricht. Der bloße Druck, nicht nur von 10 bis 12, sondern selbst von 79 Atmosphären, ohne Wärmehöhung, wirkt nicht im Geringsten auf Apophyllitpulver; eben so löst sich Palagonitpulver unter einem Druck von 103 Atmosphären nur spurenweise im Wasser, während es sich beim Kochen mit Wasser unter dem Drucke von Einer Atmosphäre in weit erheblicher Menge zersetzt und löst. Dem Drucke an sich kann also kein wesentlicher Einfluß auf die chemischen Kräfte eingeräumt werden.

(1) Auszug eines Schreibens von R. Bunsen an Berzelius. *Marburg* Nov. 1846; *Ann. Ch. Pharm.* LXII, 1; *Pogg. Ann.* LXXII, 159.
(2) *Compt. rend.* XXIV, 456; *Arch. ph. nat.* IV, 83; *Ann. ch. phys.* [3] XIX, 471; *Phil. Mag.* [3] XXX, 391; *Sill. Am. J.* [2] III, 303.

ruhenden Flüssigkeit eine über 100° steigende Temperatur. Die dergestalt erhitzte, von unten stets erneuerte, aufsteigende Wassermasse erleidet an der Mündung der Röhre eine dem verminderten Druck entsprechende Temperaturerniedrigung bis auf 100°, wobei der ganze Wärmeüberschuss zur Bildung von Dämpfen verwandt wird, die mit dem Wasser continuirlich aus der Quellenmündung hervordringen. Ist die Röhre dagegen nach oben sehr weit, so daß das Wasser sich erheblich abkühlen kann, und tritt der weit über 100° erhitzte Quellenstrang nur langsam in den Boden der Röhre ein, so wird das Wasser plötzlich in's Kochen und zum Ausbruch kommen, und wieder zur Ruhe zurückkehren, wenn nur durch irgend eine Ursache, z. B. Dampfanhäufung in der Tiefe, die Wassersäule gehoben wird und dadurch unter einen Druck gelangt, welcher ihrer Temperatur nicht mehr entspricht. Nach einem Ausbruch steigt die Temperatur in der Röhre fortwährend, erreicht aber nie, selbst bis einige Minuten vor der großen Eruption, in der ruhenden Wassersäule den Kochpunkt, der dem Atmosphären- und Wasserdruck am Orte der Beobachtung entspricht. Die Ursache der Hebung der Wassersäule, die den ersten Anstoß zur Eruption giebt, liegt in der Eigenthümlichkeit der isländischen Thermen, daß sich periodisch an gewissen Stellen in dem Wasser des Quellenbasins eine Anzahl großer Dampfblasen bildet, die beim Aufsteigen in eine obere kältere Schicht plötzlich wieder condensirt werden, wodurch kleine periodische Detonationen und Aufwallungen entstehen, die den großen Ausbrüchen vorausgehen.

Diese periodische Hebung beträgt selten mehr als ein bis zwei Meter, ist aber nicht eher im Stande irgend eine Wasserschichte in eine Höhe zu versetzen, wo sie in Folge der daselbst stattfindenden Druckverminderung in's Kochen gerathen könnte, bis die ganze Wassermasse eine solche Temperatur angenommen hat, daß sie kochen kann, wie sie Bunsen einige Minuten vor der wirklich eintre-

tenden Eruption in der That beobachtete. Der Hauptpunkt der mechanischen Kraft findet sich also im Geisirwan selbst.

Ungeschichtete
Gesteine.
Entstehungs-
weise des
Granits.

Scheerer (1) knüpft an seine Lehre vom polymeren Isomorphismus Betrachtungen über die Entstehung des Granits und der ihm verwandten Gesteine, die sich in den Einwürfen von Breislack (2), Fuchs (3), Bouček (4) und Schaafhäutl (5) gegen die plutonische Entstehung derselben anschließen, und welche hauptsächlich darauf fußen, daß in den granitischen Gesteinen wesentlichen sowohl als die zufälligen Bestandtheile, in ihrer krystallinischen Ausbildung nach, in einer Reihenfolge erstarrt sein müssen, welche mit den Graden ihrer Streifungsflüssigkeit nicht im Verhältnisse steht, indem der streifungsflüssigste Quarz einen Taig für die andern Bestandtheile bildet; daß ferner ausgeschiedener Quarz in Laven vorkommt, trotz der nothwendig ebenso schnellen Erstarrung mancher Granitgänge und obgleich wenigstens Theil der Laven (einige Obsidiane und Bimssteine) ebensoviel Kieselerde enthält, als der Granit.

Die mechanische Gruppierung der wesentlichen und zufälligen Gemengtheile des Granits zeige, daß Aehnlichkeit zwischen Granat, Gadolinit, Turmalin, Amphibol, Orthit, Almandin, Eisenkies, Arsenikkies, grauer Kobalt und Glimmer mit dem Feldspath und dieser vor dem Quarz des Granits krystallisirt sein müssen. Nie habe der letztere die Krystallisation der andern Mineralien beschränkt, wie seinerseits doch der Feldspath gethan hat. Fournet hat zwar zur Rettung der plutonischen Ansicht eine Theorie der *Surfusion* aufgestellt, nach welcher der flüssige Quarz gleich dem Schwefel, Phosphor, Wasser u. s. w. bei tieferer Temperatur erstarren, als der starre flüssig wird.

(1) Bullet. géolog. [2] IV, 468; Jahrb. Miner. 1847, 854.
(2) Traité sur la structure du globe, Paris 1822, I, 356. — (3) Über die Theorien der Erde, München 1844. — (4) Études sur l'histoire de la terre. — (5) Münchener gelehrte Anz. 1846, 557.

soll. Aber bei dem Wasser liegen der Erstarrungs- und der Schmelzpunkt nur wenig, und bei dem Schwefel nicht um 100° auseinander. Der Schmelzpunkt der Kieselerde ist annähernd etwa 2800°, während Achmit, Granat, Hornblende, Turmalin, Eisenkies und andere begleitende Mineralien bei 1000° bis 1500° den Schmelzpunkt haben (bekanntlich schmelzen sie alle mit der grössten Leichtigkeit in der Löthrohrflamme, bei etwa 2000°); so dass nach Fournet's Theorie der Erstarrungspunkt des Quarzes um 1300° bis 1800° tiefer als sein Schmelzpunkt liegen müfste.

Entstehungs-
weise des
Granits.

Nach Scheerer war das in einigen Bestandtheilen des Granits chemisch gebundene Wasser (etwa 1 pC.) vor der Erstarrung zugegen, und wirkte wesentlich bei der Bildung des Granits mit. Andernteils hat sich der Granit nicht aus wässeriger Auflösung niedergeschlagen, weil der dann nothwendige Hydratzustand der Bestandtheile des Granits wenigstens 50 pC. Wasser und ein weit größeres Volumen des Granits bedingt hätte. Das Feuer der Plutonisten mufs zu Hülfe genommen werden; dieses weckte die chemische Thätigkeit in dem Granitteig, verlieh ihm die nöthige Plasticität, und erklärt eine Reihe von Contacterscheinungen in den den Granit begrenzenden Gesteinen; es war ein wesentliches Agens bei der Bildung des Granits. Wenn man sich denkt, jener feuchte Teig werde unter einem Drucke, der die Verflüchtigung des Wassers hindert, immer weiter erhitzt, so wird er wahrscheinlich durch die dazwischen eingeschlossenen, sehr dichten, theilweise verdichteten, heifsen Wasserdämpfe schon bei einer Temperatur weit unter derjenigen schmelzen, bei welcher dasselbe Gemenge im wasserfreien Zustande schmelzen würde. Erkalte der geschmolzene Granit wieder, so werden ganz andere Erscheinungen dabei eintreten, als bei der Abkühlung einer wasserfreien, aber sonst gleich zusammengesetzten, feurig-flüssigen Masse, insbesondere eine während der Abkühlung bis zu geringerer Temperatur

Entstehungs-
weise des
Granits.

herab andauernde Plasticität des Granits, Krystallis der Mineralien, ein Zurückdrängen alles Wassers, jene Mineralien zu ihrer Bildung nicht bedürfen, häufig und Verbindung desselben mit dem übrig bleiben und immer reiner werdenden Kieselteige, der dadurch sehr lange flüssig erhalten wird, bis endlich bei ständiger Abkühlung das Wasser allmählig verdunstet. Auf diese Weise erhalten sich auch die pyrognomischen Eigenschaften gewisser Mineralien, welche dieselben, bei einer hohen Temperatur ausgesetzt, nicht mehr zeigen können. (Es wird hierunter die Eigenschaft gewisser Mineralien verstanden, wenn sie bis kaum zum dunkeln Rothglühe erhitzt werden, plötzlich eine lebhaft Lichtentwicklung, H. Rose in Verbindung mit Wärmeentwicklung und Veränderung einiger physikalischer Eigenschaften zu zeigen ohne einen andern chemischen Wechsel als vielleicht etwas Wasserverlust zu erleiden.) Wenn aber Mineralien schon feurig-flüssig gewesen, und aus diesem Zustande in den weissen und endlich in den rothglühenden übergegangen wären, wie könnten sie die pyrognomischen Eigenschaften noch besitzen? Die ausschwitzende Feuchtigkeit, welche die Mineralbestandtheile in chemischer Lösung mit sich führte, ist dann in die Masse angrenzender neptunischer Gesteine eingedrungen, und hat diese verändert und Contacterscheinungen bewirkt, Thonstein in Gneufs und granitartige Gesteine umgewandelt u. s. w. Die Bemerkungen, die bei Gelegenheit des Vortrags dieser Abhandlung von Schreuer in der geologischen Gesellschaft von Frankreich gemacht wurden, sind von Interesse namentlich die von De la Roche über die Existenz von Wasser in gewissen Körpern, die einer feurigen Schmelze unterworfen werden, so wie auch an die Versuche Laurent erinnert wurde, nach denen Kaliborat, in einem Calcinirofen bis über die Temperatur des schmelzenden Silbers erhitzt und geschmolzen wurde, noch 1 pC. W. zurückhält, wovon es indeß in viel niedrigerer Tempe-

noch einen Theil verliert, wenn man dieses (glasige) Kaliborat über einer Alkohollampe nur erweicht (1).

Entstehungs-
weise des
Granits.

Durocher (2) tritt den Ansichten Scheerer's entgegen, und vertheidigt die Entstehungsweise der granitischen Gesteine auf feurig-flüssigem Wege. Ihm zufolge soll es nicht der Quarz sein, welcher, ohne fest zu werden, sich bis zu einem Grade abkühlte, der dem Schmelzpunkte des Feldspathes nahe lag, sondern vielmehr eine dem Feldstein ähnliche Masse, d. h. eine Substanz, die etwas weniger schmelzbar ist als der Feldspath, ohne indessen davon sehr abzuweichen. Diese Masse enthielt Kieselerde, Thonerde, alkalische und erdige Basen, Kali, Natron, bisweilen Lithion, etwas Kalk, Magnesia, Eisen- und Manganoxyd, nebst sehr kleinen Mengen Flusssäure und oft selbst Borsäure. Als diese Masse, bei langsamer Abkühlung, eine Temperatur von wahrscheinlich gegen 1500° erreicht hatte, fand eine Trennung zwischen den verschiedenen Gemengtheilen statt, das Magma zersetzte sich in Feldspath, Quarz und Glimmer. Im Augenblick der Trennung, als die Temperatur der Masse wenig von dem Erstarrungspunkte der beiden schmelzbarsten Gemengtheile, des Feldspathes und Glimmers, entfernt war, hatte das Erstarren derselben um so schneller statt, als sie eine größere Tendenz zur Krystallisation hatten, so daß der Feldspath, mit stärkerer Krystallisationsneigung als der Quarz, auch vor demselben krystallisirte. Die Kieselerde verhält sich, nach den Versuchen von Gaudin, wie ein Glasfluß, der lange in zähem Zustand bleibt, besonders wenn sie von einer Masse umgeben ist, welche selbst sehr heiß ist. — Bei diesem Acte müssen hauptsächlich zwei Ursachen von Temperaturveränderung statt gefunden haben, welche nach einander und im umgekehrten Sinne wirkten; vor der Trennung der

(1) Bulletin géologique [2] IV, 496. — (2) Bullet. géolog. [2] IV, 1018; Compt. rend. XXV, 208; Jahrb. Min. 1848, 208. 337. Vergl. auch Compt. rend. XX, 1275.

Entstehungs-
weise des
Granits.

Gemengtheile verband sich die Kieselerde mit andern Silicaten und bildete eine saure Verbindung, wodurch wahrscheinlich Wärme erzeugt wurde, und umgekehrt wenn sie sich von einer Verbindung dieser Art trennte so mußte dabei eine Absorption statt finden; also in Augenblick, wo der Quarz aus einer granitischen Combination ausgeschieden wurde, fand eine, wenn auch schwach Temperaturerniedrigung statt, die das Festwerden derjenigen Gemengtheile beschleunigte, welche die größte Tendenz zu Krystallisiren hatten. Im Augenblicke dagegen, wo der Feldspath eine krystallinische Form angenommen hatte wurde durch seinen plötzlichen Uebergang aus dem flüssigen in den festen Zustand Wärme frei, die sich der umgebenden Masse mittheilte, und den Quarz in einem weichen Zustande erhielt, so daß er den Eindruck der Krystallform des Feldspathes aufnehmen konnte. Die homogene Masse trennte sich in mehrere bestimmte Verbindungen, die noch flüssig neben einander lagen. Das Erstarren der Gemengtheile fand bei den echten Graniten zwar nicht in demselben Augenblick statt, aber kurz nach einander, denn der Feldspath, der Quarz und der Glimmer hemmen sich gegenseitig in ihrer Ausbildung. Der Quarz mußte schon von der Masse getrennt sein als der Feldspath krystallisirte.

Durocher widerspricht nach seinen Untersuchungen der Behauptung Scheerer's und Anderer, daß sich immer eine bestimmte Reihenfolge in der Krystallisation der verschiedenen Gemengtheile des Granits wahrnehmen lassen. Die von Scheerer angegebene Reihenfolge in der Krystallisation der Gemengtheile des Granits von Hitteröe in Norwegen sei zufällig; in fast allen von ihm untersuchten Graniten ergebe sich eine fast gleichzeitige Krystallisation, namentlich sei schon eine Parthie Quarz etwas erstarrt gewesen, als der Feldspath zu krystallisiren aufhöre wofür er viele Beispiele anführt. In einem Granit von Suc (Arrière) finden sich bald Turmalin- oder Feldspath-

krystalle in der Mitte von Quarz, und bilden Eindrücke in ihm, bald sind Quarzkrystalle von Feldspathmasse umhüllt, was man selbst an einem und demselben Handstück sieht. Man sieht ebenso, daß das Erstarren des Granats, des Turmalins, des Glimmers, des Feldspaths und des Quarzes sehr schnell auf einander folgten, und daß die Mineralien, welche zuerst krystallisirt zu sein scheinen, noch an einigen Stellen weich waren, als die andern fest wurden; daß also ein Character der granitischen Gesteine das gegenseitige Durchdringen der Gemengtheile ist, welche sich in ihrer Ausbildung gegenseitig hemmen. Wo die Kieselerde sich streng von den blättrigen oder krystallisirten Silicaten scheidet, und zuletzt krystallisirt zu sein scheint, haben vielleicht andere Einflüsse statt gefunden, welche die Kieselerde lange flüssig erhielten; dies gilt aber nicht von den gewöhnlichen Graniten.

Entstehungs-
 weise des
 Granits.

Das Vorkommen von Eisenkies, Arsenikkies und Kobaltglanz, das Scheerer als einen Beweis gegen die feurige Entstehung des Granits anführt, sei nur eine Ausnahme, und könne eine nachträgliche Bildung sein, da sich an denselben Orten diese Schwefelmetalle auch in Felsarten verschiedenen Ursprungs fanden. Auch das Magnet-eisen und das Titaneisen haben Eindrücke im Feldspath und im Quarz hinterlassen, ebenso der Eisenglanz; oft hat sie aber auch der Feldspath durch seine Krystallisation zusammengedrückt. Auch der Zircon, der Korund, der Polymignit, der Gadolinit, der Yttrantalit sind in Mitten einer Feldspathmasse krystallisirt, so daß man nicht glauben darf, daß immer die am wenigsten schmelzbaren Elemente zuletzt krystallisirt sind.

Daß in Laven gewöhnlich kein Quarz ausgeschieden ist, beweise ebenfalls nicht gegen die feurige Entstehung des Granits. Viele Trachyte, denen Niemand einen feurigen Ursprung abspreche, enthalten freie Kieselerde, selbst zuweilen als ausgebildete Krystalle, so wie sie sich durch die Gegenwart von Feldspathen, Hornblende und Glimmer

Entstehungs-
welcher des
Granite.

den granitischen Gesteinen auch anderweitig am me-
nähern, und sich durch den Augit mit den vulkanis-
Producten verbinden. In Italien gehen die Trachyt-
Granite und die Trachytporphyre in Quarzporphyre i

Die Gegenwart von pyrognomischen Mineralien
Granit hält Durocher ebenfalls nicht für einen Be-
gegen den feurigen Ursprung. Die pyrognomischen Mi-
ralien, welche calcinirt worden seien, hätten eine
veränderung ihrer Molecule erfahren, wie ja so
Substanzen, (z. B. arsenige Säure) nach einer ähnli-
Veränderung wieder zu der ursprünglichen Gruppe
ihrer Molecule zurückkehren.

Den wichtigsten Einwurf von Scheerer, die Ge-
wart von Wasser in einigen Bestandtheilen des Gr-
beantwortet Durocher damit, daß der größte Wa-
gehalt nur in zufälligen Gemengtheilen des Granits
komme; aber auch in den meisten Feldspathen ko-
eine ganz geringe Menge vor, 0,1 bis 0,2 pC. (ni-
einem durchsichtigen Feldspath von Fredericksvern-
gar kein Wasser), und da diejenigen, welche meh-
0,2 pC. einschließen, immer undurchsichtig sind, so se-
Wassergehalt wohl nur Folge der beginnenden Zerset-
Die meisten Granite enthielten indessen weniger
1 pC. Wasser.

Durocher hat eine große Menge Felsarten u-
sucht, wie viel Wasser sie bei 15 bis 110° abgeben
fand, daß die meisten feuergebildeten Felsarten W-
einschließen, das nur durch Dunkelrothglühhitze an-
trieben werden kann. In den Graniten, dem Feld-
und dem Quarzporphyr, die keine Spur von Verände-
zeigen, fanden sich immer weniger als 0,5 pC. Wasser
im Granit zwischen dem Feldspath und Glimmer ver-
ist. Bei der geringsten Veränderung steigt der Geha-
zu 3 und selbst 4,70 pC., und ist dann immer Folge
anfangenden Kaolimisation. Bei denen, welche nicht
als 1 bis 1½ pC. enthalten, scheint das Wasser abs-

werden zu können, ohne Spuren von Zersetzung. Melaphyre, Basalte, Laven und Bimssteine enthalten mehr oder weniger Wasser, die vulkanischen Laven 0,45 bis 4,51 pC. Sein Dasein ist allgemein bei vulkanischen oder pseudovulkanischen Gesteinen, obgleich es auch einige Trappe giebt, die kein Wasser enthalten, wie dasselbe auch im Basalte von Saint-Flour fehlt, und der Obsidian gewöhnlich sehr wenig enthält. Durocher hält also das meiste Wasser für atmosphärischen Ursprungs, doch scheinen ihm auch Granite, wie Laven und Trappgestein Wasser von Anfang an einschließen zu können.

Ent-
weil
Ge

Angenommen, daß der Granit von Anfang an Wasser enthalten habe, so begreift Durocher nicht, wie dieses Wasser das Flüssigwerden der Masse erleichtern konnte, wie Scheerer meint. Das Schmelzen der Salze in ihrem Krystallisationswasser sei eine Folge der Auflöslichkeit in dem Wasser, welche sich im Allgemeinen mit der Temperatur erhöhe, und eine Folge ihrer Affinität für dieses Wasser, vermöge deren sie dasselbe zurückhalten können bis zu dem Temperaturgrade, der hinreicht, daß das Salz sich in der Wassermenge auflöse, welche es einschließt. Welches sei aber die Auflöslichkeit des Quarzes, des Feldspaths, des Glimmers, der Hornblende im Wasser? welches ihre Verwandtschaft mit ihm? offenbar fast keine, weshalb es sehr gewagt scheine, anzunehmen, daß die Bestandtheile des Granits weit unter ihrem gewöhnlichen Schmelzpunkte flüssig werden können, wenn sie von Wasser begleitet sind und einem starken Druck unterworfen werden. Das Wasser, welches bei vulkanischen Ausbrüchen ausgestoßen wird, bewirke nie etwas ähnliches an den Laven, wie es Scheerer vom Granit annehme; es bilde im Gegentheil nur Blasenräume in demselben, was bei den immer sehr krystallinischen Graniten nie der Fall ist.

Die von Virlet D'Aoust (1) für Gerölle gehaltenen

(1) Virlet d'Aoust (Bull. géolog. [2] IV, 498; im Ausz. Jahrb. Miner. 1847, 861), hält den Granit wie den Gneufs für metamorphische

Entstehungs-
weise des
Granits.

Abscheidungen von Quarz und Glimmer im Granit
Virtu in der Normandie, der in Paris zu Trettoirs ver-
wird, und die ihm darauf hinzuweisen schienen, daß
Granit ursprünglich ein Sedimentärgebilde gewesen
hält Droncher (1) für bloße Concretionen.
Haidinger (2) wenn auch ein Gegner der I-
von der polymeren Isomorphie, erkennt doch die Wichtig-
der von Schreier erhaltenen Resultate für die Gesch-
der Metamorphose der Gesteine überhaupt, da, wenn
den Aspasolith als Pseudomorphose des Cordierit
trachtet. Den Cordierit ist, wie schon Schreier
schlossen, das ursprünglich gebildete, und zwar
Haidinger bei einer tieferen oder centraleren Ste-
des Gesteins, bei der alles Wasser ausgeschieden wa-
kommt. Später wurde in einer höheren Lage Was-
das Gestein und zwar vorzugsweise in den Cordierit
eingepreßt, der dadurch seine Selbstständigkeit v-
Man hat kein Maas für die Tiefen, bei welchen
änderungen dieser Art stattgefunden, aber demunge-
wird die Cordieritperiode zu einem relativen Vergleich-
punkt in der Geschichte der Granite und mancher a-
krystallinischer Gesteine dienen, während die volle
Bildung des Pinit am weitesten von dieser Zeit entfernt
Als der Cordierit sich in Krystallen ausgeschieden,
die Grundmasse häufig noch kein Granit, wenigstens
solcher, wie jetzt, wo aus dem Cordierit Pinit gewo-
ist. Wie die Bildung der Pseudomorphosen, beruht
die Veränderung der Gesteine selbst auf diesem im
währenden Kreislauf der Materie, und jedes Hand-
unserer Sammlungen bekrundet, nach Haidinger,
lange Geschichte der Bildung. Wir verweisen im Ueb-

Gesteine, gebildet aus Sedimentablagerungen, und glaubt, daß nir-
auf der Erdoberfläche primitive Gesteine existiren.

(1) Bull. géolog. [2] IV, 140. — (2) Haidinger's Abhandl. (S. 1147) I, 79; Pogg. Ann. LXXI, 266; Jahrb. Miner. 1848, vergl. S. 1147 dieses Jahresberichts.

auf dem reichhaltigen Aufsatz selbst, in welchem auch treffende Bemerkungen über die Bildung wasserhaltiger Silicate im Basalt u. s. w. enthalten sind.

Naumann (1) bekämpft die Hypothese, daß Gneufs ^{Gr} und ähnliche Gesteine in ~~allen~~ Fällen nichts Anderes als umgewandelte Sedimentgesteine sein können, welche Meinung wesentlich auf die Paralleltextur und Parallelstructur derselben, sowie auf ihren oft parallelen Lagerungsverband mit Thonachiefer, Grauwacke und anderen sedimentären Gesteinen gegründet worden; er kommt zu der Ueberzeugung, daß es aufser den metamorphischen und hypogenen Gneufsen auch eruptive Gneufse giebt. Indem er das gneufsähnliche faserige Gefüge und die Parallelstructur an wirklich vulkanischen und plutonischen Gesteinen nachweist, führt er viele Beispiele an, aus denen hervorgeht, daß die Parallelstructur der krystallinischen Silicatgesteine sehr häufig durch verschiedene Streckung oder Spannung bedingt gewesen ist, welcher die Gesteinsmasse im Bereiche ihres ganzen Eruptionsgebietes vor ihrer endlichen Erstarrung ausgesetzt gewesen war. Naumann unterscheidet nämlich in dieser Textur der Gesteine eine plane Paralleltextur oder Plattung und eine lineare Paralleltextur oder Streckung, wovon die erstere wesentlich durch einen Druck, die Streckung aber durch einen Zug der Massen zu erklären sein dürfte.

Delessé (2) untersuchte den Syenit des Ballon d'Alsace. Er besteht aus zwei verschiedenen Feldspathen (Orthoklas, und einem dem Andesin von Abich nahe stehenden), und dunkelgrüner Hornblende, wegen deren näherer Beschreibung wir auf den mineralogischen Theil des Jahresberichts verweisen (3). Aufserwesentliche Bestandtheile sind: Quarz,

(1) Jahrb. Miner. 1847, 297; Quarterly Journal of the Geological Society of London, 1848, 1; Arch. ph. nat. VII, 322. — (2) Ann. des mines [4] XIII, 667; Compt. rend. XXV, 108; Arch. ph. nat. V, 332; mit Zusätzen des Verf. Jahrb. Miner. 1848, 769. — (3) S. 1172, 1181, 1183.

Syenit.

Sphen, Glimmer, Magneteisen, Eisenkies, Epidot, Eisen-
glimmer. Das spec. Gewicht des gepulverten Syenits von
Servance betrug 2,69 bis 2,71, des von Them und Corav-
lers 2,64 bis 2,68. Es wechselt zwischen ziemlich weit
Gränzen, und ist bei sonst gleichen Verhältnissen um-
größer, je mehr Hornblende und Andesin, und um so klein-
er, je mehr Quarz vorhanden ist. Er verliert im Feuer im Mit-
tel 0,70 pC., nimmt eine sehr blasse Farbe an und wird zer-
zerreiblich, giebt im Glasofen ein stark eisengefärbtes Gl-
eben im Kohlentiegel, wobei sich Eisen und Titan re-
ciren. Das Verhältniß der einzelnen Bestandtheile wech-
selt, meistens enthält er $\frac{1}{4}$ Orthoklas, $\frac{1}{4}$ Andesin, $\frac{1}{4}$ Ho-
rnblende und Quarz. Die Reihenfolge, in welcher die Ge-
mengtheile krystallisirten, war: Orthoklas und ungefähr zu
selben Zeit Hornblende, dann Andesin. Quarz füllte
Zwischenräume aus, und formte sich in vollkommener We-
ise über den scharfen Krystallkanten. Hornblende, Andesin und
selbst Quarz finden sich oft in der Mitte der Orthoklas-
krystalle. Die Sphenkrystalle finden sich in den andern
Mineralien, selbst im Orthoklas; ihre Bildung scheint vom An-
fang der Krystallisation an vor sich gegangen zu sein. In
Glimmer entstand gleichzeitig mit der Hornblende, mit
der er immer verbunden ist und selbst in ihrem Innern. Die
Ordnung ist nicht die der Schmelzbarkeit, eine Thatsache
welche auch von andern Beobachtern bei granitischen Ge-
steinen bemerkt wurde. Nach seiner, von uns bereits
mitgetheilten, Methode bestimmte Delessé die Volum-
der Gemengtheile dieser Syenite und ihre chemische Zusa-
mmensetzung im Ganzen, und zwar in verschiedenen Var-
täten 1, 2, 3. In der folgenden Zusammenstellung bede-
teten f falben, b braunen Orthoklas, n weissen, r rothen An-
desin, H Hornblende, Q Quarz, die eingeklammerten Zahlen
das spec. Gewicht, A den procentischen Gehalt an Ge-
mengtheilen nach Volum, B den nach Gewicht:

(1) S. 1231 dieses Jahresberichts.

1. (2,87)		2. (2,72)		3. (2,72)	
A	B	A	B	A	B
30	fb 29	24	b 23	20	f 19
32	r 31	30	r 29	34	b 33
10	H 12	21	H 24	16	H 19
28	Q 27	25	Q 24	30	Q 29

Der Procentgehalt an entfernten Bestandtheilen ist :

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	KO	NaO	H ₂ O u. Rest
1)	70,74	14,24	2,21	2,74	1,97	3,87	3,07	1,14
2)	67,49	13,28	3,98	3,95	3,74	3,55	2,73	1,28
3)	70,03	13,21	2,85	3,88	2,93	3,09	2,90	1,17

Delesse (1) hat mehrere Porphyre (Melaphyre) aus den Vogesen und zur Vergleichung einige aus andern Ländern untersucht. Er kommt zu dem Schluss, dass die Felsarten feurigen Ursprungs, welche in derselben geologischen Epoche gebildet wurden, wohl Uebergänge in andere Felsarten darbieten können, welche von ihnen im Alter, in chemischer und mineralogischer Zusammensetzung verschieden sind; dass sie auch Aenderungen in einzelnen Theilen erlitten haben können, aber diese zufällig und local sind und nicht das Ganze der Formation ändern. Er glaubt, dass man folgendes Princip aufstellen kann: Im Allgemeinen sind die Felsarten desselben Alters von derselben chemischen und mineralogischen Zusammensetzung; und umgekehrt: Gesteine von derselben chemischen Zusammensetzung, von denselben und auf dieselbe Weise vereinigten Mineralien gebildet, sind von demselben Alter.

Porphyr.
(Melaphyr.)

Die von Delesse untersuchten Gesteine sind nun :
1) Porphyre oder Melaphyre von Belfahy. Eine Art Labradorfeldspath und Augit bilden die wesentlichen Gemengtheile dieses Porphyrs, wir müssen aber wegen ihrer Beschreibung auf den mineralogischen Theil dieses Berichts verweisen (2). Unwesentliche sind: Schwefelkies, Epidot, Quarz, Kalkspath und ein chloritartiges Mineral. Diese liegen in einer Grund-

(1) J. pr. Chem. XLIII, 417; XLV, 219; theilweise Bullet. soc. géolog. [2] IV, 774; Arch. ph. nat. V, 258; Compt. rend. XXV, 636; Jahrb. Miner. 1847, 846. — (2) S. 1183.

Porphyr. masse von sehr dunkelgrüner Farbe', die indessen doch
 (Melaphyr.) vom Schwarzen bis in's Hellgrüne und Graue übergeh
 Das Pulver ist im Allgemeinen lichtgrau gefärbt. D
 Structur ist eine krystallinische, doch sind die Krystalle
 klein, um durch das Auge unterschieden werden zu könne
 Spec. Gewicht zwischen 2,803 bis 2,769. Die Grundmas
 wirkt fast stets auf die Magnetnadel, um so stärker,
 dunkler sie ist. Sie enthält gebundenes Wasser, gleich de
 Feldspath, den sie einschließt, und zwar von 3,59 l
 2,14 pC. Durch offenes Glühen nehmen die Gesteine ei
 bräunlich-grüne, röthliche Farbe an. Vor dem Löthro
 schmilzt die Grundmasse fast eben so schwer als d
 Feldspath zu einer bouteillengrünen Perle. Mit Bor
 giebt sie ein von Eisen gefärbtes Glas, und Phospho
 salz löst sie vollständig auf. Concentrirte Salzsäure li
 innerhalb zwei Tagen in der Kälte 23 pC. der schwarz
 Grundmasse auf. Analysirt wurden: 1) Schwärzlich-grü
 Grundmasse des Porphyr von Belfahy; 2) ziemlich du
 kelgrüne Grundmasse des Porphyr von der Sägmühle b
 Puix; 3) röthliche Grundmasse des Porphyr von Gir
 magny.

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	CaO	MgO	KO u. NaO	F
1.	53,17	19,77	8,56	0,51	3,87	4,96 **)	7,02	2.
2.	50,79	27,25 *)	—	—	8,02	10,74 **)		3.
3.	49,82	29,74 *)	—	—	7,31	10,93 **)		2.

*) Mit Fe₂O₃. **) Aus dem Verlust berechnet.

Das Gestein schmilzt im Glasofen vollkommen, u
 liefert ein dichtes Glas von muschligem Bruch und sta
 von Eisen gefärbt. Es wird dann durch Salzsäure vo
 ständig zersetzt, wobei sich die Kieselerde körnig absche
 det. Auch dieses Glas wurde analysirt; die Analyse kom
 mit der der Grundmasse No. 1) fast ganz überein, und
 ergibt sich daraus, daß die mittlere Zusammensetzung d
 Grundmasse fast die der Gesamtmasse dieses Porphy
 ist. Auch zeigt die Grundmasse bei mikroskopischer U

tersuchung zwei Mineralien. Eine Berechnung der Gemengtheile aus dem spec. Gewicht nach der Formel: Porphyr,
(Mélaphyr.)

$$D = \frac{MS + NF}{M + N}$$

worin D das spec. Gewicht des Gesteins, S das des Augits, F das des Feldspaths bedeutet, M und N die Volumverhältnisse von Augit und Feldspath, welche in 1 Vol. des Gesteins enthalten sind, so daß $M + N = 1$ ist, ergibt 65 bis 70 pC. Feldspath für die dunkelsten Varietäten. Die Mineralien, welche die Grundmasse bilden, sind ebenfalls Labradorfeldspath, dessen Zwillingskrystalle sich unterscheiden lassen, und Hornblende, was Delesse daraus schließt, daß bei der Calcination der Abänderungen, welche Augit enthalten, der letztere eine dunklere Farbe annimmt, die Grundmasse dagegen im Allgemeinen mehr hellbraun oder röthlich wird, wie es bei den Dioriten und den dioritischen Hornblende enthaltenden Porphyren der Fall ist. Es muß indessen eine Hornblende von besonderer Zusammensetzung sein, da sie 53 pC. Kieselerde enthält, was nur selten der Fall ist; auch muß sie Wasser und Thonerde enthalten, und endlich muß die Menge des Kalkes kleiner sein, als in dem Feldspath, während die untersuchten Hornblendengewöhnlich reich an dieser Erde sind.

2) *Spilit* (von Thirria so genannt) von Fauconney (Haute Saône), ein wahrer Mandelsteinporphyr. Ein Gestein von grüner, violetter, ins schwärzliche ziehender Farbe, von vollkommen homogenem Ansehen, krystallinischer, körniger Textur, und dem Porphyr von Belfahy sehr nahe stehend. Die Blasenräume sind von kohlensaurem Kalk erfüllt, den ein wenig eisenhaltiger Chlorit umgiebt. Das spec. Gewicht ist = 2,906. Es ist magnetisch. Unter der Loupe bemerkt man grünliche Blättchen, die parallel ihrer Längenaxe sehr fein gestreift sind, was auf Zwillinge von Labrador deutet. Vor dem Löthrohr verhält es sich wie die Grundmasse des Gesteins von Belfahy, mit der es auch fast dieselbe Zusam-

Porphyr.
(Melaphyr.)

zusammensetzung hat, nur dafs es reicher an dem grünen Si (Hornblende) ist und kaum 55 pC. Labrador enthält.

SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO*	MnO	CaO	MgO	NaO	KO	H ₂ O	Σ
54,42	20,66	9,44	0,93	3,64	3,87	4,48	0,94	1,47	100

* Zum Theil als Fe₂O₃.

3) Delesse untersuchte auch den antiken grünen Porphyr, der dem Porphyr von Belfahy sehr nahe steht. Feldspath hat die Mischung des Labradors, wofür ihn Delesse hält. (G. Rose hielt ihn für Oligoklas.) spec. Gewicht der Grundmasse bei einer olivengrünen Varietät war = 2,915. Der Wassergehalt wechselte zwischen 3,99 und 1,80 pC.; er ist gröfser in den grünen als in violetten Varietäten, und in jenen um so gröfser, als Farbe schöner und dunkler ist.

SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	CaO	MgO	NaO	KO	1
53,55	19,43	7,55	0,85	8,02	7,93*			2

* Aus dem Verlust bei der Analyse mit kohlensaurem Natrium bestimmt.

4) Melaphyr aus Tyrol. Delesse untersuchte eine Varietät, die zwischen Botzen und Colmar (?) gesammelt. Die Grundmasse war hellgrau, schwach grünlich, reich mit kleinen Labradorkrystallen erfüllt. Bei aller sonstigen Uebereinstimmung mit dem Labrador der Vogesen ist sie grau und blättrig. Das Gestein ist magnetisch, wie Melaphyre, und man entdeckt hier und da kleine Octaeder von Magneteisen. Obgleich zwischen den Melaphyren Tyrols und der Vogesen eine grofse Analogie herrscht, sind jene im Allgemeinen doch blasiger und leichter. mineralogische Zusammensetzung erscheint auch complicirter (Delesse bemerkte Hypersthen und Glimmer in einzelnen Stücken); ihr Wassergehalt ist kaum halb so grofs wie dem Melaphyr der Vogesen, er wechselt zwischen 0,7 und 1,24 pC.

5) Porphyr von Tyfholms Udden bei Christiania. I. Porphyre besitzen nur zum Theil den Character des Melaphyrs. Die Grundmasse ist rauchgrau, ins Röhlichbräunliche.

ziehend. Sie enthält hellere Labradorkrystalle, die aber keine Zwillinge sind (vgl. S. 1163 dieses Jahresberichts). Die Grundmasse enthält vorzugsweise Labrador, dessen kleine Zwillingsskrystalle sich in allen Richtungen kreuzen; ferner ein schwärzliches, glänzendes, eisenhaltiges Silicat, welches für Hornblende gehalten wird (von Cordier, Buch und Keilhau); außerdem verworren krystallinische, feldspathartige Parthien und Magnetisen. Spec. Gewicht der Grundmasse = 2,771. Die Zusammensetzung ist im Mittel von zwei Analysen:

Porphy.
(Melaphyr.)

SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	CaO	MgO	NaO	KO	HO
55,29	18,78	9,46	3,14	3,48	8,68 ^{*)}		1,17

^{*)} Aus dem Verlust bestimmt.

Der Kieselsäuregehalt ist der des Labradors. Der Nadelporphyr Buch's ist eine Varietät von diesem.

Hinsichtlich der noch theilweise auf ihren Wassergehalt und spec. Gewicht untersuchten Melaphyre Norwegens, des Urals und Aegyptens und ihre Vergleichung mit dem Porphy von Belfahy verweisen wir auf die Abhandlung selbst.

Einige der Thatsachen haben Wichtigkeit für die Beziehungen zwischen den Melaphyren und Basalten. Die Grundlage beider Gesteine ist dieselbe, Labrador; außerdem enthalten beide Augit und Magnetisen, sowie Wasser. Es ist wahrscheinlich, daß der basaltische Labrador selbst chemisch gebundenes Wasser enthält, gleich wie der der Melaphyre. Was die Zeolithe betrifft, so scheint es, daß sie nicht einen Theil der Grundmasse bilden, sondern nur in Drüsenräumen des Gesteins vorkommen.

6) Porphy von Ternuay, ein Gestein, das von Einigen als Abänderung des Labradorporphyrs von Belfahy, von Andern als Uebergangsporphy und Diorit, von Cordier mit dem Namen Ophitone bezeichnet wurde. Die wesentlichen Gemengtheile dieses Porphyrs sind Feldspath und Augit; von denen der erstere von dem Verfasser als eine eigenthümliche Feldspathgattung mit dem Namen Vosgit oder Vogesenfeldspath bezeichnet

Porphyr.
(Melaphyr.)

wurde, hinsichtlich dessen Beschreibung, sowie der d
Augits, wir auf den mineralogischen Theil des Jahr
berichts verweisen können (1). Bemerkenswerth ist hi
nur, daß beide wasserhaltig sind, daß Delesse
Anwesenheit des Wassers in einem plutonischen Gestein
durch den Druck erklärt, unter welchem seine Entstehung
Statt fand, und daß er dieses Wasser nach Scheerer'scher
Theorie der polymeren Isomorphie für basisches Wasser hält.
Als zufällige Gemengtheile enthält dieser Porphyr Schwefel
felskies und Magneteisen; in Höhlungen oder kleinen Gängen
trifft man pistaziengrünen Epidot, Quarz, Chalcocit, eisenhaltigen
Chlorit und einen rothen blättrigen Zeolith, welcher leicht
verwittert und wahrscheinlich Heulandit ist. Zuweilen bemerkt
man Glimmerblättchen in der Grundmasse, doch nur da, wo
benachbarte Gesteine den Porphyr verändern zu haben
scheinen; desgleichen Spuren von Diallag und verschiedenen
Feldspathen, Oligoklas oder Andesin an den Grenzen des
Gesteins. In charakteristischen Stücken besteht der Porphyr
allein aus Vosgit und Augit. Wenn die Krystalle mikroskopisch
werden, so erscheint das Gestein gleichmäßig grün und
enthält nur hier und da sehr groß und ausgebildete Augitkrystalle.
Spec. Gewicht 2,857 bis 2,833, bei dunkleren Varietäten 2,885.
Glühverlust von 3,02 bis 4,06 p. Durchs Glühen nimmt er
eine hellröthlich-braune Farbe an, und läßt seine Structur
deutlich erkennen. Im Glas giebt er eine bräunlich-schwarze,
strahlige, vollkommen krystallinische Masse, im Kohlentiegel
aber bloß ein bontengrünes Glas. Durch Vergleichung der
Dichtigkeit und Volumverhältnisse in der Einheit des Gesteinsvolumens
fand Delesse, daß der Porphyr von Ternuay 75 bis 80 p. seines
Volumens oder Gewichts an Vosgit enthält. Man kann diese
Mengen durch das Verhältniß der Wassermengen in einem
Gewichtstheil des Gesteins und dem der beiden C

(1) S. diesen Jahresber. S. 1172. 1183.

mengtheile controliren, oder auch durch die Mengen von Kalkerde u. s. w. aus der Masse des Porphyrs, wodurch dieselben Zahlen erhalten werden. Hiernach besteht also der Porphyr als Ganzes aus :

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MnO	MgO	CaO	NaO	KO	HO	Sme.
1) 26 Augit :	12,7	1,8	1,9	—	4,2	4,9	—	—	0,6	} 99,3
74 Vosgit :	36,5	22,3	0,5	0,4	1,5	3,2	3,6	3,3	2,4	
2) 19 Augit :	9,3	1,0	1,4	—	3,0	3,6	—	—	0,4	} 99,4
81 Vosgit :	39,9	24,4	0,6	0,5	1,6	3,5	3,9	3,7	2,6	

Delesse hat auch vier veränderte Uebergangsschiefer aus der Nähe des Porphyrs untersucht und dabei gefunden, daß in dem Maße, als das Gestein sich dem Schiefer nähert, der Gehalt an Wasser und Kieselerde größer wird, während der Kalk zurücktritt.

Uebergangsschiefer.

	Sp. Gew.	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	CaO	NaO u. KO	HO
1.	2,852	52,7	34,0			2,4	7,5 *)	3,4
2.	2,764	60,8	39,6			0,5	4,2 *)	4,9
3.	2,752	62,7	26,0			0,8	6,0 *)	4,5
4. †)	2,743	60,0	30,0			0,5	4,2 *)	5,0

*) Mit MgO. †) Drei Meter von der ersten Probe entfernt.

Delesse (1) hat der französischen Akademie eine Mittheilung über den Protogyn gemacht, den er hauptsächlich wegen seines Uebergangs in geschichtete Gesteine für eine metamorphische Gebirgsart hält. Seine Hauptbestandtheile sind Quarz, Orthoklas, Oligoklas, zweiäxiger, sehr eisenreicher Glimmer und eine Talkvarietät. Vom Granit unterscheidet er sich durch die Gegenwart des Talkes, der sich bei diesem nur zuweilen in geringer Menge findet. Die mineralische wie chemische Zusammensetzung wechselt etwas. Ein vom Gipfel des Mont-Blanc entnommenes Handstück von Protogyn ergab bei der Analyse: Kieselerde 74,25, Thonerde 11,58, Eisenoxyd 2,41, Manganoxyd Spuren, Kalkerde 1,08, Magnesia, Kali und Natron 10,01, Wasser 0,67.

Protogyn.

(1) Ann. ch. phys. [3] XXV, 114; Bullet. soc. géolog. [2] VI, 230; Institut. 1848, 287; Compt. rend. XXVI, 306; Arch. ph. nat. X, 240; Phil. Mag. [3] XXXIV, 233; Jahrb. Miner. 1849, 360.

Trachyt.

Morlot (1) analysirte den Trachyt vom Gleichenberge, den er dem Trachydolerit Abich's parallelisirt und ihn auch ebenso zu nennen vorschlägt; ein dichtes, wie Feldstepporphyr aussehendes Gestein von graulich-grüner Farbe, an dem man hin und wieder die Spaltungsflächen von kleinen, sonst wenig unterschiedenen Feldspathkrystallen sieht.

Sp. Gew.	SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	KO	NaO
2,64	57,17	16,90	8,50	Spur	1,90	6,30	3,90	1,00

Mit der Analyse des Gleichenberger Mineralwassers verglichen, finden sich dieselben Bestandtheile in derselben relativen Menge, mit Rücksicht auf die relative Löslichkeit, nur dafs dort alles Alkali als Natron angegeben worden ist. Da auch Gmelin und Struve bei ihren Analysen des Phonoliths fanden, dafs das verwitterte Gestein oft noch mehr Kali enthält, als das unverwitterte, während der gröfsere Theil des Natrons weggeführt wurde, so glaubt Morlot aus der Untersuchung der Gleichenberger Quellen schliessen zu dürfen, dafs dies auch hier der Fall sei, dafs aber in der Tiefe das Ganze eigentlich eine Metamorphose sei, und sich Kalifeldspath bilde, weil sich oft Graniten Pseudomorphosen von Orthoklas nach Albit finden (2). Aus der einst feurig-flüssigen, im Innern amorphen Lava des Gleichenberges habe sich an der Erdoberfläche Trachyt und Phonolith, in der Tiefe vielleicht Porphyr oder gar Granit gebildet. Morlot bemerkt indessen, dafs dies nur eine theoretische Annahme sei, die weiterer Untersuchungen bedürfe.

Diorit.

Delessé (3) hat den Kugeldiorit von Corsica untersucht. Ueber den ihn zusammensetzenden Feldspath, der besonders das Merkwürdige hat, dafs er einfach-kieselsauer und dem Anorthit nahe kommt, und die Hornblende vorsehen wir auf den mineralogischen Jahresbericht (4). Di-

(1) Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) II, 236. 336. — (2) *Proc. Ann.* LXVI, 109; LXVIII, 476. — (3) *Ann. ch. phys.* [3] XXIV, 4 *Compt. rend.* XXVII, 412; *Instit.* 1848, 325; *Jahrb. Miner.* 1848, 6 — (4) S. 1184 und 1172.

Mineralien sind in ihm in concentrischen abwechselnden Lagen geordnet; der innere Theil der Kugeln hat oft eine granitische Zusammensetzung, und die Kugeln haben sich in der Mitte einer dioritischen Grundmasse von mittlerem, zuweilen auch grobem Korn entwickelt. Außerdem enthält er Glimmer von grüner Farbe, Eisenkies, der sich nach der Hornblende gebildet hat, indem er Abdrücke von ihr zeigt, Magnetkies und Quarz, welcher letztere in einem Gestein mit so kieselsäurearmem Feldspath eine Merkwürdigkeit ist. Auch findet man kleine Adern von Epidot und Ripidolith. Spec. Gewicht. 2,768, woraus hervorgeht, daß er 90 pC. Feldspath und 10 Hornblende enthält. Durch einen besonderen Versuch wurden 48,05 pC. Kieselerde und 11,04 Kalkerde gefunden, woraus sich 80 pC. Feldspath und 20 Hornblende ergeben.

Diorit.

Delesse (1) beschreibt den als Arkose bezeichneten Feldspathsandstein von Poivin in den Vogesen, und hält ihn für einen sedimentären Sandstein, der durch Aufnahme von Hyalith und Feldspath auf nassem Wege metamorphosirt worden ist. Nach unten geht er allmählig in den Granit über, auf dem er ruht; nach oben in den gewöhnlichen Vogesensandstein. Hyalith und Orthoklas, der letztere oft vollständig auskrystallisirt und mit der Längensaxe der Krystalle nicht parallel den Schichten, sind die Hauptbestandtheile der Arkose, die oft Porphyristructur hat (2). Der so neu gebildete Feldspath zeigt keine Spuren von Zersetzung, während Granitbruchstücke in der Arkose fast zersetzt und in Kaolin oder wasserhaltiges Magnesiasilicat verwandelt sind. Mit Unrecht ist diese Felsart für einen Eruptivporphyr gehalten worden, da sie nicht nur Gerölle, sondern auch Thonschichten enthält, die mit ihr abwechseln und in geringer Entfernung von Granit Pflanzenabdrücke enthalten. Diese Thone sind kieselhaltig, hart, klingend und sehr dicht, haben Schiefertextur und sind bandartig gestreift. Ihr

Arkose.

(1) Arch. ph. nat. VII, 177. — (2) Ueber den porphyrtig eingewachsenen Feldspath vergl. diesen Jahresbericht S. 1181.

Arkose. Wassergehalt ist 2 pC., also viel weniger wie in den wöhnlichen Thonen. In Adern finden sich Quarz, Fglanz, Schwerspath, Flußspath und Chalcedon, welche auch sehr oft in der Masse der Felsart vorkommen. Gerölle des Sandsteins, die aus Granit, Quarz, Kiesel u. s. w. bestehen, zerfließen unmerklich in ein chalcisches oder hornsteinartiges Bindemittel, dessen Ablagerung in Schichten man oft wahrnimmt. Nach Delesse l sich die Feldspathkrystalle nach der Ablagerung des steins auf nassem Wege gebildet, es hat außerdem Aufnahme von Kieselerde Statt gefunden, die von G oder heißen Quellen geliefert wurde.

Gabbro. G. Rose (1) beobachtete am Zobtenberg in Sch einen geschichteten Gabbro, der zwischen Serpentin Granit liegt und auf dem letztern ruht. An andern S geht er in einen grünen Schiefer, an noch andern in pentin über. Rose schließt daraus, daß der Gabbro vielleicht auch der Serpentin durch den Einfluß des nits auf frühere Sedimentärbildungen umgewandelte steine sind.

Nach Burat (2) bestehen constante Verhältnisse Zusammenvorkommens der Trappgesteine — worunter Silicate mit den isomorphen Basen der Magnesia, des kes und Eisenoxyduls, also den Grünstein, die Hornbl gesteine, Mandelsteine, Spilite, Variolithe, Euphotidi Serpentine begreift — mit den Erzgängen, und er hat dies für den toscanischen Serpentin und Gabbro, ferner für nassanischen Grünsteine und Schalsteine, die Blatterstein Harzes, für das Vorkommen der Kupfererze auf Cub am Obersee in Canada nachgewiesen. Die toscanische serpentine hält er für Eruptivgesteine, dagegen den Gabbro ein Contactproduct. Er unterscheidet zwischen dem nen und rothen Gabbro, von denen der erstere Uebergang vom Serpentin zum rothen Gabbro und in

(1) *Bullet. soc. géolog.* [2] IV, 1061. — (2) *Ann. des mi* XIII, 351.

bar geschichtete Gesteine (Galestri und Mattoni) bildet. Gabbro.
Der grüne Gabbro ist steatithaltig wie die Serpentine, mit denen er bisweilen verschmolzen ist, geht in den rothen Gabbro über, indem er zuerst gefleckt und dann allgemein durch Aufnahme von Eisenoxyd roth gefärbt wird. Die Kupfer- und Eisenerze sind in diese Contactgesteine eingelagert, oder in eruptiven Hornblendegesteinen eingesprengt, welche ihrerseits mit den Serpentin verbunden sind. Die Steatitadern, welche oft den grünen und rothen Gabbro von den Serpentinmassen trennen und andre Male im Gabbro parallel mit gekrümmten Contactflächen laufen und seine Schichtungsflächen andeuten, hält Burat für eingedrungene Massen, welche unmittelbar den Serpentineruptionen folgten.

Der Eisenglanz, sowie die andern Erze, die mit dem Gabbro und in den geschichteten Gebilden in der Nähe des Contacts mit dem Serpentin vorkommen, sind nach Burat ein Resultat metallischer Emanationen aus der Tiefe. Gleichen Ursprungs sind die Erze im Dillenburghischen u. s. w. Der Schalstein von Nassau, die Blattersteine vom Harz und der Gabbro von Italien — Felsarten, die alle aus den metamorphischen Einflüssen in Berührung mit Trappgesteinen hervorgehen — haben einen weiteren gemeinsamen Character in der starken Röthung der Felsarten und der massenhaften Ausscheidung des Eisenoxyds. Im normalen Zustand sind diese Gesteine grün, zeigen mehr oder weniger den Character der Trappmassen, denen sie untergeordnet sind, und bilden einen Uebergang zwischen dem eruptiven Gestein und dem erhobenen Schichtgestein. Die Quantität Eisenoxydul, welche sie in diesem normalen Zustand enthalten, schließt die Annahme aus, daß hier bloß eine höhere Oxydation des vorhandenen Eisens statt gefunden; das Eisen ist in solcher Menge hinzugefügt worden, daß sich diese Felsarten durch Uebergänge und Contactverhältnisse an die Ansammlungen des reinen Eisenoxyds anschließen. Derselbe Eisengehalt findet sich bei dem einfachen rothen Thonschiefer von Dillenburg, dem rothen

Gabbro. Kieselschiefer vom Harz, dem Galestri und dem r Jaspis von Toscana; es sind überall unterirdische Ex- tionen von Eisenoxyd, die dem Aufbruch der Trappge- folgten, dasselbe, was die Producte der Solfataren der- tigen Epoche, die Eisenglanzbildungen in den Vull der Jetztwelt sind.

Auch der bunte Sandstein, der Vogesensandstein bunten Mergel und im Allgemeinen die Gyps- und mergel der secundären Zeit zeigen diese Färbung wasserfreies Eisenoxyd, das sich auch überall in Formationen in größeren Massen angesammelt hat, Burat schließt hieraus, daß das Innere der Erde während der ganzen geologischen Zeit ein Heerd andauer Emanationen war, die eine ungeheure Masse Eisen an die Oberfläche brachten; das wasserfreie Product misch sich mit dem Sediment, oder schob sich in concent Lagern zwischen die durch die Trappgesteine erhalten Sedimentgesteine.

Laven. Genth (1) untersuchte verschiedene Laven des H die Bunsen mitgebracht hatte :

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MgO	CaO	NaO	KO	MnO	CoO	NiO
1. Thjorså Lava (ein ält. Strom)	49,60	16,89	11,92	7,56	18,07	1,24	0,20		Spuren	
2. Lava von Häls (jüng.)	55,92	15,08	15,18	4,21	6,54	2,51	0,95		Spur	
3. Lava von Efravols- hraun (noch jünger)	60,06	16,59	11,37	2,40	5,56	3,60	1,45		Spur	
4. Lava von 1845	56,68	14,93	13,93	4,10	6,41	3,46	1,07		Spur	
5. Asche vom Ausbr. 1845 (von reiner Schneefläche entnommen).	56,89	14,18	13,35	4,05	6,23	2,35	2,64		0,54	

1) Grünschwarze Grundmasse, voller Blasenri zum Theil ausgefüllt mit den beiden andern Gemength einem neuen Mineral Thjorsaut und Chrysolith, zum leer und dann in den Wandungen mit kleinen rhombi

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 13; Arch. ph. nat. IX, 72.

Krystallflächen. Die Grundmasse bildet etwa $\frac{1}{3}$ der ganzen Lava, ist aber so mit andern Bestandtheilen durchwachsen, daß sie nicht rein erhalten werden kann. Das Verhältniß, in welchem die Bestandtheile in dieser Lava enthalten sind, läßt sich ausdrücken durch die Formel $5(3 \text{ RO}, 2 \text{ SiO}_3) + (4 \text{ Al}_2\text{O}_3, 3 \text{ SiO}_3)$. Ueber den Thjorsaut und Chrysolith vergl. den mineralogischen Jahresbericht (1).

2) Krystallinisch, von unbekanntem, vielleicht rhombischem Krystallsystem, bemerkbarer Spaltbarkeit, unebenem Bruch, mattem, auf den Krystall- und Spaltungsflächen schwachem Glasglanz, undurchsichtig, grauschwarz. Strichpulver grau. Spec. Gew. bei $5^\circ = 2,919$. Härte 5,5 bis 6. Schwach magnetisch. Schmilzt vor dem Löthrohr in kleinen Stücken zu einer schwarzen glasigen Kugel, und giebt mit Borax und Phosphorsalz Eisenreactionen. In Salzsäure unauflöslich. Derb, feinkörnig krystallinisch, voller Blasenräume, in denen sich sehr kleine rhombische Krystallflächen wahrnehmen lassen. Selten ist ein weißes, krystallinisch blättriges Mineral (Thjorsaut?) und schlackiges Magneteisen eingesprengt. Genth nimmt hierfür die Formel an: $(3 \text{ RO}, 2 \text{ SiO}_3) + (\text{Al}_2\text{O}_3, 2 \text{ SiO}_3)$. Die Analyse zeigt dieselbe Zusammensetzung wie Laurent's Wichthyn (Wichtisit, Hausmann).

3) Unkrystallinisch, Bruch uneben in's Muschlige. Matt. Schwarz ins Graue. Strichpulver grau. Spec. Gew. bei $5^\circ = 2,776$; Härte = 5,5 bis 6. Schwach magnetisch. Die scheinbar fast dichte Masse enthält viele sehr kleine Blasenräume, welche selten die Größe eines Hirsekorns erreichen. In der Lava sind etwa 2 bis 3 pC. eines weißen, feldspathartigen, krystallinisch-blättrigen Minerals eingesprengt (Orthoklas?). Außerdem sind noch in viel geringerer Menge Chrysolith und schlackiges Magneteisen eingewachsen. Annäherungsweise wird das Verhältniß der Bestandtheile ausgedrückt durch die Formel: $(3 \text{ RO}, 2 \text{ SiO}_3) + (\text{Al}_2\text{O}_3, 3 \text{ SiO}_3)$.

(1) S. 1173, 1179.

Laven.

4) Krystallinisch, Bruch uneben ins Muschlige. Schwarz ins Graue, auf den sehr kleinen Krystallflächen metallische Glasglanz, im Uebrigen schwacher Glasglanz bis matt Strichpulver grau. Spec. Gew. bei $5^{\circ} = 2,819$. Härte 5, bis 6,5. Schwach magnetisch. Vor dem Löthrohr und gegen Salzsäure sich wie die vorigen verhaltend. Blasig bis dicht in den Blasenräumen zeigen sich die kleinen Krystallförmchen. Ein feldspathartiges Mineral, vielleicht das nämliche wie in der Lava von Efraholshraun, ist auch in diese doch in viel geringerer Menge und kleineren Krystall ausgeschieden. Ihre Zusammensetzung läßt sich durch die Formel $(3 \text{ RO}, 2 \text{ SiO}_3) + (\text{Al}_2\text{O}_3, 2 \text{ SiO}_3)$ ausdrücken.

5) Kleine Schlackentheile von der Größe eines kleinen Felderbses bis zur Staubform; matt bis zu schwachem Glasglanz. Schwarzgrau, hin und wieder roth gebrannt Strichpulver grau.

Die Heklalaven unterscheiden sich dadurch von den Laven des Vesuv's und Aetna's, den meisten Basalten und Phonolithen, daß sie keinen durch Salzsäure ausziehbaren gelatinirenden Bestandtheil enthalten, sondern bloß auf Spuren von Magneteisen unlöslich in dieser Säure sind; alle enthalten einen wesentlichen Bestandtheil von der Zusammensetzung des Wichtisits, und wenn die Elemente nicht in dem Verhältnisse des Wichtisits vorhanden sind, so scheiden sich in und neben diesem andere Mineralien aus, wie Thjorsautit, Chrysolith, Orthoklas?, Magneteisen u. s. w.

Geschichte
des
Gesteins.

In Folge seiner Analysen des Haydenits, des Steatits und des Talks kommt Delesse (1) zu der Ueberzeugung, daß die Talkgesteine keinen eigentlich plutonischen Ursprung haben, sondern daß die Talk- und Steatitschiefer der Gneufs, der Protogyn und alle analogen Gesteine einen gemischten Ursprung haben, und daß sie zuerst a

(1) Ann. des mines [4] XIII, 235; Arch. ph. nat. IV, 85.

wässrigem Wege gebildet und nachher auf feurigem Wege verändert worden sind.

Delesse (1) untersuchte einen Schiefer von Villa rota am Po von grün-graulicher Farbe, mit Perlmutterglanz, in dünnen Blättern durchscheinend, der sich leicht schneiden und pulvern läßt, sich fettig anfühlt und ein spec. Gew. von 2,644 hat. Beim Calciniren wird er graubraun, schmilzt vor dem Löthrohr schwer und nur in dünnen Splittern zu einem weißgrauen Glas. In Phosphorsalz hinterläßt er ein kleines Kieselskelett. Mit Kobaltsolution giebt er eine Lilafärbung. Von Säuren wird er leicht angegriffen und hinterläßt pulverige Kieselerde. Zwei Analysen ergaben im Mittel: Kieselerde 41,34, Thonerde 3,22, Eisenoxydul 5,54, Magnesia 37,61, Wasser 12,06 pC., nebst Spuren von Chromoxydul und Manganoxydul. Hiernach stellt Delesse die Formel auf $3\text{RO}_3, \text{SiO}_3$. Den physikalischen Eigenschaften nach könnte man diesen Schiefer Talkschiefer oder Chloritschiefer nennen, die Analyse nähert ihn aber viel mehr dem Serpentin. Delesse betrachtet ihn darum als Serpentin-schiefer, und zählt hierzu noch den Marmolit von Vanuxem und mehrere von Schweitzer analysirte Schiefer aus den Alpen.

Serpentin-schiefer.

Fournet (2) giebt eine Geschichte des Dolomits als Mineralspecies wie als Felsart, deren wir indessen hier nur erwähnen können.

Dolomit und Dolomitbildung.

Monheim (3) untersuchte Dolomit von der Grenze des Altenberger Galmeilagers. Derselbe bestand aus:

SiO_2	CaO, CO_2	MgO, CO_2	ZnO, CO_2	FeO, CO_2	MnO, CO_2
0,48	54,31	43,26	1,38	0,99	0,56

Morlot (4) untersuchte ein sandiges Dolomitgestein vom Hausberg bei Stübing, eine geschichtete schiefrige,

(1) Ann. des mines [4] XIV, 79; Arch. ph. nat. VIII, 111; Jahrb. Miner. 1848, 658. — (2) Ann. de la soc. roy. d'agricult. de Lyon 1847; Arch. ph. nat. VI, 240; Jahrb. Miner. 1848, 102. — (3) Verhandl. des naturhist. Vereins der preufs. Rheinl. 1848, 41; Jahrb. Miner. 1848, 826. — (4) Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) II, 242.

Dolomit und schwach gelblich-rothe, leicht ritzbare, mit Säuren au
Dolomit- brausende, im Bruch erdige Masse. Die Untersuchun
bildung. ergab :

Sp. Gew.	CaO	MgO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	HO	CO ₂	Rückst. unlösl. in C
2,69	13,8	6,6	2,2	1,6	20,7		55,0

Der Rückstand enthielt 61,5 pC. Kieselerde, 23,4 Thonerde, 3,4 Eisenoxyd, 8,2 Kali und 3,5 pC. Natron, so dafs die Ganze aus 45 pC. unreinem Dolomit und 55 pC. feinspathartigem Sand besteht.

Morlot (1) hat eine Theorie der Dolomitbildung aufgestellt und dieselbe durch einen Versuch zu begründen gesucht. Haidinger, von der häufigen Vergesellschaftung des Dolomits mit Gyps ausgehend, hatte schon früher eine Vermuthung geäußert, dafs die Magnesia als schwefelsaures Salz zugeführt worden sei, und dieselbe den Kalkstein bei gleichzeitiger Ausscheidung von Gyps, in Dolomit verwandelt habe, und dafs der Vermittler jener Molecularbewegungen das Wasser gewesen, in welchem das Bittersalz leicht und der Gyps nur schwer löslich sei. Alsdem mußte eine Bittersalzlösung den kohlensauren Kalk aus dem Doppelsalz des Dolomits, bei gleichzeitiger Bildung von Gyps, umwandeln. Da aber eine Gypslösung, durch pulverisirten Dolomit filtrirt, diesen in reinen kohlensauren Kalk bei gleichzeitiger Ausscheidung von Bittersalz verwandelt, so vermuthete Haidinger, dafs eine erhöhte Temperatur bei zunehmender Erdtiefe und entsprechendem vergrößertem Druck die Verhältnisse umkehre, und da schon in der Kälte und unter dem gewöhnlichen Luftdruck eine Gypslösung den Dolomit zu Kalkstein und Bittersalz umwandle (wie Haidinger das Ausblühen von Bittersalz aus den Felsen in der Nähe eines Gypsbruches beobachtete), bei erhöhter Temperatur und unter einem größeren Druck die chemische Reaction gerade die umgekehrte

(1) Haidinger. Berichte (vergl. S. 1147) II, 398. 461 u. IV, 1. Pogg. Ann. LXXIV, 591; Jahrb. Miner. 1847, 862 u. 1848, 489.

kehrte wäre, so daß also das Bittersalz den Kalkspath zu Dolomit und Gyps umwandeln würde. Haidinger schätzte die erforderliche Erdwärme auf höchstens 200°, was einem Druck von 15 Atmosphären entspricht. Morlot zeigte nun durch den Versuch, daß ein Gemenge von krystallisiertem Bittersalz und gepulvertem Kalkspath in den Gewichtsverhältnissen von 1 zu 2 Atomen in einer zugeschlossenen Glasröhre eingeschlossen, bei der genannten Temperatur und Druck sich so vollständig zu dem Doppelsalz von kohlensaurem Kalk und kohlensaurer Magnesia und zu schwefelsaurem Kalk zersetzte, daß keine Spur von Bittersalz übrig blieb.

Dolomit und
Dolomitbil-
dung.

Elie de Beaumont (1) hatte berechnet, daß, wenn in einem gemessenen Raume ein Doppelatom Kalkstein durch ein Atom Dolomit ersetzt wird, wegen des größeren specifischen Gewichtes des Ganzen bei einem niedrigeren Atomgewicht der Magnesia eine Anzahl von Drusenräumen = 12 pC. des ganzen Volums übrig bleiben muß. Morlot fand nun durch unmittelbare Untersuchung eines Dolomits vom Prediel 12,9 pC., ganz nahe übereinstimmend mit der Theorie.

Dana (2) machte zu dieser Dolomitlehre die Bemerkung, daß viele dichte Kalksteine von Amerika 30 bis 40 pC. kohlensaure Magnesia enthalten, und daß diese Gesteine kein Zeichen der Wirkung von Hitze darbieten. Eine Analyse frischer Korallen von Silliman d. j. ergab weniger als 1 pC. Magnesia. Aber in einem dichten Korallenkalk fand er 38,07 pC. kohlensaurer Magnesia; dieser hatte durchaus keine Hitze erlitten. Ein anderes, aus Trümmern von Korallen bestehendes Gestein gab 5,29. Dieses zeigt, daß es Umstände giebt, unter welchen das Magnesiakalk des Oceans und der kohlensaure Kalk der Korallen auf einander wirken, und einen Magnesiakalk bei

(1) Compt. rend. XXVI, 311; Sill. Am. J. [2] VI, 268; Bull. géolog. [2] V, 243; Arch. ph. nat. VII, 324; siehe auch Bull. géolog. 1837, 174. — (2) Sill. Am. J. [2] VI, 268.

Dolomit und
Dolomitbil-
dung.

der gewöhnlichen tropischen Temperatur des Wassers produciren können. Diese Thätigkeit kann das Festwerden zum Fels begünstigen, welche unter dem Seewasser im Fortschritt ist (1).

Frapolli (2) hat der Berliner Academie Untersuchungen über das geologische Vorkommen der Gypse, der Dolomite und des Steinsalzes in den Umgebungen des Harzes vorgetragen, und dabei höchst unwahrscheinliche Ideen über deren Bildung mitgetheilt, weshalb wir sie hier übergehen.

Sandberger (3) spricht sich nach seinen Untersuchungen der Dolomite in Nassau für die schon von Grandjean (4) aufgestellte Ansicht aus, daß die Dolomite allmählig aus einem magnesiareichen schwarzen Kalke entstehen, indem sie durch kohlensäurehaltige Wasser zersetzt werden, wobei die Resultate der Zersetzung zweifach-kohlensaurer Kalk, welcher weggeführt wird und sich in Klüften des Gesteins als Kalksinter oder Kalkspath wieder absetzt, und Dolomite sind. Die Metalloxyde, gleichfalls in dem ursprünglichen Gestein oft in bedeutender Menge enthalten, werden niedergeschlagen, und so erklärt sich ihr constantes Vorkommen mit dem Dolomit. Doch will er diese Meinung vor genauer Prüfung nicht auf alle Dolomite übertragen.

(Alles, namentlich die Umwandlung des Kalksteins in Dolomit nur in den oberen Teufen und in der Nähe von Spalten, spricht für eine solche einfache Pseudomorphosen-

(1) Ein Süßwasserkalk aus der Braunkohlenformation bei dem Dorfe Rödgen in der Nähe von Gießen hat einen sehr großen Gehalt an Magnesia. Zwei Analysen ergaben nach Knapp :

	CaO, CO ₂	MgO, CO ₂	Fe ₂ O ₃	Unlös.
1)	42,80	49,63	1,65	1,42
2)	46,42	38,03	1,39	11,21

(2) Pogg. Ann. LXIX, 481; Bull. soc. géolog. [2] IV, 832; Jahrb. Miner. 1847, 609; 1848, 629. — (3) Uebersicht der geol. Verhältnisse des Herzogth. Nassau, Wiesbaden 1847. — (4) Ueber Dolomite im Lahnthal, Jahrb. Miner. 1844, 543.

bildung desselben aus magnesiahaltigem Kalk. Ist doch jeder Kalkstein durch eine solche innere Umbildung hindurchgegangen. Es ist auch zu bemerken, daß kohlen-saurer Kalk und kohlen-saure Magnesia für sich viel leichter auflösbar sind, als die durch ihr Zusammentreten gebildete Doppelverbindung, der Dolomit.)

Dolomit und
Dolomitbil-
dung.

Nauck (1), in einer Untersuchung über die bekannten Specksteine von Göpfersgrün, hält dieselben, so wie die daselbst auftretenden Dolomite für auf nassem Wege gebildete Pseudomorphosen. Kohlensäurehaltiges Wasser zersetzte die vorhandenen Silicate, und setzte die gelösten Substanzen, unter denen namentlich Magnesia und Kieselsäure in Betracht kommen, an anderen Orten wieder ab. Enthielt das Wasser kohlen-saure Magnesia, so verwandelte es den dort auftretenden (sogenannten) Urkalk in Dolomit; enthielt es Kieselsäure, so bildeten sich in den vorhandenen Klüften und Spalten Quarzkrystalle; enthielt es kiesel-saure Magnesia, so wurden die vorgefundenen Gesteine zu Speckstein verwandelt. Hierbei wird eine Veränderung des mineralischen Gehalts der Gewässer angenommen. Man kann aber auch annehmen, daß das atmosphärische Wasser kiesel-saure Magnesia auflöst, hierauf ein Kalklager durchdringt, den kohlen-sauren Kalk auflöst, wobei nun die Neigung der Magnesia zu Doppelverbindungen bewirkt, daß sie ihre Verbindung mit der Kieselsäure aufgibt, sich mit der im Wasser vorhandenen Kohlensäure verbindet und mit dem gelösten kohlen-sauren Kalk die Doppelverbindung des Dolomits bildet. Die frei gewordene Kieselsäure setzte sich in den Drusenräumen des Dolomits als Quarz oder Opal ab. So lange die Lösung der kiesel-sauren Magnesia kohlen-saure Kalkerde findet, so lange wird die Dolomit- und die Quarzbildung dauern. Ist dies aber nicht mehr der Fall, so setzt das Wasser seinen Gehalt an kiesel-saurer Magnesia als Speckstein ab, und verwandelt endlich Dolomite und Quarzkrystalle ebenfalls in Speckstein.

(1) Pogg. Ann. LXXV, 129.

Muschelkalk.

Schnabel (1) analysirte den Muschelkalk aus Sa
brücken. Er bestand aus :

CaO	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	HO	CO ₂	Org. Subst.	Ver
53,09	0,46	2,62	0,44	0,86	0,32	41,93	Spur	0.

Marchand (2) untersuchte das Gestein des Oelber
bei Jerusalem, einen gelblichweissen, sehr bröcklichen, a
porösen Kalkstein. Er bestand aus : hygroskopisc
Feuchtigkeit 0,319, gebundenem Wasser 0,488, Chlor
cium 0,400, kiesel-sauren Salzen 0,075, kohlensaurer Ki
erde 98,718, Eisen, Magnesia, Thonerde in Spuren.

Steinsalz,
Gyps,
Anhydrit.

Karsten (3) hält Steinsalz und Anhydrit für aus d
Erdinnern hervorgedrungene, obgleich später noch um
bildete Massen, Gyps aber als entstanden aus einer s
teren Umänderung des Anhydrits entweder noch auf
ursprünglichen Lagerstätte, oder nachdem er dieser sel
entrückt gewesen. Der Dolomit ist ihm »ein durch Cäm
tation mit (Magnesium-) Dämpfen veränderter« Kalkst
irgend einer Bildungsperiode. Jede andere Bildung
nassem Wege oder aus einem feurigflüssigen Zustand
Kalksteinmasse ist nach ihm unmöglich.

Pseudomor-
phosen nach
Steinsalz.

Haidinger (4) hat die Pseudomorphosen nach Ste
salzwürfeln, von Quarz, Dolomit, Gyps, dichtem Kalkst
u. s. w. aus den meisten geologischen Formationen ausfü
lich behandelt, und eine Erklärung der in Würfeln krysta
sirten Sandsteine von Stuttgart gegeben, die mit der v
Nöggerath übereinstimmt. Gutberlet (5) hat diesel
aus den bunten Mergeln und Sandsteinen der Gegend v
Fulda, und Hausmann (6) das Vorkommen dersell
im Muschelkalk von Hehlen beschrieben.

(1) Verhandlungen des naturhist. Vereins der preuss. Rheinl. 18
150. — (2) J. pr. Chem. XL, 192; Jahrb. Miner. 1846, 706.
(3) Karsten's Archiv 1848, 545; Berl. Acad. Ber. 1848, 129; Ja
Miner. 1848, 596; Instit. 1848, 367. — (4) Haidinger's Abhandl. (v
S. 1147) I, 65; Haid. Berichte II, 13. 61; Pogg. Ann. LXXI, 247.
(5) Jahrb. Miner. 1847, 405. 513. — (6) Archiv für Miner. u. Ge
XXI, 494.

Borazit als Gebirgsart fand Karsten (1) bei einer Bohrarbeit auf Steinsalz bei Staffsurth in einer Teufe von 797' 5'' im bunten Sandstein. Wir verweisen auf den mineralogischen Theil (S. 1226), und bemerken hier nur, daß diese Entdeckung zur Erklärung der Boraxsäure-Exhalationen in Toscana und der Boraxseen in Tibet von großem Interesse ist.

Göppert (2) hat zunächst durch Untersuchungen Steinkohlen-
von Kohle aus den Binnenmulden Deutschlands bewiesen, bildung.
daß die Steinkohle sich auf ähnliche Weise wie der Torf der Jetztzeit, auf nassem Wege gebildet habe und zwar aus denselben, an Ort und Stelle gewachsenen Pflanzen, die wir auch in den die Kohlenflötze begleitenden Schieferthonen u. s. w. antreffen, da man fast in jeder Kohle die einzelnen Pflanzen oder ihre feinere Structur noch sehr wohl unterscheiden kann. Die Stämme sind dann meist breitgequetscht, gewöhnlich ohne Parenchym; doch ist dieses auch zuweilen in Kohle verwandelt, so daß man unter dem Mikroskop durch bloßes Zerreiben der Masse die Parenchymzellen noch erkennen kann. Ueber die Entstehung der sogenannten mineralischen Holzkohle oder der Faserkohle.
Faserkohle hat Göppert die eigenthümliche Ansicht, daß es Coniferenholz sei, das in seiner Structur den Araucarien der Jetztzeit entspricht, indem man ganze plattgedrückte Stämme in Faserkohle verwandelt antrifft. Die weicheres Parenchym enthaltenden Sigillarien, Stigmarien,

(1) Berl. Acad. Ber. 1847, 14; J. pr. Chem. XLII, 310; Arch. ph. nat. VI, 66; Pogg. Ann. LXX, 557; Jahrb. Miner. 1848, 336; Jameson's Edinb. Journ. XLV, 180; Sill. Am. J. [2] IV, 415. —
(2) Pogg. Ann. LXXII, 174; Naturkund. Verhandl. van de Holl. Maatsch. der Wetensch. te Haarlem, 1848; Abhandlung als Antwort auf die Preisfrage - - - von Göppert. Gekrönte Preisschrift. Leiden und Düsseldorf 1848; Jahrb. Miner. 1847, 109 u. 1848, 726; aus Verhandl. der schles. Gesellsch. für vaterl. Cultur, im J. pr. Chem. XLII, 56; Arch. ph. nat. VII, 320; Instit. 1848, 74; Brit. Associat. Reports, Oxford 1847; Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) III, 116.

Faserkohle. Lycopodiaceen begannen sich aufzulösen und zu zerfallen während die härteren und nicht in gleichem Grade in Zersetzung vorgeschrittenen Araucarien in einzelnen Stücken mit zur Masse gezogen wurden oder oben schwammen, bis diesem Zersetzungsprocess durch deckung ein Ende gemacht wurde. In der Faserkohle man ohne Schwierigkeit die Holzstructur, parenchyma Holzzellen und Markstrahlen schon mit der Loupe erkennen können. (Jedenfalls ist es nach dieser Ansicht für die Entstehung der Faserkohlen auffallend, daß gerade in ihnen die Zersetzung am allerweitesten fortgeschritten ist, da wenigstens englische Faserkohle aus St. Helen Platiniegel bei gewöhnlichem Feuer nicht zu verbrennen ist. Auch findet sie sich dort so regelmäßig und gleichförmig zwischen den Schichten und in den Klüften, daß die gleichförmige Ablagerung von Stückchen von Coniferen über einem werdenden Kohlenflötz nur schwer zu begreifen ist.) Göppert stellte auch einen Versuch an, um die natürliche Bildungsweise der Kohle nachzuweisen. Er liefs nämlich Vegetabilien längere Zeit unter Zutritt von Luft in Wasser liegen, dessen Temperatur am Tage 100° und des Nachts etwa 62° bis 75° betrug, und erhielt bei manchen Pflanzen schon nach einem Jahre, bei andern erst in 2 Jahren, ein Product, welches in seiner äußeren Beschaffenheit von Braunkohle nicht mehr zu unterscheiden und als Steinkohlen erhielt er aber erst durch einen Zusatz etwas Eisenvitriol (¼ Drachme auf 6 Unzen Pflanzen). Göppert glaubt zwar nicht, daß die natürliche Bildung der Steinkohle in einer so hohen Temperatur vor sich gegangen sei, aber die Zeit habe bei dieser dasselbe bewirkt, im Experiment sei es blofs auf Beschleunigung abgesehen. Göppert meint auch, daß die Bildung fossiler Harze, z. B. des Bernsteins, durch seine Methode anschaulich gemacht werden könne. Venetianischer Terpentin Zweigen von *Pinus larix* veränderte unter diesen Um-

den seinen specifischen Geruch, und hatte nach Jahresfrist schon fast die Fähigkeit verloren, sich in Weingeist aufzulösen. Faserkohle.

Lyell hat fast zu gleicher Zeit dieselbe Ansicht über Steinkohlenbildung ausgesprochen (1). Ebenso Lesquereux (2).

Binney (3) glaubt ebenfalls, daß die Kohlenpflanzen an Ort und Stelle gewachsen und zwar in Salzmarschen, wegen der Anwesenheit von Nautilus, Goniatiten u. s. w., obgleich man auch Cypris und Unio findet.

Nöggerath (4) machte der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn am 6. Mai 1847 eine Mittheilung über die Braunkohlen auf der Hardt bei Pütschen, welche zu einem Drittheil der ganzen Förderung ihre ursprüngliche Natur eines gewöhnlichen bituminösen Holzes beim Austrocknen in die allerschönste Pechkohle mit vollkommen muscheligen Bruche und dem charakteristischen Fettglanz verwandeln, während an andern Orten, z. B. am Meißner, die Pechkohle völlig ausgebildet in der Erde lagert. Bischof stellte Versuche über die Ursache dieser Umwandlung an, indem er Stücke der Kohle in der Grube in Flaschen einschloß, und diese unter der Luftpumpe mittelst Schwefelsäure trocknete. Diese verwandelte sich schon nach einigen Tagen wirklich in Pechkohle. Als Stücke jener in der Grube gesammelten Braunkohle 8 Tage in einer verkorkten Bouteille liegen geblieben, hatte sie 11 pC. Sauerstoff der eingeschlossenen Luft absorbirt, ohne Kohlensäure gebildet zu haben. Die Kohlen hatten sich nicht im mindesten verändert. Die Umwandlung in Pechkohle hängt also wesentlich von der Austrocknung ab, es mag aber auch Sauerstoffabsorption eine Pechkohle.

(1) Sill. Am. J. [2] III, 89. — (2) Quelques recherches sur les marais tourbeux en général, Neufchatel 1844; Mém. Soc. Scienc. nat. Neufchatel, III; Arch. ph. nat. VI, 154, 158. — (3) Phil. Mag. [3] XXXI, 259; Manchester Literary and Philosoph. Society's Memoirs, VII; Arch. ph. nat. VI, 242. — (4) Jahrb. Miner. 1848, 608.

Mitursache sein, da die in einem warmen Zimmer trocknete Kohle vollständiger umgewandelt war, als Stücke unter der Luftpumpe. Die natürlichen Pechkugeln, welche vorkommen, scheinen Umstände von Austrocknen in den Flötzen, Zerklüftung durch Basalt, Verwitterung der Flötze und Zutritt der Luft, auch die Hitze des salzes vorzusetzen. Die Absorption des Sauerstoffs klärt auch die Stickwetter in Braunkohlengruben.

Imatrasteine. Parrot (1) hatte den bekannten concretionären Fels im Schuttgebirge Finnlands, den Imatrasteinen, einen vulkanischen Ursprung zugeschrieben, und sie für versteinte Weichthiere gehalten, wobei er sich auch darauf stützte, daß er in ihnen Kalk und Schwefel gefunden haben würde und sie in einem Gesteine vorkommen sollen, das die Spur dieser Elemente enthielt. Virlet (2) dagegen hielt sie für bloße Kalkthonknauern, in Folge von Molecularattraction entstanden. Bei Analysen von Imatrasteinen durch Salvétat vornehmen liefs, fand dieser Thonigen, mit dem Kalk gemischten Sand sehr verändert in seiner Zusammensetzung, aber er enthielt *nicht* Schwefel. Die Analyse ergab: Kohlensäure 21,03, Kalkerde 2,51, Kieselerde 34,06, Thonerde 9,00, Eisenoxyd 4,00, Manganoxyd 2,00, Alkali 0,49, Titan und Magnesia in Spuren, Verlust 0,14.

Koprolithen. Dana (3) zerlegte die Koprolithen aus dem Sandstein der Flufsthaler des Connecticut. Es kommen diese Koprolithen mit den bekannten Fußspuren vor. Sie enthalten: basischen phosphors. Kalk und Magnesia 39,60, kohlens. Kalk 3,00, harns. Ammoniak und Kalk 3,00, Chlorhydrat 0,50, schwefels. Kalk und Magnesia 1,75, organische Stoffe und Wasser 7,30, Sandsteintheile 13,09.

Meteorsteine. Rammelsberg (4) hat den Meteorstein von Juva

(1) Petersb. Acad. Bull. 1839, VI, 183; Jahrb. Miner. 1840, Bronn's Geschichte der Natur, I, 285. — (2) Bullet. géolog. II, 2 IV, 22. — (3) Jahrb. Miner. 1847, 729. — (4) Pogg. Ann. LX 585; Pharm. Centr. 1848, 289.

von Neuem untersucht, welcher durch die mineralogische Untersuchung von G. Rose so bekannt geworden ist, und als dessen Bestandtheile derselbe Augit, Labrador und Magnetkies angegeben hatte. Shepard (1) hatte behauptet, daß der feldspathartige Gemengtheil desselben Anorthit sei, und dieser Meinung schließt sich nun auch Rammelsberg an. Die Analyse des Steins ergab: 36,77 durch Säuren zersetzbares (A) und 63,23 durch Säuren nicht zersetzbares (B) von der Zusammensetzung:

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	NaO	KO	PO ₅	FeS	FeO	TiO ₂	FeO, Cr ₂ O ₃
A	44,38	33,73	3,29	18,07	0,36	1,08	0,33	0,54	0,71	—	—	—
B	52,07	0,24	—	5,68	9,98	0,41	—	—	—	80,81	0,16	2,13

Der Meteorstein von Juvenas besteht folglich aus Anorthit (etwa 36 pC.), Augit (etwa 60 pC.), Chromeisen (1,5 pC.), Magnetkies (1 pC.) und vielleicht kleinen Mengen von Apatit und Titanit.

Borissiak (2) in Charkow giebt Nachricht von einem Meteorsteinfall, der sich am 30. Oct. (alten Stils?) 1843 dreißig Werste südwestlich von Werchne Tschirskaja Stanitza am Don zugetragen. Der Stein hat die Gestalt einer dreiseitigen Pyramide mit einer concaven, einer convexen und einer ebenen Fläche, wiegt 8 Kilog. 30 Grm. und besitzt ein spec. Gewicht = 3,58. Mit dem Magnet können 30 pC. metallische Theile herausgezogen werden. Eine etwa 0,2 Lin. dicke Kruste, die den Stein allseitig bis auf die vier Ecken umgiebt, ist schwarz, matt, hart (das Glas ritzend), spröde und an einigen Stellen mit Eisenthellchen durchsetzt. Die innere Masse hat ein grobes erdiges Gefüge, eine hellgraue Farbe und matten Bruch, mehr Glas Härte und ist von feinen Adern durchsetzt, deren einige mit einer schwärzlichen Masse gefüllt sind. Vor dem Löthrohr schmilzt sie nicht, verändert aber ihre Farbe und wird magnetisch. Mit Borax giebt sie eine glasige Schlacke,

(1) Sill. Am. J. [2] II, 377. — (2) Petersb. Acad. Bull. V, 196; Pogg. Ann. Ergänzungs. II, 366.

die beim Erkalten schwarz wird. Sie löst sich nur Theil in Säuren, in Salzsäure besser als in Schwefelsäure und haucht mit ersterer einen Schwefelwasserstoffgeruch aus. In der dem Trachyt ähnlichen Masse ließen sich erkennen: Metallisches Eisen, Schwefeleisen, kleine, wahrnehmbare, unregelmäßige weiße Körner, ähnlich Orthoklas, und glänzende, schwärzliche Kügelchen Stecknadelgröße, die vom Magnet ausgezogen wurde.

Meteoriten
von Braunau.

Der Meteoritenfall von Braunau in Böhmen gehört zu den merkwürdigsten bis jetzt beobachteten. Ueber Historische des Falls und die naturhistorische Beschaffenheit der Massen haben Humboldt (1), Göppert, Boguslawski (2), Weiss (3) und Beinert (4), der letztere am Ausführlichsten und in einer besonderen Schrift berichtet. Nach demselben fielen bei Braunau am 14. Juli Morgens 3½ Uhr, zwei Massen, von denen die eine 42 6 Loth wog und noch 6 Stunden nach dem Fall so heiß war, daß man sie nicht anfassen konnte. Diese letztere war ein unregelmäßiges verschobenes Viereck, mit Concavität besetzt, deren Einfassung ziemlich deutliche sechs- oder mehr oder weniger ins Längliche gezogene Zellen bildete. Aeußerlich ist die Masse eisengrau, in den Zellen ist gelbbrauner Ueberzug, auf welchem glimmerartige, metallisch glänzende Blättchen sitzen. Auf dem Bruche ist deutlich krystallinisch blätterig, und von einem Metallglanz, der zwischen Blei und Zink steht. Das spec. Gew. ist 7,7142. Ihre Härte ist sehr groß. — Eine zweite Masse schlug durch das Dach eines Hauses. Ihr Gewicht 30 Pfd. 16 Loth und sie ist bloß in der äußeren Form, die mit einer colossalen Austerschale einige Aehnlichkeit hat, von der vorigen verschieden. Die sechseckigen

(1) Compt. rend. XXV, 627. — (2) J. pr. Chem. XLII, 59 Schles. Ztg. 1847, 24. Nov.; Haidinger's Berichte (vergl. S. 114 493. — (3) Berl. Acad. Ber. 1847, 391. — (4) Pogg. Ann. L 170. — (5) Der Meteorit von Braunau, Breslau 1848.

cavitäten sind bei diesem Stück weit deutlicher, tiefer und mit mehr röthlichbraunem Oxyd belegt. Meteoreisen
von Braunau.

Glocker (1), Neumann (2) und Haidinger (3) haben Beobachtungen über die krystallinische Structur dieses Eisens und des Meteoreisens im Allgemeinen angestellt. Glocker hält es für wahrscheinlich, daß Anhäufungen unvollkommen ausgebildeter oder dicht gedrängter Octaëder die Ursache der Widmanstätten'schen Figuren beim Meteoreisen sind, obgleich eine octaëdrische Structur des Eisens durch directe Beobachtungen nicht zu erweisen sei (4). Dagegen zeige künstlich dargestelltes Eisen eine blätterige Structur parallel den Flächen des Würfels, und auch das Meteoreisen von Braunau und Seeläsgen habe eine derartige Structur, die beim Zerreißen hervortritt. Beide erscheinen im Bruche krystallinisch-blätterig, von drei vollkommen gleichen, einander rechtwinklig schneidenden Structurflächen, zeigen aber beim gewaltsamen Zerreißen einen sehr scharfen, hakigen Bruch. Das Eisen von Seeläsgen zeigt diese Structur noch viel deutlicher, so daß die Kanten und Ecken selbst schärfer als beim großblätterigen Bleiglanz sind. Von eigentlicher Spaltbarkeit, wie bei andern Mineralien, könne indessen keine Rede sein, da es sich nicht mit dem Hammer zersprengen lasse und nur beim Zerbrechen der hakige Bruch oder die erwähnten krystallinischen Structurstücke zum Vorschein kommen, die sich aber nicht weiter nach den krystallinischen Flächen theilen lassen. Der Name spaltbar sei eigentlich unpassend; die Spaltbarkeit sei etwas bloß äußerliches, und könne mit der krystallinischen Structur verbunden sein oder nicht, setze aber immer die letztere voraus.

(1) Pogg. Ann. LXXIII, 332; Pharm. Centr. 1848, 196. — (2) Oestr. Blätter für Lit. u. Kunst 1848, 26; Jahrb. Miner. 1848, 825; Haiding. Berichte (vergl. S. 1147) IV, 86. — (3) Haiding. Berichte III, 302. 378; Pogg. Ann. LXXII, 582. — (4) Haiding. Berichte III, 303; doch ist hier zu bemerken, daß das Arvaer Eisen im Cabinet von Wien als aus octaëdrischen und tetraëdrischen Fragmenten bestehend angegeben wird.

Meteoriten
von Braunau.

Haidinger fand das Wiener Stück des Braunauer Eisens sehr vollkommen theilbar (abgesehen von der Zähigkeit des Eisens, fast so leicht wie Bleiglanz), und die Theilflächen parallel den drei Richtungen des Würfels. Derselbe Beobachter fand schöne Widmanstätten'sche Figuren und zwar nur ein System solcher Figuren, so daß das ganze Stück Eisen nur aus einem einzigen Krystallindividuum zu bestehen scheint, woraus er auch auf einen sehr langen Bildungsproceß schließt.

Neumann fand unter den Krystallflächen, welche durch die Theilbarkeit dieses Eisens entstehen, nur solche, die Hexaëdern angehören, und zwar so gestellt, daß ausgezeichneten Theilungsrichtungen einem Hexaëder, andern minder vollkommenen Flächen solchen Hexaëdern angehören, welche gegen das erste in einer von den möglichen Zwillingstellungen sich befinden. Um die durch Aetzung hervortretenden Linien zu bestimmen, wurden zwei Schnittflächen angebracht, welche in Bezug auf die durch Theilbarkeit entstandenen Hexaëder einer Hexaëder- und einer Octaëderfläche entsprechend lagen. Die hexaëdrische Schnittfläche zeigt Linien in sechs Richtungen, octaëdrische Schnittfläche in neun Richtungen, welche nicht gleichmäßig auf allen Theilen der Flächen verbreitet sind. Diese Linien entsprechen vollkommen den Durchschnittslinien der hexaëdrischen Schnittfläche mit den Seiten der vier Hexaëder, welche mit dem der Schnittfläche entsprechenden Hexaëder in Zwillingstellungen verbunden sein können, und diesen Durchschnittslinien entspricht, wird durch die Aetzung die Linienzeichnung auf Meteorisen hervorgebracht. Die Flächen des Hexaëders, nach welchen die Theilbarkeit am Ausgezeichnetsten stattfindet, werden durch Aetzungslinien nicht angezeigt. Die krystallinische Structur ist von der Art, daß die Masse aus dünnen Schichten zusammengesetzt ist, die Flächen eines Hexaëderzwillings parallel liegen, und

leichter und schwerer auflöslichen Schichten durchschneiden sich in jenen Richtungen, die den Flächen von sechs andern Hexaëdern entsprechen, deren je drei mit einem der Hexaëder des ersten Zwillings zu einem Zwillinge verbunden sein können. Den Durchschnittslinien entsprechend ist eine leichter auflösliche Eisenverbindung, wahrscheinlich Schreibersit, abgelagert, durch deren Wegschaffung mittelst Aetzung die Linienzeichnung auf dem Meteor Eisen entsteht. Auch durch die Verschiedenheit des Glanzes auf den geätzten Flächen ist die Verschiedenheit der Schichten erkennbar.

Meteorstein
von Brannau.

Analysen dieses Ärolithen haben N. W. Fischer und Duflos (1) und der erstere allein (2) geliefert. Das Ergebniss dieser Untersuchungen ist, dass der Meteorit drei verschiedene Körper enthält.

1) Vorwaltend, etwa zu 95 bis 98 pC., besteht die Masse aus Eisen 91,882, Nickel 5,517, Kobalt 0,529, Kupfer, Mangan, Arsen, Calcium, Magnesium, Silicium, Kohlenstoff, Chlor, Schwefel 2,072.

2) Der an vielen Stellen in grösseren und kleineren Stücken eingewachsene und mechanisch trennbare Körper ist eine chemische Verbindung von Einfach-Schwefeleisen und Nickel, die sich in Salzsäure bis auf einen kleinen Rückstand von ungefähr 1 pC. löst, welcher Chrom, Kohlenstoff und Kieselerde enthält.

3) Der dritte Körper, der bei der Auflösung in Salzsäure übrig bleibt, besteht aus kleinen, dünnen, grauweissen, sehr glänzenden und spröden Blättchen, die stark magnatisch sind und von denen einige deutlich die Form einer länglichen rechtwinkligen Tafel zeigen, ausserdem aus grauweissem, glänzendem Pulver von gleicher Natur. Er enthält : Eisen 56,480, Nickel 25,015, Phosphor 11,722,

(1) Pogg. Ann. LXXII, 475; Jahrb. Minér. 1847, 853; Compt. rend. XXV, 627; Sill. Am. J. [2] V, 338; VII, 171. — (2) Pogg. Ann. LXXII, 575; LXXIII, 590; Pharm. Centr. 1848, 289; Jahrb. Minér. 1848, 320.

Meteoriten
von Braunau,

Chrom 2,850, Kohlenstoff 1,156, Kieselsäure 0,986 kommt mit dem sogenannten Schreibersit überein. Fischer ist dieser Körper der Grund der Widmanstschens Figuren, wie schon Berzelius bemerkt hat.

Diese drei Körper sind mehr oder weniger vollkommen krystallisirt; alle drei sind magnetisch, die Hauptmasse die Blättchen nur retrahatorisch, die letzteren in höherem Grade als das Eisen, das Schwefeleisen hingegen zu attrahatorisch.

Die Gegenwart von Brom, die Humboldt in seiner Mittheilung an die Pariser Academie nach der Angabe von Fischer in dem Braunauer Meteorit anführte, hat also bei näherer Untersuchung nicht bestätigt.

Außer dem Braunauer Meteoreisen giebt es nur noch zwei, deren Fall wirklich beobachtet wurde.

von Seeläsgen

Ueber das Meteoreisen von Seeläsgen (im Schwiebus, Frankfurter Regierungsbezirk), das im December 1847 sieben Ellen unter dem Boden gefunden wurde, haben Göppert, Glocker (1), Partsch (2), W. G. Schneider (3) berichtet; Duflos (4) und Schmelsberg (5) haben es analysirt. Die Masse ist von Schneider 218 Pfund schwer, und hat äußerlich Aehnlichkeit mit dem Braunauer Meteoreisen. Schneider ist sie mit einer stellenweise papierdünne Rinde von sehr braunem Eisenoxyd überzogen. Ihre Gestalt ist eine regelmäßige, aus dem kugelförmigen ins eiförmige gehende, mit stumpfer Spitze und breiter Basis. Die Höhe der Masse ist 1' 2 1/2" (Par.) der kleinere Durchmesser der Basis 10" 8''' der größere 1' 1/4'', der größte U

(1) Bresl. Ztg. 1847, 8. 9. Dec.; Haiding. Berichte (vergl. I, 471; Pogg. Ann. LXXIII, 329; J. pr. Chem. XLII, 431; Centr. 1848, 143. — (2) Wien. Acad. Ber. I, 153. — (3) Pogg. Ann. LXXIV, 57. — (4) Pogg. Ann. LXXIV, 61; Jahrb. Min. 1848, Pharm. Centr. 1848, 428; Ann. Ch. Pharm. LXVI, 260. — (5) Ann. LXXIV, 443.

der Masse 3' 3" 10". Auf ihrer Oberfläche wechseln flache und tiefe Gruben und zuweilen sehr stark hervortretende Buckeln. Das Innere ist dichtes gediegenes Eisen von licht stahlgrauer Farbe mit gelblichem Schimmer, das von feinen zickzackförmigen Sprüngen durchzogen und sehr weich ist. Schwefelkies ist in großer Menge und in mannichfaltiger Weise in der Eisenmasse eingesprengt, bald in kleinen Parthieen hier und da zerstreut, bald als isolirte Kerne von sehr verschiedener Gröfse, von 1 bis 2½" Durchmesser, oder lang cylindrisch von 4 bis 6½ bis 8" Durchmesser und von 1 bis 3½" Länge. Salzsäure wirkt nur bei langer Erhitzung darauf. Der Bruch ist feinkörnig, auf den Structurflächen ausgezeichnet grofsblättrig und von fast zinnweifser Farbe, mit ausgezeichnet rechtwinkligen Krystallisationsflächen; sonst aber bricht es schlackenartig und zackig. Beim Aetzen zeigen sich keine Widmanstätten'sche Figuren, was auch Partsch bestätigt, sondern nur körnige Hervorragungen, welche von einzelnen sehr kurzen, feinen, meist nach derselben Richtung gehenden Linien unterbrochen werden. Das spec. Gew. bei 16° ist nach Partsch 7,59, nach Duflos 7,63 bis 7,71, nach Rammelsberg 7,7345. Die Härte nach Partsch = 4,0. Die Analyse von Duflos bezieht sich nur auf die Hauptmasse, und entscheidet nichts über die Natur des beigemengten Schwefeleisens und des beim Auflösen in Salzsäure bleibenden Rückstandes. Er fand darin: Eisen 90,000, Nickel 5,308, Kobalt 0,434, Mangan 0,912, Kupfer 0,104, Silicium 1,157, Rückstand 0,834. Nach ihm besteht der eingewachsene Körper meist aus Schwefeleisen, hinterläfst aber mit Salzsäure behandelt metallisch glänzende Blättchen von Graphit, und einen braunen, stark abfärbenden Rückstand, der auf Silicium und Chrom deutet.

Rammelsberg fand, dafs nach der Auflösung in Salzsäure ein Rückstand bleibt, in welchem man drei verschiedene Substanzen unterscheiden kann: 1) eine leichte pulverige Kohle; 2) Graphitblättchen; 3) ein schweres

Meteorstein
von
Schlaggen.

Meteoriten von Scelfagen. metallisches, fast silberweißes Pulver, in welchem mit der Loupe viele nadelförmige Krystalle entdeckt.

Die Analyse ergab :

Fe	Mn	Ni	Co	Sn	Cu	Si	C	Unl
92,327		6,228	0,667	0,049		0,026	0,520	0,1

Das körnige Schwefeleisen, das in der Substanz st und ein spec. Gew. von 4,787 hat (was vielleicht w beigemengten Eisentheilen zu hoch ist), heist mit recht Schwefelkies, da es sich in Salzsäure löst. Es steht aus :

S	Fe	Ni	Co	Co	Cu	FeO	Cr
28,155	65,816	1,871		1,871	0,566	0,874	1,1

Rammelsberg glaubt, daß der Nickelgehalt beigemischtem Nickeleisen herrührt. Dieses Schwefel hat (nachdem die zur Bildung von Cu_2S nöthige M Schwefel in Abzug gebracht ist) die Zusammensetzung Eisensulfurets, und nicht des Magnetkieses.

Der Rückstand, der beim Auflösen in Salzsäure u löst bleibt, erscheint als ein Gemenge von weißer selsäure (die vielleicht vom Glase herrührt), von sehr lockern leichten Kohle, glänzenden Graphitblätt und hauptsächlich metallischen Theilen, die unter Mikroskop theils als weiße glänzende Stückchen ersche die vielleicht Reste von der Hauptmasse des Eisens welche die Säure nicht aufgelöst hatte. Nach Entfer der Kohle und Kieselsäure durch Abschlemmen gaben Analysen folgende Resultate :

	S	P	Fe	Ni	Cu	Sn
1)	— *)	6,13	50,23	26,78	0,78	0,20
2)	0,26	7,93	61,13	28,90	*)	

*) nicht bestimmt.

Dieser Körper, der schon von Berzelius in Massen von Bohumilitz, Sibirien und Elbogen, in den Texas und Lockport von Silliman und Hunt unters wurde, läßt sich bis jetzt — wahrscheinlich wegen s gemengten Beschaffenheit — nicht auf eine bestin

Formel zurückführen. Shepard hat ihn mit dem Namen Dysilit bezeichnet, während er Schreibersit kleine gestreifte Prismen im Meteoreisen von Bishopville nennt, von denen er vermuthet, daß sie Schwefelchrom seien.

Die Menge des Kohlenstoffs bestimmte Rammelsberg auf 0,52 pC.

Patera und Löwe (1) haben das Meteoreisen von Arva untersucht. Der erstere fand das spec. Gew. 7,814.

Meteoreisen
von Arva.

	Patera :			Löwe :	
Eisen	89,42	93,13	94,12	90,471	91,361
Nickel	8,91	5,94	5,48	7,321	7,328
Kobalt und Kupfer . .	Spur	Spur	Spur	Spur	Spur
Kiesel und kohlehaltiger Rückstand	1,41	—	—	1,404 ^{*)}	0,938
Schwefel	—	—	—	Spuren	—

^{*)} mit metall. Filtrern von gelber Farbe.

Patera (2) fand noch dieselbe metallische Verbindung in lichten stahlgrauen Blättchen und Körnern, welche Berzelius im Meteoreisen von Bohumilitz fand, die letzterer aber nicht besonders benannt hat. Sie sind biegsam und sehr magnetisch, ihre Härte beträgt 6,5, ihr spec. Gew. 7,01 bis 7,22, und sie bestehen im Mittel aus drei Analysen aus: Phosphor 7,26, Eisen 87,20, Nickel 4,24; ferner etwas Kohle, die nicht näher bestimmt wurde. Patera und Haidinger schlagen den Namen *Schreibersit* für diese Substanz vor, den aber Shepard schon einem andern meteorischen Mineral gegeben hat. Haidinger will daher den Schreibersit von Shepard Shepardit nennen, dem Arvaer Mineral dagegen den Namen Schreibersit lassen.

Ueber die in Ungarn gefallenen Meteorsteine verbreitet sich Stedler (3).

(1) Oestr. Blätter für Lit. 1847, No. 169, S. 670; Haiding. Berichte (vergl. S. 1147) III, 62. 70; Jahrb. Miner. 1848, 698; 1849, 199; J. pr. Chem. XLVI, 183. — (2) Oestr. Blätter für Lit. 1847, No. 175, 694; Beschreibung des Fundorts und des Eisens Wien. Ztg. 17. April 1844 u. März 1845. — (3) Oestr. Blätter für Lit. 1847, 343; Jahrb. Miner. 1848, 64; Haiding. Berichte III, 382.

Meteoriten
von
Schönenberg.

Ueber den beobachteten Fall eines Meteorsteins v
14 Pfund 17 Loth Gewicht bei Schönenberg im Mindelth
Kreis Schwaben, Landgerichts Burgau am 25. Decemb
1846 (1), der sich jetzt in München befindet, hat Scha
häutl Mittheilungen gemacht (2).

Amerikanische
Meteoriten.

Shepard (3) berichtet über 23 amerikanische Meteor
steine, als Fortsetzung früherer Mittheilungen (4), von d
nen wir nur die interessanteren und näher beschrieben
anführen. 1) Von Walker County, Alabama (von Troo
schon 1845 beschrieben). Birnförmige Eisenmasse, 165
schwer, die fern von menschlichen Wohnungen, mit de
dickeren Ende in der Erde steckend, gefunden wurde. Sie w
mit einer glatten schwarzen Rinde überzogen, hatte kei
scharfe Hervorragungen oder Eindrücke, zeigte nach dem A
ätzen keine Widmanstätten'sche Figuren, obschon glänzen
Flecken oder eckige Stellen von der Gröfse feinkörnig
Schiefspulvers, gemischt mit glänzenden Linien und Faser
zum Vorschein kommen. Ihr specifisches Gewicht w
7,265, und sie bestand aus 99,89 Eisen, gemischt mit C
cium, Magnesium und Aluminium.

2) Von Scriba (Oswego), Staat New-York. Die Mas
wurde von Herrn Pendergast bei einem Grobschmi
angetroffen, welcher sie von seinem Kohlenlieferant erha
ten hatte, der sie in der Nähe seines Kohlenmeilers g
funden hatte. Sie war der vorigen sehr ähnlich, hatte ei
glatte Oberfläche und schwarze Rinde, und eben solc
Flecken nach dem Anätzen, und dieselbe Zusammensetzun
Die äußere Form, die Flecken, die geflossene Kruste, z
sammengehalten mit den Fundorten, entfernt von mense
lichen Wohnungen, bestimmen Shepard, beide obig
Massen für meteorische zu halten, obgleich ihnen die d
Meteoriten gewöhnlich auszeichnenden Beimischung
fehlen.

(1) Augsb. Allg. Ztg. 1847, 1. Jan.; daraus Pogg. Ann. LXX, 24
— (2) Münchener gelehrte Anz. 1847, XXIV, 553. — (3) Sill. Am.
[2] IV, 74. — (4) Sill. Am. J. [2] II, 392.

3) Von Babb's Mühle, 10 Miles von Greenville, Green County, Tennessee (gleichfalls schon 1845 beschrieben). Es wurden zwei Massen gefunden, von denen die eine 12 bis 14 \mathfrak{A} wog, von krystallinischer und feinkörniger Structur war und aus hämmerbarem Eisen bestand. Die zweite Masse, die ungefähr 6 \mathfrak{A} schwer ist und sich im Besitz von Shepard befindet, hat die bei Meteorsteinen gewöhnlichen Eindrücke mit stumpfen abgerundeten Winkeln und Rändern. Sie hat stellenweise eine dünne, gelbliche, ockerbraune Rinde, ihr spec. Gew. ist 7,548. Sie ist feinkörnig und dicht, nimmt eine hohe Politur an und hat dann eine hellere Farbe als Stahl, zeigt beim Anätzen keine Widmanstätten'sche Figuren, sondern nur kleine weiße Flecken, die ohne Ordnung über die Oberfläche zerstreut sind. Bruch feinkörnig und silberglänzend. Troost fand darin (wohl im größeren Stück), Eisen 87,58, Nickel 12,42, doch hält er den Nickelgehalt für wahrscheinlich zu hoch und glaubt, daß auch noch andere Elemente darin vorhanden sein mögen. Shepard fand in seinem Stück Eisen 85,30, Nickel 14,70, mit Spuren von Calcium, Magnesium und Aluminium.

4) Von Burlington, Otsego County, New-York. Diese Masse, im Jahr 1819 aufgepflügt, wog ursprünglich 150 \mathfrak{A} und wurde schon von Silliman beschrieben. Es sind jetzt nur noch 12 \mathfrak{A} vorhanden, indem der Rest verschmiedet wurde. Sie ist grob krystallinisch, mit hakigem Bruch, und die polirte Oberfläche ist fast so weiß wie Neusilber. Widmanstätten'sche Figuren werden deutlich. Die Härte ist ungewöhnlich groß, die Zusammensetzung ist nach Rockwell Eisen 92,291, Nickel 8,146. Shepard dagegen fand Eisen 95,200, Nickel 2,125, Unlösliches 0,500, Schwefel und Verlust 2,175.

5) Von Asheville, Buncombe County, Nord-Carolina (1). Shepard bemerkt zu diesem Meteorstein, daß es Kobalt,

(1) Die Meteoriten von Partsch, 116.

Amerikanische Meteoriten. Magnesium und Phosphor enthält, der Nickelgehalt auf 5 pC. steigt und Kieselerde beträchtlich unter pC. ist.

6) Von Hommoney Creek, Buncombe County, N Carolina. Die Masse wurde bei einem alten Hause funden, und wog beinahe 27 $\frac{1}{2}$. Sie ist auf einer s flachgedrückt, wie wenn ein halbflüssiger Körper auf einer ebenen Fläche sich abdrückt, auf der andern unregelmäßig mit mannichfaltigen Vertiefungen, im Innern sehr bläulich und etwas hämmerbar, 11 Zoll lang und 7 breit, 4 1/2 dick am dickeren Ende, am andern nicht über 2 1/2. Oberfläche ist knollig und zackig, die Farbe braunschwarz, bisweilen bunt von aschfarbener erdiger Materie besonders im Grunde der Eindrücke. Das letztere kommt wohl daher, daß die Masse lange als Heerd in der Küche eines Farmers gedient hatte. An einer Stelle fanden sich einige Körner eines dunkeln gelblich-grauen Olivins. Oberfläche ist blasig, diese Structur nimmt aber nach Innen ab. Der frische Bruch hat eine Farbe zwischen Stahl und Magnetkies. Die Widmanstätten'schen Figuren erscheinen sehr zart und deutlich. Die Härte ist die des grauen Gußeisens das spec. Gew. 7,32. Die Zusammensetzung: Eisen (Spuren von Chrom und Kobalt) 98,19, Nickel 0,23, kohlunlösliche Materie und Verlust 1,58. Die gelblichen olivähnlichen Körner bestehen aus Kieselerde, Kalkerde, Magnesia und Eisenoxyd.

7) Von Lockport, New-York. Zu den früher schon bekannten Bestandtheilen, Nickel, Kupfer, Phosphor und Kieselerde, entdeckte Shepard noch Kobalt.

8) Von Black Mountain, am Ursprung des Swanoah-Flusses, Nord-Carolina. Die Masse, die nur 22 Unzen wiegt, ist augenscheinlich Bruchstück einer viel größeren Masse, hat ein ausgezeichnet krystallinisches Gefüge, steht aus 1 1/2 Zoll dicken Blättern die nach den Flächen eines Octäeders liegen. Die Blätter trennen sich nur sehr schwer in körnige Stücke von der Dicke der Blätter, die Theile

sind etwas oval, was von kleinen Aederchen von Magnetkies herzurühren scheint. Die Masse enthält mehrere unregelmäßige abgerundete Knollen von graphitähnlicher Masse, von $\frac{1}{4}$ bis 1 Zoll im Durchmesser, womit blättriger Magnetkies vorkommt. Das spec. Gew. war 7,261, und die Zusammensetzung: Nickel mit Spuren von Kobalt 2,52, Eisen 96,04, Unlösliches, Schwefel und Verlust 1,44.

Amerikanische
Meteoriten.

9) Von Cocke County, Cosby's Creek, Tennessee (1). Die ursprüngliche Masse, welche bis auf ein kleines, 1 \mathfrak{A} schweres Stück verschmiedet wurde, war ein länglicher, viereckiger Block, wog ursprünglich ungefähr 2000 \mathfrak{A} , und es kamen darin große und vollkommene octaëdrische Krystalle vor. Eine andere Masse wog 112 \mathfrak{A} , und fand sich ganz in der Nähe der ersten. Sie war hämmerbar, sehr weiß, und leicht mit einem scharfen Instrument zu schneiden. Sonst waren beide Massen identisch.

10) Von Randolph County, Nord-Carolina. Diese Eisenmasse (2), ursprünglich 2 \mathfrak{A} schwer, hat eine dünnblättrige, verwobene Structur. Farbe und Glanz gleichen dem Mispickel. Durch das Aetzen kommen feine, fast unsichtbare, federige Linien zum Vorschein, wie Eis auf einer Glasscheibe. Die Härte ist die des besten Stahls. Shepard fand nur noch Spuren von Kobalt darin und ein in Königswasser unlösliches rothbraunes Pulver, das er für Kieselerde hielt.

11) Meteoreisen von Otsego County, New-York. Es wog 276 Gran, und hatte eine runde Gestalt, eine schwarze Rinde, blättrige oder blättrig stänglichte Structur, so daß die Individuen radienförmig vom Mittelpunkte austrahlen. Die Farbe war ein liches Stahlgrau, mit einem blaßgelben Schimmer, etwa wie Magnetkies. Durch die Masse waren sehr kleine, vollkommen runde Kügelchen

(1) Früher von Troost beschrieben, Sill. Am. J. XXXVIII, 250, und von Shepard, ibid. XLIII, 354, auch von Partsch, die Meteoriten, 151. — (2) Beschrieben von Shepard, Sill. Am. J. XVII, 140.

Amerikanische
Meteoriten.

von Magnetkies zerstreut, welche leicht ablösbar und Höhlungen mit glatten, silberweißen Wänden zu liefen. Beim Aetzen zeigte sich schöne Krystallie. Enthält 94,57 pC. metallisches Eisen, und außerdem K Nickel, Kobalt, Schwefel, Kohlenstoff, Zinn? und auch Chrom.

12) Shepard berichtet über einen merkwürdigen Meteoreisenfall in Linn County, Iowa, am 25. Februar. Die von Shepard erhaltenen Reste dieser 40 bis 50 schweren Steine zeigen kleine Kügelchen von Nickel in einem grauen feldspathartigen Mineral verbreitet.

13) Nachrichten über einen Meteorsteinfall von Bangor, Maine, am 20. Mai 1848, geben Cleveland und Shepard (2). Das Gewicht des Steins war 1½ cwt und hatte eine schwarze Rinde, und etwas keilförmige Gestalt. Eine Oberfläche war beinahe eben, die andere unregelmäßig oder leicht wellenförmig. Sein spec. Gew. war 3,456, was gleich im Allgemeinen dem Poltawa Stein (März 12, 1848) ist, hat indessen eine viel hellere Farbe, mehr Perlmutterschimmer und keine Rostflecken. Das Nichteisen ist in kleinen Punkten da, und hat einen ungewöhnlichen Silberglanz. Ebenso ist auch Magneteisen vorhanden. Es lassen sich ferner einige feine schwarze Punkte unterscheiden, die vor dem Löthrohr Chromreaction geben und wahrscheinlich Chromeisen sind. Das hämmerebare Eisen wird mittelst des Magnets ausgezogen und betrug 11,2% des ganzen Steins. Es enthielt Eisen 85,3 und Nickel 14,7. Der erdige Bestandtheil dieses Steins löst sich in concentrirter Salzsäure auf und scheint ein Trisilicat von Nickeloxydul und Magnesia zu sein, ein Mineral, das sich in Meteorsteinen findet, und welches Shepard unter dem Namen Howardit noch zu beschreiben gedenkt.

(1) Sill. Am. J. [2] IV, 288. 429; Pogg. Ann. LXXIV, 320; Centr. 1848, 528; Jahrb. Miner. 1848, 850. — (2) Sill. Am. J. VI, 251.

Silliman d. j. und Hunt (1) analysirten Meteoreisen von Texas und Lockport; sie fanden in dem ersteren : 90,911 Eisen, 8,462 Nickel, sowie Phosphurete, Kohle, Kupfer, Antimon (oder möglicherweise einen neuen Stoff), zusammen 0,500; in dem andern von Lockport : 92,583 Eisen, 5,708 Nickel, Spuren von Kupfer und Arsenik und 1,4 unlöslichen Rückstand. Beide Meteoreisen zeigten bei Aetzung mit Salpetersäure Widmanstätten'sche Figuren.

Amerikani-
sche
Meteoreisen.

Silliman d. j. (2) beschreibt einen Meteorstein, dessen Fall im October 1846 in Concord in Newhampshire beobachtet wurde. Derselbe wiegt nur 370½ Gran. Seine äußere Fläche zeigte eine glänzend graulich-weiße Emaille mit einigen dunkelbraunen metallischen Flecken. Das Innere ist schlackenartig, wie theilweise gefritteter Feldspath, porös, und darum das spec. Gew. nicht zu bestimmen. Die Härte ist ungefähr 6,5, und ritzt leicht den Feldspath. Die Farbe ist dem größten Theil nach weiß; auf dem Bruche Glasglanz. Der ganze Stein zeigt die Merkmale bedeutender Erhitzung. Die Eisenflecken sind nur sehr klein und zeigen bei Vergrößerung keine metallischen Punkte. Vor dem Löthrohr löst er sich in kohlen saurem Natron mit Aufbrausen auf und giebt ein beim Erkalten fast undurchsichtiges Glas. Für sich schmilzt er in der Platinzange an den Ecken, phosphorescirt, und färbt die Flamme gelb. Er enthält weder Wasser noch empyreumatische Substanzen. Die chemische Zusammensetzung war : Kieselerde 84,973, Magnesia 12,076, Soda 2,218, Verlust 0,233, entsprechend der Formel $MgO, 3 SiO_2 + NaO, SiO_2$; diese nähert sich der eines von Shepard in dem Meteorstein von Bishopville in Südcarolina gefundenen Minerals, für das er den Namen Chladnit vorschlug.

(1) Sill. Am. J. [2] II, 370; Pogg. Ann. LXXI, 544; J. pr. Chem. XLII, 458; vergl. Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 80. — (2) Sill. Am. J. [2] IV, 353; Pharm. Centr. 1848, 15.

Amerikani-
sche
Meteoriten.

Troost (1) beschreibt ein Meteoreisen von Murfreesboro', Rutherford County, Tennessee, aus welcher Gegend derselbe Forscher bereits 10 verschiedene Aërolithen in Silliman's Journal, bekannt gemacht hat. Ueber seinen Fall ist nichts bekannt. Die Masse wog ungefähr 19 Pfund, hatte eine unregelmäßige ovale Gestalt und war fast überall mit einer Kruste von ungefähr 2 Millimeter Dicke umgeben, die Brauneisenstein glänzte. Das Meteorit hat Eisenglanz, sehr krystallinischen Bruch, und ist sehr hämmerbar, obgleich härter als die bekannten Tennessee-Meteoreisen, da es mehr Zeit zum Zersägen braucht. Polirt zeigen sich die Widmanstätten'schen Figuren von rhombischer und dreieckiger Gestalt. Es scheint ziemlich frei von fremden Beimischungen, nur sieht man auf der Sägefläche eine kreisrunde Masse von $\frac{1}{8}$ Zoll im Durchmesser, welche Troost als Schwefeleisen (Magnetkies) ansieht. Auf der andern Oberfläche sind zwei kleine Höhlen, eine von ungefähr $\frac{1}{8}$ und die andere von $\frac{1}{16}$ Zoll im Durchmesser. Mit diesen Ausnahmen ist das Metall homogen und compact. Eine oberflächliche Analyse ergab weniger Nickel als irgend einer von den Tennessee-Meteormassen, nämlich 96,00 Eisen, 2,40 Nickel und 1,60 nicht untersuchte Substanz.

Shepard (2) hat eine Zusammenstellung aller in der Geschichte der Aërolithen Bezügliches gegeben, und wir hier des darin vorkommenden Neuen wegen nicht übergehen dürfen. Nach ihm beträgt die Anzahl der in diesen Körpern erkannten Mineralspecies 37, von denen die 17 bezeichneten den Meteoriten eigenthümlich sind. Schweflige Säure (a), Bittersalz, Glaubersalz, † unterschwefliges Natron, † unterschwefliges Magnesia, Chlorcalcium, Chlor

(1) Sill. Am. J. [2] V, 351; Pharm. Centr. 1848, 844. — (2) In 1847, 379 aus Rep. Amer. geolog. Assoc.; Beinert, der Meteorit Braunnau, Breslau 1848, S. 30; Arch. ph. nat. VI, 332. — (a) Fast allen Meteorsteinen im Momente ihres Falles; durch Bruch oder Beileicht am Stein von Bishopville zu entdecken.

magnesium, † lösliche Kieselerde (b), † schwefels. Nickel-
oxyd (c), Eisenvitriol (d), † Eisenchlorid (e), † Nickel-
chlorid (e), † Kobaltchlorid (f), Chlornatrium (g), Apatit (h). Amerikan-
ische
Meteoriten.

Apatoid (c u. i), kleine gelbe halbdurchscheinende
Körner. Härte 5,5. Schmilzt auf Kohle vor dem Löthrohr
und wird schwarz, löst sich in Borax zu einem grünlich-
gelben Glase. Er enthält keine Phosphorsäure.

† Sphenomit (Shepard), graubraune Krystalle mit
einem Stich ins Gelbe, tafelförmig und sehr klein. Härte
5,5. Er findet sich auf schwarzen Augitkrystallen und
verwachsen mit Anorthit im Stein von Juvenas. Vor dem
Löthrohr giebt er leicht ein schwarzes magnetisches Glas,
löst sich mit Brausen in Borax und zeigt dann die Reac-
tionen des Sphen. Er ist in Salpetersäure löslich, mit
Hinterlassung eines in Ammoniak unlöslichen schweren
weißen Pulvers. Die Lösung hält Kieselsäure und Kalk.

† Dysilit (Shepard); ein braunschwarzes Pulver,
welches bei einer großen Anzahl Meteoreisenmassen bleibt,
wenn man sie in Säuren löst. Es beträgt 0,25 bis 2,25 pC.
der Massen. (Es ist dieses der Schreibersit der deutschen
Mineralogen. Siehe die Analyse bei den Massen von Braun-
au, Seeläsgen und Arva.)

Glimmer (i).

† Jodolith (b) (Shepard) findet sich in derben,
eckigen, ein wenig abgerundeten Körnern, von denen die
größten $\frac{1}{4}$ Zoll im Durchmesser haben. Drei Spaltungs-
richtungen, die aber ziemlich undeutlich sind. Die Farbe
ist smalteblau. Der Glanz ist dem des Salpeters ähnlich;
sie sind halb durchscheinend und leicht zerbrechlich.
Härte 5,5 bis 6,0. Vor dem Löthrohr kommen sie leicht
ins Kochen und geben ein fast farbloses trübes Glas, das,

(b) Alle im Stein von Bishopville. — (c) Im Stein von Alais (Berz.).
— (d) Im Steine von Cocke County, Tennessee. — (e) Im Steine von
Clairborn, Ashville, Nord-Carolina. — (f) In einem rothen Regen bei
Blankenburg, Journ. de Phys. LXI, 469. — (g) Im Stein von Stannern.
— (h) Im Stein von Richmond. — (i) Im Meteoreisen von Weston.

Amerikanische
Meteoriten.

so lange es heifs ist, einen schwachen Stich ins Amethystfarbene hat. Gepulvert mit Boraxsäure auf Eisendra erhitzt, zeigt sich keine Reaction. Von Salzsäure wird das Pulver leicht gelöst; Ammoniak fällt diese Lösung, die nur Kieselsäure und keine Spur von Kalk oder Magnesia enthält, scheint.

Anorthit (k).

† Chladnit (Shepard) bildet unvollkommene Krystalle, deren einige bis zu einem Zoll Durchmesser haben. Primitivform: ein schiefes Doppelpisma, neben der auch die Formen des Feldspaths und Albits vorkommen. Die natürlichen Flächen sind zu uneben, um Messungen zuzulassen. Man erhält durch Spaltung, die sehr leicht ist, Winkel von 120 und 60°. Farbe schneeweifs, selten graulich. Perlmutterglanz, der in den des Salpeters übergeht. Durchscheinend, in nicht zertheilten Stücken halbdurchscheinend. Härte 6,0 bis 6,5. Sehr zerbrechlich. Halbzolldicke Stücke zerreiben sich leicht zwischen den Fingern. Spec. Gewicht 3,116. Vor dem Löthrohr für sich auf Kohle erhitzt, bildet sich leicht und unter Lichterscheinung ein weisses Email; mit Borax langsam ein durchscheinendes Glas. Es ist ein Trisilicat der Magnesia und macht fast $\frac{1}{3}$ des Steins von Bishopville aus.

Augit (g u. k).

† Chantonit (Shepard), im Stein von Chanton: Eckige, feste Massen, oder schwarze Adern. Härte 6 bis 7,0. Spec. Gew. 3,48. Vor dem Löthrohr schmilzt es an den Rändern zu einer schwarzen Schlacke.

Olivin.

Granat (l).

Limonit, unter der Oxydkruste der Eisenmasse und dem Roste auf dem frischen Bruche verschiedene Steine.

(k) Im Stein von Juvenas. — (l) Im Stein von Nobleboro.

Chromeisenerz (m).

Amerikanische
Meteoriten.

Magneteisenstein. In Massen in den Adern und der Hülle des Steines von Scriba, und als schwarzes Pulver, gemengt mit dem Dysilit, als Rückstand bleibend, wenn man gewisse Species des Meteoreisens in Säuren löst.

† Gediegen Eisen, beim Eisen von Burlington, Scriba und Walker County, in denen die Abwesenheit von Nickel, Chrom und Kobalt den meteorischen Ursprung mit Unrecht zweifelhaft machte. Spec. Gew. 7,26 bis 7,5. Es ist weich von faserigem bis körnigem Bruche. Zeigt, wie jedes nickelhaltige Eisen, auf glatten Flächen zahlreiche glänzende Punkte, die sich zwischen hervortretenden silberglänzenden Linien befinden.

† Nickelhaltiges Eisen. Unter diesem Namen werden wahrscheinlich mehrere Arten zusammengeworfen. Spec. Gew. 6,5 bis 8,0.

† Gediegener Stahl in schönen krystallisirten Massen, im Allgemeinen in parallelen Blättern, die sich verwirrt durchschneiden. Härte 6,0 bis 6,5. Spec. Gew. 7,33 bis 7,4. Farbe stahlgrau. Geätzt erscheinen schöne Krystallbilder. Er findet sich in den Massen aus Randolph County (Nord-Carolina) und aus Bedford County.

Magneteisenkies. Primäre Form ein rhombisches, secundäre ein sechsseitiges Prisma. Krystallflächen stahlgrau, Bruch kupferfarbig gelb. Die Krystalle sind gewöhnlich hohl, oder mit rundlichen Höhlungen versehen. Auch kommen blätterige Massen vor. Spec. Gew. 4,454. Er wurde gefunden im Eisen der Grafschaft Cocke, Tennessee. Die hier beschriebenen Krystalle finden sich im Steine von Richmond und in einer sehr veränderten Form im Steine von Juvenas.

† Schreibersit (b). In kleinen tiefgestreiften Prismen mit unbestimmten Ecken; Spaltungsrichtung parallel den Flä-

(m) Im Stein von Ensisheim und in dem von Chassigny.

Amerikanische
Meteoriten.

chen des Prismas. Härte 4,0. Glanz unvollkommen metallisch. Undurchsichtig, leicht zerreiblich. Vor dem Lötrohr entwickelt sich schweflige Säure ohne Aufbrausen, und es bleibt ein schwarzes magnetisches Glas zurück. Mit Borax entsteht eine schöne gelbe Perle, die beim Erkalten blasser wird und oft eine grüne Färbung annimmt. Bei Zusatz von Zinn entsteht ein durch Chrom grün gefärbtes Glas. Das Eisen scheint zufällig darin zu sein und dem Magneteisenerz anzugehören, das daran mechanisch hängt. Wahrscheinlich ist es ein Anderthalbsulfür des Chromschwefel (b).

Wasserblei (d).

Meteorstaub.

Viele Fälle von Meteorstaub sind in neuerer Zeit bekannt und der Staub näher untersucht worden. Wenn der Staub nicht offenbar vulkanischer Natur ist, so stammt er nach Ehrenberg (1) fast immer, den darin enthaltene Infusorien nach, aus Südamerika; er wird lange Zeit in den Staubnebeln (Höheraue) der Passatzzone schwebend gehalten, und von Zeit zu Zeit durch Südwestwinde (Sirocco-Föhn) nach Europa geführt, weshalb er ihn auch Passatstaub zu nennen vorschlägt. Ein rother Staub, der mit Föhnwind auf Schnee im Pusterthal in Tyrol am 31. März 1847 gefallen war und auch in Freysing und Chambery beobachtet wurde (2), wurde von Oellacher (3) nach zwei vergleichenden Analysen für Saharastaub gehalten von Heinisch und Kanka (4) für gewöhnlichen Gebirgsstaub (5) aus der dortigen Gegend und zwar aus dem westlich gelegenen Hochgebirge, der namentlich durch Lawinenfälle veranlaßt und durch Nordwestwind weit verbreitet worden sei. Ehrenberg wies durch das Mi-

(1) Berl. Acad. Ber. 1847, 319; 1848, 285. — (2) J. pr. Chem. XLV, 217. — (3) Wien. Ztg. 1847, 2. Juni, 29. Nov.; Haiding. R. (vergl. S. 1147) III, 430. — (4) Pogg. Ann. LXXIII, 607. — (5) Haiding. Berichte III, 289; Oestr. Blätter für Literatur und Kunst, 13. October 1847.

kriscop nach, daß er aus vielen verschiedenartigen, nicht vulkanisch veränderten Theilen bestehe, von gleicher Zusammensetzung wie der im atlantischen Meere bei den Capverde-Inseln regelmäfsig fallende Staub; er enthielt 66 Formen von Süßwasserinfusorien. Meteorstaub.

Ein vulkanischer Staub dagegen war der am 1. Mai 1812 auf Barbados zur Zeit des Ausbruchs des Vulkans von St. Vincent gefallene Staub, den Ehrenberg (1) ebenfalls mikroskopisch untersuchte, und ihn aus glasigen durchscheinenden, aber öfter abgerundeten Theilchen, die beim durchgehenden Lichte oft bräunliche und gelbe, zuweilen rothbraune, auch schwarze Farbe haben, zusammengesetzt fand. Dazwischen finden sich zellige, dem zerriebenen Bimsstein ganz ähnliche Theilchen und öfter kleine Krystalle, die Augitkrystallen ähnlich sehen und grünliche Färbung zeigen. Manche sind farblos. Doch auch in diesem Staube finden sich 19 organische Körperchen, die sämmtlich nur als Süßwasser- und Continentalbildungen bekannt sind, was zu interessanten geologischen Schlüssen führt, auf die aber näher einzugehen hier nicht der Ort ist.

Gibbs (2) untersuchte einen auf ein englisches Schiff im atlantischen Ocean gefallenen Meteorstaub, über den früher von Ehrenberg berichtet wurde. Die Substanz wurde nur schwierig von Salzsäure angegriffen und wurde mit Flufssäure aufgeschlossen. Gibbs fand darin:

Wasser und organ. Materie	18,53	Kohlensaure Kalkerde . .	9,59
Kieselerde	37,18	Magnesia	1,80
Thonerde	16,74	Kali	2,97
Eisenoxyd	7,65	Natron	1,90
Manganoxyd	3,44	Kupferoxyd	0,25

Auch Haidinger, Reissek und Ehrlich (3) be-

(1) Berl. Acad. Ber. 1847, 152. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 567; Jahrb. Miner. 1848, 488; Berl. Acad. Ber. 1846, 205. — (3) Wien. Acad. Ber. Hft. 2, 138; Haiding. Ber. (vergl. S. 1147) III, 489; IV, 151. 152. 304.

Berichtigungen und Zusätze.

Seite 26 Zeile 8 von oben lies Krystal- statt Kysrtal-.

" 39 " 20 " " " bekanntes statt bekannte.

" 123 " 11 " unten " Breguet " Berguet

" 418 " 18 " oben " Cr_2O_3 statt Mn_2O_3 .

" 457 " 8 " unten " rothe statt gelbe.

" 488; dem Citat (1) ist sususetzen : Chem. Soc. Qr

" 544 Zeile 10 von oben lies gerade statt ganze.

" 629 " 12 " unten " 17,5 " 47,5.

" 704; das Citat (1) heisst richtig : Phil. Trans. 184

[3] XXXV, 244; Ann. Pharm. LXXI, 144; im

[3] XVI, 66; Instit. 1849, 348.

Seite 975 Zeile 14 von unten lies Hubert statt Huber

" 1072 " 3 " " " sogenannten statt sog

" 1183 " 16 " " " Melaphyr statt Melaph

Autorenregister.

- Abbéne**, Mineralwasser von Prè-Saint-Didier 1009.
Abel, Einwirkung der Salpetersäure auf Cumol 712.
Abel und Rowney, Wasser eines artesischen Brunnens zu London 998; Mineralwasser von Cheltenham 1009.
Abreu, gerichtlich-chem. Analyse 966.
Aimé, Reflexionsanemometer 151.
Airy, Schallgeschwindigkeit in der Luft 154; Zusammensetzung des Spectrums 197; Lichtintensität in der Nähe der Brennlinien 197; Gleichungen für das unter der Wirkung des Magnetismus stehende Licht 248.
Alexander (J. H.), Formel für die Spannkraft des Wasserdampfs 95.
Alexander (?), Bestimmung des spec. Gew. von Flüssigkeiten, Hydrometer 89.
Allan, vergl. Bensch.
Anderson (A. G.), Bildung saurer oxalsaurer Salze 499.
Anderson (Th.), Zersetzung fetter Oele mit Schwefel in der Hitze 570; Verbindungen organischer Basen mit Phosphorsäure 616. 625. 628; organische Basen im Oleum animale Dippelii 651; Unterscheidung der organischen Basen mittelst des Mikroskops 667; Farbstoff der Morinda citrifolia 748.
Andral, Reaction thierischer Säfte 894.
Andrews, Wärmeentwicklung bei chem. Verbindungen 47; spec. Wärme des Broms 86; latente Wärme, Siedepunkt und spec. Wärme mehrerer Körper 88.
Arago, Uhr mit conischem Pendel 151; Erleuchtung von Mikrometerfäden 213; doppeltbrechend. Ocularmikrometer 213.
Arppe, Pyroweinsäure 510.
Artus, Fermentolea 730.
Aubergier, Morphingehalt d. Opiums 622.
Babinet, Atmidoscop 100; Abhängigkeit der Schwere von der Breite 147.
Babo, Beziehungen zwischen Siedepunkt u. Zusammensetzung bei Salzlösungen 93.
Baden-Powell, vergl. Powell.
Baer, phosphors. Kalk 340. 348; Untersuchung von Brennstoffen 1112.
Ballot, vergl. Buys-Ballot.
Barral, Tragkraft der Electromagnete 238; Nicotin 613; Anilin 654.
Barreswil, wasserfreie Schwefelsäure 370; Uebererhromsäure und Uebervanadsäure 418; vergl. auch Bernard.
Barreswil und Michelot, Zucker in den Runkelrüben 826.
Bastick, Zersetzung von Gyps durch ätherische Oele 372; Einwirkung von Chlorkalk auf organische Substanzen 381.
Batillot, über französischen Wein 1106.
Baudrimont, Teratologie der Krystalle 26; Beziehungen zwischen Zusammensetzung u. Krystallform 30; Pektin 797.
Baudrimont u. Martin-Saint-Ange, chemische Vorgänge bei der Entwicklung der Thiere im Ei 859.
Baumert, Platincyanverbindungen 483. 484; Einwirkung von Salpetersäure auf Brucin 632; Gentianin 809.
Baumhauer, Muskelgewebe der Fische 837; lösliches Eiweiß der Fische 841.
de la Beche und Playfair, Untersuchung von Steinkohlen 1117.

- Becker (H.), Fällbarkeit des Arsens durch Schwefelwasserstoff 421; Zersetzung des dreifach-salpeters. Wisnuthoxyds durch Wasser 432.
- Becker in Mühlhausen, Fermentolea 730.
- Béclard, Blut 865.
- Becquerel (E.), Wirkung verschiedener Farbenstrahlen auf phosphorescirende Substanzen 164; electricische Farbenringe 190; photogenische Wirkungen der verschiedenen Farbenstrahlen 222; farbiges Lichtbild des Spectrums 224; electricisches Leitungsvermögen fester u. flüssiger Körper 288. 290. 291; electricische Polarisation 299; Wärmeerscheinungen in Stromleitern 809.
- Becquerel und Rodier, Blut bei Scorbut 870.
- Beetz, electricische Farbenringe 190. 191; Wirkung des freien Sauerstoffs in der galvanischen Kette 283; Passivität des Eisens 284.
- Beinert, Meteoreisen von Braunau 1300.
- Belfield-Lefèvre, Daguerrotypie 226.
- Bellani, Tönen frei ausgespannter Eisendrähte 156.
- Belloc, Entbittern der Rolskastanie 831.
- Beltz, Analyse von Most 1085.
- Bénisch, Darstellung arsenfreien Antimons 425; Darstellung von Milchsäure und Buttersäure 554; Zusammensetzung der Galle verschiedener Thiere 918; Milchezucker in der Milch von Fleischfressern 922.
- Bensch und Allan, harns. Salze 578.
- Beringer, Sodafabrikation 1052; Ersatzmittel der grünen Arsenfarbe 1060.
- Berlin, Wassergehalt weins. Salze 505.
- Bernard und Barreswil, Zucker in der Leber 895.
- Bertin, Drehung der Polarisationsebene durch den Electromagneten 245.
- Bertrand, Bewegung der Wärme 104; Ähnlichkeit in der Mechanik 137.
- Berzelius, Fermentolea 731; neuestes Mineralsystem 1152.
- Biànchi, Apparat für Circularpolarisation 213.
- Bibra, Blut niederer Thiere 871.
- Bineau, spec. Gewicht der Mischungen von Schwefelsäure und Wasser 371; saures ameisens. Kali und Natron 546; Verhalten des Camphers zu Säuren 734; Stickstoffbestimmung 955; Bestimmung von kohlens. Kalk 963.
- Binney, Steinkohlenbildung 1297.
- Biot, optisches Verhalten des niak-Alauns 204.
- Bischof (G.), polymere Isomorphie Pseudomorphosen 1229; chem. physikalische Geologie 1230; gigigkeit der Bestandtheile der von der Höhe ihres Vorkommens dem Terrain 1248.
- Bisson, vergl. bei Brunel.
- Blake, Ausfluß von Gasen 146; geschwindigkeit in der Luft 15.
- Blanquart-Evrard, Lichtbild Papier 227.
- Bley, Darstellung von Bernsteinsäure Fermentoleum aus Salvia pratensis Gallensteine 919; Harnsteine 91.
- Bley und Diesel, Kohlenwasserstoffe aus dem Bernstein 736; Senne 828; Arsen in dem Ocker der zu Alexisbad 1016.
- Blondeau, Gährung 467; Umwandlung des Caseins in Fett 840.
- Blow, vergl. bei Rowney.
- Blum, polymere Isomorphie 1147; domorphosen 1229.
- Blumenau, Färbung der geschmolzenen Phosphorsäure 359; Vorkommen Titan 401; eigenthümliche Säure Campher 522; Bildung von Nitrozoensäure 534; Zersetzung der Säure durch Salpetersäure 539; barkeit des Eisens durch Schwefelmonium 970.
- Blyth, Condukt 1214.
- Bobierre und Moride, Zinnchlorid Antichlor 1123.
- Bödeker, Berberin 635.
- Böhme, Bildung von Metacetonsäure Buttersäure bei Fäulnis 545; bei Schwarz.
- Böttger (R.), Darstellung von Titan 680.
- Boguslawsky, Meteoreisen von Braunau 1300.
- Boissière, vergl. bei Possoz.
- Bolley, vierfach-bors. Natron Preisser's Angaben über Farbstoffe im Sandelholz bors. Kupferoxyd als grüne Farbe Bolley und R. Wydler, Farbe Anchusa tinctoria 746.
- Bolzano, Messung schneller Bewegungen 151.
- Bonnet, Wärmeleitung 104; Einwirkung verschiedener Substanzen auf die 866.

- Bonjean**, Schiefsbaumwolle 1144 f.
Borissiak, Meteorstein am Don 1299.
Bossy, wasserdichtes Papier 1127.
Botzenhart, Haidinger'sche Farbenbüschel 206.
Bouchardat, Inulin 794; Untersuchung von Burgunderweinen 1109.
Bouchardat und **Sandras**, Verdauung geistiger Getränke 804.
Boudet, Erkennung des Guajakharzes in andern Harzen 742.
Boué, Daguerrotypie 227.
Bouis, Zersetzung des Cyanquecksilbers durch Chlor 486; Einwirkung von Chlor auf Holzgeist 670.
Boullay und **Henry**, Schwefel in den Schwefelwassern von Barzun und Barèges 1008.
Bouquet, Zinnoxidulsalze 436.
Bourdon, neues System hydraulischer Motore 151.
Boussingault, Darstellung von phosphors. Magnesia-Ammoniak aus Harn 339; Abhängigkeit des Fettgehalts des Bluts von dem der Nahrungsmittel 869; Wasser, welche freie Schwefelsäure enthalten 1011; Einfluss des Salzes auf die Viehfütterung 1101; Einfluss von trockenem oder genetztem Futter auf dieselbe 1102.
Boutigny, Sphäroidalzustand 92; vgl. bei **Hutin**.
Boutron-Charlard und **O. Henry**, Pariser Trinkwasser 995; Absatz aus Quellwasser 1012.
Bouvier, vergl. **Chatin**.
Bowman, Auge 213.
Boyé, vergl. **Wetherill**.
Braconnot, Untersuchung von altem Lampenbrennmaterial 569; Vorkommen von Orleanfarbstoff 788; Früchte verschiedener Kürbisarten 830; Kalb- und Hammelharn 932.
Brandis, Verbindung von salzs. Strychnin mit Cyanquecksilber 626; Eisen- cyanüre des Strychnins und Brucins 627. 629.
Bravais, optische Phänomene durch eishaltige Wolken 209.
van Breda, electrischer Lichtbogen 811.
Breithaupt, Mesitinspath 1223.
Brewster, Erscheinungen an dünnen Platten im polarisirten Licht 192; Brechungsverhältniss des Eises 196; Zusammensetzung des Spectrums 197; Epipolismus 202; optisches Verhalten des Topases 204; Polarisationszustand des Himmels 210; Anwendung des polarisirten Lichts im Mikroskop 212; Muscae volitantes 215; Wahrnehmen der Entfernungen beim Sehen 216; Foramen centrale 218; optische Täuschungen 220.
Brocklesby, Abhängigkeit der Bethauung von der Farbe 100; Uebertragung irisirender Oberflächen 193.
Brodie, Untersuchung des Bienenwachses 701; des chinesischen Wachses 706.
Bromeis (C.), Soolsprudel von Nauheim 1001.
Bromeis (Th.), Columbit (Tantalit) 1207.
Brooke, Lichtbilder auf Papier 229.
Brooks, spec. Gewicht des Zinkoxyds 434.
Brossard-Vidal, Ebnulioscop 683.
Brown (J.), Sodafabrikation 1044; Gelbbleierz 1212.
Brown (R. E.), Bildung von zinn. Natron 437. 1058.
Brown-Sequard, Wirkung des Lichts auf die Iris 215.
Brücke, Newton'sche Farbenringe 190; Wesen der braunen Farbe 201.
Brunel, **Bisson** und **Gauguin**, galvanische Bronze 1035.
Brunner d. ä., Eudiometrie 941; Magnesit 1223.
Brunner d. j., Abhängigkeit der Capillaritätshöhe von der Temperatur 4.
Buchner d. ä., Lactuca 825; Mercurialis annua 831; Entsäuerung von Wein 1109.
Budge, Milchzucker in dem Weissen von Hühneriern 858.
Budy und **Lammatsch**, Blechverzinnung 1025.
Buff, electrisches Leistungsvermögen von Metallen 286; electrische Polarisation 295 ff.
Bull, Brunnenwasser von Hartford 999.
Bunsen, Bestimmung des Harnstoffs im Harn 989; Palagonit 1193; blaue Farbe des Wassers 1236; über den innern Zusammenhang der pseudovulkanischen Erscheinungen Islands 1261; vulkanische Salmiakbildung 1254; Einfluss des Drucks auf chemische Action 1262.
Burat, Gangbildung 1236; Gabbro u. a. 1284.

- Burguières, Reaction von Flüssigkeiten von Cholerakranken 895.
- Bussy, arsenige Säure 422.
- Buys-Ballot, Abhängigkeit der Cohäsion der Flüssigkeiten von der Temperatur 2.
- Cahours, Phosphorchlorid 363; Einwirkung von Phosphorchlorid auf organische Substanzen 363 (auf Benzoesäure 532, auf Nitrobenzoesäure 534, auf Cuminsäure 534, auf Zimmtsäure 535, auf Benzilsäure 536, auf Anisäure und Nitranissäure 538, auf Bittermandelöl 711, auf Zimmtöl 712, auf Römisch-Kümmelöl 717); Einwirkung von Salpeterschwefelsäure auf organische Substanzen 387 (auf Benzoesäure 533, auf Cuminsäure 535, auf Anissäure 537, auf salicyls. Methyloxyd 676, auf Mesitylen 733); Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Hydramide 590, auf Benzonitril 595, auf stickstoffhaltige organische Verbindungen überhaupt 596; Einwirkung von Chlor auf oxals. Methyloxyd 674, auf ameisens. Methyloxyd 675; Einwirkung von Brom auf citrons., itacons., citracons. u. a. Salze 501; Anisamid 588; Cinnanilid 609; Cumanilid und Anisanilid 610; Nitro-cumidin 665; Rautenöl 721; Furfurol 732; Leucin 846.
- Cailliot, Einwirkung der Salpetersäure auf Terpenthinöl 727.
- Calamai, Meerwasser 999.
- Caligny, Intermittiren eines Wasserstrahls 145; neues System hydraulischer Motore 151.
- Callan, Volta'sche Combinationen 276.
- Cantu, Nachweisung von Jod und Brom in Mineralwassern 954.
- Cap, Einfluss des Wassers bei dem Keimen 825.
- Carl, Darstellung von Chloroform 680.
- Caron de Villars, zufällige Färbung der Glasfeuchtigkeit 216.
- Casanti, Unterscheidung des Bluts verschiedener Thiere 867.
- Cattel, Prüfung von Chloroform 681.
- Cauchy, Bewegung eines Systems zusammengesetzter Moleculle 137; Theorie des Lichts 164; Zurückwerfung des Lichts an opaken, besonders metallischen, Körpern 169; Differenzialgleichungen für die chromatische Polarisation 208.
- Cerutti, Ausbeute an Santonin 812.
- Challis, Theorie der Schallgeschwindigkeit in der Luft 154; Fortpflanzung der Lichtstrahlen und Polarisation 16; Aberration des Lichts 166.
- Chancel, Constitution der Acetone d Säuren $C_n H_n O_n$ 544. Vergl. an bei Laurent.
- Channing, Verhalten fester Kohlsäure zu Basen 334.
- Chapman, Unterscheidung vor de Löthrohr von Kali und Natron 96 von Lithion und Strontian 962, v Blei und Wismuth 970, von Eisenox und Eisenoxydul 971; Nadelers 115; Classification der Silicate 1168.
- Chatin, Wirkung arseniger Säure a Pflanzen 822; Arsen in Mineralwas 1016.
- Chatin und Bouvier, Blut bei Soc 870; Bestimmung des Fibrins i Blut 993.
- Chantard, vergl. Dessaignes.
- Chevallier (A.), Absorption unorga scher Substanzen durch Pflanzen 82; Kupfer und Blei im Thierkörper 87; Sperma im Harn 930; Arsen in Mineralwasser 1017; Mehlverfälschu 1103.
- Chevallier (A.) und Gobley, Ars in Mineralwasser 1017.
- Chevallier (A.) und Schaufel Arsen in Mineralwasser 1017.
- Chevallier (V.), Beleuchtung mikr scopischer Objecte mit schiefe Lic 213.
- Chevandier, Zusammensetzung v verschiedener Holzarten 1098; vergl. an bei Wertheim.
- Chevreul, Vergleichung von Cocheni aus Algier und aus Mexico 792.
- Clark, Themsewasser 998.
- Claudet, photogenische Wirkung d verschiedenen Farbenstrahlen 223. 22 Photographometer 233.
- Claus, schweflgs. Platinoxidul-Kali 45 schweflgs. Ruthenoxidul-Kali 45 Iridiumsilberchlorid 458; Einwirku von schwefliger Säure und schweflig Kali auf Iridiumkaliumchlorid 451 zweifach-schweflgs. Osmiumoxydul n schweflgs. Kali 461.
- Clausius, Lichtzerstreuung in der A mosphäre 209.

- Cleaveland, Meteorsteinfall von Castine (Maine) 1312.
- Clemm, Darstellung von Cyankalium, cyans. Kali und Harnstoff 476.
- Clerget, Saccharimetrie 213.
- Cloez, Schwefelphosphorsäure 362; Schwefelarsensäure 425; Darstellung von Ameisensäure 546; Aetherschwefelphosphorsäure 695; Oel von *Tropaeolum majus* 725.
- Coathupe, Schiefsbaumwolle 1142.
- Cockburn, Anemometer 151.
- Collomb, Farbe der Gletscher und des Gletscherwassers 202.
- Combes, Schiefsbaumwolle 1144.
- Conaty, Ebullioscop 683.
- Connel, natürliches schwefels. Kupferoxyd mit Kupferchlorid 1220; aurichalcitähnliches Mineral 1226.
- Le Conte, Coracit 1167.
- Couper, Rohstoffe und Producte der brittischen Töpferei 1063.
- Courtépée, vergl. Masson.
- Crahay, Längsstreifen im Sonnenspectrum 198.
- Crasso, Untersuchung von Theilen des Weinstocks 1082.
- Credner, Crednerit 1164; Gismondin 1190; Volborthit 1213.
- Crelle, Theorie der Dampfmaschinen 148.
- Crookewitt, Legirungen und Amalgame 398.
- Crum (A.), Löslichkeit des phosphors. Kalks in Säuren 341.
- Crum (W.), Analyse salpeters. Verbindungen 957; Schiefsbaumwolle 1131 ff.
- Custer, Cyanquecksilberdoppelsalze 477.
- Dale, elliptisch-polarisirende, nicht-metallische, Substanzen 171.
- Damour, Isländische Quellwasser 1010; Malakon 1171; Faujasit 1189; Columbit (Tantalit) 1207; Alluaudit 1216.
- Damour u. Salvétat, Halloysit 1185.
- Dana, Cohäsion und Krystallisation 25; Dolomitbildung 1291; Koproolithen 1298.
- Danger, Form der Oberfläche des Quecksilbers in Glasröhren 14.
- Darby, chromsaure Salze 416.
- Daubeny, über Vulkane, Erdbeben und heiße Quellen 1251.
- Daubrée, Gasentwicklung in Erzminen 1250.
- Davy (J.), auflösende Kraft des kohlen. Wassers 335; Meerwasser 1000.
- Debus, Farbstoffe der Krappwurzel 781.
- Deck, Vorkommen von Vanad 413, von phosphors. Kalk in plutonischem Gestein 1073.
- Delafoisse, Beziehungen zwischen Zusammensetzung und Krystallform 29.
- Delbos, Fluosilicanilid 597; amidartige Verbindungen des Naphtalidams 610; vergl. bei Laurent.
- Delbrück, Cyan und Paracyan 473; Stickstoffbestimmung 956.
- Delesse, Bohnerz 1164; Augit 1172; Hornblende 1172; Orthoklas 1181; Andesin 1183; Labrador 1183; Chrysotil 1195; Eisenchlorit 1199; Grünsande 1199; Bestimmung der Gemengtheile von Gesteinen 1231; Schmelzversuche mit Gesteinen 1234; Syenit 1273; Porphyry (Melaphyr) 1275; Uebergangsschiefer 1281; Protogyn 1281; Diorit 1282; Arkose 1283; Talkgesteine 1288; Serpentinsschiefer 1289.
- Deneke, Soole von Werl 1001. 1002.
- Desains, Schmelzpunkt, latente Schmelzwärme und spec. Wärme des Phosphors 84; Bildung der Verbindungen von Schwefelkohlenstoff mit Methyloxyd 674, mit Aethyloxyd 690, mit Amyloxyd 700; vergl. bei Provostaye.
- Deschamps, Kupfer im Thierkörper 875. 876.
- Descloizeaux, Christianit 1189; Greenovit 1204; Kalkspath 1221; Geisirtheorie 1262.
- Dessaigues und Chautard, äpfelsaurer Kalk 500; Vorkommen von Buttersäure und Metacetonensäure 545; Valeramid 586; flüchtiges Oel der *Matricaria Parthenium* 723; Asparagin 818.
- Deville, spec. Gew. des Schwefels 365; verschiedene Zustände des Schwefels 366; verschiedene Brunnen- und Flusswasser 996.
- Dickson, Asche der englischen Biere 1112.
- Didion, Bahn der Wurfgeschosse 188.
- Diesel, Verhalten des Jodkaliums gegen Schwefelsäure 380; Färbung des erhitzten dreifach-salpeters. Wismuthoxyds 434; vergl. auch bei Bley.
- Döpping, Verbindung von schwefeliger Säure mit Wasser 369.
- Döpping und Struve, Gährung und Fäulnis 472.

- Dollfus, Verbindungen organischer Basen mit Schwefelblausäure, Ferrocyanwasserstoffsäure und Ferricyanwasserstoffsäure 616. 618. 622. 625. 626. 629.
- Domeyko, vanadinhaltiger Pyromorphit 1213.
- Domonte und Ménard, Schiefesbaumwolle 1184 ff.; Knall-Mannit 1145.
- Donny, Cohäsion der Flüssigkeiten und Sieden 9. 92; Mehlverfälschung 1103.
- Doppler, Messung schneller Bewegungen 151; Legirungen zu Spiegeln, Verbesserung katoptrischer Apparate u. a. 212; Photometer, Schleifen von Gläsern und Spiegeln 212; optischer Fernmesser und Riesenmikroskop 213.
- Dorey, Beleuchtungssystem für Zifferblätter 212.
- Dove, Wärmeleitung im Erdboden 100; Depolarisation des Lichts 189; Uebertragung irisirender Oberflächen 193; Versuche mit rotirendem Polarisationsapparat 207; rotirende Farbenscheibe 211; Stephanoscop 213; subjective Farben auf der rotirenden Scheibe 219; optische Täuschungen 220; electriche Entladung par cascade 273.
- Doveri, Kieselerde 400; Thymianöl 721.
- Doyère, Zusammensetzung der atmosphärischen Luft 390; Apparat zu Gasanalysen 941.
- Draper, Lichtentwicklung beim Glühen und beim Verbrennungsprocess 160; photogenische Wirkung der verschiedenen Farbenstrahlen 222.
- Drinkwater, spec. Gewicht des Alkohols und seiner Mischungen mit Wasser 682.
- Dub, Tragkraft der Electromagnete 237.
- Dubois - Reymond, electriche Farbenringe 191.
- Dubreuil, Fauchet und Girardin, Einfluss des Kochsalzes als Düngers 1070.
- Dubrunfaut, verschiedene Zuckerarten 792. 793.
- Ducom, Lycopodium 829.
- Duflos, Vorkommen von Jod in Steinkohlen 379; Meteoreisen von Braunau 1803, von Seelägen 1804.
- Duhamel, Wärmeleitung 104; gleichzeitige Empfindung verschiedener Töne 159.
- Dulk (A. B.), Dammarharz 740.
- Dumas, flüchtiges Stickoxydal 382; tryle 592.
- Dumas, Malaguti und Lebl, Einwirkung von wässrigem Kali Cyanmethyl 547, auf Cyanäthyl Identität der Buttersäure und taceonäure 551; Amide 566; N 593.
- Dupasquier, Erkennung von zwei kohlen. Kalk in Wasser 963; 1 weisung von organischer Mater Wasser 983.
- Durocher, Farbe der Gletscher des Gletscherwassers 202; Magnus der Gesteine 1233; Entstehungsweise des Granits 1267.
- Ebelmen, Nachbildung krystall Mineralien 23; Titanverbindungen Nachbildung von Hyalith 1162.
- Ehrenberg, Bildung compacter steine aus Infusorien 1240; Mistaub 1318.
- Einbrodt, Alkoholat der salp Magnesia 396; Alkoholat über 684.
- Ellis, neues Causalprincip der Musik 124.
- Elsner, Verkupferung von Glas Porcellan 1025; englisches Neu 1040; Hohofenschlacke zu hydriem Oelment 1057; Trängren
- Enderlin, Blutasche 873; Fleisch 894.
- Engelhardt, milchs. Wismuthoxyd verschiedene Modificationen der Säure 518; Chabasit 1188.
- Engelhardt u. Maddrell, Milch 512.
- Erdmann (O. L.), Trennung der nesis von den Alkalien 962; Zusammensetzung griechischer Bronze 1034; Asche von Raps und E 1076; Thonerdegehalt der Pfl 1097.
- Erdmann (O. L.) und Marchand, Mellithsäure 494.
- Etti, Asche der Wurzel von Betularis 1075.
- Ettingshausen, Bewegungalehre Evans, Darstellung wasserfreier Silica 370; Bad für verschiedene Temperaturen 941.
- Ewald, Absatz des Soolspradels zu heim 1012.

- Faraday, Gefrieren des Quecksilbers im glühenden Tiegel 92; magnetische Eigenschaften der Gase 250; Gutta-Percha als Isolirmittel 266.
- Farey, über Southern's Bestimmungen der Spannkraft des Wasserdampfes 95.
- Faucher, vergl. bei Dubreuil.
- Favre, Blut bei Scorbut 870.
- Favre und Silbermann, Wärmeentwicklung bei chemischen Verbindungen 62; Apparat zur Bestimmung d. spec. Wärme von Gasen 86; chemische Wirkungen des Lichtes 221.
- Faye, Compensation der Pendel 151.
- Fehling, Bestimmung des Broms 952; Württemberger Salzsöolen 1001; käufliches Kochsalz, Mutterlaugen u. Pfannensteine v. Salzsöolen 1054; Schiefbaumwolle 1132 ff.; Steinsalz 1228.
- Fellenberg, Mineralwasser v. Weissenburg 1003.
- Field, Cuminamid u. andere Amide 588; Cumonitryl 595.
- Figuier, Darstellung v. Goldoxyd 451; Arsen in Mineralwasser 1014 (vergl. bei Marcel de Serres).
- Figuier und Mialhe, Meer- und Mineralwasser 999. 1005. 1006.
- Filhol, Beziehungen zwischen Zusammensetzung und spec. Gew. 40; arsenigsaure Salze 423; Nachweisung von Arsen 967; Quellenabsätze 1012; Mehlverfälschung 1103.
- Fischer (N. W.), salpetrigs. Salze 383; Palladiumchlorür-Ammoniak 457; Meteoriten von Braunau 1303.
- Fischer (in Ovelgönne), Arsen in dem Ockerd. Wildunger Sauerbrunnens 1016.
- Fizeau und Foucault, Interferenz der Wärmestrahlen 122; optische Interferenzerscheinungen 166.
- Flandin, Entbittern d. Rofskastanie 830; Arsen in Mineralwasser 1016.
- Fleitmann, Entschwefelung s. g. Proteinverbindungen 834; Schwefelgehalt thierischer Substanzen 836.
- Fleitmann u. Henneberg, pyrophosphorsaure Doppelsalze 353. 354; metaphosphors. Salze 356; neue Modificationen d. Phosphorsäure 359.
- Foley, vergl. bei Léonard.
- Fonberg, diabetischer Harn 931.
- Fordos und Gélis, Sauerstoffsäuren d. Schwefels 375; Analyse derselben 950.
- Foucault, Uhr mit conischem Pendel 151; Daguerrotypie 226; vergl. bei Fizeau.
- Fournet, Magnetismus d. Gesteine 1283; Metamorphismus der Gesteine 1242; Dolomit 1289.
- Fownes, spec. Gew. der Mischungen aus Alkohol und Wasser 682; Furfurol 731.
- Frankenheim, Abhängigkeit der Capillaritätshöhe von der Temperatur 4. 12; spec. Gewicht und Ausdehnung einiger Flüssigkeiten 68.
- Frankland und Kolbe, Constitution der Säuren $\text{Ca H}_2 \text{O}_4$ 544; Einwirkung von wässrigem Kali auf Cyanmethyl 547, auf Cyanäthyl 552, auf Cyanamyl 559; Constitution d. Nitryl 591; Kyanäthin 650; Zersetzung des Cyanäthyls durch Kalium 687.
- Frapolli, Vorkommen von Gyps, Dolomit und Steinsalz am Harz 1292.
- Fremy, Hydrate 332 (Chromoxydhydrat 414, Antimonsäure und Meta-Antimonsäure 428, Zinnsäure und Metazinnsäure 438, Kupferoxydulhydrat u. Kupferoxydhydrat 444); Pektin und Ähnliches 796; Erkennung von Soda in der Potasche 960.
- Frerichs, vergl. bei Wöhler.
- Fresenius, Constitution der organischen Basen 668; Trennung der Phosphorsäure von Eisenoxyd und Thonerde bei Gegenwart alkalischer Erden 948; Trennung von Eisenoxyd und Thonerde 971; Untersuchung Rheingauer Weine 1107; Schwerspath 1219.
- Fritzsche (in Freiberg), Mesitidnspath 1223.
- Fritzsche (in Petersburg), Knallsäuren 487; organische Basen in Peganum Harmala 636; Harmalaroth 787.
- Fritzsche u. Struve, Osman-Osmiumsäure 461.
- Froment, electrischer Stromunterbrecher 310.
- Fuchs, Begriff der Mineralspecies 1150.
- Fyfe, Tauglichkeit engl. Kohlen zur Gasbeleuchtung 1120.
- Gaisney, Nachweisung von Arsen 968.
- Galloway, vergl. bei Merck.
- Gannal, Bleiweißfabrikation 1057.
- Garnier, Uhr mit conischem Pendel 151.
- Gaudichaud, Reaction der Pflanzensäfte 823.

- Gaudin, Beziehungen zwischen Zusammensetzung und Krystallform 29; Verbesserung von Aerostaten 151; photographische Wirkung der verschiedenen Farbenstrahlen 224.
- Gaugin, vergl. bei Brunel.
- Gay-Lussac, Darstellung von Stickoxydul 382, von Stickoxyd 382; Königswasser 387; Trennung d. Zinns und Arsens 968.
- Genth, sp. Gew. des Nickeloxyduls 444; Eisenmulm 1165; Chrysolith 1173; Thjorsanit 1179; Baulit 1180; Chabasit 1188; Phillipsit 1190; Uranit 1218; Laven vom Hekla 1286.
- Gerding, eigenthümliche Substanz in d. Kraut von *Oenanthe fistulosa* 816.
- Gerned, Rauhkalk 1223.
- Gerhardt, spec. Volum ähnlich gestalteter Körper 46; Ansichten über die Salze 328; phosphors. und pyrophosphors. Salze 328. 338. 344. 347. 349; schwefels. Thonerde-Kali 398; basisch-salpeters. Zinkoxyd 436; salpeters. Quecksilberoxydul 447; Chlorsuccinsäure 500; Phosphamid 585; Chlorcarbethamid und Chloracetamid 587. 588; gepaarte Verbindungen 610; Zersetzung der Substitutionsproducte zusammengesetzter Aetherarten 689; Römisch-Kamillenöl und Rautenöl 718; vergl. auch bei Laurent.
- Gibbs, Zirkon 1171; Skolezit 1188; zinkhaltiger Kalkspath 1222; Mesitinspath 1223; Meteorstaub 1319.
- Giles, Brunnenwasser von Wolverton 998.
- Girardin, Mineralwasser von Rouen 1006; Arsen in Mineralwasser 1018; vergl. bei Dubreuil.
- Gladstone, salpeters. Wismuthoxyd 432; salpeters. Kupferoxyd 444; Bildung von Harnstoff aus knalls. Kupferoxyd-Ammoniak 488.
- Glaisher, Ausstrahlung der Wärme 117; Glasson, Veränderung des Eisenspaths bei dem Glühen 443; Theobromin 633; Wallnussasche 1074; Eisenspath 1224.
- Glocker, krystallinische Structur des Meteor Eisens 1301; Meteor Eisen von Seeläsgen 1304.
- Gobley, Zusammensetzung des Hühner-Eis 857; vergl. auch bei Chevallier.
- Godefrin, Darstellung von Chloroform 680.
- Göppert, über Pflanzeneinschlüsse in Chalcedon 1162; Steinkohl 1295; Meteor Eisen von Braun von Seeläsgen 1304.
- Görgey, fette Säuren des Cöls 560.
- Goodman, Kräfte im Allgemeinen Volta'sche Combinationen 27.
- Gorup-Besanez, Vorkommen Säuren in Früchten 545; Sch. epithelium 839; Kieselerdeg. Federn 935; vergl. auch bei Gossart.
- Gossart, Prüfung des Salpeters.
- Graeger, Sättigungen 335; Wasser von Popperode bei Mi 1002.
- Grange, Wasser der Isère 9 hängigkeit der Bestandtheile von der Höhe ihres Vor und dem Terrain 1247.
- Grassi, spec. Gewicht mehrer Körper 39; Zusammendrückb. Flüssigkeiten 135; Blut bei 1870; Flüssigkeit aus dem H. eines an Hydrocele Leidenden.
- Gregory, Untersuchung von einem verwesenen Thierkörper Darstellung von Hippursäure musartige Substanz 803; D. von Kreatin 879. 887; V. von Nickel und Kobalt in E 1161.
- Grewinck, Columbit (Tantalit).
- Griffith, Menschenmilch 922.
- Gris, Wirkung von Eisenvit auf Pflanzen 823.
- Grove, Kräfte im Allgemeinen Gasbatterien 278; electrolyt. Zersetzung 314; Einwirkung Hitze auf zusammengesetzte Zerlegung des Wassers durch l.
- Grüel, rotirende Farbensche.
- Vereinfachung des Heliostate.
- Grundner, Früchte von l. Europaeus 829.
- Gruner, Eisenaugit 1172.
- Grunert, Dämmerung und bogen 209.
- Guckelberger, Zersetzung von Albumin, Fibrin und Leim Manganhyperoxyd oder Cl und Schwefelsäure 847.
- Guibourt, Catechu, Gambir 522; Unterscheidung von R und Stärkezucker 983.
- Guillemot, Schraubenpumpe.
- Guiot, Anziehung d. Erdsphä.

- Gulliermond, Chinariade 828.
 Gundelach und Strecker, Schweinegalle 913.
 Gutberlet, Pseudomorphosen nach Steinsalz 1294.
 Häcker, magnetische Tragkraft 235.
 Hagen (G.), Zusammensetzung des Wasserstrahls 145.
 Hagen (R.), Schleimsäure 520.
 Haidinger, Farbenschiller der Krystalle 194; Pleochroismus des Amethysts 202; Farbenringe beim Durchsehen durch farbige Flüssigkeiten 218; Bildung von Vivianit 443; polymere Isomorphie 1147; Hauerit 1157; Chrysoberyll 1167; Brandisit 1197; Löweit 1219; Stalactitenbildung 1221; Pseudomorphosen 1229; Metamorphismus der Gesteine 1243; Granitbildung 1273; Pseudomorphosen nach Steinsalz 1294; krystallinische Structur des Meteor-eisens 1301; Meteorstaub 1319.
 Haldat, Magnetismus 264.
 Hall, Schiefsaumwolle 1143.
 Hamilton, eigenthümlicher Gesichtsfehler 215.
 Hankel, Aenderung des electricchen Leitungswiderstandes von Flüssigkeiten mit der Temperatur 291; Bestimmung der Stärke electriccher Ströme in Drähten aus der Verlängerung der letztern 309; Krystallelectricität des Boracits 1227.
 Hare, neue Theorie der Electricität 315; Knallgasgebläse 941.
 Harless, Blut niederer Thiere 871.
 Harris, salpeters. Ammoniak 393.
 Houghton, Kräfte im Allgemeinen 124.
 Hausmann, irisirende Oberflächen der Mineralien 193; Pseudomorphosen nach Steinsalz 1294.
 Hautz, Doppelsalze mit Chlorammonium 392.
 Hayes, Reinigung der Schwefelsäure 371.
 Hearn, Cavendish' Apparat zur Bestimmung der Erddichte 147.
 Hecker, vergl. bei E. Schmidt.
 van Hees, Ausbeute und spec. Gewicht flüchtiger Oele 703.
 Hein, Gallensteine 919.
 Heineken, Schleifen von Gläsern 212; mehrfaches Sehen 218.
 Heintz, phosphors. Manganoxydul 342; phosphors. Binoxid 343; dreifach-salpeters. Wismuthoxyd 432; Krystallform des Kreatins und Kreatinins 880. 882; Kreatin und Kreatinin im Harn 927; Bestimmung des Schwefels in organischen Substanzen 950; Trennung der Magnesia von d. Alkalien 961; Aschenanalyse 978; Harnstoffbestimmung 991; Bestimmung der Harnsäure 992; Reaction auf Galle 992.
 Heldt, Entstehung der Harze im Allgemeinen 738; Santonia 812.
 Henneberg, Vogelblutasche 873; Kieselerdegehalt der Federn 936; vergl. auch bei Fleitmann.
 Hennessy, Anziehung der Sphäroide 147.
 Henry (O.) d. ä., Bestimmung des Golds 976; Erkennung von schwefels. Cinchonin in schwefels. Chinin 988; Mineralwasser 1007; Arsen in demselben 1017; vergl. bei Boullay.
 Henry (O.) d. j., Zweifach-Schwefelamyl und Schwefelcyanamyl 699.
 Henry (T. H.), Trennung von Nickel und Kobalt 974.
 Henry (?), Anemometer 151.
 Herapath (Th. J.), Rettigwurzeln 826; Pollen 828; Gichtknoten 933; Wasser des Flusses Exe 998; Mineralwasser von Beacon-Hall bei Bath 1009; Seeschlamm als Dünger 1072; Asche der Rettigwurzeln und der Kaffeebohnen 1075, des Maulbeerbaums 1095.
 Herapath (T. A. W.), krystallinisches Zinkoxyd 434.
 Hermann, Iminenium 404; Heteromerie 1149; Hydrargillit 1164; Völknerit 1168; Epidot 1175; Bucklandit, Ural-Orthit u. a. 1176; Idokras 1177; Steatit 1196; Chlorit 1198; Chondrodit 1200; Pyrochlor 1205; Ytrotantalit 1206; Columbit (Tantalit) 1207; Yttrilmenit 1208. 1210; Monazit und Monazitoid 1215; Gibbsit 1216.
 Herrmann, phosphors. Manganoxyd 343; Manganoxydsalze 421.
 Herzog, Unterscheidung von Rohrzucker und Traubenzucker 985.
 Hefs (J.), Behandlung der Platinetze 453.
 d'Heureuse, Verhalten von Eisen und Zink gegen Schwefelsäure und deren Verbindungen 372.
 Heyl, Schwammkohle 938; Glockenmetall 1036.

- Higgin, Farbstoffe der Krappwurzel 778; Krappfarben 1126.
- Hipp, Verbesserung am Wheatstoneschen Chronoscop 151.
- Hirzel, Imperatoriaöl 724.
- Hittorf, blaues Platinoyd 453.
- Hobson, Bewegung von Flüssigkeiten 145.
- Hochstetter, Kalkspath 1221.
- Hofmann (A. W.), Valeramid 587; Nitrile 594; Oxanilid 598; aus dem Anilin hervorgehende Basen 655; Cyancumidin 665; Cyantoluidin 666; Constitution der organischen Basen 668.
- Hofmann (P. W.), salpeters. Amyloxyd 699.
- Holtzmann, Abhängigkeit der Cohäsion des Wassers von der Temperatur 9.
- Hornung, Darstellung von Antimonoxyd 426.
- Horsford, electrischer Leitungswiderstand von Flüssigkeiten 286; Absorptionsapparat zur Stickstoffbestimmung 956.
- How, peruanische Goldlegirung 1034.
- Hruschauer, Mineralwasser von Kosteinitz 1002; Tetradymit 1155.
- Hubert, Bestimmung des Kupfers 975; Wismuthglanz 1156; Periklin 1181.
- Hugi, Mutterlauge von Pyrmont 1002.
- Humboldt, Meteoreisen von Braunau 1300.
- Hunt, Beziehungen zwischen spec. Gewicht und Atomgewicht bei Schwefel und Stickstoff 40; photogenische Wirkung der verschiedenen Farbenstrahlen 224; Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf salpetrige Aethyloxyd 689; Leim 845; Glycocol 846; Enceladit 1204; vergl. bei Silliman d. j.
- Hurault, Bildung des Valerianaöls 725.
- Hutin und Boutigny, Conserviren des Holzes 1127.
- Iljenko, Fäulnisproducte des Caseins 839.
- Izarn, Tafeln zur Reduction des Barometerstandes auf 0° 70.
- Jackson, Darstellung von schwammförmigem Gold 450; Meerwasser 1000; Vorkommen von Blättertellur 1154.
- Jacobi, gleichförmige Kreisbewegung 149; Wiedervereinigung der Gase im Voltameter 285.
- Jacquelain, Einwirkung starker auf Diamant und Kohle 333; schweflige Säure 366; Dithion 374. 375; schwefels. Thonerde 398; Atomgewicht des Chroms 415; Chromverbindungen 415; Darst. chroms. Salze 416. 1055; schw. Eisenoxyd 443; Fettbildung im Körper 865.
- Jacobowitsch, Speichel 923.
- Jagu, Locomotive durch Kohle getrieben 151.
- Jamieson, s. g. Schwefelcyan 41.
- Jamin, Zurückwerfung des Lichts 173; Zurückwerfung des Lichts an Metallen 177; opt. Verhalten des Ammoniakalauns 178; Haidinger'sche Farbenbüschel 214.
- Jean, Schiefsbaumwolle 1140.
- Johnstrug, Kopenhagener Brunnwasser 994.
- Jolly, Endosmose 16.
- Jones, albuminartiger Körper im Blut 930.
- Jordan, Lichtbilder auf Papier 2.
- Joule, mechanisches Aequivalent der Wärme 56; Gestaltsveränderung 243.
- Joule und Playfair, spec. Vol. v. haltiger Salze 42; Ausdehnung 57; Maximum der Dichte des Wassers 69.
- Julien, chinesische Spiegel 212; sische Metalllegirungen 1035; craquelés 1066.
- Jurasky, Haarsalz 1219.
- Kaiser, steinmarkartiges Mineral 1219.
- Kane, Unters. über Flachs- und Baumwollenerdiges kohlens. Manganoxydul 1220.
- Karafiati, Löwit 1220.
- Karmarsch, hydrostatische Silbe 1032; Abnutzbarkeit der Silberungen 1034.
- Karsten (E. J. B.), Kohlenwasserstoffe 1019; Boracit 1226. 1295; tinsit 1228; Entstehung von Selen Gyps und Anhydrit 1294.
- Karsten (G.), Verdunstung des Silbers in der Kälte 96; Längs im Sonnenspectrum 198.
- Keating, Härten des Gypses 101.
- Keller, Darstellung von Sauerstoffelst Chlorkalk 328; Arsen in Wasser 1015.

- Kemp**, Ammoniakgehalt der atmosphärischen Luft 392; Berberin 636; Absorptionsapparat zur Stickstoffbestimmung 956; Kartoffelkrankheit 1105.
- Kenngott**, Spaltungsflächen an Bergkrystall 1162; Glimmer 1185.
- Kent**, Gutta-Percha 744.
- van Kerckhoff**, Mineralwasser von Mondorff 1002; Arsen darin 1016.
- van Kerckhoff und Reuter**, Schiefsbaumwolle 1129 ff.
- Kerndt**, wolframs. Ammoniak und Wolframsäure 408; Bodenit und Muro-montit 1177; Feldspathe 1182; Wolfram 1210; Wolframbleierz 1212.
- Kersten**, verschiedene Sorten Zinn 1023; Aventuringlas 1060.
- Kessler (F.)**, unterschweflgs. Salze 367; Polythionsäuren 375; weins. Antimonoxyd-Strontian 506; Analyse der Sauerstoffsäuren des Schwefels 951.
- Kessler (L.)**, Ausscheidung des Silbers im metallischen Zustand 449; Darstellung und Prüfung von Chloroform 680. 681.
- Kilburn**, Daguerotypie 227.
- Kindt**, Unterscheidung von Leinen und Baumwolle 1122, von Baumwolle und Schiefsbaumwolle 1137.
- Kirchhoff**, Gleichgewicht und Bewegung einer elastischen Platte 139; electriche Ströme 307.
- Knoblauch**, Wärmestrahlung 104; Zurückwerfung der Wärmestrahlen 118; Doppelbrechung, Polarisation und Beugung der Wärmestrahlen 120; Längsstreifen im Sonnenspectrum 198.
- Knochenhauer**, electriche Ströme durch Entladung von Flaschenbatterien 276.
- Knop**, Bildung, Aggregation, Verzerrungen u. a. von Krystallen 24; Entwicklung von Phosphorwasserstoffgas 863; Farbstoff in rohem Weinstein 505; Chininsurrogat 617; Entfäulung des Branntweins 1111.
- Knop und Schnedermann**, *Cetraria islandica* 831.
- Kobell**, Molybdänsesquioxid 412; Bestimmung des Arsens 965; Begriff der Mineralspecies 1150; Kreittonit 1166; Chloropal und Nonttronit 1186; Disterit oder Brandisit 1197.
- Kohlrausch**, Electrometer 268; Condensator 269.
- Kokscharow**, neues Hexakisoctaëder 25; Bagrationit 1174; Krystallform des Cerins, Orthits, Allanits und Epidots 1176.
- Kolb**, Darstellung von Ferridcyanallium 479.
- Kolbe**, oxydirende Wirkung des galvanisch dargestellten Sauerstoffs 328; Zersetzung der Valeriansäure durch den electricchen Strom 558; Bunsen's Methode Gase zu analysiren 941; vergl. bei Frankland.
- Kolmodin**, vergl. bei Svanberg.
- Kopetzky und Patera**, Vorkommen von Platin und Gediagen-Eisen 1152.
- Kopp (E.)**, Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf salpetrigs. und salpeters. Aethyloxyd 689; Tolubalsam 736.
- Kopp (H.)**, Ausdehnung, spec. Gew. und Siedepunkt von Flüssigkeiten 65; spec. Wärme verschiedner Flüssigkeiten 86; Siedepunktregelmäßigkeiten bei Chlor- und Bromverbindungen 93; At. Gew. des Siliciums 400; spec. Gew. des Quecksilbers 445.
- Kosmann**, Verhalten des Chlorquecksilbers-Amidquecksilbers (weißen Präcipitats) 448.
- Krämer**, Vorkommen flüchtiger Säuren in destillirten Wassern 545.
- Krahmer**, Harn 923.
- Krug**, Boraxweinstein 507.
- Kühn**, schwefels. Ammoniak 392; schwefels. Cadmiumoxyd 436; Verbindungen von Jodblei mit Bleioxyd 442; salpeters. Kupferoxyd 445.
- Kugler**, basisches Cyanblei 477.
- Kuhlmann**, Bildung der Salpetersäure aus Ammoniak 385; Bildung von Ammoniak aus Salpetersäure 391; Einfluss des Ammoniaks auf die Thierernährung 864; Verhältniß der Salpeterbildung zur Fruchtbarkeit des Bodens 1070; Natur des Düngers 1071; Versteinerungsprocess 1240; Einfluss der Cämentbildung auf Gesteinshärtung 1241.
- Kuhn**, Längsstreifen im Sonnenspectrum 198; vergl. auch bei Lamont.
- Kuhse**, über die drei wichtigsten älteren Hof- und Nebensonnenphänomene 209.
- Kundernatsch**, Bestimmung des Kohlenstoffs im Roheisen 943.
- Kussin**, Wolfram 1210.
- La Cava**, toskanische Steinkohlen 1115.
- Lade**, Mineralwasserv. Wiesbaden 1004.

- Lallemand, Torsionswaage zum Messen inducirter Ströme 321.
- Laminne, Mineralwasser von Tongern 1009.
- Lammatsch, vergl. bei Budy.
- Lamont, mittlere Horizontalintensität des Erdmagnetismus 243.
- Lamont und Kuhn, Schwingungszeit eines Magnets in leeren Raum und in Luft 244.
- Landerer, Flüssigkeit eines Hygroms 895; blaue Milch 922; Harnstein eines Affen 932; Concretion aus der Aorta 933.
- Langlois, Arsen in Mineralwasser 1017.
- Larøque, Verflüchtigung fixer Substanzen mit Dämpfen anderer Körper 93; Bittersäure und Valeriansäure 555. 557.
- Larøque und Hurant, Darstellung von Chloroform 680.
- Lassaigne, Löslichkeit kohlen. Salze in kohlen. Wasser 835; Löslichkeit des phosphors. Kalks in kohlen. Wasser 341; Einwirkung von Kohlensäure und phosphors. Kalk auf die Pflanzenvegetation 822; Blut nach Aetherisation 870; Harnleiterstein eines Ochsen 982; Harnsteine von Schafen 982, einer Schildkröte 933; Bestimmung von Gyps in Kochsalz 962; Nachweisung von Arsen 967; Mehlfälschung 1103.
- Langier, Compensation der Pendel 151.
- Laurant, Beziehungen zwischen Zusammensetzung und Krystallform 30. 32; Isomorphismus, Dimorphismus u. Hemimorphismus 32; borsaure Salze 385; wolframs. Salze 406; Zusammensetzung der Quecksilberverbindungen 445; Constitution der Cyanverbindungen 484; Säuren des Fichtenharzes 572; Sulfocarbamid 586; Phthalinsäure 589; Chlorcyanilid 596; Fluosilicanilid 597; Chinin 615; Cinchonin 617; Morphin 622; Cotarnin und Opiansäure 624; Piperin 625; Chlor- und Bromstrychnin 628; Einwirkung von Salpetersäure auf Brucin 630; Chinolin 666; Pikryl 666; Lophin 666; Glycocol 845; Bestimmung des Wasserstoffs 942; Formeln der Silicate 1168.
- Laurent und Chancel, Wirkung Salpetersäure auf Butyron (Nitroacetonsäure) 553; Nitryl 594; I 667.
- Laurent und Delbos, Nitrobenzophensäure 540.
- Laurent und Gerhardt, Veränderung der Weinsäure durch Erwärmung Anilidverbindungen 598; gepaarte bindungen 608; Sulfomorphid Sulfonarcotid 622; Farbstoffe der Färbten 761. 762. 765; Leucin 846.
- Lavaux, vergl. bei Roseleur.
- Leblanc, vergl. bei Damas.
- Lebourdais, Darstellung der chemischen Bestandtheile der Pfl. 808.
- Leconte, Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Salpetersäure 366.
- Le Conte, vergl. Conte.
- Leeson, Krystallisation und Kryographie 25; Mikrokrytallometrie.
- Lefebvre, Theorie der musikalischen Töne 156.
- Lefort, kohlen. Chromoxyd 414; kohlen. Manganoxyd 420; kohlen. Wismuthoxyd 432; kohlen. Zink 435; kohlen. Cadmiumoxyd 435; kohlen. Bleioxyd 442; kohlen. Nickeloxyd 444; gemischte V. 445.
- Lefranc, Barometer 151.
- Legrip, Farbstoffe verschiedener Färbstoffe 787; Kupfer und Blei im Thierkörper 875; Mineralwasser von Lux 1006.
- Lehmann, Säure des Magensafts 872.
- Lehnerdt, Unterscheidung von Leinwand und Baumwolle 1122.
- Lembert, Rectification der Schwefelsäure 370.
- Lenoir, Pentathionsäure 375.
- Lenz, Wirkung der magnet-electrischen Maschinen 323.
- Léonard und Foley, Blut bei Algier endemischen Krankheiten.
- Lepage, joda. Kali im kälte. kalium 380; Kirschlorbeerwasser eigenthümliche Substanz in der Rinde 816; rothe Milch 922.
- Leroy, joda. Kali im kälte. kalium 380.
- Lesquereux, Steinkohlenbildung.

- Leuchtenberg (Herzog v.), Niederschlag an der Anode bei galvanischer Zersetzung von Kupfervitriol 1022.
- Leudet, Bildung und Darstellung von Valeriansäure 556.
- Lewy, Wasser aus dem Furano de Ruiz 1011.
- Lieberkühn, vergl. bei Strahl.
- Liebig; Endosmose, Säftbewegung im thierischen Organismus, Absorption von Flüssigkeiten durch thierische Haut 19; Löslichkeit des phosphors. Kalks in kohlens. Wasser 841; Einfluss der Zeit auf die Bildung chemischer Verbindungen 465; Gährung und Fäulnis 465; Darstellung von Schwefelevan ammonium 491, von Mellonkalium 493; Gehalt des Bluts an Kohlensäure 872; Bestandtheile der Fleischflüssigkeit 876; Abwesenheit der Milchsäure im Harn 925; Kreatin und Kreatinin im Harn 926; Trennung von Nickel und Kobalt 971; Erkennung der Blausäure 987; Mineralwasser von Friedrichshaf und Liebanstein 1002; Fleischkochen und Fleischextract 1098; Entfäuerung von Rheinwein 1108.
- Liebig und Redtenbacher, Carbothialdin 649.
- Liebig und Wöhler, Thialdin 646; Salenaldin 649.
- Lies, buttersaures Kupferoxyd 558.
- List, s. g. Terpeninölhydrat 725.
- Löwe, Farbenringe beim Durchsehen durch farbige Flüssigkeiten 218; Nickelglanz 1155; Jamesonit 1159; Meteorisen von Arva 1807.
- Louyet, Sieden und Stoßen bei denselben 93; Flußsäure 381; englisches Neusilber 1040; Mehlfälschung 1103.
- Lubbock, Wärme der Dämpfe 88.
- Lüdersdorff, Platinlüste 1067.
- Ludwig (H.), phosphors. Baryt 389; Pentathionsäure und Tetra-Pentathionsäure 375; Lactucarium 824; Seidensaft 936; Ocker der Quelle zu Driburg 1012, 1016; Asche der Sassa parillawurzel 1025.
- Lyell, Steinkohlenbildung 1207.
- Lyman, Vorkommen von Zinnober 1188.
- Maas, electrischer Lichtbogen 311.
- Mac Cullagh, dynamische Theorie der Reflexion und Brechung an Krystallen 165.
- Madrell, metaphosphors. Salze 355; Cölestin 1219; vergl. bei Engelhardt.
- Magnus, Bewegung einer Flüssigkeit in einem gleichartigen Mittel 145; Diffractionsercheinungen in der Torricellischen Leere 189.
- Majocchi, Hygrometer 100.
- Malaguti, Chlorcarbamid und Chloracetamid 587; vergl. bei Damas.
- Malaguti und Durocher, Zersetzung von Chlor- und Bromsilber durch Schwefel- und Arsenmetalle 450.
- Malapert, Farbstoffe der Pflanzenblätter 787.
- Mansfield, Steinkohlentheor und Benzol 711.
- Marcel de Serres und Figuier, Versteinigungsproceß 1236.
- Marchand (E.), Erkennung v. Strychnin 988; Mineralwasser von Valmont 1008; Arsen in Mineralwasser 1018.
- Marchand (R. F.), Bestimmung des spec. Gew. von Gasen 39; Zusammensetzung der atmosphärischen Luft 690; Identität der Chrysolepinsäure und Nitrophosphorsäure mit Pikrinsäure 589; Zersetzung der ätherschwefels. Salze 693; Stickstoffentwicklung beim Atmen 860; Kohlensäure im Harn 924; Bestimmung der Kohlensäure im Harn, Milch u. s. 944; Nickelspess 1089; Kalkstein vom Oelberg 1294.
- Marie-Davy, electr. Leitungswiderstand von Flüssigkeiten 291; electr. Polarisation und Uebergangswiderstand 299.
- Marignac, Atomgew. des Baryums 394; Atomgew. u. Verbindungen des Ceriums 897; Diaspor 1163; Epidot 1174; Glimmer 1184, 1185; Gigantolith 1191; Pinit 1192; Liebenorit 1193; Pseudomorphose nach Pleonast 1197; Chlorit 1198; Humit 1200; Turmalin 1208.
- von der Mark, Vorkommen von Jod in Pflanzen 379; Asche der Spirogyra quinina 1096.
- Marloye, Akümeter 160.
- Marsson, Eisenweinsteine 507; Icasäure 519.
- Martin-Saint-Ange, vergl. bei Baudrimont.
- Martins, Farbe der Gletscher und des Gletscherwassers 202.
- Massignon, citrons. Magnesia 501.
- Masson und Courtépée, Ausstrahlungsvermögen 117.

- Mather, Cupelliren mittelst des Löthrohrs 876.
 Matteucci, Phosphorescenz im Meer und bei Fischen 164; Drehung der Polarisationsebene in comprimierten Körpern durch den Magnetismus 247; isolirende Kraft der Gase 266.
 Matthiesen, Goniometer 29; Dispersion des Menschenauges 214; Drehung der Polarisationsebene durch den Electromagneten 245.
 Maumené, verbesserte Destillirblase 941.
 Mauviel-Lagrange, Mehlverfälschung 1103.
 Mayer, Malagawein 1109.
 Mayet, Einwirkung von Aetzkali auf verschiedene Stärkmehlarten 794.
 Meier (L.), Farbstoffe im Sandelholz 784; rothe Rübe 827.
 Melloni, Thaubildung 96; Ausstrahlungsvermögen verschiedener Körper 116; Zerlegung des Sonnenlichts 198.
 Melsens, Gehalt des Bluts an verschiedenen Metallen 876.
 Méne, Darstellung von Chlorkalk 381.
 Mengarduque, Pseudochinin 621.
 Menard, vergl. bei Domonte.
 du Ménil, Sationen 385; Vorkommen flüchtiger Säuren in destillirten Wassern 545.
 Mercer, Anwendung des Ferridcyan-kaliums zum Bleichen d. Indigo's 479.
 Merck (G.), Papaverin 625; Einwirkung von Salpetersäure auf Brucin 682.
 Merck (G.) und Galloway, Mineralwasser von Bath 1009.
 Meurer, Darstellung von Jodarsen 425, von Chloroform 680.
 Meyer (F.), Jodcyan in künstlichem Jod 380; Darstellung von arsenfreiem Antimon 425.
 Mialhe, citrons. Magnesia 501; Prüfung des Chloroforms 681; vergl. bei Figuier.
 Michéa, Blut von Wahnsinnigen 870.
 Michelot, vergl. bei Barreswil.
 Miller (W.H.), Krystallform d. schwefels. Magnesia-Natrons 396, des schwefels. Zinkoxyd-Natrons 435, des Erythroglucins 755, des Orcins 761, des Beta-Orcins 762.
 Millon, salpetrigs. Ammoniak 384; Entwässerung des Gypses 395; Bildung der Aetherschwefelsäure 693; Harnstoff im Auge 854; Gehalt des Blutes an verschiedenen Metallen 875. 876; Verweilen von Antimon in dem Körper 875; Harnstoff im Harn 9 Harnstoffbestimmung 991.
 Milly, Stearinfabrikation 1121.
 Minding, neuer Ausdruck des Brechungsgesetzes 196.
 Mitchell, Stickstoffbestimmung 956.
 Mitscherlich (E.), Conserven 832.
 Moberg, Atomgew. des Chroms Chromverbindungen 413. 416; Chroleisenstein 1166; Hornblende 11 Pyrop 1179.
 Mohr, Sationen 335; Darstellung chlorfreier Salpetersäure 385; Quasijodid 447; Auscheidung des bers im metallischen Zustande 4 Darstellung von Blausäure 474; Nigung des Weinstens 505; Gerbei 523; Darstellung des spiritus vini a holisatus 682.
 Molnar, Vorkommen von Platin Gediegen-Eisen 1152.
 Monheim, Willemit 1173; Halk 1185; Zinkglas 1187; zinkhaltiger Kspath 1222; kalkhaltiger Eisenspath 1224; Eisenzinkspath 1224; Manzinkspath 1224; Dolomit 1289.
 Monthiers, Doppelcyanüre mit Ammoniak 477; Kalium- und Ammoniakupfercyanür 478; Verhalten des Iridcyankaliums mit Ammoniak 475 Moride, vergl. Bobierre.
 Moritz, Widerstand des Wassers gegen darin schwingende Flächen bei verschiedenen Temperaturen 10; Audehnung des Eises 60; Sphäroidalstand des Wassers auf Glas 92.
 Morlot, Sandstein von Fontainebl 1222; Trachyt 1282; Dolomit Dolomitbildung 1289.
 Morson, Zersetzung des Chloroforms.
 Mosotti, Analyse des Fraunhofer'schen Gitterspectrums 167.
 Moullard, Bromkalium in künstlichem Jodkalium 380.
 Moulton, geschwefeltes Caoutchouc.
 Mousson, Electricitätsentwicklung des Wasserdampf 276.
 Müller (Fr.), Bildung von Ameisensäure in Citronenöl 546.
 Müller (J., in Aachen), Zinkspath Versteinerungsmittel 1240.
 Müller (J., in Freiburg i. B.), The der natürlichen Farben 199.

- Müller (J., in Halle), Abhängigkeit des electrischen Leitungsvermögens von der Temperatur 289.
- Müller (J., in Soest), Erkennung des Ammoniaks 960; Rotterdamer Brunnenwasser u. a. Wasser 995; Mutterlaugen von Salzsoolen 1002; alte Glasmalerei 1060; Bodenanalysen 1073.
- Malder, Gerbsäure 523; Identität der Chrysolepinsäure mit Pikrinsäure 539; Chrysaminsäure 541; Proteinverbindungen 835; Leucin 846; Veränderung von Albumin und Casein bei der Verdauung 864; Ochsen-galle 896; Bestimmung der Phosphorsäure 946; Mineralwasser von Assinan 1011.
- Muspratt (J. S.), schweflgs. Salze 369; Einwirkung der Salpetersäure auf Schwefelecyanmethyl und Zweifach-Schwefelmethyl 673, auf Schwefelcyanäthyl und Zweifach-Schwefeläthyl 687. 689.
- Nachet, Beleuchtung mikroskopischer Objecte mit schiefem Licht 213.
- Namur, Asche der Blätter von *Brassica rapa* 1075.
- Napoli, verschiedene Modificationen des Phosphors 397.
- Nauck, Speckstein von Göpfersgrün 1293.
- Naumann, Condensation der Wasseratome in wasserhaltigen Säuren 46; Krystallform mielliths. Salze 495. 496; polymere Isomorphie 1147; über sein Mineralsystem 1151; Gneufs und Gneufsgranit 1273.
- Nendtvich, ungarische Kohlen 1115; Bergtheer 1229.
- Nesbitt, Bestimmung der Phosphorsäure 949.
- Neumann, krystallinische Structur des Meteoreisens 1301.
- Nicholson, Caffein 634; phosphors. Anilin 654; Cumidin 663.
- Nickles, Winkelverschiedenheit an Krystallen 27; Beziehungen zwischen Zusammensetzung und Krystallform 34; salpetrigs. Bleioxyd 385; Krystallform des Zinks 434, des Zinkoxydhydrats 435; Cadmiumoxydhydrat 436; Krystallform der Chlorsuccinsäure 500, des äpfels. Ammoniaks 500, von Substitutionsproducten des Aethers 685, des Bromchlorkohlenstoffs 686.
- Niepee de St. Victor, Eigenthümlichkeiten gewisser Dämpfe zur Erzeugung von Bildern angewandt 231; Lichtbilder auf Glas 232.
- Noad, Absorbirbarkeit der Kohlensäure durch Schwefelsäure 334; Einwirkung der Salpetersäure auf Cymol 713; Vitellin 841; Legumin 842.
- Nüggerath, Bildung von Meting 1160; Pyromorphit als Hüttenproduct 1214; Zinkspath als Versteinerungsmittel 1240; Bildung der Pechhöhle 1297.
- Nüllner, Darstellung von Zinnchlorid 437; Stickstoffbestimmung 956.
- Nordenskiöld, Krystallform des Halmalins 637; Diaphant 1191.
- Norton, Legumin 843; Untersuchung des Hafers 1089.
- Oberhäuser, Beleuchtung mikroskopischer Objecte mit schiefem Licht 213.
- O'Brien, Vibrationsbewegung 127.
- Oerstedt, Diamagnetismus 201.
- Ohme, Hesperidin 785.
- Onnen, Kupferlegirungen 1036.
- Oppermann, Einfluss von trocknem oder genotztem Futter auf die Viehfütterung 1102.
- Orfila, Kupfer im Thierkörper 875.
- Orosi, Wasser der Mafetta di S. Quirico 1009.
- Osann, Einfluss der Vertheilung auf die Bestimmung des spec. Gew. bei festen Körpern 38; Ozon 331.
- Ostrogradsky, Dynamik 127.
- Ott, Bitterspath 1222.
- Oxland, Schiefbaumwolle 1143.
- Pagenstecher, Erkennung von Soda in der Potasche 960.
- Pappenheim, Brechungsverhältniß der Glasfeuchtigkeit 215.
- Parkes, geschwefeltes Caoutchouc 743; Verhüttung von Kupfererz 1020; Verbleitung von Eisen und Stahl 1027.
- Partsch, Meteoreisen von Seckingen 1304.
- Pasquier-Nalinne, Erkennung des Guajakharzes in andern Harzen 742.
- Pasteur, Beziehungen zwischen Zusammensetzung, Krystallform und Drehung der Polarisationsebene 31. 205; Dimorphismus 35; Krystallisation des Schwefels 366, des schwefel. Kalis

- 394; Isodimorphismus der arsenigen Säure und des Antimonoxys 422; arsenige. Salze 428; Chlorarsen mit Ammoniak 436.
- Patera, Hausenit 1158; Mesitinspath 1228; Meteoriten von Arva 1807; vergl. bei Kopetzky.
- Payen, Reaction der Pflanzensäfte 823; Vertheilung von Stärkmehl, Zucker u. a. in Pflanzenwurzeln 826; Einfluß des Fettgehalts der Nahrung auf die Mästung 865; Oidium aurantiacum 1104.
- Payne, Conserviren des Holzes 1128.
- Pearce, Chiolith 1227.
- Pecqueur, Centrifugalpendel 151.
- Péligot, At. Gew. des Urans 418; Antimonoxydverbindungen 426; Stickstoffbestimmung 954.
- Pelouse, Bestimmung des Kupfers 975; Prüfung des Salpeters 958; Schießbaumwolle 1133 ff.
- Percy, Wolframlegirungen 406; krySTALLIRTE Schlacken 1169.
- Perets, Ytrotantalit 1205; Samarskit 1209.
- Perreaux, Sphärometer 151.
- Person, specifische Wärme, Schmelzpunkt und latente Schmelzwärme 72; latente Dampfwärme 89; Beziehungen zwischen dem Elasticitätscoefficienten und der Schmelzwärme 132; Heber, welcher sich selbst ansaugt 145; chinesische Spiegel 212.
- Persoz, pyrophosphors. Doppelsalze 352; Gewinnung von Jod aus verdünnten Lösungen 380; salpetrige. Silberoxyd 385; Oxydation des Eisens durch Salzlösungen und Harn 442; Trennung von schwefliger Säure und Kohlensäure 952; Wirkung von Mineraldünger 1071.
- Peters, Entfäulung des Brauntweins 1111.
- Pettenkofer, Verbreitung des Platins 453; Mineralwasser von Kochel 1004; Goldscheideri mit Schwefelsäure 1027; Kupferamalgame für Zahnärzte 1036; Hämatinon 1061; Schießbaumwolle 1138.
- Pettko, Berthierit 1159.
- Peyrone, Salze von Platinbasen und deren Verhalten 454.
- Phillips, Thonerdehydrat 398; vergl. bei Rivot.
- Pierlot-Feldmann, Darstellung Chloroform 680.
- Pierre, Ausdehnung, spec. Ge. Siedepunct von Flüssigkeiten & Bindung von schwefliger Säure Wasser 368; Atomgew. des S 399; Chlorschwefelsilicium 401; gew. des Titans 401; Löslichl. Chloräthers in Salzsäure 450 methyl und Brommethyl 672; dampf C, H Cl₃ 685; Jodäthyl Schwefeläthyl 686.
- Pigoni, hydraulischer Telegraph 619.
- Piria, Asparagin 816; Erkennen Blutflecken 993.
- Plantamour (Ph.), Vergolden Uhrrädern 1025.
- Planzanet, Schrauben als Luftmotor 1025; Katalyse 325; ver Joule und bei de la Beche.
- Plessy, neue Säuren des Schwefels 375; Entwässerung des Gypses 1025.
- Plouviez, Blutanalysen 868.
- Plücker, Magnetismus und Diamagnetismus tropfbarer Flüssigkeiten der Gase 250; Bestimmung der netischen oder diamagnetischen verschiedener Substanzen 253; ten der magnetischen und diamagnetischen Kräfte bei wachsender Temperatur 256; Darstellung neutraler durch Mischung magnetischer & magnetischer 256; Polarität des magnetischer Körper 260; Wirkung der netpole auf Körper von organischer Gefüge und Krystalle 261.
- Poggendorff, Polarität diamagnetischer Körper 260; electricische Pole 295 ff.; Messung der Kraft undiger galvanischer Ketten 308; Entwicklung in electricischen Leitern 308; electro-thermische setzung 315; Metallhydräre 399 bung des Wismuths 421.
- Poggendorff und Weber, die tische Abstoßung 257.
- Poggiale, Einwirkung von sal Natrium und von Zuckerlösung Blut 866; Blut neugeborener 867; Blut des Menschen und w dener Thiere 868.
- Poggiale und Marchal, Blut i hirnentsündung 868.
- Pohrt, Ausdehnung des Wassers 6

- Poissenille, Ausflugs geschwindigkeit von Flüssigkeiten aus engen Röhren 139.
- Poitevin, Uebertragen von Lichtbildern und Zeichnungen auf photographisches Papier 229; Darstellung gravirter Metallplatten von Zeichnungen und Kupferstichen 230.
- Poleck, Destillation des Bienenwachses 706.
- Polstorff, Wirkung von Mineraldünger 1072.
- Porret, vergl. bei Teschemacher.
- Porro, Compensation der Pendel 151; über ein, den Moser'schen analoges, Bild auf Porcellan 232.
- Poselger, Bromkohlenstoff in käuflichem Brom 380; Federers 1159.
- Possos und Boissière, Darstellung von Blutlaugensalz aus dem Stickstoff der Luft 1056.
- Pouillet, latente Dampfwärme 88.
- Poumarède, Aërophor 862.
- Poumarède und Figuier, Holzfaser 796; Pektin 797.
- Powell (Baden-), Aberration des Lichtes 166; neuer Fall von Interferenz 167.
- Prechtl, künstliche Feldspathkrystalle 1171.
- Preisser, Sperma im Harn 930.
- Provostaye, Krystallform des schwefelphosphors. Natrons 362, des zweifach-weins. Antimonoxyds 427.
- Provostaye und Desains, Wärmestrahlung 114, 117, 118; Diffusion der Wärme an Metallflächen 119.
- Prüfer, Lazulith 1217.
- Pulsky, Vorkommen von edlem Opal 1163.
- Quadrat, Platincyanverbindungen 482.
- Raewsky, phosphors. Kalk 340; Salze von Platinbasen und deren Verhalten 455; Nicotin-Platinchlorür 614; Anilin-Platinchlorür 655; Bestimmung der Phosphorsäure 945, der Pyrophosphorsäure 946.
- Ragona-Seina, Längstreifen im Sonnenspectrum 198.
- Ragsky, Erkennung von Chloroform im Blut 992; Wasser artesischer Brunnen zu Wien 994.
- Rammelsberg, phosphors. Lithion 838; Existenz von Doppelsalzen des schwefels. Lithions 394; Ferrocyan kupfer und Ferrocyan kupferkalium 478; Verhalten der Cyanverbindungen in höheren Temperaturen 486; Quecksilber-platincyanür mit salpeters. Quecksilberoxydul 484; Ocker der Quellen zu Alexisbad 1012, 1016; Asche der Flachspflanze 1075, von Raps und Erbsen 1076; polymere Isomorphie 1147; Heteromerie 1149; Mineralsysteme 1152; Crednerit 1164; Uebersicht der natürlichen Silicate 1169; Epidot 1175; Gehlenit 1179; Steinmark 1185; Apophyllit 1187; Chlorophyllit 1192; Pinit 1192; Hisingerit 1194; schillerspathähnliches Mineral 1195; Pikrolith 1195; wolframartiges Mineral 1212; Condurrit 1214; Chiolith 1227; Meteorstein von Juvenas 1298; Meteorstein von Beclägen 1304.
- Ransom, Schiefesbaumwolle 1122 ff.
- Redtenbacher, Taurin und saures schwefl. Aldehyd-Ammoniak 918; vergl. bei Liebig.
- Redwood, Verhinderung des Stossens beim Sieden 93; Rectification der Schwefelsäure 370.
- Roes (Owen), Uebergang des venösen Bluts in arterielles 865.
- van Rees, Vertheilung des Magnetismus in Magnetsäben 289.
- Regnault, Ausdehnung des Quecksilbers 70; spec. Wärme des Wassers bei verschiedenen Temperaturen 86; latente Wärme des Wasserdampfs 87; Hygrometer 100; Zusammendrückbarkeit tropfbarer Flüssigkeiten 133; Zusammendrückbarkeit der Gase 135; spec. Gewicht und Zusammensetzung der atmosphärischen Luft 390; spec. Gewicht des Quecksilbers 445.
- Regnault und Reiset, Athmen 860; Apparat zu Gasanalysen 941.
- Reich (F.), Diamagnetismus 259.
- Reich (G.), Bernsteinsäure in fossilen Hölzern und Braunkohlen 499; Darstellung von Chloroform 680; Kohlenwasserstoff aus dem Bernstein 736; diabetischer Harn 932; Harnsteine 932; gerichtliche Untersuchung auf Arsen 966; Unterscheidung von Rohrzucker und Traubenzucker 985; Asche von fossilem Holz und Coniferenzapfen 1096.
- Reichel, Chinarinde 828.

- Reichenbach, Bildung von Ammoniak aus dem Stickstoff der Atmosphäre 391.
- Reinsch, verfälschtes braunes Catechu 523; Farbstoff einer neuen Kartoffelart und der Beeren von *Ligustrum vulgare* 787; Honigthau 794; *Radix Mei* 825; Erkennung von Strontian vor dem Löthrohr 962; Analyse von Ackererden und Bodenarten 983; Verkupferung von Eisen 1026; Krystallbildungen in Tafelglas 1062; Kartoffelkrankheit 1105; vergl. bei Ricker.
- Reiset, vergl. bei Regnault.
- Rissek, Meteorstaub 1319.
- Rennenkampf, Pflanzenabdrücke in Chalcedon 1162.
- Reuter, vergl. bei van Kerckhoff.
- Rhodium, Verhalten flüchtiger Oele zu Jod 709; Bildung von Gediengen-Kupfer 1154; Titaneisen 1161; Olivin 1173; Phosphorochalcit und Ehlit 1217; Mendipit 1228.
- Richardson, Analyse von roher Soda 1046; Untersuchung von Pflanzenaschen 1097; Asche von Rohrzucker und Melasse 1106; Steinkohlenasche 1120.
- Richter, Zoisit 1174; Kalkspath 1222.
- Ricker, Hesperidin 735.
- Ricker und Reinsch, Angelikasäure in der Moschus- oder Sumbulwurzel 528.
- Rieckher, Rectification der Schwefelsäure 370; Darstellung von Ferridcyankalium 479; valerians. Eisenoxyd 557. 558; Amylverbindungen 698; Mutterlaugen von Salzsäuren 1002.
- Riegel, Fällung von Zinkoxydlösungen durch Schwefelwasserstoff 435; Guajakharz 742; Guajakholz und Guajakharz 828; Verbindung von Gummi mit Bleioxyd 795; Beeren von *Vitis sylvestris* 829; Bestimmung des Kupfers 975, des Säuregehalts in Essig 986; Pyrolusit 1161.
- Riefs, Leitungsvermögen der Flamme 264; Schellak als Isolirmittel 266; Bestimmung electrischer Dichtigkeiten in der Torsionswaage 268; Theorie des electrischen Condensators 270.
- de la Rive, Töne durch den electrischen Strom 158; electrischer Lichtbogen 311. 313.
- Rivière, Hemiëdrie 26.
- Rivot und Phillips, Kupferproceß durch Niederschlagen mit Eisen 1 Leitungsfähigkeit der Gesteine Electricität 1233.
- Robiquet (E.), Identität der Chelidonsäure und Pikrinsäure 539.
- Roche, Dichte des Erdkerns 146; Gestalt der Meeresfläche 147.
- Rochleder, Säuren im Kaffee-, und Paraguaythee 525; Caffein 6.
- Roder, Entfernung des Kupfers Essig 1112.
- Roders, Chinoidin 620.
- Rodier, vergl. bei Becquerel.
- Rogé-Delabarre, citrons. Mag 501.
- Rogers (J. R.), Excremente 934.
- Rogers (R. E. und W. B.), Oxyd von Diamant durch Chromsäure Absorbirbarkeit der Kohlensäure (Wasser und durch Schwefelsäure Bestimmung des Kohlenstoffs im phit 943; Zersetzung von Gest durch Wasser 1245.
- Rollmann, Passivität des Eisens 1.
- Ronalds, photographische Selbstrahlung meteorologischer und meteorischer Phänomene 234; Schwefel Phosphor im Harn 924.
- Rose (G.), Einfluß der Vertheilung die Bestimmung des spec. Gew bei festen Körpern 37; spec. Gew des Eisenglanzes 443; Magnetkies Gabbro 1284.
- Rose (H.), Einfluß hoher Temperaturen auf das spec. Gewicht bei verschiedenen Substanzen 39; spec. Gewicht Magnesia 396, der Beryllerde 398 Thonerde 398, der Tantalssäure der Niobsäure 405, der Pelopsäure des Eisenoxyds 443; isomere Zersetzungen der Phosphorsäure 387. 351. 356 menium 404; Zusammensetzung Schlippe'schen Salzes 481; Modificationen der Zinnsäure 439; Verhalten des Zinks gegen Quecksilberoxydungen 446; goldhaltiges Glas Anwendung des Salznitrials in der mischen Analyse 939; Erkennen Phosphorsäure 945; Trennung Phosphorsäure und Pyrophosphor 947; Bestimmung des Molybdäns Trennung von Zinn und Antimon von Nickel und Kobalt 973, des Nickel und Kobalts vom Mangan von Nickeloxyd und Thonerde

- Aschenanalyse 977; Columbit (Tantalit) 1207. 1208; Samarskit 1209.
- Roselaur und Lavaux, Versilberung und Vergoldung 1024.
- Rosengarten, Einwirkung von Salpetersäure auf Brucin 632; Willemitt 1173; Eisenspath 1224.
- Roucher und Coulier, Einwirkung verschiedener Substanzen auf das Blut 866.
- Rousseau, Porcellanversilberung 1067.
- Roux, Zusammensetzung eines Osteosarcoms 935.
- Roux (Vital), Heizung der Porcellanöfen mit Steinkohlen 1066.
- Rowney, Analyse von böhmischem Glas 1062; vergl. bei Abel.
- Rowney und Blow, Asche des Orangenbaums 1075.
- Rudberg, über die Wärmemenge in Metallgemischen 70.
- de la Rue (Warren), Untersuchung der Cochenille 788; Absorptionsapparat zur Stickstoffbestimmung 956.
- Ruickholdt, Corydalin 643.
- Ruspini, Darstellung von Mannit 793.
- Russell, Einfluß der Richtung einer sich schnell bewegenden Schallquelle auf die Höhe des Tons 159.
- Saalmüller, fette Säuren des Ricinusöls 562.
- Sacc, Atomgewicht des Selens 378; flüssiges Chlorselen 379; Ernährung von Hühnern 864.
- Sachsenheim, neue Form von Fahlerz 1160.
- Saint-Evre, Zersetzungsproducte der Benzoesäure 528; fette Säuren des Cocosnufsöls 560; Zersetzung des Jodoforms durch Cyan 681.
- Saint-Preuve, Verbesserung des parabolischen Pendels 151; Uhr mit conischem Pendel 151.
- Saint-Venant, Gleichgewicht starrer Körper 125; Theorie des Widerstandes in Flüssigkeiten 145.
- Salm-Horstmar, Thonerdegehalt der Pflanzen 1097.
- Salvetat, Steinzeug 1068; Kieselguhr 1163; vergl. bei Damour.
- Sandberger, Geisirwasser 1257; Dolomitbildung 1292.
- Sandras, vergl. bei Bouchardat.
- Sandrock, Einwirkung von Schwefelsäure auf Gußeisen 442.
- Sartorius, Speiskobalt 1155.
- Sartorius von Waltershausen, Pagonalit 1193; vulkanische Salmiakbildung 1253; Einfluß des Drucks auf chemische Action 1261.
- Saweljew, electrische Polarisation 298.
- Scanlan, Jodeyan in käuflichem Jod 380.
- Schaffgotsch, spec. Gewicht des Selens 378.
- Schafhäutl, Aräometerpipette 149; Phosphor und Arsen im Eisen 1020; Meteorstein von Schönenberg 1308.
- Scharling, feste Säuren des Ricinusöls 564; Düglingsthran 567.
- Schaeffele, vergl. bei Chevallier.
- Scheerer, Atomgewicht der Magnesia 896; polymere Isomorphie 1147; Neolith 1191; Wöhlerit 1203; Enkolith 1203; Euxenit und Polykras 1206; Entstehungsweise des Granits 1264.
- Scherer, Amniosflüssigkeit 895.
- Schleiden, Asche der Sassaaparilla-wurzel 1095.
- Schleiden und E. Schmid, Entwicklung der Wickenpflanze 1076.
- Schlieper, Oxydation der Harnsäure durch Ferridcyankalium und Kali 581.
- Schloesing, Nicotin 612.
- Schlofsberger, Bildung von Vivianit 443; Kreatingehalt menschlicher Muskeln 879. 887; Färbung des Harns nach Genuß von Rhabarber 929; Verhältniß des Stickstoffgehaltes der Ernte zu dem des Düngers 1069; Malztaig als Brodsurrogat 1104.
- Schmid (E.), Stickstoffbestimmung 956; Chrysotil 1196; vergl. bei Schleiden.
- Schmidt (C.), Mikrokrystallometrie 28; Gährung 468; Vorkommen und Krystallisation des oxals. Kalks 499; spec. Gewicht thierischer Substanzen 837; Säure des Magensafts 864; Transsudation 894.
- Schmidt (E.) und Hecker, Schießbaumwolle 1130 ff.
- Schnabel, nickelhaltige Hüttenproducte 1039; Speiskobalt 1155; Kalkspath 1221; Sphärosiderit 1224; Mendipit 1228; Muschelkalk 1294.
- Schnedermann, vergl. bei Knop.
- Schneider (Fr.), Gasentwicklung in Erzminen 1251.
- Schneider (W. G.), Meteoreisen von Seelägen 1304.
- Schneider (?), Schwefelsäurefabrikation 1041.

- Schneider (?), natürl. Goldamalgam 1153; Agalmatolith 1171.
- Schönbein, Empfindlichkeit einer Mischung von Stärkekleister und Jodblei gegen das Licht 229; Gasbatterien 281; Einwirkung von Ozon, Chlor und Brom auf Mangan- und Bleisalz 829; Ozon 880; verschiedene Zustände des Sauerstoffs 330; Einwirkung vegetabilischer Kohle auf Chlor, Salpetersäure u. a. 338; Geruch des Phosphors 337; Stickoxyd und salpetrige Säure 383; Salpeterschwefelsäure 387; Uebermangansäure 421; Arsengeruch 421; Gusakharz 742; Anwendung v. Ozon als Reagens 952. 968; Schiefsbaumwolle 1128 ff.; Einwirkung von Salpeterschwefelsäure auf Zucker 1146.
- Schönbein und Böttger, Schiefsbaumwolle 1134 ff.
- Schrötter, amorpher Phosphor 336; amorpher Schwefel 866.
- Schulze (F.), Amidulin 794.
- Schulze (H.), Agrostemmin 645.
- Schumacher, Ausdehnung des Eises 60.
- Schunck, Identität der Chrysolepinsäure und der Pikrinsäure 539; Chrysaminsäure 541; Farbstoffe der Flechten 764; Farbstoffe der Krappwurzel 767; Krappfarben 1128.
- Schwarz, Mellithsäure 497.
- Schwarz und Böhme, Aetzflüssigkeit für Kupfer und Stahl 1027.
- Schwarzenberg, phosphors. Silberoxyd 345; Pyrophosphorsäure 345; oxals. Wismuthoxyd 499; weins. Wismuthoxyd-Kali 507.
- Schweizer, neuer Körper im rohen Holzgeist 669.
- Sckeyde, Chininverfälschung 617.
- Scoffren, Zuckerläuterung 1106.
- Scott Russell, vergl. Russell.
- Seebeck, Tonschwingungen von Stäben und Saiten 155.
- Segond, Klang der menschlichen Stimme 160.
- Seguin, mechanisches Aequivalent der Wärme 57; Zusammenhang der Molecul 137; Bericht über die Photographie 233.
- Semmola, blauer Harn 930.
- Senarmont, Wärmeleitung in Krystallen 101; Zurückwerfung des Lichtes an metallisch-undurchsichtigen Krystallen 180.
- Sequard, vergl. Brown-Sequard.
- Serres, Marcel de, vergl. Marc Serres.
- Serret, allgemeine Bewegungslehre
- Shepard, natürliches Wismuthgold
- Arkansit 1160; Williamsit 1195; 1
- Nickelmagnetit 1226; amerik. Meteoriten 1808; Bestandtheil Aërolithen 1314.
- Shepherd, Vorkommen von Ged Kupfer 1154.
- Shier, Stärkmehlgehalt verschiedener Pflanzen 794.
- Shortrede, Formeln für die Span des Wasserdampfs 96.
- Siemens, Selenmercaptopan 684.
- Siemerling, Darstellung von C form 680.
- Siemianowsky, Ankerit 1222.
- Silbermann, Haidingersche F büschel 205; Bestimmung des holgehaltes von Flüssigkeiten durch Ausdehnung 684; vergl. bei F
- Sillem, Pseudomorphosen 1229.
- Silliman d. j., Nickelsmaragd Meteorstein von Concord (New shire) 1318.
- Silliman d. j. und Hunt, Meteor von Texas und Lockport 1313.
- Smaasen, dynamisches Gleich der Electricität in einem Körper im unbegrenzten Raum 292.
- Sméd, Erkennung des Guajak in andern Harzen 742.
- Smith (A.), Hydrate der Salpeter 386.
- Smith (L.), Gefrieren des Wassers im luftleeren Raum 91; Medjidiit Liebigit 1226.
- Smith (R. A.), Bestandtheile der geathmeten Luft 390; Regenwasser
- Sobrero, Knall-Mannit 1145.
- Soleil, Argand'sche Lampe für optische Versuche 212; optischer Sa meter 213.
- Solly, zersetzende Kraft des Wasserdampfs 332.
- Sonnenschein, Trennung der Metalle von den Alkalien 961.
- Sorby, Schwefel- und Phosphor der Pflanzen 833.
- Soubeyran, Darstellung und Eigenschaften von Chloroform 680. 681; Percha 743; Pektin 796.
- Spatzier, Chininsurrogate 617.

- Städeler, Untersuchung der Anacardiumfrüchte 574; Absorption d. Sauerstoffgases durch Kalilauge 943.
- Stas, Acetal 696.
- Stedler, Meteorsteine 1307.
- Stein, Handorgel 160.
- Stein (in Dresden), nasse Versilberung 1024.
- Stenhouse, Zersetzungsproducte der Anilsäure 538; Chlorpikrin 539; Farbstoffe der Flechten 750.
- Stokes, Schallgeschwindigkeit in der Luft 154; Aberration des Lichtes 166; über den Fleck in der Mitte der Newton'schen Farbenringe 192.
- Strahl und Lieberkühn, Harnsäure im Blut 869.
- Strecker, Zusammensetzung der festen Säure im Behenöl 569; Zersetzung der Hippursäure durch Salpetersäure und Stickoxyd 584; gepaarte Verbindungen 609; Farbstoffe der Flechten 763; Zersetzung des Glycocolls durch Salpetersäure und Stickoxyd 845; Untersuchung der Ochsen-galle 896; Trennung des Nickels und Kobalts vom Mangan 974; Erkennung der Milchsäure 986; vergl. bei Gundelach.
- Stresemann, Chininverfälschung 617.
- Struve, vergl. bei Fritzsche und bei Döpping.
- Sturm, allgemeine Bewegungslehre 137.
- Suckow, Pseudomorphosen 1229.
- Svanberg (A. F.), electriche Polarisation 295 ff.; electromotorische Kraft der Daniell'schen Kette 299.
- Svanberg (L.), Atomgew. des Quecksilbers 445; Einwirkung von Salpeterschwefelsäure auf Zucker und Gummi 1146.
- Svanberg (L.) und Kolmodin, flüssige Säure des Ricinusöls 564.
- Svanberg (L.) und Nordenfeldt, Atomgewicht des Magnesiums 396.
- Svanberg (L.) und Struve, Atomgew. des Molybdäns und molybdänsaure Salze 408; Erkennung der Phosphorsäure 945.
- Swan, Veränderung der Form der Oberfläche von Flüssigkeiten durch andre, und Capillaritätshöhe 12; spec. Gew. des Chloroforms 681.
- Taddei, Zersetzung von essigs. Bleioxyd durch Kali 548.
- Taupenot, verbesserter Heber u. and. Apparate 941.
- Taylor (A.), Erkennung der Blausäure 987.
- Taylor (A. S.), Erzeugung von Elementen im Ei 860.
- Taylor (H.), scheinbare Bewegung blauer und rother Punkte auf rothem und blauem Grund 219.
- Taylor (Th.), Angabe verschiedener Apparate 941; Absorptionsapparat zur Stickstoffbestimmung 956.
- Tchihatscheff, Vorkommen von Smirgel 1161.
- Teschemacher, Schiefsbaumwolle 1137 ff.
- Teschemacher und Porret, Schiefsbaumwolle 1135 ff.
- Thénard (P.), phosphorhaltige organische Basen 645.
- Thirault, Bildung und Darstellung von Valeriansäure 556.
- Thompson (L.), Darstellung von chlors. Baryt 381; Bildung der Oxalsäure aus Rohrzucker 498; kohlen. Ammoniak in der ausgeathmeten Luft 863; Prüfung von Mineralien auf Arsen-, Molybdän- u. a. Säuren 965; Knallzucker 1146.
- Thomson, Legirungen von Blei, Zinn, Wismuth und Zink 1040.
- Tilghmann, zersetzende Kraft des heißen Wasserdampfs 331; Schwefelsäurefabrikation 1043; Sodafabrikation 1052; Darstellung chroms. Salze 1056.
- Tilley, Oenanthol und Zersetzungsproducte desselben 566.
- Timmermans, Trägheitsmomente 137.
- Tourmentin, Bleiweißfabrikation 1058.
- Traube, Chromverbindungen 414. 415. 416.
- Trez, selens. Kali in käuflichem Jodkalium 380.
- Troost, amerikanisches Meteoreisen 1814.
- Turnbull, Gerberei 1128.
- Tyrtov, electriche Entwicklung von Licht und Wärme 309.
- Ulex, zweifach - kohlen. Ammoniak in Guano 392; Struvit 1218.
- Ulrich, Vorkommen von Gold 1153.
- Unger, Sodafabrikation 1044.
- Ure, Bestimmung des Alkoholgehaltes von Flüssigkeiten durch den Siedepunkt 683; Mineralwasser von Ten-

- bury 1010; Entsäuerung von Wein 1109.
 Usiglio, Meerwasser 999.
- Valée, über das Auge 213; Achromatismus des Auges 214.
- Vaux, Untersuchung der britischen Kohlen 1114.
- Venghaufs, Nierensteine 933.
- Vidi, Aneroidbarometer 150.
- Vierordt, Endosmose 15.
- Villain, Mehlverfälschung 1103.
- Vincent, Unterscheidung der Faser von Phormium tenax 1122.
- Violette, Verkohlung des Holzes durch Dampf 1120.
- Virlet, Imatrasteine 1297.
- Virlet d'Aoust, Granit und Gneufs 1271.
- Voegeli, Verbindungen von Aethyloxyd und Phosphorsäure 694.
- Voelcker (A.), Schildpatt 936; Vorkommen von Kobalt in Braunstein 1161.
- Vogel (A.) d. j., Zersetzung des Quecksilberchlorürs 448; Bienenwachs 701; Meerschwamm 937.
- Vogel (J. M.), Beziehungen der Mineralquellenbildung zur Gebirgsmetamorphose 1249.
- Vohl, Album Graecum 934; Bestimmung der Kohlensäure 944; Bestimmung des Chroms 964.
- Volger, über die Lichtflamme 163; Ueberzüge von Kupferkies auf Schwarzgültigerz 1160.
- de Vry, Darstellung von chloriger Säure 381; Bildung von Cyanursäure 488; Einwirkung chloriger Säure auf Protein und Leim 836; Braunsteinprobe 965.
- Wackenroder, Verhalten des Jodkaliums gegen Schwefelsäure 380; Darstellung chlorfreier Salpetersäure 385; Bildung von Buttersäure bei der Milchsäuregährung 554; Corydalin 644; Darstellung von Chloroform 680, von absolutem Alkohol 682; Erkennung des Ammoniaks 959; Aschenanalyse 979.
- Wächter, Email zum Löthen von Porcellan 1061; Schmelzfarben 1067.
- Wagner (R.), Löslichkeit des Chlornatriums in Weingeist 394; Hefe 470.
- Walz, Digitalin 644; Verunreinigten Santonins 812; I 824; Untersuchung von The Weinsteinen, Most und Weinb 1083.
- Wartmann, Töne durch elektrischen Strom 157; Längsstri Sonnenspectrum 198; Wirkung Magnetismus auf die strahlende 247; Untersuchungen über Inderscheinungen 321; Schiefsbaum 1144.
- Watts, Hopfenasche 1077.
- Weber (R.), Bestimmung der Phosphorsäure 946.
- Weber (W.), Diamagnetismus 21 (vergl. bei Poggendorff); 1 dynamik 316.
- Weidenbusch, Einwirkung von Alkalien auf Aldehyd 548 min aus Fisch- und Hühner 840; Bestimmung des Schwere organischen Substanzen 949.
- Weifs (C. S.), Meteoriteisen von 1300.
- Weifs (?), Schiefsbaumwolle 114
- Wertheim, Elasticität und Zusammenrückbarkeit fester Körper 127 sticität und Cohäsion von G des menschlichen Körpers 130 sticitätscoefficient und Drehungen 138; Schallgeschwindigkeit Flüssigkeiten 152; Töne durch electrischen Strom 156.
- Wertheim und Chevandier, Elasticität und Festigkeit des Glases mechanische Eigenschaften verschiedener Holzarten 129.
- Werther, phosphors. und arsens oxyd 419; Bestimmung des 966; Uranglimmer 1218.
- Westhead, geschwefeltes Caen 743.
- Wetherill, Gerbsäure 523; schwefl. Chinin 615; sch Aethyloxyd 692.
- Wetherill und Boyé, Magen eines Pferdes 864.
- Wetzlar, Passivität des Eisens
- Whitney, Rothzinkerz 1160; J 1180; Chlorastrolith 1188; S. Nöscan, Haun., Ittnerit und 1 nit 1201.
- Wiedemann, Zersetzungsproducte Harnstoffs 855.

- Will (Fr.), Ameisensäure in Raupen 546.
- Will (Fr.) und Gorup-Besanez, Guanin in Spinnenkoth 935.
- Will (H.), Verhalten flüchtiger Oele zu Jod 709; Mineralwasser von Rippoldsau 1002; Arsen u. a. in Mineralwasser 1015.
- Wille, nickelhaltige Hüttenproducte 1038.
- Williams, künstliches Haar 1127.
- Williamson, Ozontheorie 329; Oenanthol und Zersetzungsproducte desselben 565.
- Wilson, Veränderung der Form der Oberfläche von Flüssigkeiten durch andre 11; Zersetzung des Wassers durch Hitze 326; Verhalten wasserfreier Säuren gegen Pflanzenfarben 327.
- Winckler, citrons. Magnesia 501; Chininverfälschung 617; Chininsurrogate 617; Veränderung des Cinchonins durch Schwefelsäure 619; Chinoidin 620; Chinidin 620; Chinarinde 828.
- Winnertl, Uhr mit conischem Pendel 151.
- Witting, Mineralwasser von Levern und von Lippspringe 1004.
- Wittstein, Darstellung chlorfreier Salpetersäure 385; Löslichkeit des Kalks in Wasser 395; Zersetzung von Eisenvitriollösung 443; gerbs. Eisenoxyd 525; Zersetzung des Liquor ferri acetici oxydati und der Tinctura ferri acetici aetherea Klaprothii 548; valerians. Zinkoxyd und Eisenoxyd 557; valerians. Wismuthoxyd 558; Farbstoff der Pflanzenblätter 787; Harnsteine einer Hündin 932; Asche von Vitis hederacea 1082; Thonerdegehalt der Pflanzen 1097.
- Wöhler, Verhalten des Zinks zu seleniger Säure 435; Cyanursäure 489; kakodylähnliche Verbindung aus Buttersäure 494; Chinon 522; Einwirkung von Säuren auf Amygdalin 820; Harnstoff im Auge 855; Castoreum 895; Pyrochlor 1205.
- Wöhler und Frerichs, Uebergang verschiedener Stoffe in den Harn 929.
- Woestyn, spec. Wärme chemischer Verbindungen 85.
- Wolff (E.), Untersuchung des Rofskastanienbaums 1078.
- Wurtz, Schwefelphosphorsäure 362; Phosphoroxychlorid 364; Chlorcyanwasserstoff und flüssiges Chlorcyan 475; Darstellung von Cyanursäure 488; cyanurs. und cyans. Methyloxyd 679; cyanurs. und cyans. Aethyloxyd 691.
- Wydler, vergl. bei Bolley.
- Yorke, Verbindungen von Schwefelgold mit Schwefelkalium und Schwefelnatrium 451.
- Zantedeschi, Längsstreifen im Sonnenspectrum 198; Magnetismus 263.
- Zenneck, Kürbisfrucht 830.
- Ziervogel, Ausbringen des Silbers ohne Quecksilber 1024.
- Zwenger, Kobaltcyanverbindungen 479; Cholesterin 920.

Sachregister.

Anal.	bedeutet Analyse.	lat. Schmelzw.	bedeutet latente Schmelzwärme
Ausd.	• Ausdehnung durch die Wärme.	Schmelzp.	• Schmelzpunkt.
Best.	• Bestimmung.	Siedep.	• Siedepunkt.
Bild.	• Bildung.	sp. G.	• specifisches Gewicht
Const.	• Constitution.	sp. W.	• specifische Wärme.
Darst.	• Darstellung.	Unters.	• Untersuchung.
Einw.	• Einwirkung.	Untersch.	• Unterscheidung.
Erk.	• Erkennung.	Verh.	• Verhalten.
Krystallf.	• Krystallform.	Zers.	• Zersetzung.
lat. Dampf.	• latente Dampfwärme.		

Nicht alle im Jahresbericht beschriebenen Salze, Aether u. a. sind in diesem Register aufgezählt. gezählten Salze stehen alle unter dem Namen der Säure oder des Salzbilders.

- Aberration des Lichts 166.
 Absorptionsvermögen von thierischer Haut gegen Flüssigkeiten 19.
 Acetal 696.
 Acetamid 586.
 Aceton, Ausd., sp. G. und Siedep. 66; sp. W. 86.
 Acetone der Säuren $C_n H_n O_n$, Const. 544.
 Acetonitryl 592, identisch mit Cyanmethy 593.
 Acetylmercaptan 550.
 Ackererde, Analyse 983.
 Adstringirende Extracte 522.
 Aepfels. Ammoniak, saures, Krystallf. 500.
 Aepfels. Kalk 500.
 Aequivalente, endosmotische, 16; mechanisches der Wärme 56.
 Aërolithen, vergl. Meteorsteine.
 Aërophor 862.
 Aesculus hippocastanum vergl. Roßkastanie.
 Aethalalkohol, Siedep. und lat. Dampf. 91.
 Aether, Ausd. 61. 66; Capillaritätshöhe 6; lat. Dampf. 89. 91; Schallgeschwindigkeit darin 154; Siedep. 61. 66. 89. 91; sp. G. 61. 66; sp. W. 89; Zusammendrückbarkeit 135; K von Substitutionsproducten des Aetherarten, Zers. der Substituteducte zusammengesetzter - 689
 Aetherisation, Einfluß auf die 2 Bluts 870.
 Aethermellithsäure 497.
 Aetherphosphorsäure 694.
 Aetherschweifelposphorsäure 695
 Aetherschweifelsäure, Bild. 693; fr Zers. der Salze 693.
 Aethyloxyd, vergl. Aether.
 Aethyloxydhydrat, vergl. Alkohol
 Aethyloxyd-Schwefelkohlenstoff (oxyd-Sulfocarbonat) 690.
 Aethylunterschwefelsäure 687.
 Aethylverbindungen 682.
 Aetzflüssigkeit für Kupfer und Stahl
 Agalmatolith 1171.
 Agriculturchemie 1069.
 Agrostemmin 645.
 Akustik 152; physiologische - 1
 Akumeter 169.
 Alaun, Bildung 1256; vergl. sc Thonerde-Kali.
 Alaunerde, vergl. Thonerde.
 Albumin, Schwefelgehalt 836; sp.

- Zers. mit Manganhyperoxyd und Schwefelsäure 853, mit zweifach-chroms. Kali und Schwefelsäure 854; Veränderung bei der Verdauung 864; - aus Fisch- und Hühnerfleisch 840; lösliches - der Fische 841.
- Album graecum 934.
- Aldehyd (der Essigsäure), Bild. 848. 854; Ausd., sp. G. und Siedep. 66; Einw. von Säuren und Alkalien 548.
- Aldehyd der Buttersäure 849. 854.
- Aldehyd der Metacetonsäure 848.
- Algarothpulver 426.
- Alizarin 768. 772. 778.
- Alizarinsäure 773.
- Alkannagrün 747.
- Alkannaroth 747.
- Alkannawurzel, falsche, Farbstoffe darin 746.
- Alkohol, Darst. 682; Ausd. 61. 66; Capillaritätshöhe 6; lat. Dampf. 89. 91; Schallgeschwindigkeit darin 154; Siedep. 61. 66. 89. 91; sp. G. 61. 66. 682; sp. W. 86. 89; Zusammendrückbarkeit 135. Siedep. der Mischungen mit Wasser 683, sp. G. derselben 682, Capillaritätshöhe 6; Bestimmung des Alkoholgehalts von Flüssigkeiten durch den Siedep. 663, durch die Ausd. 684.
- Allanit 1176.
- Allantoin, Bild. 582; Zers. durch Kali 583; Veränderung beim Uebergang in den Harn 929.
- Alloxan, Veränderung beim Uebergang in den Harn 929.
- Alloxantin, Veränderung beim Uebergang in den Harn 929.
- Alluaudit 1216.
- Aloëinsäure 542.
- Alphaharz des Krapps 770. 776.
- Alpha-Orcin 762.
- Alpha-Orsellinsäure (alpha-orsellesic acid) 751 (vergl. auch 763 ff.).
- Alpha-Orsellinsäure 750 (vergl. auch 763 ff.).
- Amalgame, sp. G. 393 (vergl. die einzelnen).
- Ameisensäure, Bild. 881. 546. 850. 853. 854; Darst. 546; Vork. 545. 546; Ausd. u. sp. G. 67; lat. Dampf. 91; Siedep. 67. 91; sp. W. 86; Ausd. der wässrigen 68.
- Ameisens. Aethyloxyd, Ausd. 61. 67; lat. Dampf. 89; Siedep. 61. 67. 89; sp. G. 61. 67; sp. W. 86. 89; Substitutionsproduct desselben 675.
- Ameisens. Kali, saures, 546.
- Ameisens. Methyloxyd, Ausd. u. sp. G. 67; lat. Dampf. 89; Siedep. 67. 89; Einw. v. Chlor 675; Substitutionsproducte desselben 675.
- Ameisens. Natron, saures, 546.
- Amethyst, Pleochroismus desselben 202.
- Ami des pauvres (Kürbisfrucht) 830.
- Amide 585.
- Amidochrysamminsäure 542.
- Amidulin 794.
- Ammoniak, Bild. aus Salpetersäure 391, aus dem Stickstoff der Atmosphäre 391; Erkennung 959.
- Ammoniakalaun, vergl. schwefels. Thonerde-Ammoniak.
- Ammoniaksalze 392 (vergl. bei den einzelnen Säuren).
- Ammoniumkupfercyanür 478.
- Amygdalin, Einw. v. Säuren 820; Veränderung bei dem Uebergang in den Harn 929.
- Amygdalinsäureäther 821.
- Amyläther 698.
- Amyloxyd, Siedep. u. lat. Dampf. 91.
- Amyloxydhydrat (Fuselalkohol, Kartoffelfuselöl) 698; Ausd. 62. 66; lat. Dampf. 91; Siedep. 62. 66. 91; sp. G. 62. 66; sp. W. 86.
- Amyloxyd - Schwefelkohlenstoff (Amyloxyd-Sulfocarbonat) 700.
- Amylverbindungen 698.
- Anacardiumfrüchte 574.
- Anacardsäure 574.
- Ananas, Asche, No. 102 u. 103 der Tab. zu S. 1074.
- Anchusa tinctoria, Farbstoff der, 746.
- Anchusin 747.
- Andesin 1183.
- Anemometer 151.
- Aneroidbarometer 150.
- Angelikasäure, Vork. 528. 718.
- Anhydrit, Bildung 1294.
- Anilidverbindungen 596.
- Anilin 654; daraus hervorgehende Basen 656; - mit Platinchlorür 656; Veränderung des - bei dem Uebergang in den Harn 929.
- Anilsäure, Zersetzungsproducte 538.
- Anisamid 588.
- Anisanilid 610.
- Anisöl, Ausbeute und sp. G. 708; Verh. zu Jod 709.
- Anissäure, Zers. durch Salpetersäure 586, durch Salpeterschwefelsäure 537, durch Phosphorchlorid 538.
- Ankerit 1222.

- Anthemis nobilis, flüchtiges Oel der - 718.
 Anthranilsäure 607.
 Antichlor 1123.
 Antimon, Darst. von arsenfreiem 425;
 Trennung von Zinn 969, von Arsen
 969; Untersch. der Antimonflecken
 von Arsenflecken 967.
 Antimonoxychlorüre 426.
 Antimonoxyd, Darst. 426; Dimorphismus
 422; -verbindungen 426.
 Antimonsäure 428.
 Antimonyl 428.
 Apatoid 1315.
 Apfel, Asche, No. 132 der Tabelle zu
 S. 1074.
 Apophyllit 1187.
 Apparate, akustische 160, mechanische
 149, optische 211.
 Ariometerpipette 149.
 Arkansit 1160.
 Arkose 1283.
 Arsen, Vork. in Mineralwassern 1013,
 in Eisen 1020; Geruch 421; Erk. 965.
 966; Bestimmung 965; Fällbarkeit
 durch Schwefelwasserstoff 421; Unter-
 sch. der Arsenflecken von Antimon-
 flecken 967; Trennung von Zinn 968,
 von Antimon 969.
 Arsenfarben, Ersatzmittel für grüne 1058.
 Arsenige Säure 422; sp. G. 41; Di-
 morphismus 422; Wirkung auf Pflan-
 zen 822.
 Arsensäure, sp. G. 41; Verb. mit Uran-
 oxyd 419.
 Arterien, Elasticität und Cohäsion der,
 130.
 Artischoke, Asche, No. 133 der Tab.
 zu S. 1074.
 Aschen, Analyse 976; Zus. verschiedener
 Pflanzen- 1074 ff.
 Asparagin 816.
 Asparaginsäure 817.
 Athmen 860.
 Atmidoscop 100.
 Atmosphäre, Optik derselben 208 (vergl.
 Luft, atmosphärische).
 Auge, Bau und optische Eigenschaften
 213. 214; Fehler desselben 215.
 Augit 1172.
 Auflösung, Wärmeabsorption bei der von
 Salzen in Wasser 53.
 Aurichalcit 1226.
 Ausdehnung fester Körper durch die
 Wärme 57, tropfbar flüssiger 60.
 Ausflugeschwindigkeit von Flüssigkeiten
 aus engen Röhren 139.
 Avenin 844.
 Aventuringlas, Zus. 1060.
 Bad für verschiedene Temperature
 Bagrationit 1174.
 Baldrianöl, -säure u. s. w. vergl.
 rianöl, -säure u. s. w.
 Ballistik 138.
 Balsame 736; Veränderung des p
 nischen bei dem Uebergange i
 Harn 929.
 Barometer 151; Aneroid- 150; Red
 der -beobachtungen auf 0° 70.
 Baryt, sp. G. 41.
 Barythydrat : BaO, HO, sp. G.
 BaO, 9HO, sp. G. 41.
 Baryum, Atomgew. 394.
 Basen, Wärmeentwicklung bei Ver
 Säuren 52.
 Basen, organische 612; phosphor
 645; im Oleum animale Dippeli
 Untersch. mittelst des Mikrosco
 Constitution 668.
 Baulit 1180.
 Baumwolle, sp. G. 39; Zus. 11;
 Untersch. von Leinen 1121, von S
 baumwolle 1137.
 Behenöl, Säuren in demselben 569
 Benzilsäure, Zers. durch Phosphor
 536.
 Benzin, vergl. Benzol.
 Benzoësäure, Bild. 528. 713. 851
 854; Vork. 895; Zersetzungspr
 528—533.
 Benzoës. Aethyloxyd, Bild. 465;
 änderung bei dem Uebergang i
 Harn 929.
 Benzoës. Amyloxyd 699.
 Benzol 711; Ausd., sp. G. und S
 66; sp. W. 86.
 Benzonitryl, Einw. von Schwefelw
 stoff 595.
 Berberin 635.
 Bergtheer 1229.
 Bernstein, fester Kohlenwassersto
 demselben 736.
 Bernsteinsäure, Bild. 817; Vork
 Darst. 499.
 Berthierit 1159.
 Beryllerde, sp. G. 398.
 Beta vulgaris, Untera. der Wurzel
 Asche derselben 1075.
 Betaharz des Krapps 769. 777.
 Beta-Orcin 762 (vergl. auch 763 f
 Beta-Orsellinsäure (beta-orsellesic
 753 (vergl. auch 763 ff.).

- Beta-Orsellsäure 752 (vergl. auch 763 ff.).
 Bewegung starrer Körper 138, tropfbar-
 flüssiger 139, gasförmiger 146.
 Bewegungslehre 123, allgemeine 137.
 Biätherphosphorsäure 694.
 Biere, Anal. der Asche englischer, 1112.
 Binitranisol 536.
 Binitrobenzoesäure 533.
 Binitrogaultheriasäure 677.
 Binitrosalicylsäure 678.
 Birn, Asche, No. 131 der Tab. zu S. 1074.
 Bittererde, vergl. Magnesia.
 Bittermandelöl 710; Bild. 850. 853. 854;
 Zers. durch Phosphorchlorid 711;
 Veränderung bei dem Uebergang in
 den Harn 929.
 Bitterspath 1222.
 Biuret 856.
 Blättertellur 1154.
 Blausäure, Darst. 474; Erk. 987.
 Blei, Schmelzp. 71. 72. 81; sp. W. und
 lat. Schmelzw. 72. 81; electr. Lei-
 tungsvermögen 289; Vork. im Thier-
 körper 874; Untersch. von Wismuth
 970.
 Bleilegirungen, vergl. Legirungen.
 Bleioxyd, sp. G. 41. 58; Ausd. 58;
 Verb. mit Jodblei 442.
 Bleiweißfabrikation 1057.
 Blumenkohl, Asche, No. 113 der Tab.
 zu S. 1074.
 Blut, arterielles und venöses 865; Einw.
 verschiedener Substanzen auf dasselbe
 866; - Neugeborener 867, des Menschen
 und verschiedener Thiere im normalen
 Zustand 868, im kranken Zustand
 869, niederer Thiere 871, nach Ae-
 therisation 870; Abhängigkeit des
 Fettgehalts von dem der Nahrungs-
 mittel 869; Gehalt an Kohlensäure
 oder kohlen. Alkali 872; Gehalt an
 Kupfer, Blei u. a. 875.
 Blutasche 873.
 Blutflecken, Erk. 993.
 Blutkörperchen, sp. G. 837 (vgl. bei Blut).
 Blutlaugensalzfabrikation 1056.
 Bodenarten, Art der Anal. 983; Anal.
 1073 ff.
 Bodenit 1177.
 Boheensäure 527.
 Bohnerz 1164.
 Bohnen, Asche, No. 122 der Tab. zu
 S. 1074.
 Boracit 1226.
 Borax, vergl. bors. Natron.
 Boraxweinstein 507.
 Bors. Kupferoxyd als grüne Farbe 1059.
 Bors. Natron : NaO, 2 BO₃, sp. G. 41;
 NaO, 2 BO₃ + 10 HO sp. G. 41;
 NaO, 4 BO₃ + 10 HO 335.
 Bors. Salze, Zus. derselben 335.
 Brandisit 1197.
 Branntwein, Entfälschung 1111.
 Brassica rapa, Asche der Blätter 1075.
 Braunkohlen, Zus. 1112 ff.
 Braunstein 1161; -probe 965.
 Brechung des Lichts, vergl. Licht.
 Brennnlinien 197.
 Brennmaterial, Unters. von altem 569.
 Brennstoffe 1112 ff.
 Brenzweinsäure, vergl. Pyroweinsäure.
 Brokolikohl, Asche, No. 111 u. 112 der
 Tab. zu S. 1074.
 Brom, Ausd. 63; lat. Dampfw. 89;
 Siedep. 63. 89; sp. G. 63; sp. W.
 86. 89; Best. 952; Erk. 954; Ver-
 unreinigung von käuflichem mit Brom-
 kohlenstoff 380.
 Bromäthyl, Ausd., sp. G. und Siedep. 61.
 Brombrucin 629.
 Bromchlorkohlenstoff C₂Br₂Cl₂, Krystallf.
 686.
 Bromcinchonin 618.
 Bromelal (C₂H₃Br₂), Ausd., sp. G. und
 Siedep. 63.
 Bromitonsäure 504.
 Bromkohlenstoff CBr₄ in käuflichem Jod
 380.
 Brommethyl 672; Ausd., sp. G. und
 Siedep. 61.
 Bromoform 501.
 Brom-Orcin 760.
 Bromotriconsäure 503.
 Bromoxaform 502.
 Bromphosphor (PBr₃), Ausd., sp. G.
 und Siedep. 62.
 Bromsilber, Zers. durch Schwefel- und
 Arsenmetalle 450.
 Bromsilicium (SiBr₄), Ausd., sp. G. und
 Siedep. 63.
 Brom-Strychnin 628.
 Bronze, griechische 1034, chinesische
 1035, galvanische 1035.
 Brucin 628; Zers. durch Salpetersäure
 629.
 Brunnenwasser 994.
 Bucklandit 1175. 1176.
 Butteressigsäure, identisch mit Metace-
 tonsäure 551.
 Buttersäure, Vork. und Bild. 512. 545.
 554. 839. 851. 853. 854; Darst. 554;
 Ausd. und sp. G. 67; lat. Dampfw.

- 91; Siedep. 67. 91; sp. W. 86; Untersch. und Trennung von der Valeriansäure 555. 556; Substitutionsproduct 504.
- Butters. Aethyloxyd, Ausd., sp. G. und Siedep. 62. 67.
- Butters. Methyloxyd, Ausd. und sp. G. 62. 67; lat. Dampf. 91; Siedep. 62. 67. 91; sp. W. 86.
- Butters. Salze 556.
- Butyron, Zers. durch Salpetersäure 558.
- Butyronitryl (Cyanmetacetyl) 594.
- Cadmium, lat. Schmelzw. 77; Schmelzp. 71; electr. Leitungsvermögen 289.
- Cadmiumlegirungen, vergl. Legirungen.
- Cadmiumoxyd-Hydrat 486, andere Verbindungen 436.
- Cämenbildung, Einfluß der - auf Gesteinerhärtung 1241.
- Caffein 634.
- Calomel, vergl. Chlorquecksilber.
- Campher, Verh. zu Säuren 734.
- Camphersäure 522.
- Camphoranil 606.
- Camphoranilsäure 606.
- Cancrinit 1201.
- Caoutchouc, geschwefeltes 742.
- Capillaritätshöhe, Abhängigkeit von der Temperatur 1.
- Caprinsäure, Bild. 721; Vork. 560; Eigensch. und Salze 561.
- Capronsäure, Bild. 559. 566. 551; Vork. 560.
- Caprylsäure, Vork. 560.
- Carbanilsäure 607.
- Carbolesäure, Vork. im Castoreum 895, ist giftig 929.
- Carbothialdin 649.
- Cardol 576.
- Carminsäure 789.
- Casein, Veränderung bei der Verdauung 864, bei der Fäulnis 839, mit Manganhypoxyd und Schwefelsäure 847, mit zweifach-chroms. Kali und Schwefelsäure 851; Umwandlung in Fett 840.
- Catechu 522.
- Cerantsäure 570.
- Cerin 1176.
- Cerium, Atomgew. und Verbindungen 897.
- Ceroten, 708.
- Cerotin 707.
- Cerotinsäure 702.
- Cetraria Islandica, Unters. der, 831.
- Chabasit 1188.
- Chalcedon 1182.
- Chalkolith 1218.
- Chantonit 1216.
- Chemie, unorganische 325, organische 465, analytische 929, technische 1
- Chinarinden 828.
- Chinidin 620.
- Chinin 615; Verfälschung 617; Sarro 617. Erk. v. schwefels. Cinchoi schwefels. Chinin 988.
- Chinoidin 620.
- Chinolin 666.
- Chinon 522; Veränderung bei d. U. gang in den Harn 929.
- Chiolith 1227.
- Chladnit 1313. 1316.
- Chlor, Wärmeentwicklung bei der V. mit andern Körpern 48; - und V. serstoff, Einwirkung v. Licht 221.
- Chloracetamid 587.
- Chloracetonitryl 593.
- Chloräthyl, Ausd., sp. G. u. Siedep. damit isomere Flüssigkeit 687; substitutionsproduct 685.
- Chlorammonium, vulkanische Bild. 1; sp. G. u. Ausd. 58; Anwendung i chem. Anal. 939; Doppelsalze dess.
- Chloranisyl 538.
- Chlorantimonlösung, electr. Leitungsvermögen 290.
- Chlorarsen (AsCl₃), sp. G., Ausd. Siedep. 63; mit Ammoniak 425.
- Chlorastrolith 1188.
- Chlorbaryum, Darst. 378. BaCl, sp. 41. BaCl + 2 HO, sp. G. 41. Ausd. 58.
- Chlorbenzamid 589.
- Chlorbenzil 586.
- Chlorbenzoyl, Eigensch. 582; Substitutionsproduct 584.
- Chlorcarbethamid 587.
- Chlorcalcium : CaCl sp. G. 41. (+ 6 HO sp. G. 41, Schmelzp., Schmelzw. und sp. W. 73. - Lös. Spannkraft d. Dämpfe u. Siedep. Zusammendrückbarkeit 135; Sc geschwindigkeit darin 154.
- Chlorcerotal 707.
- Chlorcerotinsäure 703.
- Chlorchrom : CrCl 413; Cr₂Cl₃ 41
- Chlorcinchonin 618.
- Chlorcumyl 534.
- Chlorcyan, flüssiges, 475.
- Chlorcyanamyl 535.
- Chlorcyanilid 596.
- Chlorcyanwasserstoff 475.

- Chloreisen, sp. G. von FeCl und $\text{FeCl} + 4 \text{HO}$ 41.
 Chlorelayl ($\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_2$), Ausd., sp. G. u. Siedep. 63; Substitutionsproduct 685.
 Chlorige Säure, Darst. 881.
 Chlorit 1198.
 Chlorkalium, Ausd. 58; sp. G. 41. 58; electr. Leitungswiderstand der Lösung 288.
 Chlorkalk, Darst. 881; Einw. auf organische Substanzen 381.
 Chlorkohlenstoff C_2Cl_2 , Krystallf. 686.
 Chlormagnesium, sp. G. v. MgCl , 6HO 41.
 Chlornatrium, sp. G. 39. 41; Löslichkeit in Weingeist 394; electr. Leitungswiderstand der wässr. Lösung 288. 290, Schallgeschwindigkeit in derselben 154 (vergl. Kochsalz und Steinsalz).
 Chlorobenzol 711.
 Chloroform 680; Capillaritätshöhe 12; Erkennung des - im Blut 992.
 Chloromelal 705.
 Chloroniceinamid 530.
 Chloroniceinsäure 529.
 Chloronicin 531.
 Chloropal 1186.
 Chlorphosphor: PCl_3 , Ausd. u. sp. G. 62, lat. Dampfw. 62, Siedep. 62. 89; PCl_5 363.
 Chlorophyllit 1192.
 Chlorquecksilber (HgCl), Zers. desselben 448.
 Chlorquecksilber-Amidquecksilber, Verhalten desselben, 448.
 Chlorsalpetrige Säure 389.
 Chlorsaurer Baryt, Darst. 381.
 Chlorsaures Kali, Ausd. u. sp. G. 58.
 Chlorschwefelphosphor 364.
 Chlorschwefelsilicium 401.
 Chlorselen, flüssiges, 379.
 Chlorsilber, Löslichkeit in Salzsäure 450; Zers. durch Schwefel- und Arsenmetalle 450.
 Chlorsilicium, Ausd., sp. G. u. Siedep. 63.
 Chlorstickstoff, Bild. 329.
 Chlorstrontium, Darst. 378; sp. G. v. SrCl und SrCl , 6HO 41; Siedep. der wässrigen Lösung 94.
 Chlorstrychnin 628.
 Chlorsuccinsäure, Zus. u. Krystallf. 500.
 Chlortitan: TiCl_3 , Ausd., sp. G. u. Siedep. 63; Ti_2Cl_3 402.
 Chloruntersalpetersäure 388.
 Chlorzinklösung, Ausd. 68; Capillaritätshöhe 6.
 Chlorzinn: SnCl , Darst. 437, als Antichlor angewandt 1123; SnCl_2 , Ausd. und sp. G. 63, lat. Dampfw. 89, Siedep. 63. 89.
 Cholacrol 566.
 Cholelsäure 908.
 Choleinsäure 909.
 Cholesterilin 921.
 Cholesterin 920.
 Choloidinsäure 907.
 Cholonsäure 907.
 Cholsäure 897; Zers. durch Alkalien 902, durch Säuren 906.
 Chondroit 1200.
 Christianit 1189.
 Chrom, Atomgew. 413; Best. 964.
 Chromeisen 1166.
 Chromoscop 151.
 Chromoxyd, Darst. v. krystallisiertem 24; - hydrat und Salze 414.
 Chromoxydul und Verbindungen desselben 413.
 Chromsäure 416.
 Chromsaure Salze, Darst. 416. 1055; Salze und Doppelsalze 416 (sp. G. und Ausd. von K_2O , CrO_3 , KO , 3CrO_3 , $\text{KCl} + 2 \text{CrO}_3$, 59).
 Chrysamid 541.
 Chrysaminamid 542.
 Chrysaminsäure 541.
 Chrysoberyll 1167; künstliche Nachbildung 24.
 Chrysolepinsäure, identisch mit Pikrinsäure 539.
 Chrysolith 1173; künstliche Nachbildung 24.
 Chrysoretin 828.
 Chrysotil 1195.
 Cinchonin 617; Erk. des schwefels. in schwefels. Chinin 988.
 Cinnanilid 609.
 Citraconsaure Salze, Veränderung durch Brom 501.
 Citronenöl, Siedep. und lat. Dampfw. 91; Capillaritätshöhe 6; Ausd. u. sp. G. 68.
 Citronsaure Magnesia, Darst. 501.
 Citronsaure Salze, Veränderung durch Brom 501.
 Cochenille, Unters. der, 788.
 Cocinon 560.
 Cocinsäure 560.
 Cocosnussöl, fette Säuren desselben, 560.
 Codein 625.

- Cölestin 1219.
 Cohäsion, Abhängigkeit derselben bei flüssigen Körpern von der Temperatur 1; Beziehungen derselben bei festen Körpern zur Krystallisation 25.
 Collodium 1139.
 Columbit 1207.
 Compensation der Pendel 151.
 Concretion aus der Aorta 933.
 Condensator, electrischer 269; Theorie desselben 270.
 Condurrit 1214.
 Conferven, Zus. 832.
 Coracit 1167.
 Corydalin 643.
 Cotarnin 624.
 Crednerit 1164.
 Cumanilid 610.
 Cumidin 663.
 Cuminamid 588.
 Cuminsäure, Zers. durch Phosphorchlorid 534, durch Salpeterschwefelsäure 535.
 Cumol, Einw. der Salpetersäure 712.
 Cumonitryl 595.
 Cupelliren, Vorrichtung dazu 941; mittelst Glimmer 976.
 Cyan 473.
 Cyanäthyl 552. 686; Zers. durch Kalium 687.
 Cyanamyl 559. 700.
 Cyananilin 658.
 Cyanblei, basisches 477.
 Cyanbutyryl, vergl. Valeronitryl.
 Cyancumidin 665.
 Cyancinnamyl 536.
 Cyankalium, Darst. 476.
 Cyanmetacetyl, vergl. Butyronitryl.
 Cyanmethyl 672; Darst. 547; identisch mit Acetonitryl 593.
 Cyanquecksilber, Doppelsalze desselben 477 (Verb. mit unterschweifigs. Kali 367); Zers. durch Chlor 486.
 Cyansäure, Bild. 329; Einw. auf Amyloxyhydrat 699.
 Cyans. Aethyloxyd 691.
 Cyans. Kali, Darst. 476.
 Cyans. Methyloxyd 679.
 Cyantoluidin 666.
 Cyanurin 930.
 Cyanursäure, Bild. u. Darst. 488; Constitution und Salze 489.
 Cyanurs. Aethyloxyd 691.
 Cyanurs. Methyloxyd 679.
 Cyanverbindungen, Constitution derselben 484; Verhalten in höherer Temperatur 485. (Doppelcyanüre mit moniak 477.)
 Cyanwasserstoff, vergl. Blausäure.
 Cymol, Einw. der Salpetersäure 713
 Cymophan, vergl. Chrysoberyll.
 Cystin 933.
 Dämpfe, lat. Wärme 87; Spannkraft Eigenthümlichkeiten gewisser -, Erzeugung von Bildern angew. 231.
 Dämmerung 209.
 Daguerrotypbilder 226.
 Dammarharz 740.
 Dammaryl 741.
 Dammarylsäure 741.
 Dampfmaschinen, Theorie der - 14
 Destillirblase, verbesserte 941.
 Diabetischer Harn 931.
 Diamagnetismus 245.
 Diamant, Vork. 1152; Einw. sta Hitze 333; Oxydation durch Chsäure 333.
 Diaphanit 1191.
 Diaspor 1163.
 Dibromomelanilin 662.
 Dichloromelanilin 661.
 Dicyanomelanilin 663.
 Diffraction, vergl. Licht.
 Digitalin 644.
 Dijodomelanilin 662.
 Dimorphismus 33. 35.
 Dinitromelanilin 662.
 Diorit 1282.
 Dioscorea alata, Wurzel der, 826.
 Dispersion, vergl. Licht.
 Disterrit 1197.
 Dithionsäure 375.
 Döglingsoxyd 569.
 Döglingsäure 568.
 Döglingthran 567.
 Dolomit und Dolomitbildung 1289.
 Doppelspath 1221.
 Drachenblut, Einw. der Salpetersäure 534.
 Dracyl, identisch mit Toluol 716.
 Drähte, Tönen frei ausgespannter, Drehschwingungen 138.
 Druck, Einfluß desselben auf chem. Action 1262.
 Dünger 1069.
 Dyslysin 909.
 Dysilitit 1307. 1315.
 Ebullioscop 683.
 Ehlit 1217.

- Ei, chemische Vorgänge bei der Entwicklung der Thiere im - 859 (vergl. Hühnerei).
- Eichenholz, sp. G. 39.
- Eis, Ausd. 60; sp. W. 73. 78; Brechungsverhältniß 196. (Farbe, vergl. Gletscher.)
- Eisen, electr. Leitungsvermögen 289; Passivität des - 284; Oxydation durch Salzlösungen und Harn 442; Fällbarkeit durch Schwefelammonium 970; Gehalt an Kohlenstoff 1019, an Schwefel und Phosphor 1020 (vergl. Meteoreisen, Gulßeisen, Stahl).
- Eisenchlorit 1198, 1199.
- Eisenglanz, sp. G. 443.
- Eisenoxyd 443; Untersch. von Eisenoxydul 971; Trennung von Phosphorsäure 948, von Thonerde 971.
- Eisenoxydul, kohlen. 443; Bildung von phosphors. 443; Untersch. von Eisenoxyd 971.
- Eisenspath 1224.
- Eisenweinstein 507.
- Eisenzinkspath 1224.
- Elasticität fester Körper 127.
- Elasticitätscoefficient 138; Beziehung zur Schmelzwärme 132.
- Electricität 264; neue Theorie der - 315; Leitungsvermögen für die -, vergl. Leitungsvermögen; dynamisches Gleichgewicht der - in einem Körper und im unbegrenzten Raum 292 (vergl. Luftelectricität u. Pyroelectricität).
- Electrodynamik 315.
- Electrodynamometer 315.
- Electromagnete, Tragkraft der - 237.
- Electrometrie 267.
- Electromotorische Kraft 299.
- Email zum Löthen von Porcellan 1081 (vergl. Schmelzfarben).
- Enceladit 1204.
- Endivie, Asche, No. 135 der Tab. zu S. 1074.
- Endomorphismus 1243.
- Endosmose 15.
- Entladung, electriche, par cascade 273.
- Epidot 1174.
- Epipolismus 202.
- Epithelium der Schleimhaut 838.
- Erbsen, Asche 1076. No. 123 der Tab. zu S. 1074.
- Erdbeere, Asche, No. 117 der Tab. zu S. 1074.
- Erdlichte, Apparat zur Best. derselben 147.
- Erdmagnetismus, mittlere Horizontalintensität desselben 243.
- Erdkern, Dichte desselben 146.
- Ernährung 864 (vergl. Viehfütterung).
- Eryglucin 765.
- Erypikrin 765.
- Erythrelinsäure 754 (vergl. auch 763 ff.).
- Erythrinsäure 753 (vergl. auch 763 ff.).
- Erythrobetinsäure 827.
- Erythroglucin 755 (vergl. auch 763 ff.).
- Essig, Best. des Säuregehalts im - 986; Entfernung des Kupfers aus - 1112.
- Essigsäure, Bild. 547. 850. 853. 854; Vork. 545; Ausd. und sp. G. 67; lat. Dampfw. 91; sp. W. 86; Siedep. 67. 91. Wässrige Essigsäure, Capillartätshöhe 6, sp. G. und Ausd. 68 (vergl. Essig).
- Essigsaures Aethyloxyd, Ausd. 62. 67. 68; lat. Dampfw. 89. 91; sp. G. 62. 67. 68; sp. W. 86. 89; Siedep. 62. 67. 89. 91.
- Essigsaures Bleioxyd, Zers. durch Kali 548.
- Essigsaures Eisenoxyd, Zers. 548.
- Essigsaures Kali, Siedep. der Lösung 94.
- Essigsaures Methyloxyd, Ausd. und sp. G. 62. 67; lat. Dampfw. 89; sp. W. 86; Siedep. 62. 67. 89.
- Euchron 498.
- Euchronsäure 498.
- Eudiometrie 941; mittelst der Gasbatterie 281.
- Eukolit 1203.
- Euxenit 1206.
- Evernia Prunastri, Farbstoffe der, 756.
- Everninsäure 757 (vergl. auch 763 ff.).
- Evernsäure 756 (vergl. auch 763 ff.).
- Evonymus Europaeus, Früchte 829.
- Excremente 934.
- Exomorphismus 1243.
- Färberei 1123 ff.
- Fäulniß 465.
- Fagus sylvatica, eigenthümliche Substanz in der Rinde 816.
- Fahlerz 1160.
- Farben, Theorie der natürlichen - 199; der Metalle 177; subjective 218, auf der rotirenden Scheibe 218.
- Farbenbüschel, Haidinger'sche, 205.
- Farbenringe, beim Durchsehen durch farbige Flüssigkeiten 218; Newton'sche 190. 192; Nobili'sche od. electriche 190.
- Farbenscheibe, rotirende 211.
- Farbenschilder der Krystalle 194.
- Farbenstrahlen, photogenische Wirkung der verschiedenen 221.

- Farbenzerstreuung 197.
 Farbstoffe 745.
 Faserkohle, Bildung 1295.
 Faujasit 1189.
 Fayence, Zus. 1064 (vergl. Steinzeug).
 Federers 1159.
 Federn, Kieselerdegehalt derselben 985.
 Feige, Asche, No. 107 der Tabelle zu S. 1074.
 Feldspathe 1180; künstl. -krystalle 1171.
 Felsarten, vergl. Gesteine.
 Fenchelöl, Ausbeute, sp. G. und Verh. zu Jod 709.
 Fermentolea 730.
 Fernmesser, optischer 213.
 Ferridcyankalium, Darst., Verh. als oxydirendes Mittel und Verh. mit Ammoniak 479.
 Ferro- und Ferricyanwasserstoffs. Chinin 616, Cinchonin 618, Strychnin 626, 627, Brucin 629.
 Ferrocyanisen, vergl. Blutlaugensalz.
 Ferrocyanpfer 478, -kalium und -ammonium 478.
 Fett, Bildung 840. 865; aus verwestem Thierkörper 570; vergl. die einzelnen Fettarten.
 Fibrin, sp. G. 837; Best. desselben im Blut 998; Zers. mit Manganhyperoxyd und Schwefelsäure 853, mit zweifachchroms. Kali und Schwefelsäure 854.
 Fichtenharz, Säuren desselben 572.
 Flachspflanze, Asche der - 1075; Unters. über die Cultur der - 1085.
 Flamme, Natur der Licht- 163; electr. Leitungsvermögen 264.
 Flavin 666.
 Flechten, Farbstoffe derselben 749 (vergl. Cetraria).
 Flechtenstärke 831.
 Fleischasche 894.
 Fleischextract 1098.
 Fleischflüssigkeit, organische Bestandth. derselben 876, unorganische 892.
 Fleischzubereitung 1099.
 Flüssigkeiten, gasförmige, vergl. Gase.
 Flüssigkeiten, tropfbare, Veränderung der Form der Oberfläche durch andere 11; Ausd., sp. G. und Siedep. 60; sp. W. 86; Gleichgewicht 133; Zusammendrückbarkeit 133; Bewegung 139; Ausflusgeschwindigkeit aus engen Röhren 139; Widerstand 145; Schallgeschwindigkeit darin 152; magnetische Eigenschaften 249; electr. Leitungs-
 widerstand 288; des kranken menschlichen Körpers 895.
 Fluorwasserstoff, vergl. Flußsäure.
 Fluosilicanilid 597.
 Flußsäure, 381.
 Flußwasser 994.
 Foramen centrale 218.
 Früchte, Reifen derselben 807.
 Fumarolen 1258.
 Furfurol 781.
 Fuselalkohol oder Fuselöl, vergl. oxydhydrat.
 Gabbro 1284.
 Gährung 465.
 Galle 896; Unters. der Ochsen- und der Schweinegalle 913, der Gallen verschiedener Thiere 917. 918; Re darauf 992.
 Gallenfarbstoff 920.
 Gallenfett, vergl. Cholesterin.
 Gallensteine 919.
 Gallussäure, Bildung aus Gerbsäure 524.
 Gambir 522.
 Gangbildungen 1233. 1236.
 Garancin 773. 777. 780. 1125.
 Garn, sp. G. 39.
 Gasanalysen 941.
 Gasbatterie 278.
 Gasbeleuchtung, Tauglichkeit engl. Steinkohlen zur - 1120.
 Gase, Best. des sp. G. 39, der sp. V. Zusammendrückbarkeit 135; Gewicht 135; Ausfluß 146; magnetische Eigenschaften 250; Einw. starker auf zusammengesetzte - 826; nische - 1258.
 Gasentwicklung in Erminen 1250.
 Gasometer 941.
 Gaultheriasäure, vergl. salicyls. N. oxyd.
 Gebilde des menschl. Körpers, Elasticität und Cohäsion 130.
 Gehlenit 1179.
 Geisirtheorie 1262.
 Gelbbleierz 1212.
 Gentianin 809.
 Gerberei 1128.
 Gerbsäure 523; Veränderung bei Uebergang in den Harn 929.
 Gersdorffit 1156.
 Gesichtsfehler 215.
 Gesteine, Bestimmung der Gemen 1231; Magnetismus der - 1233; Leitungsfähigkeit der - für Elec-

- 1233; Schmelzversuche mit - 1234;
Bildung compacter - aus Infusorien
1240; Metamorphismus der - 1242;
Zersetzung durch Wasser 1245; unge-
schichtete - 1264; geschichtete - 1288.
Gewicht, specifisches 37; Best. bei Flüs-
sigkeiten 39, bei Gasen 39; Einfluss
der Vertheilung bei festen Körpern 37,
hoher Temperatur 39; Beziehungen
zur Zusammensetzung 40; Veränderung
beim Schmelzen von Gesteinen 1235.
Gibbsit 1216.
Gichtknoten 933.
Gifte, Ermittlung metallischer 966.
Gigantolith 1191.
Gismondin 1190.
Gitterspectrum, vergl. Spectrum.
Glas, Elasticität und Festigkeit 128; gold-
haltiges 452; Zus. von böhmischem
1062; Krystallbildungen in Tafel -
1062 (vergl. Aventuringlas).
Glasfeuchtigkeit, Brechungsverhältnis
215; zufällige Färbung 216; enthält
Harnstoff 854.
Glasmalerei, alte, 1060.
Gleichgewicht fester Körper 125, tropf-
bar-flüssiger 133, gasförmiger 135.
Gletscher und Gletscherwasser, Farbe
202. 1236.
Glimmer 1184.
Glockenmetall, Zus. 1036.
Glucose 792.
Glühen 160.
Glycocoll 845.
Glycolsäure 845.
Gneufs 1273.
Gneufsgranit 1273.
Gold, Vork. 1153; sp. G. 38; electr.
Leitungsvermögen 289; Best. 976;
Darst. von schwammförmigem 450.
Goldamalgam, natürliches 1153.
Goldoxyd, Darst. 451.
Goldhaltiges Glas 452.
Goldscheidelei mit Schwefelsäure 1027.
Goniometer für mikroskopische Krystalle
27. 28; Anlege- und Reflexions- 29.
Granit, Entstehung 1264.
Graphit, Best. des Kohlenstoffs darin 943.
Gratiolin 645.
Greenovit 1204.
Grünerde 1199.
Guajakharz 742; Erk. des - als Verfä-
schungsmittels 742.
Guajakholz 828.
Guanin in Spinnenkoth 936.
Guanit, vergl. Struvit.
Gummi, Verb. mit Bleioxyd 795.
Gurke, Asche, No. 110 der Tab. zu
S. 1074.
Gufseisen, Einw. von Schwefelsäure 442;
Best. des Kohlenstoffs darin 1019.
Gutta-Percha 743; als Isolirmittel 266.
Gyps, Bild. 1255. 1294; Best. im Koch-
salz 962; Härten desselben 1057 (vergl.
schwefels. Kalk).
Haarfirnis 1127.
Haarsalz 1219.
Hämatinon 1061.
Hafer, Unters. der Entwicklung des -
1089.
Halbopal, Bildung 1241.
Halloysit 1185.
Handorgel 160.
Harmalaroth 787.
Harmalin 636.
Harmin 639.
Harn 923; Kohlensäure darin 924;
Schwefel und Phosphor darin 924;
Harnstoff darin 925; Kreatin u. Kre-
atinin darin 926; Abwesenheit d. Milch-
säure 925; Uebergang verschiedener
Stoffe in den - 929; Färbung nach
Genuss von Rhabarber 929; bei Krank-
heiten 930; bei Diabetes insbes. 981;
des Kalbs und des Hammels 932.
Harnleiterstein eines Ochsen 932.
Harnsäure, Vorkommen im Blut 869;
Best. 992; Oxydation durch Ferrid-
cyankalium und Kali 581.
Harnsaure Salze 578; Veränderung bei
dem Uebergang in den Harn 929.
Harnsteine 932.
Harnstoff, Bild. aus knalls. Kupferoxyd-
Ammoniak 488; Vork. im Auge 854;
Darst. 476; Gehalt des Harns daran
925, Best. desselben 989; Zers. 864;
Veränderung bei dem Uebergang in den
Harn 929; Zers. des salzs. - durch
Hitze 488.
Hauerit 1157.
Hauyn 1201.
Harze im Allgemeinen 738.
Heber, verbesserter 941; der sich selbst
ansaugt 145.
Hefe 470 (vergl. Gährung).
Helio-stat, vereinfachter 212.
Hemi-drie 26.
Hemimorphismus 33.
Hesperidin 735.
Heteromerie 1149.
Hexakisoktaeder, neues 25.

- Hidantolinsäure 588.
 Hippursäure, Darst. 584; Zers. durch Salpetersäure und Stickoxyd 584.
 Hippursaures Aethyloxyd, Bild. 465.
 Hisingerit 1194.
 Höfe 209.
 Holz, Verkohlung durch Dampf 1120; Conserviren des - 1127 f.
 Holzarten, mechanische Eigenschaften 129; Zus. und Aschegehalt 1098. 1112 ff.; Asche von fossilem - 1096.
 Holzfaser 795.
 Holzgeist, Ausd. und sp. G. 61. 66; lat. Dampfsw. 89. 91; sp. W. 86. 89; Siedep. 61. 66. 89. 91; neuer Körper im rohen 669; Einw. von Chlor 670.
 Homowolframsäure 406.
 Honigsteinsäure, vergl. Mellithsäure.
 Honigthau 794.
 Hopfenasche 1077.
 Hornblende 1172.
 Howardit 1312.
 Hühnerrei, Zusammensetzung 857.
 Humit 1200.
 Humusartige Substanz aus dem Loch Dochart 808.
 Hyalith, Nachbildung desselben 1162.
 Hydramide, Einw. von Schwefelwasserstoff 590.
 Hydrargillit 1164.
 Hydrate im Allgemeinen 332.
 Hydrochrysamid 543.
 Hydrocyanharmalin 641.
 Hydrometer 39.
 Hydronickelmagnetit 1226.
 Hygrometer 100.
 Hyocholinsäure 913.

 Idokras 1177.
 Igasursäure 519.
 Ilmenium 404. 1208 ff.
 Imatrasteine 1298.
 Imperatoria Ostruthium, flüchtiges Oel davon 724.
 Inductionsgesetz, allgemeines 319.
 Infusorien, Bildung compacter Gesteine aus - 1240.
 Inosinsäure 887.
 Inulin 794.
 Iridiumkaliumchlorid, Einw. von schwefeliger Säure und schweflgs. Kali 458.
 Iridiumsilberchlorid 458.
 Irisiren 193.
 Isolirmittel 266.
 Isomorphie, polymere 1147; heteromere 1149.
 Isomorphismus 33.
 Isotarttridsäure 310.
 Isoweinsäure 509.
 Isowolframsäure 407.
 Itakonsäure Salze, Einw. von Brottnerit 1201.

 Jacksonit 1180.
 Jamesonit 1159.
 Jod, Vork. 379; Gewinnung und unreinigungen 380; Erk. 954.
 Jodäthyl, Ausd. und sp. G. 61.
 Dampfsw. 89; Siedep. 61. 89; durch Chlor 686.
 Jodanilin 656.
 Jodarsen, Darst. 425.
 Jodbaryum, sp. G. 41.
 Jodblei, sp. G. 41; Verb. mit B 442.
 Jodcyan, Vorkommen in künftlich 380.
 Jodkalium, sp. G. 41; Verunre 380; Verh. zu Schwefelsäure electr. Leitungsvermögen d. Lösung.
 Jodmethyl, Ausd. und sp. G. 61.
 Dampfsw. 89; Siedep. 61. 89; Z.
 Jodnatrium, sp. G. 41.
 Jodoform, Zers. durch Cyan 584.
 Jodolith 1215.
 Jodquecksilber (HgJ) 447; sp. G. 41.
 Jodsäure, sp. G. 41.
 Jodsilber, sp. G. 41.
 Juglans regia, Asche der Nufs Wallnufs.

 Kaffeebohnen, Asche der - 1075.
 Kaffeegerbstsäure 525.
 Kakodylähnliche Verbindung aus säure 494.
 Kakothelin 681.
 Kali, Erk. vor dem Löhrohr 96.
 G. von KO, HO 41; Capillarität der wässrigen Lösung 12; Aussehen 69.
 Kaliumkupfercyanür 478.
 Kalk, sp. Gew. 41; Löslichkeit in 395; sp. G. von CaO, HO 41.
 Kalkspath 1221; Untere krystallischer Eigenschaften 27.
 Kalkstein 1294.
 Kalmusöl, Ausbeute und sp. G. 1224.
 Kartoffelart, Farbstoff einer neuen.
 Kartoffelfuselöl, vergl. Amyloxy.
 Kartoffelkrankheit 1105.

- Kastanie**, Asche, No. 116 der Tab. zu S. 1074 (vergl. Rostkastanie).
Katalyse 825.
Keimen, Einfluß des Wassers bei dem - 825.
Kieselerde 400; Gehalt der Federn an - 935. Verb. der - vergl. Silicate.
Kieselguhr 1163.
Kieselzinkerz 1187.
Kino 522.
Kirsche, Asche, No. 129 und 130 der Tab. zu S. 1074.
Kirschchlorbeerwasser 710.
Knallgasgebläse 941.
Knall-Mannit 1145.
Knallsäuren, Const. u. Nomenclatur 487.
Knallzucker 1146.
Knochen, Elasticität und Cohäsion 130.
Kobalt, Trennung von Nickel 971, von Mangan 974.
Kobaltcyanverbindungen 479.
Kobaltglanz 1155.
Kobaltkies, vergl. Speiskobalt.
Kochsalz, Best. von Gyps in demselben 962; Zus. von käuflichem 1054; als Dünger 1070; Einfluß auf die Viehfütterung 1101 (vergl. Chlornatrium).
Königswasser, vergl. Salpetersalzsäure.
Kohle, Wärmeentwicklung bei dem Verbrennen 49; Darst. aus Holz durch Dampf 1120 (vergl. Kohlenstoff).
Kohlen, fossile, Zus. 1112 ff. (vergl. Braunkohle, Steinkohle, Pechkohle u.a.)
Kohlenoxydgas, sp. G. 40.
Kohlensäure 333; sp. G. 40. 390; Zusammendrückbarkeit 135; Verh. der festen - zu Basen 334; Absorbirbarkeit durch Schwefelsäure 334; Best. 944; Trennung von schwefeliger Säure 952.
Kohlens. Ammoniak, zweifach, Vorkommen in Guano 392.
Kohlens. Baryt, sp. G. 41.
Kohlens. Bleioxyd 442.
Kohlens. Cadmiumoxyd 436.
Kohlens. Chromoxyd 414.
Kohlens. Eisenoxydul, Veränderung bei dem Glühen 448.
Kohlens. Kali, sp. G. 41; Siedep. der Lösung 94 (vergl. Potasche).
Kohlens. Kalk, Best. in Kalksteinen, Mergel, Wasser u. a. 962. 963.
Kohlens. Manganoxydul 420; natürliches erdiges 1224.
Kohlens. Natron, sp. G. 41; Zusammendrückbarkeit der Lösung 135, Schallgeschwindigkeit in derselben 154 (vergl. Soda).
Kohlens. Nickeloxylul 444.
Kohlens. Salze, Löslichkeit in kohlens. Wasser 335.
Kohlens. Wismuthoxyd 432.
Kohlens. Zinkoxyd 435.
Kohlenstoff 333; Best. in Graphit u. Roheisen 943; Gehalt an - in verschiedenen Eisensorten 1019.
Kohlenwasserstoffe, sp. G., Siedep. u. lat. Dampf. von $C_{12}H_{10}$ und $C_{14}H_{12}$ 91; fester - aus Bernstein 736.
Koprolithen 1298.
Korund, künstl. Nachbildung 24; sp. G. 398.
Kräfte im Allgemeinen 128.
Krappfärben, Theorie des Processes, 777. 780. 1123.
Krappwurzel, Farbstoffe der, 766.
Kreatin 879; im Harn 926.
Kreatinin 881; im Harn 926.
Kreisbewegung, Vorschlag zur Erreichung gleichförmiger 149.
Kreitonit 1166.
Kripin, vergl. Pikryl.
Krümelzucker, vergl. bei Zucker.
Krystalle, Bildung 24. 25; Hemiëdrie 26; Verzerrung u. a. 24. 26; Winkelverschiedenheit 27; neue Darstellungsweise von - auf trockenem Weg 23; Wirkung der Magnetpole auf sie 261.
Krystallform, Beziehungen zur Zusammensetzung 29.
Krystallisation 23.
Krystallographie 25.
Krystallometrie mikroskopischer Krystalle 27.
Kümmelöl (Kreuzkümmelöl) 712; Ausbeute 709. 713; sp. G. 709.
Kümmelöl, römisch-, vergl. Römisch-Kümmelöl.
Kürbisfrucht 830.
Kupfer, Vork. und Bild. des gediegenen 1154; Vork. im Thierkörper 871. 874, in Mineralwasser 1013; sp. G. und Ausd. 58; electr. Leitungswiderstand 286. 289; Best. 975; fremde Metalle darin 1022.
Kupferamalgam für Zahnärzte 1036.
Kupfererze, Verhüttung 1020.
Kupferhydrür 394.
Kupferlegirungen 1036.
Kupferoxyd, sp. G. 41.
Kupferoxydhydrat 444.
Kupferoxydulhydrat 444.

Kupferproceß durch Niederschlagen mit Eisen 1021.
Kyanäthrin 650.

Labrador 1183.
Lactucarin 824.
Lactucarium 823.
Lactucin 824.
Lactuca virosa 825; Milchsaft derselben 823.

Lactucon 823.
Lampe für optische Versuche 212.
Lantanursäure 582.
Latente Dampf- und Schmelzwärme, vergl. Wärme.

Lattich, Asche, No. 184 der Tab. zu S. 1074.

Lauch, Asche, No. 105 und 106 der Tab. zu S. 1074.

Laurostearinsäure, vergl. Pichurimtalgsäure.

Laven 1286.

Lavendelöl, Ausbeute und sp. G. 709.

Lazulith 1217.

Leber, Gehalt an Kupfer und Blei 875, an Zucker 895.

Lecanorin 765.

Legirungen, Schmelzp. 71. 72. 73. 83. 84. 1040; lat. Schmelzw. 72. 73; sp. W. 72. 73. 82. 83; Wärmemenge darin 70. 84; sp. G. 393. 1040; Zus. verschiedener 1034 ff.

Legumin 842.

Leidenfrost'scher Versuch 92.

Leim, Const. 845; Zers. mit Manganhypoxyd und Schwefelsäure 853, mit zweif.-chroms. Kali und Schwefelsäure 854.

Leimzucker, vergl. Glycocoll.

Leinen, Untersch. von Baumwolle 1121.

Leitungsvermögen (und Leitungswiderstand), electr. 285; der Flamme 264; der Gesteine 1233.

Leuchtenbergit 1198.

Leucia 846.

Leukoharmin, vergl. Harmin.

Lichthuminsäure 832.

Licht, Theorie 164; gradlinige Fortpflanzung 166; Aberration 166; Interferenzerscheinungen 166; Diffractionserscheinungen in der Toricelli'schen Leere 169; Zurückwerfung 169, an Metallen 173, an metallisch-undurchsichtigen Krystallen 179; Depolarisation 189; Brechung 196; Dispersion

197; Zerstreuung im Innern und flüssiger Körper 202; Anw. des polarisirten im Mikroskop chemische Wirkungen 221.

Lichtbilder 225, auf Papier 227 Glas 237; Uebertragung auf graphisches Papier 239; farbig

Lichtbogen, electrischer 311.

Lichtentwicklung beim Glühen und Verbrennungsproceß 160.

Lichtflamme, Natur der -, 163.

Lichtmeteore 208.

Lichtquellen 160.

Lichtstrahlen, Wirkung der verschieden gefärbten auf phosphorescirenden

stanzen 164.

Liebenerit 1193.

Liebigit 1226.

Lignustrum vulgare, Farbstoff der 787.

Liquor ferri acetici oxydati, Zers. 548.

Lithion, Untersch. von Strontian dem Löthrohr 962.

Lizarsäure 782.

Löweit 1219.

Lophin 666.

Luft (atmosphärische), sp. G. und 390; Gehalt an Ammoniak 300; Zusammendrückbarkeit

Schallgeschwindigkeit darin 154

Luftelectricität, Einfluß auf elektrische Leitungsdrahte 292.

Lycopodium 829.

Magisterium Bismuthi 433.

Magnesia, sp. G. 396; Trennung der Alkalien 961.

Magnesit 1223.

Magnesium, Atomgew. 396.

Magnete, Tragkraft der -, 235.

Magneteisen 1165.

Magnet-electrische Maschinen, Wirkigkeit der Wirkung von der Leitungsgeschwindigkeit 323.

Magnetisirung, dadurch bewirkte Zustandsveränderung 243.

Magnetismus 235; Vertheilung in Netzen 239; Wirkung auf die Inductionsebene 245, auf die leitende Wärme 247; als allgemeine Eigenschaft der Materie 248; breitung 263. 264; der Gesteine (vergl. Erdmagnetismus).

Magnetkies 1156.

- Magnetstab**, Schwingung im luftleeren Raum und in der Luft 244.
Magensaft, Säure desselben, 863.
Magensteine eines Pferdes 864.
Malagawein 1109.
Malakon 1171.
Malztaig als Brodsurrogat 1104.
Mandelsteine, Entstehung durch Fumolenwirkung 1261.
Mangan, Reagens darauf 952; Trennung von Nickel und Kobalt 974.
Mangancarbonat, natürliches erdiges, 1224.
Manganoxyd-oxydul (Mn_2O_3), sp. G. u. Ausd. 58.
Manganoxysalze 421.
Manganzinkspath 1225.
Mannit, Bild. 466; Vork. 794. 825; Darst. 793; explosiver, vergl. Knall-Mannit.
Martinsit 1228.
Maschinen, Theorie der, 148.
Matricaria parthenium, flüchtiges Oel der, 723.
Maulbeerbaum, Asche des - 1095.
Medjdit 1220.
Meeresfläche, Gestalt der - 147.
Meerschamm, vergl. Seeschlamm.
Meerschwamm 937; sp. G. 39.
Meerwasser 999; Zusammendrückbarkeit 135; Schallgeschwindigkeit darin 154.
Mehlverfälschung 1103.
Melalgallussäure 524.
Melanilin 659.
Melaphyr 1275.
Melassenasche 1106.
Melen 706.
Melissin 704.
Melissinsäure 705.
Mellithsäure und ihre Verbindungen 494.
Mellonkalium, Darst. 493.
Mellonverbindungen 491.
Mendipit 1228.
Monnige, Bildung 1160.
Mercurialis annua 831.
Mesitinspath 1223.
Mesitylen, Einw. der Salpeterschwefelsäure 783.
Meta-Antimonsäure 428.
Metacetamid 586.
Metacetonsäure, Bild. 551. 552. 851; Vork. 545; Salze 551. 552; Substitutionsproduct 500. 504.
Metalle, Ausstrahlungsvermögen für die Wärme 115, Reflexionsvermögen dafür 117; Farbe 177; Zurückwerfung des Lichts an ihnen 173.
Metallgemische, vergl. Legirungen.
Metallhydrüre 394.
Metamorphismus der Gesteine 1242.
Metapektin 800.
Metapektinsäure 804.
Metaphosphorsäure und ihre Salze 355; verschiedene Modificationen 356. 358.
Metaweinsäure 508.
Metawolframsäure 407.
Metazinnsäure 438.
Meteor Eisen 1298 ff.
Meteorstaub 1318.
Meteorsteine 1298.
Methyl 672.
Methylal 670.
Methyloxyhydrat, vergl. Holzgeist.
Methyloxyd-Schwefelkohlenstoff (Methyloxyd-Sulfocarbonat) 674.
Methylunterschwefelsäure 673.
Methylverbindungen 669.
Mikrometer 213.
Mikroskop, Anwendung des polarisirten Lichts 212; Beleuchtung mit schiefem Licht 213; Riesen- 213.
Milch 922; Gehalt der - von Fleischfressern an Milchzucker 922; blaue und rothe 922.
Milchsäure, Bild. und Darst. 512. 518; Darst. 554; Vork. in der Fleischflüssigkeit 891; Abwesenheit im Harn 925; Erk. 986; verschiedene Modificationen 517.
Milchs. Salze 513—519.
Milchsäuregährung 466.
Milchzucker, sp. G. u. Ausd. 59; Vork. 858, in der Milch von Fleischfressern 922.
Mineraldünger 1071.
Mineralien, irisirende Oberflächender, 193; künstliche Nachbildung krystallisirter 23.
Mineralogie 1147.
Mineral-species, Begriff der, 1150.
Mineralsysteme 1151.
Mineralwasser 1001; Gehalt an Arsen, Kupfer u. a. 1013 (vgl. Quellwasser).
Möhre, Asche, No. 138 der Tab. zu S. 1074.
Molybdän, Atomgew. 408; Best. 964; Erk. 965.
Molybdänsäure, Salze der, 409—412; Verhalten zu Phosphorsäure 412.
Molybdänesquioxid 412.
Monazit 1215.

- Monazitoid 1215.
 Morinda citrifolia, Farbstoff 748.
 Morindin 748.
 Morindon 749.
 Most 1082.
 Murumontit 1177.
 Muscae volitantes 215.
 Muschelskalk 1294.
 Muskelgewebe der Fische 837.
 Muskeln, Elasticität und Cohäsion 130.
 Mutterlaugen von Salzsoolen 1002. 1055.
 Myricin 705.
 Myristinsäure, Vork. 560.

 Nadelierz 1158.
 Nahrungsmittel, Chemie der, 1098.
 Naphtalidam-Carbamid 610.
 Natron, Erk. vor dem Löthrohr 960, in
 Potasche 960; sp. G. von NaO, HO
 41.
 Nebensonnen 209.
 Nelkenöl, Ausbeute und sp. G. 709.
 Neolith 1191.
 Nerven, Elasticität und Cohäsion 130.
 Neusilber, Zus. von englischem 1040;
 electr. Leitungswiderstand 286.
 Newton'sche Farbenringe, vergl. Farben-
 ringe.
 Nicen, einfach-gechlortes 530.
 Nickel, Trennung von Kobalt 971, von
 Mangan 974.
 Nickelglanz 1155.
 Nickellegirungen u. a. nickelhaltige Prä-
 parate, Zus. 1038.
 Nickeloxydul, sp. G. 444; Trennung
 von Thonerde 975.
 Nickelamaragd 1225.
 Nicotin 612; Verb. mit Platinchlorür 614.
 Nierensteine 933.
 Niobsäure, sp. G. 405.
 Nipholith 1228.
 Nitracrol 566.
 Nitranissäure, Zers. durch Phosphor-
 chlorid 538.
 Nitrobenzamid 589.
 Nitrobenzoësäure, Bild. 534. 713, Zers.
 durch Phosphorchlorid 534.
 Nitrobenzoës. Aethyloxyd 737.
 Nitrobichlorphensäure 540.
 Nitrocholsäure 566.
 Nitrococussäure 790.
 Nitrocumidin 665.
 Nitrocuminsäure 535.
 Nitrogentianin 811.
 Nitroharimalidin 642.
 Nitrometacetonssäure 553.
 Nitrophenissäure, identisch mit Pi-
 säure 539.
 Nitryle 591.
 Nontronit 1186.
 Nosean 1201.
 Nullpunkt, absoluter, 75.

 Ocker von Quell- und Mineralwa-
 1012.
 Odmyl 571.
 Oele, fette, Zers. mit Schwefel in
 Hitze 570.
 Oele, flüchtige 708; Ausbeute u. s.
 708; Verh. zu Jod 709 (vergl.
 einzelnen).
 Oenanthe fistulosa, eigenthümliche
 stanz in dem Kraut 816.
 Oenanthol und Zersetzungsproducte
 selben 565.
 Oenanthylammoniak 567.
 Oenanthylsäure, vergl. bei Oenanth
 Oenanthylwasserstoff 567.
 Oidium aurantiacum 1104.
 Oleum animale Dippelii, organisch
 sen darin 651.
 Oligoklas 1182.
 Olivenöl, Capillaritätshöhe 6.
 Olivin 1173.
 Opal, Vork. des edlen, 1163.
 Ophitone 1279.
 Opiansäure 624.
 Opium, Morphingehalt 622.
 Optik, 160; der Atmosphäre 208;
 siologische 213.
 Orangebaum 1075 (vergl. No. 111
 Tabelle zu S. 1074).
 Orcin 759.
 Orlean, Vork. dieses Farbstoffs 786.
 Orsellinsäure (orsellesic acid) und O-
 säure, vergl. Flechten, Farbstoffe.
 Orthit 1175. 1176.
 Orthoklas 1181.
 Osman-Osmiumsäure und Salze d-
 ben 461.
 Osmiumoxydul, zweifach-schweflig
 schwefligs. Kali 461.
 Osteosarkom, Zus. eines, 935.
 Oxalsäure, Bild. aus Rohrzucker
 sp. G. und Ausd. von HO, C₂(
 2 HO 59.
 Oxals. Aethyloxyd, Bild. 465. 675;
 Dampf., sp. W. und Siedep. 8.
 Oxals. Ammoniak: sp. G. und
 von NH₄O, C₂O₃ + HO, NH₄O, 2
 + 3 HO und NH₄O, 4 C₂O₃ + 7 H
 Oxals. Amyloxyd, Bild. 675.

- Oxals. Antimonoxyd und Antimonoxyd-Kali 427.
 Oxals. Kali : sp. G. und Ausd. von $\text{KO}, \text{C}_2\text{O}_3 + \text{HO}, \text{KO}, 2\text{C}_2\text{O}_3 + 3\text{HO}$ und $\text{KO}, 4\text{C}_2\text{O}_3 + 7\text{HO}$ 59.
 Oxals. Kalk, Vork. u. Krystallisation 499.
 Oxals. Methyloxyd, Bild. 675; Einw. von Chlor 674.
 Oxals. Salze, Bild. saurer 499.
 Oxals. Wismuthoxyd 499.
 Oxals. Zinnoxidul und Doppelsalze desselben 437.
 Oxaluranilid 601.
 Oxalursäure 601.
 Oxalweinsäure, Bild. 465.
 Oxanilid 598.
 Oxyliczarsäure 782. 783.
 Ozon 329; als Reagens angewandt 952. 968.
 Palagonit 1193.
 Palladium, electr. Leitungvermögen 289.
 Palladiumchlorür-Ammoniak 457.
 Palmitinsäure, Vork. 560. 705.
 Papaverin 625.
 Papier, wasserdichtes 1127.
 Papyrin 796.
 Parabansäure 601.
 Paracholsäure 898. 900.
 Paracyan 478.
 Paramid 498.
 Paramidsäure 498.
 Paranicen 531.
 Paranicin 532.
 Parapektin 799.
 Parapektinsäure 804.
 Parawolframsäure 407.
 Passivität des Eisens 284.
 Pastinake, Asche, No. 139 der Tab. zu S. 1074.
 Pechkohle, Bild. 1297.
 Peganum Harmala, Basen in den Samen 686; Farbstoff daraus 787.
 Pektase 800.
 Pektin 798.
 Pektinkörper im Allgemeinen 806.
 Pektinsäure 801.
 Pektose 797.
 Pektosinsäure 801.
 Pelargonsäure, Bild. 721.
 Pelopsäure, sp. G. 405.
 Pendel, compensirte, verbesserte, conische u. a. 151.
 Pentathionsäure 376.
 Peridot, vergl. Chrysolith.
 Periklin 1181.
 Petinin 652.
 Petroleum, Ausd. und sp. G. 68.
 Pfannensteine von Salzsoolen 1055.
 Pflanzen, Darst. der eigenthümlichen Bestandtheile 808; Absorption unorganischer Substanzen 822; Gehalt an Phosphor und Schwefel 832; Zusa. der Asche 1074.
 Pflanzenchemie 822.
 Pflanzensäfte, Reaction der, 823.
 Pflaumen, Asche, No. 124 bis 128 der Tab. zu S. 1074.
 Phillipsit 1189.
 Phormium tenax, Untersch. der Faser 1122.
 Phosphamid 585.
 Phosphor 336; Schmelzp., lat. Schmelzw. und sp. W. 73. 79. 84; amorpher 336; im Harn 924, in Eisen 1020; Gehalt der Pflanzen an - 832.
 Phosphorchlorid und Phosphorchlorür, vergl. bei Chlorphosphor.
 Phosphorescenz 164.
 Phosphorochalcit 1217.
 Phosphoroxychlorid 364.
 Phosphorsäure (gewöhnliche) 337; Erk. und Verhalten zu Molybdänsäure 945; Best. 945; Trennung von Pyrophosphorsäure 947, von Eisenoxyd 948, von Thonerde 948. (Pyrophosphorsäure 345; Metaphosphorsäure 355; andere Modificationen 359.)
 Phosphors. Aethyloxyd 695.
 Phosphors. Anilin 654.
 Phosphors. Baryt 339.
 Phosphors. Bleioxyd 343.
 Phosphors. Brucin 628.
 Phosphors. Chinin 616.
 Phosphors. (Drittel) Eisenoxydul, Bild. 443.
 Phosphors. Kalk 340; Vork. in plutonischem Gestein 1073.
 Phosphors. Lithion 338.
 Phosphors. Magnesia-Ammoniak, Darst. 339; Krystallf. 28.
 Phosphors. Manganoxyd 343.
 Phosphors. Manganoxydul 342.
 Phosphors. Natron 338 (Schmelzp., sp. W. und lat. Schmelzw. von $2\text{NaO}, \text{HO}, \text{PO}_3 + 24\text{HO}$ 73).
 Phosphors. Silberoxyd 345.
 Phosphors. Strychnin 625.
 Phosphors. Uranoxyd 419.
 Phosphorschwefelsäure, vergl. Schwefelphosphorsäure.
 Phosphorwasserstoff, Darst. 363.

- Phosphorweinsäure, vergl. Aetherphosphorsäure.
 Phtalamsäure 589.
 Phtalanil 605.
 Phtalanilsäure 605.
 Phtalsäure, identisch mit Alizarinsäure, 778.
 Photogenie 221.
 Photographie 225.
 Photographometer 233.
 Photometer 212.
 Pichurimalgsäure, Vork. 560; Eigensch. und Salze 561.
 Picolin 654.
 Pikrinsäure 537.
 Pikrinsäure 539.
 Pikro-Erythrin 754 (vergl. auch 763 ff).
 Pikrolith 1195.
 Pikryl 666.
 Pimarsäure 572.
 Pininsäure 572.
 Pinit 1192.
 Piperin 625.
 Pistomesit 1223.
 Platin, sp. G. 38; electr. Leitungsvermögen 289; Verbreitung 453. 1028; Vork. 1152.
 Platinbasen, Salze derselben und deren Verhalten 454.
 Platincyauverbindungen 482.
 Platinerse, Behandlung, 453.
 Platinlüste auf Thonwaaren 1067.
 Platinoxyd, blaues, 453.
 Platinoxydul, zweifach-schwefigs. mit schwefigs. Kali 453.
 Pleochroismus des Amethysts 202.
 Polarisation, chromatische 208; elektrische 298.
 Polarisationsapparat, Versuche mit rotirendem -, 207.
 Polarisationsebene, Drehung in Beziehung zur Krystallform 204; Apparat zur Messung der Drehung durch Flüssigkeiten bei verschiedenen Temperaturen 213; Drehung durch den Electromagneten 245; Drehung in comprimierten Körpern durch den Magnetismus 247.
 Polarisationszustand des Himmels 210.
 Pollen 828.
 Polykras 1206.
 Polythionsäuren 374.
 Polywolfraumsäure 407.
 Porcellan, Zus. 1064.
 Porcellanöfen, Heizung mit Steinkohlen 1066.
 Porphyr 1275.
 Potasche, Prüfung 960 (vergl. ko Kali).
 Präcipitat, weißer unschmelzbarer, Chlorquecksilber-Amidquecksilber Propionsäure 551.
 Proteinverbindungen, s. g., im meinen 834.
 Protogyn 1281.
 Pseudochinin 621.
 Pseudomorphosen 1229. 1243.
 Pseudo-Orcin 755.
 Pseudoschwefelcyan 491.
 Pyro-Alizarinsäure 774.
 Pyrochlor 1205.
 Pyroelectricität des Boracits u. a.
 Pyrogallussäure 524.
 Pyrolusit 1161.
 Pyromarsäure 572.
 Pyromorphit, als Hüttenproduct vanadinhaltiger 1213.
 Pyrop 1179.
 Pyropectinsäure 805.
 Pyrophosphorsäure 345; Best. Trennung von Phosphorsäure Salze derselben 345-354; Substitutionen derselben 351.
 Pyroweinsäure und Salze derselben
 Pyroxanthin 669.
 Pyroxylin, vergl. Schießbaumwolle
 Quarz 1162.
 Quecksilber, Atomgew. 445; sp. G. Ausd. 70; lat. Schmelzw. 77; frieren in glühendem Tiegel 92; dunstung in der Kälte 96; sp. W electr. Leitungsvermögen 289; Ziemendrückbarkeit 134; Capillarser 12; Form der Oberfläche in röhren 14.
 Quecksilberchlorür, -jodür u. a., Chlor-, Jodquecksilber u. a.
 Quecksilberlösungen, Verh. zu Zink
 Quecksilberoxyd, sp. G. und Ausd.
 Quecksilberplatincyanür mit salz Quecksilberoxydul 484.
 Quecksilberverbindungen, Zus. 445
 Quellwasser, Abhängigkeit der Be theile von der Höhe ihres Vorkon und dem Terrain 1247. 1252; B warmer - 1252, kieselhaltiger - (vergl. Brunnenwasser, Mineral u. and.).
 Quellwasser-Absätze 1012.

- Radix Mei** 825.
Raphanus sativus, Wurzel 826.
Raps, Anal. der Asche 1076.
Rauhkalk 1223.
Raupen, enthalten Ameisensäure 546.
Rautenöl 719.
Reflexion des Lichts, vergl. Licht.
Regenbogen 209.
Regenwasser 993.
Reifen der Früchte 807.
Rettigwurzel 826; **Asche** der - 1075.
 No. 114 und 115 der Tab. zu S. 1074.
Rhabarber, **Asche**, No. 119 und 120 der Tab. zu S. 1074.
Ricinölsäure 562. 564.
Ricinstearinsäure 565.
Ricinusöl, fette Säuren im - 562.
Roccella Montagnei und **tinctoria**, Farbstoffe der - 750. 753.
Roccellinin 753 (vergl. auch 763 ff.).
Römisch-Kamillenöl 718.
Römisch-Kümmelöl, Einw. von Phosphorchlorid 717.
Roh Eisen, Best. des Kohlenstoffs darin 943, **Gehalt** an demselben 1019.
Rohrzucker, sp. G. und Ausd. 59; **Untersch.** von Stärke- oder Traubenzucker 983.
Roskastanie, **Unters.** der verschiedenen Theile 1078; **Entbittern** der Früchte 830.
Rothzinkerz 1160.
Rubiacin 770. 774. 778.
Rubiacinsäure 769. 775.
Rubian 769. 776.
Rübe, rothe, 827.
Runkelrüben, **Gehalt** an Zucker 826.
Ruta graveolens, flüchtiges Oel der - 719.
Rutinsäure 719.
Rutylchlorür 721.

Saccharimetrie, optische 213.
Säfte, vegetabilische, **Reaction** 823; **thierische**, **Reaction** 894, **krankhafte** 895.
Säuren, **Wärmeentwicklung** bei **Verbindung** mit Basen 52; **Verh.** der wasserfreien - gegen Pflanzenfarben 327; **organische** 494; **Säuren** $C_n H_n O_n$, **Const.** 544, **Vorkommen** 545; **Definition** der ein- und zweibasischen - 598; **Condensation** der Wasseratome in den wasserhaltigen - 46.
Salicin, **Vork.** 895.
Salicylige Säure, **Uebergang** in den Harn 929.

Salicyls. Methyloxyd, Einw. von Salpeterschwefelsäure 676.
Salmiak, vergl. Chlorammonium.
Salpeter, **Prüfung** 958 (vergl. **salpeters.** Kali).
Salpetersäure, **Bild.** aus Ammoniak 385; Einw. auf Schwefelwasserstoff 386; **Darst.** chlorfreier - 385; **Hydrate** derselben 386; **electr. Leitungsvermögen** der wässrigen - 290; **Anal.** ihrer Verbindungen 957.
Salpeters. Aethyloxyd, Einw. von Schwefelwasserstoff 689.
Salpeters. Ammoniak 393; **Siedep.** der Lösung 94.
Salpeters. Amyloxyd 699.
Salpeters. Antimonoxyd 426.
Salpeters. Baryt, sp. G. 41. 58; **Ausd.** 58.
Salpeters. Bleioxyd, sp. G. 41. 58; **Ausd.** 58.
Salpeters. Harnstoff, **Zersetzungsproducte** 854.
Salpeters. Kali, sp. G. 39. 58; **Ausd.** 58; **Schmelzp.**, sp. W., lat. **Schmelzw.** 73. 80; **Siedep.** der Lösung 94 (vergl. **Salpeter**).
Salpeters. Kalk, sp. G. von CaO , NO_2 und CaO , NO , + 4 HO 41; **Siedep.** der Lösung 94.
Salpeters. Kupferoxyd 444; **electr. Leitungsvermögen** der Lösung 290.
Salpeters. Magnesia, über die **Existenz** eines Alkoholats derselben 396.
Salpeters. Natron, sp. G. 41. 58; **Ausd.** 58; **Schmelzp.**, sp. W., lat. **Schmelzw.** 73. 79; **Siedep.** der Lösung 94, **Zusammendrückbarkeit** ders. 135, **Schallgeschwindigkeit** darin 154.
Salpeters. Quecksilberoxydul 447.
Salpeters. Strontian, sp. G. von SrO , NO_2 und SrO , NO , + 5 HO 41.
Salpeters. Verbindungen, **Anal.** 957.
Salpeters. Wismuthoxyd (dreifach-) 432; **Zers.** durch Wasser 432; **Färbung** bei dem Erhitzen 434.
Salpeters. Zinkoxyd (basisch-) 436.
Salpeters. Zinnoxidul 436.
Salpetersalzsäure 387.
Salpeterschwefelsäure, Einw. auf organische Substanzen 387, auf Zucker u. a. 1146.
Salpetrige Säure 883; **Erk.** 952.
Salpetrigs. Aethyloxyd, Einw. v. Schwefelwasserstoff 689.
Salpetrigs. Ammoniak 384.

- Salpetrigs. Amyloxyd 699.
 Salpetrigs. Baryt 383.
 Salpetrigs. Bleioxyd 385.
 Salpetrigs. Kali 383.
 Salpetrigs. Kalk 383.
 Salpetrigs. Magnesia 384.
 Salpetrigs. Natron 383.
 Salpetrigs. Silberoxyd 384. 385.
 Salpetrigs. Strontian 383.
 Salze, Ansichten über dieselben im Allgemeinen 328; sp. Volum der wasserhaltigen 42; Wärmeabsorption beim Auflösen in Wasser 53.
 Salzlösungen, Siedep. derselben und Beziehungen zur Zusammensetzung 93.
 Salzsäure, Capillaritätshöhe der wässrigen 12.
 Salzsoolen 1001.
 Salvia pratensis, Fermentoleum daraus, 731.
 Samarskit 1208.
 Sandelholz, Farbstoffe des, 784.
 Sandstein von Fontainebleau 1222.
 Santalid 786.
 Santalidid 786.
 Santaloid 786.
 Santaloidid 786.
 Santaloxyd 786.
 Santalsäure 784.
 Santonin 812.
 Sarkosin 884.
 Sauerstoff, Darst. 328; sp. G. 390; Absorption durch Kalilauge 943; oxydirende Wirkung des galvanisch dargestellten 328; verschiedene chemische Zustände 330; Wärmeentwicklung bei der Verbindung mit andern Körpern 48.
 Schallgeschwindigkeit in der Luft 154, in tropfbaren Flüssigkeiten 152.
 Schellak als Isolirmittel 266.
 Schiefbaumwolle und Aehnliches 1128.
 Schiefpulver, sp. G. 39.
 Schildpatt 936.
 Schillerspath 1195.
 Schlacken, Untersuchung krystallisirter 1169; zu hydraulischem Cement 1057.
 Schleifen von Gläsern und Spiegeln 212.
 Schleimhautepithelium 838.
 Schleimsäure und Salze derselben 520.
 Schlippe'sches Salz, Zus. 431.
 Schmelzen 70.
 Schmelzfarben 1067.
 Schmelzpunkte von Metallen und Legirungen 71.
 Schmelzversuche mit Gesteinen 1234.
 Schmelzwärme, vergl. Wärme.
 Schnee, Krystallisation desselben 26.
 Schraubenpumpe 151.
 Schreibersit 1307. 1317 (vergl. auch 1303. 1315).
 Schwamm, vergl. Meerschwamm.
 Schwammkohle 938.
 Schwefel, Bild. 1256; sp. G. 365; W., lat. Schmelzw., Schmelzp. 73. Dimorphismus 35; verschiedene Zustände 866; Gehalt der Pflanzen ihm 832, thierischer Substanzen in der Galle verschiedner Thiere 9 im Harn 924; Best. in organischen Substanzen 949; Analyse der Salzsäuren des - 950.
 Schwefeläthyl, Zers. durch Chlor 68.
 Schwefeläthyl (zweifach) 689.
 Schwefelamyl (zweifach) 699.
 Schwefelantimon - Schwefelnatrium (zweifach) 431.
 Schwefelarsensäure 425.
 Schwefelblau, Chinin 616, Cinchonin 618, Morphin 622, Codein 625, Strontin 626, Brucin 629.
 Schwefelblei, sp. G. und Ausd. 58.
 Schwefelcyan, s. g., 491.
 Schwefelcyanäthyl, Zers. durch Salzsäure 687, durch chlors. Kali Salzsäure 689.
 Schwefelcyanammonium, Darst. 491.
 Schwefelcyanamyl 700.
 Schwefelcyankalium, Uebergang in Harn 929.
 Schwefelcyanmethyl, Zers. durch Salzsäure 673.
 Schwefelgold, Verb. mit Schwefelnatrium und Schwefelkalium 451.
 Schwefelkies, Bildung 1257.
 Schwefelkohlenstoff, Ausd. und sp. G. 61, lat. Dampfw. 89; Siedep. 61. Capillaritätshöhe 6.
 Schwefelmethyl (zweifach-), Zers. d. Salzsäure 673.
 Schwefelnaphthalidam - Carbamid 611.
 Schwefelnatrium (NaS), sp. G. 41.
 Schwefelphosphorsäure 362.
 Schwefelsäure; Darst. der wasserfrei 370; - Fabrikation 1041; Destillat der concentrirten 370; Reinigung durch Krystallisation 371; Wärmeentwicklung beim Mischen mit Wasser 52; sp. G. der Mischungen mit Wasser 371; Capillaritätshöhe 6; sp. W.

- electr. Leitungswiderstand 288. 290;
 Zers. durch Eisen und Zink 372.
 Schwefels. Aethyloxyd 692.
 Schwefels. Ammoniak, Zus. 392; sp. G. und Ausd. 59.
 Schwefels. Antimonoxyd 426.
 Schwefels. Baryt, sp. G. 38.
 Schwefels. Bleioxyd, sp. G. 41.
 Schwefels. Cadmiumoxyd 436.
 Schwefels. Ceroxydul und Ceroxydoxydul 397.
 Schwefels. Chromoxyd 414.
 Schwefels. Chromoxyd-Kali, Zus. 415; sp. G. und Ausd. 59.
 Schwefels. Cinchonin, Erkennung in schwefels. Chinin 988.
 Schwefels. Eisenoxyd 443.
 Schwefels. Eisenoxydul : sp. G. v. FeO , SO_2 41; sp. G. von FeO , SO_2 + 7 HO 41. 59, Ausd. 59.
 Schwefels. Kali (einfach), sp. G. 41. 59, Ausd. 59, Krystallf. 394; - (zweifach) sp. G. und Ausd. 59.
 Schwefels. Kalk : CaO , SO_2 , sp. G. 41; CaO , SO_2 + 2 HO sp. G. 41, Entwässerung 395 (vergl. Gyps).
 Schwefels. Kupferoxyd : CuO , SO_2 , sp. G. 41; CuO , SO_2 + 5 HO sp. G. 41. 59, Ausd. 59; Cohäsion der Lösung 3, electr. Leitungswiderstand derselben 288. 290.
 Schwefels. Kupferoxyd mit Kupferchlorid (natürliches) 1220.
 Schwefels. Kupferoxyd-Ammoniak, sp. G. und Ausd. 59.
 Schwefels. Kupferoxyd-Kali, sp. G. und Ausd. 59.
 Schwefels. Lithion, über die Existenz von Doppelsalzen desselben 394.
 Schwefels. Magnesia : MgO , SO_2 , sp. G. 41; MgO , SO_2 + 7 HO , sp. G. 41. 59, Ausd. 59.
 Schwefels. Magnesia-Ammoniak, sp. G. und Ausd. 59.
 Schwefels. Magnesia-Kali, sp. G. und Ausd. 59.
 Schwefels. Magnesia-Natron, Krystallf. 396.
 Schwefels. Natron, sp. G. von NaO , SO_2 und NaO , SO_2 + 10 HO 41; Cohäsion der Lösung 3, Schallgeschwindigkeit darin 154.
 Schwefels. Nickeloxydul, Dimorphismus 37.
 Schwefels. Salze, Zers. durch ätherische Öle 372, durch Eisen und Zink 372.
 Schwefels. Silberoxyd, sp. G. 41.
 Schwefels. Strontian, sp. G. 41.
 Schwefels. Thonerde, Zus. 398; sp. G. 41.
 Schwefels. Thonerde-Ammoniak, optisches Verhalten 204.
 Schwefels. Thonerde-Kali, Zus. 398; sp. G. und Ausd. 59; Entwässerung 398 (vergl. Alaun).
 Schwefels. Zinkoxyd, sp. G. von ZnO , SO_2 und ZnO , SO_2 + 7 HO 41; electr. Leitungswiderstand der Lösung 288. 290.
 Schwefels. Zinkoxyd-Kali, sp. G. und Ausd. 59.
 Schwefels. Zinkoxyd-Natron, Krystallf. 435.
 Schwefels. Zinnoxidul 436.
 Schwefeltitan (TiS_2) 403.
 Schwefelwasserstoff, Einw. auf Salpetersäure 386, auf Hydramide 590, auf Benzonitril 595, auf stickstoffhaltige Körper überhaupt 596, auf salpetrigs. und salpeters. Aethyloxyd 689.
 Schwefelweinsäure, vergl. Aetherschwefelsäure.
 Schweflige Säure 368; Verb. der wasserfreien gegen Pflanzenfarben 327; Ausd., sp. G. und Siedep. der flüssigen 63; sp. G. des Gases 40; Erk. 952; Trennung von Kohlensäure 952.
 Schweflign. Aethyloxyd, sp. G., Ausd. und Siedep. 64.
 Schweflign. Aldehyd-Ammoniak, saures, 919.
 Schweflign. Ammoniak, Cadmiumoxyd, Eisenoxydul, Kupferoxyd, Natron und Nickeloxydul 370.
 Schweflign. Osmiumoxydul (zweifach) mit schweflign. Kali 461.
 Schweflign. Platinoxydul (zweifach) mit schweflign. Kali 453.
 Schweflign. Ruthenoxoydul-Kali 457.
 Schwere, Abhängigkeit von der Breite 147.
 Schwerspath 1219.
 Schwingungen, tönende von Stäben und Saiten 155.
 Seeschlamm als Dünger 1072.
 Selen, Theorie 216; Fehler 215; mehrfaches 218.
 Sehnen, sp. G. 837; Elasticität und Cohäsion 130.
 Seidensaft 936.
 Selen, Atomgew. 378; sp. G. 378.
 Selenäthyl-Selenwasserstoff 684.

- Selenaldin 649.
 Selenigs. Zinkoxyd 435.
 Selenigs. Natron 379.
 Seleniofurfol 733.
 Selenmercaptop 684.
 Sellerie, Asche, No. 137 der Tab. zu S. 1074.
 Senföl, sp. W. 86.
 Senfolammoniak, Veränderung bei dem Uebergang in den Harn 929.
 Senneblätter 828.
 Serpentin 1195.
 Serpentinischefer 1289.
 Sesquiphosphorsäure 360.
 Shepardit 1307.
 Sieden 92.
 Siedepunct, Beziehungen zur Zus. 93.
 Silber, Ausbringen ohne Quecksilber 1023; Darst. 449; sp. G. 38; lat. Schmelzw. 77; electr. Leitungswiderstand 286. 289; Best. 976 (vergl. Silberprobe).
 Silberlegirungen, Abnutzbarkeit 1034.
 Silberprobe, hydrostatische 1032.
 Silicate, Formeln und Classification 1168; künstliche, vergl. Schlacken.
 Silicium, Atomgew. 399; Verbindungen 400.
 Skolezit 1188.
 Smaragd, künstl. Nachbildung 24.
 Smirgel, Vorkommen 1161.
 Soda, Fabrikation 1043; Erk. in Potasche 960 (vergl. kohlens. Natron).
 Sodolith 1201.
 Sooranjee (Farbstoff) 748.
 Spargel, Asche, No. 104 der Tab. zu S. 1074.
 Spatheisenstein, vergl. kohlens. Eisenoxydul.
 Spec. Gewicht, Wärme u. a., vergl. Gewicht, Wärme u. a.
 Speckstein, Bild. 1293 (vergl. Steatit).
 Spectrum, Zus. des - 197; Längstreifen im Sonnenspectrum 198; Anal. des Fraunhofer'schen Gitterspectrums 167.
 Speichel 923.
 Speiskobalt 1155.
 Sphäroidalzustand 92.
 Sphärometer 151.
 Sphärosiderit 1224.
 Spnen, vergl. Greenovit.
 Spnenomit 1315.
 Spiegel, Legirungen, Schleifen u. a. 212; magische - der Chinesen 212.
 Spilit 1277.
 Spinat, Asche, No. 121 der Tab. zu S. 1074.
 Spinell und analoge Mineralien 11 künstl. Nachbildung 24.
 Spinnenkoth enthält Guanin 935.
 Spiritus vini alkoholisiert, Darst. 68.
 Spirogyra quinina, Asche der - 1096.
 Spongia marina 937; Kohle derselben! Stachelbeere, Asche, No. 136 der Tab. zu S. 1074.
 Stärkezucker, Untersch. von Rohrzucker 983.
 Stärkmehl, sp. G. 39; Vertheilung in verschiedenen Pflanzentheilen 826; Gean - verschiedener Pflanzen 794; tersch. verschiedener - arten 794.
 Stahl, Kohlenstoffgehalt im - 1019.
 Stalaktitenbildung 1221.
 Stearinfabrikation 1121.
 Steatit, Bildung, vergl. Speckstein.
 Steatitartige Mineralien 1196.
 Steinkohlen, Zus. 1112 ff.; Bild. 12 Tauglichkeit englischer - zur Ga leuchtung 1120.
 Steinkohlentheer, Benzol darin 711.
 Steinmark 1185.
 Steinöl, Capillaritätshöhe 6 (vergl. Petroleum).
 Steinsalz 1228; Bild. 1294; Pseudophosen nach - 1294.
 Steinzeug, Zus. 1068.
 Stephanoscop 213.
 Sternanisöl, Ausbeute und sp. G. 70.
 Stickoxyd, Darst. 382.
 Stickoxydul, Darst. 382; Eigenschaft des flüssigen - 382.
 Stickstoff, Best. 954; sp. G. d. Gases! Zusammendrückbarkeit desselben Stoffen bei dem Sieden 92.
 Strontian, Untersch. von Lithion vor Löthrohr 962. Sp. Gew. von SrO, HO und SrO, 9 HO 41.
 Struvit 1218 (vergl. phosphors. Magn Ammoniak).
 Strychnin 625; Erk. 988.
 Suberanilid 604.
 Suberanilsäure 604.
 Succinanil 602.
 Succinanilid 603.
 Succinanilsäure 603.
 Süßerde, vergl. Beryllerde.
 Süßwasserkalk 1292.
 Sulfäthylschwefelsäure 689.
 Sulfamylschwefelsäure 700.
 Sulfmethylschwefelsäure 673.
 Sulfobenzol 711.
 Sulfocarbamid 586.
 Sulfocarbamilid 607.

- Sulfomorphid 623.
 Sulfonarcotid 624.
 Syenit 1273.
 Sylvinsäure 572.

 Tabak, Gehalt verschiedener Sorten an Nicotin 612.
 Täuschungen, optische 219.
 Tantalit 1207.
 Tantsäure, sp. G. 404.
 Tartarus boraxatus 507.
 Taubenmist 1070.
 Taurin 918.
 Telegraph, hydraulischer 151.
 Tellurglanz, vergl. Blättertellur.
 Teratologie der Krystalle 26.
 Tereben, Siedep. und lat. Dampfw. 91.
 Terebenzinsäure 728.
 Terechrysinsäure 728.
 Terephthalsäure 728.
 Terpenthinampfer 725.
 Terpenthinöl 725; Ausd. und sp. G. 68; Siedep. und lat. Dampfw. 91; Capillaritätshöhe 6; Schallgeschwindigkeit darin 154; Einw. der Salpetersäure 727.
 Terpenthinölhydrat 725.
 Terpin 725.
 Terpinol 726.
 Tetradymit 1155.
 Tetrapentathionsäure 378.
 Tetrathionsäure 376.
 Thaubildung 96.
 Theobromin 633.
 Thermen, Bild. 1252.
 Thialdin 646.
 Thianisil 591.
 Thieröl, flüchtiges, organische Basen darin 651.
 Thiersubstanzen, Schwefelgehalt 836; sp. G. 837.
 Thiocinnol 591.
 Thiofurfol 591. 733.
 Thjorsanit 1179.
 Thone, in England zur Töpferei dienende 1063.
 Thonerde, sp. G. 41. 898; Darst. krystallisirter - 24; Trennung von Phosphorsäure 948, von Eisenoxyd 971, von Nickeloxydul 975; Gehalt der Pflanzenaschen an - 1097.
 Thonerdehydrat, Veränderung beim Aufbewahren 398.
 Thonwaaren, Zus. englischer - 1064 (vergl. Porcellan und Steingut).
 Thymianöl 721.
 Tinctura ferri acetici aetherea Klaprothii, Zers. 548.
 Titan, Vorkommen und Atomgew. 401.
 Titaneisen 1161.
 Titangrün 1058.
 Titanoxyd Ti_2O_3 , 403.
 Titans. Alkalien, Anal. und Zus. der sauren 940.
 Titanverbindungen 402.
 Töne, durch den electrischen Strom 156; frei ausgespannter Eisendrähte 156; Theorie der musikalischen 156.
 Töpferei, Rohstoffe und Producte der britischen 1063.
 Tolen 737.
 Tolubalsam 736.
 Toluol, Siedep. und Identität mit Dracyl 716.
 Toluylsäure 715.
 Tonschwingungen von Stäben und Saiten 155.
 Topas, optisches Verhalten desselben 204.
 Torf, Zus. 1112 ff.
 Torsionswage, electriche 268; zum Messen inducirter Ströme 321.
 Trachyt 1282.
 Trägheitsmomente 137.
 Transsudation 894.
 Traubensäure 512; muthmaßliche Zus. aus zwei verschiedenen Säuren 82.
 Traubens. Salze, Beziehungen zwischen Zus. und Krystallf. 31.
 Traubenzucker, Untersch. von Rohrzucker 985.
 Trinitranisol 537.
 Trithionsäure 375.
 Tropaeolum majus, flüchtiges Oel von, 725.
 Tschewkinit 1176.
 Turmalin 1203.

 Ueberchlorsäure, Bild. 329.
 Ueberchromsäure 418.
 Uebergangsschiefer 1281.
 Uebergangswiderstand, electriche 293.
 Uebermangansäure 421.
 Uebersvanadsäure 418.
 Unterschweifelsäure, vergl. Dithionsäure.
 Unterschweifige Säure 366.
 Ural-Orthit 1176.
 Uran, Atomgew. und Verbindungen 418.
 Uranglimmer 1218.
 Uranit 1218.
 Uranotantal 1208.
 Uranpecherz 1167.

- Uranyl 428.
 Usmiansäure 759; Zers. durch trockene Destillation 762.
 Valeramid 586.
 Valerianaöl 725.
 Valeriansäure, Bild. 839. 851. 853. 854; Vork. 545; Siedep. und lat. Dampf. 91; Untersch. und Trennung von der Buttersäure 555. 553; Zers. durch den electr. Strom 558.
 Valerians. Methyloxyd, Ausd., sp. G. und Siedep. 67; sp. W. 86.
 Valerians. Salze 557.
 Valeronitryl (Cyanbutyryl) 594. 852.
 Valyl 559.
 Vanad, Vork. 413; Erk. in Mineralien 965.
 Vases craquelés 1066.
 Venen, Elasticität und Cohäsion 130.
 Verbindungen, chemische, Wärmeentwicklung bei ihrer Bildung 47; spec. W. derselben in Beziehung zu der der Bestandtheile 85; gepaarte 608.
 Verbleien von Eisen und Stahl 1027.
 Verdauung 863.
 Vergoldung, nasse 1024; von Uhrädern 1025.
 Verkupferung von Glas und Porcellan 1025, von Eisen 1026.
 Versilberung, nasse 1024; matte von Porcellan 1067.
 Versteinerungsproceß 1238.
 Verzinnung von Blech 1025.
 Vesuvian, vergl. Idokras.
 Vicia sativa, Entwicklung 1076.
 Viehfütterung, Einfluß des Salzes 1101, genetzten Futters 1102.
 Viridinsäure 526.
 Vitellin 841.
 Vitis hederacea, Farbstoff der Blätter 787.
 Vitis sylvestris, Beeren, 829.
 Vitis vinifera, Farbstoff der Blätter 787; vergl. Weinstock.
 Vitriole, gemischte, 445.
 Vivianit, Bild. 443.
 Vülcknerit 1168.
 Vollborthit 1213.
 Voltameter, Wiedervereinigung der Gase im - 285.
 Volta'sche Combinationen 276.
 Volum, specifisches, 40; ähnlich gestalter Körper 46.
 Vosgit 1184.
 Wachs, Schmelzp., sp. W. und Schmelzw. 73; Unters. des Biowachses 701; des chinesischen 706
 Wärme, Entw. bei Bild. chem. Verbindungen 47, von Metalllegirungen in electr. Stromleitern 307; mechanisches Aequivalent derselben 56; A. dehnung durch die - 57; specif. 70, chem. Verb. aus der der Bestandtheile abgeleitet 85, der Gase (App. zur Best. derselben) 86, versch. Flüssigkeiten 86, des Wassers bei versch. Temperaturen 86; lat. Schmelzw. Beziehung zum Elasticitätscoefficienten 132; lat. Dampf. 87; Diffusion Metallflächen 119; Wirkung des Magnetismus auf die strahlende - (vergl. Wärmestrahlen).
 Wärmelehre 47.
 Wärmeleitung im Erdboden und in Kaminen 100.
 Wärmemenge in Metallgemischen 70.
 Wärmequellen 47.
 Wärmestrahlen, Reflexion 118; Doppelbrechung, Polarisation, Interferenz Beugung 119.
 Wärmestrahlung 104.
 Wallnufsaße 1074. No. 108 und der Tab. zu S. 1074.
 Wasser, Ausd. 61. 66; Maximum Dichtigkeit 66. 69; sp. W. bei versch. Temperaturen 86; Zusammendrückbarkeit 134. 135; Cohäsion 3. Widerstand gegen darin schwebende Flächen bei versch. Temperaturen Capillaritätshöhe 6; Schallgeschwindigkeit darin 154; lat. Dampf. 89. 91; Spannkraft des Dampfes zersetzende Kraft des heißen Dampfes 331; blaue Farbe 1236; Condensation in Mischung mit Säuren 46; Gefrierpunkt im luftleeren Raum 91; Nachweis organischer Materie darin 983; Z. durch Hitze 326 (vergl. Brunnflüsse, Meer-, Quell-, Mineralwasser) Wasserstoff, sp. G. des Gases 390, sammendrückbarkeit 135; Best. 9 - und Chlor, Einw. des Lichts 221
 Wein 1106 ff.; Entsäuerung 1108.
 Weingeist, vergl. Alkohol.
 Weinphosphorsäure u. a., vergl. Aethylphosphorsäure u. a.
 Weinsäure, Veränderung durch Erwärmung 507.
 Weins. Antimonoxyd (saures) 427.
 Weins. Antimonoxyd-Strontian 506.

- Weins. Kali (saures), Reinigung 505;
 Farbstoff in rohem 505.
 Weins. Salze, Beziehungen zwischen Zus.
 und Krystallf. 31; Wassergehalt 505.
 Weins. Wismuthoxyd-Kali 507.
 Weins. Zinnoxidul 437.
 Weinstein, vergl. weins. Kali (saures).
 Weinstock, Unters. der verschiedenen
 Theile 1082.
 Wetter, schlagende, in Erzminen 1250.
 Wickenpflanze, Entwicklung 1076.
 Willemit 1173.
 Williamsit 1195.
 Wismuth, Schmelzp. 71. 72. 81; sp. W.
 und lat. Schmelzw. 72. 81; Färbung
 431; Untersch. von Blei 970.
 Wismuthglanz 1156.
 Wismuthgold, natürliches 1153.
 Wismuthlegirungen, vergl. Legirungen.
 Wöhlerit 1203.
 Wolfram (Mineral) 1210.
 Wolframbleierz 1212.
 Wolframlegirungen 406.
 Wolframsäure und Salze derselben 406.
 Wolle, sp. G. 39.
 Wurfgeschosse, Bewegung derselb. 138.

 Xanthin 771. 777. 779.
 Xanthobetinsäure 827.

 Yttrioilmenit 1208.
 Yttrioantalit 1205.

 Zeitmessung 151.
 Zellensubstanz der Flechten 831.
 Zersetzung, electro-thermische 314; zu-
 sammengesetzter Gase und des Was-
 sers durch Hitze 326.
 Zimmtöl, Ausbeute und sp. G. 709;
 Zers. durch Phosphorchlorid 712.
 Zimmtsäure, Zers. durch Phosphorchlorid
 535.

 Zink, Krystallf. 434; sp. W. 81; Schmelzp.
 und lat. Schmelzw. 73. 81; electr.
 Leitungsvermögen 289; Verhalten zu
 seleniger Säure 435, zu Quecksilber-
 lösungen 446.
 Zinkeisenspath 1225.
 Zinkglas 1187.
 Zinklegirungen, vergl. Legirungen.
 Zinkoxyd, sp. G. 41. 434; krystallini-
 sches 434.
 Zinkoxydhydrat, sp. G. 41. 435; Kry-
 stallf. 435.
 Zinkspath 1224; als Versteinerungsmittel
 1240.
 Zinn, Schmelzp. 71. 72. 81; sp. W. und
 lat. Schmelzw. 72. 81; electr. Lei-
 tungsvermögen 289; Verbr. in Mineral-
 wasser 1013; Trennung von Arsen
 968, von Antimon 969; Zus. ver-
 schiedener Sorten 1023.
 Zinnchlorid, vergl. Chlorzinn.
 Zinnchlorür, vergl. Chlorzinn und Zinn-
 salz.
 Zinnlegirungen, vergl. Legirungen.
 Zinnober, Vork. 1158.
 Zinnoxid 438; sp. G. und Ausd. 58.
 Zinnsäure, vergl. Zinnoxid.
 Zinnsalz, Darst. 437.
 Zinns. Natron, Darst. 1058.
 Zirkon 1171.
 Zoisit 1174.
 Zucker 792; in der Leber 895; Ver-
 theilung und Gehalt in den Runkel-
 rüben 826; Untersch. verschiedener
 Arten 983; Einw. von Salpeterschwe-
 felsäure 1146; Asche von Roh- 1106.
 (vergl. Rohrzucker, Traubenzucker,
 Milchwasser, Stärkezucker, Glukose,
 Saccharimetrie).
 Zusammendrückbarkeit fester Körper 127,
 flüssiger 133, gasförmiger 135.
 Zusammensetzung, Beziehungen zur Kry-
 stallf. 29, zum sp. G. 40, zum Sie-
 dep. 93.



Schnellpressendruck von Wilhe

Abkürzungen in den Citaten.

Eine eingeklammerte Zahl hinter einer Abkürzung bedeutet, daß die citirte Bandzahl die einer 2., 3. Reihe [Folge, série, series] ist.

Ann. Ch. Pharm.	„	Annalen der Chemie und Pharmacie, herausgeb. von Wöhler u. Liebig. — Heidelberg.
Ann. ch. phys.	„	Annales de chimie et de physique, par Gay-Lussac, Arago, Chevreul, Dumas, Pelouze, Boussingault et Regnault. — Paris.
Arch. Pharm.	„	Archiv der Pharmacie, herausgegeben von Wackenroder und Bley. — Hannover.
Arch. ph. nat.	„	Archives des sciences physiques et naturelles, par de la Rive, Marignac, Pictet, de Candolle, Gautier, Plantamour et Favre. — Genève.
Berl. Acad. Ber.	„	Monatsberichte der Academie der Wissenschaften zu Berlin.
Bull. soc. d'enc.	„	Bulletin de la société d'encouragement pour l'industrie nationale. — Paris.
Chem. Gaz.	„	Chemical Gazette, conducted by Francis. — London.
Chem. Soc. Mem.	„	Memoirs and proceedings of the chemical society of London. — London.
Chem. Soc. Qu. J.	„	The Quarterly Journal of the chemical society of London, edited by Ronalds. — London.
Compt. rend.	„	Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'académie des sciences. — Paris.
Dingl. pol. J.	„	Polytechnisches Journal, herausgeg. von G. J. Dingler und E. M. Dingler. — Stuttgart.
Jahrb. Miner.	„	Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefactenkunde, herausgeb. von Leonhard u. Bronn. — Stuttgart.
Jahrb. pr. Pharm.	„	Jahrbuch für practische Pharmacie, redigirt 1847 v. Herberger u. Winckler, 1848 v. Hoffmann, Winckler u. Zeller. — Landau.
Instit.	„	L'Institut; section des sciences mathématiques, physiques et naturelles. Dirigé par Arnould. — Paris.
J. chim. méd.	„	Journal de chimie médicale, par Béral, Chevallier, Dumas, Fée, Guibourt, Lasaigne, Orfila, Payen, Pélégot, Pelletan, Pelouze, Richard et Robinet. — Paris.
J. pharm.	„	Journal de pharmacie et de chimie, par Boullay, J. P. Boudet, Bussy, Soubeiran, Henry, F. Boudet, Cap, Boutron-Charlard, Frémy et Guibourt; suivi d'un compte rendu des travaux de chimie par Gerhardt. — Paris.

J. pr. Chem.	bedeutet : Journal für practische Chemie, herausgegeben von Erdmann u. Marchand. — Leipzig.
Peterb. Acad. Bull.	Bulletin de la classe physico-mathématique l'académie de St. Petersburg.
Pharm. Centr.	Pharmaceutisches Centralblatt, redigirt von Knop (im Anf. 1847 v. Buchheim). — Leipzig.
Pharm. J. Trans.	Pharmaceutical Journal and Transactions, edited by Bell. — London.
Phil. Mag.	The London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazin and Journal of Science, conducted by Brewster, Taylor, Phillips, and Kane. — London.
Pogg. Ann.	Annalen der Physik und Chemie, herausgegeben von Poggendorff. — Leipzig.
Pol. Centr.	Polytechnisches Centralblatt, herausgegeben von Hülse und Stöckhardt. — Leipzig.
Repert. Pharm.	Repertorium für die Pharmacie, herausgegeben von Buchner. — Nürnberg.
Sill. Am. J.	The American Journal of Science and Arts, conducted by Silliman, Silliman jr. and Dana. — Newhaven.
Verh. Gew. Bef. Pr.	Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbflusses in Preussen, redigirt von Schubarth. — Berlin.
Wien. Acad. Ber.	Sitzungsberichte der Academie der Wissenschaften zu Wien.

In dem vorliegenden Jahresbericht ist Atom- und Aequivalentgewicht als gleichbedeutend angenommen, und folgende Zeichen und Gewichte liegen den Formeln zu Grund :

Aluminium	Al=13.7	Kobalt	Co=29.5	Schwefel	S=16
Antimon	Sb=129	Kohlenstoff	C=6	Selen	Se=39.
Arsen	As=75	Kupfer	Cu=31.7	Silber	Ag=108
Baryum	Ba=68.5	Lanthan	La	Silicium	Si=21.
Beryllium	Be=4,7	Lithium	Li=6.5	Stickstoff	N=14
Blei	Pb=103.7	Magnesium	Mg=12.2	Strontium	Sr=43
Boron	B=10,9	Mangan	Mn=27.6	Tantal	Ta=18.
Brom	Br=80	Molybdän	Mo=46	Tellur	Te=64.
Cadmium	Cd=56	Natrium	Na=23	Terbium	Th
Calcium	Ca=20	Nickel	Ni=29,6	Thorium	Th=59
Cerium	Ce=47	Niobium	Nb	Titan	Ti=25
Chlor	Cl=35.5	Norium	No	Uran	U=60
Chrom	Cr=26,7	Osmium	Os=99,6	Vanadium	V=68
Didym	D	Palladium	Pd=53.3	Wasserstoff	H=1
Eisen	Fe=28	Pelopium	Pe	Wismuth	Bi=21
Erbium	E	Phosphor	P=32	Wolfram	W=95
Fluor	F=18,9	Platin	Pt=98,7	Yttrium	Y
Gold	Au=197	Quecksilber	Hg=100	Zink	Zn=32
Jod	J=127,1	Rhodium	R=52,2	Zinn	Su=59
Iridium	Ir=99	Ruthenium	Ru=52,2	Zirkonium	Zr=22
Kalium	K=39.2	Sauerstoff	O=8		







